



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele II

XXX

G

19

MARCO



XXX

g

19-20

THEOPHILI
BONETI

Doctoris Medici

SEPULCHRETUM

SIVE

ANATOMIA

PRACTICA

Quatuor Libris comprehensa & in duos
Tomos divisa.





THEOPHILI BONETI

*D. Med. Nec non Serenissimo quondam Principi Henrico ab Aurelia,
Longavilla Duci, &c. à Consiliis Medicis.*

SEPULCHRETUM

SIVE

ANATOMIA PRACTICA,

Ex

CADaveribus MORBO DENATIS.

Proponens

HISTORIAS ET OBSERVATIONES OMNIUM
penè humani Corporis affectuum, ipsorumq; Causas reconditas revelans.

*Quo Nomine tam PATHOLOGIA Genuina, quàm NOSOCOMIA Orthodoxa fundatrix,
imò MEDICINA VETERIS ac NOVA Promptuarium dici meretur.*

Cum INDICIBVS necessariis.

OPVS OMNIUM MEDICINÆ ET ANATOMIÆ CULTORUM
votis hætenus expetitum summoque labore decerptum ac congestum.

Tomus Primus.

AFFECTVS CAPITIS ET PECTORIS CONTINENS.



GENEVÆ,
Sumptibus Leonardi Chouët.

M. DC. LXXIX.







Illustrissimo Potentissimoque S. Rom.

Imperii Principi

FRIDERICO AVGVSTO,

PRINCIPI WIRTEMBERGENSI,

COMITI MONTISBELIGARD ET EBERSTEIN,

Domino in Heintonheim, Fravenbourg, Forbach & Werdenstein.

S A L.



EMINI olim privato apud Persas coram Rege se sistere concessum tradunt, nisi aliquo è Regia cohorte introducente: Audebo tamen ultro Serenissimam Celsitudinem Tuam intrepidus adire, experta iampridem gratia fiducia impellente. Cum Genevam nostram presentia Tua condecorares, quoties auderem accedere, toties Benevolentia, vultus serenitate se prodentis, fores patebant. Id mihi beneficii alius si concessum, Absentem, meique memorem verear compellare? Hoc vero manet alta mente repositum, Celsitudinem Tuam, dum Genevam incoleret, cum Serenissimo Fratre, valetudinis curam commissam mihi voluisse, ac profiganda febris, tunc temporis epidemia, cuius aliquot impetus sustinuerat: Hac qua animo non excidisse scio, ut accedere iterum suscipiam impellunt, & ut librum hunc Celsitudini Vestræ voueam & nuncupem, cum iam non suppetat aliud magnificentius quod ad Tuos tholos appendam. Multis gentibus eum morem fuisse legimus, ut mola salsa & lacte Diis supplicarent, si deficerent thura, Si novitas rebus omnibus aliquid pretij & dignitatis afferre solet, non est quod diffidam quin aliquam gratiam initurum sit hoc leve donarium, apud Celsitud. Tuam, rerum novarum ut studiosissimam, sic laboris in comparandis quæ Principi ornamento futura sunt, tolerantissimam: Testes oculos producimus quam pertinaci & indefesso studio horis succis suis & subsecundariis, libris incubueris, quas equestria exercitia, aliæque quæ utriusque Palladis sunt, concedebant Sereniss. Parentis vestigia premens, non alienam à Principis dignitate literarum cognitionem credidisti, quæ ex sententia Tyrii Maximi, Philosophi Platonici, iis imbutos medio intervallo inter Divos & ceteros homines collocat. Non Serenissimus Ille Parens Bibliotheca (cui parem tota Germania non videt, siue

librorum multitudini attendas, sive dignitati, sive ordinationi) constructionem, Non numismatum rariorum & rerum antiquarum, immensibus sumptibus & labore conquisitorum, cumulum in proprium usum tantum Nominisque famam meditatus est, Ex ungue Leonem qui novit, & in literas literatosque insitam insignemque propensionem Celsitudini Tuz destinata hac voluit: Hares illi ex asse esto, quo studio eruditos prosequitur, illorum Mecenas & patronus, qui

Solus tristes hac tempestate camoenas
respexit

Eodem animo favere illis perge: Palladis alumnum Marti & Musis sacra facere nil obstitit: Quam strenuus illius affecla fueris, prater vulnera tam dexteram, cujus robore plures conciderant, vel ipsi hostes testimonium perhibent, In celebri scil. illa pugna, qua à loco, Principatus Tuo finitimo, ubi Mars furebat, Argentinenfis nomen obtinuit, certamini, cohortis Dux, avidissime Te intulisti. Sed calamus reprimō, ne infra dignitatem Tuam dicentem, vel Tuo fastigio haud equalia, Virtutis Tua describi nescia magnitudo obtundat, Redeoque in viam, Celsitudinem Tuam regans ut leve hoc devoti animi symbolum sub tam splendidis & Augusti nominis auspiciis (pacem & divitias ominantis) publicum subire aspe-ctum patiaris. Deus O. M. diutissime Te toti orbi Christiano servet incolumem, votis annuentem (votis iam nunc assuesce vocari) qua toto animo effundit.

Genevæ ex Mulzo nostro
Calendis Martiis 1679.

Serenissimæ Celsitudinis Tuae

Humillimus & Obsequentissimus
THEOPHILVS BONETVS.



Præfatio ad Lectorem.

Ere^gre^uer^um nomen Mercurio olim inditum, quod animabus ad inferos ducendis praesert, in me derivatum iri est quod metum B. L. qui Te non ad Tempe, aut campos Elysios, ut alii (Scriptori enim officium est miscere utile dulci) sed ad cadaverum cervum, ad sepulchretum, imo ad *exuperiam* deducam, & loca in quibus.

Luctus ubique, pavor & plurima mortis imago.

Luctus ubique, pavor & plurima morbis imago.

A vèstigiis tamen Medicorum non discedo, quibus Mortis præsentii Morbi perpetuo obversantur: Nihilò felicior est Theologorum & Jurisconsultorum fors, qui Peccata & Lites, Legum Divinæ & Moralís impediunt, assidue objecta habent. De Peccatis illi agunt, devios à celesti tramite revocanturi: De Litibus Hi: pacem & concordiam concilianturi. Medici morbos arcere satagunt, bonæ valetudinis gratia, arque ut flammam vitalem à corpore & animæ defendant. En undique ex malo bonum emergit, ex Peccatorum abolitione, Salus æterna; Ex Litium compositione, redus, quæ terras reliquerat, Astrata, & Hi: æque æstus, & æstus æstus: Ex morborum profligazione Sanitas, bonorum omnium suavissimum, cæterum condimentum. At mortem, ultimam lineam rerum, quid metuet? Ad Theologorum castra transilire nobis liceat, Legimus in sacris (Ezechielis 37.) Prophetæ objectam fuisse plantilem, cujus superficiem arida ossa (telluris inutile pondus) tegebant, illa vi afflantis Spiritus collecta fuisse, coadunata, suo quæque loco coaptata, carne, nervis & cute vestita, tandem Anima adveniente, vitæ munus sequebatur. Hoc beatæ resurrectionis iudicium instituto nostro componere liceat: Morbo denarum quæpiam, ex naturæ lege resurgere etsi non contingat, ut tamen ejuspiam mors, si quæ sit, ut quæ sit, ac qui libitina destinatus erat ope Medica postmodum quasi resurgat, & diu in luminis aurâ evadat, in aperto positum est: hinc sicut ex mortuo leone apum examen exiliit, & ex forti exorta dulcedo, sic ex illius amarâ morte, hinc vitæ suavis accedat: Quin Æsculapium, Apollinis filium, non solum ægros perfanasse, verum etiam mortuos ad vitam revocasse perhibeat, Hyppolitum, Glaucum & Androgon,

*Tuque potens artis, reduces qui tradere vitas,
Noſſi, atque in cælum manes revocare ſepultos,
Qui colis *Ægeas*, qui *Pergama*, quique *Epidaurum*,
huc adei.*

Empedocles, teste *Diogene Laertio*, Philosophus & Medicus insignis, maximam ex eo gloria consecutus est quod mulierem defunctam vitæ restituerit. Ex *Plinio & Apuleio* lib. Florid. Asiaclepides, magni Inter Medicos nominis, hominem exanimatum, domo elatum, egojam iam imponendum, vivum reduxit. Nemini hæc *αἵμα* videantur, Animam enim jam sui juris, corporis claustris liberam, iterum in ea revocare, Aut eandem prorsus sepultam, corporis consuetudinem evadentem, artis vinculis intus coercere & colibete, perinde esse videtur: Adeo ut parti passim hæc incendant, jam mortuum suscitare, & mox morituum Oculi faucibus eripere: Nec hæc solum in Medici potestate, sed potiora, Cum sterilitatis causas auferat, artis efficacia præstat ut producantur alias nunquam nascituri: Præstat Idem ut fixus in utero ad statum usque parvus tempus degant, quo non exacto abortus & exiti Indubia occasio est: Quævis illorum numerus, qui absque periti Medici opera vitali aura non fruenter, innumera in lucem feliciter prodeundi obstacula amoventi: Multa etiamnum spondet *Anatome cadaverum morbosorum*, quæ vitia intus abscondita expromit, eo fine ut qui talia in sinu se fovere deprehender, imminens inde exitium præcavere studeat, ab eo mature se subducatur, siatque ex alieno periculo cautus: Ne itaque horrescas, Lector, ad rot cadaverum tibi obiectorum stragem, quibus vita & salus succedanea est: molestus fletor nullus nares fetet, contagiosi affectus abest metus: quin perpenderè quan-

PRÆFATIO

tum beneficii ex intimo viscerum scrutinio tibi accessurum sit: Cadavera olim, ne horrida essent, floribus spargebantur: idem faciliaturi sumus, flores hinc inde deceptos, & editi removere gratia, aspersuri: Quantum vero utilitatis apparat Tibi Lector, tantum mihi laboris & molestia impendat, calli devio, nec prius trito insistenti, & sine duce viam inviam ingressi: ideoque temeritatis nota signando, qui tantum itineris ardui emeriri aggrediar: Urinam aliquis occupasset, & operi immensæ utilitatis peritiam manū admovisset, onus humeris impar non imposuisset, imo decretalessem: Illustriss. *Harvee* id olim in mentem venisse tradunt. *Pel. Castellum*, Medicum Romanum, necroticis amplissime profectum, ac iusto has volumine complexum notat *Marcus Aur. Severinus* lib. de Abcessibus pag. m. 187. Eundem ducentorum cadaverum evisceratarum historias colligisse, titulo *Sepulchreti* emittendas, asserit *Clar. Velschius* in Sylloges Observationum: Novissime utilissimo operi annos plusculos dedicavit Illustr. *Thomas Bartholinus*, qui universam Anatomiam, (ait *Ipsus Dissertatione de Bibliotheca incendio*) non ad morem vulgarem aliorum Professorum, qui hæcenus in hoc pulvere defudarunt, ex sanis corporibus, sed morbo defunctis composuit. Quod Opus orbi humano invadit Vulcanus, xx. annorum laborem (treparabili iactura) momento absorbens. Quod integrum susceperat, & perfecerat, Vir Illustris, idem in particularibus aliquor morbis alii adgressi sunt, quos inter eminent *Thom. Willis & Joh. Jac. Wepferus*, qui Dissertationem de Apoplexia absolutissimam, ex *autopsia* eo morbo defunctorum concinnavit. His priores *Fernelius, Fel. Platerus, Car. Piso, Franc. Sylvius* de le *Bœ* Pathologias suas, solidissimo huic fundamento innixi, struxerunt. In censum veniant, viri Clarissimi, *Gul. Ballonius*, passim Operibus suis cadaverum dissectiones interferebant, *Schuererus* & alii: Equibus præsertim affectuum ætiologias excerpimus: nemini tamen vi illata, ut antiquorum vel recentiorum placita respicere vel amplecti quisque sit sibi iuris. Opus vero quâ ad capite ad calcem pertextisset cum deesset, temerarius negotium suscepit, tenuitatis propriæ conficius.

Quid valeant humeri quid ferre reculent.

Revera quis non doctrinæ, peritiæ, industriæ, sedulitatique concutitus & apparatus requiritur? Anatomes præsertim, accuratæ illius & subtilis, quæsi profiteretur Neoterici, intima quæque & abscondita scrutantis, absoluta cognitio? Consummata præterea experientia, & in opere practico inveterata *pericia*, quem requiriturum cumulum in me desiderati fac scio, alienis quippe oculis pluraquam propriis qui vidi in arte Anatomica, oculos manus exposcente. At si in magnis voluisse fac est, conatibus nostris & ingentibus laboribus qui faveant, & boni consulant non defuturos spero. Sed quandoquidem iacta est alea, ac *fecit indignatio* *aut* *seu* liberque evasit prelium, & qui me vendit *Bibliopola* putat Medicum, age dum, quædam de Operis ordine & dispositione dicamus: multa enim præfandi labore me sublevarunt Viri Illustres & Clarissimi *Thomas Bartholinus*, qui me haricatore impulit, & *Joh. Conradus Peyer*, quorum Judicia (Operis perfectissimi typi) hæc publica fruuntur: Id monitum antecedit, quanquam Anatomix Practicæ titulo superbiar liber, non usque tamen stare fidem: neque enim, quod Practicis in more est, morbi nomen, essentiam, causas, signa & curationem ex ordine proficere: Prohibeor ab instituto, quod est notiora, Affectus ægro ipsi & affidentibus manifestos, exhibere, à quibus ad ignota, morbi scilicet sedes, causæque abditas transiens fiat: Affectus autem illi plerumque symptomata sunt, sensibus fere obvia: ideoque nulla peculiaria morborum latentium, quos sensus non assequitur (e. g. intemperiei alieuius partis, obstructionum, &c.) adducuntur observationes: Qui vero in propatulo sunt morbi, corporis habitum obidentes, tumores, ulcera, &c.) quemadmodum symptomata suis quique locis collocantur: Demum palam est tyronibus opus hoc *avaleat* non esse, viam tritam sequentibus, sed provectioribus, qui ex usu, totò practico, remittentur, atque ex casibus rariis occurrentibus, practicas cautiones elicient: Anatomes etgo Practicæ ex sine nomen deducatur, cum Medicum ad praxin dirigat, in ea confirmet, necnon in Diagnostica, illius fundamento, Cum ex *Hippocr.* lib. de Lege, *is qui morbum novit, valeat non ad curandum tantum, sed etiam ad sanandum; Eum recte curaturum dicunt*, ait *Celsus*, quem *prima origo causa non fefellerit*. Quamobrem compendium nacti, cum Observata anatomica operis materies sit & basis, hæc congerere, collocare, servare, quantum liceat, ordine practico, è re visum est: his assensuendo scholia, quæ vel dedere Observatores: vel mutuatia, eruta ex iis, qui maxime corant Anatomiam vel propria: Id quoque innotescere volumus quoad assignatas in titulis observationum morborum causas, et si plerumque innuere videat affectum ejus, quod aperto cadavere se exhibuit, progeniem fuisse, non ubique tamen id causas illius adequatas me exstimare, ob varias quæ extincto calore, vel ad interitum vergente, accidunt in corporibus mutationes: cavillandi enim ansam sæpius præberem & erroris obijciendi: Norum enim illud

PRÆFATIO.

illud Celsi, *Nihil est stultius quam quodque homini vivum ita est, tale existimare moriente, imo etiam mortuo*: Et Valerii Maximi lib. 9. cap. 12. *Fine namque vita nostra variis & occultis causis expostio, imprimis quadam immerentia supremi sui titulum occupant, cum magis in temporis mortis incidant quam ipsam mortem accersant*. Flamma enim vitalis quandiu micat omnia expansa sustinet, in ordinem cogit, & putredine & corruptione vindicat: Eadem extincta, aut ad interitum vergente, concidunt, subsident, dislocantur: putredo & corruptio humores æque ac solidas partes invadit, adeo ut prioris formæ non omnia supersint vestigia. In id quoque notandum quod ait Eruditissimus Glisson lib. de Rachitide, *Morbos fere omnes tractu temporis alios diversæ generis sibi adfiscere, ideoque chronicos plerumque ante obitum esse complicatas*: Ne ergo patet Medicus in defunctis corporibus quicquid præternaturale reperitur ad hunc affectum (rachitidem) pertinere necessario: forte etiam magis ad alium morbum, huic ante mortem supervenientem quam hunc ipsam respiciat. Idem cap. de Gibbositate, *Anatomici frequenter ad hanc cautionem non satis attenti graviter in suis observationibus lapsi sunt, dum quæ ad alium morbum spectant, alteri, cum quæ ante obitum complicatus erat, adscriperunt*: Hunc erga errorem quo præcavimus, non temere ex unius aut alterius corporis inspectione pronuntiandum est, at multiplices sedulæque sæpe experimenta, distinguendum prius est quæ perpetuo, quæ plerumque frequenter, quæ raro in dissimilis ab eodem morbo occumbentibus occurrant: Enim vera sciendum est quicquid non perpetuo adeß in corporibus apertis, eodem morbo extinctis, ad primam id intimamque ejus essentiam spectare non posse, & quæ etiam neque illud quod in variis corporibus reperitur, quibus morbus abest. Neque enim morbus ipse existere potest separatus à sua essentia, neque essentia à morbo. Ideo Medicus insignis credit Pulmonem, qui ut plurimum corruptus aperto corpore reperitur, sæpe talem ante mortem non esse qualem anatome ostendit: At ut concedam post obitum alterari, præsertim si diu corpus infectum servetur, initium tamen corruptionis præcessisse verisimile est, cum aliquando inaliteratus deprehendatur, maxime in præcipitibus morbis: à chronicis enim, ob varium partium consensum, vix labem declinare potest. De Jecore cavendum jubet Clar. Theod. Kerkringius Observat. Anat. 77. ne inventa ejus corruptione Medici decipiantur, existimantes dum eam in cadavere inveniunt, ægrum diuturna illius tæbe laboravisse, eo quod viscis hoc subitæ obnoxium sit colliquationi, ut brevissimo temporis spatio crasin omnem possit amittere. Quod confirmat exemplo Equorum, qui concitato nimis cursu extincti erant, eodem quo conciderant die, hepar insigni & profunda putrilagine correptum apparuisse. Id tamen assertum dubium reddit Ruolans Anthropol. lib. 2. cap. 19. qui hepar humanum elixatum, sub mensam anatomicam projectum, toro anno incorruptum permanisse tradit, adeo ut eorum ille morbus occultæ vi, hepati infestæ, imputandus videatur. Nec silentio Involendum quod idem Vir. Clariss. de Polypis variis, qui sæpius in vasis occurrunt, tradit, morbi antecedentis potius esse productum & effectum quam causam, quod illos producere artificio noverit. Sed concessa dari quæ sanguinis in polypis concretionem excitent, non proinde negandum causarum Intrinsicarum sobolem eos esse posse, ac proinde multum morborum autores (quos præsertim parere maxime apti nati sunt) syncopes, cordis palpitations, pulsus interruptionis, apoplexiæ, &c.

Hæc quoque eo collineant ut Medicus in prædicendo sit cautus, præsertim quoad morbos qui cerebro assignantur. Nam, animadvertente Ballonio conf. 71. lib. 3. Sæpe capita hominum morbo capitis consumptorum aperta sunt, in quibus nihil commemorabile repertum est quod mortem intentasset, cum alioquin Medicus, aut abscessum, aut simile quid repertura ita pronuntiavisset, *Spes augurantium ipsa inspectio fecellit, & eorum fiducia & expectatio in stuporem vertit, ac si cum ipsa anima mortis occasio evolasset*. Nec prætereundum quod circa causas morborum productrices adnotat Excell. Wepferus Exercit. de Apoplexia pag. 286. *Plurimæ earum, quæ continentur vacantes, ac immediate morbum produciunt & ferunt, plerumque sensum coarctari, Sæpe diu in corpore delitescere nullasque molestias exhibere, & non raro paucis suis indicia præbere: Aut si quandoque molestia sunt, mandum tamen illum morbum efficere quem paritas sunt, si vel viriute validiores, vel quantitate abundantiores evadant, vel sepulta quasi ab accensione aliqua excitentur*. Tunc enim sæpe subito in actum deduci morbosque gignere. Huic consentiens Clar. Theod. Kerkringius Observat. Anat. 42. *Falsari, inquit, mecum, Lector, late-ri sæpenumero in corpore morborum causas, quæ & ipsa morbi sunt, quas ne suspicari quidem Medicus potest, Frequenter autem ab Anatomicis qui eas invenerunt: Observationes in lucem data id æferent generi humano commodi, ut dum medicamenta ordinaria ad speratam sanitatem parum conferunt, Medicus mentem advertat ad hæc, Indubria dicam patius quam ludos naturæ, quæ dum sic ludent, nobis illudit. Cum in tali caligine animus versatur, Tullius illud observepinus, In re nova atque admirabili investigato si potes: Si nullam reperias causam, illud tamen exploratum habito nihil*

PRÆFATIO.

nihil potuisse fieri sine causa, eumque errorem, quem sibi rei novitui attuleris, natura ratione depellere.

Caliginem vero discusserunt nova quæ affulserunt numina, olim abditas morborum causas in apertum deducunt: Ex quo illustrissimus *Harvæus* circularem sanguinis motum, novum jam in medicina fundamentum invenit, nihil mirum si Neoterici dituro caduco ædificio, prope novam instaurandam intraverint artem Medicam: Nec in Opere isto solus defudavit *Harvæus*, alios excivit qui ad structuram operas conferrent, *Bartholinus*, *Wendelius*, *Sylvius*, *Glissonius*, *Diemartbrochius*, *Wepferus*, & alios, ex quorum præsertim concursu & præiudicio opus hoc conflatum est, ut non tam meum quam ipsorum esse consisteat, ac sicut *Plautina* illa mulier, *Alienos labores eam suppositum mihi*. Porro si, ut eleganter *Hildanus* in Præfat. Operum, *Anatome clavis est & clavis Medicina*, an solidior basis, cui inniteretur Ars, queri debuit? Regio animo Viri illustres, qui Anatomen ad perfectionis culmen deduxisse videntur, *Egyptorum Reges imitari*, *Quibus*, teste *Plinio secundo*, lib. 4. cap. 1. *erat studium corpora scrutari moriunorum, & causas valendinum oculata fide recognoscere*: Ex stabili hoc fundamento, juxta partium quarumque phenomena, per observationes anatomicas ædificum hypotheseos veræ & reales cuduntur: hinc ægotantium symptomata quæque melius solvuntur & explicantur, causæ clariore evidentioresque evadunt: Et quanquam antiqua receptaque medendi methodus exinde non concutitur, rationes tamen unicuique affectui accommodatiores eruantur, certiorque lectu morbi eorumque causæ impetuntur: Glorietur ergo hoc nostro ævo multa incognita, populoque ignota profano quotidie succrescere.

Potiori jure Ars exultaret, si jactis fundamentis, congestaque materia, accederet idoneus architectus, qui ædificii structuram ab imo ad summum adgrederetur: Materiem uberlem, maceriem forte dixeris, lutuli: manum operi admovi, marmoreum, aut potius laceritium, daturus, donec aureum per alium exeat: At vero nulli rei contigit ut protinus & inchoata fuerit & perfectionem adeptæ, sua cuique & eruptionis & maturationis tempora: Opus hoc, adhuc dum in incunabilis, etsi mole vastum, indigetur rudis indigestaque moles, congeries incondita, arena sine calce, imo monstrum horrendum ingens cui lumen ademptum, per me licet,

non potes in nugæ dicere plura meæ

ipse ego quam dixi:

Qualecunque autem patronos pactum est & defensores, imo Divos majorum gentium, vimbonem hunc opponam non neminis telis, quæ sic irrita fient: Jatrarchias ille molitus Medicos quosdam Principes designat, Alios mediocribus officiis destinat, *Vnde tu ad flumen Inachi, Tu autem ad Portas Thebas*. Quosdam densa caligine obvoluit, nec fulgore quidem radiorum suorum (qui tam late splendent quam Solis parietis ad pectus) illustratio dignat. Antistes è specula salutis totius Reipublicæ Medicæ prospicit, ac præcavet ne falsæ, supposititiæ, fictitiæ, perniciosæ, pro veris, genuinis & utilibus irreperant: veteritque alter Atlas ne impositus humeris fractus illabaratur orbis Medicus: statim ac prælium opere meo gravium nuntiarum est, monstrum ali edicit, partum non expectandum, suffocandum in exitu, ne grandius incautos impetat, *Fugite, fugite hinc pueri, Latet anguis in herba*. Imo de parentis fama sollicitus est ne caduca fiat: at illius aucupio nequaquam intentum esse, norunt omnes quibus intus & in cute pater: perpetuus fere incola loci musarum cultui dicati, quem vir *ἄλκυονας* Morpheï domicilium statuit: Gloriæ si litavit, à viis legitimis nunquam deflexit: *Aviculas educare neglexit quæ occiderent Paphos est Deus*: Adversario si fides, toto in opere veri nihil, omnia ficta: Caurio tamen adfuit ut quæ vel male fides firmata testibus, aut ab auribus tantum, credulæque aures præbentibus, vel inexpertis manarunt, exalarent. Obiatis observationes, quarum laboraret fides, respui: Ex gratia nuperam de Medico, cui ante decem lustra alterum lumen ademptum, & marasmo senili in primo senio confecto, decumbente in superstitem oculum humore, hiantibusque oculorum tunicis, crystallinus humor, omnibus obviis, ex centro excussus est, nihil oscicis tamen, (sic visum Superi) & obiectam papyrum designare valuit, & candelam adnotam digitis indicare: Alteram item narrationem de foetu in utero putrefacto, cujus pars à muliere, Superstite adhuc & incolunt, per os exclusa. Hæc, & similia, sedare opus passus nō sum, quæ nec pueri credunt, nisi qui nondum arte lavantur, aut qui intemperie pietatis laborant, & falsa superstitione mentes quæ sascinat ægræ: Quin tamen quædam irreperant à vero forte aliena inficias non ibo, pro quorum tutela tanquam pro aris & focis decertaturus non sum: liberum est Lectori illis fidem adhibere vel detrachere. Nec tamen Opus totum falsitatis aut inutilitatis tedarguendum: cum quæ bona sunt multitudine mala superent, & sine pondere habentia pondus. Ne hos in scopulos impingerem præmonuit Excellentissimus Medicus

AD LECTOREM.

Medicus, à veridicorum historicorum censu quosdam Medicos arcens, *Fereffum, Schenckium, Zacutum*, qui, quia apella, male audit: At severum hoc est iudicium nisi, falsitatis reatu aperte convincantur, An quia quæ rara afferunt, à Viro Excell. visa non sunt, ideo suspecta? *quod non nesci fortassis novis Ocellus*: Notum est illud Averrois *Monstra in morbis sunt*, Si in morbis, quidni & in corporibus? An monstra in magno mundo admixtus non est? si in hoc, quidni & in microcosmo? Si à *Zacuto* manasset historia eruclarii illius, in quo viscerum omnium situs præposterus inventus est, à Medicis popularibus Viri Excellentissimi tradita, nunquid ut figmentum traduceretur?

Magis vero mihi metuo à curiosis & in evolvendo opere nimis sedulis, ob quædam ty-pothetarum culpa mala collocata; quædam etiam quæ iterato irrepserunt: Perpendat quæso B. L. hoc Opus non unius sed plurium esse annorum: neminem mihi fuisse *unumquemque* in colligendo, scribendo, exscribendo, recognoscendo: ideoque grandem laborem in errorem proclivem fuisse, ut quæ prioribus annis consignata etant, posterioribus tanquam nova se obtrulerint: Adde à pluribus authoribus unam eandemque observationem traditam fuisse, quæ tanquam simplex advenit: Professorum privilegio frui concessum non fuit, qui candidatos habent amanuenses, Idque muneris illis assignant: Amoliri quoque objectionem debeo, ob quasdam scil. Observationes vix inter se dissimiles, identitatem, ut sic dicam, referentes, unde inutili mole liber tutgeat, fastidium lectori inducatur: Cum vero certum sit plurimos morbos varia specie illudere, paucissimorum signa esse univoca, ea utilitas erit congestionis multarum homogenearum, ut si affectus alicujus symptomata eadem in pluribus ægris, & conformia, se prodant, Medicus certius se causam morbi deprehendisse credat audaciusque pronuntiet. Sin dissimilia, cautus sit in enuntiando, memor effecti Hippocratis, *Iudicium difficile*: Ea porro quæ fidem superabant multiplici exemplorum serie roborare necesse fuit. Grande autem Opus, varia variorum indicia subiturum scio, at qui bene consulant repertum isti spero, & conatibus nostris qui faveant, alios ad studium istud melius excolendum instigaturis. Aristoteles etiam male philosophantibus gratiam habendam esse dicit, quod ansam offerant vera inveniendi: Scopum me quam minime assequutum esse satis scio, id tamen profitebor me primum in hoc pulvere defudasse, & forte aliqua pars erit laudis temerariis ausis excidisse. Quicquid ab invidis ac malevolis opprobrii metuum, operæ meæ me nunquam pœnitebit, etique unde placeam mihi, vel quod

Functus vice cotis acutum
reddere quæ ferrum valet exors ipsa secandi.



Sequuntur Monitoria & Hortatoria Clarissimorum Virorum.

rumpantur ut Ilia Cedo.

*Fredericus Christianus Winclerus, Serenissimi Principis Electoris Palatini Archiater.
Heidelbergæ xvi. Februar. 1673.*

A *Nauciam* tuam *Præficam* quod actioet, si promisso modo evulgaveris Orbiste mirabitur & laudabit, ea enim demonstratio causarum morbosicarum, quæ hoc modo à posteriori fit, certissima semper & fere infallibilis mihi visa fuit: Hactenus tale opus Maxirè desiderabat ars nostra, & expectabat anxie ab Amico meo æternum venerando, celeberrimo Thom. *Bartholino*, &c. qui per proprias accuratissimas observationes causas omnes morborum à capite ad calcem cultro Anatomico derexerat, ejusque (ut ipse oretenus conqueretur) ad umbilicum ferè perduxerat, cum lugendo fato crudelis & invida flamma cum incomparabili Bibliotheca etiam hunc Thesaurum devoraret, & proinde nos omni spe frustraret. Sed eni! Phœnix ex igitur resurgit, infinita enim lectio & diligens crebraque observatio tua oobis amissum restituunt, & ætem nostram, hæcenus multis incertam visam, certam & benè in axiomaticis suis fundatam efficiunt. Ne dubites itaque, *Vix Excellentiſſ.* quin manibus Doctorum teneretur iste liber, & quin suum nomen æternitatis hoc opere commendabis: melius enim de republ. Medicæ mereri non poterat.

*Lucas Scræckius, Senior, Doctor & Reipubl. Augustana Physicus, Augusta Vinelicorum.
15. Novemb. 1673.*

A *Natomix* cognitio quàm necessaria sit Medico, cui morbos rite cognoscere, eisdemque feliciter pro-pellere, curæ cordique est, plures in saluberrimæ Artis mysteriis explanandis solertissimi, eruditè de-monstrarunt. Quibus jam jure suo merito annumerandus veni Clariss. *Theoph. Bonerus*, dum præter lucidam Orbis lectatio exhibitum scriptum, *Pharos Medicorum* nuncupatum, insuper *Praxin Anatomicam* divulgare, atque sic laborem maxime commendandam continuare parat. Huic propterea illud veterem *Felicer*! adclamare, mecum omnes veri benè dictorum factorumque æstimatorum lubentissimè assurgent, & symbolum petenti annuent. Quod autem meum benevolè requirere placuerit, per virum Amplissima D. *Reكتورatus* ac *Syndicatus* Almx Uoiversit. Annist. quæ Paravi est, functi dignitate illustrem Dn. *Joh. von Flammerdinge*, M. D. & Divi Marci Equitem Auratum, amicæ conversatione mihi gratissimum, benevoli in me animi *summiſſi* æstimo. Ast cum pericard apud nos cadavera lustrare, inque causas morboeum intrin-secas inquirete, supersticiosa erga demortuos veneratio, quæ (magis *Sennerti* effuso) piaculum vulgus habet, cadavera hominum, alias vernum eicam, Anatomix debita consumiteret, cum tamen Summorum Imperatorum, Regum & Principum autoritate id nihil deroget prohibeat, voto Autoris in communicandis rarioribus observationibus unam alteramque notare vix datur optio. Ne ramen *arripere* planè sim, aut hoc officii genere, tam amico perito, decisse velle videar, sequentes, non quidem luce publica dignas, sed meæ gratificandi promptitudinal indices, subministrare constitui, &c.

Johannes Geshof. Geilfusius Medicina Doctor, Butisbach, die 16. Novemb. 1673.

N ullus dubito Anatomiam Practicam, æque ac curiosam, Medicis omnino profutura, plurimos approbatores habituram, &c.

*Joh. Caspar Bauhinus Archiater & Primarius Professor Basiliensis.
Basilea 5. Januar. 1674.*

L audio institutum tuum Clar. *Bonere*, qui edendotum scopum tibi perexigis utiliterat publicam, quæ inde in rem medicam emanare poterit. Secus faciunt Observationum aliqui collectores, qui ut soli emineant sibi videntur cæteris omnibus plus sapere, quorum aut scripta legerunt, aut consiliis adjuti sunt, quorum truncatas sententias publico propinant minus suo ardentem palato; imo de convitiis ablinentes dum eos ignorantiam albo adscribunt quierant ipsis oon reticendi, quorum Umbra terrori esse posset, forte etiam deberet.

*Antonius Menjouius Consiliarius & Medicus Regius.
Parisius xxvii. Aprilis 1674.*

D e munere, quo me cohonestasti, gratiam habeo, Autorque sum ut rempublicam literariam juvare pet-gas, Utilissimas & cum judicio collectas emittens Observationes Tuas: Gratissima mihi fuit & frugi-fera lectio fragmenti à te mihi transmissi: Selys inest sincerus & geouinus, materia autem rata, quæ curiosorum animos capiet, adeo ut futurum spectem ut bene mereris de Republica literaria si ulterius progredi-aris: Impertii queso deinceps amicitiam tuam, quam hooosticam habiturus sum. Quantum in me est enitar ut eam commereat, &c.

Idem

Idem Parisiis 15. Maii 1675.

Redde mihi sunt paginæ à Te mihi nuper transmissæ, me cum fructu & auide perleget: Stylo nativo & puro conscripserunt, ac me iudice opus novitare & utilitate publico profuturum est: Eripe opter, Domine, autor Tibi sum ut in insulento pergassis: Si enim eadem sere ceteros humani corporis affectus protequeutus fueris, proculdubio universi Medicorum cœtus gratiam iniurus es: Condonabis veto mihi si hanc cautionem addidero, ut ne *Ferepsi, Sebentii & Zacui* vestigiis insistas, qui operibus suis fabulas plusquam Judaicas interseuerunt: rati admirabundos se habuissos Lectores, si stupendas hystorias adducerent: Candoris Tibi facinelle scio ac propitæ sante consilare Te velle: Posthac ubicunque se obtulerit occasio & Opera & Authoris perpetuus præco futurus sum, &c.

Henricus Glaser, Anatomæ Professor in Academia Basileensi.

Basilea 29. Maii 1674.

Fragmentum Anatomiz Tux Practicæ mihi destinatum tradidit Clariss. Dom. D. Mangolt, quo me honestate voluisti. Opus id insignem lucem allaturum est indagandis plurimorum morborum causis: assensum habiturum eorum quibus perscriptum est insigni diligenam quod intercedit certitudinem consequentiarum quas plerumque Authores à nudis conjecturis deducunt, & illam quæ fundamentum habet non fallit. Multum debeo Domine quod me participem facere voluisti, &c.

Carolus Offredus Medicus Patavinus.

Patavii Octobris xiii. 1675.

Anatomiz Practicæ mirandi sunt usus, nec satis extolli queunt, quod ex naturæ libro colligantur quæ errare nequit.

Ioh. Nic. Binninger, Serenissimi Principis à Wirtemberg Medicus, Poliater Montisbelgardensis.

Montisbelgardis xxvi. Nov. 1675:

Ex tuis colligere licuit me ab amicitia Tua non excidisse, ac librum Observationum à me editatum pergratum fuisse: Uterque nomine gaudeo, præsertim quod ex his aliquas selegeris, inserebas operi quod luci exponere fatigis. *De abditis morborum causis ex eadaverum dissectione revelatis.* Vocum est ut institutum illud Tuum, elegantissimum, utilissimum & laudatissimum cito prodeat, Ex quo quippe ornamentum, robur & certitudinem. Ars sibi comparatur est: Celeberrimi quique Medici in constructionem Operis concurrere deberent, communicatis rarissimis Observationibus Anatomicis, quo decenti ornatu cito prodeat completum in nominis Tui gloriam.

Gulielmus Groun Societatis Regiæ Anglicæ Socius.

Londini Maii 10. Stylo Novo 1676.

Gratulor admodum, Cl. Bonete, temporibus hisce nostris, in quibus Opus, & Reipub. Medicæ, & universo generi humano utilissimum, sed hæcenus frustra desideratum, Ex Te tanto Viro nasci consuegit. Qui cum excellenti rei medicæ cognitione, tum Græcis ut video, Latinisque licetis sis instructissimus, illud & opportunè Aggredi, & omnibus numeris perficere potuisti, & quod propterea adjicio, etiam debuisti. Equidem vehementer dolebam cum ante aliquot menses à Bartholini Opusculo à Te memorato intell. existens, præiosam illam Anatomiz Practicæ supellectilem, plurimum annorum laboribus à se collectam, incendio perisse: Verùm ex hoc dolore consilium recreabar, cum apud eandem illud mox occurrisset, Vtrum qualis Tu es, in eodem Argumento versari: unde & facile augurabar fore ut jacturam hanc æquiori animo pati posses. Nuperis dictis tuis Prodreum Tui Anatomici exemplum ab ornatisimo Filio Tuo acceptum, sine nequeo dicere quanto sum animi gaudio perfrui: cum & ipse scio quid de mechanica ceteris constructione, vistorumque, hoc est morborum ejus elucidatione jam pridem moliar. Tu interim Vir Clariss. Patrum hunc Tuum, quem sane vitalem, sed immortalẽ futuram spondere ausim, favente Lincii Disque nitiss in lucem publicam quanto citius depropere ac Vale.

Thomas Bartholinus, Regis Danorum Archiater, &c. Astorum Danicorum

ann. 74-75-76. Observ. 28.

Precarios Tuos conatus in promovenda Anatomie Practicæ non possum non publice laudare, quos privatim hæcenus tacitoque peccore estimavi, Dignum genio multiscio opus aggressus es, immortalis orbi encomio pensandum. Mihi istam fortunam invidit vulcanus ut Tux gloriæ reservaretur. Intererat sane Reipub. Medicæ ne diutius argumentum illustre negligere, cui Te patem monstrasse Placuit institutum, quod ex primis foliis mihi missis lenus hausi, sicut in Consilio meo de Anatomie Practicæ publice restatus sum: Majori gaudio me implevit Prodreum Tuum, anno corrente 1675. Genævæ typus expressus de Dolorebus capitis ex illius aperiione manifestis, ut de perfecti operis complemento optima quæque ominari debeam.

nisi quid finitici postendar nomen meum, cui illustrem libellum inscripisti: Non meritis sum tantum amorem, quem Tibi mecum debebum crudiri, quod serio ad desideratum argumentum totiq; votis protocatam accesseris. Perge in amore incepto, & qui tanto applausu particulam operis exire in publicum passus es, quod complementum adeptum est, noli invidere omnium expectationi.

Dominus Monin Medicus Divionensis, 7. Junii 1677.

Mibi semper in pretio fuit Observationes ex cadaverum anatome desumptæ: Idque animo meo alte infusum est nihil æque Medico medicinam facienti utile esse: ejusmodi exempla congesti *Benivonium* libro de Abditis morborum causis inscripto. Quod aggressus es opus, illi persimile est (cujus partem ulam mihi exhibuisti.) Medico practico summo usui futurum, eoque nomine mihi pergratum: Potto est ejusmodi observationes non frequenter occurrant, sæpe tamen occasiones cadavera dissecandi obvia sunt Medicis, quas elabi permittunt: non negligenda tamen cum morbi, quorum causa occulta est, intermunt. Futurum spero ut corpus insistas ac scribis Operis propediem deptomas. Omnium qui Artem excolunt eo pacto gratiam iniunctus es. Ego autem palam facio Prodrumi tui lectionem gratissimam fuisse, quo nomine gratias ago, &c.

*Raimundus Johannes Fortis, In prima Sede Patavina Prædicam Ordinariæ profectus.
Patavii die xxiv. Septembris 1677.*

Non in alium finem ab Antiquioribus Anatome fuit inscripta, nisi ut internarum partium affectiones nobis ignotæ, facilius innotescerent *Gal. lib. de Anat. parva*. adeo ut dissectiones atque disputationes in Arte Medica per Anatomen discantur, cum *Autopsia lib. An. sang. in art. can. 8. & 2. de decret. 5.* etiam demonstrationes suppet, atque vincat, cui acquiescere coactus fuit & Erasmus ipse: ut propterea Anatomes imperitii Medici non secus, ac exæci iter agentes, 3. per loca 2. errantes periclitentur; quare mitum non sit, si Anatomes ipsam tam fecerit, & ad sydera extulerit *Flavius Boëthius p. de Anat. adm. p. Romanorum Consil. Galenæ exorans*, ut libros suos de Anatomicis adgratificationibus in publicam utilitatem eaderet, quamvis moveat ipse *Galenus 2. de usupari. 3.* Anatomæ scriptoribus credendum non esse, sed *Dioscoridis* tantum plenam fidem habendam. Quæ si ita se habent, quis inter Medicos erit ita cæcus, ut non videat Anatomes necessitatem ad Morbos internarum partium dignoscendos? Verum si ulterius consideremus, quod quantacunque diligenti industria à Medico adhibita, ejus tamen cognitio conjecturalis *Introduc. cap. 5.* fallaxque sit, tanto acutiora humana debent evadere Ingenia, fortioresque conatus intellectus edere, ut conjectura non multum à certitudine distet. Quod si quisquam Medicorum inveniat, qui nos ad internarum affectionum cognitionem certam ducat, erit mihi alter Apollo. Quam Methodum à Te Vir Præstantissime modò teneatam audio, dum à posteriori autopsia ipsa non inodo contemptibilem, sed sensibilem nostram cognitionem reddere intendis, in tinandis, & indagandis abditis abstrusorum affectionum causis: Opus equidem Posteritati futurum utilissimum, diu cognitæ causis, & locis affectis, plurimi Morbi, hucusque incurabiles habiti, atque experti, curabiles evasuri sine. Ut igitur in tanto opere absolviendo pergas, non solum hortor, sed exoro humanam Virtutem tuam, ut de Republica Medica optime meritis has. Dissertissime vale, diu ego vivam. P. & Exc. D. T. Æt. Add.

*Andreas Falconet Pater, Medicina Doctor Lugdunensis.
Lugduni Gallorum x. x. Octobris 1677.*

Multum debere me profiteor Domino *Sponio*, amico singulari & Collegæ, quo internum literis me cohonestas, quin simul elegantis Tui instituti communes: De eo amice cum sermo incidisset, quæ mea esset sententia, gratulabundus prædixi: Nomen jam pridem atque merita mihi innotuerant ex libro à Te edito, cui matrem præbuerunt opera Viri præstantissimi & subacti judicii *Gal. Balensis*, in quo omnia eleganter concinnoque ordine disposita, extensa cum utilitate: De eo differendi ubi se occasio obtulit, cum Excellentissimo *Sponio*, in eam semper obvius sententiam bene Te de republica Medica metuisse: Ille vero cum adjungeret commercium literarum intere edere, rogavi testatum tacet quanti Te æstimem: Facta quoque nupti mihi copia libelli à Te editi, per quem reviviscit Excellentissimus ille *Prædictus Dominus De Mayerne*, ejus aliquot Consilia, cum Tractatu de Arthritide jam luce fruantur: Celeberrimus ille fuit Medicus, Opulentissimus, Expertissimus: Quicquid deinceps à Te produrum est, ut pote bonæ notæ, pergratum mihi futurum est, &c.

*Carolus Sponius, Medicus Regius, Doctor Montpelienfis, Collegii Lugdunensis Ficedecanus.
Lugduni Gallorum die xxviii. mensis Octobris 1677.*

S. P. Clarissime Dom. D. Bonata, Amicorum Optime, summoque cultu mihi prosequende, Hamanissimis tuis Literis significas, animo destinasse Te, publicis usibus propediem imperitii Syllogen Observationum, deptomatum ex Anatome & extipiciis personarum morbis omnis generis è medio sublata-ram, prout sese offerunt, cùmque Syllogen Practicæ serie disponendam, juxta ordinem Ion. *SENNE-RII* in simili materia prædemonstratam, adjectis prote nata Scholiis quibusdam, ad pleniorum re- rum minus peripicuum illustrationem: quo super cepto quid mihi videatur, rogatus. Ego verò, Vir Eximie, propositum illud tuum non possum non præclarum admodum, inò tantæ frugis, ut nihil super, pronuciare, quanquam perardum quoque agnoscum, valissimum ac laboriosissimum: quo sit ut ipsum

non immerito compellere liceat titulo facinoris Heroici, Herculani, *εργαλειόν*, solisque rariotibus ingenuis, quale tuum, apprimè digni. Nullus omnino dubito quin tuas inter manus adeò industrias, mirificos successus acquirat, incredibilisque volapetis sensu tam Te ipsum auctorem, quàm curiosos omnes Philistros sit affecturum, qui nullà unquam Tuam ledendi satietate capientur. Eoquod enim amantissimè (obsecro) spectaculum ipsis exhiberi queat, quàm in multiplici Cadaverum dissectione, Morborum prægressuum funestas quasque clades oculatè fidei perlustrandis exponere? quæ nonnisi imperitè intelligi, aut potius subsolerti tantum poterant ante corporis apertionem: ut idem hec evenire dicendum sit, ac in obidionum solutione, ubi spectatores ejus rei sacri poliopecticos omnes hostis labores oculis usurpare cominus faciliè possunt, si velint, puta castorum solum, munimenta, cuniculos, ruinas ac subversiones paratas, quæ singula, præterite adhuc hoste, obfessus minùs erant explorata. Consilium ergo Tuum, nunquam profectò facis laudandum, famique unicè celebrandum, non aliò spectare mihi videtur, in abditorum Microcosmi recessuum detectione, quàm collimabat olim modernorum Argonautarum, Christophori Columbi & Americi Vesputii votum, quo sibi propulerant Terrarum nova, aliò (ut ais ille) Sole calentia, hæcenusque ignorabilia indagare ac detegere, quemadmodum etiam faustis avibus tandem præstiterant, eoque ipso admirandi ac *δυνατός* apud universam posteritatem evaserunt. Nostra etiam Patriarum memoria non pauci extiterunt, quibus de meliore luto finietur præcordia Titan, qui præcipuo studio ad Anatomicum negotium serio pertractandum se contulerant, naturalem partium humani Corporis Diathesin accuratè rimantur, quo ipso non parum sibi pepererunt gloria. Quid si tali scrutinio gloria debeatur, nonne longè majorem merebatur alterum istud, cui lites, ictericuli genus, urpote multò majoris abolle, & ad Medicum potius quàm Physicum pertinent, quo scilicet perultrari solet Diathesis præternaturalis, quæ in corporibus morbo defunctis apparet, quæ quidem ipsa levi admodum brachio à plerisque Pathologie Prædicte delineatoribus hæcenus fuit excussa atque expensa: etiam si cetera hanc speculationem nunquam solidè exploratæ esse possint infirmæ quorumlibet morborum noxæ, neque ad unguem reddi possint rationes omnium & singulorum *παθημάτων* quæ per totum morbotum tractum occurrerunt, quas ad res assequendas hoc pacto commodissime perveniri potest.

Quapropter summo opere Te adhortatam velim, non tantum ut à suscepto molimine minimè Te abstergeti sinas, sed contra ut huic gnariter incumbas, quantum scilicet tum propriæ valetudinis, tum Tui abs tebus aliis oculi ratio patietur: imò ut quantumvis tam amabile pensum auspicetis: peruladissimum habens, Te Republicam Medicam hoc ipso impensè demeritarum, ac in stuporem quodammodo abrepturam, adeoque Nomen immortale Tibi comparaturum, aliisque fortassis aniam præbituram Tuum exemplum imitandi, præsertim cum fieri non possit, ut tantæ molis tantique momenti Opus ab uno dumtaxat homine & inchoari, & summam ad abolitionem perducì possit: quem ad scopum obtinendum vix ac ne vix quidem pates esse valeant aliquam multorum Viræ. Si vultis ergo Tu, Tuisque similes alii, reliquorum Aiclepiadæ ratio gratiam inire, atque ut Vobis applausus omnium concilietur emicete, non aliam puto Vobis viam esse calcandam. Allurgatur passim Vobis, Amor & Deliciæ Medicorum audietis, Elogia denique non inferiorem tribuentur quàm quæ primis Astrologiæ Cultoribus accinebat Ovidius,

*Felices anima, quibus hæc cognoscere primum,
Inque domos superas scandere cura fuit!
Credibile est ipsos, postis vicisque jocisque,
Aliis humanis exornasse capis.*

Vale Vir Clarissime, Tui Nominis officiosissimus Cultor, &c.

Carolus Drelincurtius Medicus Regius in Gallis, nec non glor. m. Principi de Turrena à Consilio olim Medicus, Nunc vero Lugduni in Batavis Reilor Magnificus, & Professor Medicus Primarius.

Lugduni Batavorum exente Oclobr 1677.

A Nacome Tua, Ars potior cum nulla sit, quò Veritas è puteò eruat, debitis illam laudibus nullus extulerim, sed Tuam, mi Bonete, *τις τι εἶδεναι τὸ το ἀγνῶσθαι* per Apollinis facta conector, ut perditus & pernox veritatem illam, quæ Medicina tenebras dissipat, expromas.

Id profectò suis numeris si absolvetis: *αὐτὸν αὐτομάτῃ* brevibus si perpensis, inanimis missis, quæ ad rei pondus nec *ἡδὴ δυνάμει* *εὐπροσμίᾳ* si fidus enarras, quibus, cum *Λιβύνα* *Σαττερῶν*, in tumultum est æget compellus; Cadavera demum, industrius si penetras, rerum medullâ nos ut exstatis, universus Tibi allurget Medicorum Chorus.

Macte igitur pericia Tui, Clarissime Bonete, & quam nactus es spartam, exornato, Nobisque nuncleam cedito, relidis pignori putaminibus. Sic ibis ad Astra, nec Te comitescunt feci Nepotes, vaticinante Tibi C.D.

Natalis Falconet, Andrea Filius, Professor Medicus Lugdunensis.

4. Calend. Januar. 1678.

F Ruertis tandem famâ nominis tui, & Lncubrationibus tuis tantopere optatis vicissim fruimur: cùm exequium penes nos sit opus rium Pathologicum, verus Therapeutices gnomon: Qui enim melius quàm tu *εὐαγέλιον* in tot *παθημάτων* in morbis prociis dissimilibus similium, explorata ratio poterat haberi? qui facilius pars affecla, cui debebat medicamentum, integrè damnosum, poterat internosci? Qui demum tantus tot syrtis ac scopuli in voracoso affectionum pelago exurgentes poterant declinari quàm novâ hæc observatio tuarum cyrofurâ? novum mehercle est opus, solote Machaone altero dignum, nec sanè novum ex sola novitatis gratiâ, ex raro dictionis nitore, ac variis conincuitatis & elegantiss quibus consue ornamentis, sed potissimum ob insignem *παρρησίαν* optima fruge sparsam, atque maximam quod con-

tanti & curando cedere emolumentum : opus ergo nomine multiplici novum, quippe quod nulli vel inter eos qui Anatomico inclinare, magis conspicui partem ætologiam cum pari felicitate fuerint persequuti. Omnibus curis, muneribus nec non periculis labori hunc impolitum tam gloriose defunctus es, ut quæ in te invisi-
bilia solis sub prælo fluctantibus converterent, illud apertantibus aliis detorrescerent : mitum equidem quoddam cum Evectus ludam in quo Literati ab omnibus invidiæ ventis solent circumfari, invidiorum mor-
bus & improborum contumeliam aufugens; ad tot enim veritatum splendorem convitentes qui aliorum opera dense Theonino solent rodere, defixis in rectam oculis tabula videntur rodere scientia. Sed quid quæso Zoilis fateri carpendum? nisi quod stolidi velut canes, nascenti in publica commoda, majoris ma-
gnitudinis allatent fideri : quis enim majorem lumine artem Medicam decoravit? quis diligenter excogitavit? quis auri uberius? oculosa, Vir Præstantissimè, aperuisti, iterum explicuisti, impetria penetrasti, angusta
ampliasti, universæ domum Medicinæ fines ad usque protulisti quod salebrosa & prærupta Diagnoses via,
ut ostendicularum plena, sic omnium errorum causa, jamjam nesciam si illustrata sed complanata, sis artibus
affectas partes primas necis hospites tantâ cum diligentia pertractatus es, & secundum vel minimas sui par-
ticulas erugisti, ut par passibus impendens fatum, nemini, quantum natura rei concesserit, non liceat averten-
tes stantemque solo conjectura nomine, alias audire coolueverant validiora rationum momenta, & dis-
sidium ex Disquisitionibus tuis orto, nunc ferme ad demonstrationis pondus accedant. Qui sint ergo qui
obstrepant antea? qui oggannant scoli? qui subsannent Mom? qui taceant Aristarchi? rumpeantur
sanè si qui forent millefimi Cleones, cum tot inter plausos ac solennia, Panathenæis celebra non minus
Litteratorum gaudia, nec cachinori, nec sibili, nec ipsorum scutarum magis vociferantium, tumultus adu-
riculas quantumlibet avidiores possent pervenire gratulabatur in musico suo amicorum constantissimus N.F.

Joh. Jacobus Harderus Medicinæ Doctor & Philosophiæ Professor Basileensis.

Basileæ xxi. Junii 1678.

Judicium de Opere Tuo in ultimis Tuis à me efflagit, certe levius illud foret, nisi Nominis Tui
suspitum prodere posset auxilio; ea enim ejus fama est quod Rei Medicæ peritos & Antistites hoc
seculo, ut vel solo Nominis auditu, liber Tuus facile apud omnes sit inventurus locum. Ea insuper
Operis Tui utilitas, ut non tantum quidam, sed etiam ij quibus paulo uberius Medicina delicias
gustare datum est, optima exinde depromere queant Theoremata, quibus adjuti, & in morborum
horumque causarum cognitionem facilius devenire, inq. his profigandis felicitari manu desudare,
poterant : imò insuper hoc Tuum Opus, Tui ingenii spirat aciem quod omnia junctam egregia, adeo
ut, si licitum foret, totus eruditus Orbis Te ad ulterius nobis pandenda, jure esset simulacrum. Ha-
bes itaque hic judicium meum leviusculum æquidem sed ἀλὼν ἄνευ & αὐτὸν ἄνευ.

Johannes Conradus Peyer, Schaphnusianus Med.

Lutetia Paris. 5. Julii 1678.

Opus Tuum historiarum Anatomico-Medicarum & novitate & utilitate adeo præclarum est, ut non
possit non ab omnibus expectari, quibus cura Medicina. Neque enim ad artis nostræ perfectionem quic-
quam desiderari potest accommodatus : Talibus sane historiis pathologicis ad patres affectus & morborum
causas discernendum vis multo potentior quam nudis rerum systematum præceptis dubilius regulis, quæ sine
exemplo sunt seculum sine sale : Io Philosophia naturali hodie obtrinit ut nihil verum putetur quod sensu-
bus percipitur, aut experimento demonstrari. Hac methodo si & medicina traditur, plurimum in ea cer-
titudinis atque soliditatis eminebit, nec eam adversari velut conjecturalem, & fortune rota instabiliorem
amplius traducunt. A cadaveribus cujusvisque dissectione, aut historiarum anatomicarum lectione nunquam
ædipoliteo nisi doctior & oculatior, ut cæcos omnino putem qui ista floccipendunt.

Joh. Baptista Fantonus Medicina Doctor, Angusta Taurinorum Collegii Medicarum
Socius, Et in alma Universitate Anatomies Professor. xv. Sept. 1678.

Dum ignotas in cadaveribus vias, per quas effugit vita scrutaris; extrema longè præcellis humana vi-
ta non minus, quam ingenij (Excellentissime Vir, Celeberrime) Eo quidem pervenit Anatomie in Bar-
tholinis, Riolanis, &c. ut incuncto assumpturam desperet secula : decet nullatenus perfectio, tibi soli
servata, quam cæteris respicere fatam; illi naturales partium status, vel morborum locos, ex sanorum cada-
verum dissectionibus recensent, Tu utrectius morborum non tantum locos, verum locorum affectus oculorum
examine præbes observatos : Neque quisquam (moet Harvey Exercita. Anat. ad Joan. Riolan.) facile cre-
deret quantum ex morbo, præsertim Coronarij, interiora perventur, & quanta partium interiorum Membra
in morbo gignantur. Ausim dicere, plurima dissectione, & aperto rabiidi, aut Morbo aliquo antiquo, vel ce-
renato conspectu corporis ad Medicinam tantum commodi, quam decem corporum strangularum, hoc hæce-
nus expectat Orbis, pollicentibus suis Petrus Castellus Romanus in Hipp. Aph. lib. E. p. 1. ad Dominicum Pana-
tolum, calcitrans sui censeas & dissectione cadaveribus observationes, sub titulo Sepulchretici, quod a pulchri in-
ter umbras fecum involutum finit, credo : Anxium quoque sub spe detinuit Orbem Magum Harveum
publicandæ Anatomie Medicæ, quod exequi negavit Patre : Celeberrimus denique Bartholinus Anato-
miam utilem sive Practicam, quam Publico erat obtuturus, invidiam nimis incedia consumptierat erat in fatis,
ac præclaretur occasio Anatomiz ruz Practicæ publicandæ : Pari titulo gloriatur Clarissimus Pauli Barbetæ
Anatomia

Anatomia, Riolani Pathologia & Molinetti, Ez tamen subalternatur Physiologia: Tua vetò *Vilinarum* erit *Anatomicarum Catastrophe*, vel potius *Theatrum Anatomicum Tragedia vite humana*, tot scenis divitum quod partibus distinctum, Varium tot actibus, quot morborum capita: Festina itaque (Vix Clarissimo) publice utilitati editionem; Anatomia nostro hoc seculo si ita adacta, ut hoc tantum egerat complemento, Tu perice, & dum oculis uteris in teites, quoniam occurrerit dissensio? proferat Hippocrates, *lingua in Arte difficile iudicium*, Si te includit, erravit: quæ incomprobat sensus non difficilis est iudicij: Denique tua hæc voluntaria mutilo prædicabunt eloquio immortalitati (Harveio loco citato) elogia. *Omnium nempe Aëtorum fides ante oculos ponere non est nisi divino ingenio exaltandum: gravem sibi subis præcursionem, qui morbos penè inebellabilem aciem fugientes oculis præficientis tradidit: decet hæc examina Anatomicarum principem*, Ego vetò tuo lætabundus applausu, partiali devinctus beneficio, gloriæ ex Animò.

Iohannes Jacobus Wepferus Poliater Scaphusianus xxv. Octobr. 1678.

L Andatissimum opus tuum quod attinet, Anatomiam sc. Practicam, nec me applausore nec defensori re indiget, cum vel solum nomen se commendat atque ex Prodomo de Capitis dolore ceu ex ungues Leo cognoscatur; ex illo enim perspicitur non solum sedulitatem & diligentiam tuam laude dignissimam, verum etiam in intelligendo, & ad suum locum quamlibet historiam exactissimum iudicium & in commentando incomparabilem eruditionem magno tuo merito singulariter æstimandam esse. Quilibet, cui vel mica salis in pectore est, Anatomiam Practicam non solum utilem sed quoque plane necessariam esse facile agnosceret: in omnium ore est Medicum tantum ad Curationem sufficere, quantum in cognoscendo valeat. At quis sine prævia hac luce plurimorum morborum loca præcipue affecta & causas proximas intelligit? nonne horum ignarus Andabatarum more hæc sacra profecturus? experimenta per mortes faciet? quos enim in medendo rerum locorumque gnarus scopos sibi præfigit? quæ medicamenta adhibebit? quorsum ducet, aut quibus locis apponet? Plura absurda prætereo: id tamen ausum dicere ob studiū huius-neglectum nimium quam diu nobis talia & delicta obstacula fuisset, & neminem hoc studium improbarum, nisi quem absurda deducere posset, nec scio qua philantia fascinatam, ut nihil rectum puer nisi quod ipsemet comminiscitur, quorum semidolorum se turba quotidie nobis occurrat.

At studium hoc noxium effutire, proflus diabolicam dixerim, cum non nisi è schola illa proficiscatur cui Generis humani juratus hostis præstet: quibus enim damnum aliquod afferunt? mortuis ne? aut paulo post effusa veritas fieret? An vivis? verum illorum bono labor iste suscipitur, nimirum ut præsens sanitas conservari, amissa si licini restitui possit: si quam noxam parit, illis afferet qui Reipubl. Med. commodis impensis invigilat, atque ut proximo bona conscientia in medendo inservire valeant, propterea vitam vili pendant: id Viri Excellentissimi & optime de Rep. Med. meriti Spigelius & Vellingini cum vite jactura, alii cum valentudinis incommodo fecerunt: eo laudabiliores quod Charitate Christiana nihil prius subvenire habuerint.

Iob. Daniel Horstius Diversorum S. R.I. Electorum Principum & Magnatum Medicus, Collegij Medici Francofurtensis Senior.

Francofurti 20. Dec. 1678.

Quæso, Vir Celeberrime, noli diutius tibi invidere doctissimos illos labores tuos, sed propediem in publicum publici boni causa illos eruite, quod mereantur plane: Non multa sed multum legisse præstat, nec multos sed bonos Authores noscere facit peritum & erudum: Multis vero non amplius opus habebimus, si lucem aspicias Tuum clarissimum & consummatum scriptum, quod ad Theoriam descendam & Praxim extendam sit validum illud ut & commodum, atque citra ambages commoda monstrat Philiano committenda & omittenda, sique ad solidam Artis Medicæ notitiam feliciter ducat, generalia specialibus, pro diversitate ægrorum & ægritudinum apposite applicando: Non contempno quidem libros controversiarum & dissertationum, sed ad bene medendum unicum Artis scopum, non faciunt tantum quantum Observationum collectio, à qua lecta relectaque plus solatii quam à doctissima quavis, in novatorum maxime, etudica, & subtili contentione, morbi acceperant, ipsæque Medicus cum adstantibus: Cum ante annos quadraginta Professoris Medicæ munus mihi in Academia Marpurgensi concrederet, in omnibus meis Prælectionibus hoc egit ut cuncta prolata exemplis potius Anatomicis & Nosologicis elucidarentur, quam spinosis disputationibus difficultia redderem, inculcante nempe Arte nostra longa & Vita brevis, Fac itaque ut brevino bect Tuum Opus desideratissimum & Vale. T. T.

Iosephus Du Vernay Doctor Medicus & Regius apud Parisienses Anatomicus. Parisi die xiv. Januarii 1679. ex Hortu Regio.

Tuum de Historiæ Anatomicæ-Medicæ Completum jam Opus Summa cum Animi Delectatione cognovi, mihi certo constat nihil ad promovendam Artis Medicæ praxim Accommodatius, nihil ad illustrandam Medicinæ Theoriam, eamque à tot inanum Syllatarum commentis expediendum, aptius hac Tua Elæubratione posse reperiri, quæcumque enim præceptiones sedulis istis ac certis Observationibus, illudque tot foletissimum tuarum medicationum accessione locupletari videntur, fidem plane locupletant: itaque huius Operis utilitate permotus meum hoc de ejusdem Excellentia Testimonium ad te libere

Ad Perillustrem Virum, Dom.

TH. BONETVM.

I Mmensas grates fundes Tibi qualibet aera,
Gloria Poenis prima, BONETE, chori,
Quid ferè iactantibus Artem conatibus erant,
Dique Cadaveribus parva trophaea docet.
In puribus suis mella feris qui quæere certant,
In microscopio aperis mille, BONETE, savas.

Carolus SPONIUS Med. Lugdun.

Ad Excellentiss. Clariss. Doctissimumq. Virum

Dom. D.

THEOPHILVM BONETVM

Med. Doct., cum Opus utilissimum

ad hunc usq. præparatum ad oculos in
lucem Princeps ederet.

Tilesius.

S I dum vivo meum corpus referare liceret
Censuræ animæ parti tua quanta meæ?
Pellera sed, nisi cum post fata recludere nos sit,
Moriem ero ad usque meam Bonete ianis.

VINCENTIVS MINVOLI in Aca-
demiæ Genevensi polioris
Licentiæ Professor.

Sur la même pensée

MADRIGAL.

Apprends Illustré Bonet

Médecin consommé par l'Art & par l'Usage

(Car en fin je le dis tout net

Au sujet de ce bel Ouvrage)

Que si comme les morts l'on entoure les vivans,
L'on pourrit dans mon cœur lire les sentimens
D'une estime pour vous toute particulière,
Mais que puis qu'on attend qu'on ait fini son sort,
Je les conserverai d'une telle manière
Qu'on pourra les voir encor après ma mort.

Le Même.

In laudem Auctoris & Anatomiz Practicæ.

D At bona Bonetus, mala cur tu Momo' rependit?
Non tibi de lato cor meliora fuit,
Theophili bonus omnis enim, nomen studiūque
Laudarum sera posteritas capis.
Magna melis opus præclare Hercules ausu
Is dedit, auspicii Gordia vincula fecant.
Ferro qua parat tacitas Libitina per artes
Ut jugulet miseros, ut struas infidias:
Felix qui potuit mortis cognoscere causas,
Hanc igitur libram voluit, revertis, tenet:
Te eruer absisteret, vel mors cauta non sed ecce
Hæc manus innocens vulnere parva salus.

IO. CONRADVS PEYER
Medicus Schaffala
Helvetius.

S E bona diffundant, ardo nec carcere claudi
Dum prodesse volunt se patiuntur ea.
Non mirum est igitur lucem præclare Bonete
Abellare tua nobile mentis opus.
Hoc Medici est, multis gratiam præstare salutem
Hoc præstas cunctis ore manūq. bonus,
Hinc nomen clarum splendensq. inferis astris.
Atque aspera tibi præmia fama canes.

JO. GEORGIUS MANGOLDT
D. Medicus Basiliensis.

Index Sectionum.

Liber Primus.

De Affectibus Capitis.

SECTIO I.

DE Doloze capitis

1. De Apoplexia

3. De Soporosis affectibus

4. De Catalepsi

5. De Insomniis & Incubo

6. De Vigilis p. n.

pag.1

76

124

146

151

154

7. De Phrenitide, Paraphrenitide, Delirio 158

8. De Mania, Rabie seu Hydrophobia 176

9. De Melancholia & affectione Hypochondriaca 182

10. De Imaginationis, Ratiocinationis & Memoriz læsione 206

11. De Vertigine 215

12. De Epilepsia 224

13. De Spasmo 244

14. De Scupore, Torpore, Tremore, Horrore,

Rigore, Anxietate	273
15. De paraffisi	282
16. De Hydrocephalo	304
17. De Catarrho	312
18. De Oculorum affectibus	329
19. De Aurium affectibus	342
20. De Narium affectibus	345
21. De Oribus affectibus	354
22. De vitis Vocis & Sermonis	369
23. De Angina	378

Liber Secundus.

De Affectibus mediæ Ventris, seu Thoracis.

Sett. 1. De Respiratione difficili	385
2. De Suffocatione	460
3. De Tussi	476
4. De Pectoris, Laterum & Dorsû dolore	476
5. De Hæmoptysi	526
6. De Exspulsiõe putulenta, Empyemate	537
7. De Tabe in genere & Pulmonari	545
8. De Cordis Palpitatione, Tremore	635
9. De Pulsibus præter naturam	660
10. De Leipothymia, Syncope	678
11. De Morte repentina	692
12. De Gibbositate	710

Liber Tertius.

De Affectibus imi Ventris.

Sett. 1. De Inappetentia	701
2. De Fame præter naturali	729
3. De Siti morbofa	740
4. De Deglutitione læsa	745
5. De Singultu & Ruminatione	755
6. De Concoctione læsa	762
7. De ventriculi dolore	768
8. De Nausea & Vomitu	790
9. De Cholera morbo	826
10. De Alvi profluviis incurrentis	828
11. De Alvi profluviis cruentis	853
12. De Excrementis alvi præter nat.	865
13. De Alvi adhiæsi	875
14. De Ventris dolore	890
15. De Hæmorrhoidum fluore, dolore	950
16. De Hypochondriorum tumore	951
17. De Hypochondriorum dolore	966

18. De Jæto	988
19. De Scorbuto	1008
20. De Cachexia, Leucophlegmatia	1017
21. De Ventris Tumore	1033
22. De Lumborum dolore, Nephritide, Calculo renum	1150
23. De Hypogastri dolore	1177
24. De Suppressionẽ urinæ	1205
25. De Urinæ difficultate & ardore	1243
26. De Diabete	1264
27. De Urinæ Incontinentia, & per locum indecentem Excretionẽ	1268
28. De Urinis non naturalibus	1271
29. De Hernia	1294
30. De Testiculorum dolore	1309
31. De Gonorrhœa	1311
32. De Uteri procidentia & descensu	1321
33. De Hyftericis affectibus, Suffocatione	1326
34. De Salacitate, Venetæ languida, Impedita, Fœcunditate & Sterilitate in utriusque sexu	1340
35. De Menstruo fluxu Suppresso, Imminuto, Inordinato	1347
36. De Fluore muliebri, & Excretis p. n. ab Utero	1353
37. De Graviditate falsa, conceptione Tubaria, Gemellorum origine, Hermaphroditis, Virginitatis notis	1358
38. De Abortu, Partu impedito, Fœtu mortuo, Puerperiiis	1371

Liber Quartus.

Sett. 1. De Febribus	1393
2. De Tumoribus p. n.	1507
3. De Vulneribus, Plagis	1657
4. De Ulceribus, Fistulis Gangræna	1631
5. De Fracturis	1639
6. De Luxationibus & Ambulatione læsa, aut motu impedito ob Ossium vitia	1645
7. De Decubitu Supino aut in Latera impedito	1649
8. De Arthritide, Podagra, Ischiadico dolore	1656
9. De Lue Venerea & Pliea Polonica	
10. De Affectibus Habitus, Externis	
11. De Affectibus occultis, chronicis	
12. Miscellanea	


INDEX



INDEX

Morborum & Affectuum.

Capitis Affectus.

 erebri intemperies humida cum piumi- ta, <i>fero pag.</i> 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 100. 101. 104. 106. 107. 108. 111. 112. 117. 124. 125. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 166. 168. 171	
Cerebri intemperies cum plebora	8. 9. 10. 12. 24. 28. 26
4. 5. 6. 9. 13. 14. 149. 154. 161. 162. 146. 148. 148	
Cerebri intemperies sicca	53. 149. 154. 161. 176. 162. 150. 184. 201
Cerebri intemperies cum bile	24
Cerebri inflammatio	42. 43. 156. 161. 167. 163
Cerebri intemperies cum atra bile	178. 180. 182. 193
Cerebri commotio,	1557
Cerebri substantia corruptio, <i>phacelus</i>	39. 43. 44. 50. 59. 110. 140. 182
Consumptio	300
Cerebri Tumores, <i>Abcessus</i>	18. 24. 26. 27. 28. 29. 39. 139. 140. 141. 158. 4. 19. 26. 27. 28. 29. 139. 101
Vesica	118
Fleura ventriculorum	154. 165. 201
Cerebri subfidentia, <i>disfolutio</i>	118. 120
Afoles parva	112. 652. 308
Vermes, <i>effa, calculi &c. in capite</i>	63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 72. 73. 74. 75. 180. 181. 143. 1494
Hydrargyrum	150
Cranii caries	57. 58. 59. 60. 61. 62. 118
tumor	120
Suturarum compages strilla	53. 58
discessio	56
Abcessus sub cranio	30. 32
Meningum inflammatio, <i>fuleratio</i>	34. 57. 39. 41. 35. 40. 163. 167. 139. 6. 1596
Caulum	34. 57. 45
Pustula	160
Siccitas	45. 161
Abcessus	34. 118
Polypi in sinibus	166
Tumores scirrholi, <i>Tubercula</i>	35. 36. 45. 47. 48. 49. 118
Flatus	24
Gummata	35
Vicera	161
Vermes	163
Macula	179
Vesica	120. 125
Pncredo	179
Capitis vulnera	1557. &c.
Apoplexia	470. 857. 838
letus	1454
Sopor	1587
Convulsio	1565
Convulsio digitorum	948
Capitis dolor	899. 1413
Catarrhus	1462

Suffocatio Externus

<i>Coryza</i>	
<i>Coma vigil</i>	
<i>Phrenitis</i>	1596
<i>Delirium</i>	1469. 1396
<i>Epilepsia</i>	387. 1110. 1187
<i>Paralysis</i>	1009. 1493. 1565
<i>Melancholia</i>	966. 1135
<i>Lassitudo</i>	1010. 1110

Oculorum affectus.

<i>Amaturosis, Cacus</i>	329. 380. 331
<i>Suffusio</i>	333
<i>Oculorum proci dentia exiunt</i>	357. 118. 119
<i>Dolor</i>	340. 341. 342
<i>Lacryma</i>	340
<i>Myopia, Nyctalopia</i>	341
<i>Pulcra</i>	1596

Aurium affectus.

<i>Aures purulenta</i>	342
<i>Surditas</i>	342
<i>Dolor</i>	344

Narium.

<i>Oderatus amissio</i>	345. 346
<i>Polypus</i>	348. 149
<i>Excretio feruida</i>	349. 350
<i>Hæmorrhagia</i>	351. 1018
<i>Sternutatio</i>	353

Oris dentium, &c.

<i>Gingivarum erosio</i>	354
<i>Angina</i>	388. 1442
<i>Aphtha</i>	354. 358. 1487. 1488. 353. 381
<i>Oris fætor</i>	355. 357
<i>Gangrena</i>	358
<i>Gula dolor</i>	358
<i>Saliva defluta</i>	359
<i>Labiorum tumores</i>	360
<i>Lingua calculeja</i>	366. in pollicentur abfcedens
361. nigra	361. 362. 363. 364. sicca, rubea
<i>feruida, affrica</i>	365. extra et exierit
<i>Gingiva eructa</i>	
<i>Epiglottis exalta</i>	
<i>dura</i>	
<i>Dentium caries</i>	366
<i>dolor</i>	366. 367
<i>cafus</i>	ibid.
<i>Dentitio difficilis</i>	365. 359
<i>Gultus pruritus</i>	368
<i>Ofitatio</i>	687. 746

Vocis & seminis vitia.

<i>Aphonia</i>	369. 370. 371. 373. 374
<i>Rauco</i>	369. 371
<i>Pax elongata, &c.</i>	370. 371

<i>Bellucius, Sermo impediens</i>	375.378	<i>Caruncula in sinu</i>	592.609
<i>Admiration</i>	375	<i>Ossa</i>	594.609
Pectoris & Pulmonum affectus.			
<i>Asperit atrox afflicta variis</i>	386.387	<i>Valvula ossis</i>	702
<i>Ulcus</i>	357	<i>Acria erisipium amplum</i>	80
<i>Pulmonum ariditas</i>	1408.1409.1410	<i>Ossis ventriculorum oclusa</i>	604
<i>Durities</i>	1479	<i>Pericardii hydrops</i>	462. 465. 471. 647. 648. 654.
<i>Inflammati</i>	365.390.397.535.610.1397.1454. 1456. 1459.1462.1469.1482.1502.1512	1414	
<i>Pleuris peripneumonia</i>	494. &c. 1464. 1628	<i>Inflammati</i>	688. 659. 677. 682. 685. 491. 515
<i>Pulmonum Erysipelas</i>	488. 1437. 1459	<i>Ischias</i>	645. 646. 810
<i>Pulmonum Abscessus, vomica, imbecilla</i>	397. 400. 566. 402. 900. 1399. 1408. 1412. 1437. 1448. 1450	<i>Exulceratio</i>	584
<i>Pustulosi</i>	1487	<i>Tumores adnati</i>	647. 677. 668
<i>Tumores</i>	391	<i>Vermes</i>	646
<i>Scirrhus</i>	528. 1407	<i>Cordis adnatum</i>	647. 676
<i>Splenecum</i>	530. 539	<i>Deficiens</i>	682. 692
<i>Varices</i>	477	<i>Valvula</i>	1606
<i>Coaliunt cum partibus vicinis</i>	415. 522. 1039.	<i>Cordis palpitatio</i>	469. 639
1469. &c.		<i>Tremor</i>	657
<i>Ulcera</i>	538. 546. &c.	<i>Dolor</i>	656
<i>Vermes</i>	479	<i>Scyaps</i>	674. 675. 1464.
<i>Lapides</i>	ibid.	<i>Pulsus debilis</i>	1039
<i>Pleuris inflammatio</i>	490. &c. 1442. 1458. 541.	Imi ventris Affectus	
1481		Ventriculi.	
<i>Phitula</i>	160	<i>Oesophagi conuulso</i>	747
<i>Pleuris Dorsalis</i>	530	<i>Obstructione</i>	748
<i>Diaphragmatis phlegmone</i>	166. 438	<i>Siccitas, durities, contractio</i>	749. &c.
<i>Abscessus</i>	685	<i>Ventriculi inflammatio</i>	174. 741
<i>Tumores</i>	539. 1057	<i>Ischias</i>	797
<i>Perforatio</i>	1176	<i>Erysipelas</i>	773
<i>Mediastini inflammatio</i>	482. 490. 491. 527. 584.	<i>Abscessus</i>	816. 780. 798. 577. 780. 798
593		<i>Scirrhus</i>	773
<i>Vomica</i>	1407	<i>Tumores</i>	781. 798. 197
<i>Pleuris & Pulmonum Hydrops</i>	417. &c. 444. 496. 462. 456. 576. 700. 1025. 1026. 648. 654. 1025. 1079. 1273. 1408. 1442. 1445. 1447	<i>Hydrops</i>	1130
<i>Empyema</i>	568. 425. 1290. 1662. 516. 557. &c.	<i>Carbo</i>	1514. 1516
556. 1621. 1653		<i>Tuberculum</i>	689
<i>Pulvula</i>	1601. &c.	<i>Gangrana</i>	796
<i>Pleuris Cancer</i>	417	<i>Ferruca, mola</i>	774
<i>Gibbositas</i>	710. &c. 1355	<i>Herpes</i>	816. 815
<i>Rachitis</i>	592. 611	<i>Pustula</i>	1494
<i>Phthisis</i>	318. 456. 413. 275. 545. &c. 1440	<i>Valvula</i>	1625
<i>Scorbutica</i>	1110	<i>Ulcus, Eroio</i>	1175. 168. 770. 771. 772. 773. 792. 792.
<i>Pellerea</i>	714	1147. 798. 846. 704. 721	
<i>Dorsalis</i>	530. 1172. 1317	<i>Fistula</i>	1291
<i>Respiratio laesa</i>	454. 385. &c. &c. 765	<i>Lapides</i>	780. 781. 783
<i>Tussis</i>	318. 362. 314. 605. 1393	<i>Extrahitum</i>	804. 805. 801
<i>Quintana</i>	428	<i>Laxitas, flacciditas</i>	312. 1114. 1114
<i>Spasmodica</i>	1498	<i>Corruptio, lacer</i>	816. 982
Cordis Affectus.			
<i>Inflammati</i>	635	<i>Contractio, parvus</i>	797. 892
<i>Tuberc</i>	1403. 184. 185. 1412. 1444. 201. 607.	<i>Contractio, attenuatus</i>	583
682		<i>Pylori scirrhus</i>	195. 7992
<i>Abscessus</i>	639. 184. 693	<i>Callos</i>	798
<i>Erosio, Ulcuscula</i>	638. 667. 534. 649. 681. 705. 564. 608. 679	<i>Glandula adnata</i>	620
<i>Polypus</i>	104. 106. 430. 471. 1035. 1040. 1044. 1045. 1046. 1079. 1470. 639. 693	<i>Siccatum</i>	799
<i>Sium mucosum</i>	651. 659	<i>Tubercula scirrhusa</i>	799
<i>Tumores</i>	656. 699	<i>Exaltit clausum</i>	802
<i>Hydrides</i>	678. 638	<i>Constrictum</i>	203
<i>Vermes</i>	651. 1524. 681. 693	<i>Glandula iadurata</i>	411
<i>Calculi</i>	639. 1477. 592	<i>Fames</i>	634. 810
		<i>Inappetentia</i>	395. 795. 858
		<i>Sium</i>	1454. 1481
		<i>Concoctio laesa</i>	1271. 1276
		<i>Rutina</i>	166. 767. 916
		<i>Pomina</i>	1280. 1568
		<i>Sanguis</i>	1013. 1675
		<i>Singultus</i>	1558. 1232. 1233
		<i>Ventriculi dolor</i>	141. 142. 620. 922

<i>Arenularum generatio</i>	1450	<i>Fluxus mercurius</i>	1199-1214
<i>Debilitas</i>	1379	<i>Atenſa-viſioſa</i>	575
<i>Corruptio</i>	1412-1419	<i>Hæmorrhagia uteri colli</i>	1348
<i>Tumor</i>	648-803	<i>Cervicidias</i>	942
<i>Luxatio</i>	445-987	<i>Falsa</i>	1104
<i>Tecori adnati</i>	612	<i>Conceptio extra uterum</i>	1198
<i>Vermes</i>	112-123	<i>Gemelli</i>	1155
<i>Pinguetudo nimia</i>	710	<i>Fœtus mercurius</i>	1199
Capitula Attributarie.			
<i>Maſſa</i>	198	<i>Partus difficultas</i>	1062
<i>Veficæ uſellum.</i>		<i>Secundina ſubſiſtentes</i>	1127
<i>Inflammatio</i>	1253	<i>Propter arum venarum tumor</i>	946
<i>Ulcus</i>	1291-1293	<i>Hæſterica puſſio</i>	1260-707-722
<i>Aphidæ</i>	1420	<i>Febres.</i>	
<i>Scabies</i>	1245	<i>Bilioſa</i>	933-883-907-1200-1251-1254
<i>Tumores ſcirrhoſi</i>	1189-1228-1245-1246-1239	<i>Brachialis</i>	1474
<i>Carcinoma</i>	1268	<i>Continuus</i>	842-888
<i>Fungus</i>	1294	<i>Cauſus</i>	2492-190
<i>Dilectio</i>	1245	<i>Catarrhalis</i>	1450
<i>Calculi, Lapides</i>	1251-1285-1288	<i>Cephalica</i>	1192-1270
<i>Colluvieſis ulcus</i>	1243	<i>Commuſa</i>	1454
<i>Carcuncula</i>	1186-1236-1244-1247	<i>Ephemera</i>	1441
<i>Cervix intorta</i>	1238	<i>Epileptica</i>	1431
<i>Tophus in meatu urinario</i>	1475	<i>Hectica</i>	1402-1270-1279
<i>Dysuria, Stranguaria</i>	1668-1171-1187	<i>Inermiſtens</i>	1443
<i>Iſchuria</i>	788-1152	<i>Lenta</i>	1020-1270
<i>Mitio cruenta</i>	1281	<i>Lethargica</i>	1412-1468
<i>Ulinæ varia</i>	564-1270	<i>Leipſia</i>	741
<i>Cruda</i>	1020	<i>Maligna</i>	1493-1468-1276-917
<i>Dulcis</i>	1266	<i>Marafmodus</i>	1285
<i>Purulentum</i>	1288	<i>Pellus</i>	705
<i>Incontinentia</i>	1238	<i>Quartana</i>	1548
Sexti & Teſtium.			
<i>Hernia</i>	1234-1270	<i>Synochus putrida</i>	1443
<i>Teſticulorum dolor</i>	1709	<i>Synpromatice</i>	1405-1418-555-1442-1445-1467
<i>Proſtatarum tumor</i>	1244-1247-1249	<i>Scorbatica</i>	1013-1016
<i>Siccitas</i>	1245	<i>Singultiens</i>	1450-1398
Uteri Affeſſus.			
<i>Atroſa mul.</i>	1350	<i>Terſiana</i>	1279-1275
<i>Fungoſa excreſcens in cervice</i>	1324	<i>Typhodes</i>	555
<i>Cancer</i>	1195-1332	<i>Variola, morbilli</i>	466
<i>Complicatio</i>	1195-708	Affeſſus Externi, Habitus.	
<i>Corruptio</i>	1420	<i>Arthritis, Iſchia, Podagra, &c.</i>	194-837-1412-1432
<i>Extranea conſentiu, Lapides</i>	1195-1196-1054	<i>1433-1462</i>	
<i>Fungi</i>	1333	<i>Dolores externi</i>	1545
<i>Gungram</i>	1196-1357-708	<i>Ecchymofus</i>	1624
<i>Hernia uterina</i>	1300	<i>Facies ſurgida</i>	571
<i>Hydrops</i>	1091-1135-1136-1137-1140-1143	<i>Lenca</i>	632
<i>Mela</i>	1197-1136-1142-1143-1148-1155	<i>Lumborum dolor</i>	621-929-941-949-1075-1175
<i>1360</i>		<i>Lumbago</i>	1170-1173
<i>Præluſus falſus</i>	1088	<i>Macula ſcorbutica</i>	1110
<i>Polypus in vaſis</i>	1351	<i>Phlebitis</i>	69-70
<i>Sarcoma</i>	1126-1196	<i>Plica Polonica</i>	817
<i>Scirrhus</i>	1200-1136-1142-1491	<i>Scabies</i>	554
<i>Sinu marinus</i>	1188	<i>Subſaltu membrorum</i>	668
<i>Ulcus</i>	1200-1157	<i>Lues veneren</i>	456-519-521-522-750-770-771-847-1413
<i>(Cancerofus)</i>	1195	<i>Venena</i>	709-633-768-765-770-776-792-793-794-795
<i>Teſtium muliebrium hydrops</i>	1139-1141-1144	<i>712-949-1478</i>	
<i>Tumor</i>	1329-1330-707	<i>Fungi</i>	705
<i>Pomica</i>	1197	<i>Philtum</i>	620
<i>Corruptio</i>	708	Tumores præter naturam, &c.	
<i>Chloroſis</i>	962-1271	<i>Aneurysma</i>	199-469-496-531-1433-1550-1552
		<i>Aſceſſus</i>	1172-1555
		<i>Peſſalis</i>	1532
		<i>Oculatus</i>	1417
		<i>Abdominis tumor, meſentericus</i>	902-1468
		<i>Apoſtemum</i>	1415-1417
			1415-1417
			Bronchus

<i>Bronchocela</i>	464-807-1524	<i>Pedum</i>	967-972-1547-1650
<i>Bubo</i>	1471-1533	<i>Parotis maligna</i>	771
<i>Cafus, alijis</i>	944-962-964-848	<i>Paronychia</i>	3544
<i>Cancer</i>	1135-1530	<i>Sarcoma</i>	1521
<i>Vleceatus</i>	1197	<i>Scirrhos ordematofus</i>	1540
<i>Erysipelas</i>	160-329-1556	<i>manomatum</i>	1418
<i>Exanthemata</i>	1549	<i>Screatoma</i>	1521-1522-1544-1548
<i>Glandularum affeetus</i>	1541	<i>Spina ventosa</i>	321-1549-1633
<i>Hernia</i>	919-920-921	<i>Seroma, Scrofula</i>	614-925-926-1062-1524
<i>Bubonocela</i>	806-1201	<i>Tumot in genere</i>	616-1545
<i>Hydrocele</i>	309	<i>Adammarum</i>	1529-1531
<i>Hydromphalus</i>	1062	<i>Scorbuticus</i>	1013
<i>Saccocela</i>		<i>Serri</i>	1535
<i>Falsa</i>	964	<i>Varix</i>	477-1555
<i>Inflammatio</i>	139	<i>Vulneta</i>	1557-1600
<i>Musculorum Abdominis</i>	1057-1416	<i>Ulcera</i>	1631-1636
<i>Incubarium</i>	1452	<i>Filula</i>	1636
<i>Natta</i>	1517	<i>Gangrena</i>	1637
<i>Oedema</i>	1549	<i>Fractura</i>	1639
		<i>Luxationes</i>	1645

INDEX EORUM

Qui hoc in Opere adducuntur.

JOHANNES Aicholzius.
Joh. Albofius.

Salomon Albertus.

Amatus Lusitanus.

Paulus Ammanus.

Petrus Aponensis, Conciliator.

Fabritius ab Aquapendente.

Johannes Arculanus.

Johannes Argenterius.

Henningus Arniseus.

Johannes Affuerus.

Jacobus Aubertus.

Horatius Augenius.

Gulielmus Ballonius.

Ludovicus Bailly *Chirurgus*.

Paulus Barbette.

Caspar Bartholinus.

Thomas Bartholinus.

Joh. Bauhinus.

Caspar Bauhinus.

Joh. Caspar Bauhinus.

Gulielmus Beckers.

N. Bedeau.

Georgius Behrens.

Johannes à Belloforti.

Antonius Benivenius.

Christoph. Beunertus.

Jacobus Berengarius.

Carolus Berengugliis.

Gerardus Bergensis.

Georgius Berrinus.

Bertus.

Joh. Beverovicus

Theophilus Bierlingius.
Bidgood.

Joh. Bilgerus.

Joh. Nic. Binningerus.

Gerardus Blafius.

Perrus Blandinus.

Jacobus Bontius.

Johannes Bodinus.

Joh. Jacobus Bobrzensqui.

Martinus Bogdanus.

Arnoldus Boortius.

Joh. Alphonsus Borellius.

Petrus Borellus.

Olaus Borrichius.

Leonardus Botallus.

Hippolitus Boscus.

Robertus Boyle.

Petrus Boyftein.

Antonius Musa Brassavolus.

Joh. Hentricus Brechfeld.

Brengerus.

Brugelius.

Rudolphus Burkardus.

Joh. Burgover.

Thomas Burnet.

Joh. Butzius.

Lucas Bylerus.

Caspar Caldera.

Barthol. Cabrollius.

Franciscus Cailleus.

Jacobus Camenicens.

Joachinus Camerarius.

Joh. Ra-

Joh. Rudolphus Camerarius.
 Hieron. Capivaccius.
 Hieronim. Cardanus.
 Julius Caserius Placentinus.
 Petrus Castellus.
 Isaacus Cartierus.
 Prothus Casulanus.
 Gedeon Chabrazus.
 Gualterus Charleton.
 Moses Chartas.
 Johannes Chifflerius.
 Franciscus Chomel.
 Volkerus Coiter.
 Caspar Collichen.
 Tobias Cneulinus.
 Andreas Cnoffellius.
 Theodorus Collado.
 Realdus Columbus.
 Ludov. Herman. Combach.

Conradinus.

Paulus Constantius de Rebeque.
 Mauritius Cordæus.
 Caspar à Costa.
 Samuel Coster.
 Joseph Covillardus.
 Joh. Craro.
 Alfarius Crucius.
 Alardus Hermanus Cummenus.
 Tobias Czazkelius.

Stephanus Dentand *Chirurgus*.
 Alexander Deodatus.
 Antonius Deusingius.
 Isbrandus à Diemberbroeck.
 Petrus Salius Diverfius.
 Joh. Jacob. Venceslaus Dobrzenski.
 Rembertus Dodonæus.
 Joh. Dolæus.
 Leonardus Doldius.
 Michael Doringius.

Dovynctus.

Carolus Drelincurtius.
 Ludovicus Duretus.

Sebastianus Eckert.
 Joh. Henricus Egermeier.
 Gallus Eifchnekreuterus.
 Joachimus Georgius Elfmer.
 Joh. Sigismundus Elshostius.
 Thomas Erastus.
 Bartholomius Eustachius.

Gulielmus Fabricius Hildanus.
 Hieronymus Faber.
 Antonius Falus.
 Andreas Falconet.
 Natalis Falconet.
 Johannes Faber.
 Nathanael Fairfax.

Adrianus Falkenburgius.
 Gabriel Fallopius.
 Joh. Baptista Fantonus.
 Michael Fehr.
 Johannes Fernelius.
 Ferrandus Senior.
 Thomas Fienus.
 Joh. von Flammerdinge.
 Robertus Flud à Fluctibus.
 Martinus Fogelius.
 Cæcilius Folius.
 Rodericus à Fonsëca.
 Jacobus Fontanus.
 Nicolaus Fontanus.
 Lælius à Fonte.
 Petrus Foreftus.
 Samuel Formius.
 Raimundus Joh. Fortis.
 Carolus Fracassatus.
 Dominicus Fracassatus.
 Melchior Fribe.
 Christophorus Fromannus.

Ofsvaldus Gabelchovverus.
 Gaius *Chirurgus*.
 Claudius Galenus.
 Georgius Garnerus.
 Petrus Gassendus.
 Achilles Gasserus.
 Daniel Geiger.
 Conradus Gefnerus.
 Petrus Gassendus.
 Cornelius Gemma.
 Hector Gibaltus.
 Johannes Gilbertus.
 Matthias Glandorpius.
 Henricus Glaser.
 Franciscus Glisson.
 Reinerus de Graaf.
 Gras.

Georgius Grafeccius.
 Joh. Georgius Greifelius.
 Jacobus Greifelius.
 Ofsvaldus Grembs.
 Christophorus Guarinonius.
 Jacobus Guillemeau.

Philippus Hæcstetterus.
 Samuel Hafenrefferus.
 Ehrenf. Hagendorn.
 Paterfon Hain.
 Fridericus Hammericus.
 Georgius Hannæus.
 Joh. Ludov. Hannemannus.
 Christophorus Harder.
 Joh. Jacobus Harder.
 Johannes Hartmannus.
 Gulielmus Harveus.
 Joh. Hebenstrett.

Henricus ab Heers.
 Ioh. Helmsius.
 Moses Heldt.
 Ioh Bapt. Helmont.
 Johannes Henen.
 Augustinus Hermannus.
 Siboldus Hemsterhuys.
 Matthæus Franciscus Hertodus.
 Ioh. Ferdinandus Hertodus.
 Iohannes Hefius.
 Ioh. Heurnius.
 Ottho Heurnius.
 Hiarne.
 Nathanael Highmorus.
 Hippocrates.
 Fridericus Hofmannus.
 Gaspar Hofmannus.
 Mauritius Hofmannus.
 Cosmas Holtzachius.
 Martinus Holtzapellus.
 Iacobus Hollerius.
 Wolfgangus Hœferus.
 Iohannes van Horne.
 Hornungus.
 Gregorius Horstius.
 Ioh. Daniel Horstius.
 Houpeville.
 Ioh. Fridericus Huldreichius.
 Emanuel Hurterus.
 Leonardus Iacchius.
 Matthias Iacobæus.
 Oliger Iacobæus.
 Desiderius Iacotius.
 Julius Iasolinus.
 Ioh. Ieffænius à Iessen.
 Frider. Ferdinandus Illmerus.
 Ingraffias.
 Antonius Iodon.
 Thomas Iordanus.
 Laurentius Ioubertus.
 Iulienus.
 Georgius Sebastianus Iungius.
 Lucas Iustus.
 Ioh. Kentmannus.
 Theodorus Kerkringius.
 Athanasius Kirkherus.
 Tobias Knoblochius.
 Alberus Kyperus.
 Frider. Lachmund.
 David Laigneau.
 Ioh. Lamont *Chirurgus*.
 Ioh. de Lamomiere.
 Ioel Langelot.
 Iohannes Langius.
 Nicolaus Larcheus.
 Ioh. Henricus Lavaterus.

Andreas Laurentius.
 Lævinus Lemnius.
 Dominicus Leonus.
 Fridericus Lepnerus.
 Franciscus de Leflang.
 Andreas Libavius.
 van der Linden.
 Iodocus Lommius.
 Acta Londinenfia.
 Lofelius.
 Fridericus Loffius.
 Ioh. Petrus Lotichius.
 Richardus Lover.
 Marcellus Lucius.
 Cyriacus Lucius.
 Adam Luchlenius.
 Daniel Ludovici.
 Eduardus Maffi.
 Ioh. Daniel Major.
 Marcellus Malpighius.
 Magenus.
 I. Georgius Mangolt.
 Prosper Martinus.
 Matthæus Martin.
 Henricus Martinus.
 Ieremias Martius.
 Dominicus de Marchettis.
 Petrus de Marchettis.
 P. Andreas Marthiolus.
 Ioh. Marquardus.
 Thv. de Mayerne.
 Henricus Meibomius.
 Philippus Melancthon.
 Antonius Menjorius.
 Menxelus.
 Ludovicus Mercatus.
 Edmundus de Mera.
 Hicronymus Mercatialis.
 Thomas Merinannus.
 Georgius Abraham Merolin.
 Marinus Merfennus.
 Franciscus Michinus.
 Ioh. Mingaultius *Chirurgus*.
 Iacobus Moccius.
 Gothofredus Mœbius.
 Henricus à Moïnicen.
 Mollinetus.
 Valentinus Andreas Mollenbroccius.
 Monconis.
 Ioh. Baptista Montanus.
 Paulus Morh.
 Moutonus.
 Iohannes de Mutalto.
 Abrahamus Murgelius.
 Sebastianus Nafius.
 Ioh. Neander.

Netetus Netetius.
Benjamin Noel *Chirurgus*.
Ludovicus Nonnius.
Gregorius Nymmanus.

Obstetrix Galliea.
Adolphus Oeco.
Jacobus Oethæus.
Fridericus Orthlobius.

Marthias Paifenius.
Georgius Palma.
Dominicus Panarolus.
Aureolus Theophrastus Paracelsus.
Ambrosius Pareus.
Guido Patin.
Simon Pauli.
Joh. Henricus Pauli.
Pausanias.
Petrus Pavvius.
Pechlinus.

Conradus de Penin.
Petrus Paulus Pereda.
Philippus Persius.
Henricus Petrus.
Georgius Christoph. Petri.
Gaspar Pencerus.
Joh. Conradus Peyer.

Philotheus.
Petrus Pigray.
Severinus Pinæus.
Carolus Pilo.
Pillement.

Simon Pimpernelle.
Gulielmus Plantius.
Georgius Plautius.
Felix Platerus.

Plazzonus.
Scipio du Pleix.
V. Fortunatus Plemphus.
Plinius.

D. Pollet.
Johannes Posthius.
Petrus Potcrius.
Antonius de Pozzis.
Pressius.

Jacobus Primerosius.
Daniel Puertarius.
Franciscus Pureus.
Puylon.

Petrus Quentzius.
Josephus Quercetanus.

Justus Raphelengius.
Carolus Rayget.
Nardus Antonius Reechius.
Salomon Reifelius.
Joh. Renodæus.
Petrus Rex, *Pharmacop.*

Coelius Rhodiginus.
Johannes Rhodius.
Johannes Riolanus Pater.
Joh. Riolanus Filius.
Lazarus Riverius.
Christophorus Rœslerus.
Guernerus Rolfinckius.
Gulielmus Rondelætius.
Ronseus.

Henricus Roonhusius.
Abel Roscius.
Franciscus Rota.
Jacobus Rothius.
Franciscus Rouffetus.
Hieronymus Rubæus.
Olaus Rudbeck.
Christianus Rudnicus.
Henricus Rufus.
Joh. Udalricus Rumlerus.
Ruyfchius.

Phil. Jacobus Sachs.
Angelus Sala.
Dominicus Sala.
Philippus Salmuth.
Rudolphus Saltzmanus.
Sanctorus Sanctorius.
Antonius Saporra.
Henricus Sampsonius.
Philibertus Saracenus.
Hercules Saxonia.
Jul. Cæsar Scaliger.
Schmid.

Conradus Victor Schneiderus.
Laurentius Scholtzius.
Joh. Schenckius.
Joh. Theodorus Schenckius.
Schrodter.

Simon Seultzius.
Lucas Serockius Senior.
Lucas Serockius Junior.
Johannes Scultetus.
Melchior Sebifius.
Georgius Segerus.
Jacobus Seidelius.
Daniel Sennertus.
Johannes Serrarius.
Mareus Aurelius Severinus.
Joh. Baptista Silvaticus.
Benedictus Salvaricus.
Slegelius.

Cosmus Slotanus.
Henricus Smetius.
Reinerus Solenander.
Cornelius à Sommeren.
Paulus de Sorbait.
Lazarus à Soro.
Petrus Sphæretius.
Petrus Specth.

Adrianus

Adrianus Spigelius.
 Samuel Spilemberg.
 Carolus Sponius.
 Georgius Fridericus Stöffel.
 Nicolaus Steno.
 Carolus Stephanus.
 Bernardus Stieberus.
 Stockerus.
 Famianus Strada.
 Joh. Uldaricus Streiter.
 Suecus *Chirurgus*.
 Franc. Sylvius de le Boë.

Georgius Tanstetterus.
 Joh. Tardinius.
 Bernardus Telefius.
 Jacobus Thevart.
 Ignatius Thiermalr.
 Augustinus Thonerus.
 Raphael Thorius.
 Jac. Augustus Thuanus.
 Franciscus Tidicæus.
 Gothofredus Tilefius.
 Matthias Tilingius.
 Balthazar Timæus.
 Bernardinus Tornamira.
 Joh. Frider. Trafelmannus.
 Fridericus Treublerus.
 Victor Trincavella.
 Simon Aloysius Tudecis.
 Nicolaus Tulpus.
 Leonardus Turnheiser.

Franciscus Valleriola.

Franciscus Vallefius.
 Antonius Valetius.
 Joh. Valverda.
 Constantius Varolius.
 Christoph. à Vega.
 Thomas à Veiga.
 Georgius Hieronymus Velſchius.
 Franciscus Vertunianus.
 Andreas Vesalius.
 Johannes Veslingius.
 Bernardus Verzaſcha.
 Vidus Vidius.
 Viſcherus.

Antonius Vitaglianus.
 Joh. Georgius Volkamer.
 Laurentius Voſtfrigel.
 Johannes Walæus.
 Thomas Warthon.
 Wolfgangus Wedels.
 Joh. Jacobus Weperſus.
 Joh. Jacobus Wecker.
 Abrahamus Werner.
 Joh. Valeus Willius.
 Joh. Chriſtianus Wilhelmi.
 Thomas Willis.
 Joh. Chriſtianus Winclerus.
 Henricus Wolgnad.
 Laurentius Woltzfrigel.

Paulus Zacchias.
 Zacutus.
 Joh. Zecchius.
 Jacobus Zvvingerus.
 Theodorus Zvvingerus.

INDEX

INDEX

Rerum Memorabilium.

V.



V **U** **DOMEN** *pinguedine infarctum* 135. 631.
præsumptio in mortui 897.
ibocellus fereus in cerebro 4. 19. 26. 27.
diffusum epilepsia causa 135. 234. *ortus in*
supraepia fuit autem 19. *feliciter casu diffusum* 32. *quo*
curati non debent 40. 449. *in cerebro apopl.* *causa* 79.
peritum 118. 119. *citra masculum psum* 203. *generatio*
intra duplificationem membratum 247. *prope carum* 601.
in vena arteriosa. 413.
Abscessus in cerebro quando lumbum induci 141. *Signa* 164.
à effusione grava poudere 289. 290. *tunicatus in cerebro*
300. ingens in palmaribus 481.
Abscessus in vena arteriosa 613. 673.
Achotes raperus 39. *an urandi* 40.
Acidæ fræum sanguinem coquant, crassum attenuant 642.
acidum solum causâ frigoris in homine 688.
Aurorum usus cephalalgiam facit 14. *Sanguinem coquant*
964.
Acidulæ causa apoplexia 17. *hydræ* 1080.
Aconiti efus mortui causa 178.
Actiones animales non voluntaria à cerebello sunt 84.
Adipis generatio 107. 6. 957.
Adipis consideratio ad remedium exhibendum 1184.
Adipis paludosis hydropem parit 1219. *quo phibys inducit* 372.
606. 915. 918. Romanus catarrhes 344. 500. *frigida sunt*
vulneribus cap. 1172.
Æthiopiæ ex cranio alia crassius 54.
Affectuum infanorum causa 185. *hystride similes in viis*
1314.
Agonizantes quomodo recreandi 164.
Agonizantes in hoc mundo 2.
Alili tu causa ventris cordis 631.
Amplubionum respiratio 458.
Ancurysimati obnoxii qui situm mercurialem patiuntur 465.
interitum 511. *in collo* 327. 465.
Arteriosus arteria venosa 674.
Angina lacerata 388.
Auricularis causa 1569.
Aurilome cerebri 50.
Anastates an differat à leucophlegmatia 1097.
Anastomoses vasorum vires 1349.
Anime rationalis & sensitiva fides 17. 6. *quomodo afficitur in*
melancholia 194. *an immutabilis* 1496.
Anime brutorum memores organorum apparatus eget 109.
Animi passionibus rebedentes memem à sede distrahunt 147.
hystricam accipiunt 149. *neruosum genus intendunt* 147.
melancholiam inducunt 194. 195. *infaniam* 177. *vis in*
motibus generantur 195.
Antimoniæ præparatio 367.
Antimonium d'aph. pulmonis curat 104. 554. 567.
Aphonia quid hyppoc. 95.
Aphonia d'aph. d'aph. d'aph. 103.
Aphor. explicatione 10. 6. 6. 12. 43. *aph.* 10. 7. *pag.* 42. *aph.* 70.
4. 41. aph. 57. 7. *p.* 196. *aph.* 66. 5. *p.* 1186. *aph.* 77. 4. *p.*
119. aph. 79. 4. *p.* 1192. *aph.* 79. 4. *p.* 1231. *aph.* 565. *p.* 1002.
aph. 62. 4. *p.* 1003. *aph.* 3. 6. 6. 6. *p.* 858. *aph.* 456. *p.* 867. *aph.* 3.
6. 3. 7. 8. 66. aph. 65. 5. *p.* 863. *aph.* 11. 4. *p.* 868. *aph.* 6. 6. 6.

8. *p.* 1548. *aph.* 60. 7. *p.* 1562. *aph.* 34. 4. *p.* 711. *aph.* 46. 7.
p. 712. *aph.* 10. 6. 6. 6. *p.* 730. *aph.* 13. 5. *pag.* 537.
Aphthæ puerorum 218.
Apothecata in pulmonibus circa testem. 708.
Aque pericardii usus 647. *arigo* 698. 439. *malis in brachio*
580.
Ampullarum generatio 1549.
Apoplexia cur non audit in hydrocephalo 100. *variis fu-*
perueniens 118. *in illo cerebro* 120.
Aqua antiepileptica 1409. *frigida nixa* 413. 457. *bened. Rulandi*
519. epilepticarum nixa 195.
Ardoris sensus circa testem 182.
Artenularum generatio 1192. 1195. 1154. 1173. *citra calicem*
1163. 1164. 1154. 1175. 1176. 1192.
Argentum vivum cerealis sanguinem 150.
Auricicum appropinquum lachale 71.
Arteriz valvula caret in capite callosa 215. *an fiant* 38.
carens offa in capite 51. *vertebralis ampla in capite* 51.
capitis obstruere apoplexiam inducunt 77. 80. *an fiat ab*
earum compressione 77. *ruptio in cerebro* 86. *caricoides ter-*
tiofa in cerebro 109. *aorta ascendens amplata* 199. *tunica*
media est muscularis 637. *non habent in se pulchrum* 637.
arterialis ampla 751.
Arteria anatomica nova 671. *tunica* 1555.
Arteria cranialis fuit sanguine 632. *aorta truncus offus* 616.
Arteria venosa extensa 603. *aorta offa* 492.
Arteria trachea tunica 318. 318.
Arteriotoomia officiosa 596. 1. *vis in epilepsia* 139. *in tempori-*
bis 42. *apopl.* 106.
Anthraxi paraffis succedens 184. *arterialem crampi ac-*
cessus 257. 4. *quarta* 1432.
Arthritis an ab externis catarrhis 327. *offensa sape comes* 396.
Asthma lecti calore sustinetur 246. 454.
Atrophia post laxationem majorum articularum 1637.
Attractio que fit 337.
Audacia mendacior unde 178. *causa* 1039.
Auditus gravis in febribus 343.
Avives, equorum morbi 272.
Aurium officina 343. *famem fundentes.* 37.
Aurium tinnitum à lue venerea 348.
Auster cur differtur facit 386.

B.

Balnea calida morbos quando irritant 274.
Balsamus vulnerarius 1315. *omnis vis* 386.
Basilicum herba stuporem excitat 75.
Bdella quid 342. 345.
Bibo melitensis 760.
Bilis p. d'aph. 440. *colorem quomodo mutat* 441. *generatio*
in pancreas 848. 351. 872. *venius excludit an idem causa*
803. an corpore non mutetur 1674. *flatu apoplexiam excipit* 149.
Bilis 1781. causa causa cephalalgia 24. *meningibus suffusa*
24. magna copia naturâ altere pigritur 101. 995. *an apoplexia*
causa 102. 115. *an capitis doloris* 24. *suffusa in 1781.* 135.
ventriculis infusa causa tinnitum 196. *atra flatuum patens*
468. bilis nescitis 1278. *ex quibus constituitur* 990. *usus*
1051. 802. 613. 681. quibus ex qua calidi in cysti sunt
1000. usus via ab hepate ad duodenum 1056. *an causa colica*
926. ex massa sanguinis excutitur 935.
Bilioi quomodo sunt epileptici 214. *duplex* 778.

B.

Bilimach

Index Rerum.

[illegible]

Index Rerum:

Gravado à pure circa et obliterata	25	Hydrops simplex 426. subacutus 116. acutus 117. pericardialis	
Gummosus in corde sufficiens coram sanguine	471	in anasarca alibi 117. articularis	1044.
Gummi 98	1058	Hydrocephalus inter cranium & pericranium an datur 304	
Gulo animal	731	si ab obstruendis lymphaticis ingularibus 306. ventralis terebri	
Gumma in dente matris.	35	semper repletis reperitur 307. in punctis apoplexiis ac-	
Gustus privatus ab nervis illius derivis	346	cutis	116
Guta leneza	329	Hydrocephalus	1073
Gypsis matris circa caput	618	Hydrops pteritis morbus albuginis	405
Habitus proprius habet morbis	1031	Hydris sive hydrops	386
Hæmopsi ypsi sine tæsi	330	Hydropicis an semper calida 1124. Sili.	992
ab Hæmorrhagia marium superflua mania 178. apoplexia.		Afflicti fore semper unumquemque aliusque videris supponit	1044.
So. 96. 105. Largam fluxum sequitur 268. Hydrops 352.		Hydrocephalus afflictiis symptomata præcipua sunt 348	
1019.		medica 395. symptomata præcipua 189. 190. 199.	
Hæmorrhoides à morbo præteritis	935	abacis 194. 199. phlogosis supponit 198. legitima, albuginis	
Helleborus albus an venenatus 795. Symptomata	794	204. fides 203. 192. 197. an ea vasa inferiora veluti canalis	
Hemicrania nephrotica	44	sunt 203. ut autem summa 195. à venenosis non semper	
Hemiplegia à sanguinis circulatione impedita	114	pendit 200.	
Hentris magni obitus	1607	Hypochochidias palida notent 196. sunt quatuor 197. ut	
Hepatis constitutio naturalis 1008 an sanguis 1013. 1019		sape palpitat 636. petiti dicit	933
1035. angustia supra vix minuitur 1020. ligamenta 986.		Hypochochidias quæ esse debent 1468. contructio sape.	
frictura et lobulis 955. an fiesio	935	folias 1457. Sarum quid 1179. dicit non semper à juve	
Hepas rotundum sine lobis 131. passivum 194. daturum ali-		ant bene	984
quatum 604. fides colliguntur obstruunt 690. vena et		Hyperchochidias fluxus acidi	168
alera infestabilis	1617	Hypochochidias dolores in equitantes	984
Hepas regius, manifestum 154. diaphragmati adnotum 179.		Hydretic afflictiis ut dicitur in acidi 169. Hæmorrhoides	
204. 571. 1057. puto irritum, lura sanum 195. migr-		251. 255. 256. afflicti in vix 253. ut sape palpitat	656
cas 101. 1057. puto irritum, fides 103. magnus			
conglutinatione 117. magnus irritum 130. irritum ex-			
cessum 161. vatum irritum, glandula congestum refer-			
unt 200. fides 103. irritum, magni ponderis 473. amplexum			
38. 44. 149. 164. vatum irritum in lura 206. magnus,			
profundus fides 44. subpalidum quid significat 529. aff-			
licti dolores in clavis irritum 1472. non venenatum fides			
haberi in vix & mortuo 1472. an fides obstruunt 1081.			
non fides an hydrops causa 1054. Violentum aliquando			
attingit	1699		
Hepas per partum ab excrescentia si liberat 537. an per			
alium fides excrescentia 507. cum venenatis 1015. ad-			
notum, puto referunt 517. fides irritum in fides latero			
haberi 444. fides	845		
Hepas aqua digerunt 322. quando in lura venenata palpit			
707. fides puto in vix 620. 697. quasi fides induratum			
201. tumor sine fides 955. vix afflicti 954. fides			
venenatis 914. lobis irritum venenatis pteritis afflicti 936.			
venenatum fides 395. puto 354. vena ut lura			
1605.			
Hepas venenatum 344. magnus afflicti à vix fides			
344. calido & frigido quando digerunt afflicti 365. vix			
venenatum irritum	811		
Holothuriscus nota.	414		
Horroris irregularis vix 277. an pleuritidis vix 507. dicit			
puto fit 548. inflammationis vix comit	1457		
Homonum migrationes 12. 371. fides irritum in cerebro 232.			
alibi qualitates quæ elementares obstruunt 127. acutissimi			
in vix puto 232. transiunt ab irritum in vix			
204. an venenatis vix magnitas habet 311. 316. fides			
notum expulsi an à cerebro 315. venenatis cerebro expulsi			
vix 307. fides 307.	1403		
Hydatis magna in petore 203. in lobis vix 204. in ven-			
enatis 246. 179. dicitur petore arterias 34. hydatum ge-			
neratis 82. 1022. 1095. an venenatis vix 822. 13. fluxus			
obstruunt 1077. supra 103. calidum 118. circa afflicti			
notum obstruunt 404. in partum 445. generatio			
1103. 658. 1074. vix in vix 156. circa hep-			
Hydragrum quando salivatum moveri 1488. pul-			
visus morbum	594		
Hydragrum vix 59. 216. in cerebro reperitur 63. efflicti			
in corpore vix 63. 219. 220. pleuritidis puto 166			
Hydragrum nota.	406		

Index Rerum.

Labis ulcerata in febribus	360. arida pueris	367. tumor	361
Lacrime	340. in dolore capitis erumpentes		32
Lactis patus quibus convenit	1440. affinis vis		1420
Lagundi herba			266
Lapidei generatio in corpore	65. in vesica felis	ut frequenter	
65. per salivam relictis	65. in abscessibus	1451. h2. carnis	
fundis in bonis		1136. 1147.	
Lapides in ossa rariam	gignuntur substantia		1188.
Lecetis dolores qui obnox			304.
Leyn et inflammation			379.
Lingocomia			461.
Lazus virivirax			310.
Lexen hydropica			1062.
Leihagus pleuroidei quomodo succidit			156.
Ligaturae sanguinem quomodo siliunt			337.
Lingua glutine obita	263. modo raris coloratur	362. quomodo	
362. letum videtur	263. pellicula frangit in febribus	367.	
invenitur	152. quos afficit praesentium signis	462.	
quomodo afficit	461. confectio in febribus	463. hu-	
midu ventris	in dext	364. peripneumoniae	364.
Lich acinusatus veniens	4. 197. 395. 1003. 1008. 1110. 1111.		
1057. 941. 966. 981. a ventriculo in ipso non contra			779.
Lien melancholica an fides	1635. an eximi possit	1630.	
Lienus stratus			962.
Lien an sanguis	99. 967. ademptus extrahitur	nisi super-	
sit	99. multarum erumatur	autem	92. vasi existeret
caet	99. 959. 188. 1019. an humore acidi fons	99. non	
semper laborat in melancholia	188. epilepsia causa	241.	
242. confinitio varia morum diversitatem	fuit	214. utro-	
rum	189. confinitio cum cerebro & ventriculo	189. 190.	
affertum hypochond. parens	189. fibrum frequens	fons	
1411. 1435. primum hepatis emendatum	156. substantia		
1014. 1014.			
Lien utrumque cum incisura & cartilagineo	comite	98. amari	
nigra diffusio	192. magnus	veritus	109. quae
drum	cartilagineus	192. 245. oblongus	179. exilis
retundit	108. magnus	fractilis	230. ponderis
4. 161. 190. appendicem habens	191. gloriose cum venis	varicosis	191.
perit	191. patris	193. adtractus	412. ex tubuli
versum	4. 4. magnus	nativus	915. 916. frequens
915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 2679. 2680. 2681. 2682. 2683. 2684. 2685. 268			

Index Rerum.

Meningitum tumore inflammatorum	9. 34. 38. 39. costium 37.
46. fideratio 40. 41. fuerit 161. 162. ingreditur 46.	
morore furibundi 46. 47. libere coarctata 60. epilepsia in	
subiectum 214. magna ex parte immobilitas	214
Meningum cerebri lesarum signa 156. 4. dura an secunda	
157. 158. 4	
Menses suppreffi & fluentes capiti dolorem faciunt 14. pu-	
rulescent. 31. menstrua fluxus causa	1349
Metapneus quid	7
Metastasis quid	7
Meteorismus abdominis	1468
Mingendi & egerendi ne. officia simul / velle	1149
Mobile perpetuum in liquoribus humores reperiunt	186
Morborum vis in quatuor morbis 195. 185. 1112. omnia	
ficienda reddi. letum tamen solus 205. tractum parit	
276. animam quomodo afficit 183. humores intrat 991	
Morborum complicatio 182. periculum suffragium causa	
319. 321. trisuram mala indele 162. congerit 968	
Morborum successiones 1. quidam in statu demum evin-	
ant 148. idiosyncraticas & sympathicas distinguendum 2. boro-	
dicarum 178. epithelias ipsius succedunt 252. Necrosis	
Equisum 277. maligni signa 1467. aneurismales priores	
1468. febris hydrogas sequitur 1020. 1030. non evanes-	
cent 47. bile 868. ex lymphis	571
Morbi ab hepate 619. à liene 619. metastasici	639
Mores infusi, advenit 174.	
Moribundi cerebellum 268. Supra 139. deliri 169. 134	
Mors subitanea plumbi foderit	1673
Mors tubina à corporis pinatiss in vasis errantibus	105
Mors à poen frigida 742. expectatio acidit	436
Mors misto acutissimo febribus unde 1408. placida his quibus	
spasmodi interm 588. 598. à cerebro sine cordis con-	
sensu	709
Mors salvo sensu aboletur 302. debilis causa 303. sponta-	
neum. naturalis 247. 667. utriusque diversa erige 247.	
muscularis alio à motu aliarum partium 217. muscularis	
quomodo fit 248. catulosis quando iurat	1156
Mucus excrementorum melle sanguine non cerebri 312.	
313. in nervibus coalescit 313. 414. Paucis signum corpa-	
ris bene temperati non cerebri 314. multum aut vel paucum	
in quatuordecim	414
Mucosae fides ex ano	913
Mulieres emuncta natu flori utero obnoxia 414. alia	
alio magis hysterica afficit. obnoxia 249. oblique utero	
viventes 1102. sine luna	935
Mulier affectibus hypochondr. magis quam vir obnoxia 764.	
semper querula	765
Murmur ventris	946. 966
Musculolus qualem parci se ipsu tantum movet	147
Musculus temporalis an secundus	565
Mutitas per duntaxat comes	371

N.

Narcotica apoplexiam inducunt 79. humorem fervorem	
solent 127. summum quomodo adducunt 127. ventriculo	
nonant 127. Motum ante summum capi inducunt	127
Narcotica humer an robis ingrederentur	117
Natum tanta affatus organum 345. tubuli 345. in cu-	
bus lymphis excrementis 349. 351. Purgamenta non sunt	
cerebri sed massa sanguinea 35. 113. pruritus an ver-	
micum fuerit	1449
Nasturui officina 561. equitio contra pilula	630
Nervus luccos 46. 49. 191. 319. 825. 630. 631. est	
naturus	545
Nervorum annuum erige 273. an solidi aut perforati 192.	
pari rapti dissolutio 373. psyllis exsiliantur 360. pla-	
nas spualibus turgens 356. mittum non leditur in parisi	
ex solis 294. elidituri, spiritum quomodo deserunt 192.	

epileptum erige 319. 339. an perforati 329. extremis	
330. 314. consensu 331. corruptio 333. non fuit interfecti	
sed ducit 334. fuit angustia	109
Nervorum erigens afficit quia ipsius species variatur. 152.	
spiritum caput radolu	833
Nervi non trahunt aut restringunt. sed fibra nervosa 637.	
spiritum totum effusum 833. ii & tendunt prae-	
convulsione non sunt	1614
Nephrotomia an tentanda	1163
Nicotinam fumum vertiginem ciet	216
Nutricionis violenta causa 545. 546. ob vitiu pulmonum	
332	

O.

Obaficis nimis	1479
Obliuio est sententiarum prateritarum 170. à ferefa colla-	
vis in cerebro	143
Obfistitio appellativa, attenuativa 331. aperientia an fusa-	
fit datur 3. causa 105. moficem. alia in obfistitio labo-	
rentibus. alia in hypochondriaci 198. arteriarum cere-	
bri apoplexiam facit 102. an visibiles in viferum 1044.	
causa	974
Occipitis dolor 7. 10. 11. 39. 41. ut plurimum oritur ab	
utro	39
Oculi squallidi, rubentes phrenitidem denunciant 164. vafa	
habent sympathica 360. utro vergentes in capiti dolore 1.	
vulnus luteale	1590
Odoctus amissio à lue venerea 345. orpimento quale in can-	
thum 345. in erubi 346. aboliu causa 346. 347. organum	
an ficutum esse debeat	147
Oculi affert in vulneribus recentibus	1595
Oculophagi anatome 746. angustia 750. inflammationis 760.	
ventriculi formam habent	716
Omenti & ventriculi sympathia 565. diversum 179. 188.	
Or. furtivus, amplexus 200. 812. tumor in eo furtivus	
201. furidum. paridum 203. effi pua & illius annexum	
788. ad effictum densum	816
Omentum actum fuit 763. autem 758. diversum.	
distrahunt	582
Omenti vitiu fieri adscripta 197. tumor furtivus an can-	
thum 200. portio cito efficit quoniam usum habet 200. in	
merito longo conficitur 245. sine stridura 451. usum 567.	
durities striditudo causa 1343. conficitur 1016. 957. facile	
putret 915. amplius naturalis 882. 788. in omentum	
ventris dolori non omnia legu ingruat	905
Opiata memum ledunt 208. memum 214. hysterici le-	
thalis	1480
Ora ferit	205
Os frons intus flavum 24. erosum. perforatum 28. 398.	
ethmoides an cerebri emundissimum 28. canaliculi fra-	
ctum 88. 100. ethmoides	554. 715
Oscula in cerebro 68. autem epilepsia causa 236. in corda	
702	
Ossa abfessus patiuntur 238. vi ffecti fralla 270. tibi mo-	
dulla carer. 171. humeri epiphyfis confistitior gangra-	
nam fuit	1639
Officuli meningi pungentis signa	1598
Os sacrum sanguinolentissimum 1639. fractum in extremis	
gangrenam cito contrahit quoniam in medio 1639. morbo	
interperit. compositionis & solis unitatis obnoxium	
1643. lue venerea fragilis esse reddit 1645. esse caner	
quid 1640. ethmoidis rursus conformatio 712. temperant	
à perit. ano non sequit	874
Offium apoplexia 631. labet	632
Os ante animal egrot	1364
Os epilepsia obnoxia 331. pra pinguedinis copia fessum	
710	

P.

Pachanone	314
Palatum fissum affus ad filum fericam	463
Pachetui	

Index Rerum.

Pancrētis mulierum morborum causa faſſe adſcribitur 717.
Sinus tunc plerumque morbus ſuit 616
 Pancreas abſeſſa putrefactum 157. glandula plerumq. &
 magni reſeruum 203. epilepſia cauſa 240. 241. male lu-
 per aquas 524. in melancholico aliter ſim 554. item con-
 ſtricta 934. 988. durum & cartilagineum 935. nigri-
 tum 813. ſurſuſum erudit in morbo ſtremu 616
 Pancreas ex glandula conglomerata conſtat 250. 540. per-
 tinacium morborum cauſa 1435. 717. ſuum 1328. 1003.
 717. in aſcid 717. ad aliter gener. ſunt 1001.
 Aſcidii 1032. veri aſci 488
 Paraceſtreſis thoracis 545. abdominis 1321. 1084. 1094.
 1095. 1036. 1060. 1061
 Paralyſis peripneumonia ſuccedanea 498. apoplexiam quan-
 do non ſequitur 82. à uervulſione qui diſſert 165. apopl.
 ſuccedens 109. lethargo 116. ſanctitatem præcedens 208.
 epilepſiam ſequens 233. malum ſpirituum animi. diſpoſiti-
 um ſequitur 245. 174. cartilaginea aſſum 162. balneum albi.
 aciditatem 283. primæriæ. ſecundariæ 284. calicem ſequens
 284. 285. an à bile 298. à ſanguine 299. à meſenterio
 299. à parte inter cranium & duram meningeam. 299. in
 parte oppoſita capiti vulnerati 299. à ſpirituum anima-
 libus naturaſi 287. ab æternis inſuper 287
 Paresis ſolucam præcedens 295. ſuccedenti ſymptomatica 293
 Paronychia à febre maligna 272
 Partum iuvantiquando ſuſcitans 1386. Caſarem 1384. 1385.
 1200. partum 1325. partura ſua 1389
 Patella carui obnoxia 1546
 Pectoreſ conſuſus cau imo ventis 429. dolor cauſa in ven-
 tre latente 497. oppreſſo in cubito 153. conſuſus cum hæ-
 morrhoidal ætæria 192
 Pectoris dolor in hypochondriacis & ſteruſitatis 192. tunc
 aſſum ſuſum non ſequitur 268
 Pediculi ſub perianthio & inter digitos 69. differentia 70.
 71. generatio 70. 71
 Pedum & cordis conſuſus 272. planta dolor 291. hydro-
 cerum ut tument. 1101
 Pedes in lecto dolere ut egre incalſcant 1650
 Pedibus frequentia cauſa 916
 Penis ex leſe parit 770
 Pericardium cœſum 412. cordi adiacens 417. 420. 535.
 1052. diſſectum ſive 426. abſumptum 495. poſtuloſum
 1140. interius ſuperſuſum 1039. an deſiſe poſſit 1039.
 ſecus adiacens 1385. ſepit 588
 Pericardium aqua reſudans an polipore ut ſaiat 471.
 617. non ſemper aqua deſiſit in lectu 551. 1404 ſive
 humore 184. 101. generatio 1404. 1411. 1039. 677.
 pericardii uſu 676
 Pericardium affectum cauſa 53
 Peripneumonia ætæria ſepe deſiſcit 516. polipos ſepe
 corde gerat 1470. ſpecu ſebra maligna laborant ſepe
 1501
 Peritonæum deſiſcit 1413
 Peritonæum ad diſſum diſruptum 1297. ſumme dilatabile
 1201. uſita an ſides 924. 933
 Peritonæi dolor 984
 Peritis præcurſio 1501
 Phrenitis in moriam quomodo tranſit 178. moriam mer-
 curialis 165. oculis. moriſſe 148. ſi à ſpirituum anima-
 libus pleneſi 159. ut in anoxiaſ ſeruum non accidit 159.
 deſiſit ut magis obnoxia 159. qui ſuſcit incertum 160.
 epilepſi ſuſa 161. lediſa 162. confirmata 163. genera-
 tio 165. à leſa ſanguinis circulatione 63
 Phlœticum vis 610
 Phlogiſtis in hypochondriis 216
 Phlogiſtis inſula ſuſa 553. 554. pulmones duri 285.
 plane deſiſcentes 582
 Phlogiſtis lethalis cum pulmonibus cauſa coherens 553. cum vel
 nudum lethalis 556. à ſero acri & mordaci 556.

606. in plures annos prodellus 319. à lymphis 321. an
 à ætæria 318. utroqueſi 604. diſſeruit 605. non ſem-
 per ſanguinem ſuſcit 598. qui erudit 599. inſula
 ſuſa 599
 Plithificia paſſa calens 1275
 Picrocoli qui 808
 Pilem conſolida in bonum ventriculo 446
 Pili in dorſo & pectore ſuſum vergentes 192
 Pilula rix diſſolvunt in ventriculo 783
 Pinguedo nimis ſuſcitans 472. in ſiniſtro cordis ſim 106
 Pinguedo ſub cute deſiſcit vicia dyſipulata ſuſa 186
 Pingues quidem morbi obnoxii 957
 Placenta parum an ſerum pariat 140. an deſiſcit 171. in
 cerebro ut variis aſſum ſuſa 220. in quibusſam eſt ma-
 ligna 569
 Placenta quomodo dolorem capitis ſuſcit 45. quomodo ſit ſuſa
 311. quid 314. generatioſum lacum 313. ore & narium ex-
 cecit unde 321
 Placenta an à ventriculo in reſcem eat 1284. 1287
 Plethora parietalis 2
 Pleura poſtula miliaris abſeſſa 160
 Plexus choroidæus ſubſtantiæ 5. 125. 26. 262. atreſis.
 putrefactum. &c. 9. 6. rupta 8. 86. glandulaſ p. 2.
 24. 85. vas ruptum apoplexiæ cauſa 85. 86. hydroſiſ
 aduata 86. 87. glandula in hydrocephalo qualis 305. in
 hydrocephalo ſepit celluſat 306. uſu 145
 Plumbum redactum in pulcritum. venenſum 295. lumen
 pellit aduata leſe cauſa 417. mercurium ſuſcit 1673
 Podagry diſſeruit datura 94
 Pollicis radius lethalis 1625
 Polyphi in ſina longitudinali dura meningis 166. 236. 271.
 1575. in ſinibus ſuſcitans 166. in corde epul. parit 238.
 in corde 285. 104. 246. 470. 492. 819. 1629. in corde
 non reſolue cauſa ſolertiſſe. 295. apoplexiæ præce-
 dens aut ſequens 316. 77. ſerpiſis ſuſcitans in corde &
 quæ uſa 246. generatio 389. 431. 604. Rema frequen-
 tes 492. notum parietuſi 348. in uſu ſuſa 1350. 1352.
 in quibus parietuſi maxime generatur 1047
 Pomiceſ in cerebri inter annos & trivium 230
 Poniſtæ cauſa pancreaticæ conſuſio 205. in aſſum ſuſa
 aſſum quæ ſuſcitans generatur 1697
 Pons cœa diſſeruit cauſa 104. 1267
 Porcoſiſ diſſeruit ſuſum aſſum ſuſcitans ſigna 258. ſuſſerſa 601
 Porroſiſ diſſeruit ſuſum in hydroſiſ 746
 Porroſiſ diſſeruit 1540
 Porroſiſ quid 1694
 Pryalismi ſenſitio 558. ad obſerſum 471
 Pubertas ſenſum ſanguinis mercurium concitiat 236
 Puellæ quatuor primo ſupit. poſt ſenſum 207. ætæria morbi
 ſenſitans poſſulans 476. longitudo à reſuſu parentibus
 311. in duriſſum parit 1404
 Puero uena aperta poſſit 846
 Puero urine auarſa 1258. calculo reſeſa obnoxia 1779. 1170
 Pulmones ætæria mercurii 706
 Pulmones vim ſe conſtrigendi habent à ætæria 551. balneum
 ſenſum & motum 551. inſtitutio naturalis 554. quomodo
 auarſum 552. ætæria uena an ſolus ſeruum aſſum
 488. mercurio laſa 400. 401. per ſe non mercurat 434
 ætæria membrana acri ſenſit 504. tunc ſuſcitans
 545. aſſum ſerpiſis inſtituit 142. excreſcentia aliam
 quæ a cerebro ſuſcitans 218. Ramoſiſ à catarrho uena
 aſſum 324. uervulſum cauſa non ſuſa 268. mem-
 brana parit inſtituit duriſſa 542. 575. à capite per tra-
 cheam humores non exſuſcit 1462. uervulſa utraqueſi
 1469. 581. hydroſiſ cauſa 1031. abſeſſa 601
 Pulmones maculoſi à catarrho 610. parit dextra in phlogiſtis
 inſtituit aſſum 576. ætæria ſuſcitans ad ſanctitatem &
 ſenſum ſuſcitans 578. ætæria lætens 609
 Pulmones plano ſenſum an quæſit 578. lætentiſſi 581. pa-
 riunt

Index Rerum.

Natura laesa & bilis 300. *vitiosa* 210. in *senibus* actus *na-*
diuresis 307. *quatuor digni desolantes* 309. *disiectio ab in-*
vicem in Hibernia frequens 55. *obliterata* 58. *visigia in*
meningiis 179
Suppuratio in sanatis dura matris 30. *non semper in tu-*
morem est generis 31. 32
Syncope differt ab exaltatione animi & deliquio 689. *car-*
dialis causa 105. *versigo praecedu* 216

T.

Tabaci asus effluuii mori 347. *capiti* 1. *pulmonibus* 470.
1700. *et* *in* *erat* *cerebrum* *humani* 470. *adulteratio*
470. *nona* 819. 1700. *et* 214
Taber pellura 214
Tachys ergonum 58. 175. 15. 45
Tania suspensata vitum aspersans 295
Temperies calida sua seve abundat 422
Temporum valora 1618
Tendinum obstruio 157. *musculorum transversorum in tu-*
lore perforati sunt 1201
Tetebraio trani nassa mitter 1583. 1586. *quando nesci-*
feria 1584
Tetor subitui mortis causa 1042. *gravidu mori* 1559
Tetium cum alio partibus consensu 424. *in senia epilepsia*
344. *non capite consensu* 771. *in miquis lateres* 1202.
molliter 1566. *tamque* 310. 311
Tetlicolis est generatus 1341
Tetanus à frigore 109. *no. causa* 157. *exempla varia* 172
Thoracis vulnera penetrantia 414
Thouai abito 924
Thymus glandula suffocationem facit 463. *officiu* 489. *in-*
modu 355. 387
Tibiz aliu dyspulsione 185. *cervici obnoxia* 1546
Timor animam quomodo afficit 183. *causa* 1039
Timor affluuii inter apopl. & epilepsiam mediu 95
Tinex pisa vi 51
Tinctura traumatica 1586
Tiq. equorum morbus
Tonillae 747. *p. schistes* 380
Torcular cerebri 76. *an ab eo obstruio apoplexia* 3 303
Torpedo suspensio indutu 14
Transpiratio prohibita nocet 606
Transfusio sanguinis 635. *vide Chirurgia infusoria*
Tremor à vino unde 95. 176. *vino hantio ut flauis remit-*
it 276
Trepanum 12. *dis adhibitu* 1584
Trepanum ad evocacionem humorum à capite 73. *Cautu ur-*
ta asus 1571
Trepano quando caute fieri 8193
Tubum auri asu 1365
Tubercula pulmonum 400. *et* *magna in internis mem-*
bris partium 817
Tumorem cum folliculo generatio 577. *seuomatilis inter*
cerebrum & cerebellum 138. *à urina relictu apopl. causa*
120. *fiatibus in plore* 197. *tumori in cerebro causa*
239. *carneus in cerebro epilepsia causa* 236. *juxta pro-*
cessu materiam 33. *fractura in cerebro* 34. *fiatibus*
alioque materiam 35. *glabru in cerebro suppositu causa*
110. *variatur in uno tractu generatio* 1146
Tumorem causa in generi 616
Tumor totius à retere jugali 1600
Tumor fiatibus juxta carum descendente 1637. *pedum*
hydropicoru 1650
Turgescia humorum 8
Tussis generatio 414. 605. *aliquando miltu* 476. 605. *sua*
481. 488. 506. *in febribus* 484. *ab affluuiis inu venis*
484. *Quonia vel Quomodo* 488. *an ab hepat* 484. *à vapo-*
ribus modu 475. *non capite mollia* 307. *non semper est*

à capite 476. 488. *affluuii praesent causa* 568
Tympadi dyspnois furdo audium relictu 344. *an erga-*
num audium 344
Tympanites an affluuii pter 1111
Typhomania 162

V.

Valeculinarii quidam unde 629
Valoularum in venis vitiosa ab illa ipsa catarrhi 316. *sangu-*
nis venularem probant 316. *in lymphaticis* 360. *muta-*
les efflu 709. *in venis à* 520. *in venis asus* 520
Vasa lymphatica 360. *Vide lymph.* *habent valvulas* 360.
serosa 1023. *cerebri variosa* 180
Vapores an urethem pizant 1461
Vapores ab asperumtis elati soporem faciunt 124. *venena-*
tes epilepsiam facit 126. *carbonum* 1051. *quomodo nocet*
475. *à ventriculo an apoplepsiam faciunt* 13. *per autem*
suspensus tam indutu 20. *ab inferis an comi facit* 24.
45. *per arterias ad caput ferantur* 24. 45. *non omnes aquae*
cordi infusi 184
Varicorum causa 10. *arterii non accidit* 10
Valorum capiti repletu in actu & contrahit acidu 6. *super-*
remittit 3. 180. *variata in cerebro* 162. *ferentialia male*
conformata 136
Vala mammaria deferentia 826. *Becut an denu* 823. *de-*
fert à ventriculo ad lumen non contra 720. 735. *sua val-*
vula 735. *magnu* 621. *Membrum obstruio apopl. fa-*
ciunt 77
Vena arteriosa est arteria pulmonum 651. *arteria venosa est*
vena 654
Venarum dilataio sanguinis metum variat 1555. *ambulatio*
sanguinis torpida 1451. *diffusio* 1223. *irrua in calculo la-*
borantibus 1178. *duplex* 595. 1491
Venae frenu scilicet caecum causa 350. *in senibus par. naves*
316. *quibus ampla de magnu luo* 960
Venarum cerebri effluuii 10. *an sentiant* 38
Vena cara medullis materia plena 947
Vena ambulans alijssa mori non soquatur semper 1610
Venenum annu notum in corde sunt 771
Ventru suffuio 367. 2. *illudum quomodo* 1. *induci* 589. *de-*
ferentia 596. *cava tabidi* 180. *cer & pulmonis affluia*
195
Ventrum venarum cordi non est infusum 184
Ventris vulnera an debent resecti 1635
Ventris morituru causa 196. *termina in hypochondriis* 205
Ventris dolor à se eo parietalis 241. *inmensissima pss*
monem 1490
Ventriculi cerebri extremitatem receptacula 213. *an-*
gustia 254
Ventriculus cerebri nobilis 108
Ventriculus in hypochondria se sope patitur 199. *alio de-*
loru capiti causa 15. 75. *humoribus corruptu pletus* 15. 23.
non 1023. *et* 21. *infectus* 704
Ventriculi debilitas multitudine urina se prodere 1275. *doloru*
à colico distinctio 1001
Ventriculi tanna 790. 797. 767. *magni signa* 736. *crassa*
viscosa 763
Ventriculus sine rugis in venis & gulis 395. 261. *in*
sinistre latere 444. *sua morituru* 446. *magnus per me-*
duum confusio 441. *valde fermentatone presuntur* 766
Ventrulus fides febrium inolegatum 1487. *ad pubem deca-*
latus 307. *duplex* 304. *ancora delata* 797. *duplex* 304
Ventrulus depressus ad inferna 564. *ad fundum nigrescit*
795. *putredus* 484
Ventrulus cum calu sympathia 581. *in calculis amplius* 103.
calor node 763
Venus cerebro infusa 51
Vermes inter amara geniti 623
377mer

Index Rerum.

<i>Vermes in ipsis felis horii</i> 286. incipit 71. 72. 74. 163. <i>Signa</i>	
72. 73. per aurem in caput erigentes	73
<i>Vermium figura</i>	626
<i>Vermes in intestinis interhari causa</i> 143. in <i>crebro</i>	118
180. 181. capiti in peru bilariis 443. in <i>pericardio</i> 946	
in <i>sanguine</i> 1206. in <i>venibus</i> canum 1208. alibi <i>quam in</i>	
<i>intestinis</i> generantur	903
<i>Vermes in trunca parva</i>	632
<i>Ventriculi dorsi curiosa</i>	712
<i>Ventriculi dorsi infirma</i>	718
<i>Vertigo à nervis capitalibus quomodo inducitur</i> 216: ab <i>affec-</i>	
<i>tibus</i> extra <i>crebrum</i> 216. <i>obtusis</i> 217. <i>obtusis</i> & <i>para-</i>	
<i>lysis</i> quomodo succedunt 222. <i>seri</i> <i>fulcibus</i> per <i>nates</i> <i>fu-</i>	
<i>lura</i> 222. 223. à <i>vermibus</i> in <i>crebro</i> 72. à <i>causa</i> <i>externa</i>	
233	
<i>Vesica urinaria ob calculum crassa evadit</i> 286. <i>felles an</i>	
<i>tenuanda</i>	1233
<i>Vesica rugosa, contracta</i> 187. <i>parva</i>	438
<i>Vesica rotunda supra corpus callosum</i>	118
<i>Vesiculae feminales</i>	109
<i>Vesica aquosa in sinistro cerebri ventriculo</i>	219
<i>Vesica filis albuginis</i>	236
<i>Vesica filica nunquam naturaliter manet</i> 826. <i>rupta</i> 808. <i>est</i>	
<i>semper plena</i>	826
<i>Veterinaria à medicina non differit</i>	272
<i>Vix cerebri extremitas infra ducens</i>	328
<i>Vigiliatum causa, fides, &c.</i> 154. 155. non <i>natur.</i> non <i>con-</i>	
<i>stitutis</i> <i>noxia</i> 155. à <i>phantasia</i>	788
<i>Vigilia in humida cerebri</i>	27
<i>Vinum apoplexiam facit</i> 94. 117. <i>Potestatem</i> <i>Pegasi</i>	94
<i>Vinum & equinum cisternam & asinum producit</i> 990. <i>cali-</i>	
<i>ta causa</i>	930
<i>Vinum cur tremorem inducit</i> 276. <i>fulphure imbutum</i> <i>infa-</i>	
<i>lubum</i> 2592. <i>ferri causa</i>	1393
<i>Viperæ in ventre imaginaria</i>	938
<i>Vitæ bursæ in superius partibus</i>	192
<i>Vitium imbecillitas sola anxietudinem non parit</i>	278
<i>Viscerum numerus causa</i>	952
<i>Viscerum omnium cum partibus continentibus commercio</i> 412.	
<i>exalta à negare potest</i> 1479. <i>minoris</i> <i>majoribus</i> <i>laudabi-</i>	
<i>lura</i>	1050
<i>Visura an sensu prodita</i> 722. <i>omnium</i> <i>corruptio</i> 21. <i>hinc &</i>	
<i>medii</i> <i>ventris</i> <i>plumbi</i> <i>coloris</i>	191
<i>Vitæ gemma</i>	319
<i>Vitæ essentia</i>	693
<i>Vitæ humeris patredo</i> 537. <i>vermibus</i> in <i>eo</i>	ibid.
<i>Viventium generationis in homine causa</i>	495
<i>Ulcetis foetidis pulmonis signa</i> 552. <i>ulcerum non occludenda</i>	
<i>temere</i>	286
<i>Ultera tubarum non semper à tunc</i> 1634. <i>ulteri</i> <i>natura</i> 1617	
<i>Ulcus pedis sanatum orthopneux causa</i> 449. <i>generatio in</i>	

<i>pulmonibus à catarrhis</i> 319. <i>citra phlegmon</i>	319
<i>Umbilicus suppuratus terminus</i> 1415. <i>in referto hydra-</i>	
<i>pia liberari</i>	1093
<i>Umbilicali vena felis mori succedit.</i>	435-952
<i>Vomitus an in pectore affectibus</i> 435. <i>materie fusae in</i>	
<i>moribus</i> 441. <i>crebro</i> 146 1567. 1568. in <i>inflammatione</i>	
<i>pulmonum</i> 1457. <i>gravitatum</i> 1365. <i>calculosorum</i> 1377. <i>an</i>	
<i>à pulmonibus</i> 815. <i>infans</i> <i>cur</i> <i>sequitur</i>	819
<i>Vomitus à crebro excitatus</i> 818. <i>lactis in pectore lactantibus</i>	
802. <i>est</i> <i>moris</i> <i>spasmodici</i> 800. <i>quomodo</i> <i>facit</i> 790-799	
<i>à phlegmate</i> 792. 793. 794. <i>peritiam</i> <i>cur</i>	793. 794
<i>Vomitionis quomodo vertiginem facit</i>	216
<i>Vomitionis in virgine</i> 221. in <i>afflictibus</i> <i>crebri</i>	221
<i>Vomitus in cephalalgia</i> 4. 22. <i>lasi</i> <i>capite</i> 14. in <i>peripneumo-</i>	
<i>niam</i> 505. à <i>ventibus</i> in <i>ratu.</i> <i>navigantibus</i>	216
<i>Voraces qui habent grandi hepatis</i>	912
<i>Vox consideranda ad diagnosin</i> 570. <i>lasi</i> <i>differtentia</i>	369
<i>Veteries spasmus obducunt</i>	931
<i>Urina fellex in morbis capitis</i> 161. <i>analysis</i> <i>spargina</i> 211.	
<i>serbida in affluens</i> 426. <i>salutis in morbis pulmonum</i>	
1466. 1467. 1468. <i>pinguedo in bellis</i> 1403. <i>salutis</i>	
975. <i>bona</i> <i>hepatis</i> <i>lasi</i>	810
<i>Urina bona hepatis lasi</i> 810. <i>limpida</i> , <i>copiosa</i> <i>capitis</i> <i>del.</i> <i>pro-</i>	
<i>mentia</i> 15. <i>Pania</i> in <i>cap.</i> <i>dolere</i>	20
<i>Urina rubescenda ultra fideum</i> 155. <i>suppurata</i> <i>epilepsia</i> <i>causa</i>	
234	
<i>Urina diaphana</i> 1273. <i>purulenta à purulenta</i> <i>differtentia</i> 1283.	
<i>incontinentia & suppurata ab eadem causa</i> 269. <i>del.</i> <i>sup-</i>	
<i>purge.</i> <i>tandem</i> <i>exiens.</i> <i>exer.</i> <i>removetur</i> 1220. <i>pro-</i>	
<i>pota</i> <i>potus</i> 1224. 1225. <i>urales</i> 1076. <i>viscida</i> <i>dum</i> <i>exortia</i>	
<i>citra</i> <i>calculi</i> <i>presentiam</i>	1162
<i>Urinatorum restitatio</i>	457-458
<i>Vetus an epilepsia causa</i> 240. <i>cum</i> <i>pellere</i> <i>consensus</i> 22. <i>an</i>	
<i>emixis</i> <i>omnium</i> <i>materialium</i> <i>anibus</i> 22. <i>an</i> <i>milian</i> <i>bulæ</i> <i>fomes</i>	
194. <i>magnitudo</i> <i>insolita</i> 105. <i>consistens in</i> <i>gravidis</i> 204	
<i>Vitæ gemma</i>	1367
<i>Vitæ ad dextram conuersus</i>	2421
<i>Vitæ parvus dissonans.</i> <i>mensura</i> <i>fluxu</i> 681. <i>consistens in</i>	
<i>puerpera</i>	105
<i>Vitæ deficiens</i> 1343. <i>non</i> <i>est</i> <i>sentina</i> <i>sanguinis</i> <i>excrementum</i>	
1344. <i>legamenta</i> <i>verruformia</i> <i>vafa</i> <i>sunt</i> <i>deferentia</i>	
1346. <i>ueteri</i> <i>sermentum</i>	1348. 1349
<i>Vitæ passiones dila non semper ab uteri vitio</i>	260
<i>Vulnera non ita balia mori signata</i> 1598. <i>crebri</i> <i>gravia</i> <i>inter</i>	
<i>aliquando non ita balia</i> 1567. <i>capiti</i> <i>Chironi</i> <i>sape</i> <i>com-</i>	
<i>penant</i>	1598
<i>Vulnera capitis suis calidioribus cur periculosa</i> 142. <i>arier.</i>	
<i>&</i> <i>venarum</i> <i>an</i> <i>per</i> <i>se</i> <i>balia</i> 1622. <i>salutarium</i> <i>labia</i> <i>qua-</i>	
<i>lia</i>	1582
<i>Uvulae nifi</i>	748

FINIS.



ANATOMIÆ PRACTICÆ SIVE

DE ABDITIS MORBORVM CAUSIS

Per Cadaverum Dissectionem revelatis

LIBER PRIMVS.

DE AFFECTIBVS CAPITIS

SECTIO I.

DE DOLORE CAPITIS

OBSERVATIO I.

Capitis dolor diuturnus, in apoplexiam desinens, à sanguine vasa dura meningis, parti præsertim sinistra, distendente, Ejusdem meningis crassitie, & duritie insigni genitus.



MORBORVM successiones per quas, infausto sæpe transitu, invicem sese excipiunt, notæ sunt Practicis: Cerebro præsertim ex familiares sunt, cum ab ejus substantia in ventriculos humores commigrant, aut in cerebellum ac nervos vel basin decumbunt: Ejusmodi *perniciosis*, ob *spasmodicis* *spasmodicis*, cephalalgicis accidunt, qui doloris molestiam, quia inducias concedit, vel acrius non vrget, sed surdo urbere exdit, diutius circumferunt, ac tandem vel ob dictam *perniciem*, vel ob *spasmodicam* patientiæ inextitæ pœnas luunt: Exemplum insigne dedit exiens October anni 1675. Nobilis & Lectissima N. vxor Viri Clarissimi & Celeberrimi Dom. N. annos circiter xx. nata, temperamenti laudabilis, coloris subfusi, aliquot ante matrimonium annis, sexto per mortem dissolutum mense, capitis dolori obnoxia vixit, sinistra præsertim parti infesto, & ubi fluere mensis, graviori, quo vigente cervix in id latus invitè distortaebatur: Quindecim ante obitum diebus de ingravescente conquegitur, absque dilucidis intervallis, nec tamen à domesticis officiis distrahente, ac si gravior fieret, oculus sinister introrsum corripidebatur: Consultus Medicus lienem malefici accusat, quia conjugium viscerum obstructions præcesserant: Eo collineat, syropos & apozemata ex succis herbarum composita præscribit, nec non venæ sectionem, à quibus præsidii nonnihil solati percepit, generosioribus, in graviditatis suspitione, prætermisit. Pridie ante fatalem diem aliquid in cerebro crepitasse exclamat, mox tamen inficiatur, metum incutere satagenti & sollicito de salute marito verita: Nox eam diem excipiens uterunque tranquilla, mane vultum insolitus pallor obsider: accedit in prandio præter morem apositia, unde graviditatis opinio certior Medico. Circa meridiem visitantes coartatas hilari excipit vultu, sed paulo post dimittit invaletudinis prætextu, earum ad cubiculi usque limen comes, quod dum repetere intendit, suborta vel vertigine, quod verisimilius, vel leipothymia, humili sedili obvio insidere volens, concidit: Iacens deprehensa in cubiculum deferretur, cui imposita vires brevi reparatas iri ait, ac quietem sibi petiti postulat: Interim absente Medico de confessione hyacinthorum aliquid præbetur, à qua vomitus excitatur: Superveniens ille hystericum *morbum* suspicatur, alvum enemate prolui jubet, & cucurbitulas internis femoribus affigi: dehinc somnus conceditur, qui diutius protrahus assidentibus suspectus fieri incipit, quod vix verbum extorquerent: erectæ caput nutabat; cum insigni & plumbea cor-

A poris

gravitate, unde serius animadversum *Apoplecticam passionem* Ægram invasisse: Exinde ad extrema concurrunt præsidia: Sympus emeticus Salæ exhibetur, à quo *ipsæ* & irriti ad vomendum conatus, sed nulla exclusio, mors quarta à decubiti hora subsequitur. Præceps ille & lugubris obitus mestissimos maritum & confanguineos ad causæ cognitionem per cadaveris resectionem impulit, quæ eodem die instituta est, Hæc est Prosectorum, Medico adflicte exarante, relatio.

Nos subfignati D. Medici & M. Chirurgi, rogante Clarif. D. N. institimus dissectionem cadaveris Conjugis suæ, initio ducto ab apertione capitis: Remoto cranio, statim se obtulerunt venæ duræ matrem perrepantes ultra modum & morem dilatatae ac expansæ, nigrae & varicosæ, minimi digiti crassitiem pene æquantes, parte præsertim sinistra: inde cerebri superficies livida admodum apparebat: Hinc ad duræ meningis separationem progressu facto, ea deprehensa est insignis & insolite tum crassitie tum duritieiæ circa præsertim basin cerebri, in qua venæ distentæ etiamnum & admodum lividae apparebant. Dein ad Thoracem devenientes, omnia in eo integra visa sunt, pulmones à connexionem cum costis liberi, ad livorem tamen utcumque vergentes: Quoad innum ventrem, nulla in eo labe adfuit: examini enim subiecti Renes & Lien, integritate donati reperti sunt: Vterus insigniter parvus, citra ulla conceptionis rudimenta: Quibus perpenfis, Censuimus insignem dolorem capitis, Ægræ olim molestum, ortum duxisse à crassitie & duritie extraordinaria cerebri meningum, liberam vaporem & fuliginem, à cerebro manantium, distillationem impediende, à quibus diuturnus ille capitis dolor excitabatur, quæ de causa sanguis ad hoc allaciebatur, qui ideo illuc uberiori copia confluent, vasa præter modum replebat & distendebat; cuius etiamnum portio in cerebri substantiam basinque decubuit: Cum autem sanguis nimiam venarum distensionem pareret, ejus circuitus & reductus ad cor ideo prohibitus fuit, ac postmodum concrevisse quasi & immobilis redditus, basis cerebri ab eo compressione facta, syncopen apoplecticam, ac tandem mortem intulit.

S C H O L I A.

EX hac historia elucescit quantum ad felicem *diagnosin* diagnosi rite instituta valeat: atque verissimum esse titulum illud *Ō δεινὸν αἴτιον ἀπὸ τοῦ διαιτοῦ*: Eo quippe quis in medendo felicitior est, quo in causarum dilcutione callidior & mentis sagacioris: Singularem vero solentiam & *παράδοξον* requirit affectus idiopathici, ab eo qui per consensum est digno, ne pars innocens plectatur, rea vero absolvatur: Id præsertim in casu contigit, ubi caput infans pronuntiarum, culpa infestioribus adscripta. Revera sympathie aliqua erant argumenta, obstructiones scilicet viscerum conjugum antecedentes, & levamen *διὰ διασπαστικὴν* viam consequentum: Sed postiora & dilucidiora doloris qui per essentiam affligit, & causam insignem agnoscit, iudicia se probabant. Illius nempe assiduas fere citra inducias, ac plurium annorum series: Eri vero primordiis inferioribus duxisse suspicari liceat, id tamen perpendendū fuerat quod monet *Rondeletius*, Galenam sequutus. Non raro scilicet accidere ut dolor qui à consensu partium initium accepit, in affectum proprium desinat, adeo ut partis primario laborantis affectu sublatro, postior per se subsistat, quod in cephalalgicis frequentissimum esse ait: Imbecilli as enim tandem & non delebilis *ὑπόνοια* parti inducitur, à qua congestiōnis supervacaneorum oculo: Retractio præterea oculi sinistæ, & in orbem, exacerbationis tempore intruso, ac cervicis levis in id latus inclinatio, sympathice afflictionis opinionem excludebant: Prius enim symptoma cerebri reboantes contrahi, convelli, distendi, aut quemodocunque p. n. affici à causa non advena indicabat, ad quatum consensum oculis intro rapiebatur. Posterior, vasa cervicem perrepantia plenitudine insolita distendi, (sic nervorum distentiones circa lumbos ex astraliariis hu-

moribus in venis oriri ait Hippocr. lib. de rat. victus in acuta) Aut nervosas partes membranis cerebri consensite: Plerhoræ certe signa desiderabatur, neque enim insigni pulsu micabant arteriæ; nec venæ habituro corporis perrepantes extraordinarie eminebant, quin & vultus decolor erat & concidens, nedum floridus & plenus: nullæ etiam adetæ de æstu capitis querelæ: Sed quod ad colorem attinet, nec semper *ὑπερμα* plethoræ index est, cum ex Hippocr. decreto in Coacis Prænotionibus, 214. Bene colorata facies vetulita sit cora subelle aliquando indicet, Nec vicissim sanguinis ubertas per colorem suavitatem semper se prodit: meminisse enim oportuit effecti Divini Senis, insitio libri de Humoribus, *Humorum calor, nisi ad profundam corporis se receperint, veluti in cute efflorescenti conspiciunt*. Porro, nec semper plethoræ æquabiliter diffusa est, de utque muscularis, quæ hoc in casu adfluxu sanguinis enim ambirantem potius deterat, cerebri valæ & intimos recessus occupavit. Cur vero flammæ adurentis calor in capite ideo non perciperetur, causa fuit interceptio sanguinis in vasis, (*αἵματις ἀδύναμι* elegantiori voce appellat Hippocr.) ob quam pene concrevisse calorem eamit *σπαστικὴν* enim, ait Idem 3^o. lib. citati, non potestibus naturalis in ipso viam permeare, *perfrigerationes sunt ex frigore, & virgines, & tunc intercipio & capiti gravitas*: at vero observatum in apoplecticis sanguinem etiamnum concretere, nedum refrigerari: æqui apoplexia, eaque brevi funesta, cephalalgiam hanc exceptis Pulsu vero arteriarum solito non vehemensioris, præsentis sanguinis exuberantia, causa repetenda est à nimia vasorum plenitudine, ob quam sufficiens explicari nequeunt, id quod in plethoricis corporibus sæpe contingit, quibus dempto superfluo, commotique libertate restituta, arteriæ systoles & diastoles monia

monia felicitas expleat, unde facilius & libentius miscant. Id potro sympathici doloris fidem facere videbatur, quod de vehementia & acurie ex intervallis aliquid illi decederet, at id contingebat quia causa vasu conclusa, pro vario exitu de urgimo, à causis interiectis, vel extrinsecus adveniensibus indolito, sive ab uberiori succi nutritii afflusu, minus vel gravior membrana afflicta. Solacium quod spectat ab usu obstructions referentium emergens, causam non magis imo ventrem quam lunum conceptam fuisse indicat, cum eorum vis oon minus ad caput, mediante sanguinis circulatione tendat, quam ad abdomen & pectoris loca: nam adhuc an debeat quæ ex destinato in hac vel illa parte obstructions referent, sub iudice lis est. Sicut ismodi medicaminum ope, sanguis in Angli vasis capitis crispitans ad motus redintegrationem impulsus fuerit.

Quæstionem vero quibus prædictis, nisi medemini exasperat elulit fallax mo. bilides, expugnari vel præcavei potuisset lethalis affectus? Censurissimum sane auxilium in liberali & repetita sanguinis missione querendum fuit, quæ eo in casu *hætu* est, quandoquidem ejus *hætu* est, & cohibito in vasis, aperta fuit affectus & lethi causa. Eaque juxta præceptoris libro de *leu* in bon. præceptum instituta, in *dolentibus aut prætorum ventrem ficit*: Tundendo scilicet vel jugulares venas, vel ad arteriotomiam recurrendo, Eadem quidem apertio ci illius levaminis si flet, atque, experientia teste, tutissimè: reducem nempe de cerebro sanguinem signifiq. procedentem elicit, eoque pacto sinus cerebri & torcular, ejus occlusio præcipua, imo unica apoplexiæ causa est *hætu*, promptè expedit, cruentemque recta & huc ambagibus educit: Arterie autem cujuspiam apertio sanguinem in cerebrum intrumentem, atque ampullas vasa repleturum evocat. Sicut enim arterie cujuspiam obstructione, aut consuetudine quævis, si sanguinis motum in partibus vicinis concitarem reddidit, ita ubi canalus ejus aliquis apertus, aut protius dilucidatur, adeo ut sanguinis torrenti exitus pateat, quoniam per apertum quasi ostium magis libere & expedite effluit, quam per poros corpori urgei poterat, adeo ubi facilius potest, copiosior affluit, & via qua datur liberior ejuspiam, adeo ut pulvis simul cum influxu ejus in vicinis partibus multum diminuat. Atque hinc optima recedi potest ratio, (inquit Clar. Læver. Tract. de corde cap. 2.) quare Arteriotomia ad dolores, inflammationes, & plura hujusmodi symptomata mitiganda in tantum conferat, ut præter juvenem asserit semper videatur: hoc autem ideo accidit, quod cum sanguis per arterias de corde impulsus ægre magis & difficulter per poros & habitum corporis circuletur, idcirco ubi liberam & apertam viam tactus fuerit, totus torrentis ejus simul ejuspiam & exundat, unde proximas vasis solito suo liquore depletis & destituti impetus & impulsus illi multum diminuit. Sic experientiam (addit) si arteria cervicalis ex hoc læte apertur, statim pullum alterius cervicalis multum satisfecit: patet etiam si arteria cranialis altera petundatur, pullum illico arterie oppositi cruris plurimum deficere.

Quæ de jugularium venarum apertione supra dicta firmam nupero experimeto simili in casu, 16. Icil. Decembris anni 1676. D. Martinus Genevensis, vit obatus & brevis cervicis, leægenarius, genio indolens, dum coram Schnau itat, lingua simul & pedibus riuabat: domum reducus lectoq. impulsus, destitit le crucibus atq., alterius esse quæ illi accubabant: Accedunt vertigo & cephalalgia, quam mulceti

appositis & appetitis sincipiti manibus jubet, excutiens pileum ejus erat impatiens: Secta fuit è brachio vena, & postmodò è malleolo, quia deficiente stupor pedum, sed præsentissimum levamen attulit jugularis dextere sectio, amplexo foramine, è qua prodit sanguis crassus & putridus: hinc apoplexiæ, quæ præ foribus erat, metus dilatus, remissus capitis dolor, paucisque post diebus redus fuit sanatus, non obstant hyemis rigiditate: Illud vero notandum, nullo periculo secari eas venas, nec alium apparatus quam in apertendis brachiorum venis requirit hoc uno discrimine, quod hic infra ligaturam, illic supra scapellus admoveendus sit; sanguine ab adnotis spleo & ligatura, citra glucem, quantumvis amplum sit foramen, & affluat effluat, illico coarctato: Unde vero patiens in affectibus cerebri illius phlebotomie levamen pendere ostendit idem Clar. Læver. Tract. de corde cap. 2. p. 179. Experimeto probans nihil carathi, à cerebro in partes subditas ullas descendere, sed quicquid fert ibi redundat in sanguinem denso refundi, eique commisceri, per jugulares venas excludendum.

Crassus & durus infusus) Imo diurnis doloribus capitis meningum siderationem succedere aliquando inferius videbitur. Crassitatem autem illam contrahunt ab uberiori, sed leno sanguinis affluxu, qui in nutricium abi.

Tene duram matrem irrigantes) Rilem vasa dura meningis arteriosa potius quam veno a esse censet: *Phle*, ejus vasa aut arterias esse ait, & sanguinem adducere; aut Ductus venosus, qui sanguinem illic, ac à toto capite velut cor reducat: utraque sanguine præter modum ditrema fuisse verisimile est.

Lien integritate durus, &c.) Qui in affectibus plurimis, præter melancholicis, immerito læpe male audit, quamquam, experientia teste, nullum viciu, excepto corde, in causaveribus plurimis minus labefactum reperitur, sic idem laudat ab his culpatur ab illis.

Hysterium vnde suspicatur, &c. Lien insalvus) Sympathica Cephalalgia, suspicio nata est. Cuius hæc vero notanda quæ tradidit *hætu*. Propriè s. s. mos ait in partibus aliis incipit, ab illisq. ad *hætu* contrinuos cephalalgia non raro atrocis succedunt: usitatum est ab hypochondriis, necnon è regione stomachi, menterii, utri, imo interdum à membris aut partibus externis, quendam quasi formationis sensum in caput protepic, idemque mox dolorem aliquandiu postea diuturnum excitare. Hujusmodi affectio, quæ non raro virginis, etiam Epilepsia aut Apoplexiæ proemium esse solet, Vaporum ascensus vulgo creditur, cum revera sit tantum spasmus in nervi cujusdam extrinsecus incipiens, qui verius originem ejus sursum protepic, & dein cranio superato, quatenus aut ipsi *hætu*, aut etiam meningibus, scilicet aut alteri aut utrique communicatur, convulsiones aut dolores ciet. Quæ tamen pathemata formationem istam aliunde traditam, modo velut sigoem, & quandoque velut causam sequuntur: Præter rationem alibi explicuimus, ostendit nimirum quod cum materies morbifica nervorum origines, aut partes lis proximis in capite occupans spasmus sæpenuero ab eorundem nervorum extrinsecibus incipiens, illinc sanam traditus, verius loca primario affecta quasi petreptando ascendit: quare non tantum vertiginis, sed & cephalalgia vomitio cerebro supervenit. Anamen præterea irritatio in vicinis quodam aut membro distico Cephalalgia interdum occasio & quadamtenus causa est: nempe cum ma-

teries morbilica usque ad turgescientiam plenitudinem jamjam in capitis parte affecta aggetitur, fibrarum contentum vellicatione levi tantum opus est, ut materies illa concisa morbi paroxysmum inferat: ad quam acciendam non raro sufficit quod viscera quidam distendi, puta ventriculi, lienis aut uteri, cui scilicet cum capite intus intercedit consensus, fibræ nervæ vellicentur, nam proinde itatim molestia per nervos communicata, fibræ quædam capitis membranae male dispositæ, & materia morbilica onustæ, stringi & corrugari incipiunt, cumque adeo morbi minera commovetur, à particulis ejus commotis, fibræ in corrugationes graves ac duras argentur, cephalalgia ad hunc modum à visceribus exterioribus & vulgo *Symplicia* dicitur, vaporibus adscribi solent, videlicet supponendo humoris noxi minera infusere quodam delitescere, è qua commota, dum effluvia in caput accendunt, ibidemque fibras nervas actius percellunt vellicantque, dolores excitantur: Doctrinam hanc olim ita plane redarguimus, ut non opus fuerit rationes hic alias apponere; Interim verò diquiramus annon aliis etiam modis præter communicationem per nervos spasmodicam, capitis dolores propter eam morbilicam in stomacho, liene aliisque locis hospitantem, orantur? Super his optari eas sit materiem sepe degenerent in partibus remotis congeri, quæ sanguinis commotus, sive tractata, capiti noxam inferat: Ulicatam est humores corruptos, scilicet modo acres, modo acidos aut austeros in ventriculo, bilem in Epate, feculentias atrabilarias circa Lienem, quin & alijsmodi degenerem materiam circa mæstenterium, uterum aut alias partes congeri, à quibus deum ad turgescientiam plenitudinem aggetis, mixta fermentativum sanguini infusius, à quo sit velut ostro imbutus, impetuose effervesce, & partim turgescencia sua, partimque in membranas capitis quod incongruum est transferenda, dolorum paroxysmos atroxes ciet &c. Quoad *Femoralium*, rem nunquam ita habere, quidam morbo isti obnoxii plane expellunt: quippe horum nonnulli post bilem in stomacho fluxuantem, alique post insignem illam acorem & famem caninam, cephalalgia paroxysmum certissime expectant. Cujus ratio ex parte videtur esse, quod ista ventriculi contenta, à sanguine absorpta, ipsam effervescentiam & turgescentiam cephalalgicam in eodem concitant: Insuper ab

ejusmodi materia acris, vitriolica aut alias infecta, intra stomachum aggetita & commota, spasmus, sive corrugatio molesta fibris, nervorumque extremis illis infertur impetibus, qui mox eorundem nervorum partis cævi & intercostalis ductu in caput continuatur, membranis fibrisque nerveis in corrugationes dolorificas prædispositis communicatur. Propter eandem inter *Humorum* & caput communicationem reciprocam, Nausea & vomitus cephalalgia non raro superveniunt, scilicet membranis à materia morbilica, (non secus ac à plaga aut vulnere illato affolet) in corrugationes dolorificas incitatis, namque nervorum ductu ad ventriculum ex se infertur transferentibus, vomendi nixus interdum transit oritur, nihil quod rejiciatur intra ventriculum superfili, quandoque tamen ab insanabili viscera inter vomendum succussiones, humor felles aut pancreatici, nempe aliter tam ut uno utriusque simul, in duode-num explori & vomitu rejecci, pro materia cephalalgica perperam sumuntur. Dolores capitis lieni haud minus quam ventriculo imputari solent, & quidem passim observare est in hypochondriacis, isti etiam morbo obnoxii, dum in sinistro larete dolor, inflatus, borborismi, aut alia quævis, velut lienis affectus periturbatio, contingit, cephalalgiam quasi exinde suscitatur mox crebro succedere: hinc ita vox populi est vapores à Liene petuibus emisso capitis dolorem elere: Verò neminiveto ut concedamus cephalalgiam lienis culpa interdum oriri, rejecta tamen ista per vapores *similia*, hujus causæ imputari debet, aut malo sermone à liene in sanguinem transmissio, aut spasma illius capiti per nervos communicata: quippe in liene male effusio, humor atrabiliaris, inque naturam modo vitriolicam, modo acrem aut acidam vel alias infectam degenerum numero aggetitur, qui sponte ob plenitudinem, aut occasionaliter ob perturbationem quandam excussus & sanguini confusus, ei fermentatorem impiebat, quæ liquor ejus capitis membranis irruens per se, aut cum liquore nervoso effervescens vellicationes dolorificas ciet: Porro, haud minus probabile est, quod interdum spasmus in fibris nerveis, quæ circa Lienem quam plurimè disponuntur, excitatus, illi in per nervorum partis vagi ac inter eos talis ductus, ad *spasmus* continetur, præter membranas ad prædispositis affectionem imprimat. *Th. W. Tracl. de Anima Brut. parte 1. c. 2. p. 257. 258. 259.*

OBSERVATIO II.

Cephalalgia à vasis meningum & cerebri sanguine turgidis & distentis, Abscessu parvo seroso in parte cerebri anteriore.

Mercator Occitanus, nomine Montolius, quadragenarius, melancholicæ ad atrabiliarium vergentis constitutionis, gravibus curis implicatus, dum Helvetiæ nundinis celebra peragrat loca, ardente syrio, cephalalgia prehenditur, qua diutius circumlata, tandem Morati, Ditionis Bernensium oppido, præ doloris vehementia decumbere cogitur. Illuc Neocomo evocatus, anno 1662. pedis venas rundi jubeo, brachiorum, narium vasa, ad motus hirudinibus, referati; temporum, quæ pone aures decurrunt, ac frontis, cucurbitulas dorso cum scarificatione apponi; Quarta nihilominus die nullo alio succedente affectu, occubuit: Si secandarum articularum peritus adfuisset artifex nec illis pepercissem.

Cranio ablato vasa meningum & cerebri sanguine ad summum turgida deprehenduntur: Cranium vix cerebri videbatur capax, præ summa illa plenitudine & distensione vasorum membranarum, quodammodo liventium: Repertus & exiguus abscessus, avellanæ magnitudine, sero plenus, ad levem contactum dissiliens, parte cerebri anteriore circa frontem.

SCHOLIO

De Doloꝛe Capitis.

SCHOLIA.

Generibus curis implicem. *Ardenſe Syria &c.*) Expla-
nans hiftoriam Sileni Galeus, quem in *ſympto-*
matibus, & *ſymptomatum* dignis febrem validam contra-
xiſſe dixit Hippocrat. morbum ſuccediſſe ait ad ejus-
modi cauſas extrinſas, ob prævias viſcerum diſpoſi-
tiones: Idem 1. ad Glauco. c. 2. dicit quodaſdam ab an-
tecedente cauſa, ut *ἀνέμοις*, aduſione ſolis, ita &
ſimilibus, in graves morbos incidere: Eos autem ab-
errare cenſet qui totum morbum cauſe antecedenti
adſcribunt, neque aliam ſubelle præparationem arbi-
trantur: At certum eſt & procatarticanâ claſſe alias aliis
gravioreſ affectus inducere, maxime ſi pluriam ſit con-
cuſus, aut unius diu protrahatur actio, etiam citra
præviu morbidu apparatus, morbum erumpere.
Inter eas curæ, & vehementeſ mentis ſollicitudineſ,
præ cæteris morbus paſſione, adeo ut etiam aſſiduam
cogitationem occurrere aſſerat Celſus: ob eas enim
plurimorum & vaporum facilis eſt ad caput *ῥιπίς*, hinc
pluriſimos rei cuiuſiam nimis intentos cephalalgia pre-
hendi notum eſt: *ἡσυχία* vero, ardente præteritum
Syrio, quæ viſ it ad doloꝛem capitiſ elidendum oſten-
dit experientia: ſidem facit Sunamitidis filii hiftoria,
7. Regum, qui graviter à ſolis radiis percuſſus, induc-
ta *ἡσυχία*, non diu poſt inierit: Geminæ hæ cauſe
metacæſi dicto ſaneſcit facere: Curæ quidem & ſoli-
citadineſ, (ub quibus attentiora ſtudia & meditationeſ
comprehendere eſt) quomodo cephalalgiam pa-
tere valeant, elegantiffime & doctiffime proponit.
Exc. *genius Theſauri* conf. medic. 10. lib. 2. Doloꝛeſ
capitiſ, *αἵματι* plenitudine fieri ordinariu eſt, in oſto-
ſis præcipue & crapulæ deditis, niſi forſan caput ha-
beant robuſtius, quandoquidem diverſos homineſ
novi, diu noctaque poculis egregie certanteſ, capite
tamen ſemper ſimiliſimo: Vidi præterea multoſ ju-
venes, etiam Religioſoſ, qui, licet boni habitus, æque

urerentur, more religioniſ, cibo potuque admodu
moderate, vexabantur tamen doloꝛibus capiti� & itica-
leſcentiſ, ſeu, ut ipſi loquebantur, inflammatoriſ; maxi-
me ſi ſtudioſi & meditationiſ majori cum animi
contentione, vacarent: Hujus doloꝛiſ cauſam dupli-
cem eſſe cognovi, 1. Spirituum inſulſum, quorum
beneficio ſtudia perficiuntur, 2. Cereviziſ potum,
ſtudioſiſ, eo in loco ordinariu: Spirituum quidem
inſulſum quod attinet, dubium non eſt quin illi, in
corporiſ ſanorum juvenum abundanteſ, facile per
mentis laborem, ad animatiſticam facultateſ ſedem co-
pioſius irrahantur feranturque, & ſi meditationeſ, ac ſtu-
dia ingenduntur, rapiant præterea una ſecum ſangu-
niſ calidioriſ quantitateſ, unde neceſſario veniſ me-
ningem repletis ac diſtenteſ, caput frequentius inci-
teſcit ac doloꝛ: In iſtiſ proinde lei doloꝛentibſ, ſtudia, &
meditationeſ moderandeſ ſuaſi, crebrioreſ purgatio-
neſ cephalicæ, maxime vulgateſ & actioreſ piluleſ,
diagrydio ſtimulateſ inhiſub, ut pote quæ caliditate ſu-
ſpectæ humoreſ pluſ juſto accendunt, fundunt & li-
quant: horum loco lenitateſ ſuaſi, lotioneſ pedum
cum decocto roſar, flor, nymphaeæ &c. Opiateſ con-
temperanteſ, ſanguiniſ millionem &c. Alteram cau-
ſam, ſeu *Cereviziſ nigra potum* quod attinet, obſervavi
ſæpiuſ omneſ fere illoſ qui ex regionibſ viniſerſiſ huc
ad ſtudia pervenire, magiſ à continuato potu cerevizi-
ſ nigra accendi & ledi, quem moderate vini uſu ſibi
conſueto: Credo id eſſe, quod cereviziſ copio-
ſior lapulſuſ incoquantur, vel potuſ quod plurimuſ
fermentum in Cereviziſ nigra craſſiori, & potuſ nun-
quam ſatis defæcato laetret: In corporiſ denique
juvenilibſ hæſitanteſ, facillime fermentanteſ & inca-
leſcenteſ, vino interim in aſſaerſ longe prom-
prieſ per corporum meatuſ
dilabenteſ,

OBSERVATIO III.

Capitiſ doloꝛ à vaſorum meningum repletionē; Seri copia in ventriculū.

Sartor annorum 35. temperamento caliduſ & bilioſuſ, *faciliſ ad iram*, urcunque tempé-
ranteſ viventeſ, anno 1670. Incidit in oſſiſ frontiſ doloꝛem gravativuſ, compreſſivuſ
& lacerativuſ, ita ut ſinciput vix aut parum doloꝛet, erātque doloꝛ ſine omni febrē,
pulſum habebat tarduſ ſimileſ melancholicis, cætera ſanuiſ roto corpore: *Exinde Vigiliaſ,*
deliria per intervalla, ſubinde etiam *ſomni* ad horaſ 3. vel 4. extenſuſ, adeo profunduſ, ut
qui ipſi totuſ corpꝛ dilataſſet, vix excitatſet; tandem ſponte evigilanteſ nullam doloꝛiſ
remiſſionem ſentiebat, dieꝛum 14. ſpatio elapſo ſine convulſione fatiſ ceſſit: Prædixi ad-
ſtanteſbuſ apoſtema frigiduſ aſeſſe, urenſ vocabulo ad captuſ vulgē.

Mortuo aperio caput, Ecce vaſa turgent in meningibſ, cranium nimiam cerebri mo-
lem non poterat capere: Interiora timando, occurrunt in ventriculiſ anterioribſ uncie
viii. ſeri flavi, & plexuſ choroideuſ ſubalbicanſ, præterea nihil: *Ex Frid. Ferd. Illmeri Me-*
dicin in Wartenberg Obſervation. in Miſcellaneis curioſiſ anni 1670.

SCHOLIA.

Iudico hinc vel vaſa lymphaticam, vel vaſa capillaria
ſanguifera aliquatrupta haſſe ob exceſſumque, in qua
ebullienteſ humoreſ nimia quantitateſ propulſi vaſa
minima diſtendunt, & minoreſ locuſ affectando,
eadem diſrumpunt, unde paulatim tranſudationeſ
ſeri, cerebri vaſa particularia & cavitateſ replendo, diſ-
ſtendendo & comprimeſdo hæc ſymptomata cauſa-

verunt: Curationiſ gratia extrahi ſanguinem ex pedo,
brachio, manu; applicui ſeſicacioria, hirudineſ, cu-
curbitulaſ ad lateralia capitiſ, dediſ purgantia &c. De-
diſ ſoporifera, veruſ omnia inſcalum: Curioſiſ ali-
quiſ ſi legat lib. *Hippocrat. de morbiſ*, vaſia ſibi de do-
loꝛe capiti� deprebendēt, ſed textuſ qui hæc ex inre-
gro accommodati poſſet nulluſ inveniet; vel enim

iuxta 4. aut 1. dies mortui sunt, vel accessit febris quæ in nostris casibus nro observabatur : Quod si tamen quis vellet analogia quadam uti, cum ipso non punabo. *Idem ibidem.*

Facili ad iram] Capite sequenti generaliter dicit

Clar. Illencus se serpsin in convulsis & iratis vasa meningum sanguine turgida reperisse, quod speciatim de hoc fastore annotat.

Pulsus similes melancholicis] De pulsu melancholicorum vide *Hieronymum Saxanum* l. 3. de Pulsib. c. 38 & 100.

OBSERVATIO IV.

Capitis dolor ob vasa pie doræque meningis sanguine turgida ; Vlcus oblongum sub medio ossis sincipitis dextri, ad os Temporis extensum, Copiam feri in ventriculis anterioribus etc.

VIr Nobil. 46. annorum, temperamento supra temperatum calidior nonnihil & gracilis aliquomodo, ultimo complexionis melancholicæ: multis annis antehac phthicus & asthmaticus, 4. diebus ante æstivum solstitium anno 1670. incidit in dolorem gravativum, tensivum & lacerativum *sincipitis* totius & frontis, quem insequimur continuæ vigilæ: elapso octiduo delitit interpolata, post continua, non irata aut furiosa; tandem uno ante mortem die, motus totius corporis convulsivi leviores. Toto tempore nec vel exiguum signum alicujus febris aut caloris, sive vehementis sive lentis, sive essentialis sive symptomatici, præter ultimam diem, ubi ad præscientiam convulsivorum motuum exigua aliqua & lenta caloris exuperantia apparebat in pulsu, qui per 12. dierum cutsum erat tardissimus, instar pulsuum melancholicorum: Urina primo die usque ad XI. prodibat tincta instar Ictericorum: Concluseram dolorem hunc *ariri* ab evaporatione bilis per arteriosum genus, lege circulationis, in caput, unde adhibitis chologogis lenioribus, & emulsione laxativa Mynsichti per epicitasin, urina tandem reddebatur coloris & consistentiæ naturalis, ne illum quidem remittente dolore & dictis symptomatibus: revulsionis, derivationis, ventilationis, evacuationis causa, quantum in corpore phthico vites vitales permittebant, *extraxi sanguinem ex pede*, manu, hæmorrhoidibus, applicari curabam cucurbitulas ad homoplasas, hirudines post auriculas, vesicatoria ad vcnarum jugularium latera: gallinæ disruptæ capiti applicatæ &c. sed frustra omnia.

Ut igitur cognosceteretur causa tam pertinacis doloris, mortuo aperio caput, & ecce reperio, 1. venas arteriasque duræ & piæ meningis turgentibus plenæque nigro sanguine, ac ita particulatim vasorum capitis repletionem, uti sæpius in convulsis & iratis observavi. 2. Sub medio ossis sincipitis dextri, à processu falcato usque ad os temporis, extensum video ulcus oblongum cum sanie crassa & multum flava, quod ego habui pro maligno, quia ante aliquot annos à Pharmacopæo sciolo, in curatione gonorrhæe exhibita fuerant mercurialia, forte non bene præparata: 3. Interiora cerebri rimando, in ventriculis anterioribus uncias XII. feri limpidissimi occurrabant; 4. Plexus choroideus nonnihil erat atrosus & putrefactus; Inquisivi quoque in vasa lymphatica cerebri, sed ut ea viderem tam lynceus non fui: 5. In pectore aperto, Pulmones dextri lateris duplo erant majores solito, unde forsan causa quod æger semper in dextrum latus, etiam invictus decubuerit; Sinistri verò, à sterno usque ad spinam dorsæ, ita pleuræ & costis accreverunt, ut judicarem eos mille clavis affixos, quotum interiora plena erant sanie, pure & scirrhis; cor autem optime constitutum. *Ex observat. D. Friderici Ferdinandi Illmeri Medici in Wirtemberg. in Miscell. curiosis anni 1670.*

S C H O L I A.

Salvo aliorum iudicio, dici hunc ægro ob ferinam causam, qua ultimæ annæ vexabatur, in cerebro ruptam fuisse aliquam arteriolam vel venulam, vel vas lymphaticum, præcipue in plexu choroideo, unde exsudavit serum, quod paulatim augmentum lumen, massam cerebralem distendit, in majorem manlem elevavit, ipsas meninges earumque vasa compressit & capacciam cranii ita occupavit, ut non fuerit sufficiens ad continendum capessendumque cerebrum, quemadmodum in ipsa apertura apparuit: exinde & forissecus & intussecus meningum compressio, ac petiectan

per sympathiam tensio, sensum illum malestem seu dolorem, ad tactum etiam externum inducens, simulq; ostendens in cerebro & meningibus diminutam sanguinis circulationem. Mirabar non fuisse phrenitidem excitatam, verum dubium phrenitibus solvi. Phrenitidem fieri à sanguine in cerebro vel meningibus extravasato, stagnante, & cum sit extra locum suum naturalem, p. n. effervescente & putrescente: hic vern sanguinem nihil ejusmodi fuisse passum, & de ita usque ad XI. diem, ac ulterius, absque inflammatione cerebri potuisse persistere, donec tandem ultimo lon-

De Dolorē Capitis.

Et mora ipsa in vasis in putredinem precipitaretur, sic vitium capiunt ni moveantur aquae. *Idem ibidem.*

Extraxit sanguinem ex pede, &c.] Opem fortasse tulisset arteriotomia in temporibus celebrata, quae ex pectis petiuli & certissimi solarii, cum causa arterialis laet: cujus efficaciam (mense Aprilis anni 1671.) experitus est Genevæ Vic Consularis, qui lumen capitis dolore, laetere sinistro vexatus, irritis omnibus vacuationibus, tandem aperta temporis ejusdem lateris arteria, eductoque ad unciam sex sanguine, illico levamen sensit, brevique sequuta sanitas, sola superstitio debilitate, à crebris venae sectionibus indulta.

Orni ab evaporatione bilis, &c.] Capitis dolor est vel *lumen*, qui fieri potest modo duplici, aut per *membranas*, in ipso capite, materia secundum congestione, generationem & pravam dispositionem producta: aut per *arterias* & *venas*, materia in idem aliunde translata & conservata, nec per circulationem cum sanguine alimentali superfluo revecta: Vel est *supra*, qui certas habet differentias, Soda facta per communem, inquit *Artemia*, alia est cum communicare integra, alia cum non integra: Integra, seu Positiva cerebri condolentia, fit cum communitate materiarum, & in ea aliquod noxii alimentum accipit, Tale est humor, spiritus, vapor, status: obvia est in partibus quae *superius* venarum & arteriarum junctura: Vicinis ita adie, consensui hinc patientiores aperitur foras: Sic Pulmones cerebro materiam consensu subministrare in peripneumonia, indeque genae rubent: Privativa condolentia fit sine communicare materiae, locumque habere censetur in partibus inter quas substantiae & operam officiorumque similitudo, quaeque *superius* nervorum junctura: Gentiliter consistit in substantia similitudine. Sic cerebrum cum membranis confidentem habet ventriculum *superius* & *inferius*. Societas consistit in operis communione: Sic cerebrum consensit nervis in ordinariis officii partibus: Nervosae aliae partes consensit nervosis: Locumque privativo consensu habent, non solum adiones animales abolire & immutare, ut in paralyti deficiente spiritum animalium inflant, verum etiam depravare doloficæ: Tristis sententia petculo ventriculo, dolet etiam caput, absque eo quod vel humor vel vapor sensibilibus accusari queat, nisi quis sit in conceptu mentis: Alterna successione Martona affligit capitis & ventriculi dolore, nihil habet quod accuset, in febribus saepe oriuntur dolores translata materia, duplici modo 1. *membris* cum transferatur ad caput relicto priori foco; uterque duplici modo, vel critico saluari & *superius*, vel symptomatice finitio & *superius* appellatur: 2. *superius* dicitur cum superfluitate priori foco causa morbilica propagatur in caput, raro, imo nunquam saluatur. Vteri ob consensum creberrimi dolores, non solum generales, totum occupantes caput, verum etiam speciales, certas inter partes: Toti capiti saepe infestis ab utero dolores, incipit autem praecipue infestatur: Cur hoc caput & interior capitis pars laetius dolet quam postrior, hanc reddunt rationem quod metum circa frontem reduplicata venas & arterias plures habeat, cum ob molem copiosiori ibidem nutrimento indigat; Demonstratio videtur desumpta ex Hippoc. lib. de Veneribus, *Universum caput id est tenuissimum & maxime infirmum est ubi apparuit heugma, idemque tegitur carne paucissima: hoc item loca plurimum subiectum est cerebri.* Ab utero frequenter nascuntur in fincipite dolores, non desunt tamen pluri partibus, imprimis ventriculo, affectis: Hippocr.

6. Epid. comm. 1.1.1. *Quibus ex abortu, aut uteri tumore, in capite gravitatem permotus sit, in fincipite dolores;* Galen. in comm. Quod in abortibus capitis oritur gravitas, rem ipsam lenibus apparentem docet: Quod autem inter alias partes fincipite magis doleat, diversis adducit opiniones, quas tamen omnes fere rejicit, & tandem hanc subsungit: Primo quidem, quare ab uteri affectibus caput repletur, causam refert in venarum constitutionem: Inter omnes, inquit, corporis partes plurimas grandissimisque venas uteri habent: Cumque eos aut menses aut lochia affligunt, sanguine compleri necesse est, hoc deinde putrescente, vapores calidi ad caput mittuntur: Deinde quare fincipit maxime doleat, plures proponit rationes, quarum prima est anaromica, deducta à vaporibus calidis, qui per arterias in caput subvolvuntur, arterias autem ipsas per collum ab utraque insindubili parte recta in fincipit discurrentes videre licet: 2. est, quod sanitate tempore tenuis & halitusosa cerebri excrementa per fincipit diffundunt: Ibi enim lutare laxissima, calvaria tenuissima plurimis membris est praedita, 3. est, quod circa eundem locum membranae plurimae per fuitas transcant, quae à fuliginibus illis laedi queant. His ostendit Galen. quare incipit ab utero potissimum trahatur in consensum, & vespertinum doloficis infestetur. *Jeb. Lingua lib. 1. Epid. 45. & lib. 2. epid. 55.* se plusquam ceteris in hysterica passionibus solum ventricum capitis prope lorum coronalem, ubi mulieres etiam perferuntur glaciæ figis, dolore adnotavit. *Rafinque Tractatu de Dolorē cap. 68, &c.* Attamen certum est quamlibet capitis partem ejusmodi doloficis parere, prout haec vel illa illius pars debiliore est; natura quippe in maxime debiles omnes excutit) aut calidior, ideoque humores alliciens: Vespertinum autem afficiuntur fincipit & occiput: Illud cum humorum per via sanguifera transmissio fit: hoc in idiopathico dolore fere anterior pars afficitur, cerebri quippe per nares & os à moleculis se liberat, anterioris partis emundatoria: Occiput autem, si sympathia contingat lege similitudinis substantiam & generis hinc uterina dolores ibi se producant, veteris enim spiritus per nervos & vinctula connectitur; nam nervosa uterofus *superius* videntur.

Per arteriam genam, &c.] Affluxus humorum duplici nuntur circumstantia, 1. ut Fluant opus est, 2. ut Excipiantur: Fluxiois ipsius modus in sympathico, ratione partis mitemis, est Pulsio; ratione partis affectæ, Agitudo ad recipiendum: Pulsio, Impulsio, Expulsio, provent à partis robore: viscera & corporis habitus pellunt humores ad extremitates vasorum, nec ante relinquunt quam movendo expellant in caput, Pellunt autem quia robustiora: Recipiendi aptitudo dependet ab imbecillitate capitis, *Adversus plenum* est cerebrum: Recipiendi aptitudinem egregie delineat Avicenna l. 3. c. 1. tr. 1. c. 6. Haec receptio est secundum duos modos, unus eorum est receptio à debilitate resistitiae, 1. ab imbecillitate, Etiam scivisti quod cum membrum debilitatur, recipit quod ei advenit ex materiis: Alter modus est ab attractione ejus, sicut si caleat cerebrum, & attrahitur id à quo cerebrum calefit: Adjuvat fluxionis motum hunc naturalis humorum inclinatio, & ad motum innata propensio, ut etiam impulsio, ejusdem naturae lege instituta, in circulatione naturali, in qua onda tradit undam, ita sanguis fluxionem. Tradidit Averroës lib. 2. colligit cap. 8. per arterias sanguinem ex sinistro cordis ventriculo alendis partibus advehi: cum hoc alimentatio sanguine miscetur multae atomi, biliofa, pituitosa, melancholica, caliditate,

frigida, sicca, imo etiam figuris inaequalibus exasperata: Non defunt excrementa, quae dum non legitime coquantur, membranarum, imo substantiae medullariae poris communicari possunt: Recipiunt autem eandem arteriae à venis, quae tum exprimantur, tum ex secunda, (cuijetur & cor declinantur) tum tertiae conditionis regionibus illas hauriunt & ad cor deferunt. Praeternaturalis propensio excutitur à Turgencia: In

febris ardentibus & intermittentibus hoc modo humores fixate quousque concitati saepe caput perunt, symptomatice vel critico modo, doloresque magnos excitant. Hoc modo qui influit humor, cum teltur & propter vasorum angustiam non effluit, circulatione abcepsus, tumores in carnes inordinatas membranasum ejcedit, quodam quasi vomitu continuatam solvete potest. *Rufinus Tract. de Cap. dolor. p. 75.*

OBSERVATIO V.

§. Capitis dolor à vasis cerebri sanguine adusto repletis, Meningibus velut sideratis.

Quibus in capite focus est, ut jam doctrinae gratia febris Capitalis dicatur, oculi rubent, dolor pulsantis percipitur, est velut *insipissus* venarum capitis, ut prisco quidem verbo, sed non inepto explicat Hippocr. An non arteriotomia confert? Audimus D. Cardinalis Lotareni, qui febre veluti capitali interit, aperto capite repertas venas omnes adusto plenas sanguine, & meninges veluti tactas de caelo & sideratas. *Gal. Ballonius Epid. & Ephem. l. 2. p. 129.*

S C H O L I A.

Terminus] Sic describitur ab Hippocrate in libro lib. 2. de morbis. Si circa cerebrum venulae supereromant, nomen quidem rectum morbo non est, neque enim fieri potest ut aliqua vena, si magna sive parva, supereromat: nominantur tamen supereromunt: Si vero etiam quam maxime supereromant, morbum ab hoc fieri non est verisimile: nam à bono malum fieri non potest, neque à malo utique bonum fiat: neque rursus bonum plus iusto fieri potest: Verum supereromere videntur quum ad venas bilis aut pituita ingressa fuerit: Elevantur enim venae & pulsant, & dolor per totum caput dispergitur, & aures sonitum percipiunt ac nihil audiunt: Ex sonitum quidem percipiunt, ut pote venis pulsantibus & palpitantibus: tunc autem sonitus est in capite: Graviter autem audiunt, paucim prae interno strepitu ac sonitu, paucim quum cerebrum & venae circa ipsum elevantur: prae nimia enim caliditate vacuum circa autem partem cerebri de se ipso implet: & quum aequalis aeris copia non infuit, velut priori tempore, neque aequalis sonum exhibeat, ea quae dicuntur non aequaliter se imprimunt, atque ex hoc gravem auditum habent: Hic si quidem erumpit ipsi ad nares, aut ad os aqua & pituita, sanus fit: Si vero non erumpat, septima die maxime moritur: At si in capite venae supereromant, id quod ab illis fit, & quae prius telata sunt: Signum vero quod tali modo supereromat hoc est, Quum quis aut manum, aut aliam quandam corporis partem huc patientem incidat, sanguis nigret profusus & turbatus ac morbosus: quamquam neque sanguis nominati iuste meretur, nisi tunc quum rubicundus ac sincerus fuit: Quum itaque supereromant ab illis causis, dolor & vertigo, & gravitas caput occupant: Dolor quidem prae nimia sanguinis caliditate: vertigo autem, quum accerviam ad faciem processerit san-

guis: gravitas autem, quod copiosior sanguis sit in capite, & turbulentior ac morbosior quum intrinsecus videtur comm. P. Salij Diversi in hunc locum pag. 182.

Arteriotomia] De hac sic *Baldus* statuit. Potest obliato malo arteriotomia decerni & cum redit dolor, est velut accessio febris, maxime existente febre particulari & velut capitali. *Consa. lib. 3. Yvoni chinigo arripit iura* ferre, dolores aderant capitis profundi, vehementes, lancinantes, divellentes, *effluunt*, ut inde vires pene consternerentur: Omni modo laboratum est, ut dolores sedarentur, sed praesentissimum atque remedium arteriotomia, dicto enim citius conquirete: An non tunc idem fieri potest? At sunt qui ut audacter arteriotomiam in capitis dolore celebrer, & de capite sanguinem ducant, dicunt multum sanguinis esse in capite, & saepe etiam mortuis inungere venas, At primum nosse debent cerebrum esse nimis frigidum & facile refrigerare secta vasa: 2. abundare cerebrum sanguine per modum raptus tantum, non propter generationem: 3. cum in cerebro venae turgent, hoc habet morbosum non naturale: Et *Argenteus* l. de somno, ait sanguinem capitis esse tenuissimum, contra partium inferiorum crassissimum: Ideo non fieri potest quin tenuissimum sanguinem multum comitentur tum fixi tum fluentes spiculis: Nisi forte dicat quis istum tenuitatem non posse esse nisi cum caliditate, & ideo metu inflammationis & majoris mali non esse alienum è capite ipso demere sanguinem: contra faciem superiores rationes, item quod cerebrum ab Hippocrate dicatur esse glutinosum, frigilique metropolis: Vide Hippocratem in historia Halicarnassensis ad diffusandam phlebotomiam, praesertim frequentem in dolore capitis.

OBSERVATIO VI.

§. Capitis dolor à phlegmone meningum, vasis & sinibus sanguine repletis, Aqua plurima in auralibus.

Non minus à phlegmone & abscessu quam ab huiusmodi meningum Vasis & Tuberculis nonnunquam cephalalgiae lethales aut incurabiles oriuntur: olim Iuvenis Aca-

demicus

demicus cum per duas septimanas de gravissimo capitis dolore, ipsum incessanter affligente conquestus erat: Tandem febre aucta; mox *vigilia*, *motus convulsivi* ac confabulatio *delira* succedebant: Quo tempore Medicis accersitus; phlebotomia, enematis, emplastris revulsivis, vesicatoriis. Item remediis internis, quæ fluxionem sanguinis ac humorum à capite revocent, sedulo adhibitis, nil proficere potuit quin mors brevi successerit.

Calvaria aperta, vasa meningas obducentia erant sanguine referta & plurimum distenta, quasi cruoris massa tota illuc confluxerat, Ita ut Sinibus dissecatis & apertis cruor affatim erumpens ad plures uncias, supra respondentem efflueret: Porro ipsæ membranæ tumore phlegmonode per totum affectæ discoloræ apparebant: Integumentis hæc sublaris, cerebri anfractus omnes, ejusque ventriculi aqua limpida erant pleni, ejusque substantia, utpote nimis irrigata, madida erat & minus firma.

S C H O L I A.

PROCALDABO io hoc casu sanguinis effervescens in meningas incursus, ejusque ibidem aggestio phlegmonem excitans, cephalalgia & subsequens deliria causa fuit: Dein sanguis ibidem accumulatus, cum circulate acquireret, seri copiam à se rejecit, à quo totus *cephalus* cito inundabatur; proinde ut morbus fortan ab initio per phlebotomiam curabilis, postea lethalis evaderet. *Th. Willis Tract. de Anima Brutor. parte 2. cap. 2. p. 186.*

Febri, vigilia, motus convulsivi, delirium. Hæc symptomatum syndromæ suspitionem iocundè materiam morbosam non humore unico, quod ut plurimum contingit, sive singulari, composuimus fuisse, cujus ideo dolorum paroxysmi paulo miciores sunt & citius transeunt. Sed alteram adfuisse morbi causam,

cum scilicet duo humores, (ait Idem p. 231.) instar salinorum diversis generis, simul congesti, *muco* effervescunt, adeoque à particularum dissimilium lacta, fibræ plurimum vellicantur, ioque dolores valde acutos & lancinantes aguntur, iisque non raro diutius insistantur: Hoc in casu pugil unus semper erit Liqueor nervus, alter Latex serotus aut Succus nutritius: Liqueorem nervum, ob viâ modo citatâ, interitum per se fibræ continentes vellicare, inque spasmos dolorificos cedere statuit. Sanguinem, quia fibrarum ductas tantum alluit, ac non intima subit, eximit: Hic tamen sæpe è visceribus materiam incongruam & infestam inspicit, qui ideo effervescens & cephalalgiam & dicta symptomata inducere potest cit.

OBSERVATIO VII.

S. Capitis dolor à vasis meningum & cerebri distentis sanguine, Aqua limpida cerebri plicas implente & totam compagem inundante.

DOMINA Perillustis per multos annos *affectibus spasmodicis* obnoxia, varioque & diversos perpeffa, de capitis dolore & gravitate insigni conquesta, cum circa initium noctis alte dormiverat, expergefata in paroxysmum convulsivum incidit, qui statim in *Apoplexiam* lethalem transitit:

Ejus calvaria exempta, vasa meningas & cerebrum perreptantia sanguine plena & distenta apparebant, cum in reliquo corpore inter dissecandum vix quicquam sanguinis effluerat: Meninge crassiore amota, per alteram tenuem & pellucidam, aqua limpida cerebri plicas & anfractus implens, ejusque rotam compagem quasi inundans cernebatur, Revera omnes cerebri cavitates & recessus *colluvies serosa* impleverat: Plexus Choroidei aquæ diu immerfusi, & velut elixus discolor & semicorruptus evaserat. *Willis Pathol. cerebri. Cap. X.*

S C H O L I A.

Sanguine plena & distenta Quomodo sanguis cephalalgiam excitet, explicat Willis cap. de Cephalalgia. Interdum ait, ipse sanguis in motum rapidiorem incitatus, ac in capite ebulliens, circa loca prædisposita inter transeundum angustatur aut sistitur, proindeque uberius mox ibidem aggestus, vasa distendit, membranas valde instat, fibræque nerveas ab invicem dividit, illique adeo contortiones dolorificas inducit: Propter hanc rationem cephalalgia ebnoxii occasione omnes à quibus sanguis supra modum effervescit, uti vini potum, exercitium, balneum evitare coguntur.

Vasa meningas & cerebrum &c. Turpida & distenta ad confluentem à toto corpore sanguine, tanquam ad

partem (caput) jam pridem debilem: Inter causas autem quæ sanguinis & seri à capite ad inferas partes refluxum prohibent, circulationique libere impedimento sunt, recenset Clar. *Lewy Tractat. de corde cap. 1.* supinum decubitus, si collam occipite magis attollitur, quia tunc sanguis in venas jugulares ascendere potius quam insistere necesse habet; unde ab ejus motu retardato, foveas utrinque in occipite imprimi ait: Si vero illa refluxus cohibitio intam durum os temporis tractu adeo valeat: ut sinusque & profundos tractus eo eo sibi excavet, quanto magis si sanguis ipse, ejusque serum in cerebrum redundet, ipsamque aggravet? At vero quocumque modo, *ad id*, sive in sinibus sive in venis sistitur, eandem in

in cerebrum refilit, æque inibi furoris morbis & materiam congerit & fomitem abunde subministrat: quippe serum ob huiusmodi causas inter anfractus cerebri accumulatum, piam matrem eoque distendit, donec tandem vel acrimonia sua eam erodit, vel copia sua perumpit, unde in basin cerebri defluens, medullam oblongatam æque nervos ex ea octos, flagratione sua corrumpit, aut acedine sua consensu lactat; unde blydrops cerebri, convulsiones & diu serum illud à substantia cerebri imbibitur, paralytes, sensuum torpores, lethargum, somnolentiam aliosque graves affectus capiti inducit.

Collatus serosa impleretur Si quidem pluribus experimentis certo mihi conflet nihil Caracchi à cerebro in partes inferiores ullas descendere, operæ pretium

erit ostendere quævis atque ductu aqua omnia à pleura choroide & glandulis præ cerebellum, in ventriculos cerebri, & per infundibulum in glandulam pituitariam deposita & percolata, extra calvarie limites deponatur: Atque in cranio vitulino (idem in humano postea expectus sum) aquam aut lac in futamena in oile calvarie, pro sero à glandula excipiendo excavata, injectum, statim omne in ventus foetiales utrinque exillire & effundi: Certo utique indicio quicquid feri à cerebro secesserat in sanguine denuo refandi, eique commisceri, idem ibidem. Serum ergo in capite congeritur cum refluxu illius ob obstructionem, compressionem, aliamve affectionem jugitrium venarum inhibetur: De causis autem collectus ferri in capite, vide plura Tenon de Hydrocephalo & Cataris.

OBSERVATIO VIII.

Capitis dolor à sanguine nigro venas implente & quasi varicosas reddente, cum siccitate cerebri ac membranarum ejus: Sero multo in ventriculo medio.

A Vteliu adolescentem medio Octobri capite doluit; lex vitæ neglecta, dolor tamen capitis indies aggravabatur: Febris acuta, dolor capitis auctor: febris vere *περαυαυα* *Τυφώδης*: Æstus erat viscerum sed major capitis, oculus ardens, facies rubra: *dolor capitis major ad synciput*: Per 40. dies traxit, mors. Ægro in sua initia resoluta, sectione internæ partes oculis subliciuntur, Aperto capite, *vena quasi varicosa*, tabo & sanguine nigro turgentes videntur. Item observatum in ventriculo medio serum multum: medulla cerebri, quæ mollior & friabilis esse debet, siccor, membranae siccissimæ, &c. *Vide Tit. de Delirio & Phrenitide.*

S C H O L I A.

Dolor capitis major ad synciput? Cui synciput magis quam alia capitis pars dulcat ostendit Galen. *comm. Lin. lib. 6. Epil.* Ex putrescente, inquit, sanguine febres accenduntur quæ plurimum vaporum copiam ad caput mittunt, à quibus cum repletur, dolores in syncipite molestiam inferentes exoriuntur, eo quod vapores illi calidi per arterias in caput subvolat ratio ostendit. Ipsas quoque arterias per collum, ab utraque vocat infundibilis parte, recta in synciput discurrentes videre licet; Præterea omni sanitate tempore tenuia ac halicula cerebri excrementa maxime per synciput diffusæ solere affirmamus; siquidem in ipso sinuare laxissimæ sunt, & ipsa calvaria subtilissima plurimisque meatibus pervia: adhuc & multa sensibilia corpora per suturas evadunt: membranæ eam quædam crallum cerebri involutum, præcænio vocat: rucine connectunt, & multitudine tenuium conceptaculorum per suturas exillant: æquos autem magnitudine affectus sensibilibus natura corpora magis percipiunt; magis vero sentientia ab inferentibus dolorem causis magis cruciantur: His sane, de causis in syncipite dolores sunt: Hactenus *Galenus*. Hinc patet non ideo quod posterior capitis pars frequentioribus infestioribusque vasis est prædita, dolorem firmari in ea potius debere quam in anteriore: Ostendit enim Anatomie ramos vasorum in occipite latiores esse, anteriores vero exiliores, quod ab illa in hanc partem forantur & desinant: Hoc tamen fieri intelligi vult *Randelmus* cum nulla pars capitis altera magis imbecilla est, aut iniquius opportuna: quæ enim aut ab initio, aut à casu, vel aliqua læsione talem conditionem sortita est, in eam fluxiones & humorum de-

cubius fieri semper consueverunt, adeo ut quampulcherrimis in ea parte, per temporum mutationes, aut alias etiam leves occasiones, repetat semper dolor. Nec solum qui per consensum, sed & qui primario affectu cerebro sit dolor, anteriori frequentius, quam posteriori parti molestus est, præsertim cum à materia pituitosa cum excrementis in capite collectis excitatus est: Solent enim illa anterior & magis quam posterior parte congeri, ut patet ex meatibus per quos expurgantur: Posterior autem capitis pars omnibus doloribus minus est obnoxia, nisi ab utero origo sit, ob peculiarem illius partis cum cerebro per spinalem medullam societatem: tunc enim dolores in occipite sæviant & molestæ: initium tractum, modo non perfumos aut vapores ab utero transmissos, sed per solam condolentiam caput afficiunt.

Vna quasi varicosa I. e. varices colore & summa referentes, succo crasso & inæquali consistentia donato: turgidas: Varicum causa in eo consistere videtur, (inquit *Eust.* *Th. Bartholinus Anat. Reform. p. m. 409.*) quod sanguis crassior, & gravitate sua motui suum resistens, in valvulis diutius retentus dilationem Valvularum faciat: absque his si esset, uniformiter intumescentes venæ, & non varicum modo: Veræ ergo Varices non adherunt, quia valvula duram meningem perperant, arteriæ sunt non venæ, uti superius annotatum, arteriæ autem in toto corpore valvulis destituuntur: Extraordinarie autem repleta vasa illa & sanguine distenta, scilicet tum arteriæ tum sinus, varicum speciem exhibent: Hic *Heuræus* ex principis, & universalis circulationis fundamentis, cum utram habent ut superfusum tum à cerebri nutritione, tum à

tum à ſpirĩtuum animalium elaboratione ſanguinem recipiant, & per venas jugulares cordi reddant: Oc- curſus horum rivoꝝ à Galeno vocatur *ſarmoz*, procedunt enim ſibi invicem obviam mox illoꝝ qui in placa moneta ſibi occurrunt, aſcendentes deſcendẽs: oĩbus veniant obviam: Venofĩ tĩvĩ à ver- tice deĩcendunt, arteriæ aggreſſas aſcendunt, inque

illo magno occurſu præſtite ſibi invicem officia que alias in toto corpore faciunt per anafam oĩes omni- bus notas: Manus hic concuſas, & ſanguis per eum commeanus, impediti poſſet ab omĩbus iis cau- ſis, quæ circulationem alibi impedire queant, unde retentionis & congeſtionis occaſio.

OBSERVATIO IX.

§. *Occipitis dolor ab humore acri craſſam meningem erodente, Atro ſanguine vaſa tenuis & craſſe meningis diſtendente.*

Quidam per biennium conqueſtus fuerat de dolore in occipite, Huic craſſa cerebri membrana aliquot locis exaſa erat variis foraminibus, idque potiſſimum in bregmate ſub ſigĩtrali futura, ubi ea cum coronali jungitur: Ex iis foraminulis effluebat, & per membranam dictam effuſus erat ſanguis ferme concretus, ater ac aduſtus: Tali quoque ſanguine diſtenta erant vaſa per exteriorem craſſam meningis ſupertiſſimam diſcurrentia, quĩn & ea quæ per tenuem diſſeminantur: Ipſa cerebelli ſubſtantia flaccida omnino molliorque multo qũam cerebri ſubſtantia. P. Pavium Obſervat. Anat. PIII.

S C H O L I A.

Sanguis ater & aduſtus &c. Sanguis non ſolum è pœcipio pena capiti noxam impertit, ſed eam aliunde ſuſcipiens illac deſert: Sæpenumero cruor è ſtomacho, liene, meſenterio, hepate, utero, aliisve partibus aut viceribus materiam incongruam, aut ſibi, aut uerſo generi inſeſtam ſuſcipit. quam brevi poſtea ut extruſat efferveſcens, membranæ capitis taſſandĩ, adeoque cephalalgiam, vulgo ſympathi- eam dictam, ſcil. per conſenſum ab aliis partibus exci- tationem producit: *Idem cap. de Cephalalgia, De capiti dolore per conſenſum. vide notæ ad ſap. 1.*

De Doloze in occipite Dolor capitis vel univerſalis eſt vel particularis, in quantum ſanguis, aut ſerum ejus, modo per omnes ſimul arterias, ſcil. tam caroti- das, cum vertebrales: modo ſeuſim per has aut illas, aut ſymbolas aut oppoſitas, noxam in meningas trans-

ferunt: Hinc fit quod dolor interior, aut caput totum, aut maximam ejus partem infeſtet; aut regioni cui- piam privatè limitatus, Hemiciſſiam modo in late- re, modo in ſynocipite aut occipite producat.

Craſſa cerebri membrana Dolor capitis vel extra cra- nium eſt, vel intra cavitatem ejus: prior iſte & tardior & interior affectus eſt, quia ſcilicet partes ſupra cra- nium, nec tam ſenſiles quam meningiæ interiores exi- ſtunt, nec tam uberi ſanguinis affluus in rigantur, ut à ſubito ac vehementi incuſu ejus ſupra modum diſtendi aut inflammati facile poſſint.

Craſſa membrana aliquot locis exaſa Sæpiſſime tales dolores ſunt ab offiſ carie deſillante & ſupra menin- gem aggregato humore, (adde & eam exedente) ac offiſ particularis propter caſum ſecedentibus, inquit Th. Bartheol. Traſt. 1. de præcipiis arti Chirurg. univerſ. cap. 4.

OBSERVATIO X.

§. *Anatome Juvenis cum intenso capitis dolore, ob datum philtum, extinſi, in quo cerebri venulæ nigricantes repertæ, Sanioſa materia pauca in ſuperficie, &c.*

Juvenis xxx. annorum melancholia laborans hypochondriaca & vera, caput præter mo- rem in ſinĩſtrum latus contorqueus: vertigine Epileptiæ finitima, capitisque & viſus paulo poſt debilitate affectus, de intenso Capitis dolore affectus eſt: cui ad materiæ pec- cantis revulſionem Chirurgus, me jubente, veſicatorium ad nucham applicuit, & poſtea veſiculas aperuit: Temporibus & fronti, quibus de potiſſimum querulus erat, applicatum iſtud ꝯ. Ungu. Alabaſtr. ꝯ. ungu. de nucleis Perſic. ꝯ. opĩ Thebaici aceto ſolut. ol. nuc. moſch. expr. ana ꝯ. m. f. ungu. Interdum ſacculis ex herbis abrotani. puleg. ruta, flor. cha- mom. thymi. &c. fovebantur tepide tam regio frontis quam lenis, ad repercuſſionem va- porum: Perſeverante dolore intenso, vena frontis tuſa, facta embrocha ſeu lotio capitis, Emplaſtrum vertici raſo inducũ ꝯ. Empl. nervini, ceronci ana ꝯ. cum olei coſtini q. ſ. malaxetur pro Empl. Sed nihilo minus morbus nullas dedit inducias: Inerim narrabat mater, filium, deſperate agrotantem, è philtro, ab ancilla meretricula inſperem matrimonĩ propinato, contraxiſſe virus iſtud: Revulſionis à capite igitur utriusque carpo veſicatorium applicum, ac tandem remediis nequicquam proficientibus, & implacabili perſeverante cephalalgia, me jubente, quod extremis extrema debeantur remedia, Chirurgus in ſum- mo vertice, crinibus novacula abraſis, inciſuram tranſverſalem peregit ſub forma literæ X, unde

unde sanguis præsto nigricans effusus, ægro dolorem apprimè sentiente: mox cucurbitulam vitream cum flamma adhibuit per horæ quadrantem, quæ sanguinem attrahendo evacuavit: Quibus factis parum de pulvere hoc vulneri inspersum ʒ. rad. helleb. n. asari, bryoniz, gentianæ, prœniz, ana ʒij. flor. beton. lavand. cheiri, anthos ana. gr. iv. castor. gr. vj. mosch. gr. j. m. f. Pulvis subtil. Postridie cucurbitula denuo applicata, una cum cruore vapores luculentos extraxit, sed parum profecit: Vesperi omnia cucurbitula Columbam viventem, è medio sectam cruentamque desuper imposuit: Trimestre post supervenientibus convulsionibus exspiravit.

Aperto Capite, prodit Cerebrum, postremotionem duræ meningis, qua venulas nigricans & lividum, cui in superficie inerrabat materia pauca saniosa cerebro impressa; &c. Vide Tit. de melancholia: Unde liquet à veneni violentia extinctum fuisse. Latichim lib. iv. cap. 4. Observ. 3.

OBSERVATIO XI.

Capitis dolor ab inflammatoria affectione meningum & partis exterioris cerebri, ubi nigredo intensa deprehensa.

Generosus Baro De Monts, in Valle Equestrium, Bernensium Ditione degens, vir pusillæ staturæ & biliosi temperamenti, fumo Tabacci adeo se addixit per aliquot ante obitum annos, ut inde prostratus sit appetitus, solo mero, absque alimentis vitam sustinens, Vertici perpetuo manus admovebat, leniturus dolorem in syncope cum ardore molestum.

Ablato mortui cranio deprehensa superna cerebri pars, cum meningibus, adeo insigni nigrore infecta, ut atra fuligine tinctum omnes adstantes crediderint. Obiit anno 1660. ætatis 70.

OBSERVATIO XII.

Capitis dolor à vasis tenuis meningis cruore oppletis & amplioribus; Sinu tertio sanguine turgido, Sero flavo per cerebrum circa falcem diffuso, humore purulento in utroque ventriculo, &c.

Barthol. Fher adolescens xix. annor. Capite doluit assumpta evomuit, &c. hinc in lethargum lethalem incidit. Sublata cranii olla, per duram meningem vasa tenuis in sinu tertio ad sinum tertium meatitia, vidimus valde cruore oppleta & triplo ampliora quam alias existunt: ipse quoque sinus tertius sanguine turgidissimus erat: Remoro corpore falciformi, serum flavum satis copiose effluxit. Sublato prorsus fornice, conspeximus utrumque ventriculum cerebri lateralem, maxime sinistram, humore purulento, viscido imbutum, &c. Vide Tit. de affectibus soporosis.

OBSERVATIO XIII.

Capitis dolor casum sequutus à sanguine circa occiput inter cranium & pericranium effuso: Seri copia in anteriore capitis parte, inter membranas & cerebrum contenta.

Anno 1644. Filius Generosissimi Bernardi Budæi, Domini de Verasse, &c. Illustris Gulielmi Budæi Nepotis, septennis, vivacissimi ingenii puer, sedile cui insidebat antrotrorsum & retrorsum quatiens, supinus cecidit occipitiūque pavimento graviter allisit, Illico exhortus est ingens capitis dolor, (de quo ante, sed leviori perpetuo, querulus fuerat cum oculis attollendi impotentia, quos humum versus defixos semper habebat:) nullis exterius læsionis notis apparentibus: Decima die accessit *ischuria*, ad interitum vsque, qui xv. die accessit, cephalalgiz comes: Eo mortuo urina profluxit per horæ quadrantem: Nullæ convulsiones obitum præcesserunt, nec ullius membri resolutio: Venter autem multum intumuit.

Aperto

Aperto cadavere, viscera omnia imi & medii ventris optime constituta & absque labe deprehensa sunt: Vnicus vermiculus in colo inventus: Urinæ excretionem destinata organa nihil vieli præ se rulerant. Dissectis cranii integumentis, in occipicio ubi ictus fuerat, sub his amplius libra una sanguinis concreti delitescerebat, in anteriori verò capitis parte, inter cerebrum & meningas, ingens seri copia cohibita apparuit.

S C H O L I A.

Similem casum & graviter, felicior excepit successus in Carolo, unico Philippo Hispaniarum Regis Filio: cui cum ex præcipio caput mirum in modum intumuerit, magna cum omnium admiratione, oblationibus aliis Medicis, insignis ille Andreas Vesalius pericranii incisionem instituit, unde totus humor collectus expurgatus, cute demum ossi euharente: Sic auderes fortuna puer.

Circa exceptum inter cranium & pericranium sanguis, Sero capia anteriore parte &c. Sicut duplex fuit dolor, antiquus & recens, sic & duplex causa, duplex idem sedes: Inter cephalalgicæ differentias hæc vulgissimæ est, quod alius dolor sit extra cranium, alius intra cavita-

tem ejus: prior mitior habetur, quia partes cranium ambientes nec tam sensiles quam meningas interiores existunt, nec tam uberi sanguinis affluxu irrigantur: Posterior, & crebrior & vehementior censetur, ob sensum exquisitum membrarum cerebri investigantium, ad quas sanguis adeo multiplici & per plures longeque majores arterias suffunditur: Effugacia tamen causæ, & putredo extravasato sanguini, inter cranium & pericranium collecto, inducit, ad lethum inferendum satis fuit, ob neglectam illius educationem: A sero in anteriori cerebri parte eongesto, tandem lethifera cephalalgia, aut alius affectus subsequi potuisset.

OBSERVATIO XIV.

Gravis Cap. dolor à Sero in ventriculis cerebri, Vasis meningum sanguine faculento turgidis, & ab Ulcerato Ventriculi orificio.

Iuvenis robustus cum lauto convivio interfuisset, eadem nocte dolore stomachi correptus fuit, qui ab initio mitis, sed post auctus & vagus factus est: nunc de dolore acutissimo Capitis, mox, & in ipso momento, de maximo cruciatu oris ventriculi, ventris & artuum conquerabatur, cum vomitu omnium ingestorum: quandoque febris adfuit continua, anxietas, vigilia, à prædictis doloribus vagis ejulare cogentibus: multa à D. Rescio frustra præscripta, nam post tormenta 18. mensum, tandem anno 1599. obiit:

Inspecto Cerebro, in ejus ventriculis ad duas libras aqua limpida inventa; arteriæ item & venæ membranarum cerebri sanguine crasso & faculento turgebant: In ventriculi orificio superiori, parte anteriore, ubi ramus sextæ conjugationis inseritur, ulcus erat magnum ac fetidum, in vacuum usque ventriculi penetrans: cætera in ventre inferiore rectè se habebant: Ventriculus præterea humoribus corruptis, fetidis & atrabiliaris refectus erat; Fabricius Hildanus Centur. 3. Observat. 20.

S C H O L I A.

Ulcus magnum &c.] Dabitur Hildanus nam ulcus hocce in orificio ventriculi, cum præseoria humorum corruptorum, fetidorum & atrabiliariorum in ejus cavo, causâ fuisse vehementissimæ illius doloris Capitis, ob maximum consensum qui intercedit nervi beneficio, cum uno læso, alterum quoque statim affici contingat? Reverta inde atrociorē dolo- rem excelsisse, ob dictas rationes verosimile est; idiopathicum tamen quoque fuisse ostendit meningum cerebrum constituto, quantum vasa sanguine crasso & faculento turgebant, accedente seri copia in ventriculis repleta, a quo ingrotes dolores excitari consuit.

In ventriculi orificio superiori &c. Caput per consensum laborat quum aut universo corpore, aut aliqua ejus parte laborante, in consensum trahitur affectusque particeps redditus: quod diverso modo pro vario inter partes consensu sit, transmissis scilicet per vi vel vaporibus vel humoribus, aut non transmissis: Jecur enim inflammationem patiente sicut dolor ad jugulum pervenit, & oris ventriculi mortium sequitur labii inferioris tremor, sic afflicti insertum paribus quibusdam infernis per continuationem quam

cum capite habent, sine ulla humorum aut vaporum transmissione dolor ad ipsum deferretur: Hoc modo fieri potest ut ore ventriculi morbo, aut vellicato, aut quovis modo affecto, dolore afficiatur caput ob retractionem, cum affecto cerebro stomachus pari è converso deprehendatur propter nervorum insignium, per quos illi cum stomacho consortium habet, offensam: Quamvis oon dubitemus ex vaporum famotumque è ventriculo ad cerebrum ascensione dolo- rem excitari: De quo tamen jure posse dubitari videtur, cum nulla manifesta via per quam deferantur, appareat: Si enim per oesophagum, ut vulgus Medicorum credit, & ab oesophago per vias & odoratus organum & palatum ascendat, cur non semper & naribus apertis & ore patente potius illac exeat? Quare existimamus non è sinu ventriculi solum, sed ex ipsius tunicis externis fumos ad cerebrum efferri; & qui è sinu, partim per oesophagum & viam odoratus, partim per rectitudinem & ambicum nervorum sextæ conjugationis ad cerebrum pervenire: Est enim rectitudo eam vim habet quam baculus oblongus in camino erectus & fumum sursum intra cana-

B lem

lem dirigat ne extra effundatur: nam illa ratione Torpedo per baculum tacta rangenti manus statim inducit, ejus vim dirigente & deducente baculo ad manum, ne per aërem divagetur, quam vim alloqui non habet etiam manus quam proximè admovetur: Qui vero ex tunicis exterioribus, per arterias magis quam per venas quæ in illa parte sunt, quæ à vera pota originem sumunt, furim feruntur: Nec potest dubitandum ne tanta humorum copia non possit inde effectui, quanta ad dolorem generandum requiritur: Cur enim hi aliqui insigni agente qualitate, ex putredine vel corruptione humorum contracta præditi, minorem vim efficiendi capitis & pungendi, quam pusillum quod ex scorpionis morfu prodit virus, ut statim epilepsiam pariat, obinebunt: *Remediorum methodo lib. 1. cap. 5.*

Ventriculus humoribus corruptis &c. Cephalalgia paroxysmos quandoque per consensum ab aliis partibus, scilicet stomacho, utero, liene, &c. oritur, licet Signorum experientia & quædam prædicant, at-

men hoc alia ratione quam per vapores à viscere affecto ad caput elevaris fieri, ex illorum historici & phenomenis rite perspicis non minus luculenter patet: Et primo quod spectat ad dolores capitis ab utero excitari viros, nihil frequentius occurrit quam à mensibus aut lochiis supprellis cephalalgia immanes succedere: Potro catamenia licet rite fluant, tamen aliæ fluxu instante, aliæque eodem desinente, atroci capitis dolore affligi solent: Verum enimvero, quamvis eodem tempore quo caput, etiam uterus afficiatur, non tamen sequitur noxam hanc inde immediate transferti, sed ipse sanguis est qui materiam morbosam capiti affigit, eam scilicet modo in proprio sinu genitam, & utero destinam perperam in cerebri meningas defert, & modo eam ab utero partibus suscipiens, cum majori malicia capiti tradidit. Hujusmodi Aetologia etiam cephalalgia, stomacho, Lienæ, aliisque partibus vulgo attribuitur.

W. Halli Tract. de Anima

Brux. p. 129.

APPENDIX.

De Cephalalgia stomachi vitio adscripta.

Mulier formosa & juvenis, gracili corporis habitu, & sanguine calido prædita, cum Cephalalgia hæreditariæ obnoxia fuisset, paroxysmos ejus crebros & vagos, alios nempe de levi occasione, aliosque sponte, h. e. absque causa evidenti oriundos, pati solebat: Pridie morbi accessionem spontaneam vespere valde esuriens, cœnam uberiolem cum appetitu famelico, nedicam canino devorabat, hoc signo dolorem capitis mane sequenti inasurum certissime præfagiens, cui augurio eventus nunquam defuit. Quam primum enim evigilabat, cruciatu per totum synciput acerrimo afflicta, insuper vomitu humoris modo acidi, & quasi viridolici, modo biliosi & summe amaricantis, afficiebatur, hinc ut indicium daretur Cephalalgiam istam à stomachi vitio exortam fuisse.

SCHOLIA.

Hujus rationem ut reddam, impieis constat vomitionem capitis læso, nempe post plagam, vulnus aut casum ab alio succedere, acramen vomitus, cardialgie, aut stomacho alias laboranti, dolor capitis, nisi intercedat sanguinis effervescencia, raro aut minime supervenit: Quare in prædicto casu, cum plane liqueret cerebri meningas ad cephalalgiam prædispositas fuisse, ejusque paroxysmos sanguinis agitationem quamvis excitasse, hinc obvium erit concipere, quando particule heterogeneæ ob

chyloleus vitium, in massa sanguinea ad plenitudinem congererentur, statim ob molestem expulsionem fluore ejus oborto, eas utpote male coherentes à cruore secretas, partim ex arteriis in ventriculum sustulit fermentum ejus exsulcasse, adeoque famem produxisse: partimque in capitis meningas prædispositas intrasse, ibidemque cephalalgia mox sequenturæ fomitem, seu potius incensivum deposuisse: Idem

ibidem. De Cephalalgia per consensum vide plura Observa.

OBSERVATIO XV.

Capitis dolor à turgentibus atro sanguine cerebri venis, & aqua in ventriculis.

Frairi N. (Vide Titul. de melancholia) ingens capitis dolor, mortuus; Venæ sublatæ cranio apparent plenæ sanguine melancholico: magnis satis aquæ quantitas in ventriculis reperta fuit: An id occasio mortis esse potuit? *Ballonius.*

SCHOLIA.

Vena plena sanguine melancholico &c. Causam vehementer doloris humoris qualitatibus adscribendam non esse rectè censet idem lib. 1. p. 44. Capitis dolores, aut, non tam surgunt ob humorem melancholicum aut frigidum, quatenus ejusmodi rema-

net: quæ enim humori melancholico inest siccatas, ea parum ad dolores excitandos idonea est: frigiditas verò & humiditas, quæ tanquam qualitates propriæ pievitæ quadrant, parum quoque ad dolorem generationem valent, Nam, opinione *Galeni*, frigida torporem potius

potius & stuporem inducit: itaque cum in fluxionibus tam acerbis dolores excitantur, vel tales humores sunt pituita salis aut acida (nam de fluxionibus biliosis sermo non est) vel fluxionis materia est: Ac credibile nullum penè dolorem excitari quin aliquod sit de natura fluxulenta & icterosa, quod videbatur

Medicis *traditum*, quorum dogma Hippocrates videtur sequens lib. de flatibus; illas ventositates *air* plus vocare possit, & flatus sub ventricos, vagabundos, leves, irritos: nam *air* idem aliquando significat quod *sursum*, id est subventricos: In talibus autem phlebotomia solvit.

OBSERVATIO XVI.

Capitis debilitas à sero copioso inter meningas diffuso & ventriculos replente.

EMinent. Cardinalis N. Catarrhis obnoxius aliquam Capitis debilitatem adverteit &c. Cranio aperto plusquam libra feri tenuioris inter duram & tenuem meningas diffusa videbatur, quo turgida pia mater solitam crassitiem quater superabat: Eodem sero, sed rubicundiore, ventriculi cerebri erant repleti. *Vide l. 2. Titulo de Peliculis dolore.*

S C H O L I A.

Cum massa sanguinea sero abunde, nonnunquam circa plenitudinem ad illud excernendum excitatur, quare fluxionem, seu velut deliquium quoddam, quo nempe tempe & aequum à spissiori & cruento seceratur, concipit: Dein, si quidem etuor dilutionis factus, inter turgescendum colitius & copiosius trajicitur per arterias quam reduci possit per venas, forte quicquid servum est, juxta valorem in escapepines amandatur, inque partes modo has modo illas suffusum, prout in quibuldam locis tumores aut caracum, ita in capitis membranas decumbens, dolorum paroxysmos ciet: Cæterum ob plures alias causas, à sanguine fluxorem passio serosa colluvies exundans in meningas & pericranium irruit, inque ipsis cephalalgias valde molestas parit: Subita potorum à frigore aut madore constipatio, talem affectum in pletilique hanc morbo obnoxius fere constanter producit: Vini acidi ac tenuis, pomacei, quin & cerevitiæ propter acetem fermentescere apte potius, quatenus sanguinem fusiunt, & ferulitates ejus præcipitant, cephalalgias tanquam venena prohibentur: Denique quicquid fere Podagricis, idem etiam & his ob similem in utriusque fere turgentis ad partem affectam, ubi cum humore nervo tape effervescent, fluxionem, obesse solet.

Porro non tantum merui simplexque sanguinis serum in capitis membranas exundans, dolorum paroxysmos ciet, aut interdum humores alii sese adjungunt, hujusque ductu ad partem affectam admitti, morbi iragrediam adaugent: sipe acidi humorem tenuem & aequum à vasīs lymphaticis, glandulis, foras & partium solidarum meatibus & poris (in quibus aggregabantur, subito effluere, inque sanguinem venosum iussundi, unde statim eardis sinu trajiciens, & sanguini artetioio confusus, ab eo denovo statim se-

cernitur & quæ data via rejicitur; idcirco partim per renes amandatus, urinx limpidæ & copiosissimæ profluvium facit, quandoque etiam partim in cerebrum; aut nervorum origines redundans, affectus soporosos aut convulsivos producit: Quinimo interdum pars quædam ejusdem humoris limpidi in capitis membranas cum sero correpta, cephalalgias atrocioris paroxysmum ciet: Enimvero in pluribus observari *arinem simplicem, & valde copiosam* morbi hujus paroxysmum aut præcedere aut comitari.

Cæterum opinari fas sit aliismodi aliarum partium recrementa, scilicet bilem ab Epate; fixulentias atrabilarias à liene, & forsan humores incongruos à stomacho pancreate, renibus &c. à sanguinis sero abforberi eique penitus incoqui: quibus dum insiditur, effervescentias multo promptius concipit, proindeque in vasa cephalica imperuosius irruens, eumque liquore nervo ibidem fermentescens, ipsos & vellicationes dolorificas valde molestas parit.

Serosa colluvies, sive hæc simplex, seu, ut ostensum est, complicata fuerit, adhuc amplius capiti infesta est, si quando solennis ejus evacuatio per debitas & alias vias præcipitatur, videlicet, si vel provis & obstructis transpiratio inhiibetur, vel propter renes male affectos *disperit* haud satis commode peragitur, utrumque defectum cephalalgici graviter launt: Porro ob sanguinis transitum in aliis locis præcipuum, capitis membranas plectuntur: quibus nimis viscera imi aut medii ventris, præsertim Epate aut pulmones, obstructione laborant, ita ut sanguis ibidem viæ trajici possit, plenior ejus torrens in alias partes, ac præcipue veritas *ipsius* diligitur, ita ut propter hanc causam non tantum cephalalgias, sed affectiones soporosas & interdum lethales successisse noim: *Wila de Anima Revoc. parte 2. cap. 1. p. 254. 255. & 256.*

OBSERVATIO XVII.

Cephalalgia à sero inter duram meningem & cerebellum latente.

Dominus Albertus dolore capitis vexabatur cum destillatione tenui, tandem cum convulsionibus obiit &c. Aquæ cochlearia tria erant collecta inter duram meningem ac cerebelli postera sedem. *Vide Tit. de convulsionibus.*

S C H O L I A.

Aqua cerebriaria] Exiguam adeo aquam quantitatem dolorem insulsum micram videri poterit: Sed falsum illam, fuisse, acrem, muriaticam vel acidam ostendunt subsequentes convulsiones: Potest & adscribi doloris causa crassificæ duræ meningis, inibi quadruplicatæ, acutiorque quam qua cranium respicit parte sensu præditæ: adde & densitatem, detensionis humoris causam, diuturnioris actionis &

difficilioris resolutionis. Hinc quadrare potest solutio dubii, Quid maior dolor renium intestinorum an crassiorum? Tertium quidem intensior consensus, quod membranæ exquisitiori sensu polleant; ratione autem tenuitatis tunicarum, exitum humori facilius concordanti, secus ac crassæ, quæ densitatis causa illum diutius cohibendo, pertinaciæ, si non acutiei doloris causa sunt.

OBSERVATIO XVIII.

5. *Hemicrania ab ingenti feri copia inter cranium & duram meningem contenta, tum in hujus falce & reduplicationibus.*

Matrona Nobilis (de qua titul. de Apoplexia) fluxum hæmorrhoidalem passâ ab Anno xviii. postmodum hemicranie obnoxia vixit, totam capitis partem antricam & sinistram occupanti, plerumque semel in hebdomada vexanti: usu purgantium pilularum, xv. interdum dierum inducias concedenti, imo & mensis integri: dolore remittente oculis affecti lateris copiosas fundebat lacrymas; quod illi certum erat indicium affectus ad exitum properantis: Interdum nares è directo multo stillabant sero, quam evacuationem latissima ferebat, quod per menses integros postea concederet dolor.

In defunctæ cadavere, inter duram materem & cranium, in singulis hujus cavitatibus tam anticus quam posticus: Præterea in falce & duræ mæris reduplicatione (abscissis prius fibris, quarum interventu cranio adhæret) Inventa aquæ flavescentis mediocriter salitæ, Pintæ una, seu libræ Medicinales circiter quinq. *Ex communicatione Mag. Bailly, Chirurgi Genevensis peritissimi.*

S C H O L I A.

Plerumque semel in hebdomada vexanti &c.] Cephalalgia Habitualis, aut Continua est, aut Intermitteus, cujus periodi modo ad certum tempus determinantur, modo vagæ ac incertæ existunt: hæc frequentior continuâ, cujus accessiones cum cæcæ ac periodicæ fuerint, sæpiissime intra nycthemeri spatium redire solent: Causæ quorundam rationes audiui, & oovi qui diebus alternis, imò qui semel in hebdomada aut mense affectus istius paroxysmos exatè repetentes percutiant: Usitatum est Cephalalgie prodigiari viis, circa æquinoctia aut solstitia accessiones recurrere, quia scilicet his temporibus sanguis ac humores turgescunt solito majores concipiant, & proinde cum liquoræ partium capitis nervearum irritio effervesceat magis apto, solitos dolores insulsum redintegret: Verumtamen cum circa has anni temporis cephalalgie repetunt, hæc unica longiore accessione diu protogantur, sed plerumque periodos subordinatas nalet, nycthemeti cujusque spatio stans quibuscumque horis insistere solent: Cum itaque cephalalgia periodica accessiones quotidianas plerumque habet, harum, uti febrium intermittentium, rationes à materie mortificæ statuo rempote ad plenitudinem assurgenti & runc effervescentis vitio peti debet: Enimvero supponere licet alicubi circa capitis membranas, fibras nervæas male dispositas, liquoris proprium pervestere, aut non bene trajicere, quare cum succus notissimus, eisdem eam partibus à sanguine appositus, non statim assimilatur, nec cum altero humore bene convenit, demum ab utriusque simul appressis & discrepantibus, munda effervescentia, proindeque fibrarum vellica-

tio dolorifica exoritur: Quod autem dolorem paroxysmi non eadem semper à passu distantia, sed in aliquibus citius, inque aliis tardius, atque modo ante somnum, modo post eum oritur, in causa est, partim quod alimentorum coctionis & distributionis mucra, modo citius modo tardius obcurrunt & de partim quia in his liquor oerveus, inque aliis succus nutritius plus peccat, quare prout hujus pleoridocitius, ac illius tardius contingit, ita paroxysmi tempora variantur: 3. Cum cephalalgia intermitteus paroxysmi sunt vagi ac incerti, nec morbi procatæxis magna est aut constans, nec causa evidens assidue existit: Quare cum utraque causa sepe defest, & non raro altera desideratur, morbi insulsum non ad certa alligantur tempora, quin isti in quibusdam sunt velut fortuiti & accidentales, in aliis, quibus prædispositio ad hunc affectum paulo firmius radicatur, dolores capitis frequentius molestant, & propter varias accessiones passim excitantur, imo & ob quiddam certissime expectari solent: Paroxysmorum ita varie contingentium rationes ex morbi hujus aetiology liquido parent. *Idem Tract. de Anima Anat. part. 2. cap. 2.*

Inventa feri pinta &c.] D. Malpighius, Professor in Sicilia, alium usum adscribit cerebro ab eo qui hæreticus ei attribuitur est: Vult enim dimidiatam, vel tertiam minimum sanguinis alioquus animalis partem, ad cerebrum deferri, neque tamen ibi consumi; Igitur tubellus sanguinis serum per medium Exterioris partis percolari, & in cerebri fibras postea ingreßum, inde in nervos deduci: Hoc esse dicit cur caput sepe aqua plenum repetatur, quando cerebrum

tebrum quodam vulnere laſum aut aliquo morbo ſu affectum : Se enim detraſſe air partem cerebri Exteriozem & molliorem tegere non ſolum corpus calluſum, ui haſtenus creditum, ſed interere ſe etiam ibi pluribus in locis : Corpus etiam calluſum non ni-

ſi plucium exiguarum Fibrarum, ex medulla Dorſi ſpi- nali excurrentium, inque dicta parte Exteriore cere- bri ſuicemim texturam eſſe adverte. Ex *Adis*
Rogea Societate Anglica Anno 1667.
pag. 150.

APPENDIX.

De Hemigrania à ſero producta, errhinis & veſicatoriis curata.

Fœmina querebatur de hemigrania dextri lateris frontem potiſſimum infeſtante; adeo ut oculos vix aperire valeret : ab adminiſtrata V. S. & pilulis cephalicis peius habuit : ajebar ſe vertigine corripì ad quẽmvis motum capitis, & quocunq; inclinaret caput, eo impendere veſicam aqua plenam : Applicantur ad aures veſicatoria : for- mantur turundæ immergunturque in ſpiritum falis Armœ. volatilem, ſpiritusque per nares in cerebrum attrahitur : Non diu his remediis uſa, ſtillicidium ipſi aquæ ad ta- ctum frigidiffimæ accidit, & maxima copia, unde dolores evanuerunt. *Herm. Commenus in Miſc. Cur. anni 1672.*

APPENDIX.

De Cephalæa per aqua limpida è naribus ſtillantis copiam ſoluta.

NOvi Fœminam illuſtrem cephalæa immani infeſtari ſolitam, quæ cum à gravi paro- xyſmo melius habere ceſſiſſet, primo in cerebri ſaſtigio motum formicantem, velut aquæ irrepentis ſentiebat, dein motu iſto paulatim anticius & deorſum progrediente, demum aquæ limpida: plures guttæ è naribus exſtillabant : hoc ſymptoma illi paſſim ob- tingere ſolebat, ut minime dubitaret ægra quin lymphæ iſtæ ab ipſo cerebro exſtillaverit. *Th. Willis Anat. Cerebri cap. x. j.*

OBSERVATIO XIX.

Capitis dolor à ſero ventriculos replente & ſpatia intra meninges &c.

ISperlinus Victor 70. annor. anno 1657. phthiſi obiit, fere ad ultimum uſque halitum loqui poterat, ac ingentem dolorem in utraque femoris interna parte pertulit, quirt etiam aſſidue Caput doluit.

Remoto cranio, plurimum ſeri ſubpallidi in omnibus ventriculis & ſpatio intra me- ninges reperi, ita tamen ut cerebrum nondum comprimeret : Quin etiam univerſa anfra- ctuum ſuperficies humore ſuperfluo lentoque, ceu gelatina, obſita erat : Si ſuperficiem illam ſauciavi, exſtillavit ichor ſerofus. *Joan. Jacob. Weſſerus Exercitat. de Apopl. pag. 300.*

S C H O L I A.

DE cauſa collectionis ſeri tanta copia, paucis dico Obſtructionem infundibili, ac conuulſionem ca- tarthorum ſuppreſſionem ad ſei accumulationem motum facere : Et diuinos capitis dolores ſero ad aſſuetum ſtimulus addere, prout meliceriam vulne- ratis nervis valdeque dolemibus quotidie profundè experime. *Idem Ibidem.*

Ita tamen ut cerebrum nondum comprimeret] Alias ſub- orta eſt Apoplexia : De generatione autem apople- xia: à ſero cerebrum comprimente. Vide infra Tit. de Apoplexia : Illud vero admiratione dignum, quod cum paralyſis particularis ab humore nervos oriri cen- ſeatur &c. hic in ſperſione, cui plurimum ſeri ſubpallidi in omnibus ventriculis, & ſpatio intra meninges con-

ſinebatur, excitata non fuerit, & quidem facilius, cum nervis ſit mollius : Aliud tamen docent hydro- cephaluſiſ & aliorum : Ea ergo copia requiritur quæ cerebrum & cerebellum comprimere valeat : Nam ſi ſerum quicquam extrinſicus humiſtando va- luiffet, onam vel alteram ſalem actionem hic abole- viſſet, & loquelam præ multis, cum undique ſerum diſſuſum extiſſet, ac ſuperficiæ cerebri ſe jam inſi- nuare ceſſiſſet.

Humore ceu gelatina] In quam faciliſſi Lympha per- moram ; adeo ut credere ſit ſerum intra meninges, & in ventriculis contentum, vel lympham ſuillæ, vel hanc ſero proprie dicto, permixtam.

OBSERVATIO XX.

§. Cephalæa à sero cohibito in cerebri ventriculis & ejus anfractibus alluente.

Virgo cephalæa immani diu affligebatur, atque inter medios cruciatus multum seti flavi & tenuis quotidie naribus effluibat: novissima hyeme hæc excretio aliquandiu subsistit, & tunc demum ægrotans, & capite deterius habente, in convulsiones atroces cum stupore incidebat, atque intra triduum apoplectica interibat.

Capite aperto, latex flavus cerebri anfractus profundiores, ejusque cavitatem anteriorem, seu ventriculos inundabat: *Th. Willis Anat. Cerebri Cap. xij.*

S C H O L I A.

Efficiam seti effluvio cohibiti in generando capitis dolore ostendit *Redimus* l. Epid. & Eph. 2. p. 115. Anno 1675. deprehendimus, ait, seti bilioli, effusi si quando aliis, magnitudinem & malignitatem: atque hujus maxime vis & copia in cerebro apparebat: Capitis dolores vixere tunc tamque longi ut Medicorum opera eluderetur: Seti malignitas remedium vim superabat: necnon conclulum ibi in capite, & exitum non habens, non poterat non

affectionem nutrire: Et, quod nobis videbatur, illud serum peculiare in cerebro generationem habens, & quod indomitos capitis dolores inferebat, diarrheam quandam in cerebrum inducerat, quæ tantæ duritatis causa esse potuit: Vnde cum sine febre ægri viderentur, tamen erat nescio quæ oris siccatas, oculorum rubedo, pulsus in temporibus manifestus, sensus punctio- nis & lancinationis.

OBSERVATIO XXI.

Capitis dolor à copiosa aqua cerebrum alluente, cum ventriculi vitio.

Pvella unius anni patiebatur capitis dolorem ac tandem *Epileptica* obiit. Cerebrum librarum quinque copiosa aqua circumfusum erat: Aderant ipsi pustulæ aqua plenæ: Ventriculus in sinistra parte nigricans, vitidi humore repletus. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

OBSERVATIO XXII.

Capitis dolor inductus ab aqua dura matri incumbente.

Pvella *Epilepsia* correpta de Cephalalgia & frontis dolore querebatur: Cranio demptro duræ matri incumbentis aquæ dimidium fere cochleare repertum est. *Vide lib. 2. tit. de Tussi.*

OBSERVATIO XXIII.

Capitis dolor à Sero supra, intra & infra meninges contento: Abscessu grandiore intra dextrum ventriculum, &c.

VRsula Aberling (cujus historia Tit. de Paralyfi videatur) ex gravis ponderis gestatione sensit manifeste aliquid intra cranium ruptum fuisse. Dehinc conquerebatur de syncipitis dolore fixissimo, quasi summa vi sursum capilli ibidem raperentur continue: Oculus quoque dexter intensissime doluit, ac videbatur ipsi ac si ex orbita evelleretur, &c. Cephalalgia diu continue afflixit, atque hanc unice causabatur, quæ à vini potu exacerbabatur, tota itaque æstate aquam aut serum lactis caprini bibit, &c. Hæc præcipue dextram capitis partem occupans, nunc occiput nunc synciput, nunc tempus, nunc frontem misere excruciauit: quandoque præ dolore exclamavit abscessum intus sub syncipite latere, imo jam exitum parare, unde quoque non raro ut ille opera chirurgica maturaretur expetivit.

Mortua; cadavere aperto, Cutis capillata de cussatim incisa, tum ex vasis capillaribus faucibus, tum ex cranio ipso denudato exstillavit sanguis ichoreosus, &c. Olla ablata, integra dura meninge aliquid serosi excidit. Divisa dura meninge, copiosius serum occurrit: corpore falciformi à crista galli resecto, ac retrorsum flexo, superficies cerebri ubique ceu gelatina

latina flava transparente tegebatur: Sauciara renui meninge, exstillavit copiofum ferum flavum, tenue, admodum fluxile: Cerebri portione ad ventriculũ dextrũ ufque ablata, protinus ex illo exillit aqua turbida; Dilatato amplius hoc ventriculo, occurrit abſceſſus ovi gallinacei magnitudine, peculiari tunica veſtitus, &c.

S C H O L I A.

Cephalalgia continuo & diu affligens poſt Invaſionem Hemiplegicam in dextro latere, qua etiam capillatam ſuſam trahi, & oculum ex orbita evelli parabat; non ſolis tumoribus dextri ventriculi adſcribenda videtur, quia ante inſulam de nullo dolore conquerebatur, & poſtea permanentibus tumoribus menſe Februario ſemiſit partem ſua ſponte, partim à medicamentis ſerum evacuantibus & abſorbentibus: Rediit quidem ſubinde, & à vino exacerbabatur, ſed non tam vehemens ut pridem uſque ad menſem Auguſtum, quo denuo quidem ipſam crudeliſſet, ſoporis in dextro ſyncipite excruciat, itaque abſceſſum latere ſe diſtinde ſentire dicit, ejuſque ma-

turationem & apertioem à Chirurgo efflagavit: Verum ob plurimos errores in viſu commiſſos, & frigidoſum abſum: quibus ſerum agebatur, adeo ut de hac cephalalgia recidiva ſolis tumoribus attribui poſſit, ſed & ipſi quoque ſeu lymphæ ſeu ſero meninges tendenti, idem, magis in dextro latere, ob tumores ad hunc affectum concurrentes. Serum autem non ſolum copia, ſed etiam acrimonia leſit, nam illud quod per meninges tenuem gelatinam inſtat transiit, ſubflavum erat: forte quoque ſerum oſo impune intra cranium & duram meningem fluctuavit. J. J. Wiſſerum Hiſtor. Apopleſt. xiv. Excerpt. de Apopleſia p. 403.

OBSERVATIO XXIV.

§. Capitit dolor à ſero ventriculũ cerebri dextrũ implente.

PVer 14. annorum caput caſu ex alto aliſit, hinc febris, ſtupor, Dolor capitit, abſque rubore aut inflammatione, &c. mors. Inventus ventriculũ dexter cerebri aquæ libram continere. Vide infra Tit. de Saporofiſ affectibus.

OBSERVATIO XXV.

Capitit dolor à Sero ſpatium inter utramque meningem replente, cerebri anſraſtus alluente, &c.

IAc. Reutinger aliquot ſeptimanis ante obitum, (ex Apopleſia) crudeliſſima cephalgia totum caput frontem præcipue & occiput, afflixit, à qua ipſi nec mora nec requieſ præ dolore quandoque amens erat, ut quid vel diceret vel faceret non raro neſciret, &c.

Altero die ab obitu cranium aperui; ſaucia dura meningem, profluxit ſerum pallidum ſpicci coloris, cum impetu quodam, non ſecus ac mediana vena brachii ſecta ſanguis erumpit, & quidem tanta copia, ut cyathi aliquot unciarum capaces eo impleri poſuiſſent, Hoc ſerum maxima ex parte colligebatur in ſpatio quod inter duram & piam matrem eſt, quod mihi amplius & capacius eſſe videbatur quam naturaliter exiſtere ſolet, ſero præ nimia copia duram matrem undiquaque expandente. I. Jac. Wepferus Diſſertat. de Apopleſia hiſt. 4.

OBSERVATIO XXVI.

Capitit dolor gravativus, à ſeroſorum humorum inter duas meninges collectione ortus.

DOm. Lud. Saladinus (vide hiſtoriam lib. 2. Tit. de morte repentina) de capitit dolore gravativo, cum ſummo virium languore diu conquellus eſt, Frigoris adeo impatiens, ut ad primum hyemis appulſum non domo ſolum ſed cubiculo omnino, quaſi carcere, conſeſſus maneret cujus omnes rimas, (quanquam denſa aulæ parietes circumveſtirent) papyro glutine inducã obſtrui curabat: proceſſum ver & hirundinum ultimarum adventum expectans priuſquam liberiori aëri ſe committeret.

Illius ſubita ſyncope abrepti, aperto capite, inter duas meninges inſignis ſeroſorum humorum colluvies deprehenſa eſt.

S C H O L I A.

Rigor impatiens } De affectu hoc, qui vulgo dicitur Aſtudo ad frigore ſuſcipiendum. Vide

Pharmacop. Ration. Part. 1. ſect. 5. cap. 3.

OBSERVATIO XXVII.

Pungitivus Capitis dolor, excitatus ab aquae perspicuae copia in posterioribus cerebri ventriculis contenta.

Cerebrum facultatum animalium principem sedem esse, jamdudum contra Aristotelem Galenus disputavit, ipsasque functiones eo prestantiores reddere quo purius, temperatius, ac magis pervium extiterit; quanquam autopsia contrarium demonstrat. Nam filiola cujusdam Comitisse annorum quatuor, habitus corporis gracilis, biliosi temperamenti, correpta febre ardente, sine notabili operationum principum læsione, crescente morbo, decima quarta die succubuit.

In ventriculis cerebri posterioribus inventa fuit libra aquæ, ipsa purcali magis perspicua, sine operationum principum læsione, nih quod aliquando de *Pungitivo* capitis dolore exclamaret. Forfan ideo quia pauca utinæ prodibant, & ad calcfactum caput fecerunt metastasin. *Antonini de Pozzu miscell. curios. anni i v. Observ. xxxvj.*

OBSERVATIO XXVIII.

Capitis dolor à cerebro nimis humido.

Virginem febris, quam *ρεσταγοςία* vocat *Galenus*, infestabat, & meridie exacerbationes, septima vespertina frigidi sudores; circa 6. diem *εσπορ* per proropthiam genitus, nam & remissionis tempore perseverabat *Carm*; 7. Sudor erupit calidus fatis: alvus adstricta, nec nisi *αεὶς αἰσχυλὸς* deiciens, si fluxisset spes aliqua superfuisset: die 14. convulsa interiit: omnes corporis partes convellebantur: Illa quamdiu vixit doloribus capitis erat obnoxia: perpetuo incumberebatur operi, quod ad capitis imbecillitatem faciebat, Austrina constitutioprecedens facile caput repleverat.

Aperto capite, cerebrum erat humidius quam è natura foret. *Ballonius Epid. & Ephem. lib. 1. p. 5.*

SCHOLIA.

Cerebrum erat humidum] Humiditatem cerebri, indeque ortum dolorem, (qui Gravativus est, ideo Gravedinis nomine donatum) à lymphâ vitiatâ deducit *Franc. Syllius Pract. l. 2. c. 29.* & glandulis in cere-

bro existentibus simul affectis; quæ distillantæ sunt *Catarthi* (cujus comites sunt febres *Catanhales* dictæ) Eadem acriore facta, & salia muratica, vel simul acida, vellicatis nervi, convulsiones.

OBSERVATIO XXIX.

Cephalalgia ab aquæ copia in capite, ob evaporationes per aures susceptas.

Mulier acerbissimi capitis dolores & aurium: Sine intermissione admittebat fumum cephalicorum per infundibulum: allevabatur: deteriores fiunt dolores, mors.

Aperto capite aquæ magna quopia reperitur: Causam Medici retulerunt ad vapores ita frequentet susceptos: Nec abs re, cautos esse oportet in excitandis in aurem vaporibus, *Gul. Ballonius parad. 143.*

SCHOLIA.

Aqua] In ejusmodi doloribus à sero oriundis hydroticorum usus forte utilis est: Narræidem *Epid. l. 2.* Hemigrania intolerabili quandam cruciatum, usu pillularum potentium juvenum fuisse: hinc

naturam particularem in tempore sinistro sudorem excitasse, quo confectæ, arte provocatum esse amplius, unde ager melius fuerit.

OBSERVATIO XXX.

Gravis circa frontem dolor à seroso humore in substantia cerebri ventriculis.

ANNO 1626. in viis filiam D. Frefon septem annos natam, quæ à duobus mensibus affligebatur dolore capitis gravissimo circa frontem & supercilia, qui singulis propemodum horis

hois recurrebat, ira acutus ut illa cultro ſibi caput dividi frequenter poſtularet: lam vero à duobus diebus tres aut 4. paroxyſmos epilepticos paſſa erat cum ſpuma in ore: multa remedia fruſtra præſcripta: Conſilium initurſus nuntiarum nobis eam novo paroxyſmo epileptico ſublaram, ac poſt mortem puris aliquid per narces effuſiſſe, quod nobis abſceſſus latentis ſuſpicionem iniecit:

Sed cerebro aperro, nihil reperimentum præter ſeroſum humorem in cerebri ſubſtantiam & ventriculos effuſum. *Lazarus Rivierum Obſ. 37. Cent. 1. Roſſinkium Tract. de cap. dolore pag. 84.*

S C H O L I A.

Hic caſus mihi in memoriam revocat hiſtoriam capſulam virginis ſimili dolore per multos mentis vexata, cui, cæteris irritis, totam caput, de-raſo capillitio, veſicatoriſ conſectum eſt ſuſta: cucupha, & veſicis excitatis, effluente copia ſeroſi humo- ris liberata eſt, quod remedium aliter eſu fuiſ- ſet: *Idem ſtoll.*

Dolor capitis grauiſſimus circa frontem Inter præcipuos doloris capitis differentias ea eſt quæ à ſede cauſæ de- ſumitur, quæ aut interna eſt aut externa, cum dolor internus periculoſior ſit & curatu diſſicilior: Hic ex *Galeno 3. de loc. cap. 1. & 1. de compoſ. med. x. n.º, cap. 3.* Dolorem capitis internum hoc peculiari ſigno diſtinguit ab externo, quod ille ad radices oculorum pertingit, hic miniù: hac ratione quod tunicæ ocu- lorum à cerebri meningibus proleat, hinc ſit ut dor- lor eo uſque extendatur: Obiit *Fernandus parhol. lib. 5. cap. 1.* alicuius externos eiuſdem dolores ad radices ocu- lorum peringere, quod pericranium, cui inſident, oculorum cavum ſuccingat: Reponit *Rondeletius 1. meth. med. cap. 5.* ad dolorem pericranii oculi cavum non dolet, licet illud eo uſque pertingat, propterea quod pericranii dolor à ſigore externo opturium oritur, quia pars frigida à ſimili facillime paritue qualitate: Illud autem ſigis ad oculi cavum non poteſt pervenire, quia à calore oculorum, ſpiribus & ſanguine conſervatur: Si vero internum ab æſta, aut ſimili cauſa dolor capitis externus excitetur, tunc eandem capitis tantum afflicti aſſimiat, non autem peri-

cranium, in profundiori loco ſitum: Verum hæc *Rondeletij* doctina non omnem omnino tollit diſſi- cultatem: licet enim omnia quæ ille addidit ipſi con- cederentur, tamen ſi dolor excitetur ab aliquo tumo- re juxta pericranium collecto, aut ab aliâ cauſa con- tinuum ſolvente, nulla ratio erit cur dolor ad oculi cavum non ſeratur. Dicendum ad *Galeni* deſenſionem, duplici ratione hoc ſignum fuiſſe à *Galeno* poſitum, 1. quia membrana, quæ à pericranio ad oculi cavum ſeratur, eſt hebetioris ſenſus, æque ita non compatitur dolori pericranii, niſi admodum obtuſe, Tunicæ ve- ro oculi, quæ prædeant à meningibus, ſunt exquisi- ſſimi ſenſus, æque adeo inſigniter dolet: Deinde, membrana illa, quæ à pericranio oritur, non ita in- trinſecæ & proſuade attingit oculum verſus nervos opticos, ſicut tunicæ quæ à meningibus procedunt: unde ſit ut dolor ille externus non poſſit ſe extende- re ad fundamenta oculorum, ut loquitur *Galenus. Ri- vierus Præſt. lib. 1. cap. 16.*

Difficultas quoque eſt in dignotione doloris men- togem graſſam aut tenuem aſſicientis: hinc tamen con- jecturam aliquam capere poſſumus, quod cum affe- ctus in craſſiore reſidet, ad exteriora dolor vergit, ob pericranium illi connexam: Si vero tenuis, dolor pro- fundior ſit, cerebrôque immerſus quaſi eſſe videatur, quod per omnes cerebri anſactas diſſeminetur cõ- que ambiat: In utraque tamen aſſicta dolor ad ocu- lorum radices, cum oculi globus à cerebri membra- nis tunicas accipiat, peringere poteſt.

OBSERVATIO XXXI.

Capitis dolor à colluvie ſeroſa in cerebro, & corruptione omnium principum viſcerum.

INter alia ex cadaveribus notata, hanc in Jurisprudentiæ ſtudioſo obſervationem ante aliquot annos notavi Caſſellis Carrorum, & Excel. D. Weſpero Med. D. & Præctico Schaphuſiano Celeberr. Medico ſane in Anatomicis curioſiſſimo, communicavi: quam & Tibi Excell. Vir, ranquam amico integerrimo negare nolui: Hic juvenis xxx. circiter annorum, ab amico amice exceptus, & domum redux, poſt exacerbatum Capitis Dolorem multa evomuit, Palpitationes cordis, Tremores artuum, Convulſiones ſubſequentur, & ſequenti die deſubito moritur.

Judicis juſſu apertum cadaver: omnia penitus viſcera principaliora corrupta fuerunt inventa: Venterculus intus coloris vividus, in quo materia quædam cineritria erat conten- ta: Inteltina gangrænoſa, ſtatibus turgida & vermibus dimidiis cubiti ſcarentia: Epar corruptum: Pulmones flaccidi, coloris albi, hinc & inde exulcerati: Cor lividum, contractum & ætuoſe quodam nigro repletum: Cerebrum ſeroſa colluvie uſque ad principium nervorum repletum: Curis exterior maculis rubris inferius punctata, ſupe- rius inſtar apoplecticorum coloris nigri & ſubviridis, fetidiſſimo odore, licet ſtatim poſt mortem cultro anatomico ſubjiceretur corpus, adſtantium nares implebantur.

S C H O L I A.

ITa ut non exigua veneni exhibitæ ſympt. Innova- rint, cujuſtamen nemo reus inventus, unum etiam curioſe inſequitum fuerit: *Ægrotans ipſe mente ad- hac conſtans aliquid extra prandium aſſumptiſſe ne- gabat,*

gabat, In utroque iudicio & Medici iudicium suspensum, & insignis cuiusdam malignitatis venenae, in ipsis corporis penetrabilibus progenitae, suspicio saltem relicta fuit, quae quomodo tam brevi temporis spatio omnia viscera contemperit, & ad vitæ confirmationem inepta reddiderit mirum est, cum antea semper agrotans humilitate & robustissime fuerit constitutus. Dabam Geneva die 17. Martii 1675. Ex amica communi amica. *Excelsior, & Clarissimus Dns. D. Ludov. Hermannus Combach. aulae Hafniae Medici.*

Post exacerbationem capitis dolorem &c. Inter notas capitis doloris per consensum affligentis hae praecipuae est, quod ad affectum partis primario affectu ingravescat. Notandum tamen aliquando fallacem esse hanc regulam. Cum fieri possit ut capitis affectus, seu alterius loci, cum alterius partis affectu invalescat, & cum eo levetur, nec ideo ab illa parte per consensum afficiatur, quandoquidem fieri potest ut ea eodem loco seu fonte, materia in plures partes divisa simul induat, & in parte mientem nulla dolor, nec aliquis affectus se exteras: Sic Agellii filiae (6. Epid. 3. 4.) cum doleret coxandis, asthmae premebatur, dolore sedato, cessabat etiam fulgurium: Et cum nullus daretur consensus inter coxam & pectus, suspicandum fuit ab eodem loco in utramque partem humorem conflueret, & eodem etiam tempore dissipari: In enixa autem fortis est conjectura ab uteri ligamentis coxodolorem, & asthma a pectoris cum utero consensum provenire, & maxime non bene locuti expurgatis, quae utrumque affecum producebant, hinc verisimile est utrumque accidens etiam quiescente lochia expurgatis: Ut erus enim, maxime in enixis, omnium majorum laetioris est.

Tremores artuum, contractions subsistentur &c. A diffusa serosa colluvie in cerebro ad nervorum principium, hinc ad totum propagatus: Saepe numero vero accidit, ut circa coxae doloris effectibus propagationem, hic una in loco excitatus in altero sentiat, ejusque effectus per totam animam diffundatur: Ejus vero productio (juxta Cl. Willis) in hoc consistit, quod fibrae nervae à quodam incongruo, & valde disproportionato, irritantur plurimum & ab invicem divelluntur, proinde ut spiritus in iis scarantes mora detrahantur, & ab aequali sua expansione correpti in confusionem agantur: acrimen doloris sensus efficitur, quatenus illa spirituum perturbatio undulatione quadam per ductus nervos, ad commune sensorium, scilicet corpora striata delata, spiritalia ibidem confusos in pacem distractionem concitat; cujusmodi affectio, ulterius ad cerebri medullam pergens, imaginationem commovet, indeque mox reflexa, per totam spirituum hypostasin molestantem sive inquietudinem quandam diffundit.

Tremor, palpitatio cordis, tremores artuum &c. Quomodo tam varia symptomata à serosa colluvie in cerebro residuae oriuntur, ostendit Cl. Piso sect. 1. pag. 1. cap. 1. lib. de morbis à sero: Ita sane statuendum, ut, aequam in capite residens, & suisque deque à repentina ambicris commotione, concepto veluti fervore agitata & longe lateque desipulantem, primo membranas cerebri impetere, violentaque earum distensione dolorem insignere, quoad bullitio ipsa sensum conquiescere incipit per se, perturbatione ex-

terea parietes sedata, tum eandem sive sponte sua, sive compressione membranarum excussa, partim per paratam viam in qua in ventriculorum decumbere, partim in nervi scari parit principium decurrantem, implentemque ac distendentem, viscera & partes abdomine contentas contrahere atque convellere, non sine acerbo quodam dolore, partim denique in meatibus cerebri sensibilibus irritare: quare exarando illo varias in partes motu, diversâ symptomata paucis intra horas inferre, scilicet dolorem capitis hanc vellulam partem vellacientem, vomitum aquae & bilis, dolorem alterius hypochondrii aut utriusque: Quoniam vero convulsivos illos motus capitis dolor praevenerit semper, hinc elici potest caput per idiosyncrasiam laborare, reliquias partes per consensum.

Ventriculus autem coloris viridis, in quo materia quaedam &c. Hinc capitis doloris causa accedenda videtur: ab elato scilicet vapore ea materia membranarum cerebri percellente: Sed habet vulgo receptam hemicraniae causam, à bilioso vapore deducit, impugnat Clar. Piso allegato: Si namque à vapore & bile in epae fermentata commotumque elato, hemicrania semper exoritur, quid causae est, cur vel in principijs paroxysmorum febrium tertianae generis, & praetertim erysipelas initio, hemicraniae agnos non vellac ac pungit semper. Evidens cum erysipelas si quia alias tumor sit frequentissimus, isque cum bilis fervore necessario conjunctus, ut vomitus biliosus, bilialis erupio praeter sebum indicant, tamen cum, quamquam in faciem bilis imparet, hemicraniae non conjungi unquam, & caput condolere capientia quotidiana docet:

Multa etiam. Cephalalgia cum vomitus accedit, causa in plurimum ventriculo aut subditi visceribus adscribitur: hanc contra idiosyncrasiam statuit, laudatus Piso, vomitusque habet rationem statuit. Nimirum, inquit, dum membranae capitis in excutiendo sero molesto sponte consulantur, peritonaeum certe ejusque loboles omnes una quoque convellantur oportet: itaque quoque velicam cholelecbum convulsam, bilem in ventriculorum exprime effundereque necesse est, quae actum in ventriculo patitur quoque convulso, aut etiam sponte resupinata, per bilis irritationem vomitum simul cum aqua & capite deorsum floente restitit: Certe cum aliquando meningem cerebri in hemicrania, & praetertim in ipso vomitu contractionem perferit, ut manifeste cranium à seipso divellitur, utraque coronalis aperit nihil propemodum videretur, non sine atrocissimo dolore: tum quippe ventriculus, tum sponte, irritatus scilicet à bile, sursum moveatur, tum quasi per vim, per sympathiam membranarum cerebri primo contactum, sursum trahitur, & tractus offendens aquam & cere distillantem, eam inter dilabendam in medio cursa circa proprium orificium, necdum in fundum delapsam abripit, cuius argumentum est salivatio crebra, jamjam instantem vomitum praenuntians: Nam quod ventriculus à contactu cerebri membranis visum convellatur, aliquatenus luculenter demonstrant convulsi & evidentes totius abdominis dolores qui in me hemicraniae succedere, sed in aliis eandem comitantur.

De Doloze Capitiz.

OBSERVATIO XXXII.

Capitis debilitas à copia feri inter meningez collecta & in ventriculis.

Eminent. Cardinalis Catarrhis obnoxius, aliquam capitis debilitatem advertit. Cranio mortui aperto plusquam libra feri tenuioris inter meningez collecta cernebatur, quò rurgida pia mater solitam crassitiem quater superabat. Eodem sero, ventriculi erant repleti. *Vide lib. 2. Tit. de pectoris dolore.*

OBSERVATIO XXXIII.

Capitis dolor à maxima collectione serosi humoris inter duas meningez.

Dom. S. (*Tit. De morte sabia*) De capitis dolore Gravativo diu conquestus est: Ablato mortui cranio, inter duas meningez deprehensa serofozorum humorum extraordinaria collectio.

OBSERVATIO XXXIV.

Cephalæa à sero largius meningibus affuso, copioso in ventriculis.

Victor (*de quo Tit. de Paralyfi*) assidue caput doluit; comite nonnunquam vertigine: Discissa mortui dura meninge plurimum feri sub pallidi effluxit, quod in spatio inter utramque meningem continebatur. Hujus quoque feri plurimum in omnibus ventriculis repertum fuit.

SCHOLIA.

Cephalæa à multis annis propemodum continua, totum caput occupans, & quandoque cum vertigine juncta, potius sero meningibus largius affuso, quam sanguini intra arterias illatum, ob motum impediri stagnanti, vel flacibus meningez distendentibus attribui potest, cum à sanguine pulsans dolor exciteretur, qui nec tamdiu, nec iam continuo, citra graviozorem oozam toleratur: A flacibus

vero tensivus, & brevi evanidus produceratur, & plerumque citra vertiginem, cum medullam, splicum animalium sedem, non attingant, nec intra meningez diffusis spiritibus permisceantur: Et revera serum hunc effusile ex scissione constitit, quod copiosum inter utramque meningem, & sub tenui intra anfractibus repertum fuit. *Job Jac. Westens Enxica, de Apopl. p. 378.*

OBSERVATIO XXXV.

Capitis dolor à cerebro aqueo humore copioso irriguo, & Tumore globoso in parte interiore.

Gallus quidam Doloze capitis correptus est, mox sequuta febris, qua cessante cephalalgiz reliquæ nihilominus remanserunt cum vigiliis & capitis imbecillitate, &c. Invenimus cerebrum aqueo copioso humore irriguum: Præterea inventos globos quidam glandulæ instar inclusus in cerebri substantia. *Vide Tit. de oculorum affectibus.*

OBSERVATIO XXXVI.

Capitis dolor abaqueo & pituitoso Sanguine plures cerebri partes occupante.

Mulier febre ardenti cum capitis dolore correpta est, manum capiti admovebat. Aperto capite effluxit aqua loturæ carniū similis: Tenuis membranæ & plexus choroidæ vasa aqueo & pituitoso sanguine surgebant: uterque ventriculus aqua plenus. *Vide Tit. de Delirio.*

SCHOLIA.

Plexus Choroidæ velæ aqueo & pituitoso sanguine surgant. Non defecit antequam ad cerebrum delatus sit: Arteriz enim (ait elegantè Exa. Ruffinus diff. *for. Anat. lib. 6. c. 36.*) sanguinem ex chylo natum, ado-

lescentem & vix juvenem, ex sinistro cordis haurientes venniculo, & deortum vehementes, in Lienem deponunt: ut munda melancholica; in liem munda; in Rentes munda; & munda; Sursum vero ut quædam in pituitos;

pluviosa: Debit omnino alimentarius sanguis, singulas, in partes deferendus, suis spoliis scoriari, imprimis vero cerebro cessans in alimentum: purus hic esse debebat: *ut patet*, ideo in vestibulo mundari

debebat scorsim positis inquinamentis & recrementis ablegantur ergo illa per exocidii internae tamum ceteriore ad spongiosas narium, palati, faucium, oris partes omnes, glandulas maxillares, ipsam etiam linguam.

OBSERVATIO XXXVII.

Capitis dolor cujus nulla alia in corpore causa deprehensa quam bilis cystium felleam distendens.

Bilem subfuscam in vesica fellea, hanc distendentem, in puero aliquando cephalalgie fixissimae & paraphrenitidis, subsequente tandem sopore, mortis causam fuisse repert, nullo ad sensum vitio in cerebro animadverso. *Jac. Wesperus exercit. de Apopl. p. 435.*

S C H O L I A.

An forte redundans bilis vas conclusa, in conspectum oco veniens, doloris auctor fuit? Cystis sane nimis turgida non fuit capax majoris copiae nec à massa sanguinea bilis ulterius secretendae, ideoque

cruci confusa ad cerebrum delata est, quod videtur innuere paraphrenitis à bile in vas turgente ortum dicens.

* *

OBSERVATIO XXXVIII.

Capitis dolor à bile meninges suffundente, & liquore inter eas contento.

Ictericus (de quo lib. 3. Titulo de Ictero) Capitis doloribus continuo infestabatur. Cadavero aperto, cranii exterior superficies flavens deprehensa, ossis frontis interior superficies colore flavo infecta, ceterorum non item. Dura meninx flavescens, ut & liquor sub ea conspicuus, cujus (apor non erat notabilis. Tenuis meninx minus flava. In ventriculis, liquor satis copiosus, limpidus, subfalsus: plexus choroides valde glandulosus, &c.

S C H O L I A.

Hic moveri potest dubium, An bili adscribenda sit doloris causa, quandoquidem Icterici, quorum habitum inficit bilis, indolentes eam ferunt, vix de praeleu queruli? An id membranarum calimo sensui imputandum, qui exquisitior quam io cure, ex parte tantam membranosa? An ab occurru aëris ex-

terni hebescit bilis, retunditurque ejus aculei: Quia membranas cranio investitas percingere nequit? An quis hae densiores, minisque quam cutis poris pervix acutius bilicem cohibendo gravius ab eo afficiantur?

OBSERVATIO XXXIX.

Capitis dolor à vaporibus vel flatibus piam matrem distendentibus.

Saepe vidi in capite recens post mortem aperto, Piam matrem vesicæ instar distentam ac pelluentem, ut aqua plurima subtus inclusa eadem intumescere videretur, quod tamen omnino fieri compertum est à statu membranam distendente: ipsa enim dissecta, sine lymphæ effusione, tumor illico subsidebat. *Thom. Willis Anat. Cerebri. cap. 8.*

S C H O L I A.

Vulgatis opinio est quod acres & terti vapores à visceribus imi ventris, ac imprimis à ventericulo, hypochondriis aut utero elevati, hanc membranam fassant, adeoque eam dolore percellant: Nos autem, licet impossibile hoc dicamus ut vapores tot viscerum ac ossium interstitia ac obices, sine molesta quavis penetrantes, unquam ad caput perveniant, etque noxam inferant, verum tamen haud inficias imus quia à sanguine intra cerebri confinia zeltant, interdum effluvia vaporosa procedant, quæ sub pia matre concluduntur, ac velut in submaggeta, eam valde inflant ac distendunt, adeoque dolore afficiunt. *Idem ibidem.* Vide Notas ad cap. de dolore cap. à venis aëro sanguine turgentibus.

[*Idem*] Materis dolorem capitis faciens est vel

vaporosa vel humorosa. Hæc potest esse alimentalis vel excrementitia, biliota, puviosa, vel melancholica, sero permixta: Imprimis autem & sæpius alimentalis, atomis biliosis, pituitosis, melancholicis & ferrosius fuctis: Vaporosa dolores excitat lentivos, flatus enim distendunt: Audito nomine Vaporum, non intelligendi illi præcisi & separati ab humoribus, sed coijuncti, ita ut potius sint vapores & tenuissimæ sanguinis exhalationes, membranosis capitis partibus communicare: Vix vaporosi hujus sanguinis sunt arteriæ, ex certis partibus vel toto advenientes corpore, quod sic exprimitur *Arteria cap. 1. Sola si opturatum properea quæ arteria afferunt capiti vapores fraudulentes.* Arteriæ, cum ductibus aliis, turgide sanguine factæ, per ramos & *impingunt*, nauseabundam super e vomitionem

vomitionem quandam tandem emittunt: Venæ La-
braed cor adheſcentes, per arterias ex corde emit-
tunt vaporem cum ſanguine chylum: Ductus

lymphatici officio ſuo non exacte defutientes o-
perâ conjungere poſſunt, ſal-
tem.

OBSERVATIO XL.

*Capitis dolor à Pure inter Piam matrem & Cerebrum contento, illuc ab inflammatis
Pleura & Pulmonibus delato.*

D Omina de Chalange, Brito-Galla, Lutetiam venit Medicorum conſilium contra Fluo-
rem muliebrem expetitura; Paucis ab adventu diebus magnus eam lateris dolor pre-
hendit, comite febre: Dom. D. Magni, Duretus, & Reboursus convocati fuerunt, qui pleuri-
tide & peripneumonia ſimul cum affectum judicarunt: Quamvis eodem tempore fluere ne
menſes, præſcriptus tamen chlyſter, nec non ſanguinis miſſio, quam ægra omnino tenuit:
Poſtredie, morbi ſeptima, quod ingraveſcerent ſymptomata, phlebotomiam admittit Dom.
Duretus bis ſingulis diebus illam viſitabat, prædixitque ſi ſuperveniret capitis dolor cum
pruritu, mortem ſequuturam, tranſlata ſcilicet materia peripneumoniam efficiente ad cé-
rebrum: Poſtredie dolor capitis cum prurigne ſucceſſit, pauciſque poſt horis interijt.

Quarta aut quinta ab ejus obitu die, Ego, Domini Reboursus & Viardus, Sacrificuli ca-
daver aperuimus, pleuritide & peripneumonia complicatis interempti, cui quoque acceſ-
ſit humoris facta eſſet à pleura ad caput metatatis: Dempto cranio, omnia pure reſerta
comperta ſunt, intra piam matrem & cerebrum, ut in prædicta matrona, concluſo: *Ambr.
Parus Oper. lib. 24. cap. 63.*

S C H O L I A.

V ulnerebus capitis abſceſſum lecoris ſæpe con-
tociant, pure à cerebro illuc delato, oſtendi ſu-
mus lib. 4. Tit. de vulner. capitis: Quod autem facilius
illi ſit deſcenſus quam aſcenſus, diſqueodium per
quas vias in cerebrum inſerit: Veriſimile eſt illud
abſceſſe à ſolio tramine, diſmiſſique arterie tracheæ
bronchiis, Venarum Pulmonalem ſubiſſe, è qua tum
in auriculam, tum ſiniſtrum cordis thalamum inſulum
fuit, hinc in auriarum magnam, poſtmodum per ejus
propagines in cerebrum, ubi depoſitum Dolorem
capitis cum pruritu, ob acrimoniâ, produxit: Mo-
bilitatem autem puris, ſiut cocti, obſervare eſt in

urinâ purulenti; concuſſa enim leviter phiala, illico diſſiliſcuntque remiſcentur lotio; quo indicio à
picuita diſtinguitur: Inſignis autem tenuitas argu-
mentum, quo denſiſſima queque, hydraggi inſerta,
traicit, vidi in Paſtore quodam Dionisii Beaneoli,
cui ab abſceſſu in Ducto neglecto, nec tempore
aperto, ſphacelus abortus eſt, pure pulmones ob-
vante, quod copioſe exſpuerat, nil tibi ſimili me-
tuens: Exitum inſtans cum uxori prædiſſim, con-
viciis exceptus ſum, ſed mox poſt idem locum
oppreſſus, à temere emiſſi prognostiſti erroris
vindictam.

OBSERVATIO XLI.

Gravado à pure ad os ethmoides delato.

Quidam vulneratus in occipite, ſuccedente rima patente & cæca; male à Chirurgis
tractatus, die 9. febris occidit, xl. moritur? Aperitur cranium, & inter ſecandum co-
pioliſſimum pus ex naribus rejicitur, *materia per vulnus expurganda ad os ethmoides delata;*
unde etiam de *Gravatione ſupra nares* conqueſtus fuerat. *Vide l. 5. Tit. de vulneribus.*

S C H O L I A.

Materia ad os ethmoides delata Inſigne cerebri
emorrhodium, quo obſtundendo pus cohibendum
ſuit: Accidit interdum obſtundio meatuum per quos
excrementa cerebri expurgantur ſalubriſſimæque halitus
exeruntur, à qua dum retinentur intus, ſua mul-
titudine aut qualitate capiti offendiſſimè pariunt. *Ran-
delius Praſt. cap. 5.*

De gravatione ſupra nares Per Gravationem hic in-
telligi non tenis & incocti humoris per nares cur-
ſum, ſed gravitatem vel ponderis ſentiam circa ſum-
mas nares, illi ſimilem quem patiuntur coryza afflicti.
Sed ſi bicenna & mucos, humor viſcidus & renax,
per os ethmoides viam ſibi parat: Cur pus, ſumma
remittente partium, & perveniendi vi inſigni, illuc
exitum non quaerit? Hoc ſavere videtur ſenten-
tiae Clariffimi Roſſignii, abſcedendi & aliorum, qui

impervium illud iter ſtatuunt, nec per os ethmoides
quicquam tranſmigrare, quantum amplius poris ca-
teat, exiltimant; Quæ per nares exiunt arteriarum ad
cerebrum reudentium eſſe inſeruiſſimæ & eſſeſſimenta
à maſſa ſanguinis ſecreta, quo ſi potius & deſecratio
eo ſecatur. Obſtacle illud Hippocrati, *Capitis delatum &
circumducenti, ſanguis per per aures aut nares exiit, morbi
ſoluto*, aph. 10. l. 6. iterum, Quo ſubſtatio alterum to-
liunt, id illius eſt cauſa; Si pus per nares excrementum do-
lotem capitis ſolvit, id huius cauſa ſit rat & ex cere-
bro prodit: Si ſtabilitatem Clariff. Viatorum doctri-
nam velis, dic, Pus illud ſanguini reſiduo à nutu ione,
cerebri & reducendo permaximè per venas, ad illas
partes derivatas & hiantes exitum habuiſſe. Demum-
certum eſt purgationem in cerebro, citra vomitum
concurſum, sæpe contingere, cum ſcilicet in canali-
bus

bus, seu fulcis duræ meningis, præter naturam cohibitus, & restagnans plus justo sanguis incalescit, inflammationem concipit, & tandem in pus abit, ab-

scellus alterum genus continet; hinc cruci ad cor revehendo commiscetur.

OBSERVATIO XLII.

Capitis dolor à pure supra membranas & cerebrum effuso.

Quidam leviter vulneratus media capitis parte, tribus post mensibus incolumis vixit: dolor postea capitis subortus in loco vulneris inflicti, &c. Secta calvaria pus supra membranas & cerebrumprehendi. *Vide l. 4. Tit. de vulneribus.*

OBSERVATIO XLIII.

Gravis circa oculum dolor, puncturam ossis temporis sequutus; ab ingenti puris copia inter membranas & cerebrum.

Vulneratur quidam punctim circa os Temporis, sequitur gravitas quædam intolerabilis circa oculum partis affectæ, Inter membranas & substantiam cerebri ingens copia puris, libræ civilis unius pondore, reperta est. *Vide l. 4. tit. de vulner.*

OBSERVATIO XLIV.

Capitis dolor vulnus sequutus, aputredine induc'ta dimidia cerebri parti; Pure & aqua in ventriculis.

Quidam ab equo vehementer in capite percutitur: Ab initio conquestus est de capitis, præcipue de colli intenso dolore: Inventa putredo dimidiæ partis cerebri: In ventriculo tertio plurimum tum puris tum aquæ, subrubro colore tinctæ vidimus. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XLV.

5. Capitis Gravitas ab abscessu & pure in anteriore cerebri parte.

Mulier quædam aliquot diebus capitis gravitate laboravit, quæ succedente somno, post febre obiit: Capitis cranii osse sublaro, abscessus in anteriore cerebri parte reperiens, & pus interiori ossis cranis parti adhærescens &c. *Dodæus observat. med. cap. 7.*

S C H O L I A.

Capitis gravitas] Dolor capitis gravis *capitis* dicitur: Gravis autem Dolor, Barbatis Gravatus, dicitur cum ager veluti ponderis loco affecto incumbens sensum percipit: Provenit hæc doloris species à causa in membro per se sensu destinato, membrana involuto, qualia membra sunt Epas, Lien, Renes, Pulmo; Nam si tale membrorum parenchyma,

vel inflammatio, vel abscessus, vel calculus, vel humor occupet, etsi ipsa caro visceris non sentiat, tamen dum ambiens membrana tenditur, aut deorsum trahitur, sic inde dolor talis gravis: In cerebro ejusmodi dolor fit à pituitosorum humorum copia, à plethora, abscessibus, puris copia &c.

OBSERVATIO XLVI.

5. 1. Capitis dolor ab abscessu seroso, natibus cerebri & infundibulo adherente.

Puella 12. annos nata, temper. pituitoso & pingui habitu prædita, maximo dolore fixo verticis laboravit per quatuor menses: Vocatus ad ejus curam, eam ferè inveni sine febre sed omnia alimenta rejicientem, aqua autem sola cum saccharo per multos dies vitam traduxit: solum de dolore suture coronalis conquerebatur: Frustra fuere omnia remedia: nullus aderat tumor vel rubor: Tandem mors finem miseris & doloribus imposuit:

Aperto capite, omnia optimè conformata & sine corruptione (præter spem tamen) reperiuntur: existimaveram enim pus copiosum latere, præcipuè quoniam paulò ante obitum per oculum dextrum aliquid purulentum amisisset: Sed cum de causa agnoscenda desperaremus, dum curiositatis gratia Rete mirabile & alias partes Chirurgus discipulis suis demonstrare voluit, digitis abscessum rupit, natibus & infundibulo cerebri inhxrentem, ex quo statim aqua clarissima cum impetu & ad libras duas exivit, quasi è fonte scaturiens & in alium profluens.

SCHO-

S C H O L I A.

QUO pacto contractus fuerit ille abſceſſus, vel ſpecies hydrocephali, facillimum eſt dicere: Pituitaria enim glandula, pituitam tanquam aqua ſpongiam alliciens & coacervans temperamento juncta pituitato puella, calorique debili aquas cumulat: Serum vero è venis tranſcolatui potuit ibique coacervari: Præterea, ex Hippoc. Caput eſt humanorum morborum radix & pituitæ metropolis: Non parum ad morbi generationem conſulit quod 3. ant. 6. ante morbum menſibus, ſcabiem capitis palſa erat puella, ad cuius curam Monachi quidam repellentibus & unguentis frigidiſiſi fuerant, unde caput refrigeratum & ſetolares cumpluræ, cauſæque morbiſica, palindromia facta, intus tepida eſt, calorem manalis eſo ea materia extinctus: *Petrus Borellus cenſur. l. obſervat. 37.*

Dolore fixo venioſo.] Plures deinceps vidi à doloribus verticis fixis cruciatis mulieres, quas phlebotomia venæ rectæ frontis, vel tauſilium, cucubitalis ſcarificatio, apoplegiæmaximæ, erubina, cephalicis, hidroticis & purgationibus levavi: vidique uxorem Advocati, quæ ex dolore diſtorta, ſemperque hoc pro matricis ſympſomate à Medico ordinario accepto, tandem obiit, quam tamen exiſtimo hiſ remediis curat. i potuiſſe: Semper tamen ab hoc fonte dolor ille ortum non ducit, mulierem enim vidi quæ de ingenti capitis dolore fixo & in minima circumſtrentia conquieſcit, nec S. M. nec veſicationibus aliisve levavi potui, quæ tandem multis veſiculis ipſæ obortis curata fuit: Aliamque quæ tumore in fronte nato apertoque, maximam puris copiam effudit, ſicque curata remanſit: In alia nihil ex hiſ profuit, ſed ſiſione cunctis celebrata, vermes latentes reperti ſunt à quibus preceſſebat dolor, quibus detractis fuit curata. *Idem obſervat. ſiquæ.*

Præter ſum ſancti.] Caveat Medici prædicere

§. 2. Puella annorum circiter octo, filia D. Lefortii Aramaropoliæ Genevenſis, per plures annos de gravitate capitis conquieſta eſt, & ad obitum uſque: Obiit autem à frequenti ſyncope, inducta à lumbrico oriſicio ventericuli affixo.

Reſerato capite, quo pareret cauſa pertinacis illius capitis gravitatis, inventus eſt mædio in cerebro abſceſſus ſeroſus, ſive cysſis ſero reſerta. Anno 1659.

OBSERVATIO XLVII.

Capitis dolor ab abſceſſu ſaniſſo circa nervum opticum, cum glutinoſa & pellucida aqua.

SODA Subethica puerum corripuit & interfecit: Diſſectio corporaſculo in media parte cerebri ſiniſtri, ſupra oculum, prope nervos opticos, ſinus apoſtematis, caſtaneæ magnitudine, vacuus deprehenſus: Erupit præterea clara & mucilaginosa aqua. *Vide Tit. de Soporosis affeſſ.*

S C H O L I A.

SODA ſubethica.] Capitis doloris cum propenſione ad ſomnum, cauſa ſtatimur pituitosus humor in cerebro redundans & torporis è ſpiribus animalibus inducens: Iſtus Soda cauſa fuit abſceſſus in media parte cerebri ſubſtantiæ ſiniſtræ genitus, ſpirituum animalium liberum excreſcent, imo generationem ſpædiens: & ſegnitiam vel torporem functionum animalium ſimul inducens, ut in Equite Bonecurio, de quo infra Tit. de Soporosis affeſſibus: Id vero adnotandum de cerebri pituitosus humoribus obſeſſo, quod monet Zuſchov conſule. 72. fieri ſcil. poſſe ut in tali ſtatu vigilat ægro ſine moleſtæ, ſi ſcil. pituitosa excrementa ſtatim cum gignuntur, concitato motu delabantur & caranthum excreſcant, præcipue ſi cerebri calor natus abſumtus ſit & cerebrum ſecundum ſubſtantiæ exſiccaturum.

OBSERVATIO XLVIII.

Capitis dolor à vomica in cerebro, ſequuta oſſis frontis fracturam.

NOBILIS duo vulnera accepit, unum in fronte &c. Cum utrumque pene conſolidatum eſſet, præter expectatum moritur, 4. ſeptimana ab iſis acceptis: Toto illo tempore conquieſcit.

stus fuerat de ingenti capitis dolore, non fixo, sed qui vicissim modo in fronte paulo supra supercilium, modo in supercilio affligeret, &c. Ablata superiore cranii parte usque ad aures & dura meninge, profuxit subito per aurem dextram magna sanguinis vis: deprehensum etiam vomica in contigua cerebri parte latuisse &c. *Vide l. 4. Tit. de Vulneribus capitis.*

S C H O L I A.

HUIC capitis dolorem ab ea vomica ortum habuisse certum est, quæ tenui meningi intus proxima erat & fibris etiam alligata, unde non poterat non ei summe molesta esse: De origine autem istius vomicæ consule locum signatum. Ab ea proculdubio sa-

nies tenuis decisa doloris istius non fixi, sed vicissim modo supra supercilium, modo infra molesti, causa fuit: imo forte effusi sanguinis, per autem dextram manantis, cortoso aliquo vase ab illius acrimonia.

OBSERVATIO XLIX.

Cephalalgia ab abscessibus in processibus mammillaribus, Erosione ossis Frontis.

I Hualdus de dolore capitis quæritur, post occurrat: præ mali vehementia & diuturnitate interit. Reperti sunt abscessus in processibus mammillaribus: Os frontis erofum erat & perforatum vi humoris. *Vide oculor. affectus.*

OBSERVATIO L.

Dolor intolerabilis & fugax ad frontem & tempora, ex abscessu in media cerebri parte.

V Idimus in Nobili Viro Villanovano, cum media cerebri pars ob ictum concussa foret, unde statim abscessus ea parte altus, conceptus ac nutritus est, conqueffum illum de intolerabili dolore, eoque fugaci, ad usumque tempus & frontem, cum tamen ea parte non foret abscessus. *Ballon. lib. de Convulsion. p. 27.*

S C H O L I A.

D Olor ad utrumque tempus & frontem] Unde id? Ex-culla vi naturæ portuocula tenuis sanici à m-a-jore quadam mole paris, medio cerebro contenti, de-secæ & manantis: Et talis sanici implacabilis dolo-res excitabat, convulsiones alioqui, si in ventriculos cerebri immigraffet, provocatura: unus enim & idem humor varia edit symptomata pro variis parti-bus quas obidet & occupat: *Idem ibidem.*

Abscessus conceptus &c.] Cerebrum quia sedes est si-gidi & humiditatis facile nō inflammatur ex Hipp. sententia: In partibus carnosis & humidis facile & in-flammatio & caner, ab atra & adurente bile, concipitur, non autem facile in cerebro, quia temperamen-tum siigidum & humidum resistit. *Idem ibid.*

Intolerabilis dolor eoque fugax] Fugacis doloris, i. e.

Desultorius nec certo loco consistentis, sed modo hanc modo illam partem in uno latere læ essentis, altera in-columi & in altera, ab humore extra cranium consulen-te, indigne exemplum tradit *Holdann. cent. 4. observac. 6.* Pertinax fuit, æque per annos 21. in dextra capitis par-te, mox circa mulcicum temporalem manifestus, mox circa partem extremam auris, aut ipsam mandibulam inferiorem, aut oculi partem inferiorem, vel labium inferius, vel superius &c. sevens, nunquam dimi-diam partem faciei transgrediens: Ictus fuisse omnia medicamenta, ipsa etiam narcotica frequentes exhi-bita & adhibita; soli setaceo cedens, sed bimellici tan-tum ab ejus applicatione, qui meo judicio vesicatoriorum efficacia citius fuisse sublatum, cum humor acris & copiosus copiose exstillet.

OBSERVATIO LI.

Circa Tempora dolor ab abscessu in cerebri penetralibus, vulnus sequuto.

D N. catapultæ ictu circa tempus dextrum læsus est insigniter, occaluit tandem pars longo tempore: Cum vino Venerique indulgeret, dolor in veteris vulneris loca obortus est, mox in parte antiqua sevens, mox in alteram partem velut desultorius re-diens: comatosus factus, mors.

OBSERVATIO LII.

Capitis dolor ab abscessu purulento & fetido.

O bſervavi quendam ex diuturno capitis dolore, longisque vigiliis afflictum, tandem levi delirio & convulsione correptum periisse.

Et aperto cranio inventus fuit abscessus cum pure admodum fortente & corrupto. *Sebaſtianus Nafus meth. Med. part. 2. quæſt. 16.*

S C H O

S C H O L I A.

Abscessu tam pueri.] Ino ipſum cerebrum Apoſtemari poſſe quidam aſſerunt, quod an fieri poſſit pluſibus Conſulimus tradit, Celeberr. Greg. Hoffmann operum parte 1. lib. 2. Obſerv. 4. exemplum adducit, Idem lib. 7. Obſerv. 14. ex Joh. Bugeo narrat Cerebrum apoſtematum ovi aſeruiſi magnitudine vi-

ſum, extra calvariam corruptum propendens, fermenti initia fermentans : Atque ſpecillo, in cerebrum ſiniſtri lateris apoſtematum introſiſſam oſque quo poſtica capitis pars attingeretur, nullum doloze inculiſſe, imo ne ſenſu quidem perceptum fuiſſe, argo cum ingentibus convulſionibus z. die intercurrente,

OBSERVATIO LIII.

Capitis dolor à gravi in cerebro abſceſſu, ſuppreſſionem ſaniet ex auribus manantis ſequitur.

Filia D. N. manantem aurem habebat, ſuppreſſum id quod effluebat, dolor inde capitis ejuſdemque gravitas : Nullis malum capitis ceſſit remediis, Mors, Inventus gravis in cerebro abſceſſus. *G. Ballonius Epidem. & Ephemer. l. 2. p. 270.*

S C H O L I A.

Manentem aurem habebat] Quam periculi plena ſit cohibitio manantis è cerebro per aurium meatum ſaniet, Vide infra rit. de *Aurium aſſeſſu* : Novimus Virum Clauiſſimum qui obruto capitis dolore diu vexatus fuit, nec tamen munia & officia publica intermiſit : Auris interim dextra ſanietem modicam effundebat, quæ vacuo dolore ipſo erat magis impetuenta : Ideoque eam cohiberi curavit : Vix ſuppreſſam ingens capitis dolor ſequutus, aſtonia, convulſiones, ad diaphragma pertingentes & tertio die mors : Si aperendi capitis fuiſſet poteſtas, proculdubio abſceſſus fuiſſe deprehendiſſet : Solutæ autem per abſceſſum ſaniet Hemispheriæ exemplum habetur apud Hoffmann Obſerv. 10. lib. 2. Sexagenarius inquit incidit in

graviffimum & diuturnum capitis doloze : Super- venit gravis auditus ac vehemens ſaniet interne dolor pulſationis, donec rupto abſceſſu purulenta materia per auris cavitatem profluere ac vehementiſſimum doloze terminaret : Abſceſſum autem capitis varius eſt eventus prout proximi aut remoti ſunt ab omiſſionis, qui enim ab iſis ſunt diſſini & inelmas cerebri partes occupant, necis propemodum omnis ſunt auctorit : ab aliis ſalutis petenda ſi vacuum ſit & *analogia* & materie copie analoga &c.

Suppreſſum quo effluat] Leithalis ſuppreſſio ſaniet ex auribus manantis vide exemplum apud *Marianum* & *Bartholinum* comm. in *Aurium de Exiculis* interius.

OBSERVATIO LIV.

Capitis dolor ab abſceſſu ſub cranio : Dura matris, Pia & ſubditi Cerebri putredine, parvo ſpatio circumſcripta.

Anno 1663. menſe Octobri, per ſeptimanas aliquot in Oppido Fenouillet, duobus milliaribus Tolofa diſſito, juxta Garumnâ, moram feci, Illuſtrem Priorem Collegii Sancti Martialis Tolofæ, educationi Nobilium egenorum deſtinat, curæ meæ commiſſum habens, cui lapidem ex veſica magno apparatu feliciter eduxeram : Interea oblatum mihi dives agricola, Claudius Bertrandus, dicti oppidi incola, annos 42. natus, de intenso capitis dolore prima viſitatione conqueſtus, partem anticam & dexteram ſub coronaria ſutura fatigante, quem ab inſolatione contractum aſebat, Solis radiis diu caput ſimplici pikeo contectum verberantibus, & nocte ſequenti ſub dio vigili traducta, unde poſtredie agritudo emerſit : Doloris capitis gravativi illico comites fuere febris ardens, nauſea, rigor, vigiliæ, anxietas ſumma : oculi coruſcabant & rubebant : Die v. acceſſit Phrenitis : Advocati in curationem Dom. Junſeria, Facultatis Tolofanæ Medicus Aggregatus, & Dom. Saporra, Granate, Oppido tribus milliaribus Tolofæ proximo, Medicinam faciens, qui remedia omnia ex arte præſcripſerunt : iſis tamen irritis nona die mortuus eſt æger circa quintam vespertinam.

Cum paulo ante obitum per os, narem & aurem dextri lateris, pus foetidiffimum efflueret, de capitis apertione cogitatio inedit, quæ ultro conceſſa eſt : Dempto ergo per me cranio, in conſpectum venit Tumor avellanæ magnitudine, qui adaptatus pus effudit foetidiffimum viridantis doloris : Dura & Pia mater putredine affectæ erant : Ulterius progreſſus ipſam ſubſtantiam cerebri ſubſtantiam habem paſſam & foetidiffimam deprehendi, quæ eaparte à me reſecta ad uſque ventriculum anteriorem dextrum : Doloris ſedes & circumſcriptio aſſis Galliæ magnitudinem vix excedebat : mirantibus D. D. Medicis & Mag. Johanne Daignebelle dicti oppidi Chirurgo perito, diſſectionis teſtibus : *Ex communicatione M. Bailly Chirurgi & Operatoris Genevenſis peritiſſimi.*

S C H O L I A.

Solis radiis dicitur caput &c.] Conservatur sanguis in capite vel ob plethoram in corpore redundantem; vel eo allestus aut impulsus, ut à calore Solis, balnei, hypocausti, vel clamore, tussi, ictu, casu &c. Ab istis causis caliditatem concipit majorem: In primis vero in morbis calidis, quorum symptomata fami-

liare cephalalgia est, ac præsertim in febribus, in quibus sanguis una cum spiritibus, tum in majotibus vas, tum in cerebro accenduntur: In pleoribus ergo febribus capitis dolor & hæc de causa, & ab evaporationibus molestus est; in quibus uti omnes corporis partes sic & cerebrum incalcescit.

OBSERVATIO LV.

S. I. De Capitis dolore ab Abscessu sub cranio latente.

IN vacuo illo spatio, quod inter Cranium ac duram cerebri meningem intercedit, inflammatur aliquando sanguis, suppuratusque in abscessum convertitur, cujus abscessus duo animadverti genera, ut sedibus, ita subiecto, seu materia & causis multum inter se differunt: Prior istarum suppurationum fit in canalibus, seu sulcis duræ membranæ, tum anteriori seu superiori, qui ipsum cerebri corpus, amplo altoque hiaru à se se dehiscens, sub ductu suturæ sagittalis, notabili interstitio aditque callosum corpus in duas partes separat: tum posteriori, quo in occipitis regione cerebrum à cerebello determinatur: In horum ductuum, seu canalium, alacratro, interdum verò utroque simul, restagnans sanguis, si plus justo caleseat atque inflammetur, tandem in pus abit atque abscessum constituit: Inflammationis istius occasionem ibi, uti in aliis corporis partibus, variz causæ præbere possunt: sed quum nobis propositum non sit speculationibus indulgere, nec quid fieri queat exquirere, sed qua facta scimus fideliter representare, reliquis omittit, de iis loquamur, quas ipsi observavimus, ubi iste morbus sese nobis obtulit: Fit igitur hæc inflammatio quando sanguis iste mulea falsa pituitæ admittance infectus, ac plusquam par est calefactus, amittit eodem tempore beneficium ventilationis per compages futurarum, aliosque cranii & circumjectorum corporum meatus isti officio destinatos, per vehementem subiti frigoris incurvationem densatos obstructosque. Largiori autem talis pituitæ in istam partem affluxu atque accervationi, obnoxii sunt qui per aliquot annos experti periodicam coryzam, seu catarrhale per nares profluvium, postea solenni hoc evacuationis genere privati sunt, eoque diu caruerunt: unde fit ut serosi ac pituitosi humores, istis temporibus pro solito in caput delati, nec consueti olim itinere foras protrusi, alias sibi vias molantur, ac postremo in prædictos duræ meningis canales regurgitantes, atque permixti sanguini, quem vel invenerunt ibi, vel secum detulerunt, effervescere eum faciant, ac majori quam antea ventilatione indigere: ut mirum non sit si defraudatus eadem tempestate, ob capitis perfidionem, transpirationis beneficio, exstiterit penitus ac inflammetur, & inflammationem, ut fieri solet, suppuratio subsequatur: Fit autem fere ista inflammatio ac suppuratio, non simul ac universum, sed sensim ac per partes, unde aliquando ægrius initio cognoscitur.

Cerebri functiones ac mentis sensuumque actiones, hoc morbo nequaquam vitiantur aut interpellantur, somnus duntaxat contumipitur, ac perpetuè fere vigiliz instant, ob doloris assiduitatem, qui non quidem dirus immanisque, admodum tamen molestus & cruciabilis, ac semper fere sui similis, noctu atque interdum, pari ferme tenore ægrum divexat: unde tandem febricula quoque, quæ primis diebus nulla, accersitur, appetitusque prosterneitur: Capitis à principio magna adest gravitas, ac si grandi aliquo pondere premeretur, & calor major quàm reliquo corpore: quibus omnibus signis peritus ac sagax Medicus haud difficiliter hujus mali conjecturam capere potest, idque à reliquis capitis affectibus ac doloribus discriminare: Omnem verò dubitationem illi eripit præcipuum hoc ac pathognomonicum signum, quod, uti in Empyemate pro decubitus ratione, pus modo ab intersepiente pectoris membrana, seu mediastino ad costas, modo ab his ad illam provolvitur, ita hic quoque materia vitiosa, pro vario capitis situ huè atque illuc impellitur, vel à fronte ad occiput, aut contra, si in canali illo sub sutura sagittali subsistit: vel ab uno occipitis latere ad alterum, si ibi stabulatur: vel utroque modo, si ambos canales occupavit.

Medicus si tempori satis advocetur, omnibus modis id operam dare debet ut ne ad suppurationem deveniat: Itaque sanguinem ex alterius brachii cephalica detraxerit copiose, idque repetet semel atque iterum, si vires ferant, iustis temporis spatii inter-

Interpositis : cucurbitulas grandes lateribus cervicis ac scapulis apponet cum magna flamma, fcecas primum dein scarificatas : Purgabit plus semel (injecto prius, si adstricta sit alvus, uno atque altero clystere) blandius primum, Senna, agarico, mechoacanna, Jalappa, gummi Gambodia, Mercurio dulci : deinde valentius, elaterio, colocynthide, diaphoraco, pilulis Coccis, turbetho minerali, prout quodvis istorum in rem praesentem aptius videbitur : ubi autem corpora non fuerint ferendis vehementibus istis, tota purgatio peragi poterit decocto concinnato ex beronica, salvia, majorana, roremarino, storchade, fenra, cnicu femine, agarico, turbetho, jalapa ; cujus vini terve haustus in diem exhibeantur, per tres quatuorve dies continuos : Interea non negligenda quoque topica, ablatis prius capillis : ubi summa cautione opus est ne nudatum crinibus caput novi frigoris incurtione amplius laedatur, atque ita malo, cui remedium quaeritur, vites addantur : In Topicis hic adhibendus delectus, ut & deveniatur refrigerantia insigniter ac repellentia, ne magis etiam impediatur transpiratio, ac materia impingatur : & valenter discutientia, ne calore immodico attrahat plus in locum laborantem quam discutiendo inde evacuet : Bene itaque faciet decoctum serpilli, verbenae, hederæ, betonicae, semen papav. albi cum oxyrrhodino & camphoræ momento ; admo- vendum tepidum in pannis, lanis succidis, aut spongis, post longam, sed clementem capitis frictionem ; ungendi à fotu olei rosacei ac chamamelini paribus portionibus inter se permixtis.

Quod si serius ad ægrum accesserit Medicus, aut omnibus ritè administratis nihil profecerit, nec suppurationem impedire potuerit, sciat de cætero totum negotium naturæ committendum, adhibita tantum diligentia nequid ab ægro fiat unde in opere suo interruptetur ; id quod sollicitè si observetur, solet ipsa toto negotio ritè defungi, ægrumque tandem in integrum restituere : Quippe puri jam percocto viam sponte quartens, idque per nares ferè expellens, sentim lithac evacuat ita, ut tandem nihil eius reliquum fiat : quod certum quidem ad salutem iter, tardius tamen ac molestius plenissimum est, cum in multos dies, interdum verò complures quoque septimanas, soleat extrudi : cujus temporis maximam partem plerique aut omnia symptomata perdurant, cum nulla aut exigua remissione : Quod si hac via se exonerare, aut omnino non tentaverit natura, aut ægri errore aliquo impedita fuerit quo minus id perageret, in summo discrimine res versatur, neque aliud remedium superest quam ut perforato in idonea regione cranio, frustuloque ejus exempto, exitus materię patefiat : quæ curationis ratio, si cum viro forti atque corporis bene constituti res sit, æque certa est ac tuta ac prior illa sponte naturæ suscepta, multoque breviori tempore patitur : Sin verò hanc quoque curationem aut ægri pusillanimitas renuerit, aut Medici prudentia, ob ejus imbecillitatem aliasve causas, non attentandam censuerit, omnino perniciosæ præ fortibus est, neque aliud quam certissima mors expectanda : Quippe vel sola doloris, vigiliarum, aliorumque malorum symptomatum affuditæ, ægrum tandem conficiet : & si hoc non foret, tamen aliunde etiam exitum imminet : quum fieri non possit quin purulenta ista materïa, intra cranium penitus conclusa, procedente tempore membranas ipsamque cerebri substantiam labefaceret, & novo atque atrociori morbo, ad priorem adjuncto, miserum ægrum jugulet.

Ex hac observatione discere obiter licet, inflammationem atque *suppurationem* neque in Tumorum genere necessario collocandas esse, uti vulgò ab omnibus fit Medicis : nec accidere semper parti alicui corporis, multò minus solis carnibus, aut partibus carnosis, sicuti acriter & verbosè à multis disputatur : quum clarè hic appareat eas in ipso per se sanguine, vel sincero, vel aliis humoribus mixto interdum consistere : cranium enim & meninx in hoc casu, non pro parte affecta, sed pro loco simpliciter continente haberi debent quod ipsum quoque locum habet in omni vomicularum genere, ad quarum classẽ pertinet altera Abscessus Hypocranici species, de qua sequenti observatione acturi sumus.

Experientissimus Medicus LAZARUS RISLERIUS, mense Aprili anni 1646. in observationibus à Petro Pacheco communicatis observat, 38. loquitur de tribus capitis abscessibus, qui omnes, si quis rectè circumstantias consideret, videntur inter cranium ac duram meningem constitisse : Quare etiam abscessus Hypocranici, à capitis contusione aut allisione facti, ferè lethales sunt, ut in omnibus illis tribus apparuit : Quo etiam referendum videtur, quod idem Medicus observavit 18. observ. Quotquot vidit ex casu per aures sanio- sum materiam eddere, omnes de medio sublato fuisse : Quum abscessus isti ab internis causis orti, de quibus proptie egimus lito capite, haud raro salutariter terminentur, ejus rei haud difficilis est pericis, conjectura. Arnoldus Boonius de Affect. omnia cap. 1.

SCHOLIA.

S *Presulatio huiusmodi*) Hinc collige ab *av-*
phor. acc. propria, aut hinc dignorum hanc tradidisse,
 non coequestrum tantum aut suppositione adstruxisse.

Suppuracionem interdum in ipso sanguine consistere, &c.]
 Contentantur Hippocrati, qui 1. de morbo mul. menses
 pusulentos evadere ait ubi duobus aut tribus menses
 moram fecerint, Idem asserit lib. de loc. in Coac.
 324. 324. 327. 342. Item lib. de Nat. Pu. *Est ubi, inquit,*
Sanguis quinquies aut sex mensibus in utero immoratur, ubi,
putrescens in pus vertitur, quod quibusdam per putredinem
extra fertur. Quod circa abscessum & ulcus coeque-
 tre certum est: Id & in urinis cernitur quae saepe pu-
 rulenta secum evchant ejusmodi abscentibus causis:
 Alvus quoque humores puriformes deponit in his quibus
 longae & maximi fuerunt menses necie obstru-
 ctiones: nam humores qui peccatum admittunt non po-
 tuerunt, tandem in mucosam vertuntur pus referentem.

tem: Idem in capite accidere verisimile est, atque hanc
 quadrate videtur aphorism. 10. sect. 66. *Caput dolens,*
& vehementer laborans, Pus vel aqua, vel sanguis per na-
res, aut os, aut aures effluens, verbum sinit: deinde rursus
verborum vehementer dolens, ut Abscessus in cerebro
suspicionem faciant, quasi circa illam causam pos in
cerebro gigni non possit. Melius *Circumdantibus* ver-
 bum id reddideris, quo dolos late diffusos & vaso-
 rum ambitu conclusos intelligatur, non secus ac aqua
 vel sanguis similem dolorem intrahentes: Revera ab-
 scessus cerebri ut plurimum funestus sunt; qui pericula-
 rum, declinant, id contingit quia si cerebri emunctio-
 nis proximi, naribus, auribus, palato, sique exigui,
 magni enim impati non feruntur, Fere autem do-
 lorem angusto cerneque loco cir-
 cumscriptum pariter, oostoto
 capite diffusum.

DE VOMICA HYPOCRANIA.

§. 2. Reperitur quoque alterum inter cranium ac meningem Abscessus genus, in dive-
 xiore capitis parte, ad alterutrum latus, secus ossa petrosa oriri fuerum, non ex sanguine
 cum alienis humoribus affatim permixto, uti illud modo explicatum, sed ex mero simplici
 (qualis in venis continetur) idque inter cystin propriam; cujusmodi abscessus pecu-
 liari nomine Vomica appellatur. Origo illi ab externa violentia, validoque capitis ictu
 aut allusione, unde rupta aliqua ex venulis cranium vel meningem perreptantibus, aut
 hanc illi alligantibus, sanguinem in intermedium spatium profundit; cui solet natura con-
 festim tenuia quadam ex ipso fila deproperans, ac undique retis instar circumtendens,
 iisque alia super aliis interfecens, ac obliquis quoque transversisque fibris omnia inter se
 firmiter atque archè ligans, eodem artificio quo membranae in utero semini genitali statim
 à conceptu circumdantur, parvo temporis spatio detexit firmum densumque folliculum,
 intra quem conclusus cruor, paulatim à statu suo demutatur, atque in pus excoquitur: hic
 Abscessus, seu folliculus pure plenus, semper una in sede stabilis permanens, quum neque
 evagandi spatium detur, ut emissis quoque quibusdam filamentis vicinæ meningi alligetur,
 efficit in eo latere, in quo consistit, jugem cujusdam ponderis sensum, ac molestissimum
 dolorem à compressione ac distensione meningis, cui à latere incubans, eam longius à
 cranio divellit, atque, ut sibi locum faciat, ad interiora impellit obnixam, inque antiquum
 ac naturalem statum redire semper adnitentem: Hujus mali, si omnia attente examinen-
 tur, cognitio haudquaquam difficilis est, curatio verò à Medico nequaquam speretur:
 quandoquidem cranii perturbationem, quæ sola ei succurrere posset; nullo modo hic
 moliri licet, ob ossis petrosi naturam constitutionemque, isti perforationi, variis de causis,
 cuius Anatomia perito sponte obvis, penitus ineptam: quod si ulterius in osse sincipitis
 eandem institueris, frustra ægrum excarnificabis; siquidem distantia, ac situs incommodi-
 tas, præpedient ne ullus inde ad extrahendum abscessum fructus capi queat: Medico
 tamen necessarius scitu hic est casus, ut si quando ei se obtulerit, possit exultimationem
 suam rueri, noscensque haud suæ opis rem esse, absistat vana, nihilque profutura cura-
 tione, ægrum torquere: cui hoc tamen in rebus incertis solamen superest, quod sicuti pe-
 stem in capite circumgestat, humanis præsidis omnino insanabilem, ita forte casu impro-
 viso, ubi Deo visum fuerit, aliquando ab eo liberabitur, id quod cuidam civi Londinensi
 haud ita pridem usu venisse compertum habeo.

Hic quum ad sex septemve annos ista ærumna laborasset, & plurima in Medicos, utpo-
 te in re hæcissima constitutus, erogasset incassum, cum vix quisquam, ut in affectu insolent-
 ti, exploratum haberet ejus malum, plerique verò ne tenuissimam quidem ejus suspicio-
 nem animo conciperent, quodam die dum in publico obambulat, illius est in aurem ejus
 lateris, in quo molestos illos ac diuturnos cruciatus perpetiebatur, grandis pila sive follis,
 quilibet per hiemem ac gelu, (erat ea tempestas anni) Londini aliisque Angliæ locis, in
 plateis ludere pueri consueverunt: Felix hic ictus suo impetu, ac capitis concussionem, rupte
 vomicae cystin, unde profluens affatim pus, viam sibi vi fecit in auris meatum, per quem
 copiose ac subito foras profluens, momento ægrum omni dolore liberavit, atque pristinae
 sanitati, tot jam per annos in omne deinceps ævum desperatæ, inopinantem restituit, &
 vixit

vixit postea incolumis valensque, nullis prioris mali vestigiis relictiis : quæquam cysti intrus relicta, sive ea post excussum omne pus, penitus exaresfacta & levissima effecta, defuit meningi molesta esse : sive ipsi sensim agglutinata, tanquam congener substantia, in unum cum ipsa corpus coaluit, sive alio quopiam modo oblitterata est. *Idem ibidem cap. 2.*

OBSERVATIO LVI.

Cephalæ à substantia quadam callosa in cerebro.

Diffectum fuit cadaver mulieris in Xenodochio Aquisi, In cuius cerebri substantia prope meninges, fuit reperta quadam substantia callosa in cerebro, quæ ea vivente perpetuè Cephalæ fuit occasio. *Iacobus Fontanus Pract. lib. 1. cap. 3.*

OBSERVATIO LVII.

§. Capitis dolor ab officulo duram meningem pungente, & abscessu purulento in cerebri substantia.

Rusticus phalango in palpebram superiorem oculi sinistri vulneratur. Hic ob immincentem capitis dolorem Chirurgum accedit ; Die vero 1 x. obiit : cranio aperto, interius orbita oculi ita erat læsa, ut officulum, in duram meningem dilaceratam imprimeretur : Sub tenui abscessu purulentus latitabat, &c. ; *Vide Tit. de Saporosis aff. ex Horfio.*

OBSERVATIO LVIII.

§. Capitis gravitas ab abscessu in anteriore cerebri parte.

Mulier aliquor diebus gravitate capitis laboravit, tandem adeo forniculosa facta ut excitari non potuerit : cranii osse sublato, abscessus in anteriori cerebri parte reperi- tus, &c. *Vide Tit. de Saporosis aff. lib. 1. Ex Dodonæo.*

OBSERVATIO LIX.

Capitis dolor, vulnus sequutus, à pure supra membranas & cerebrum effusa.

Quidem leviter vulneratus media capitis parte. Tribus post mensibus dolor capitis subortus est, loco vulneris inflcti, in quo jam ad cicatricem deducto, nihil aparuit. Secta post mortem calvaria, pus supra membranas & cerebrum apparuit. *Vide tit. de vulnerib. l. 4.*

OBSERVATIO LX.

Capitis dolor à phlegmone ingenti intra calvariam excitata; dura meningis inflammatione, puris copia.

Mulier in capite percutitur, relicto minimo ac contemnendo vulnere. Tertio die Dolor gravis sequitur, febris, &c. Ingens phlegmone intra calvariam inventa ; Dura meninx tumens, dura, livore affecta & ingenti puris copia suffusa. *Vide tit. de vulnerib. l. 4.*

OBSERVATIO LXI.

Dolor continuus à tumore juxta processum mammillarem.

Potest nasci tumor p. n. in substantia cerebri, quod contigit cuidam Damicellæ Dig- nensi ; Ei namque juxta processum mammillarem natus erat tumor ab humore tenui, bilioso, cysti concluso, à quo dolor continuus profectus ad mortem usque comitatus est. *Iacobus Fontanus Pract. lib. 1. cap. 3.*

S C H O L I A.

Tumoris insignis supra callosum corpus geni- nem præ mole sua inducens, *Vide Exemplum Tit. de Adenti supra.*

OBSERVATIO LXII.

Capitis dolor ab Hydatidibus obortis circa temporales arterias.

PVer præceps in caput ceciderat, inde domum delatus maximis cepit vrgeri capitis doloribus, tandem *apoplecticus* obiit, &c. Illi circa temporales arterias hydatides repertæ quamplurimæ, quarum pars incrassatis humoribus, atheromatæ, pars steatomata, alia melicerides referebat. Vide lib. 4. tirade vulncribus.

OBSERVATIO LXIII.

Capitis dolor à Tumore globoso in cerebro, Aqua plurima per id diffusa.

GAllus quidam dolore capitis correptus est, post cæcus, &c. evasit: Aperta calvaria invenimus cerebrum aqueo copioso humore irriguum: Præterea Tumor seu globus quidam adfuit, glandulæ seu strumæ instar inclusus in cerebri substantia. *Vide tit. de oculorum affectibus.*

OBSERVATIO LXIV.

Capitis dolor ob tenuis meningis cum crassa concretionem.

Iuveni (de quo Tract. de soporosis affectibus) Cranii superiore parte dempta, antèruius sub fronte, dura mater admodum rugosa apparuit, ac si ibi à flatu vel aqua distenta fuisset. Dura mater à crista galli utrinque juxta finem rectum ad sinus laterales incisa, vidimus in sinistro latere sub ossè syncipitis versùs tempus, duram matrem renui meningi, fere dimidiata leri amplitudine, præter naturam intermediis fibris validissimis accretam fuisse; ob quam concretionem sævam proculdubio diu cephalagiam sustinuit. *1. 1æ Wipferus Exercit. de Apoplexia p. 430.*

OBSERVATIO LXV.

§. Capitis dolor ab abscessu in meningibus post phlegmonem suppuratam.

Memini alium Academicum, qui postdiuturnam Hemicraniam, sub futura temporali per tres septimanas, cum perpetuo & gravissime assilgentem, in Apoplexiam brevi functam incidit.

Capite aperto Phlegmon juxta locum dolentem in meningibus accreverat, à qua demum suppurata & disrumpita, sanies in cerebrum decidens substantiam ejus livore & putredine affecerat. *Th. Willis Tract. 2. de Anima Brutor. cap. 2. p. 286.*

S C H O L I A.

In Apoplexiam incidit, &c.] Quamquam cephalalgia continua, (præsertim si in plures septimanas sine intermissione producat) periculo non vacat, attamen de curatione ejus non illico desperandum est, quoniam hujus causa, utur fixa, sæpe longo reme-

diocum usq, imò interdum sine illis, natura & tempore sanatur, utcumque in casu fere deplorato medicina quadam opus erit, ne præsens affectus in deteriorem, nempe soporolum aut velut convulsivum transeat. *idem ibidem.*

OBSERVATIO LXVI.

Frontis dolor astuosus, à cerebri & membranarum dispositione inflammatoria, sequuta puncturam membranarum & cerebri.

BRederus (*Vide hist. l. 4. Tit. de vulneribus*) vulnératus circa os frontis: Ar vero cum ictu isto cranii particula de lamina interiori omnino per meninges in cerebri substantiam transfusa esset, fieri non potuit quin paucos post dies pars læsa inflammationem pateretur, quam ob causam ingens æstus imprimisque capitis sublequebatur. *Greg. Horstius Tom. 2. l. 2. Obs. 1.*

OBSERVATIO LXVII.

*Cephalalgia à Tumore scirrroso membranæ cerebri accretæ à latere Sinus tertii,
Et Aqua limpida anfractus alluente.*

Mulier quinquagenaria postquam per sex circiter menses gravissimo capitis dolore, sub sutura sagittali eam perpetuo fere molestante, nullisque medicamentis aut methodo cedente laborasset, tandem in *Lethargum* cum membrorum *Resolutione* partiali incidit, à quibus tamen per remedia tempestivè adhibita brevi recuperata, in cephalalgiam uti prius atrocem experscebat: potro deinde intra duas vel tres septimanas in affectionem soporosam relapsa è vita discessit.

Cranio aperto è latere sinus tertii, Tumor scirrhusus tres digitos latus membranæ accreverat, cujus interventu & dura meninx aliquanto spatio piæ accreverat, Et vasa sanguifera, quæ illic in sinus cavitatem dehiscere debuerunt, constipabantur: Porro Cerebri anfractus tum exteriores, tum cavitas interna, fuit aqua limpida repleta.

S C H O L I A.

EX his observatis, morbi istius invincibilis & denum lethalis causa liquido patebat, scilicet meningum fibrez maxime sensiles, parum ob solutionem communi, partimque ab humore nervoso ibidem aggesto & stagnante simulque ab aliis affluis, cumque eo effervescentibus, continuo vellicare & lacerare, in spasmos aut distensiones dolorificas perpetuo cicbantur. Postea cum isagais propter Tumorem istum

in circuitu sæpe diu perpeditus, ut quoquo saltem modo pertransiret, laticem ferosum (uti mos ejus est ubicumque obicem offendit) à le copiose amandaret, tandem hydrops cerebri, qui lethargi funeli causa erat, excitabatur: Casum in alio quodam huic similem me quondam per Anatomicam observasse memini. *Thomas Willis Tractatu de Anima Brutorum cap. 2. p. m. 181.*

OBSERVATIO LXVIII.

Capitis dolor à Gummatibus duræ matri inhærentibus.

Nec miranda carniæ caries: In theatro enim Anatomico Patavii anno 1651 à V. C. Antonio Molineto aperto capite rustici lue venerea inquinari, tria Gummata candida inhærebant duræ membranæ, Pia illæsa, cujus vestigia in calva corrosa erant conspicua. Talia etiam tradit Lud. Mercatus de morbo Gall. l. 2. c. 6. *Joh. Rhodius Obs. 33. l. 1.*

S C H O L I A.

Gummate præditi sunt topi, de quorum generatione videndus Fernelius cap. 5. lib. de Luc venerea: Consulendus quoque Mercatus l. c. qui exacte ejusmodi tumorum naturam & differentias persequitur: Quanquam vero doloris capitis in alio exemplo nulla fiat mentio, abfuisse tamen non verisimile est, cum cephalalgia luis soboles eis fere adscribatur: Innozie quomodo deliuerit, scirem circa genera-

tionis primordia, non video in parte extimo sensu prædita, Apud *Fartum* lib. 10. Obs. 33. Bononius Sator, post cranium ablactum, grano quodam duro sub cranio latuisse ablato, illico sanatus fuit. Alibi ex *Wilsio* ostensam capitis dolorem pernacem pletumque sequi ad membranarum cerebri morbos conformationis, tubercula, tumores scirrhusos, &c.

OBSERVATIO LXIX.

*Cephalalgia orta ex gangrena duræ meningis, à sutura coronali usque ad frontem,
excitata ab osse acuto in medio cerebro circa falcem latente.*

Capitaneus obsidioni civitatis intentus, aphonus ex equo repente cecidit: an ex vehementi transeuntis prope caput tormentarii globi boatu, (ut referebat) an ex timore, non interpono meum judicium; tandem ad se rediens, semper de dolore obtuso capitis & aurium tinnitu conquerabatur: Post sextum annum *Hercules morbo præventus*, icriticis omnibus auxiliis, exuvias victori dedit.

Aperto capite, dura meninx à sutura coronali usque ad frontem, gangrena fuit detenta, & in medio cerebro per falcatam dissecto, latuit sæpe magnum os, ad instar lapidis stellari acutum, quod suo acumine membranæ inflammationi atque corruptioni dedit occasionem, nullo animadverso signo quondam disrupti cranii, aut cicatricis reliquæ: An à natiuitate cum crescente cranio creverit; An post casum tantum fuz generationis contraxerit principia,

principia, pro nunc aliis disputandum relinquo. *Ant. de Pozzu in miscellâ curiosis Ann. IV. Observ. 35.*

OBSERVATIO LXX.

Capitis dolor ob tumorem & elevationem dura meningis; Arteriarum ejus repletionem: Tenuis crassitiem; Serum copiosum per cerebrum diffusum, &c.

VRsula Putei Frizen sanguineophlegmatica, circa 37. ætatis annum iterum gravidæ, diu continuos eosque fixissimos capitis dolores passa est cum vertigine: 4. mense conceptionis mane è lecto surrexit, humi sedit, ac caput manibus suffulcens, de consueti capitis dolore conquesta est, atque malum quoddam gravissimum sibi imminere prædixit, &c.

Mortuæ remota cranii olla, dura meninx tumida & elata erat ac si flatibus distenderetur, ejusque arteriæ sanguine turgidæ: Sublata dura meningē, tenuis ita omnes anfractus colligavit & æquavit, ut tota cerebri superficies lævis & æqualis apparerit, crassiorque debito fuerit: Ista faucia, ex omnibus anfractibus, tam dextri quam sinistri lateris, copiose serum emanavit: vasa sanguifera tenuis meningis ubique majora & sanguine pleniora, &c. *Vide histor. integram Tit. de Soporosis affectibus ex I. Jac. Wesseri Observ. de Apoplexia XV.*

S C H O L I A.

Cephalalgia fixissima, cum vertigine juncta, circa principium conceptionis mente laevæ, 1661. incipiens, & post funissecum 1662. perdurans, causam vehementem stabilēque, quæ meninges, solas dolores capaces, afflixerit, simulque spirituum animalium motum aliquomodo in cursu suo impederit, adfuisse auctor: Quenam veto illa fuerit, dubium est: meningem tenuem multa à longo tempore passam fuisse, ejus insolita crassities significat, eoque magis quia anfractuum superficiem æquavit, lævemque & planam primo intuitu lectio ostendit: Sero sub illa coequenti dolor attribui non potest, quamvis enim post obitum multum feri intra anfractus sub illa post obitum repertum fuerit, attamen cephalalgiam nullam, vel certe non tam vehementem ab autumno 1662. ad Febru. 1664. effecit, quamvis antea pluribus mensibus perulit. Flatus meninges quandoque distendit ex hac sectione consistit, nam dura meninx tumida & quasi inflata, & forte quoque tenuis meninx à cerebro ovula fuit, unde superficies planior à nobis visa: Verum statim nec continuum nec tam durabilem dolorem excitaissent: Mucus croceus utraque ventriculos & plexum choroidæum tingens, itidem causari nequit, cum pridem sublata cephalalgia & vertigine persisteret, nec forte tantos cruciatūs gignere valuisset: Ichorem subvenientem recentem exituisse æbitor, cum illum in aliis delirantibus, & febri continue defunctis his in locis repererim: Sanguinem in arteriis velsusq;

meningis doloris capitis & vertiginis auctorem fuisse, tum imprimis venæ sectio crebra, qua copia & fervor imminuabatur, vix scilicet, ætate & autumno, singulis mensibus, & hyeme æternis mensibus largior instituta cum emolumento, doloris scilicet mitigatione & vertiginis ablatione probat, tum in cadavere vestigia in utraque meningē indignant, nam vasa sanguifera ampliora videbantur: Esse citiorem dolorem dum in vasis copiose stagnans oh cursum liberum, ad sinum præcipue tertium præpeditam, membranæ exquisito lentu præditas nimium distendit, reperimus, forte quoque tale, vel simile quoddam ex lacticiis, (quibus ordinarij vescebantur) progenitum, in sinibus impetimentum laetit, nisi demum hæc oh cachexiam, post largas sanguinis profusiones in corde nata velimus, cum talia plerumque in cachecticis inveniantur: Sanguinem copiose cumulat ob laetorem victum & vitam sedentariam, oam incolæ hujus montium maximam partem fila trahendo traducunt, & in hypocaustis præservatis comorantibus sanguis iacenditur, attenuatur & ampliat, unde vasa nimium dilatata instar aneurismatis, vix ad pristinam gracilitatē redeunt & perniciem mali causa sunt: Sanguinis abundantiam auxite mensium suppressio post conceptionem. *Item ibidem.*

OBSERVATIO LXXI.

Capitis dolor à Tumore scirrhoso Pie matris, Ichore inter meninges & cerebrum.

AMedeus x l. annos natus, biennio varijs per intervalla morbis, Dolor capitis, Ichore &c. afflicti: Mortui dura matre detracta, Tumor scirrhosus & latus in pia matre ad sinistram falcis partem repertus: Hæc fuit causa doloris capitis qui totum biennium perseverarat: Inter meninges & cerebrum ichor multus: Vide histor. Lj. Tit. de cachexia: *Fabritium Hild. cent. I. Observ. 71.*

S C H O L I A.

Qui totum biennium perseverarat Cephalalgia Habitualis aut Continua est aut Intermitrens, Interdum accedit quæpiam dolore capitis Continuus, per

plures scilicet dies aut menses protogato, atque parum aut oihil, nisi cum formus urget, intermitteat affligit, quo in casu supponimus non modo causam procacitatem,

ta: etiam, sed & conjunctam alicubi fixam esse & constantem: Præterquam enim quod partes affectæ, aut quæ subinde affici solent, sunt debiles, & liquor earum insignis, utpote depravatus, stagnare, aut cum aliis humoribus effervere, aptus fuerit: Insuper in illis quædam solutio continui, nempe inflammatio, erysipelas, abscessus, tumor scirrhusus, aut alius cujusdam generis excitatur non raro, circa quem dum

humores diversissimi concurunt, & aggeruntur, propter fibras nervas continuo vellicatas, dolores fere perpetui oriuntur. Hujusmodi cephalalgie non raro in affectibus soporosis & tandem lethales terminantur: nam cum plurius ab hæc affectibus, defunctorum capita apertorum, signa sive vestigia prædictas ejusmodi causas morbiâcas declarant apparere, Thomæ Willis de Animi Brat. part. 2. cap. 1. p. 166.

OBSERVATIO LXXII.

Capitis dolor à coalitione meningum, Sanguinis liberum excursum præpediente.

Defunctorum capita, qui dum in vivis agerent cephalalgie miserrimæ erant obnoxii, aliquoties aperui, in quibus juxta sinum longitudinalem, ubi dolorum sedes erat, pia ac interior meninx duræ ac exteriori, per aliquod spatium, sæpe duos digitos latum, accrescebat, & coalitione sua tumorem asperum & inæqualem exciraverat, in quo vasorum oscula ita penitus obstrabantur, ut sanguini, licet plurimum bullienti, in sinum propinquum nullus aditus relinqueretur: *Willis Cerebri Anat. cap. 9.*

S C H O L I A.

Cephalalgia] Cephalalgia quæ propter pie matris lallem eveniunt, excitari censemus in quantum hæc à sanguine supra modum ebulliente, ejusque poros irrumpit, continue solutionem patitur, adeoque in spalmos leviores contrahitur. *Idem ibidem.*

In Sinum propinquum etc.] Vasa duram meningem pertingentia aut Arterie sunt, quæ sanguinem adducunt: aut Venæ, quæ sanguinem illinc, ac à toto capite interiore superfluum excipiunt, ad eor revendent: Quamvis autem venas, aut vasa venosa insignia continet, in quæ veluti alveos arteriarum, toti cerebro inservientium, rivuli omnes decurrant; Nempe in hac meninge quatuor insignes cavitates, vulgo Sinus vocantur, notantur, eo modo dispositæ, ut velut

promptuaria in diversis locis constituta, sanguinem à qualibet cerebri regione & angulo reducendum excipiant: Arteriarum ergo officium cum sit sanguinem nutritum cum vitali spiritu, mensura, numero & pondere justo distribuere, Excrementa sanguinis debito modo suis offerre emissariis, superfluumque sanguinem cum residuis excrementis, humorosis vel vaporosis, revolvendum committere venis, Eo si fungatur, omnia rectè procedunt: circulatione hac impedita, sanguis meningibus impactus qui manet, doloris capitis differentias, seu corpus umbram, possit se trahit: Impeditur namque eum à suo in sinum sanguinis excursu liber non est, quod in proclivi est ab hac meningum coalitione.

OBSERVATIO LXXIII.

Capitis dolor ab inflammatis cerebri membranis, Abscessu in parte cerebri Sinistra; cum Scurarum in cranio defectu.

Omnatissima Matrona Elizabetha Erot, Uxor Johannis Norry Horologiopæ Lugdunensis, annos nata xxiii. Eufarca, bonæ formæ, staturæ commodæ, crine sublavato densissimo, leni animo, &c. Nonum tertie suæ graviditatis mensem paucis abhinc diebus ingressa, immani capitis dolore, eoque ejulabundo premi capr, circa ultimos mensis Novembris dies, hujusce anni 1673. Quo nomine ad ipsam accersitus fui postrid. Kl. Decembr. St. N. Accedens mirè inquieram ac plangentem mulierculam offendo quanquam *insensum*. Dumque in causam & sedem tantorum dolorum inquiri, tum ex ipsa, tum ex adstantibus accipio, à multo tempore cephalalgia vexari solitam, nunquam tamen tam gravi quàm impresentiarum, imò parhos hujusmodi *anæsthesia* ipsi fuisse, à septimo vel octavo ætatis anno, quo Variolis fuerat conflicta: à quo etiam tempore auris sinistra ipsi purulentam materiam perpetuo hætenus eructarat, quæ nunc longè parcior quam follicret, effluebat. Percontatus qua parte præcipue doliraret caput, medium sincipiti verticem manu designabat, quam partem vestantium palms vehementer comprimi auebat in doloris solatium. Infuso enemate, cum alvus esset astricta, missoque ex brachio sinistro sanguine longè corruptissimo, necnon foru lactis repentis supra caput instituto, deorsum prius capillitio, iniectione item in aurem sinistram detergente præscripta, reuati dolore placare. Die septima mensis iterum vocor, video dolores non modo non remisisse, sed increvisse, & mulierem tremulo brachiorum motu *anæsthesia* aliquid pati: denuò itaque & enema repeto, & è brachio missionem cruoris, qui corruptissimus apparuit, æquæ ac præcedens. Postridie partus dolores invadunt, & circa sextam matutinam

D **puellum**

puellum sanum ac vegetum feliciter enititur. Tunc verò spes affulgebat plerisque omnibus, dolores capitis per loquiorum effluxum conquiescentes, ideoque eorum negotiorum Naturæ magisterio relinquendum. Verumtamen die Decembr. xvi. & xviii. accedens, pessimè solitis doloribus capitis confectam video, cum moribus illis utriusque brachii convulsivorum æmulis. Infuso enemate, Catapl. de mica panis impero capiti super imponi, deinde Catapl. Vigonis ad commotionem cerebri. Sed artem atque naturam vincentem dolorum acerbitate, occubuit tandem repente optima femina, die 19. ejusdem mensis circa septimam matutinam.

Funeſta hujusmodi catastrophe ad investigandam mali causam nos excitavit, quam Cerebri abſceſſum conjectabamur. Quapropter sub vesperam cadaver apertum fuit, & primo quidem Caput. Cranii ergo fornice remoto, quem *ἀπώρυξ* totum deprehendimus, ambo Cerebri omenta inflammata conspicati sumus, quibus incisus, abſceſſum statim deteximus, in parte sinistra Cerebri stabulantem, peculiari quidem folliculo involutum, sed quem paulo ante sponte ruptum subito necis causam fuisse judicavimus. Processum auricularem ossis petrosi, intra cranii cavitatem conspicuum, dura meninge adhuc tectum, ea remota observavimus sublividum ac cariosum, ira ut specilli cuspidē tactum in pulverem nullo negotio commineretur: Quod ad truncum corporis, nihil in ipso desideratum: Hepar amplissimum erat, Lien parvus, Pulmones ac Renes inculpatis. Cor maximum, quale nunquam hactenus nobis visum: Uterus crassus tres pollices transversos circa fundum, & sanguine adhuc turgidulus, dum incideretur apparuit: qua vero parte versus orificium internum tendebat discitus, candidiorem & *αἰσχροχρῶς* substantiam exhibuit. *Ex communicatione benevola Clarissimi & Excell. D. D. Car. Spanii, Regis consilarii, Vice Decani Facultatis Medicae Lugdunensis. &c.*

S C H O L I A.

Personarum qua parte præcipue doleret &c.] Contin- git nonnumquam ut diffusio per totum caput dolo- re *διὰ παντός* *νίκω* vacillet, neque adeo exacte dig- noscere valeamus in quoniam loco stabuletur humor morbosus: Id tali conjectura investigandum: de- talis capillitio capiti toti admoveatur cataplasma: hoc post aliquod tempus ablutum, qua parte magis exacerbatum apparebit, ibi latitare causam morbosam ostendet.

De in causam & silem tantorum dolorum inquiri] Ad causarum cognitionem ut facilius deveniamus, duo primum contemplanda sunt, id vid. In quod dolor incidit, & quod illum inducit: Ille igitur vel per universum caput sparsus est, vel ejus aliquam tantum partem affligit, etque vel Internam vel Externam est, Internas voco membranas, aut cerebri substantiam, vel venas, arterias, nervos: quarum alie sentiendi ac- mine magis, quædam minus præstant: quæ exquisi- tas sentiriæ, meoinges & nervos esse non est dubium, indeque doloris molestias vehementius percipere: Sed de arteriis, venis & cerebri substantia non adeo manifestum, cum gravem & obtusum dolorem tan- tum, qui partibus imbecillo sensu præditis accidere consuevit, persentiant: Neque enim iis partibus sen- sum omnino detrahente convenit, cum Galenus lib. k. *νῆρας* venas & arterias, inter eas quæ doloris injurias sentiriæ, enumeret, & de arteriis plane id præ- sentiet: l. de Tumor. & cap. 3. de loc. aff. substantiam cerebri sensu carere dixit, quod de exactiore intelli- gendum censemus: Quod enim illi sentiebat quædam vis insit, experientia demonstrat in his qui in ca- pite vulnus accipiunt, quibus per ipsam vulnus ad cerebri medium usque frigoris sensus pervasit: Sed quamvis hæc partes ita se habeant, consensio & con- sensum sine alterius offensione possunt accipere & effi- cit ut ex doloris specie & vehementia, non satis per- specte de doloris sui & parte primo dolente possit judicari: Quis enim ex doloris gravitate substantiam

cerebri tantum dolere, aut venas ipsas, affirmare au- deat & recte possit? Quamvis gravitas, quæ in dolo- re est, substantiæ cerebri potius quam meningum do- lorem demonstrat, cerebri enim dolor cum ponderis cujuspiam specie gravis est; meningium autem pun- gens & acutus, osium vero membranarum convul- dens & profundus est: Anteriorum dolor à venturum dolore præcipitate sua & discrimine distinguitur, quod arteriarum, aut partium arteriarum vicinarum, cum pulsatione sit, quæ illis propria est, venturum vero minime: Qui vero à nervis proficiunt, vehemen- tia cum meningibus, ut sensus acuminis & præstantia convenit cum istis, sed hæc nota discernitur quod quid convulsioni simile referat: atque etiam cum nervosis quædam pars cerebri afficitur, ejus affectus aliquod sensuum exteriorum organum participes per consensum affici necesse est: ut si pars eâ qua prima & secunda nervorum conjugatio, aut nervus qui ad oculos sentiendi facultatem deferret, ortum trahit, no- xam subierit, oculis illis illa communicabitur: Si ea porro quæ tertiam & septimam producit, doleat, lin- guam in consensum suum trahet, quæ cum laxam & raram substantiam habet, nullum ex diffensione aut laxitate dolorum concipit: Eadem est & c. si quæquam conjugationum ratio, quarum quarta si patitur, affe- ctum suum per nares transmittit ad palatum, quinta ad aures, sexta aurem ad os ventriculi: Dolor vero qui externas capitis partes excipit, aut lo citius, aut in pericranio suum habet: Uterque ab incerto diagno- scitur, quod tactu deprehenditur pressuque capitis ex- acuitur, Interior vero minime, in quo etiam illi non erigi ut in externo videntur &c. *Rondelium præcit. lib. 1. cap. 5. De diffinitione doloris interni ab externo vide Notæ ad cap. 30.*

Spes affulgebat dolores capitis per loquiorum effluxum conquiescentes] Ab utero pendere dolorem capitis demon- strant menses suppressi, semper, aut aliud in illo com- pertelens, vel citius illam partem humorum contur- batio: Raro enim ex peculiari cujuspiam partis con- sensu

sensu quam ventriculi aut uteri dolet caput: Nulla enim omnium capite inferiorum pars est quae magis & evidenter cum cerebro communem habeat, quam ventriculus per nervos sexae conjugationis, & uterius per spinalem medullam, cui ob utriusque tendonibus & ligamentis alligatus est; unde fieri ab his ipsis dolor ad cerebrum, sola condolentia ratione, nulla interveniente materia perveniat, cum uterque ab acrimonia humorum vellicatur & pungitur, aut multitudine sola distenditur: Quare licet non raro per aliarum partium affectus, ut lienis, jecoris & septi transversii caput in consensum adducatur, maxime si inflammationem pariatur, non tamen id nisi communis societatis quam totum corpus habet, ratione & materia intercedente, sique per venas & arterias materia suam transmittitur. In quo facilius id per venam cavam praestat Jecur & Lien per arteriam magnam, sed cum aliam nullam aditum quam per hos ductus ad cerebrum habeant, non videtur, quare eo potest excitari dolor, causam magis à mittente parte quam à recipientium imbecillitate obtinere, nec unam potius quam aliam capitis partem obidere debere: Cum enim vena cava, tetentiaque magna tantum juxta jugulum dividantur, dextramque & sinistram arteriam & venam in caput mittant, quae ratio est cur quod à Jecore & Liene demandat per illam potius quam per alteram ad caput perveniat, & in dextra potius quam sinistra dolorem instillare debeat? Quod enim de rectitudine obijciatur, vim in doloribus qui à materia per viam communem, & per arterias & venas sunt, nullam habet: At in his qui per partium communicationem & colligationem ab una in alteram transeunt, verum esse posse non infeliamur: Quod si haec distinctio recipienda non sit, cur rectitudinis pure dolores omnes qui propter uteri societatem sunt, non in occipite semper potius quam in scapula, ut Hippocr. & Galenus voluerunt, percipi debeat, cum Galenus in hac re his qui afflicti sunt librorum tum prius sine, posteriori cerebro rectitudinem quaedam assumant, non assentiat? Quare dolor qui ex consensu jecoris & lienis in capite tuborinus, non dextra potius quam sinistra, nec alia pars assignanda est praeter anteriorem? In qua cum omnis materia, sive vapores, vel quaecumque fuerit, qui à partibus inferiustibus suum deferret, recipiatur, doloris merito per consensum communem totius corporis, & per materiam procreant fides & nota existit: Id Galenus comen. l. in 6. Epid. demonstrare conatur,

Ex partefcente, inquit, sanguine febres accenduntur, quae plucium vaporum copiam ad caput mittunt, à quibus cum repletur, dolores in scapula molestant inferentes exoritur, eo quod vapores illi calidi per arterias ad caput sursum ferantur, quas ex colli appellat fornice utrinque scapula adductis rationibus, quas vide Scholio 3. ad cap. 18. Cum autem magnitudine aequalia fuerint pauciora, partes quae usura sensu magis participant, sentiunt magis, quae vero magis sentiunt, illae causae dolorificae molestiae magis: Ob eas itaque causas concludit in scapula dolores existeret: Ex eo vero quod pars posterior capitis frequentioribus evidentioribusque venit est magis conspicua dolorem firmari in ea potius debere quam in anteriore, non est quod quis contendat didicimus enim ex Anatomicis ramos venarum in occipite laeviores esse, anteriores vero exiliores, quod ab illa in hanc partem forantur & delinant: Hoc tamen fieri intelligimus cum nulla pars capitis altera magis imbecilla est aut injuriis opportuna, quae enim aut ab initio, aut ex casu, vel aliqua laesione talem conditionem sortita est, in eam fluxiones & humorum decubitus fieri consueverunt: Nec solum qui per consensum, verum etiam qui primario cerebri affectu sic affolitur, in anteriore frequentius quam posteriore sentiuntur, praeteriam cum à materia pleuritica, aut excrementis in capite collectis excitantur est: solent enim illa in anteriore magis quam posteriore cumulari, ut ostendunt metus per quos expurgantur, ut nates & palati foramina in illa parte à natura constituta: Ex quibus abunde demonstratum esse arbitror posteriorem capitis partem omnibus prioribus doloribus minus esse obnoxiam quam priorem, nisi ab utero proveniant, quibus ab eam causam id proprii inest propter peculiarem illius partis & uteri societatem cum cerebro per spinalem medullam, ut in occipite leviant & molestiae initium faciant, dummodo non per fumos & vapores ab utero transmissus, sed per solum condolentiam, ut à ventriculo mortuo aut vellicato fieri ante docuimus, caput afficiatur: hisdem enim modis uteris cerebrum, quibus & ventriculus in consensum trahit. *Randellum methodi lib. 1. cap. 5.*

Per hoc autem efficitur conjugatio Ex. De doloribus cap. per consensum ab utero, stomacho, hinc & c. vid. Not. ad Obs. 14. *venarum humor. corruptis* Ex C. l. 1. p. 282.

OBSERVATIO LXXIV.

Capitis dolor à membranarum phlegmone post casum.

Virgo cum capite in postem incidisset, vulnusculum in capite contraxit, quod neglexit; IV. die capitis gravitate correpta est; VI. obiit: Aperto capite, sanguinem sub cranio collectum, & cerebri membranas inflammatione correptas invenimus. *Vide hist. lib. 4. Tit. de Palneribus.*

OBSERVATIO LXXV.

Capitis dolor à sero flavo represso Tineam prius excitante, unde cerebri & membranarum corruptio.

Capitis doloris causae sunt (quamvis hi casus sint rariores) abscessus & tphi Gallici, & caries ossium: Habui proximo anno Monachum ex S. Iustina, qui laborabat per decem annos capitis dolore, & singulis annis ultra tres libras usus est Philonii ad dolorem

D 2 lenien-

leniendum: Erat autem dolor ex tali causa, nam *per cerebriationem* inveniebatur caput plurima pituita refectum, & os corruptum, tandem obiit: Quod ipsum etiam, dum essem junior, vidi in quadam muliere, cui substantia cerebri plane erat corrupta ex multis lotionibus, cum *laboraret tinea*.

Aperiui illam cum D. Tiberio, & invenimus in parte sinistra materiam cum aqua flava, & membrana erat corrupta. *Herc. Saxonia Panthei lib. 1. cap. 2.*

S C H O L I A

Lotionibus tandem sanitati restituta] An cutis debeant achorae non immerito quaeritur? *Hippocr.* enim lib. de morbo Sacro scilicet reliquit infantes, si ipsi ulcera in capitibus, vel circa aures, vel in reliquo corpore excrescant, liberari ab Epilepsia, *Galenus* 1. de compos. medic. l. 1. cap. 8. salium quid & nitrosum in se continere cum humorem aër, qui & subdito cranio vim inferat. Reverti nisi corpus ante exstiffime perpurgetur sit, Aut malum sit topicum, fomentum à toto non suscipiens. (quandoquidem & caris & habitus corporis unus habent multos, aliunde non pendentes) Aut si totum caecum hinc sit, via suscipienda curatio aliter quam per derivantia aut revellentia, praeterim forniculos in brachiis, aut potius indorito: Eiusmodi ulnque erupitantes sunt de genere abicessuum quos curari vetat *Hippocr.* 6. Epid. sect. 3. quia aliorum affectuum medià sunt, sicut fistulae & haemorrhoidum fluxus, à quibus multo, aut intempestive curari perniciosa percepti sunt.

Per cerebriationem intescebatur caput plurima pituita refectum] Scilicet inter cranium & pericranium, quae

vel mora putredinem, acrimoniam & corrodensi os subditum vim acquirere, vel infusa malignitate donata, sit, qualis tinea excitat: Eo vero in spatio diu circumferritur aliquanda humor gravitate sola molestinus: Exemplum habetur apud C. Pilonem (secta parte 1. cap. 2. de morbis ab illavie serosa, Praefatus, inquit, hortis basilicis deploravi apud me suam ætumnolam vitam, ob pertinacem infirmiam, quam gravis capitis dolor ei annum jam ventrem inulserat, qui ractu exacerbatetur & noctu ingrueretur. Cam caput contraxisset, ac flagrantem sub cute humorem deprehendisset, & vitum ab omni inhonesta morbi labe alienum nossem; tempestas vero ejus acribilis, visaque perpetuae applicationi exposta ob oculos obverberarent, cum sancti humorum, umoris illius continerem causam, æquum illum quidem, sed acri & bitoso percusum esse iussit, qui universam doloremque induceret tum iusticia: Actum postico occipiti cauterium insui cavo: dictum scdum, aqua vitæ quodam insigni, & bili praline tum imo uberatim per plures dies emanante, ab affectu libet evasit.

§. 2. Mulierem Tinea alias tentatam, ac frequentibus quibusdam capitis lotionibus tandem sanitati restitutam, in capitis dolore in febremque continuam incidisse, ad illam vocari minime mirum esse dixi: Cum vero nullis prorsus vel revulsoriis vel derivatoriis & vacuantibus cederent, sed tandem ægram post dies xxx. ad internecionem duxissent, sublato cranio media pars totius cerebri cum membranis (erat autem dextra) putrida prorsus inventa est, ichore citrinio repleta, urinam rectè dixisses. *Idem Praefation. Praefatus.* p. 1. cap. 1.

OBSERVATIO LXXVI

§. 1. Meningum Sideratio sequuta diuturnos dolores.

Observantur primarii Medici post diuturnos capitis dolores Syderationem meningum ipsius cerebri evenisse *Ballonius Hist. 4. lib. 2. consil.*

S C H O L I A

Sunt, quæ Cerebrum occupat præcunte fere inflammatione, id vero si illi accidat, potiori jure membranis, per quas numerosa vasa decurrunt, ab illis in illud expansa: quantum ratione dolos, ipsum per se sensus expert: Adjunt vero dolores capitis, (quos aut haemorrhagia, aut puris excretio solvit, aut per aures aut nares, si frontem aut tempora occupent,) cum pus in cerebro, aut circum membranas adest, vel quod sit inflammatio, vel intempe-

ries: hinc fieri potest ut pars liveat & ita sideretur: quod & lateri parvulento evenit ut sit livens, syderatum, *fluor*; Porro, non aliunde *si fluor* petitur quam à tucescentia humorum malorum, quorum excretionem cerebrum, ejusque membrane, sit immune ab omni affectione: Videatur paric. 15. l. 3. Progn. Quibus post dolores capitis sanguis aut pus non eruperit, lata in cerebrum materia, moriuntur *modo Appellatus.*

§. 2. Tenuis meninx nigricans reperta post diuturnum capitis dolorem. Continuis & gravibus capitis doloribus affligebatur vir xxx. annorum per annum dimidium: Post obitum meninx tenuis nigricans, tum in superficie, tum inter anfractus corticis apparebat. *Rolfinkius Tract. de Dol. cap.*

OBSERVATIO LXXVII.

Capitis dolor ad occiput & spinam protensus, à meningum inflammatione, quam sequuta fideratio.

Quidam natus annos 30. sæpius in dies ebrius, cùm à forensi tabula alapa vapulasset, pacem cum illo innotuit in multam noctem vino Hispano faburratus, sevisissima cephalalgia, cuius dolor etiam occiput spinamque occupabat, cum omnium sensuum dejectione corripitur: ab amico, in cuius domum pro semel mortuo delatus erat, sub merinoctium vocatus, cum viderem assidue exilientem, corpus corybantem instat, & pedes maxime manisque jactantem, nec verbum, etiam aciculis à me premeretur titillareturque, proferre valentem, dico videri mihi cerebri sphacelo correptum: nam aliquot ante diebus nunquam sobrius, convitiis verberibusque combibones plerosque male mulctarat: Acutissime febricitabat, & tamen potum omnem respuebat, validisque manibus, dum vires tulerunt, à labiis admota cymbia amoliebatur: rubebat facies cum tumore: rubebant & oculi, quorum fixo obtutu conspectos phanatici instat terrebat: Præscripto, quando aliud non licebat, clystere validissimo, ad lectum rediit, mane quietissimum invenit, movendi scilicet vi per languorem abolita: Silentium tantum, ut vulla barba, punctaque acule aure, vocem nullam ederet, abolito nimirum omni sensu: Cùm venæ sectionem vires non permitterent, cucurbitule applicite, admota quæ ratio dictabat, sed invita Hygieia omnia, die enim tertio ebriam efflavit animam.

Amicis eum qui alapam dederat in ius vocantibus, à magistratu caput [eum cerebri sphacelo correptum assererem] aperire iussi: Invenimus meningas valde lividas omninoque syderatas; quas cum Iudices mortis causam dedisse, huncque sphacelum non alapa, sed jugi ebrietati, quæ inflammationem cerebri conciverit, tribuendum Medici crederent, ulterius itum non est: fortore maximo nasos omnium in alia omnia trahente. H. ab Heers Observat. Med. xvi j.

SCHOLIA.

Potum respuebat. Inter Phrenitidis signa scitis absentia, prænotatis causis insisteri, recensetur: ægrotae scilicet mens & spiritus animales læso cerebro, ad os superneam ventriculi non diffusum: Exactam hujus morbi descriptionem vide apud P. Sallum Divertum, de affect. part. caput.

Sæpius in dies ebrius. Cephalalgie cause Evidentes conjunctas excitant, inque actus seu efficiendi rationes dolorificas ciet: Sunt autem varii generis, & diversi modi operationis: quæcumque nempe rei, aut materiam motificam aliunde in partem affectam transferre, Aut 2. illam in ea prius dispositam commovere aptæ sunt, Aut 3. fibris ipsius in spasmos dolorificos prædispositis, affectionem illam à longinquo & aliam partem consensu impetrunt, ad hunc genus pertinet: Quoad prius, sanguis, ejusque in quilibet humores, nempe serosus, coctus, nec non recentia biliosa, acida, ac alias vitiosa, variis de causis commoveri, inque capitis membranas transferti apta sunt; multaque exterior acidunt, videlicet ævis ac anni mutationes, æstus, frigoris aut mororis excessus, laurus victus, vini potus, balneum, Venus immotia, passionis violentie, &c. illud passim efficiunt: Porro humores isti interdum sponte turgent, & sine causa externa, aut alias evidenti, commoti se in caput proripiunt, quo ubi advenierint, fibrisque prius indispolitis jam insisterit, licet cause conjunctæ partem constituant, ipsi tamen compitum in motu viæ fluere lunt, caule evidenter rationem tubent, Quare cum prius explicavimus quo ritu sanguis, quæque in eo hospitant, ad membranas affectas delata cephalalgia concitatur, videndum quibus modis, & ob quas occasiones fidem humores commoveri, inque membranas corripit solet. Et 1. sanguis sua

sponte, & ob intestinos particularum ejus motus & colluctationes subinde effervescent, capiti molestias impertit, nec tantum in febrium paroxysmis, aut insuper sine causa evidenti, aut morbi suspitione, turgentie ejus crebra ac vagæ contingunt, quas in aliis vix perceptibiles, cephalalgia obnoxii satis advertunt ac lunt: Nec solum è proprio penu sanguis capiti noxam immitit, sed eam aliunde fulcipient illuc defert: Sæpenumero cruor è stomacho, liene, mesenterio, hepate, utero, aliisque partibus aut vitæbus materiam incongruam, aut sibi, aut nervoso generi infestam fulcipit, quam brevi postea ut extrudat effervescent, membranis capitis suffundit, adeoque cephalalgiam, vulgo dictam sympatheticam producit, cujmodi affectus ab aliis partibus transmissio ad caput, etiam alio interdum modo contingit, uti dicetur: Cum massa sanguinis à sero abundat, nonnunquam mere plenitudine ad illud excutendum excitatur, quod in capitis membranas decumbens, dolorum paroxysmos ciet: 2. In crura sine prout serum, ita & succus nutritius, h. e. recentis chymus ex alimentis coactus hospitatur, ac una circularis, si femicoctus aut depravatus, vellicationes dolorificas ciet. 3. Restat adhuc aliud casuum evidentium genus, cum propter spasmus in partibus aliis inceptos, cephalalgia succedat, De quibus omnibus, aliis locis. *W. H.*

Dolor occiput spinamq. A repetitione Sinum lateralem dictorum, alias Posteriorum & Descendentium sub surae lambdoideæ ductu sitocum: oriturque utrinque unus in posteriori occipitis fede, unus de viæ alter similiter ductus, ad latus foraminis occipitis, per quod spinalis medulla transit, cranio semper attenti.

Relatum Dyssert. Anal. p. 398.

Dolor occiput Occipitis dolor causam sæpe agnoscit

capitis capitis inibi eximiam crassiciem, eoque nomine interiorum exhalationibus minus per viam, quæ coercitur diutius, ubi ad narium redierint, distendendo dolorem inferunt, à vulgo cunctalem dictum, qui sæpe

esse arthriticus solet: hoc enim ex fonte, *Fervet*, supervacui humores per summam corporis sub cute, iter sibi aditumque molientes ad arium compagiores siccantur.

OBSERVATIO LXXVIII.

Capitis dolor à phlegmone cerebri partem posticam obsidente, subsequente sphacelo.

Nobilis juvenis annos natus 37. sub cane ingravissimum & acutissimum dolorem capitis incidit, qui ad posteriora & latus sinistrum magis porrigebatur; aderat *obscura & levissima febris*, sensuum vigor, gustus præcipue: cum his nihilominus sitis ingens & vigilæ perpetuæ: *frons* nihil incaluit, caput parum, ex tactu licet duro, non dolebat: appositis ad frontem manuum una, ad sinistram altera, *cerebrum intus contenti ac convelli* sentiebatur: ac caput universum *involuntarie subsiliebatur: urina in principio crassa & alba*: Quibus animadvertis, phlegmonem in cerebro metuentes, vel erysipelas, sanguinem mitti &c. iussimus: 4. morbi die, in linguæ latere dextro erupit tuberculum, quod durum & cavum & sine sensu ulcerosum deprehensum est, carcinoma scilicet. Septima sub vespere paululum deliravit, mox sudor in facie primum, deinde per totum corpus copiosus obortus est, ita ut veram & perfectam crissim adfore speraremus: Dum amovenitur stragula & sudor abstergetur, illum fermè resolutum invenimus & continuo delirantem: *Vires quæ ante sudorem fuerant prævalide*, omnino fractæ percipiuntur, atque in eo statu nocte tota usque ad horam 8. diei ix. matutinam perficit, garrulus supra modum & insipiens, & immemor omnium quæ sibi in morbo contigerant vel facta fuerant: Circa x. recipere visus est, quorundam reminisci, & sic spes animis addita fuisset, nil pulsus convulsivus, artuumque tremor cerebrum pessimè affici indicassent: In proximo urinae excretio copiosissima, quæ rubra & igneo splendore coruscabat: Simili hora, qua pridie sub vespere, rursus ægrotantem invasit delirium, in eo pejus, quod cum rursus vires constarent factus phreniticus, adstantes summo terrore profligabat: Nona matutina iterum resipuit usque ad vespere, sub quam tumor exortus est in cervice, pomi mediocrius magnitudine, non dolorosus neque à cute diversæ coloris, nec minus delirium juvenem occupavit cum manuum motu convulsivo; die x. omnia similiter se habuerunt: Sub finem xi. convulsus moritur.

Cadavere dissecto, cæteræ corporis partes inculpatæ repertæ sunt præter cerebrum: aperta quippe calvaria magna copia sanguinis nigerrimi, etiam diluti, illico affluxit, intactis adhuc meningibus, imò ossibus vix diductis ad serræ capedinem; qui quidem sanguis inter calvam & membranas effusus ponderis lib. ij. vel pluris æstimabatur: Ubi detectæ sunt cerebri tunicæ, mox universum venulis nigro torridoque sanguine turgentibus conspersæ apparuerunt: Pars autem posterior duorum digitorum latitudine, longitudine quatuor, ubi toreularis sedes definitur, non solum nigricans, sed præterea membranae purpureo colore & gangræna correptæ visæ sunt: In qua parte dum scalpellum adigi iussimus, protinus inde materia purulenta ad unc. vi. cum fœtore emanavit: Novacula altius adacta, tota fere basis cerebri, imprimis cerebellum, & ea pars spinalis medullæ quæ primis vertebrae excipitur, & super qua tumor apparuerat, sphacelo similiter correptæ sunt inventæ: meninges vero partis sinistrae ulcerculis exarsæ, per quæ sanguinem sub calvam effluxisse verisimile est:

S C H O L I A.

EX quibus collige causam doloris illius acutissimi, vigiliarum, delirii & convulsionum fuisse solutionem continuam in cerebri parte postica, cerebello dicta: Solvere vero unitatem causæ duæ, ultæ & phlegmone erysipelatodes: Ulcus quidem ut causa primaria, ab aliquo mensibus contractum ex causâ relatis, sed retinendis: ut sololem habuisti ulcerculum illud in lingua enatum, sic & partem debilem & reddidit & inflammationi locum dedit: phlegmonem autem erysipelatodem promoverunt ætas, temperies corporis & ætatis, sed præsertim narratio in frigida sub dio post insolationem & creand. sciantiam: Febris vero obscura fuit eum tot terrificis symptomatibus, 1. quia cerebrum unum labora-

bat. Secundo quod obscuri sensus sit ex se, non frigidum & humidum. 3. Ob eas distantiam à cordis, hinc spiritus caput perreptantes ubi in plexus binos illos labyrinthicos lapsi sunt, difficile ad eorum exitum & contagium partis affectæ cordi minime communicant. *Hieronymus Rufus ad Legerum litteras, Obs. 21.*

Dea lesio cerebri etc.] Tenuis meningis infinitas vasorum propagines à cassis derivatas in se cum suscipiunt, itenimque cerebro dispenstet, hinc etiam est eos hallucinari qui cerebrum inflammatione posse corripit insidiantur, quod experientia ipsa ostendit: Ad Aphor. 50. 7. in quo Hipp. eos quibus hydrops est cerebrum, tridui intervallo obire docet, gravem porius inflam-

mationem

maionem, quam nacti caloriz extrinsecionem (quam alias sphacelus significat) intelligendam esse testatur Galenus: Rationem addit, quod ab hoc nulla salutis spes superest, quam Hipp. tamen promittit si hos superaverit; iam & nos ipsi per foramina craoii, quae cerebrum sunt in capitis vulneribus, cerebrum cum dura membrana intra sibi laum esse, ne extra calvariam promiguet, saepe vidimus sedata mox inflammatione in suum locum rediisse: Quin & in apertis cadaveribus abscessus in ipsa cerebri substantia reperit multorum testimonio comprobatur. *Singulis Anot. lib. 10. c. 3.*

Qui ad postrema, &c.] Ibi enim grandes arteriae & aequale per quas humores in caput infusant.

Diffusa & lentissima febris.] Inanes sunt quas affect rationes, si enim adhuc phlegmone cerebri & membranarum, non potuit non sequi febris continua, admixta praefertim circumsione sanguinis: Ratio ergo querenda in necrosi cerebri circa obrepente, vitalem sanguinis calorem extinguente, qui cessans ad cor non potuit ingens incendium inducere: frontem enim sic nequaquam incaluisse; caput parum, imo ne ad contactum doluisse.

Caput involuntariis subsistit.] V. illicitis membranarum ab acrimonia ichorum & phlegmone exsodaculum, & organo agens sanguine in vas, tunc itaque flatur: membranas distendentes.

Vires quae ante fuerant, &c.] Exhausto sero & lymphis a quibus temperabatur acrimonia bilis, unde desuper tacta acies, hinc delirij catenarumque symptomatum exacerbatio.

Magna cepha sanguinis effusio.] Ab omni quoque vasorum quae exuberantiam illic depoluerunt.

Primo crassa.] Futurus in fibrillis praefigiti potest

capitis dolor ex unitis turbatis, *Quibus in febribus urinae perturbatae, quales iuniorum, in dolores capitis vel adfusa vel adcreta aphor. 70. 4.* Hic aphor. ut recte intelligatur, distinguendum est inter urinas perturbatae: Aliae perturbantur à causis externis, aliae ab internis, illa est fignis umbilicis, & tales Caduam vocat concretas, quae in aqua calida rursus clarificant: Haec est calor internus praeternaturalis, seu febrilis, qui partes humorum crassas, quae in sedimento erant ablutit, nunc valide permiscet cum tenuibus, nunc leviter: Si valde miscetur, manent turbidae: sin leviter, tota calor eorum actualis evanescit, sedimentoque ponunt: Non primae dolorem praenuntiant ab externa quae turbantur causa, sed postremae. Ratio hujus prognostici suppediatur à Galeno, Funt tales urinae crassas & densas materiam agitante & versante calore, atque in ea subsistenda occupata, Et paulo post, Seceris talibus vel dolores capitis conpari vel eas sequi subjungit, quia una cum calore statimque formis in caput facile tollitur. Urinae tales sunt à calore igneo per modum ebullitionis & fervoris humorum in venis, non aliter ac in musto: ut in hoc, ita & illic humores & vapores concitatos elevati necesse est: significane ergo tales urinae *urinae quae vix sapientia di phlegmone imminet*: Tanta in febribus sua est agilitas, ut procelle instat ad caelum ferantur, & sacrum menis domicilium attingant humores, inferiore regione interit non manente libera: Salta spirituum in motum sublimationem minatur, alembicum dum peius membranas ibidem linciant. Elevantur autem ex internis venis ad cor, ex carotidibus ad cerebrum. *Responsum Tract. de Cap. Dolore p. 114.*

OBSERVATIO LXXIX.

§. 2. Capitis dolor à totius cerebri Phlegmone quem sequuta eius necrosis.

Mltos vidimus qui cerebrum sphacelatum (h. e. principium ad sphacelum, ut Gal. statuit) habebant: tamen nonnulli contra Hipp. sententiam qui intra triduum perire afflicti pervenerunt ad 14. diem; Alii à 7. alii ad 10. & non sunt sanitati restituti, & horum calvarias aperientes, rotum cerebrum penitus sphacelatum, i. e. corruptum invenimus: Hoc mihi videre contigit in Ill. Comite N. qui 6. die à sphacelismo obiit: Cum Gal. igitur in genere dicimus, cerebrum corruptum habentes nullomodo posse supervivere, imo breviter moriuntur, non ramen in 3. diebus: Nam virum quendam robustum vidimus qui usque ad 14. diem pervenit: Et si peras, quoniam modo cognosci potuit jam cepisse corruptionem, Respondemus ex vehementissimo dolore quem pariebatur æger, tum puram sphacelum & corruptionem cepisse, 4. die effectus est attonitus, 8. die omnes sensus amisit, 14. die obiit: Huic ablata calvaria totum cerebrum corruptum invenimus: *Brassavolus comm. ad aphor. 51. lib. 7.*

S C H O L I A.

De ejusmodi doloribus qui in sphacellum abeunt, ait Hippoc. aph. x. 6. Dolenti caput & valde dolenti, pituita, aut aqua, aut sanguis fluens per nares, aut per oculos, aut per aures, solvit morbum: Nimirum ex aquo succo aut sanguine ejusmodi dolores piguntur: Sanguis autem aliquando naturae beneficio in pus abit, aliquando transmutationem illam non subit, atque tunc periculum est cerebri sphacelismi, h. e. corruptionis, si supra dicta emunctoria sicca sunt nihilque per illa excreantur: Si tales succi in eo morbo per eas partes evacuentur, vacuum est congrua, educantur enim qualia decet & per regiones convenientes.

Totum cerebrum penitus sphacellatum.] Cerebri abscessus

& sphacelus à paucissimis auctoribus describitur, licet ab Hippoc. annotatus fuerit. 3. de morbis, & in usu practico interdum occurrat, minusque exercitatus Medicos alterius morbi specie deludat. Est autem substantiae cerebri suppuratio vel corruptio, quae gangraena vel syderatio etiam nominatur: Causa illius immediata est cerebri substantiae inflammatio, quae tamen à phrenitide distinguitur, ex eo quod in ea membranae potissimum inflammantur, & ab iis inflammatio partium exteriori & coniugae communicatur: In hac verò partes cerebri interiores, ac totam propemodum illius substantiam occupat: magna autem illa inflammatio in parte molliissima & humidissima

brevi sphacelum accersit: Causa est sanguis supercalcfactus, vel admodum biliosus in cerebri corpus & partes ejus internas affatim intruens: Externæ causæ sunt quæ sanguinem calidum copiosius congerere & ad caput transire valent, sed maxime vulnera capitis gravis & contusiones: Ab hac tamen causa oriundus abscessus, vel sphacelus, à prædicto diversus quodammodo est, quia ex contusione factus abscessus tot cerebri partes usque ad ultimum non occupat, sed uni præcipue adhæret: unde symptomata leviora, saltem ab initio, esse solent & affectus ad plures dies propagatur: Signa verò prioris hæc sunt, invadente affectu iogens capitis dolor ægrum adoritur, qui per occiput collo & ipine communicatur, cui mox succedit lentissimum omnium tum interiorum tum exteriorum abolitio, sicut in apoplexia contingit, à qua tamen signis infra describendis distinguitur: Variis modis & inordinatis sese ægri exagitant, ut vix uno in loco contineri valent: manibus interdum partes superiores invadunt, eisque divellere ac dilaniare conantur, faciem ungulis dilacerant, crines avellunt: ac procedente morbo corpus languescit, & ad mortem impotens efficitur: febris acutissima & intensissima hunc perpetuo comitatur affectus, quæ ab ingenti inflammatione procedit: Ægri oque cibum neque potum admittunt, & vix aliquid in stomachum quocunque artificio ingeri possit, unde cito advenit vitium exanthematicum: Abscessus ex vulnere aut contusione geniti hæc sunt signa: post acceptam contusionem capitis torpor quidam & morbositas apparet, animalibus spiritibus à materia extravasata labefacti incipientibus: morbo invalescente febricula cæsiatur, materia putrescere

incipiente: hic capitis dolor succedit & somnolentia, mox aucta putredine omnia symptomata ingravescant: febris intensior evadit, æger et profundiori somno emergens subito vociferatur & surgit è lecto, statimque iterum decumbit: frequenter manum ad caput adducit: Ea hisperique ante obitum putrescentiam materiam & virescentem ore aut nabus reiciunt. Ille affectus periculosissimus est & usque ad ultimum letalis, aph. x. 7. Quibus cerebrum sphacelatum est io tribus diebus pereunt, si vero hos evaserint, sani sunt: docet vero Galenus per sphacelum non esse intelligendam factam & completam partis corruptionem, quia hæc curationem non admittit, sed quæ est in fieri, immineque ob inflammatiois magnitudinem. *Riternus Pract. l. 1. c. 12.* Vide hujus affectus ampliotem descriptionem apud *Salum Diversum* lib. de affect. partium, c. 1. & iniquæ exemplum apud *Amatum* cent. 1. cur. 9. qui hoc hoc affectu cerebrum corrodit & exedit ait, & intra triduum ægrum perire, ac ad x. diem aliquando pervenit dissecto cranio experientia se didicisse ait. In insatiable morbus hic Scirrhosis dicitur de qua *Langius l. c.* Cujus triste mihi exhibuit exemplum filiolus meus Henricus x. menses natus anno 1657. mense Junio: qui in eum affectum incidit ex calidioris lacte, moribunda enim erat nutritio conducticia, & bombardum in domus vicinia explosione: hunc febris præhendit acutissima, cum faciei pallore, inextinguibili sui diarrhæa: Protinus fovea in sinu capitis apparuit continua sui agitatio brachii dextri, qui præ frigatione aliquot post horas concidit, hinc sinistram eadem agitatione commotum, tandem succedentibus convulsionibus x. 1. post hora obiit.

OBSERVATIO LXXX.

Hemicrania dextri lateris à corruptione cerebri latere sinistro.

Multum vidi quæ continua dextri lateris hemicrania diu & acerbissime affligebatur:

Tandem defunctæ cranio detecto inventum fuit cerebrum in sinistro latere corruptum, ichore & sanie repletum: quatenus in parte ipsa nullum deprehenderat doloris sensum. *H. Saxoniae Præf. Pract. p. 1. c. 1.*

S C H O L I A.

Galenus 1. comp. loc. c. 3. magna ex parte scribit fieri Hemicraniam per consensum, expurgante se cerebro per venas & arterias: Sed hic pulcherrimum occurrit quæsitum, Cur dolor qui fit à causis essentialibus magis in una quam alia parte oritur? Quando enim caput afficitur per consensum, res plana est, Nam prout pars, à qua fit consensus, fuerit dextra vel sinistra, dolor etiam magis hanc vel illam occupabit partem: Sed ubi essentialis materia in capite reperitur,

cui unica semper pars paritur, non quandoque una quandoque alia? Si contingat unam ex istis partem factam esse imbecilliorē, causa est in promptu, sed nulla præcessit imbecillitatis causa: Puto plerumque hoc fieri expurgante seipsum cerebro per consuetam emunctoria, per unam tantum capitis partem, per aliam minime: Ita ut illa pars quæ tacite tamen educit ab hemicrania sit immutata, altera verò dolorem sentiat. *Idem ibidem.*

APPENDIX.

Hemicraniam per consensum] Observatam à se ait in nonnullis calculosis ejusdem lateris Hemicraniam, qua parte renum Calculus se urinæ opposuit dolorēque fecit, *Excellent. Th. Bartholinus* centur. 4. Epist. 6. An sero in caput stagnanti id imputandum, vel ad membranarum ejusdem lateris consensum, dubitat: Convulsionem, ait, minatur *Hippocrates* lib. 1. Prædict. §. 120. si vesica sit intercepta cum capitis dolore: forsitan caput nervorum principium serum interceptum inundat: Ruborem genarum notavit *Lalium à Fonte*, Consule. 69. in iis quibus phlegmone obsidentur renes parter exteriore. Tò *ægr. 280*, autem, aut diaphragmatis oppositio in situ doloris, non semper observatur: quin potius promiscue vapores à quacunque corporis parte qui subministrantur, nunc hanc nunc illam partem implere possunt: Arterix enim calvarie circa basin foramina intrantes, postquam rete mirabile dictum

dictum constituerunt, se per univcrsum meningum & cerebri districtum expandunt; cumque alimentari humore excrementis multos humores & vapores in caput deponunt promiscue, nulla habita mandantis partis ratione: vaporibus etiam plus tribuitur quam reuera in eis est. *Roskiius Traité de dolere Cap. l. 2. f. 2. art. 1. part. 1. cap. 15.*

OBSERVATIO LXXXI.

Capitis dolor à vitiosa meningum dispositione, inducta ab humoribus atrabilaris, &c.

Siccæ meninges arque velut syderatæ apparuerunt post diuturnos capitis dolores, præsertim cum & humores pravi sunt, retinentque aliquid de natura humoris atrabilaris adque sti: In talibus balnea potius ex usu sunt, quàm agitatio ulla sudorificis aut calidioribus medicamentis reatrata. *Ballonius Epid. l. 1. pag. 88.*

S C H O L I A.

De natura humoris atrabilaris adque sti] Erii tatio dolor capitis fuit à melancholia pura, sit tamen ab hac pituita permixta, ut in iis qui passi sunt morbum venereum: Si dolor fiat à pura melancholia, medicamenta alterantia debent esse calida & humida (nisi fiat à bile flava adusta) non admodum tamen sed mediocriter, ut borago, buglossa. Vt autem pleuritidis à melancholia tatio fit, sit nec dolor capitis: Si enim sola dolorem taceret, certe qui melancholia laborant, frequentes dolores capitis verarentur, qui tamen dolorem nullum haberet, nisi illum non sentiant quod mens occupata sit: Adde quod iecitias dolorem non facit, neque materiam causa, nisi vel bilis permixta sit, vel spiritus, qui distendendo partes dolorem faciunt: quod fecus evenit in pituita, quia frigida est & humida, unde spiritus multus oleus qui distendendo inducit dolorem, idque potissimum notum,

ut in morbo Italico: Si vero fiat à melancholia adusta, ob bilis naturam quam retinet, dolorem facit: ob idque humidis & frigidis altcranda est: Inter remedium formas magis conveniunt embrocatio capitis & irrigatio frequens: Dependunt autem à melancholia dolores fieri, si prius ægri quam dolerent, non dormiebant, & inter dormiendum formæ multas verabantur, patetque omnes illis circa caput calidiores & sicciore apparere: Adde tentum veluti puncturas circa oculos, per quas Medici crediderant melancholiam expurgari, ut bilem per aures, & pituitam per palatum ac nares: Quod si in corpore melancholico post morbum à melancholia, vel in morbo melancholico fiat dolor, qui medicamentis discutientibus facile non cedat, verisimile est ab eodem humore fieri. *Rendelius method. lib. 1. cap. 6.*

OBSERVATIO LXXXII.

Capitis dolor à vitio duræ matris & pia, nigricantiam circa os coronale, ad semidigiti transversæ latitudinem, ob Tabacci sumi usum perennem.

Anno 1640. Prior Monasterii Cucullatorum Vicofezenfacii Aremoricorum, Gravi dolore capitis infestabatur, tandem lethali: quanquam omnem curam impenderent Clar. D. D. Forgeus & Lommins: Qui causam atrocis illius doloris & lethi indagaturi, caput aperiri curarunt, quod à peritissimo Chirurgo Forcæo præstitum: Remore cranio, animadversa circa partem supernam ossis coronalis, insignis nigredo duræ matri impressa, ipsam cerebri substantiam attingens, crassitiem semidigiti adæquans: Quærentibus Doctoribus num defunctus sumissus esset? responsum vix momento à Tabacci usu temperare sibi potuisse, Imo per pennæ anserinæ tubum illius pulverem in nares attrahere solum esse, unde ossis ethmoidis foramina ab illo omnino obturata reperta sunt. Quare ab iis pronuntiatum non aliam originem habuisse cephalalgiam, quam à prædicto Tabacci abusu. *Ex communicatione peritissimi Joh. Lamoni Chirurgi Genevensis.*

S C H O L I A.

An Tabacci sumus sul vestigia in cerebro, cranio, tum eorum quibus nigrore sedetæ ex partes reperiuntur, tum quibus pure nec ullo modo inquinatæ existere.

OBSERVATIO LXXXIII.

Capitis dolor à membranarum Coalitu, Tuberculis & Tumoribus scirrhis.

Cephalalgia Scorbuto tam rarò deest, ut multi potissimum hoc affectu virus Scorbuti cum luant: cuius nempe mali paroxysmis gravissimis, longo tempore protractis, & crebra vice repetitis obnoxii sunt: Hujus causam unicuique obvium est humoribus in meningibus

meninges suffulsi adscibere, quod etiam *W. Will. Tracl.* comprobavit: Nam in quorundam dysfunctionum capitibus utraque membranas coalitas, & tuberculis ac tumoribus scirrhosis per totum obfusas vidi: Cujusmodi tumores & concretiones, à geminis humoris dolorifici, *post crebra effervescencia*, mutuis coagulationibus exoriri videntur. *Th. Will. Tracl. de Scorbuto cap. IV.*

S C H O L I A.

Paroxysmi gravissimi Cephalalgie, cujus paroxysmi vagi sunt ac incerti, à sanguine aut sero in loca affecta irruentibus crebra sunt exempla; Intermittentis periodicæ insignie affect exemplum *Excellens. Will. Tracl. de Anima Brut. cap. de Cephalalgia*: Venerabilis, *legit.* matrona anno ætatis 45. gracili corporis habuit ac temperamento bilioso prædicta, cum à longo tempore cephalalgia occasionaliter excitari solitis obnoxia visisset, circa initium Autumni dolore capitis periodico molestari cepit: Hic affectus circa quartam à meridie horam invadens, ad mediam fere noctem, donec ægrotans præ cruciatu & vigilis defatigata in somnum cogere, proterendi solebat: dein post somnum satis profundum illa mane evigilans recte habebat: Ad hunc modum ægrotans per tres septimanas morbi hujus insidius quotidianos passa, medicinz, quam maxime horrebant, usum distulit, tandem vero appetitu defecto, & vitibus attritis, ad therapeiam expectandam coacta, post lenem cathartici & phlebotomiam, cepit bis indie, per unam aut alteram septimanam, Elecluar. seq. quantitatem nucis castanzæ, & integre convalescit.

℞. Conserv. flor. cichor. fumar. ana ʒij pulver. rad. Aron. compof. ʒijß, Eboris ʒijß. tant. cltr. ligni Aloës ana ʒijß. lalis absynth. ʒijß. vitriol. martis ʒijß. cum syr. è quinq. rad. fiat Elecluar.

In hoc casu, quod post diathesin cephalalgicam morbi accessiones, fibrium intermittentium ritu, demum periodicæ exitiunt, proculdubio in causa fuit chymici, sive humoris nutritii in sanguinem assimilatio impedita: quippe cum penitus ejus in massam sanguineam receptas vinci nequeat, post aliquantulum moram discere, cumque particulis ejus effervescere solebat: propterea ita in sanguis, ut mixturam incongruam exaceret, turgescens, recrementa sua, prout in alias partes, ita præcipue, & cum majoris molestia sensu in meningum fibras prius debiles, aut in conformatione lasas deponere: materies ea capiti suffusa, aut per se fibras sensiles irritans, aut cum iuoco earum iriguo effervescens, doloris paroxysmum modo de seipsum ciebat: qui nempe perdurabat donec particula heterogenea vel mutuo congressu effervescens, aut subigeretur aut exhalaret.

A Gemini humoris dolorifici Or. Materies morbifica cephalalgiam inducens, vel est sanguis, vel serum ejus, vel siccus nutritius, vel liquor nervus: Unum quodque horum varie dispositum, aut feculentis imbutum, circa loca capitis prædisposita, modo ante paroxysmum sensim aggeritur, modo hoc ingruente affari apponitur: Cæterum modo humor unicus plenitudine ac acrimonia sua fibras sensiles distendit: aut irritat; modo plures simul congressu munda effervescencia fibras divellit, adeoque spasmos dolorificos cient: 1. *Sanguis* in moram capidorem incitatus, ac in caput ebulliens, circa loca prædisposita inter trans-eundum angustatur aut fistitur; proindeque uberius mori ibidem aggeritur, vasa distendit, membranas valde inflat, fibrarumque nervas ab invicem divellit, illisque adeo corrugationes dolorificas inducit: 2. *Serum* in

massa sanguinea copiosius aggeritur, sæpe aut sponte sua, ob meram plenitudinem, aut à causa evidenti commotum, subito furorem concipit, & proinde statim è cerebro exundans, non semper, aut tamen in pul-mones, ac sæpenumero in caput iruit; inque mem-branas ejus aut musculos sustinuit, circa partes ad cephalalgiam prædispositas copiosius aggeritur, ibidemque inflationes & corrugationes dolorificas inducit: Porro *serum*, prout recrementa sulphurea, aut salina, acida, biliola, actia aut melancholica, aut aliis generis infesta secum vehit, eaque fibris nervis affligit, dolorem aciem aut hebetem, brevem aut longio-rem efficit: Cephalalgia, propter hujusmodi proca-tarxin oriundæ, tempore hyberno, celo humido & vento humido gravius incitat: Insipet hunc affec-tum aliarum faciei, oris, aut laryngis partium catarrhi sæpe comitantur.

3. *Siccus Nutritius*, sive *residu Chymus*, è sangui-ne ad partes solidas delatus, itaque adiposus, siquidem ille quibusdam capitis partibus male dispositis improporionatus fuerit, *Cephalalgia paroxysmi periodi-cæ* excitare solet: Namque hujus penus, juxta hanc quasdam nervas depolitas, siquidem assimilari nequit, post aliquantulum moram eam aggravare incipit, & demum in corrugationes, propter molesti expul-sionem, incitat: Cephalalgia è tali causa procedens, post totidem à passu horas quotidie repetere, & pari temporis spatio perdurare: quinsimo, prout vicinis ratio quoad quantitatem, qualitatem & assimendi tem-pora alteratur, etiam dolorum paroxysmi variari solet, prout in multis observavi.

4. *Liquor Nervus*, in ordinatione sua, cum sæpe in aliis paribus, tunc non rari in capite dolorum causa exitit: nam ille aut à crasi degener, aut feculentis imbutus, fibras nervas non ita libere trajicit, quin stagnare, in hisque ad plenitudinem irritativam conge-ri aptus est, idque præceterim intra fibras prius debiles, aut male conformatas (quales interdum sunt capitis membranz) quippe in his prædispositis, liquor irri-guus in mora præpediendus, ad plenitudinem aggrava-tivam aut irritativam facile assurgit, proinde ut fibræ adeo impleta, inflat stomachi nimis signati, propter contenta sua excrescenda, spasmos & corrugationes dolorificas intant, nec ab illis cessant, donec sarcina liberantur, que tamen postea totius modo citius mo-do tardius coacervata, alios subinde ac alios dolorum paroxysmos infert: Cephalalgia talem ubi causam ori-undam, sine notabili sanguinis turgencia, & sæpe-numero absque erroribus in victa, lente ac velut sua sponte oritur: quandoque tamen propter inordina-tiones in non naturalibus, aliaque accidentia citius acceditur, sæpius horis minutis, & post largiores somnos, cum fibræ nervæ humorem libam copio-sius imbibuerint, obtingere solet. Quod rursus autem, & ob quas causas remotiones, humores, nempe aut fer-o-sas aut tartuos delinquant, quociens *Nervi* intra fi-bras contenti occurrentes dolorum paroxysmos cient, infra declarabitur: Interim præcipua *Liquoris Nervii* culpa cephalalgias crebriores & habituales produci facis consistere abutitur; quoniam hic & fibris ipsis quæ corrugantur, & spiritibus qui in distractione & dolo-

dolorificas agnoscit, maxime intus est: tum etiam quia dolores capitis nonnunquam sine ulla sanguinis, feri aut succi ventris inordinacione aut umulu oriuntur, atque his quantumvis depletis aut sedatis, cephalalgia persistit: sępe durat: De *Liquore* autem *Nervi* cum cephalalgia causa est, observamus culpam ejus modo universalem & modo privatam esse: Nam interdu istę labem suam à parte affecta acquirere potest, quareus nempe intra fibras conformatione lasas subsistere aut stagnare coactus, adeo perventur ut demum infestus, istas vel per se, vel cum alio humore fermentescens, in contorsiones dolorificas irruet: quandoque tamen, ac præsertim in cephalalgia gravioribus existimare fas est, totam *Liquoris Nervi* massam in vicio esse; Nervosam autem capitis partes præ aliis quibuscvis in toto corpore notam ejus lucere, quia neminem hæc primæ *Liquoris Nervi* (cavitatini propius existunt, atque etiam sunt maxime sensiles: Quapropter *Liquor Nervi*, si quando vitiolus fuerit, intra meninges aliasque capitis membranas, plusquam alibi in ceteris partibus corporis vel ipso iuge fecos, vel ab altero humore ei fususo effervescent, dolorificus evadit: Rem ita habere constat, quoniam Cephalica diuturna ac gravis, non tam remediis capiei adhibitis aut appropriatis, quam illa quæ *fuci nervi* atque *sanguinis* massę crases testantur, qualia sunt chalybea, antiscorbutica, curari solet: Quod certe arguit quicquid *Liquor Nervi*

in toto corpore peccat, id capitis partes potissimum plecti. *Idem ibidem*, pag. 249, 250, 251, 252 & 253. Vide plura l.c.

Post cerebrum effervescentia, materia coagulansimilis &c.] In prædictis cephalalgia materia morbifica humore ut plurimum unico sive singulari constat: proindeque dolorum paroxysmi paulo minores sunt, & non raro citius pertranseunt: Subest vero altera hujus morbi causa, cum duo humores (instar salinorum ductu generis) simul coegressi morbo affervescunt, adeoque à particularum dissimilium luctu fibre plurimum velliscuntur, loque dolores valde acutos & lancinantes agantur, hisque non raro diutius insistunt: In hoc casu pugil unus semper erit *Liquor Nervosus*; alter vero aut *Latus fereus* aut *Succus struissus*: Sanguinem, quia fibrarum ductus tantum allevit, ac non intima subit, eximimus: Liquor autem Nervosus, ob viam modo citatam, interdum per se fibras continentes vellit, inque palmas dolorificos ciet, Quod si luctus prædispositio, ac intra fibras plenius aggesto humor alter, sive nutritivus, sive secretivus (nam uterque reus esse solet) minus congener existens, copiose suffunditur, particularum statim omnes extructuræ inter se colluctantur, adeoque mutua effervescencia fibras insigniter distendunt & vellunt, hinc ut ab *istodem* diu & valde contorquas, dolores acerrimi & diu perdurantes inducantur: *Idem*

ibidem p. 251.

APPENDIX.

Cephalalgia supra vicennium durans, Ortum verisimiliter ducens à tumoribus scirrhopis &c. meninges obsidentibus.

ANte aliquot annos ad invisendam Nobil. Dominam, supra vicennium cephalalgia primo intermittente, ac nuper fere continua laborantem accersiebar: Ante secundum ætatis lustrum à febris periculosa convalescens, capitis doloribus interdum sponte, ac sæpius à levi quavis occasione oriri solitis obnoxia evasit: Aegritudo non uni loco aut parti capitis limitata, modo dextrum latus modo sinistram, & non raro totum ejus ambitum infestabat: Durante accessione (quæ raro intra nycthemeri spatium terminata, sæpe per duos, tres aut quatuor dies urgebat) illa lucis, loquelæ aut soni, aut motus cujusvis impatiens, intra cameram atratam, in lecto erecta sedens cum nullo colloquio, nihil somni aut victus capessere potuit: Tandem circa paroxysmi declinationem somno gravi & perturbato succumbere, & quo evigilans melius habere, & deinsensim convalescere, ac intermissionis tempore mediocriter valere solebat. Olim paroxysmi nonnisi occasionaliter accersiti, raro intra x. dies aut mensem, postea dein multo crebrius reperebant: nuper autem raro illi immunis degit: Insuper ob plures occasiones, seu causas evidentes, istædem immanius plectitur. Propter curationem assequendam, seu potius conandam, per totum morbi progressum remedia quamplurima præscripta sine quovis successu: Ab inunctione hydrargyri salivationem diuturnam tolerabati, postea bis à pulvere mercuriali curatio per oris sputum instituebatur: Thermas & acidulas nullo successu probavit: Phlebotomias crebras, semel Arteriotomiam admisit, Fontanellas plures gestavit: medicamenta nullius non generis, nempe cephalica, antiscorbutica, hysterica, specifica quævis famosa, imo & empirica sumperat: Se tamen à nullo uspiam aut remedio aut medendi methodo, quidpiam aut medelæ aut levaminis recepisse profitebatur: quia rebellis & contumax ille morbus ad quævis medicamenta surdus domari recusavit: Porro iste *si in prædictis* pomeria tamdiu occupans, erit cerebri claustra invadere nequiret, attamen quando eam invisi, in quasdam alias nervosi generis partes fines suos explicans, in membris, etiam in abdomine dolores atroces, prout in Rheumatismo ac in colica Scorbatica assoler, concitare cœperat.

S C H O L I A.

IN morbi hujus inveterati abusu logiam si inquiratur, nihil minus suspicari possumus quam cerebri meninges ab initio levius tactas, postea viciu habinale

& indecibile contraxisse: Ab affectus historia liquet primum ejus diathesin à materia morbifica, post febrem male judicatum in caput translatam fuisse: Tunc

Tunc forsan ob noxam membranae illarum, fibrarum totius in tantum laderetur, postea ut in iis humores, scil. tum nervus irriguus, tum alii subinde afflui, ad plenitudinem aggeriti, aut mera aggravatione, aut mutua effervescencia, Cephalalgia paroxysmos excitarent. Tandem vero causa morbifica ob crebros paroxysmos invalescente, videretur quod fibrarum istarum unitas in tantum solveretur, proinde ut Tubercula & Nodi scirrhosi in tota meninge exteriori, sicut in magna eius parte accrescentes, dolores fere continuos,

eosque à levi quavis occasione exacerbari aptos producerent: Talis certe causa invincibilis & permanens, scilicet dura meningis Scirrhosa affectio, pia interim incolumi, Cephalalgia tam diuturna & nondum lethali par esse videretur: Quasunque enim alia de causa si naturæ & medicinae cum morbo conflictus fuisset, longe citius aut circa motus venisset aut vi-

ctoria lata. *Thom. Willis Tractatus de Anima Brutor. part. 2. cap. 2. p. 282.*

§. 2. Cephalalgia continua funesta, ab iisdem Tumoribus scirrhosis, aut strumosis ortum ducere existimata.

Vir egregius x l. circiter annos natus, robustus & sanus, cum per diem inegrum pluvia perperim stillante inter faciens, propter continuum occipitis madorem frigus contraxerat, propediem in ista parte dolorem pari cepit, qui brevi tempore plurimum exacerbatus, ægrum noctes & dies miserrime afflixit & fere semper insomnem derinuit, Ad curandum hunc affectum phlebotomia, purgatio, enemata, vesicatoria, hypnotica, quin & plurima nullius non generis remedia, diligentissime licet adhibita, parum aut nihil præstiterunt. Cum morbus his non obstantibus indies ingravesceret, post seque mensiem glandulae præter naturales tumidae ac dolentes in tota cervice excitabantur, hemierania interim nihil remittebant. Insuper colli tendines plurimum discenti ac rigidi, ei plurimum molestiae fecerunt; quibus brevi motus convulsivi, tendinum subsultus variis in partibus cum delirio succedebant, tandemque æger doloribus & vigiliis attritus morti succubuit.

SCHOLIA.

Et si cadaveris dissecandi copia non daretur, suspicari tamen poterat & pericranium & meningas in occipite cerebellum invadentes, ubi cariores illae ac plurimum villosae existant, primario affectus fuisse, indeque noxam postea in cerebrum communicaram in totum genus nervorum migrasse. In membranis istis dum à frigore & madore transpiratio prohiberetur, simulque fibrarum totius plurimum laderetur, probabile est quod liquor nervus eas irrigans, tum motu præpeditus & stagnans, corpora continentia aggravaret; tum iste in crasi depravatus, cum aliis humoribus affluis efferveret, cumque iis demum coagulatus, in Tumores quasi scirrhosos & strumosos concreveret, adeoque cephalalgia gravidum seminum copiosum jaceretur: Dein postea cum à vigiliis & doloribus perpetuis, magna spirituum inordinatio, & succi in nervis irrigantis dyscrasia ingens produceretur, propterea in cervice concretiones nodosae, teodinum rigiditatis, ac demum in cerebro totaque genere nervoso spasmi & motus convulsivi succedebant, cumque adeo oeconomia animali plurimum labefacta præcordiorum motus perennare nequirit, flamma vitalis exstinguitur. *Mem ibidem pag. 285.*

Ad febri periculosa convalescentia.] De cephalalgia Febrilibus, aliisque affectibus male indicatis suborta sic rationatur Excell. Willis Tract. de Anima Brutor. p. li. c. 2. Iosetudum, *sc.* Socus nutritius cephalalgia peridice causa existit, in quantum scilicet iste sanguini suffusus, & non tunc assimilatus, ob parvas discordes ei turgescens infert: proinde ut calor in capite ebulliens, exuvias suas in meningas, aut illarum partes quasdam prædispositas ingerat, fibrisque adeo in spasmos dolorificos irruat. Propter

hanc causam novi plures, post variolas, morbillos, aliisque Febres aut ægritudines, quibus sanguinis massa vitia solet, cephalalgia quotidiana obnoxios iussit: videlicet totidem à pasta horis, modo citius modo tardius, primo ruboris in facie suffuso, dein capitis plenitudo & dolor eos infestabant; Insuper à vini potu aut alimentis turgidis comestis gravius plecebantur: Morbi accessio ab assumptis magis aut minus distare solet, prope clymus aut paulo post in crasione primum ingressum, aut post aliquantulum in eo moram turgescere locipit. Hæ affectus periculo vacat, & plerumque satis facile curatur: Post totius provisionem leni catharsi, & interdum levi phlebotomia instituta, remedia quæ sanguinis crasi restituant, cujusmodi impetius sunt: Antiscorbutica & chalybeata maxime proficiunt. *℞.* confervæ samariz, tunceti, loquæ ana ʒij. pulv. Aci compos. ʒij. Eboris, oculor. cancri, corall. ppt. ana ʒij. pulv. sant. citr. ligni aloes, ana ʒij. virtiois martis ʒi. salis abssinth. ʒij. syr. de v. radic. q. l. f. Electuar. capiat mane & hora 5. pomerid. q. nuc. castan. superbibendo liquoris seq. ʒij.

℞. aqu. sol. ar. verbenæ, flor. sambuc. sos ʒvj. aquæ limacum lumbic. magist. ana ʒij. sacch. ʒij. me.

Huc medicamenta vasa contra sanguinis dyscrasiam scorbuticam usurari solita accenseri, & bono cum successu exhiberi possunt: Nam cephalalgia quæ in scorbutico ita familiares existunt, sepe numero à sanguinis hominem nutritium pervertentis, & recrecentia sua capitis membranis ingereoris vitio procedunt.

§. 3. De Cephalalgia à vitio Succo Nervi excitata.

Mulier venusta, procera & gracilis, affectibus cephalicis diu & graviter obnoxia, interdum per plures dies, imo septimanas quotidie primo mane somno expectrecta; cephalalgia atroci, eam exinde per tres aut quatuor horas affligente, infestari solebat: Interim & totius capitis gravitate, sensuum corpore & inenris hebetudine afficiebatur, cuiusmodi affectus, una eum dolore velut nube discussa, ante meridiem evanescentes sedum & serenum relinquebant, donec postero mane iterum velut nebula & caligo ἐνέπαυαν occuparent: Pro his sanandis pilulas purgantes, phlebotomiam parcam, velicatoria insuper, Spir. c. e. aut fuliginis cum aquis appropriatis usum præscripsi.

S C H O L I A.

Quod in hac Domina dolores capitis somno succedent potius quam ab eo sanarentur, ratio efficit videtur quoniam in cephalalgia hac matutina, materia morbilica in *Ante Nervum* residet, cuius insignior erudias, & plenior circa caput aggestio mox à somno contingunt: Alter autem huius morbi paroxysmus vespertinus, cum a liquoris nutritii intra massam sanguineam plenitudine & turgescencia pendet, idcirco totidem à prandio horis contingens, nonnisi à somno, qui sanguinis inordinationes sedat, compescitur.

Liquor Nervus intra meningem aliarumque capituli partium fibras aggestus, modo incongruente propria, quatenus acris aut alias degener, fibris improporcionans evadit: modo qua enus cum alio humore, scilicet nutritio aut seroso illuc adhærente efferveicit, partes continentes vellit, inque spasmus aut distentiones dolorificas incitat: Quando ita est morbilicus, vel in tota massa peccans, capiti prædisposito maximam affligit noxam, vel ex se ipso luesens, intra fibras affectus pervertit, ac ita secundario morbilicus evadit: cuius tunc curatio à partium continentium restitutione dependet, nempe si fibrarum debilitates aut conformationes læta emendantes, humor eas irrigans statim culpa vacabit: Quibus remediis partium ad cephalalgias prædispositarum vitia tollantur, mox dicemus: Interea si *humor Nervus* in tota massa dege-

ner, maiorem capiti ad dolorem præparato notam impetit, ejusmodi medicamenta & methodus adhibeantur, quibus ite ad debitam crasim redactas, fibras istas blande trajiciens, parum aut minime irriter: In quem finem nec purgantia fortiora, nec phlebotomia larga aut crebra conveniunt, utpote qua sanguinem & humores exagitant, vitæque arceunt, proindeque nervo liquori peccanti maiorem acrimoniam, celumque imprimunt: Attamen blanda solutiva, & parca sanguinis detraçtio interdum ex usu erunt, quo villosa detergantur, & massa sanguinea nonnihil expurgetur, & medicamentis aliis succellatis via stratur: Pharmaca autem que *Liquorem Nervum* capituli membranis ab eo molestari solitis magis amicum & benignum reddunt, ejusmodi sunt que *Cybalica* vulgo perhibentur, quorum scilicet particule facis activa; simulque tenues & subtiles, sanguinem absque turgescencia aut tumultu trajiciunt: dein *Liquor Nervus* se insinuantes, eum blande actuant, ductusque nervos adeo explicari faciunt, proinde ut spiritus animales corpora queque tum sensibilia tum motiva libentius litadient, etque sine deliquis, spasms aut distensionibus anomalis inspirent. Huiusmodi remedia etsi non semper efficacia existant, attamen cephalalgias qualesdam haud multum inveteratas sepe tollunt; inque aliis, utur pertinacibus, non raro juvant &c. *Willi Tract. de Anima Bruter. part. 2. c. 2. p. 170.*

OBSERVATIO LXXXIV.

Capitis dolor pertinax plerumque sequitur ad membranarum cerebri morbos conformationis.

Plegmonas, Abscessus, Tubercula, Tumores scirrhusos, meningis cum cranio Conformationis, aliosque male conformationis morbos in cerebri membranis excitatos novi: A quibus imprimis per longum tempus cephalalgia frequentes ac immanes, ac deum affectus soporosi ac lethales inducebantur: morbi causa nonnisi post mortem, per Anatomiam detecta: Et quidem suspicari fas sit Capitis dolores inveteratos & pertinaces, cum frustratis omnibus remediis frequentius redeunt, & in dies fæviore evadunt, à tali causa invincibili pendere. *Th. Willi Tract. de Anima Bruter. part. 2. cap. 1.*

S C H O L I A.

Dolorem capitis in Accidentalem sive Occasionem dividimus, & Habitalem: Prior sine procatarxi aut dispositione prævia, à causa evidenti solitaria excitari solet, crapula, insolatione, exercitio vehementi: item in febrium paroxysmis, cephalalgia fere quibusvis hominibus contingit: quatenus nempe sanguis, plus solito incitatus, ac immodice ebulliens membranas, quas pertransit, valde inflat ac distendit: quinimo secum & vapores ab eo tunc efflu-

vente copiosius immixta, & in membranas irrudent, fibras nervas vellunt & irritant: *Habitalem* procatarxi aliquam sicuti affixam habet, propter quam vel constantem vel crebro molestus est, ita ut quandoque licet intermittat, sæpe tamen iponte redeat, ac insuper à levi quavis occasione excitetur: Hic autem sive continuus sive intermittens fuerit, neque semper neque tantum, pro causa conjuncta Sanguinis aut Serii suffusiones aut evaporationes nimias habet, ve-

E rum

rum insuper partis affectæ, aut affici solitæ, semper mala procataxis, seu prædispositio quadam affigitur, ob quam & causæ prædictæ, item præterea Liquevis Nervosi inædinationes ejusque cum sero sanguineo, vel succo nutritio congestus & effervescentie dolorum paroxysmos elient.

Procataxis cephalalgia licet multiplex fuit, a-
tamen ad eam constituendam hæc duo, nempe aut
alterum, aut simul utrumque præcipue ac fere semper
conducunt, nempe 1. *Partis afflicte mala aut debilis
constitutio.* 2. *Dein properea factus & promptus materia
morifica in illa congestio.* Quoad primum, Capitis partes
doloribus obnoxie sunt fibræ Nervæ ad membranas,
tendines, carnes musculolas, aliæque corpora sensi-
lia pertinentes, quarum apparatus morbidas in earum
mala conformatione aut debilitate consistit: Ex his
priorum quandoque innatam & hereditariam esse in-
de constat, quia morbus à parentibus sæpe ad liberos
traducitur, idque ea potissimum ratione fieri videtur,
quod integumenta capitis debilo crassiora aut con-
strictiora facta, nec humores nec vapores facile tra-
jiciant: quare ab his cohibitis, illisque in mora præ-
peditis & aggelis, meningis, pericranium, aliæque
partes sensiles, aut insensiles nimis, aut inflatæ, aut
vellicatæ dolores accipiunt: Cui accedit quod inter-
dum propter cerebri intemperiem originalem, hu-
mores aut vapores circa partes ipsium concenterantes
varie congeriuntur. 2. At vero longe sæpius accidit
malæ conformationis visio, quibus hæc vel illic par-
tes capitis ad cephalalgiam disponuntur, de novo
constant, idque vario productionis genere; quippe
nonnunquam à frigore, ob statum borealem, nives
contractæ, in aliqua capitis regione cutis pori, quin
& ipsæ fibræ nervæ ita constipantur, aut alias per-
vertuntur debilitanturve, ut nec aeris externi occur-
sum, nec sanguinis vel humorum agitationes quas-
vis patiantur, quia Cephalalgia statim oritur.

Nec minus raro propter inordinationes in sex re-

bus non naturalibus, prædispositio cephalalgia induci
solet: Enim vero sanguis ob quamlibet causam supra
modum incitatus, aut ebullitiones sua nimia, aut seri vel
vaporem inflammatione, partibus quibusdam nervis
continui solutionem, aut aliummodi noxam impet-
nit, propterea ut cephalalgia mox præteris, ac in-
posteriorum diathesis eam à levi quavis occasione sus-
ceptura excitetur: Ceterum à passione vehementi,
à crasula, insuper à capitis ictu, vulnere aut con-
tusione, dispositio cephalalgia non facile debilis,
crebro inducitur, proinde ut humores aut proprii
aut extrinseci, in his congesti & stagnantes, pos-
sint aut per se commoti, aut cum aliis succis insulis
effervescentes, inflationes aut vellicationes dolori-
ficas citis: quoniam plegmonas, abscessus, aliæque
in hysteria narrata excitata novi: 2. Nec tantum ma-
la conformatio de unitas soluta, sed etiam mea in-
terdum debilis, sive enervatio quasdam capitis par-
tes cephalalgie obnoxias reddit: Cum enim fibræ
alicubi ita infirmantur ut nec proprium humorem
ipse regere, nec alienis incutibus resistere valeant,
pars sic disposita à levi quavis occasione in conturba-
tiones dolorificas agitur: hujusmodi fibrarum debilitas
nonnunquam externa accidentia ut frigoris & caloris
excessus; quandoque item errata in victu, prout cra-
pula, ebrietas, & impemis somni meridiani, insuper
ingentes causerit, & seri acris decubitus longiores
interire solent.

Hæc de cephalalgia procataxi primaria, quæ &
fixa & radicata est: Altera ejus ratio secundaria &
mobilis, consistit in materia morifica citra partem
prædispositam prompta ac facili congectione, à qua
dolorem paroxysmi ac solutus dependent: Materies
autem cum multiplex fuerit, multifariam congesti &
dolores diversis afficiendi modis excitare solet: De
illius materia specibus vide inferum. Th. Walsley de

Anna Bræ, part. 2. cap. 1.

p. 146. &c.

OBSERVATIO LXXXV.

Capitis dolor à putredine dimidiæ partis cerebri, Pure & aqua in ventriculis. &c.

Quidam ab equo vehementer calce percussus in capite, vulnus accepit ad cranium
vix penetrans: Ab initio conqueustus est de capitis & colli intenso dolore: Aperto
mortui capite invenimus putredinem dimidiam partem cerebri occupasse; In ventriculo
lateralis & medio plurimum tum puris tum aquæ, subrubro colore tinctæ vidimus, Dura
membrana fuit integra &c. Vide l. 4. Tit. de Vulnribus.

SCHOLIA.

Dimidium partem cerebri] An cerebri substantia do-
leat: hoc libro disquiremus: Id vero sentite,

quoniam obrute, ex eo ostendit Remedeum quod qui
vulnerati sunt frigus usque ad medium cerebri sentiant.

OBSERVATIO LXXXVI.

*Intolerabili capitis dolore in quodam affecto à diuturna lue, Cerebrum pene consumptum
reperitum est: Cerebri atrophie.*

IN Xenodochio S. Petri & Pauli, Andreas Lippeneus, scortorum amantissimus & per-
ditissimus, post diuturnum morbum Gallicum, variæque symptomata, tandem in crude-
lissimum capitis affectum incidit, cui nullæ auxiliatrices manus profuere, dixit quater re-
perita, his suffumigiis factis, & quinquies inunctionibus administratis: Nilominus noctu diu-
que, sed tamen magis noctu cruciabatur, ut frequenter manus sibi violenter inferre tentaret:
Demum

Demum empiricus quidam dolotibus quasi enecato agro & veluti desperato, nobis nescientibus, pisces, tenchas vulgo dictas, plantis pedum alligavit, & fere per totum diem ac sequentem noctem detinuit: At paulatim viribus animalibus & vitalibus in tanto cruciatu deficientibus, hanc miserrimam in meliorem consummutavit vitam.

Quod defuncto, facta est dissecandi potestas: factis ergo necessariis sectionibus, cranio setta oculoalutina aperto, & à suis membranis, dura & pia matre liberato, Nihil cerebri in toto cranio reperi, præter quandam mucositarum & phlegma valde indigestum, quod vix quartam cranii cavitatis opplebat patrem: Interim tantus fœtor ex pedum plantis, quibus admotus fuerant pisces, emanabat, ut nulli assistentium ibi adesse liceret: Unde raptim aperto abdomine, festinanter visis intestinis & naturalibus visceribus, cadaver sepultum: tradendum reliqui *Ex observ. D. D. Garneri.*

S C H O L I A.

Increta non parum disputatum est an cerebrum à morbo Venereo & Venere consumptum? an vero à piscibus pedum plantis admodum, per spinalem medullam & alios nervos attrahatur, necne? D. D. Nicolsonus S. Michael, alias Comaicus, assererat credibile esse cerebrum à morbo & Venere consumptum fuisse, potius quam à piscibus illis attrahatur, propter infinita obstacula quæ in piscibus ipsis, per quæ ferri debet ipsum cerebrum, reperiuntur: Ex adverso quidam affirmabant ipsos pisces summam vim inesse attrahendi, nec proinde mirandum, cum experientia doceatur quotiescunque multam inesse vim rebus, quarum rationem assignare aut reddere non valeamus: Quare liberum fuit credere quod unicuique secundum experientiam placuit. *idem.*

Sententiam avantissem in studiosissimum capituli affectum inquit. Cur Venus nimia tam acre cerebro bellum indixerit eleganter demonstrat Excell. *Wilius de Anima Brat.* part. 1. c. 7. Humor genialis, aut, non uti Hippocr. olim asseruit à cerebro in partes spermaticas deferat: nulli enim peculiare ductus hæc corpora longissime remota interjacet, sed proculdubio ipsa multa sanguinea nobilissimam quandam sui partem in genitalia acque ac in cerebrum dimittit: Quamobrem ad testes cum nulli pertingant nervi, illac arterie insignes admirabiliter per ductus vacuos & crebras venarum insculcationes conformatae mirantur, in eum nempe finem ut sanguinis purissimum florem, quali per tortuosos alambici canales, longissimo ductu destillatum, proindeque maxime subtilem & elaboratum in illas partes deferat: Huius quod superfluum est, aut minus defecatum, non tantum venæ excipiunt & redaciunt, sed insuper quoniam à multo spiritu, magna laxositate (qui semper pro vehiculo est) quantitas ceduntur, id circo lymphaductus quoz plurimi ob his partibus plinquam ab alia quavis producuntur: Quod autem larga humoris genialis

dispendia cerebro ac nervis valde officiant,isque debilitatem insignem afferant, ratio est, quoniam sanguinis, ut seminis, ad speciem propagandam destinati, jacturas reficiant, quicquid sui pretiosissimum est illuc confert & impendit, interim ut cerebrum debito penu defraudetur, maximis spirituum copiis in corpora spermatica delegatis: Quinimo sanguis cum è proprio penu generalibus suis impetire nequit, tibia sua à cerebro aliisque partibus remanda aut rapit, ut illic impendat, non raro item totius animæ ac corporis vires, ad vesanam inaneitatem venetis explendam insumunt, arque in his desideris unusquisque, vel imperitus, de flamma queritur, & non tantum sanguinem efflagrare, sed glisciente magis incendio, medullas autem perferit: non raro item carnes, vilicæ & ossa concernari inque putredinem redigi experitur.

Nihil cerebri &c. J. Cerebri consumptionem Hippocr. eleganti vocabulo *aisiomy* vocat, his familiarem qui perniciatius res & cogitare & tractare: Inde enim licet & defecatus reddunt, & sic, marcescit & *aisiomy* putrit; quod ne facile contingat cautum est à natura, quæ glutinosa substantia id donavit: Quinimo ejus substantiam plane distinctam ab aliis competunt, Si fides *Valerius*, *Corpo* aliisque habenda: Næ, *Festus* Amsterodami anno 1639. puerum sine cerebro se vidisse asserit, cujus locum, ut & spinalem medullam, aqua limpidissima membrana inchoia occupabat: A nimio venetis aut immixtum observavit cerebri substantiam *Exc. J. D. Morlius*, ut testatur in Epistolis: Id autem venetis intemperie, nec non totum nervorum genus, lardi, aurorum testimonia corroborant: *Salmon* cent. 1. observat. 64. se novisse quendam viri cui ex nimio venetis unum cerebrum ita fuit exsiccatum ut etiam intra cranium hinc inde ferri possideretur.

OBSERVATIO LXXXVII.

Hemicrania sinistra lateris ob carotidem dextram intra cranium ossam factam.

Defuncti caput aperui, in quo dum quæ ad *enclapsoy* pertinebant lustramus, carotidem dextram intra cranium emergentem, planè ossam, seu potius lapideam (cavitate ejus ferè in totum oclusa) invenimus, adeo ut sanguinis influxui hac via denegato, mirum videatur quare æger non interierit apoplecticus: at mens & functiones animales ad finem usque vitæ integre fuerunt: Contra illud apoplexiæ periculum natura remedium satis aptum substituerat, nimirum ex eodem latere quo carotis defuerat, arteria vertebralis tubulose aucta, pari sua alterius lateris triplo major evaserat: quippe sanguis carotide exclusus vertebralis solito vertigali scitè insuper addens, & duplicato huius in eundem alveum

E 2 influens,

Influens, arteriæ istius canalem ita supra modum dilataverat. Vitæ egregius circa initium ægritudinis suæ atroci capitis dolore, *juxta latus sinistrum*, torquebatur: cujus causam nescio an probabilior assignari possit quam quod sanguis carotide dextra exclusus, cum primò in sinistram impetuosius irrueret, membranam distendcrat: idcirco idem affectus postea sponte evanuit, nimirum *sanguine superfluo per arteriam vertebralem derivato*. Th. Willis Cereb. Anat. 7.

S C H O L I A.

Hemicrania.] Propter quam causam dolor magis unam quam alteram capitis partem exerceat? Respondeo 1. Hemicrania magna ex parte fit per consensum, ut ea tantum pars laboret quæ est directio partis laborantis. Ideo lib. 2. de compos. medic. sec. 1. cap. 5. dicebat Galenus in Hemicrania dolores fieri ascendentibus vaporibus &c., quasi vellet per consensum fieri. 2. Caput aliquando passum est aliquid extrinsecum, magis in una quam in altera parte: Sic ubi ulcus, aut externus lacerus caput magis in una quam altera parte fuerit, hemicrania fieri solet: 3. Aliquando per multos annos caput universum doluit & tandem in hemicraniam desit: Potest post diuturnum dolorem fieri abscessus qui succedat in una tantum parte, unde liberatur una pars, causa doloris remanente in altera: nam illa materia quæ erat quasi fermentum, ubi colligitur in unam partem, liberat alteram; quod conrigit Episcopo Phocenfi Polono, ex angina enim hemicrania facta est, cum dolor antea esset totius capitis: *Hæc Saxonia Pambis lib. 1. cap. 2.* Galeni sententia Hemicraniam fieri per consensum &c., intelligenda est non simpliciter, sed quod ut plurimum. Nam quid prohibet fieri per essentiam, cum ambæ tunicæ in duas velut partes simul cum cerebro, per medullæ calvarie longitudinem, ad amissim distemper sint? Si ergo affectus in una saltem illarum parte vel latere consistat, medium quoque tantum latus ca-

pit is dolore afficiatur necesse est;

Juxta latus sinistrum.] Ad superiorem processum, Falcem ab Anatomicis dictam, nonnulli referunt quod hemicrania nequaquam caput tenet, cohibita scilicet vi dolorificæ causæ ab hoc intestepimento, quo minus utrumque latus occupet, At falluntur hi graviter, cum hemicraniam non internas subeant capitis partes, sed foris temporales musculos obideant, humocibus biliosis irascibilibus. *Apuleius Anat. lib. 10. c. 3.* Hippocr. tamen lib. de morbo sacro, rationem ab ea membrana cerebri differentiant deducit, cur modo dextra modo sinistra pars doleat, cerebrum, inquit, homini, ut reliquis animalibus, duplex est, cujus mediam tenais membrana dividit: Ideo non semper eadem capitis pars dolet, sed singillatim utraque, incedum vero totum.

Sanguis superfluo per arteriam vertebralem.] In quantum sanguis, aut serum ejus, modo per omnes simul arterias, scilicet tum carotidas tum vertebrales: modo seorsim per has aut illas, aut symbolas aut oppositas noxam in meningas transfertur, hinc fit quod dolor interior, aut universalis sit, caput totum aut: maximum ejus partem infestans; aut particularis, qui regioni cuidam private limitatus, Hemicraniam modo in latere, modo in fincipite aut in occipite producit. *Idem Pract. de Anim. Brut. pag. 1. cap. 1.*

OBSERVATIO LXXXVIII.

Atror capitis dolor ab arteriis carotidibus induratis: Aquæ collectione sub pia matre, & Arenulis in Glandula Pineali.

ELizabetha Joppen per 25. annos intolerabili capitis dolore cruciabatur, qui dum primo alimenta masticare inciperet, vel aura tempestuosa adveniret, ita exacerbabatur, præsertim in latere dextro, ut lacrymæ fontium ad instar ex oculis erumperent, ac ejulari do mesticos & vicinos defatigaret: Ad inauditi hujus capitis doloris ablationem plurimum Medicorum auxilia frustra imploravit, & tandem 9. Martii, anni 1669. ex hac lacrymarum valle ad superos migravit.

Aperto ejus cranio invenimus 1. sub pia meninge magnam quantitatem aquæ limpideæ. 2. Ventriculos cerebri simili liquore repletos. 3. In glandula Pineali plurimas arenulas asperas, quarum aliquæ calculi nomen propter magnitudinem merebatur. 4. Arterias carotidas, curiosissimo spectaculo, ita induratas offendimus, ut externa facie calculosas, sive in lapideam substantiam mutatas eas judicaremus: sed illis apertis, observavimus carum lateribus materiam callo-lapideam accrevisse: Per hatum arteriarum medium sanguini adhuc quodammodo concedebatur via. *Ex observat. Regneri de Graaf Med. Delfensis. in Miscell. curios. anni 1670.*

S C H O L I A.

In glandula Pineali.] Cartesius ejusque sequentes existimant glandulam hanc Animæ sensitivæ sedem esse; sed præter varia argumenta quæ contra nobilem hunc usum afferri possunt, areculam in ea reperiatur copia ostendit villosi officio destinam esse, cum nulla læsio sentiam internocum hic contingeret, quæ sine dubio emerisset ab ejusmodi extranei corporis præsentia.

Magnam quantitatem aquæ.] A seroso humore induci cephalalgiam palam est: Senem autem non pum putata aqua est, sed vehiculum salis & tartari humoris, qui in casu præfenti subtiliter & conerexit in calculos in glandula pineali; lateribusque arteriarum carotidum accrevit, aquæ parte per lacrymas effluente.

Ita exacerbatur &c.] Gal. 1. de diff. feb. causam præ-

OBSERVATIO XCI.

Capitis dolor à crassitie cranii, Sutararum absentia, & Aqua multa in ventriculis cerebri collecta.

Generosa quædam mulier, (vide historiam l. 4. de Febribus) in gravissimos dolores incidit circa ossium nudam, præcipue articularum, regionem, cum capitis intolerabilibus cruciatibus &c. Huic capitis *cranium crassum* inventum, atque integrum sine futuris: ventriculi in cerebro aqua limpida pleni. *Platerus observ. lib. 2. p. m. 503.*

S C H O L I A.

Inolerabilibus cruciatibus] Quorum origo adscribenda cranii densitati & suturarum defectui: Nam cum, ex Galeno 9. de V. P. cap. 1. cerebrum abundet excrementis crassis & tenuibus in eo genitis: defunde etiam vaporosis in illud è subditis partibus ascendentibus, illa si intercludantur, crassus neque per nares & palatium exeatibus; neque vaporosis per suturas transiit auribus, dolores inde fieri necesse est: Conspertum præterea eos quibus duplex accessit à natura furata lambdoidea, à doloribus. in totum fere immunes esse, necnon eos quibus sagittalis os frontis ad nares usque divisi.

Cranium crassum] Crassities cranii non est in omnibus eadem: Periarum leviori ictu lapilli pertunde-batur, secus ac Ægyptiorum: Hiispani, teste A. Cadamusto, ducturi novos milites in insulam D. Thomæ, vicinæque Æquæ soli loca, id in primis inescalabant ne eum in loco consistantur inquam ipsorum caput perirent, quod quies proximis distulirent: Crassities in deliciis mediocris est, evidentior in durioribus habitibus. & præcipue rusticis, quod in cerebationibus observavit Carpus, comm. in Mundinum p. 310. qui causam hujus rei refert, quod delicati caput semper bene cooperiant bisetis & pileis: rustici autem per frigora & zibus nudo incedant capite, frigus vero omnia inducit: Propterea monet idem Carpus patres familias, ut liberorum suorum capita non tegant multis operimentis, ex ea enim modestate sacula corroboratur, & exercitii injuriis ferendis assidua evadit. Hoc observant Patavini, quorum liberi portantur nudo capite per plateas, etiam media hyeme: pueri incedunt per hyemem nudis capilibus, æstate eadem muniant pileo adversus Solem: *Ralskius Diffinit. Anat. l. 1. c. 9.* Sed si à frigore confirmatur caput,

quia id ducit cranium, an verisimile huic mulieri cranii crassitatem doloris causam exiisse? 2. extraordinariam fuisse illam crassitatem, accedente forsan nimia densitate & summatum absentia: 1. Cranii illam indurationem adversus causas extrinsecas caput præferam tueri, intrinsicas vero potius cohibere, in his præsertim quibus insignis vitium est partium æconomix naturali interventum, à quo plurius redundat excrementorum illarum, quæ depulsum in prædicta muliere: atque huic suppresse impu aut. aquæ congenies in cerebri ventriculis, dolorem ingeminant, quod plures ad cerebrum vapores laici sin quam ut exhalare, ab interclusis vias, possuerint: Quæ de causa, notant *Craniæ Encheirid. Anat. l. 6 c. 6.* Naturæ duplicem calvaria tabulam in mulieribus tenuiorem quam in viris esse, quod excrementorum congectione magis oppugnantur sint.

Integrum fuit sutura] Patavus ex Herodoto scribit Æthiops, &c. qui regiones calidas circa meridiem incolunt, cranium densius habere, nullis aut parvis suis is discretum. Quod falsum esse docuit Æthiops nigerrimus publicæ, à Rustici discipulis, cujus cranium natis procul erat consimile. *Eubert. Anat. lib. 5. c. 6.*

Cranium crassum] Ea de causa capitis dolores qui per insignes febrium intermittentiam paroxysmosprehendunt, his declinentibus, post aliquot horas perseverare solent: Materia scilicet tardius dissiliensque resolvitur & declinatur propter cranii densitatem in capite, quam quæ per corporis habiū effusa est: Hac quippe nota caput per consuetum laborem & deprehenditur, quod adhuc frequenter reperit & eod. alterius intermento invalescit, illiusque remissione & afflicti sublevo miraculis vel levatur.

APPENDIX.

De immunitate à dolore Capitis ob cranii tenuitatem & perviam substantiam.

Anno 1596. dissectuit Fabricius Hild. caput detruncatum; cujus cranium in vertice vix papyrus crassitie æquabat, ubique instar ossis cribrosi perforatum: cutis, quæ extra cranium spiraculum, seu caminum illum cooperiebat, flavens fuit: Hominis robustissimi caput vix unquam dolore affectum fuisse existimat, ita ut ad extremum senium perventurus fuisset nisi prævenisset mors violenta: Ut à mortuis ad vivos transfusum, neque procul discedam, si conjecturæ locus est, maximam aut cranii tenuitatem, aut laxiorem suturarum in me suspicior copulam, aut utramque simul: Non semel contigit in Sacris ædibus, si sol tergum feriret, ut in opposita exhedra umbram excipiente; monentibus vicinis, manantem è capite, non secus ac è camino, manifeste suum animadvertentem: Hinc ante tricesimum annum vix cephalalgiam expertus sum; quæ deinceps molesta, frontis ambitu comprehensa fuit, eaque fugax, ab oblato ventriculo alimento coctionem celerem respiciens: At naturæ id beneficium, quo causarum intus genitarum vim eludo, externarum efficaciz opportunum reddit, minimum enim frigoris appulsus percipit caput, modicis tamen operimentis contentum, effi capillitio jam pridem nudatum: Ejusdem verò raritatis, aut tenuitatis, insignie hoc esto argumentum, quod cum adolescens udm capillitium ride odorati

odorati pulveris aspergine exsiccarem, paulo post ejus odor in os redundaret, non secus ac si illum deglutissem, cibique ingesti ea saporati mihi viderentur.

OBSERVATIO XCII.

§. 1. Dolor Capitis à Suturaum Dissectione.

Solutio continui contingit aliquando in cerebro à causis internis, ab humoribus nempe biliosis aut salis & rodentibus: aut ab humorum & vaporum copia, qui *distendendo dissolvunt contiguum*. Vera autem tanta est aliquando ut junctura solvantur magno spatio, auctore Aëgineta. Quod vidimus anno 1593. in filio Domini Merindoli Aquensis, E cujus capite dissecto effluxit ingens copia serosi humoris, qui in ventericulis & tota cerebri substantia inclusus manebat: Distabant autem suturæ: quatuor fere digitis à se invicem. *Jacobus Fontanus prælica lib. 1. cap. 3.*

§. 2. Anno 1622. quo ingressus pestis in Polonia grassabatur, tanta fuit ejus sævitia, ut in de mortuis rumpereutur & suturæ divisæ apparerent:

S C H O L I A.

V*Junctura solvantur magno spatio* Non pauci Suturaum ejusmodi distractionem in dubium revocant: 1. quoad exemplum à Fontano adductum, de pueri hydrocephalo, ajunt Hippocr. illam in hydrocephalo non adnotasse, nec fieri posse credibile, nisi in puerulis & nuper natis, in adultis nullo modo. In aliis etiam affectibus id fieri posse pariter dubitant, nimis enim firmiter combinari oisaper suturas: facile quidam in discontingere posse si modo fere ubique modo committentur, sed si mihiorem esse compagem, ita ut nulla vi in desinctorum, vel natural vel violenta morte, valvulis, & nonnulli rupis folliculis & teculidicis separari queant. In cæmeteria vero cum hæc extremitates sunt læsæ, dehiscere sua sponte: Vulgi autem opinione quod atinet, lenius in vinculo ioceto dolorum, per accidens hoc fieri ajunt, quæstus a valida illa constitutione sensus incipit & pars ipsa stupore corripitur: Sed auctoritatibus & rationibus non pugnandum contra Senius.

Qui autem sunt veri rati quævis falsæ sit omni. Neque virosum arte insignium suspecta fides esse debet, quibus accedit Hilidanus, cujus *perceptio* insignis, ac imponentibus parte arduum fuerit, Resertis cent. 2. obs. 1. scilicet hoc oculi tumore affectum quemdam, antea dolore & capitis gravissimo laborasse, & cerebri motum ab attritancibus perceptum fuisse, in conjunctione suturæ sagittalis & coronalis: audi os etiam sonitus & cranij erepationem, perinde ac si lignum funderetur, Existimat id factum quod cranij suturæ, ob dolorem & inflammationem, copiosumque in cerebro humorem, disjunctæ fuerint. Quanquam vero ipse *fabritius* hoc in casu non fuisse oculum testis, eadem tamen observatione narrat observasse se in honesto viro, laborante ex febre ardente cum dolore capitis acutissimo, illum habuisse suturas adeo disjunctas, ut per insertionem illud systole & diastole facile deprehenderentur, idem illius centuria 2. obs. 7. in Th. Houlen. febre continua cum intenso dolore capitis sistito, circa sextum & septimum diem, suturas sagittalem & coronalem adeo à se invicem separatas deprehendisse ut adstantes cerebri, suturis digno impoitis, eodem præritus modo ut in pueris, antequam eorum cranium penitus obsideret, facile percipere possent. Nec alius Medicis fractus ejusmodi capitis dolor: Ita de po L. *Jussur* cap. 9. de cap. affectibus, Tannus, an, quandoque etiam capitis ut oculos extrudat aut habuerat: Fit sane ex capitis plenitudine, quæ, imp-

diente calvaria, nec expurgari nec resolvi potest: idque separatim fit Suturaum, quam ego semel observavi in fronte cujusdam puellæ, cui unius lateris os alterius superabat latitudinem, post diuturnam in infantia cephalalgiam: Firmat Excell. *Thomas Bartholinus* centur. 2. obs. 21. in cephalalgia, ingens, taphus loco moveatur suturæ, quod in viros quidam animadvertere patens *Gaßus Bartholinus*: In Hibernia fit quænter suturæ in adultis, modo coronalis modo sagittalis dividuntur, sequiturque dolor capitis ob resolutionem meningis: Apud antiquiores Medicos monumenta ejus extant: Interdum accidit, ait *Orbafius* monente *Montano* Anasceves morborum l. 1. c. 9. capitis dolor ab apertione suturarum: Sanguis vero ligaturæ que cephalica dicitur, & ceterentibus Sutura in suum locum cessat dolor: Ipsam Galenam *sub finem* comm. 3. in officinam Hippocr. asseritorem habemus, qui suturas, quamvis sint acutissime confectæ in viventibus, tamen facile interdum hiare pronuntiat & dolorem moveret: Imò Hippocr. ipsam, qui loc. cit. *inopiam* adhibet, quo hanc ossium *discur*, atque hinc natum dolorem, sinit. Et Gal. de locis c. 7. *supra* *discur* meminit ex Archigene, in cephalalgia circa phlegmonem, que compressione sua assilum humanum & vaporum ad caput impedit: Interdum enim vapor seu flatus ex pituita viciata, copulis membranarum, pericranij scilicet & dnræ matris, inter suturas inherente generis, ita crassus & validus est, ut præter insignem dolorem, etiam copulas illas membranarumque distendendo, compages suturarum cranij relaxet: malo huic mulieres non inapte falsis caput vinciendo moderantur. Fieri censetur ex capitis plenitudine, quæ nec expurgari nec resolvi potest, adeoque sit separatim suturatum, unde *Intensum* & vehementissimum dolor, quem Hipp. 2. Coac. 1. tom. 1. vocat *ἀλγος σίμπερ*, & *ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*, qui nonnunquam tantus est ut oculos extrudat: Hunc annotat Avicenna lib. 3. canon. sect. 1. et 2. cap. 2. Soda diversitate secundam fontitudinem, mediantem & debilitatem: Fortem delineat his verbis, Sed cum alia est valde fortis, ita cum obviat suscipiri infans, lenia habemus ossia, separat ipsam & frangit committitur ipsius. Quia vero accurate de hac specie doloris agit *Arulius Pontius Tricassus* de affectibus omnia capitis 4. integram hoc asserere libuit.

Frequens est in Hibernia ut capitis ossia à se distendant, ac notabili spatio dehiscant, præcipue in sagittali, idque à

OBSERVATIO XCIII.

Cranium ætiosum & crassissimum in quodam, qui nulla vi externa facile ladebatur in capite, nec unquam à causa externa dolebat.

Cum Paravii Medicinæ operam daremus, plura cadavera dissectimus: Cum multa in his rariora observare licuere, tum illud singulare in bajulo advertimus: Hic cum videret nullavi externa facile ladebatur in capite, nec unquam à causa interna dolebat, etsi plerique prodiderint cephalalgias his maxime familiares occurrere quibus cranium ætiosum (vapores ex inferioribus suscepti promptim non transmitteret:) Altert sane Celsus, 11x. 1. Raro calvaria solida sine sutura est, loci tamen assueti facilius invenitur, & id caput firmissimum atque à dolore tutissimum est: ex ceteris, quo sutura pauciores sunt, eo capitū valetudo commodior est. Nimirum quod causas externas attinet, has enim, ut frigus ætæis, solis æstus & cæteras non facile admittit. Vnde distinguendum parer, nam internis eventandis ad transpirationem insensibilem, quo plures & ampliores, eo etiam commodiores existunt futuræ. G. H. Velschius Observ. Phys. med. hecæstora 1. §. 77.

S C H O L I A.

Nec unquam à causa interna dolebat, &c.] Hinc patet verum esse quod ajunt, Quamlibet regulam generalem exceptionem aliquam pati. An immunis cephalalgia sicut iste bajulus ob robur facultatem naturalem & vitalium, probamque constitutionem organotum, quæ superflua nulla congeri & redundare permittere, sed potius & perpetui in corpore eliminantur. accedente maxime valido exercitio, cuius ope hæstus & fulgines in toto, unde molestia & dolor alius capiti imminet, assidua transpiratione extrapellatur? Adde, si genus hominum curis & studiis animum non gravare, vapores ad caput allicientibus,

qui nisi per sinuras exitum nanciscantur, id repellent & dolore afficiant: hinc senes, quibus per ætatem pressus comminuntur, humidiores sunt cerebro, gravedinique obnoxii, à cohibitis illis vaporibus, quibus antea liber transitus, sursum hiantibus, concedebatur, accedente illiberali per habitum stuporem: Cranium eorum qui æstuosas regiones incolunt, sursum eætere ait Hippocr. lib. de structura hominis, nec ideo cephalalgia obnoxia tradit, quod facili per ambium corporis transpiratio, congestione fuliginum in capite animi præcipiat.

OBSERVATIO XCIV.

Ingens capitis dolor ab ossis sincipitis dextri carie & Suturis oblitteratis.

Heranum usque, sine tamen huius suspitione, serpsit, ut incredibilibus doloribus capitis mors lenta succederet.

Cranium defuncti accuratius consideravi, os sincipitis dextrum, à sagittali sutura ad temporalem, profunde caries corripuit, excavata prima lamina, & secunda transparente: Ex serpente carie reliquæ partes externæ utriusque bregmatis, asperæ & inæquales sensibus occurrunt, foraminula multa sunt pervia, præsertim ubi venæ transire solent: Prope lambdoideam caries bregmata separavit & manifestiora foramina hiant: Secundum cranii longitudinem diffunditur caries, salvi, ossibus temporum, quod in cranii cavitate clarius apparet: nam os infinitis porulis ab osse sincipitis ad cristam, quasi acu diligenter pictum cernitur: Oblitteratæ fere sunt suturæ sagittalis & coronalis, quanquam in homine, necdum senium prospectiente, ut mirum non sit quod internis injuriis expositus fuerit, ob impedimentum vaporum exitum. T. Bartholinus histor. VII. centur. VI.

S C H O L I A.

Ingenus capitis doloris] Contrarius videtur Celsus lib. 8. c. 1. quem ad concordiam revocant Fallopius, Columbus, Riolanus: Per transiensis noto textum Celsi ita emendandum esse à P. Paravio in codice, Et id caput

firmissimum atque à dolore tutissimum est ex ceteris, quo suturæ pauciores sunt, & quo capitū valetudo commodior est. Patet ibidem in margine Celsum scripsisse, Adeoque non à dolore. Item.

OBSERVATIO XCV.

§. Capitis gravado à carie ossis frontis, & lesione superioris orbitæ.

Quidam Gravedine capitis afficiebatur, tandem subito in cataphoram lethalem incidebat. Patefacto defuncti capite, reperitur os frontis carie confectum, aliqua tantum ex parte, cerebro salvo ac ejus integumentis integris. C. F. Schneid. de aff. cap. Soporosis.

OBSERV.

OBSERVATIO XCVI.

Capitis dolor à carie cranii parte interna juxta cerebellum.

Iuvenis diu capitis dolore vexatus, tandem ab Epilepsia vehementissima extinguitur. Diligenter calvariae osse, in posteriori parte extenta, perspecto, nullum ibi morbi signum fuit; quo perpetuo dolebat, ac capite aperto, ossis posterioris interiorum partem, juxta cerebellum cariem satis notabilem contraxerat. *Zecchius consult. I. X.*

OBSERVATIO XCVII.

Capitis dolor à Carie cranii ex adhesionem cum membrana.

§. 1. **Q**uidam diuturna cephalalgia mitè torquebatur. Omnibus in cassum tentatis, quatuor vesicantia ceryci & scapulis affixa plurimum profuere: pilulis deinde Cocculus irritata alvo, quum tamen deiecit, dolor aliquantulum remisit, qui tandem hypocausto cessasse visus: Graviores autem fuisse mali causam paucis post annis docuit eventus.

Inopinatus enim bidui dolore quum succubisset ille, aperto cranio, cerebri membrana glutinosa humore obrita, quibusdam locis vix avelli potuit, osse passim carie corrupto, qualem in aliis cadaveribus deprehendi: unde hic infestati Venerea, sive admodum capitis dolentibus ab acri & venenoso humore nonnunquam excarnificantur. *Rhodius Centur. I. Observ. LXXIV.*

S C H O L I A.

Cerebri membrana Cum dolor omnis sit actio laesa, sive sensio molesta, à fibrarum nervorum spasmo sive contortione dependens, cephalalgia subjectum erunt capitis partes maxime nervosae, h. e. ipsi nervi, necnon fibrae & membranae, quales illas plures & maxime sensiles, tum supra tum infra cranium dispositas obinet. Sunt autem ejusmodi partes quae dolore afficiuntur, imprimis duae meninges, ceterumque varii processus, Nervotum tunicae, Pectinatum, aliisque perforata, muscoli, panniculolus carnosus, ac ipsa denum cutis: Quoad cerebri verò & cerebellum, eorumque appendices medullares, statim huc corpora, siquidem fibris sensibilibus, corrugati & distendi apti sunt, dolorum immunitate privare. Idem patet de cranio dicendum erit. *Idem de Anima Inst. part. 2. cap. 1. p. 144.*

Fibras autem Nervos immediatum Tactus esse organum statuit *Idem* parte 1. cap. 11. Si inquiratur, aut, quid in singulis aut membris aut partibus immediatum Tactus organum fuerit? Dicendum est illud ipsum esse *Nervos* spirituum animalium copia ubique repletas & quasi distentas, quae tanquam biduum chordae, quoties à tangibilium ictibus feriuntur, impulsu quemlibet ubi vis acceptum, per nervorum

ductus illico ad commune sensorium propagant. Enimvero cuti, panniculo carnosio, membranis, carni muscolosae, imò & parenchymatis quibusdam, tales densissimae fibrae intereunt, ut non solum in volutatus, aut superficiei corporis tangibilium exteriorum appulsus sentiantur, sed quoties intus in visceribus humores acres, aut contenta praeternaturalia velleitationem inducunt, illius sensio molesta peragitur: Quare proprium Tactus organum, nec cutis, nec caro, nec membrana, verum ipsae fibrae sunt quibusque istarum, aliarumque partium texturis insitae.

Membrana glutinosa humore obrita Excremento illius praeternaturali: illa enim assidue doloris laesata, & à naturali constitutione deficiens, proprium alimentum in substantiam rixè convertere non potuit, sed illud imperfectè assimilando ingluvinosum illum humorem commutavit. Quod idem contingit in dysenteria, ubi mucosus humor copiosus excernitur.

Graviores fuisse mali causas Cum dolores capitis in morbo venereo sunt vagi, tum proveniunt à fibrarum: Cum vero sunt fixi, tum signum est eo in loco fieri Talpam, i. e. abscessum ossis. *Joh. Pylhormi Observ. ad Colombi Anat. p. 174.*

OBSERVATIO XCVIII.

Capitis dolor ab adhesionem crasse meningis cum cranio.

Philosophus quidem in intolerabili capitis dolore tenebatur: pars dolens in fincipite magnitudine digitum non superabat.

Aperto capite, crassior membrana ea parte in qua dolor excitabatur calvariae adhærebat, pauculo humore putri interjecto. *Fernelius lib. de Abditis 2. cap. 15.*

S C H O L I A.

Cum vinas Venereum Cerebrum summamque corporis aciem obsideret, multa supervacua, pro partia conditione, pituitosa colligi necesse est, quae in intersticia capitis coarctantur, magnum de acerbum

dolorem commoveret: Quamquam enim pituitosa videtur materia, veneni tamen maleficis perisua acrimoniae participes est, hinc tub ossium membranarum sic recondens, tum acrimonia tum distensione dolorem

dolorem excitat: In osium vero substantiam per tenuem quasi tubos sese inferens, illa diffundit dilatatque in tumorem, quæ tandem carie consumpta putrescunt: *idem videtur & cap. 4. lib. de lue Venerea.*

OBSERVATIO XCIX.

Capitis dolor ab humore maligno cranium, Subdita membranas ipsamque cerebrum excedente.

REm in hydrargyro admiratione dignam, à nullo quod sciam animadversam contem-
plemur: hic enim si quis rerum eventus bene observet, non modo pituitosis morbis
obnoxia nostra reddit corpora, partisque omnes, imprimis carnosæ suo frigore & humore
lædit, verum ita labefactat, & sua qualitate imbeit, vix ut corpus febre corripri possit,
etiam si multa fceat cacochymia. Anno à Christo 1556. Coriarium quendam Ton-
for ut inviserem rogavit, rarum affectum & observatione dignum me visurum dicitans.
Is tamcti annos amplius decem post curationem, per hydrargyrum, ita salubriter
exegerat ut videretur percuratus: repente tamen exorto in scincipite dolore diutius
perleverat, non modo ejus partis ob totum paulatim computruit exesumque est, ut fru-
stulationi excideret, sed & cerebri vtraque mœuinx eadem putredine absumpta, subjectaque
cerebri substantia in abscessum conversa est, unde magna puris copia (miserabile visu) per
multos menses, non ex ea tantum parte, sed ex utriusque oculi angulis etiam stillavit, den-
tes exciderunt omnes: Hic tamen neque febre corripri visus est, neque cibi fastidio multum
premi, neque extenuari, dum ad ventriculos cerebri ventum est, quo tempore mors re-
pente hominem diu misere afflictum è medio sustulit. *Fernelius lib. de Lue Ven. cap. VII.*

S C H O L I A.

Sic figure & humore ladere] De Hydrargyri tempe-
re illi est, alii enim frigidum alii calidum statuunt,
Forstius aliquot argumentis pro frigidiæ pugnat,
atque præcedentem historiam in ejus confirmationem
adducit; Recens vero sentiunt qui calidum id existi-
mant, quod patet, *an Semerius lib. 6. cap. 21.* ex maxima
vi penetrandi corrodendique, ita ut etiam metalla pe-
neret ac erodat: Qui vero ex effectibus frigidum esse
colligit, si falluntur, causam pro causa sumentes: Sic
Aurifabri, & qui argenteum vivum crebro tractant, ra-
ro sunt vivaces, sed stupidi, tremori, paralyti, ca-
rari his suffocatis & apoplexiæ obnoxii. Hæc vero
non præstat refrigerando sed peculiari de abdita vi,
cerebri nervisque infesta: Damnum à mercurio illa-
tum, calefaciendum usque emendatur, & calido, salvia,
roremariis, &c. quævis hæc cerebro & nervis fa-
milia sunt, & abdita vi mercuriali veneno adver-
santur: zinziber enim, piper & alia id non præstant,
quia (specifica hæc vi, cerebro amica, destituuntur.

Dum ad cerebri ventriculos ventum est] Ex præconcep-
ta opinione eos esse spirituum animalium officinas
& receptacula. De eorum usu aliter sentiendi ipse
Galenus 8^o. de usu partium cap. 10. animam præbet, refe-
rens adoleſcentem Smyrneum ad alienatum ventri-

calocumque vulneratum, semet oculato teste, su-
perstitem præmanisse. Verisimile est Coriarium
cortice mulo obtulisse, donec cerebri corticalem
substantiam transgressa corruptio, medullarem & pro-
fundam attingit, ubi spiritus generantur, & unde in
nervos derivantur, quæ affecta protinus è vita migran-
dum fuit.

Dentes exciderunt omnes] Dentium vacillatio & casus
ab erodente succo pravo eorum radices corripit,
quod in lue venerea sæpe evenit: compertum; maxi-
me accedente hydrargyrosi: mercurius enim ut cere-
bro, sic & dentibus bellum indicit, Teſtes sunt mu-
lieres quæ fucus, quos is logreditur, atuncur, quos vel
excudit, vel nigrore aut carie inficit. Id vero observa-
tione dignum quod *Clar. Thurnau ex Exc. Jac. Wiffen*
refert, Hemieraniam & dolorem capitis frequenter
ferri à dente caelo, quod & ab *Hildano Cene. 2. obs.*
10. notatum. Ratio hæc est, quod nervulus vitioſo
denti inferus, atque ob cariem denudatus, facillime
ab ambioſe exteriorisque injuriis offendatur, malo
sic ad nervorum initium inde propagatio: Accen-
dit dolore vigente tetola strahi, ipsamque
caput humida colluvie ad dolorem
usque completi.

OBSERVATIO C.

Capitis dolor à Crano sphaclato, Ichore putrido supra meninges corruptas, & Corrupto cerebro nervisque optici.

TAurini Quæstor quidam jam menses aliquot insomnes peregerat ex gravi capitis do-
lore circa scipsum ac tempora, ob Venericum morbum: Ab omnibus oppidi medicis o-
pem acciverat, verum morosus præſidiis non insitebat. Hic quoque ut illum inviserem
rogat: consului ut capiti caustica aliquot apponerentur juxta proximas commissuras & su-
per partes dolore infestatas, quod statim consilium difficilis æger recusavit: Ego vero Tau-
rino secedens hunc non vidi unius mensis intervallo: Tandem iterum rogatus illum adivi,
quem penitus lumine orbaturum offendi, oculi tamen nil ex præci pati videbantur, &c. Ego
III

illi tunc persuadere nitebar ut patetetur cranium perfodi, tenuit: Tandem ut causticum fincipiti adhiberetur ubi magis premebat dolor, fuit contentus, noluit tamen ferre ut apertum fervaretur: sic statim decisa crusta sponte cicatricem obduxit, quare illum juvifere destitit: Hic demum 1x. dies post ad superos migravit.

Eum fecit L. Montanus, ubi *cranium* ad coronalis & sagittalis commissuræ regionem *sphacelatum* putidumque invenimus, coronati regii latitudine: statimque cranium fetra aperto, *abundans ichor putrilaginosus*, instar aquæ, fuligine fumarii & croco asperis profusus, tum per ossis aperturam, tum per aures & nares, membranæque putidæ recta ad os affectum, verum adhuc integræ erant, quæ solo tactu facile rumpebantur: corruptum & cerebrium & nervi optici, cætera verò viscera omnia integrè habebant: Censendum est huic potuisse conferre à doloris principio caustica, vel postea ossis effossionem, rationi si obtemperasset dum præbebat occasio. *Leonardus Botallus de Lue Venerea cap. 16. §. 17.*

S C H O L I A.

Circa *signa et tempora*] Dolor capitis à morbo Italico infestat maxima ex parte noctu circa partem anteriorem capitis, vel circa tempora, aliquando exterius, aliquando interius: cum est exterius facile deprehenditur, nam sæpe tumores præter naturam excreant: Dolorem internum committunt dolores articulorum. *Rendellius meth. cap. x. lib. 1.*

Cranium sphacelatum] Dolor ex carie cognoscitur si facie confirmatissimus: si suspicio aut lue Venereæ, aut sine circa os: quod fit post vulnera aut contusiones non rectè curatas, ut notat in observat. *S. h. m. b. n. l. e. m.* Item, ex inæqualitate ossis, si tangatur, Et quod in hac carie tumores exoriantur, quandoque laxi quandoque dures, ob imbecillitatem enim partis talia generantur: Quod color partis mutatur ad lividum & fulcum. *Saxenii Pract. lib. 1. cap. 2.*

Abundans ichor] movet Holliæus Libello observ. 1. in

dolore capitis sæpe saniem sabesse inter cranium & pericranium, quoad ut dignoscatur mollitiæ vult digito conungi locum: Eum si fixus sit dolor, apertendum, quod sæpe sic sanies effluit ægrique liberetur, alius metum esse ne os corumpatur: Si quæ præterea illic vena est, apertam vel ferro rescindam, nisi admodum sit insignis.

Abundans ichor putrilaginosus] Ejusmodi ichoris malignitatem insigni exemplo illust. à Hildanus cenur. 2. observ. 69. Vult caputidam qui post sex annos gravissimum capitis dolorem in curam resolutionem incidit, cui supervenerunt ulcera in capite, non solum cutem & membranam carnotam, sed & ipsum cranium metastentia, qui ichor intrinsece primum colligebatur, tabula vitæa prius erosa, antequam vicium in cæteris ossibus esset conspicuum.

OBSERVATIO CL.

Capitis dolor ab interiore cranii tabula carie affecta.

§. 1. **V**ir xxx. annorum, non sine Venereæ lue suspitione, continuo capitis dolore laborans, post obitum aperiebatur, interior tabula cranii semicirculosa apparebat. *Raf. sinkius Tract. de dolore capitis p. 106.*

S C H O L I A.

In Lue Venereæ sæpe ingentes & continui excitantur dolores, læssio pericranio & pericranio à carie cranii laminarum, aut ipsius medullæ, quod *divisio* ab Hippocr. appellatur: Non parcat illis qui mercuriali insensatione vel ligni decocto curati sunt. Nob. Italus prope luesam lambdoideam, laei digiti distantia occupabatur dolore, spaciolo nummulum timentem vis excedente: Cruciorum fessione per icodiginitam facta, cuius labii diductis, & periosio separato, trepano facta apertura, caries observata: Ea laro fenestrazo talorio, profunde fere ad *divisio* cavernosum interstitium ablata, consolidato vulnere, exget ab omni insulso liberatus fuit. *Item ibidem.*

Dolor] Doloris naturam & causas, paucis & remotis ambagibus perstringit Clar. Franc. de le Boë Sylvius Medic. Pract. lib. 2. cap. 1. Quemadmodum, aut, ex objecti sensu demulcentis sensatione Voluptas excitatur, Sic ex ejusdem objecti sensu tum lædenti perceptione Dolor produciatur: Dolor non est tantum sensus Tactus, sed sensum quoque cæterorum affectio & molestum ipsius symptoma: Causa igitur omnis Doloris obiectum est sensibile, aut inera corpus existerit, aut fortisficus ipsi adveniens, atque sensu quodvis molestia afficiens ac lædens: Sic lux

nimia dolore afficit oculos, Sonus fortis, Aures; Olor gravis & acer, Nares: Sapor mordens linguam & palatum: Ductiles acuta, cutim & membranas: Calor & Frigus utrens iidem cutim & membranas: Nihil impedit idem Senfuum pluribus intervire sensibus: Sic oculi non tantum vident sed simul Tactu sunt præditi: Sic Lingua non tantum Sapores dignoscit sed insipet dulcem, calorem & frigus: Cujus rei ratio videtur quod ad Tactus & Caloris sensum mollis requiratur sensorii apparatus, q.alem desiderant Vifus, Gustus, Olfactus & Auditus, idcirco peculiaribus organis alligati.

Quando autem Dolor ubivis circa partes capitis nervos excitatur, ejus ratio formalis in eo consistit, quod ipsi itas animales ab invicem distracti & fugati, corpora continentia una convelli & corrupti faciunt, adque sensationem molestam cident. Quod vero spiritus ita distrahant, ut inde sensu molesta cecidit, est aliquid improporionarum in ipsos spiritus, aut in corpora eos continentia intrinseca, quod fibrarum poros & intersticia subiens, eas ab invicem divellit, spiritusque isti hospites simul in

atque adigit. B. W. de Anima Brutor, part. 2. cap. 1. p. 214.

OBSERV.

§. 2. Juvenis quidam, cum per aliquot annos gravi ac perpetuo capitis dolore laborasset, tandem moritur, quem Medici tam diuturnæ cephalæ in investigandæ causæ dissecantes, interiorem cranii tabulam semicariosam, tanti doloris causam extitisse, invenerunt. Ex Petri Sphererij Medici Florentinis Observationibus.

S C H O L I A.

HER. Saxonia Przleſt. Præf. l. 1. c. 2. ait peterebrato capite cujusdam ob cephalæam intolerabilem, reperiunt fuisse os corruptum, & supra meningem multam pituitam: A. Serenus Med. Eff. p. 1. c. 2. Chirurgie ossium, ait, foſſa ſcalpi opo inveniſſe in cranio tumorem & corruptiorem, ſic liberaliſſe hominem.

APPENDIX.

Dolor capitis ab humore acrim in capite collecto, potius cranium quam duram meningem erodente.

Superiori ætate ad civem quendam Baſilienſem, xxx. circiter annorum deductus fui: Laborat ille affectu plane abſtruſo: Elapſos ante annos ſex vir iſte dolore gravativo capitis correptus fuit & per menſes aliquot continuo laboravit. Adhibitis remediis tandem ex parte iſte remiſiſit, ſed crura ita reſoluſa fuerunt in hunc uſque diem ne digitum quidem pedum, multo minus crus movere poſſit: Non diu poſt reſoluſos, & quidem diverſis temporibus, ſupervenerunt ulcera in capite, quæ non ſolum cutem & membranam carnoſam, verum etiam cranium ipſum erodunt. Sed, quod admiratione non vacat, verum ſimile eſt materiam illam acrem ac corroſivam, primum intrinſece colligi, carieque iſta, antequam exterius appareat, tabulam vitream erodi: Si enim ulcus aliquod in capite oriri debet, ante omnia dolorem fixum illa in parte capitis intrinſece perſentit, etiamſi in cute nihil extrinſecus appareat, graviora tamen ſymptomata non aſſert dolor ille. Demum paulatim tuberculum in cute exoritur, ſenſimque ad ſuppurationem pervenit: Rupto tuberculo, quamprimum oſſa carioſa ſeſe extrahenda offertunt, atque hæc omnia abſque maximo dolore & gravioribus ſymptomatis accidunt: oſſibus carioſis extractis, cicatrix parvo cum negotio inducitur: diverſas & quidem in diverſis partibus capitis, vidi & palpavi cicatrices profundiffimas: vidi & ulcus quod & tum temporis ad duram meningem uſque penetrabat, interitum tamen de gravioribus ſymptomatis minime conquerebatur: dolor erat exiguus, febris inquietudineſque fere nullæ. Ex hac hiſtoria ſingulare provenit problema, nimirum Cur materia illa acris in ipſo capite collecta, potius cranium, corpus ſolidum ac duriffimum, quam duram meningem, membranam exquisitiſſimo ſenſu præditam, eroſerit, neque graviora ſymptomata induxerit? *Fabritius Hildanus Cent. 2. Obſerv. 69.*

OBSERVATIO CII.

Capitis dolor ab humore virulento inter cranij laminas contento.

IN cranii medurillio, inter duas tabellas, nonnunquam colligitur humor, qui tractu temporis vitiatuſ acerbiffimus cruciatus *ὀνυχοπῆς* inducit, quod ſæpius accidit in luc invertata, Et tum exorſoſi quadam cranium protuberat. *Rolfinkius Diſert. Anat. lib. II. cap. XI. Ex Riolanæ Encheiridio lib. 6. cap. 7.*

S C H O L I A.

EX Hippocr. lib. de Vult. cap. cranium eſt *διπλόν*, exigua parte excepta, ſpongiam reſerens, plenum carunculis humidis, quæ digitis compreſſæ ſanguinem emittunt: Ex his vehementiore ſcitu collaſis, ſanguis qui exprimitur, comparata putredine, os inſicit & corrumpit parte interiore, exteriore facie incolumi apparente: Exſudant quoque ſanies ab interiore tabula, ipſum cerebrum contagio aſſociat, induſta illi putredine: In illo ipſo ſpatio gignitur interitum Meliceris, (teſte *Raſkeſi* Tract. de dolore capit. pag. 106.) qua reſecratione ſupremæ laminæ detecta & vacuata, omnia ſalva ſunt, ingentium dolorum ſedore excluſo. Cranium, juxta ſedem ſu-

periciliorum, natura diffidit in duas tabulas, quatum externam lues venera nonnunquam exſcit, ac tum inter ſternendum illac anime iter eſt. Tabulis magna ſæpenumero cavitas intercedit, ad os narium deversa, quam infercit tenax quidam mador, elaborando ad odorandum aëri; ut videatur, appoſitus: conſentaneum, vero eſt aliquid, arque multum aſus humoris per abditos interioris tabulæ meatus ſive recessus tranſcolatione quadam colligi, tractuque temporis vitari poſſe, unde exiſtunt poſtea cruciatus illi *Riolanæ* non raro ſtatim repetentes temporibus. *Salmon Albertus Hyſt. Anat. pag. 3.*

OBSERVATIO CIII.

Capitis gravedo à carie ossis frontis illasus meningibus & Cerebro.

Quidam gravedine capitis afficiebatur, quam sequuta lethalis cataphora: Patefacto capite defuncti, reperiebatur os frontis carie confectum, aliqua ex parte, Cerebro salvo & ejus inregumentis integris. *C. F. Schneiderus l. de aff. superejis p. 241.*

OBSERVATIO CIV.

Capitis dolor ab internæ diploidis particulis meningibus purgentibus.

§. 1. **G**ravi pondere in caput suscepto gestatōque, internæ diploidis duæ particulae à reliquo cranio diffractæ, duodecennem cephalalgiam concitarunt. *Rolfinkius Tract. de Dolor cap. p. 107.*

§. 2. Ruricola quidam ex arbore deciduum in lapidum acervum, calvariam perfrēgit, ut hinc meningē disrumpere atque divulsæ sint, &c. Et quanquam vulnus confectum ac consolidatum fuerit quinque septimanarum spatio, quia verò mediocres cranii portiunculae in ambas cerebri meningē depressæ fuerē, hinc ex earum compressione dolores, ex doloribus humorum affluxus, & tandem mors, Quod ex aperta calva innotuit. Vide histor. 1.4. Titulo de vulneribus.

OBSERVATIO CV.

Dolor circa frontem à lamina interioris cranij callositate, & purulentia circa partem cerebri.

Vulneratur quidam supra nares, &c. Septimana nona cum antea de dolore frontis gravativo conquiescere esset, extinguitur: In loco vulnerato reperitur lamina interior intrusa, cerebrum quoque totum ex una parte purulentum. *Vide l. 4. Tit. de Vulneribus.*

APPENDIX.

De dolore capitis, seu Hemicrania, ab introeptione particulae ossis frontis, meningem subitam premente, hinc liberam per vasa excussum.

Alineunte ætate gracilior & biliosa corporis mei constitutio est: Anno ætatis, si recte memini, 4. vel 5. ex cursu celeriori præceps factus, frontis supra supercillum dextrum tantam contusionem in platea passus sum, ut ex cicatrice magnitudine facile conjicere possim ad Calvariam usque penetrasse contusionem: Unde ætatē procedente usque ad pubertatem, ex jejunijs, ardore Solis & vini cuiusvis parvissimo licet usu, per intervalla nunc longiora nunc breviora, pungentes in illa dextra parte dolores sensij, non nisi post vomitum biliosum & hæmorrhagiam narium remittentes: Ab eo autem tempore, ob loci & victus mutationem, rariores ex jejunijs paroxysmi me afflixerunt, frequentiores ex cerevisiæ crassioris aut vini potu, in dextra scilicet semper frontis parte: Horum occasione animum ad Medicinam applicare cepti, ut & aliorum & meas vitæ molestias declinare discerem: idque cum successu per aliquam multos jam annos factum adeo felici, ut per spatia biennia & longiora doloris illius immunitatem facile mihi hodiūque promittere possim, dummodo cerevisiæ crassioris, lupuli floribus conditæ, & vini recentioris, aut sulphuris fumo inebriati usu abstineo: Simulatque vero utriusque liquoris modicam quantitatem haurio, vel pinguius actu calida, aut aromatibus condita assumo, in primis quoties in ultima mensa Cancros fluviales degusto, qui in prima mensa cum butyro ventriculum aut caput minime ledunt, malum ita recrudescit, tamque pertinaciter plerumque affligit, ut vix post xxiv. horas remissionem faciat, salva interim semper frontis parte sinistra.

Per isthæc itaque experimenta varia & frequentia, in eam deveni opinionem massam meam sanguineam, tempore paroxysmi, quacunque de causâ, etiam odore croci, balsamorum fragrantium, &c. excitati, immoderatus effervescere, & ob transitum sub frontis dextra parte sanguinis chylosi difficiliorem, longiorem trahere moram, adeoque intemperiem meningi duræ, isthuc ex collisione ibi olim laxè conciliare, continuum solventem, doloris molestissimam auctorem: Credoque difficiliorem istum ibi transitum dependere, partim ex fibrarum meningis tunc temporis turbato ordine, partim ex ossis frontis proximi portiuncula inrorsum coacta & protuberante, & comprimendo vasorum angustiam augente. Ex communicatione Excell. & Clariss. DD. Mauritii Hofmanni PP. Alteri:

S C H O L I A.

O B transiunt sanguinis dyſtoli difficultatem] A ſacco nutritiis vicio quomodo inducatur Cephalalgia explicat Excell. *Grado Tract. de Anima Brat. p. m. 269.* Interdum, ait, Succus Nutritivus cephalalgie periodicæ cauſa exiſtit: in quantum ſcil. ille ſanguis ſuſſuſus, & non ite aſſimilatus, ob particulas diſcordes ei turgescenſiam inferit, proinde ut citius in caput ebulliens, exuſus ſuas in meningas, aut illarum partes quidam prædiſpoſitas ingerat, fibræque adeo in ſpasmus dolorificos ſtrictæ: Propter hanc cauſam novi plures poſt variolas, morbillos, aliſque febres aut ægitudines, quibus ſanguinis maſſa viſciſa ſolet, cephalalgie quotidianæ obnoxios fuiſſe, videlicet totidem à paſſu horis, modo citius modo tardius, primo roboris in facie luſſuſo, dein capitis plenitudo & dolor eos infeſtabat. Inſuper à vini potu, aut alimentis turgidis comestiſ gravius plectebantur: morbi acceſſio ab aſſumptis magis aut minus diſtate ſolet, prout chyms, aut paulo poſt primam in euorem ingreſſum, aut poſt aliquotulum in co moram, turgere incipit.

Et pag. 296. §. 2. In cruoris ſini prout ſerum, ita & *serum nutritivum*, hoc eſt recens chymus, ex alimentis conſectus hoſpiratur, acuna circulari, ejuſdem quaſi fluminis decurſu illorum exorbitantiis obſequi cogi-

tur; Quare cum ſanguis mox à paſſu imperiale aut inordinate ad caput precipitur, ſuccus etiam nutritivus tenuicoctus aut depuratus, fibræ illæ membranæ aſſigitur, vellicationes dolorificæ ſuccedunt: hinc enim eſt quod à pleno venere exercitium, balneum, paſſiones violentæ, lectio, aut ſerica animi intentio cephalalgicis officiant. Incedum ſuccus nutritivus ſanguini non ſtatem aut facile miſceatur, quin huic recentis illarum mox turgescenſiam concitat, adeo ut multi conſtanter à paſſu inenſo vultus rubore, non raro item cephalalgia afficiantur. Hoc vix go, ſed perpetam obſtinctioni Epæris imputatur, cum ſerena à ſanguinis dyſcratia, chyms accedentis miſturam ægre ferentis, procedat.

Quæſtus cancri fluviales deguſſo] idem obſervatum ab *Exc. Bartholomæo hiſt. 57. cent. 6. de cancri marinis*, Novi aut forminam quæ toties capitis dolores experit, quoties in cibis canctis marinis utitur: Externæ figuræ addit, & internæ ſignaturæ ſi quid tribuendum, non male capitis externi rotunditatem & cerebri anfractus ſimulque cum membranis, cancer rotundus marinus reſert. Sed quid de attack dicendum, in quibus ea ſimilitudo deſideratur? An ad anſipaliam ſingularem recurrentem?

OBSERVATIO CVI.

§. Capitis dolor ab offea ſpina inter duram & piam matrem, ſita, cerebri ſubſtantiam ingrediente.

P H. de Arentio ſuſpenſus Romæ in platea pontis, qui quotidie Tabacco tum in fumo tum pulvere utebatur, à me publice ſectus, Spinam quandam offeam, ſeu potius lapideam, tricipitem, Neptuni faſciam repræſentantem, habebat inter duram & piam matrem, in parte ſiniſtra prope falcem, è dicto interſectionis commiſſurarum coronalis & ſagittalis, ſed piaz ita fortiter adhætebat, ut ſine laceratione ipſius avelli non poſſet: quinimo acuminibus in cerebri ſubſtantiam ingreſſa conſpiciebatur: Quare ſi ſuſpenſus non fuiſſet, certè brevi mortuus fuiſſet; apparebant enim circa ipſam ſpinam inflammationis rudimenta, *Dem. Panaroli Pentecoſte v. Obſerv. 14.*

S C H O L I A.

Q Vamvis capitis dolori non meminerit *Panarolus*, eundem tamen abſuiſſe, præſentibus cauſis dolorificis, vix verifimile eſt, accedentibus etiam inflammationis rudimentis: Niſi dixeris cum Excell. *Th. Bartholomæo in Ann. Reform. 3. c. 2. obſcuriorem fuiſ-*

*ſe meningum ſenſum, ut in illo cui offa tria ſine damno adnata, Patilius ab *Itenuſo Favon* viſa; Venetique illo cui os grandiuſculum dentarum in falce, ſeu duplicata meningis ſucrexit: Vel ſenſum cauſæ dolorificæ illum aſſueviſſe.*

OBSERVATIO CVII.

Capitis dolor à ſtyli fruſtulo in cerebro relicto, ingruente tantum pluvia moleſtus.

I Oannes *Veſtingius* ante ſuum iter in Ægyptum, ubi quinquennium Cayti Conſuli Venetorum valetudini adſuit, corporis humani diſſectionem Venetiis publice inſtituens, in cerebro mulierculæ ſtyli, ſeu pugiunculi ſubtilioris fruſtulum reperit, quod ipſa quinquennium geſtaverat ſine omni moleſtia, niſi quod ingruente pluvia caput doleret. *Ioannes Rhodius cent. 1. obſerv. 32.*

S C H O L I A.

I ngruente pluvia] An tunc temporis ſicut in pleniſſimo madicens cerebrum unguis, à ſtyli cui-

pide vellicabatur; cæteris temporibus à dolore immune, quod ſe continebat, ſic à cuſpide non attingeretur.

Sed quid dicendum de meretricie à *Zauis* obl. 6. lib. 1. prax. Adm. memorata, quæ cultelli dimidium ostentio loca cerebrum lætens, circa noxam gestavit? An dixerit cerebrum esse insensibile? At id non potius esse sensus capax, ostendit *Mercatus*, eorum exemplo qui capite vulnerati, dum tractantur appulsu aeris non ferunt: An forte eandem ratio cerebri quæ den-

tiam, linæ attritu fecerit, non item calorem & frigus nimium? An forte mucore obductum frangere, cerebrum ungere non possit ejusmodi chylo manitum? Id vero sapienter deprehensum naturam solentem carnea corpora tali mucro obvallare: sic lapsa in vetica leniore tegitur, sic læpe calculi renem, adeo ut *ad alium* gelentur.

OBSERVATIO CVIII.

Dolor capitis acutissimus, ex materia quadam lapidea dura meningi adnata, aculeis tenuem perfodiente.

Nobilissima N. dolore capitis acutissimo diu conflictata fuit, eoque pungente admodum, instar acuum vel telorum parti infixorum, interdum vehementius, interdum minus ipsam divexante: doloris vehementia pressa ejulabat, & ambabus manibus caput prehendebat: ad quem dolorem sedandum sæpe detractus sanguis: parti dolenti, cui instar verrucæ cujusdam callus inerat, admotum fuit pyriticum, & ad cranii perforationem deveniendum instabat Don. Pimpernelle: Hæc deinde in hydropem incidit, tandemque interit.

Aperto cranio, inventus sub crassa meningi, juxta canalem anteriorem, seu torcular utrinque, indurata quædam materia & lapidea, instar cujusdam rupis inæqualis & aspera, aculeis multis, & veluti cati unguibus, conchyliis, variisque figuris distincta & variegata, ipsique crassæ meningi firmiter adhærens, inter ejus inæqualitates venulæ ferebantur ad ligularum ferra mentorum magnitudinem accedentes, quæ hanc materiam rigabant: supra tenuem meningem humor quidam mucosus repertus est. *Cattierus Objerv. Medic. X. P.*

S C H O L I A.

Pingente admodum] Alias gravatius dolor inter signa recensetur: qualis cæticus Mercatorum Hungarum, de quo *Abemius* p. m. 45. qui laboravit multis annis hemigræco quodam dolore gravativo, parte anteriore circa frontem: sed tandem validius nates emungens, lapidem eduxit ad unguis humani digiti lætitudinem & pollicis crassiciem, illi non absimilem qui in pilicis carpinonis capite reperitur: At scabrities & asperities materię hujus lapideę, partisque cui insidebat senius eximius, aliam doloris ideam induxit: Sic calculus renalis quondam parenchymati infixus est, gravitatis sensum exhibet: in ubi caput ureteris subito dolorem acutum & pungentem excitat: Sequenti signa lapidis in cerebro tradit *Saxonia*, Continuitatem doloris ejusque qualitatem, est enim dolor quidam fixus, nullis cedens remediis: adeit gravitas, sine excrementis tamen.

Ad cranij perforationem, &c.] Natura monstrante viam, tuberculum exsurgente in parte dolente: Hinc *Holstetius* libello observ. in notabili cruciata capitis, qui & affatus sit, nec alius celat remediis, ferro & igne utendum est: constat enim periculosius melius habuisse cerebrum vel

cyathis aperte capite: Ipse Hippocr. lib. 1. de morb. non unam facit unctionem, sed in doloribus antiquis octo videtur, duabus in occipite, duabus in principiis duabus in angulis oculorum circa nares, duabus circa tempora: Alia operatio Chirurgica est Trepanatio, qua usum se ait *Saxonia* Panthei lib. 1. cap. 1. in quodam R. Parte, quamquam non felicitet: quod contigisset aut ex natura patientis, non ex operatione: Vili sumus, inquit, Trepanatione, & invenimus os corruptum, & supra meninges copiam pituitæ, unde in soporem & paralytism semper incidebat: quo tempore foramina erant aperta, nullius habuit, sed cum oculum esset fortamen (nam invito Chirurgo concrevit caro) sopor rediit, & ita perdidit vique ad mortem.

Supra meningem humor quidam mucosus] Cujus eadem forte generatio quæ mucosi illius excrementi, copiose profusa à quibusdam calculo vesicæ laborantibus, quod falso quidam proximam lapidis materiam asserunt, cum sit vesicæ male affectæ, & ob præsentiam lapidis male transmissum alimentum conficiens excrementum, in hujusmodi mucilaginosam materiam transiens.

§. 2. A Chirurgo audio repertum fuisse os mirum, multis cuspidibus horridum, in dura matre cerebri, unde dolores æger capitis diu passus fuerat. *P. Borellus cent. 4. Objerv. x c i x.*

OBSERVATIO CIX.

Capitis dolor à lapide membrana incluso, in posteriore capitis parte, Aqua in ventriculis cerebri.

Filius Dom. N. decennis ex alto cecidit: morbus neglectus est, quia nec vulnus nec confusio extra apparebat, capite alioqui perpetuo dolente. Eo aperto Lapidem ex gypsea materia concretum, & membrana inclusum, in parte capitis posteriore, sub sutura lambdoidea, inter duram & piam matrem, inveni, adeo adhærentem duræ matri, ut non nisi violenter avelli posset. In tribus cerebri ventriculis, h. e. duobus anticis & medio, ultra duas libras aquæ limpidæ repetimus. *Vide lib. 4. tit. de Plagis, &c.*

SCHO.

S C H O L I A.

Hic triplex conquirebat causa doloris, Lapis, Aqua in tribus ventriculis contenta, (& proculdubio per cerebri substantiam diffusa, cum si excrementorum tantum conditoria habebantur) Et humor tumori, ad sollicitam aërem exortu, fomentum praebeas, cujus extractio doloris levamen attulit: Grava-

tivum autem fuisse verisimile est, quia lapis cysti conclusus erat, nec aliter quam pondere aut compressione nocere potuit: Sic aqua ventriculis concurra gravamen tantum afferre valebat; si enim acrimonia praedita fuisset, expulsiorem ad excretionem sui commoveret.

OBSERVATIO CX.

Capitis dolor gravativus à lapide circa cerebri basin genito.

Patritius Venetus nil plane olfacere poterat, cum Dolor capitis obtuso & maxime gravativo, adeo ut caput semper in prouum & pendulum habere cogeretur. Dum cerebrum excavamus, tandem prope basin lapidem compressum, nummi instar Taleri, sed non omnino rotundum, cineritii coloris reperimus. *Vide Tit. de Marium affect.*

OBSERVATIO CXI.

§. 1. Alapide in posteriore parte capitis, inter duram & piam matrem.

Intra Calvariam, h. e. in cerebro, si generetur lapis non solum cephalalgia simplex, verum etiam longe severiora symptomata sequuntur: Vidi id in puero decenni, qui quum per gradus decidisset, & posteriorem partem capitis gradibus alluisset, cerebrumque inde concussum fuisset, non solum sequutus est dolor capitis continuus, sed & plurima & graviora accidentia, quorum omnium causam in dissectione reperi.

Aperto enim capite, lapidem ex gypsea materia concretum & membrana inclusum, in posteriore parte capitis, sub sutura lambdoidea, inter duram & piam matrem, inveni, adeo adhaerentem duræ matri ut non nisi violenter avelli posset. *Fabricius Hildanus cent. 1. observat. 11. & cent. 5. observ. 1. ex Kentmanno.*

§. 2. Multis in partibus corporis humani calculi generari possunt: Observavimus concretos in capite & utero mulieris, cui dissectæ in Scholis publice præfimus; *Hallerius lib. 1. cap. 48. in Scholia.*

S C H O L I A.

In Historia tam D. Kentmanni quam Holletii omnifortem est quod maxime desiderabatur, videlicet quam in parte cerebri reperti fuerint lapides: In huiusmodi enim historiis, & quidem tanti momenti, omnia ut ad unguem adambrensus necesse est; alioquin cum cerebrum, pars corporis nobilissima, vix aliquid præternaturale ferre possit, ooo immerito aliquis historias prædictas io dubium vocare posset, aut saltem admittant quomodo corpus adeo durum, solidum & asperum, per tot annos sine vitæ periculo in cerebro delinescere poterit: Cum manifestum sit hominem stupidum fieri, simo & plerumque vitam amittere, si cerebrum ab impresso cranio comprimitur & motus ipsius impediatur; At vero si rem diligenter indagemus, id nihilominus fieri potuisse fidem nobis facient anatomicæ dissectiones: Non tamen in qualibet parte cerebri id sine ingenti periculo, sed solummodo in singulis duræ meningis superiori, qui Veliallo aliisque Anatomicis est testis, & à nonnullis torcular appellatur, fieri posse arbitror; Eo enim in loco, cum inter dextram & sinistram partem cerebri veluti vacuum quoddam sit, minus legitur ipsius actio, minusque motus ipsius à re aliqua præternaturali retardari: Hunc ego exillimo esse causam cur puer ille, gestato calculo juxta concursum suum recte & lambdoideæ, per tot annos supervixerit: Huius rei singulare exemplum habet cent. 1. ubi 2. de milite, cui post idum sclopeti globulus plumbeus in capite per-

meus sex, sine gravissimis symptomatibus remanserit: Observavi aliquoties vulnera cum cranii fractione aut impetussione, minus esse periculosa & mortalia circa sinum rectam, & io vertice quam in bregmate, quæ Columbus Anst. lib. 1. c. 5. lethalia pronuntiavit: causam ex præcedentibus colligere poteris. Quæ vero in ipso cerebro nascuntur corpuscula dura, longe graviora excitant symptomata, ut videte licet apud Clar. Platerum observat. lib. 1. pag. m. 107. *Hildanus ibidem.*

Lapides ex gypsea materia] Ubique generationi lapidis idonea materia reperitur, ibi lapis generari potest; At in cerebro ejusmodi materia reperitur, scilicet serum, quo illud saepe abundare certum est; Ergo & in cerebro lapides generari possunt; ut clarissime demonstrat Clar. Platerus lib. 2. c. 12. Causam aut generationis areolarum & calculi, pueritiam esse à calore partis adeo exsiccatam ut terra indeque lapidosa fiat, communis est opinio: Verum nos potius causam materialem hujus terrestris in corpore genitæ, tettenam quandam substantiam, unde hæc prodit, statuimus, quam in sero inventi sic ostendimus: Quemadmodum aqua continuo per tertæ meatus, & fluminum ac rivoalorum alveos defluens, materiamque terrestrem secum devehens, eandem loca sicciora, ubi facillius hæret aliendo, successive deponens illisque agglutinans, sabulam, roghos & stercias lapideas gignit, eoque magis elutus; si impura

lutofave fit, aut si succo nativo terreſtri imbata, falſa, nitroſa, miramentoſa, exiſtit: à qua ſicut in theſaurum aqua videmus, in canaliſſis per quos fluit, materia terreſtris illa adhaerens & accreſcens, calculi diverſae formae effingantur: Sic conſimili ratione, ſerum ipſum concipiens falſum ſiccum & terreſtrem materiam, quae indies in prima concoctione à Sale, quo perpetuo homo utitur, aliſque terrenis generatur (ſicut in beſtiis quae ſale adeo delectantur, eoſque reſiciuntur continuo, murosque ob id lambunt, uti capras facere videmus, in quibus plerumque, ſenſentibus praeteritis, calculi inveniuntur) ſi eo maxime redundet ſerum, locis ſiccioribus & anguſtioribus quae pervadit, ubi & citius adhaereſcit, ſe agglutinando, menſula & calculi poſtmodum inde formatis praebet materiam: Idque praeteritis illis in locis ubi à ſanguine ſecreſcit ſerum, continuo renes pervadit, unde & in illis frequentius ſemina primi colliguntur: Sed & ſerum dum adhuc ſanguinem diluit, idem quod in renibus & veſica, in certis ad illud apertis locis poſteſt efficere: Quod etiam ſi excrementis aliis per-

miſtum adhuc fit, nonnunquam facit, eoſque facilius ſi bilem diluens majorem inde accedentem ſiccitatemque acquirat; unde & in veſicula ſellis tam frequentes autro argenteoſe colore, bilis flava cauſa, ſimili calculi deprehenduntur, illuc cum bile terreſtri quoque & ſalis repurgata materia: Quod uti à ſero, dam in corpore eſt fieri obſervatur, ſic & ſi illud & corpore per ſactrymas exſtalleret, areus quoque in ciliis deponere, illieque eas concreſcere obſervavimus: Sed & in ſero jam tepurgato in veſicam, urina ſcilicet, qua ratione calculi in veſicam delapſi reſentique, ab ea eodem modo incrementum ſumunt, ſquammiſque novis, per appoſitionem continuam huius terreſteſtratis, obducantur, & in molem ſaepe magnam accreſcant, colligere licet: Apertiusque adhuc in urina reſidua in vas aliquod videre licet, quo pacto ſi diutius eadem macula uratur, nec mundetur, areoſa & ſabuloſa illie accreſceſcit materia, à qua purgetur, in ſquammiſ etiam & lapideis tandem augetur: Sic Chymici ex lixivio, quod ejuſmodi quoque terrenam in ſe habet ſubſtantiam, ſalis ſus ſolent excoquere, &c.

APPENDIX.

§. 1. De Calculo per palatum reſecto.

Anna Rietmannin annos nata 45. continuo capitis dolore admodum affligebatur: Ea omnibus prius tentatis, cum dolor ſubinde acerbiffime rediret, acidulas reſiſte, ex quibus reverſa poſt optime ſe habuit: Septimana demum proxime praeterita, noctu poſt primum ſonitum, motum quandam velut rei viventiſ circa naſi radicem, vel paulo inferius evidentem animadvertit, obſtupuit admodum, inque lecto creſcita eventum anxie expectavit, & ſtatim per palatum lapis ſponte ſua in os promovit, durus, aſper, ex cinereo flavefeſcens, admodum ſordidus (nucis moſchatæ magnitudinis) idque ſine omni dolore, moleſtia, ſanguine aliſque ſymptomatibus.

§. 2. Similis caſus Bernæ accidit, Nobilis à Graffenried, annor. 36. cum anno 1607. aliquandiu contumaciſſimo & graviſſimo dolore capitis, qui anteriorem partem ad futuram uſque cotonaſem & dentes molares occupabat, laboraſſet, nec ullis remediis cedere velleret dolor, ut de recuperanda valetudine ſpes nulla eſſet, accidit ut quadam nocte, quum poſt ingentes cruciatuſ, multaſque vigilas parumper obdormiſſet, ſubito integram deturbaret familiam, & ita quidem ut non tantum domeſtici, verum etiam viciui accurrerent, nihil aliud putantes quam ipſum jamjam naturæ ſatiſfacturum, quandoquidem tanta erat faucium anguſtia ac ſi aliquis laqueo eas ſtrinxiſſet: In iſtis porro anguſtiis & ſuffocationis metu, cum quoddam corpus, videlicet durum tuberculum, caſtanæ magnitudinis, ejuſdem coloris, ad fauces & os decidiſſet, illudque expuiſſet æger, omnia mox remiſerunt ſymptomata: Tuberculum autem hocce ex materia dura, & veluti caſeo putridiſſimo conſtabat, & membrana valiſſima involutum erat: Ab eo tempore nunquam de huiusmodi dolore eſt conſeſtus, neque remaniſit ulla obſtruſtio narium: ab arthricide tamen mirum in modum vexatur: *Fabritius Hildanus cent. 5. Obſerv. L.*

SCHOLIA.

CIta priorem caſum hoc præcipue deſidero, qualis fuerit odoratus tum ante nam poſt excretionem calculi, ſed de his tacuit D. D. Rietmannin, præterquam quod adjunxit noſibilem narium circa naſi radicem aduſſe obſtruſtionem: Ex quibus colligo odoratum, ſi non abſolutum, depravatum tamen fuiſſe: Cæterum, concretus fuit lapis ille vel intra vel extra calvariam, vel denique in ipſa calvaria, hoc eſt in caviſſimis offis frontis, in ſuperciliorum regione: Intra calvariam, h. e. in cerebro, ſi genitus fuiſſet, non ſolum cephalalgia ſimplex, ſed & longe ſeveriores ſymptomata ſequuta fuiſſent, quod oſtendit exemplum ſuperius de puero decenniſ alvarius: Porro cum Nob. Matrōna Rietmannin nihil tale, excepta cephalalgia, experiri fuerit, verſimile mihi videtur

lapidem intra calvariam concretum non fuiſſe: nec video quomodo calculus ejus magnitudinis viam ex cerebro ad palatum ſibi facere poiſſet, quam ipſiſſum enim ac ſolidum ſit cranium verſus fauces, non docet Anatomie: Præterea, foramina in baſi cranii exiſtentia, venis nervique deſtinata, adeo ſunt exiſta ut lapidem per ea exiſſe incredibile ſit: Demum, ſi in anteriori parte cerebri concretus fuiſſet lapis, quomodo os ethmoides ſine ingenti exulceratione, & deperditione offis & cartilaginum perforare poiſſet, non video: intra calvariam itaque genitus non fuit: In ipſa præterea calvaria, videlicet in caviſſimis quibus ſunt in ſuperciliorum regione, inter utramque tabulam, minime quoque genitum fuiſſe fidem facit ipſius magnitudo: cavitates enim ſive foramina illa oplacium,

oplurimum sunt tam exilia atque angusta, ut quomodo lapidem coningere possent nondum videam: ut placitum inquam, in illis enim quibus frons superciliisque protuberant, non nihil capaciores reperiuntur: Vix præterea ea his cavitatibus ad nares angustæ sunt: ossa quin etiam, præcipue in adultis, ut est dicta Matrona, adeo sunt solida ac ipsa, ut à lapide minime dilari possint, nisi maxima intervenit putredo & ossium corruptio: at nihil tale in dicta Matrona accidit, Ergo in istis cavitatibus genus non fuit: Demum, si ibi generationem habuisset, potius per nares excretus fuisset quam per palatum, quamvis non negem ipsum etiam ex prædictis foraminibus facile ad palatum pervenire potuisse, præsertim si ipso illo tempore quo lapis movebatur, & ad exclusionem sese parabat ægra aciem vigilaret ad se, uti sit quovisunque mucum circa os cribiforme collectum & exsiccatum ad fauces attrahimus, Ergo nec in ipsis cavitatibus concretus fuit: Ex his apparet lapidem Dominæ Rietmannin neque inter calvariam, neque inter duas tabulas cranii, hoc est in cavitatibus illis ossis frontis generatum fuisse: Arbitror autem extra calvariam, & quidem ad radicem nasi, circa os ethmoides, à longo tempore collectam fuisse materiam excrementitiam, densam & viscidam, ex cerebro ibidem deludentem, eamque tractu temporis vi caloris, à continuis istis doloribus capitis, vigilis & inquietudinibus accensæ, & specificæ quadam facultate exsiccata, & tandem in lapidem compactam & induratum fuisset. Rem autem lenite habere arguit satis, non tantum notabilis circa nasi radicem obstructio, verum etiam motus ille veluti rei vivendi, quem ægra paulo ante ejectionem lapidis circa radicem nasi, vel paulo inferius, evidenter animadvertit: Quoad posteriorem causam, in Domino Gasfencio, Non dubito quin tuberculum hocce, si diutius reman-

fisset, facile tandem in calculum indurasset: podagricos enim ad calculos generandos pronos esse docet experientia: Quod autem materia hæcce calculi adhuc cruda ante concoctionem & coagulationem reiecta fuerit, tum facorem longe gravissimum, tum etiam quod vicinas partes comprimeret, & proinde naturæ molesta esset, in causa fuisse existimo: hinc enim natura & facultas expultrix excrasis fuit, ac quod sibi noxium esse percipiebat, rejicere conata est; idque potius per fauces quam per nares: quæ enim nobis circa nasi radicem molesta sunt, ut est mucos, facilius vi ad fauces trahimus quam per nares extrudimus. Cæterum locum generationis tam lapidis Dominæ Rietmannin, quam tuberculi Dom. à Gasfencio, circa os Ethmoides fuisse apud me nullum est dubium: natus enim circa radicem cartilaginosa est, cavernulæ quin etiam nonnullas habet, ut videre est in crano quodam, quod in Museo meo reservo, in quo ita ut aut cavernula, quæ nunc avellanæ facile excipere posset circa nasi radicem & verius juxta dextrum conspicietur: Cartilagine præterea, quibus reclusus est locus ille, corpori durissimum facile cedunt, præsertim si accretio in sensum: Observavi id in virgine, cui ductus auris ob innotum fungum scirrholum hand parum extensus ac dilatatus fuit: Id si in osse durissimo accideret, quid non fieret in loco cartilaginoso? Cur autem obstructio circa radicem nasi in Matrona post excretionem calculi periti erit, in Nobili vero nostro una cum tuberculo evanuerit: hinc accidisse mihi videtur, videlicet quod in illa membrana, qua involutus fuerat lapis, circa os ethmoides remanserit: in hoc vero viro cum tuberculis reiecta fuerit, sed & cartilagine à calculo extra naturalem situm, & proculdubio veritas os ethmoides depreßæ fuerat, & obstructio nonnulli anni am dederat.

Idem ibidem.

APPENDIX.

De Calculis per nares reiectis præcedente capitis dolore.

IN Dania nostra virgo Nob. ex naribus calculos emunxit forma & magnitudine dactylo-rum: Ex capite prodixit id fuit indicium quod hanc plerumque excretionem dolores capitis præcesserint. *Th. Bartholinus Hist. xxxij. cent. 1.*

OBSERVATIO CXII.

§.1. Cephalalgia à calculo in cerebro nato.

Quidam diuturno atque intolerabili capitis dolore adeo fuit ex cruciatus ut dies noctesque nullam quietem caperet: Eum autem sublimiori usu contractum assererat: Medicus curæ adhibuit nihil intentatum reliquit, sed tandem æger perpetuis doloribus, illisque acerbissimis superatus, esse desit:

Prædictus Medicus, (Mell) dissecto ægri capite, in cerebro lapidem reperit magnitudine & formâ mori, colore quasi pullo aut cinereo. *Kentmannus libello de Calculis.*

SCHOLIA.

Doloribus superatus esse desit? Galeus l. de symp. causis cap. 8. ait. In doloribus capitis minus periclitari ægros quam in doloribus aliarum partium, ut aurium, dentium, oculorum, colli, peritoniæ ab ossæ avulsionē, eo quod Cerebrum per se sensus est expertus: Et 2. de comp. med. l. 1. c. 1. ait. ob dolorem capitis vehementem neminem unquam aut syncope correptum, aut se ipsum occidisse, quemadmodum qui-

dem Coli dolore vexari fecere. Id tamen audiendam quatenus dolor non alios graviores affectus accerit, aliquando enim in paralytin, convulsionem, phrenitiam, apoplexiam aliosve affectus desinit: sic refert *Saxonia* quidam post dolorem capitis ambo oculos extra caput exiisse, sensuisse tinnitum & obuisse: scribitq; *Hipp. aph. 6. §. 1.* In dolore capitis si repens superveniat aphonía, lethale esse, nisi febris superveniat.

E 4

In *Cerebro*] *Galenus* loco superius citato, Cerebrum per se sensus esse expertum: At notandum singulos ejus autractus & mandros tenui meningē, exquisito sensu pollente, ubique investiti, à cujus extensione, laceratione, divulsionē, punctione, vel alia irritatione, vehemens exortiri potest dolor: praestem si calculi, vasa vel sinus cerebri premens, liberum humorum & vaporum commensum prohibeat, unde doloris incrementum.

Lapidei &c.] *Kermmanno* testis multi praeterea accedunt, quos recenset *Schenkius*. Eisdem autem generationis habet causas quas in ceteris partibus, Suc-

cum scilicet lapideiscentem in *ex calculea* alimenti hauriantem, quod lecum velut serum *ignis* *vir* *spasmi*, in quo exhalatio sicca & terrestris soluta est, instat talis autem aquae calcis, cui pumita potest adungi: Ibi igitur possibilia est generatio calculi, ubi conjunctio illa sit: prout exhalatio illa magis vel minus usta & attenuata est, hinc color intensior vel remissior exurgit: Prout plus minusve pituitae ammicetur, eo subitanea solidior friabiliorve est: In omnibus autem alimentis & poribus adest fuligo, ut sic dicam, quidam, quae in serum & corpora, si id salium: inde urinae & sudoris in salido:

APPENDIX.

Globulus plumbens menses sex, nullo symptomate superveniente, in cerebro delitescit.

Globulum plumbum Vir Reverendissime, &c. In vacuo ventris, aut inter musculos, ad multos annos inrerdu delitescere posse experientia testatur: In cerebro vero id fieri nusquam visum esse arbitror: Attamen retulit mihi *Joh. Griffonius*, apud vos olim Chirurgus, casum tam admiratione dignissimum: nimirum tempore belli inter Ducem Sabaudiae & Genevenses, in expugnatione Castris, la classe dicti, quendam ex Genevensibus, Clerget nomine; ictum sclopeti in fronte cum insigni fractura cranii accepisse: Aegro semimortuo Genevam adducto, se methodicam instituisse curandae rationem, imo ossa non pauca extraxisse, globulum tamen nullum se offendisse affirmavit: Nihilominus miserum hunc pristinae sanitati restitutum fuisse, & se mense post curationem incolumem vixisse: Cum vero morbo acuto tandem obiisset, cranium ejus aperuit, & globulum è regione verticis, inter cranium & duram matrem, ad latus Suturae rectae invenit, membrana tamen plane à globulo illaesa: Natura enim ea in parte materiam quandam callosam procreaverat, quae durae matri ad instar culcitrae subiacebat: *Fabritius Hild. cent. 1. Observat. ij.*

De Clergeto quod scripsi, saepe me cum ipso locutum affirmo, ex quo sanatus est ex vulnere illi inflicto in capite, glande plumbea in ipso cerebro ad multos menses retenta: Postquam autem in excursionē alia fauciarum vitam cum morte commutasset, & à Chirurgis extraordinarii casus illius investigaretur causa, audivi glandem illam ipso in cerebro repositam fuisse &c. *Antonius Fayus Theologiae apud Genevenses Professor &c.*

OBSERVATIO CXIII.

Capitis dolor letbalis ab offculis circa falcem adnatis.

Diffecui corpus sexagenariae, in cuius capite, parte interna durae marris, Falce dicta, reperi sex offcula lara, quorum quaedam quatuor; alia quinque aut sex eminentiis, cuspidum acicularum instar acutissimis, donata erant piam meningem quoque pungentia, hinc continuo capitis dolore vexata fuit: *Neander in Tabacologia.*

S C H O L I A.

L *Enallu* *Observat. Anat. 2.* in cadavere offcula quatuor, inter utramque cerebri partem invenit, dextram videlicet & sinistram, recta suo sigillatim commissa posita, & sub torculari septo ipso affixa adnataque; quorum majus erat longiorinis crassitudinisque phacoli, alia vero paulo minora, micimum sublongioris lentis speciem referebat: Dura erant, atque durissima cranii pars, innisque spongiosa instar ossis lambdoidis: An is in quo reposita sunt capitis dolori obnoxia fuerit non memini: *J. van Horne*, notis in cum loquum, ait bis idem à se observatum Lugduni Batavorum, & etiamnum se afferre falcem è capite viri clar. anno 1699. exemptam, in qua spectare est utrinque, magis tamen à dextra parte, offcula plura è lara basi in acumen definentia, & rupis cuspideum

instar aspera & inaequalia, ductissima item & valde solida, intrusae, quantum oculis assequi liceat, quodammodo cavernosa: Cum autem suspicio incidere non contino capitis dolore afflicti fuisse vir ille, dum viva fuisset, negasse hoc propinquos: Absentia doloris enim causae adscribenda venit non video, cum patientis dispositio & causae efficacia adfuerint; nisi dixeris circa primordia adfuisse dolorem, ac tandem hebetiorem esse residuum partis sensum: vel forte mucilaginosam quandam materiam obducta fuisse; à quarensi sunt aculei; quod invicem calculo contingit: Vel ab initio cartilagineae molliorae fuisse, quibus sensum induratae cumbar, paulatim assueverunt partes circumiacere duriciei incrementi.

OBSERVATIO CXIV.

§. 1. Capitiz gravitas ab hydrargyro post inunctionem in capite relicto.

IN Xenodochio incurabilem Romæ, in illis qui post mercuriales inunctiones obierunt, capitis tibiærumque ossium cavitates argento vivo scatere deprehendi: Atque in uxore I. C. cuiusdam (quæ frequenter inunctione ex hydrargyro usa erat, & in eam capitis gravitatem denerat, ut eo parum in latus aliquod inclinato, statim illuc magnum pondus deferri perciperet, nec caput, nisi adhibita manu, attollere poterat) hinc ejus uncias inveni: *Petrus Castellus Dissert. 1. Dodechap. chalcant. p. 7.*

§. 2. Docet hoc Artificis Anagoria Romæ facta, qui cum summos capitis dolores passus obliisset, in aperti capitis cerebro plusquam libra una Mercurii reperta fuit, ex vapore ejus hausto ibique congelato. Ex observ. *Ph. Jac. Sachs Medic. Frasilienensis.*

§. 3. In femina calvaria quæ fucus ex Mercurio quotidie usa, & per biennium enormi capitis dolore fatigata, in osse calvarie uncie duæ Mercurii inventæ fuerunt. *Zwingerus Theatri f. 520. Ex Cardano de subtil.*

S C H O L I A.

Artifabz, alique qui oimis crebro Mercurium trahant, aut ejus fumum ore aut naribus incautus trahunt, nervorum vitis affliguntur: Neque ab simili modo, (nostrate Kircher de arte Magn. l. 3. p. 1.) Mercurius cerebrum nervosumque genus subit, quo vas Mercurium comitens, si enim loco claufo exponatur vas aureum, & dein Mercurius supposito igne in auras abire permittatur, quem libillimem avolasse credis, eum similia fuga in acri vasis amplesibus hæzere deprehendit: Unde inferit, cum non raro in cranii sepulchris invenitur, ea esse talium artificum, in quorum cerebrum vaporis specie per nates irreperit, ubi concreverat, ac etiam post mortem superfices sit, non vero generetur, quod credunt qui

Mercurium materiam Lapidæ Philosophici falso experimento pectant. Quin & extrinsecus admodum per poros corpori se infinuat, divisis particulis iterum se uniantibus; hinc, nozante Exccll. *Bertholus cent. 1. hist. 7.* ex mamma concreta Mercurius extillavit, quod lamina admodum unguento Mercuriali afficta fuisset: 8. *Jacq. apud Ruyum obs. 13.* aureum globulum oaribus indit, & nummum aureum ost. ad eluciscendum Mercurium è Capite eorum qui ob loem veneream inunctionem passi sunt, & *Zachw. Prax. admitt. l. 2. obs. 128.* ex articulis ejusdem extractionem per applicatum aurum foliatum tentat: *(ampulla Principi, ab eadem inunctione doloribus habitus vexato, ad motionem cucurbitularum aurearum cumiitit.*

OBSERVATIO CXV.

§. 1. Capitiz dolor pruriginosus à pediculorum caterva sub pericranio & intra cravis diploas latitante.

Matronam in Auverniet (oppidulum est Principatus Neocomensis in Helvetia, quod lacus alluit) pluribus mensibus ~~tormentis~~ Capitiz dolor adeo immanis direxavit, ut nullas inducias concedens ab omni consortio, imo etiam sacris coctibus eam segregaret, perpetuoque sculptu caput dilacerare impelleret, non secus ac eos qui id pedibus oblitum habent, ut cum Titinnio loquar, quamvis nulli decuterentur pediculi: Interim nubentis fororis cæremoniis interesse coacta, doloris insaniam toto bilorio in Sacris ædibus sustinet, semihora in convivio nuptiali, unde se subtrahit lecto ultimo se traditura, in quo paulo post, ferociente dolore spiritusque exhauriente extinguitur, à denegato solatio & anodyno quod concedebant unguis.

Mortuæ divisis capitis integumentis, sub pericranio Pediculorum myriades deprehense: dissecto vero cranio, ejus medullarum illudom scatens animadversum, qui viam vi, procul dubio persururas sibi fecerunt;

S C H O L I A.

Totum corpus ejusmodi animalculis in prædam cessisse novum non est, Quis non pavet Pherecydis fura Tragedi? & cæ, Sylla quoque infilia tali languore perelus Corruit, & fudo se vidit ab agmine vinci. Recensissimum vero exemplum suppediavit annis 1671. exuante hyeme: E lexcentis Equitibus, agmen Generosus. Marchionis de Lussing: Allobrogi, casta Maximi Regum sequuti, componens, vix deserta pars superstitis evalit, plerique non armis ceciderunt sed dysenteria: Reduces vel pedum gangræna confecti, à diutina in paladolo solo mora, indefinente ocreant gestatione; vel Phthierias: Adeo ingens Pediculorum numerus corpus occupabat, ut paucis diebus fode & misere illi interirent: Ne ipsa thoracibus bubalnis (familiæ Equitum vestimento) pepercerant, in quibus domicilium quæsierant, crebrisque effosis cuniculis pererebant & eroderant. Morbi autem Pedicularis (speciatim caput invadentis ac ad necem deducantis, nullus quod sciam meminit, præter

præter unum *Hartmannum*, qui *Peccores Chymistæ*, l. 2. cap. xviij. de Pediculis cerebri agit: à se autem visio, aut ab alio non memorat: quibus abfidentis præscribit cerebri porationes, parricida, suffumigia à candellis ex cera & cinnabari trita confectis accendisque: turundas ex mercurio dulci in pinguedine capri distemperato natibus inditas: Tria vero ejusmodi animalculorum recentiorum genera; primum palpebrarum, superciliis, aëllis, immixtis oculi infectum est; cæteris partibus parci, Italis *Ptattæ* dictum, Gallis *Morphi*, durum, depuratum, curi pertinaçiter affixum: Secundum commune partibus omnibus quo pilis velantur: Tertium sub cuticula latitans, præ parvitate vim per se effugiens, Acari dicuntur & Cirones: Sed versus quasvis species fluendum, secunda enim divisio nem reveta admittit, cum colore, figura & indole diversi sint: quandoquidem capillæ capitis sedi infesti nigricant, ejusque incole, nisi petine aut aliter denubentur, Ideo Nigri dicti & Capitis: Alii, excepto capite, ubique oberrant, Albi vocantur, caput nunquam invadentes, circa loca contracta præteritantes hærentes, cruralium fasciolarum, maxime circa collum, ob niduland commoditate in indolis rapis, hinc utrique limes confitui videtur, ac neque Nigri infia tendant, neque Albi capillum affequent, quos oblongos aut esse *Hafereffium* Nofodoch. l. 1. cap. 10. crassiores in pane polteriori, densiores in acuto verius caput; in vestibus laneis & sordidis latitantes, inenalis præparationum milium, remigum, medicorum: Ab his Pulchellus induitur: à prioribus interitum hauri milles multiter. De generatione vero impertinens illis animalculi consilium Medici & Philosophi. Verissimus est eorum sententia qui ortum ex succis calidis & humidis deducunt, tertie concoctionis reliquijs, modica putredine affectis: Pronam vero esse hominis carnem & succos ut in ejusmodi animalculi materiam facillans, vive vivus sit live mortuus (quamquam Rondeletius neget in mortuo fieri, quod cadaver figunt) ostendit historia sequens. Ante annum circiter lxxx. in pagu quodam Ditionis supra memoratæ. B. aut dicto, ad fauces vallis Transversæ, qua iter est in Burgundia Comitatum, Diffores erat celebris autocratum, ob carnis teneritudinem & spissitudinem insignum, com-

fectione, ut eo omnes rufici et vicinia inde de causa confluerent: Quidam advenit emporum ad hiliat celebranda. Divertit unicuique sapere ait ante occidendum factum: ille non abstinuit, pretium solvit, dicitur, mensis apponit: operculo cultro remoto, per fures perdidit obrantes pediculos animadvertit: per convivium unus et ceteri humana confecti alii: confectionem non fuisse in fectione pergendū digibus humanis repperit: Res illico ad iudicem delata. (Majorum de Rochefort) qui Divertitorem comprehendit iudice, examini et tormē subijci, extorqueat veritate carceris omnibus pagis incolis, latrocinii quoque reis, inter quos fuit et mulier, tota post confecta membra imponi. Novimus præterea juvenem calidi & humididi temperamenti, à foridie alicuius, qui prout iam in pectore sentiens, eo modico pulsatim deprehendit, quam digiti compingens, inde pediculum adalutū expressit: Porro iussitum istud animalis arctis & lacerbis ejusmodi gaudere mihi compertum est. Cuius enim aliquando Aleis ungulae segmen collo poellat, fontico morbo obnoxio, qui illi à scabie capitis in tempestive sanata ortus fuerat, appendendi desiderium iussitque revocari feci, ac severe nimis arceat pediculos prohibuissim, horum quidam poroso illi segmini le infinuavit; quod cum uxor in propell illi fantis utam, ad præcautionem convulsionum, repetitit, hincque paucos post dies totus pediculis obfatus esset, ne comam nidus inquireret, hic in tegmine illo speret, cuius nullus porus pediculis continet, forma refferus erat: Sed de hac fedestate miris, Plura qui desiderat adex m. Donatum l. c. 5. hilt. mirab. Schenklium p. m. 675. Heurnium de morbis cap. 7. & alios. De pediculis alacis vide Diodorum Siculum l. 4. cap. 5.

Integumentum capitis divisi] Civis Sedanensis ante
decem circiter annos molesto, perpetuo & puni-
ginofo dolore, pavo loco circumscripto suffecto, ne-
multos in consilium adhibuit, nihil omnino us, qua
parte dolor torqueret admoda novacula, inventum
animalculum cemicis forma, denari magnitudine,
peritello in occipio alium, quo dempto, consoli-
daroque vulnere, dolor omnino desit. Ex commu-
nicat. *Classif. & Ven. Dom. Lumborum, Pagine*
Sedamensis Eulalia.

§. 2. Anno 1674. mense Augusto, puella quatuor menses nax, filia magistri N. du Croi Genevensis, argenti in fila ductoris, per matris incuriam sub crusta lactea pediculi plurimi innati sunt, à quibus *non tantum solum* & pericranium, sed & ipsa calvaria cum meningibus, ad cerebrum usque exesa deprehensa fuit, quod ab obitu, detracta ea crusta, ad coronati arcei latitudinem in conspectum veniebat.

S C H O L I A.

Nos autem scimus &c.] Dum in norticarum corporis reflagant sanguis, evomit excrementa quædam tenuia vel crassiora. Tenuia per insensibilem transpirationem fugantur : Mediocria in sudorem se effundunt, Crassiora forde inquinant partes, aut refluunt in cutem : Hæc autem cum suam amplitudinem in profunditate gerit : Quod si itaque hoc crassamentum extremis tui peripheriam cuticæ occuparit, in porriginem se porrigit : Sin in aham se infusus fuerit materia hæc teritæ coctionis, & una malignitatem acrem redoleat, arcem creabit : quod si illud suave & calidum fuerit, nec maligna putredine contraminatum, sed modeste putrescit, & si ima in cute prope carnem stabulaverit, pedunculos proferet ; nam caloris in cute superticis efflorescentis non ea vis est ut animal pigri in eo possit : Profector Regius Lova-

nientia olim *Brugium*, mihi restat sese in humano secundo cadavere, postquam aperuerit ventriculum, vetustatis et afflictae dependendae pedunculorum plenas: *Amygdalus* s. de lult. anim. pedunculos ex carne gigni existimat, *Hieronymus de morib. capiti cap. viii.* Quid vero obliquit quod minus in praedicta Matrona, sub pericranio geniti, in superficie emeruisse? An illius crassities et densitas quam pervadere non potuerit? An forte ad mulcendum prurium capitis litionibus ulla est, quae eos exitu prohibuerit? An oleosis et pinguis caput inuixit, infestorum ejusmodi perennae? Sic lumbicis in intestinis olei eius interimit: quod enematibus vermes ad superiora remeare cogit? An quia gæum et sufficiens alimentum sub pericranio et intra crani diploas nacti, aliud quæsete coacti non sunt?

Quæ de diftictine & diftinctione (peciei pediculorum adduximus, confirmant Acta Societatis Regiæ Anglicæ, anni 1668. p. m. 181.

Ab aliis autem reſerſum obſervationem illam, quam Oris-
do tribuit de pediculo (ſemp̃ illiſ ſugere ab Hippocrate
dicat potentibus ſub certo Latitudinis gradu, & rursus ſub
eodem gradu in reditu redire) verſionem eſſe : In Indis,
ſcilicet, neminem quæcumqueque ſingulariſſimum alere pediculus
inſiſſe capite, ali plures forent, ſed nunquam obſervavi
ſed ſingulariſſimum eos habentem in indusi vel veſtibus : Et
in reditu deinceps obſervavi eos deinceps multiplicari : Ratio-
nem redditabat Generoſus Eques Chriſtophorus Mager, Eos
quando appropriant Triſſis, ſive a nodum ſutare, qui
ſuſcit per corpus abundans offundit veteres pediculus eſſeque
perirent : quemadmodum, an, uſitatum eſt remedium capi-
tulis pediculus ſtationibus ea ſecare aliquo bigno vel alio,
& ſi ſingulariſſimum fore inde parire omnes pediculus : Et quod
aliis ad notam quendam generationem, ſuſcitum non ſunt
ſed in peria perianthem non poſſe penitus producere illa in-
ſeſſa, nam nullum in Indis ſuſcitum eſſe alidum propt̃ in Eu-
ropa, quoniam ipſi obſervare ſunt : In reditu ſuſcitum du-
cunt ſubſcit peria & habent corpore, & particulares formas
ſuſcit ſermenta, exaltata & reſeſſa, redolentia in altera-
tione, hac inſeſſa formam & ita ſerri : Sed ſi reſeravari,
qui in Indis alatur in capitibus ? Reſpondet, licet ſaves
noſtra multum ſuſcit, tamen non tantum ſuſcit capillis :
pariter ſuſcitum inharere capillis, utque generare inſeſſa,
neque illi capillum tantum atque hoc ſerri eſſe : Sed quæ-
quid ſi, Hippocrati Niget lavare capita ſua ſapone ſine ſi-
gula ſipimani, quo prævoſit pediculorum inſeſſationem,
ſed ali Nigermolium tempore impetum curandi capi-
tibus, quæ quæ uſiſa frequentiora ſunt pediculus quam An-

ſeſſatum, adeo ut affirmet videliſe magnos tumores in capiti-
bus quondam ignaviam à pediculo alere.

Mortua] Quæ miſella medicina alſecti poſuiſſet
non video, quoniam cauſa doloris obſcura non fuiſ-
ſet, An Topica ſatis efficaciſſima dabitur : quæ enim pe-
ticulariſſima denſitatem perſuſſent & erant primam li-
minem, ea cerebro vim noxiam impreſſent : vali-
dioribus enim opus fuiſſet, quibus eſt mercurius, quæ-
modi inſeſſationum clava Herculeæ, ſed qui cerebro
bellum indidit : Ab Hartmanno propodia medicamen-
tatione de naciſus aſſumpta, vim ſuam eouſque exſe-
re non valuiſſent, quod totam cerebri molem ab illi
reſcici neceſſe fuiſſet, antequam ſedem affectam at-
tingerent : Imo ſupponamus remedium valida vi
eneſſos pediculos, mon ab ea cauſa verum ſtrage
novum emerſiſſet periculum : Providentiæ nature
opus eſſe centent ætem naturalium periti, quod ex
humorum corruptione animalia proſeſſet, quia eo
paſſo coercetur & damna ab ea oriſi ſolia elimi-
nentur : Ea ea ergo congerie nova putredinis occa-
ſio, ægre non minus ſat hie emerſiſſet : Lumbri-
cum in incitantiſſis genitorum alia eſt ratio, emelliſſis enim
patens eſt ad exitum via : Quodam vero præſidium
ſuppediallet Chemiſia ? An periculiſſi ſimplex, aut
decuſſuſſa ſacta inſeſſa ? æ hoc univ. ſum demen-
dum fuiſſet, hoſpitiſſum toto ſuo ambitu carere præ-
bens : Quid terebratio valuiſſet & erant quopiam
in loco aperto, exitum non aſſeſſantibus animalu-
liſ & latebris illiſ gaudenibus ? De mortuis
ex pediculari morbo. Vide
Zwingerum Theati vi-
tæ hum. 1535.

OBSERVATIO CXVI.

Cephalalgia à verme in anfractibus cerebri latitante.

Anno 1571. in Marca Anconitana, in oppido Albugo S. Sepulero, graſſabatur mor-
bus atrociffimus quidam velut Epidemicus, clandestine homines invadens, paulatim
Vertigine affluens, verum in ſecunda, 3. aut. 4. à decubitu die ſtatim jugulans, & caput ſo-
lum tentans, Cujus cauſa & eſſentiam omnes illius loci Philoſophi & Medici plane igno-
rabant, nec potinde ei occurrere poterant, &c. Longo poſt tempore Nobiliſſis quidam
xxii. duos natus annos, hujus mali primo ſuſpicionem, mox & reſpſa affectus, multis in pa-
tria fruſtra tentatis, Venetias tandem navigavit, mox ad ſe vocari curavit Medicos, qui-
bus firmiſſer multisque rationibus comprobavit aliquid eſſe in cerebro vivens, fieri enim
haud poterat ut atrociffimis huiusmodi doloribus perſodice ita afficeretur quemadmo-
dum afficiebatur : Nam illaſſa ratiocinatione, intellectu, memoria & omnibus internis ſenſi-
bus, ita pro tempore cruciabatur, ut ſibi etiam totumque cerebrum in rebello perſo-
rari videretur, mox per univerſum cerebrum extensiones, contractiones multasque com-
motiones, cum maximis conſuſſionibus & tremoribus frequenter & in omni paroxyſmo
percipiebat : Ob id multis adiutoria & interne exhibita fueret remedia ſed fruſtra, nam tertio
ab adventu & ejus Venetias ingreſſu die, hac miſera functus eſt vita.

Secundi data venſa, novacula in capite ad os uſque, orbicularem per frontis medium
molitus ſum ſectionem, & eute aliquomodo remota, calvariam orbiculariſſimè ferra diviſi,
atque ſectione per calvariam ſacta, ac ſuperiore calvariz parte à dura matre liberata, ad
piam matrem deveni, cerebrumque membranulis denudavi ſuis, quibus extradiſ, illico
concidit & quodammodo diſſuſſit, moxque ex dextro anfractu prorupit atque apparuit
caput cuſuſſam lumbriſ, qui ſtatim aère percepto frigidiore, ſeſe in cerebri anfractus
recipit, unde utrinque magnam cerebri portionem, quo cauſiſſis potui, aſtuli, ne id quod
ſuſpicabamur fore detrimentum pateretur : tandem apertis de xtro & ſiniſtro cerebri ven-
triculis, maxime conſuſis, dilataris & ad capitis baſim conſpicuis, repertus eſt lumbri-
cuſtorus ruber, indice digito longior, acutum os, oblongum & nigrum atque piloſum
collum habens, multis modis ſeſe in illis anfractibus convolvens, & ad capitis baſim ſere
pertingens

pertingens, qui obtusiori forficula exceptus, & munda papyro appositus, paulo post obiit, qui nostro patienti etiam mortem intulit. *Ex obs. Georgii Garnerii Medici Austriaci.*

S C H O L I A.

Vertiginis affligens] Hinc Saxonia *Pantelii* lib. 1. c. 2. inter signa vermium lo capere, præcipuum ponit vertiginum frequentiam, quod ad eorum motum spiritus simul agitentur: Addit dolorem simul esse acutum & pinguivum; accedere strusuramentum frequens, salivæ multitudinem, oris furorem; vehementem corulosorem, pruritus & furorem oculorum, & ex quacunque agitatione capitis, odore lugrato &c. dolorem ingravescere: de signis vide plura inferius.

Multa admoia & exuvia sed frustra] Felicitati creto præmici usæ exclusus per inter vermis dirum ca-

pitit dolorem inferens, Rutica, inquit Excell. 75. *Berboldum* Epist. 74. tom. 1. cum per multum tempus diros sensisset capitis dolores, tandemque ille adeo increvisset ut insitit maniacæ hinc inde discurreret, venit ad Pastorem pagi, famulosum inter rusticos Medicum. Prædicum: Is statim consuetum sibi in cephalalgia præmicum mulierculæ insubule, quo caput vehementer concussum una insautum hospitem loco movit, &que uare exire compulsi, quo facto immanis capitis dolor itatim coquevit

§. 2. In quodam milite, qui resimis erit naribus, ex fœdiorum quadam eluvie diutius cohibita, vermes duo villosi insitit digiti inventi sunt, qui tandem in furorem illum adgerunt & de medio sustulerunt: *Fernelius* lib. 5. pathol. cap. 7.

S C H O L I A.

Verbes dolorem capitis architecti fieri quærit, tum in inselliois, tum capite contenti: Vitales sunt spinæ, parim puogant partim lancinant: multoies autem nascuntur lo anteriore capite, super locum qui est in strichata narium: Notabilis est historia famuli 24. annorum adolescentis, qui canicularibus æstu ferventibus diebus, conqueiebatur de dolore frontis, titillariune super cavitate strichuræ narium: Re pensata, iudicabatur ut in oculibus, ita in hoc vermiculos subnatos in cavitatibus seu sinibus, qui in infima ossis frontis parte reperiuntur, utriusque in nates summas peryllis, non vero ad cerebrum patentibus: *Trucur* lib. 9. c. 11. se in Nob. Veneto, cephalæ antiqua laborante, naribus ejectionem vermem cum pedibus, muco & cruore oblitum vidisse, eoque

rejectionem omnem cessasse dolorem scribit; Signa sunt præstigiosius quidam dolor cum inclinatione lo vertigine: Si lateant in cerebro, notantur à doloris gravitate diurnitate & rosione, cum inclinatione ad soporem: In meningibus, à pugnativè vehementia, cum stupore mentis: Ex *Avicenna* cap. 8. *Vermium signa*, ali, *fuit illa que tota dext. Cerebrum ferit, & fatur odore, & su Soda ferit cum muco, & ejus sedans est cum quare*: Apertio foræ ossis frontis in vermis contentis, sua salutaris anchora est: In bove feliciter instituta fuit de vacca: In homine tamdiu suspendatur quamdū spes est vermes ætate paros adveniente autumno morituros: Cam desperata salus, de ea cogitandum: *Rossijus* Tracl. de cap. dolore.

OBSERVATIO CXVII.

Capitis dolor à vermis inter meninges & putredine circa cerebrum ortus.

Quandam fuisse matronam memorant, cui post capitis vehementissimos cruciatus pestilentis Hemitritæ, dissecta calvaria magnam putredinis vim ostenderit circa substantiam cerebri, Ex inter meninges tum vermiculorum tum cemicum copiam incredibilem *C. Gemma in appendice. Oper. Cosmocr. de Hemitr. pestilenti.*

S C H O L I A.

Quamvis *Egineta* l. 4. cap. 57. ex vermis dolores excitari quidem concedat, in cerebro vero generari neget, nihil tamen absurdum sequitur si localem in co generatorem habere dixeris, cum materia eorum productioni maxime idonea sit pituita,

(cujus cerebrum metropolis) que accedente calore loci potest putrescere: Porro, si inter cranium & cerebrum abscessus generantur, quidni & vermes quorum micot est putredo?

OBSERVATIO CXVIII.

§. 1. Capitis dolor à verme inter calvariam & piam matrem latente.

Cuīdam dolor capitis implacabilis circa sururam coronariam: irrita medicamenta, qua parte dolor designabatur, eadem facta scalpello sectio, non profuit: Aperto capite, repertus est vermis inter calvariam & piam matrem situs: Si tetebrata calvaria fuisset, spes vitæ aliqua fuisset. *G. Ballonius. Parad. XIX.*

S C H O L I A.

Inter calvariam & piam matrem] Interjacet quidem dura meninx, sed quia hæc quibuscumque in locis, cra-

nio artissime adhæret, recte designatur locus in quo vermis stabulabat.

Si Trepanata calvaria fuffit] Trepanum eft remedium evacuatorium, illis tantum affectibus conueniens qui funt ab aliqua materia fub cranio concocta; quæ fi eft vacua iudocæ; vel immixta fub cranio continetur, vel profundius in cerebro & fub membrana: Materiam quæ profundius fub cranio eft, quæque per cranium eft euacuabilis, tantum eft vapor & fumus, non autem materia aliqua humorofa & craffa, talis enim grauis eft & fpiffa, & fic nec ascendere poteft nec meningem penetrare: Vapor vero cum tenuis fit, & factum fixi & meningem pervadere poteft, itaque in morbis qui funt ab humoribus in cerebro contentis non poteft Trepanum conuenire; verum in affectibus difficillimis, qui à vapote & fumo maligno ac venenato fuor, poteft Trepanum locum habere, evacuando caufam eorum quæ alioquin per folidam offis (ubftantiam exire non fatis poffit: Tales morbi funt Epilepfia, Vertigo, Melancholia, Cephalalgia intolerabilis: Adde in morbis grauiffimis & maxime diuturnis, quia cum remedium per fe fit magnum & periculofum, non debet temere, & nonnifi in maximis diuturnis & intolerabilibus morbis, poffitque alia omnia remedia non profuerint, adhiberi: Cum vero pædidi morbi aliquando fiant ab humoribus, à vaporibus aliquando, non conuenit Trepanum in iis nifi quando à vaporibus funt generati: Eft autem ob remedia difficultatem iaro in illis affectibus trepanum adhibetur, tamen Rationi & experientie conformis eft ipfum aliquando adhiberi: Rationi, quia fi in talibus affectibus carentia fapiffime fupra

fartam coronalem adhibeantur, ut per ea facilius iidem vapores exire poffint, multo etiam facilius iidem eibunt, cum etiam ipfam cranium erit pervium fivamine, quam cum tantum ipfum pericranium & capitis cutis: Verum quidem eft quod vapores capitis per faturas crani fæpe exeat, fed non fatis commode, & in fanis, cum vapores funt pauci, non autem cum nimis funt & calidiores: Experientia vero patet etiam hoc remedium etiam in illis affectibus conuenire: A *Saxonia* adhibuitur fuisse in cephalalgia gravi dictum Obf. 108 Probatur ab *Hallerio*, in melancholicis morbo etiam ic ibi *Gæmari*: Dacti magnitudine mulierem Trepanatæ, & Trepanum menfe uno apertum relinquit: *M. mini* quando mulierem *Leodii* capitis incredibili & diuturno dolore laborantem, à D. *Riccio* Trepanatam effe & dolore liberatam: Certe in fupradictis nimis diuturnis, intolerabilibus & aliis incurabilibus capitis doloribus, qui fub cranio in eodem femper fixi loco finifunt, credo Trepanum fapiffime neceffarium: Illi, fapiffime quoniam tales dolores funt ab offis carie diffilante, & fupra meningem aggregata, ac offis particulis propter eam fecedentibus: A *vermibus* etiam *idolum gentis meningem pungentibus & erodentibus*: Sape à *lumbis* ibi cranio fubtus adnafcentibus, ut in morbo venereo aliquando fit, in quibus cafibus malum fide Trepano curari impoffibile eft, quæ enim alia ratione quod ibi contentum eft poffet evacuati?

Thomas Firrus curavit, Chirurgia.

Thall. l. cap. 17.

§. 2. Nimis diuturni; intolerabiles & aliter incurabiles capitis dolores, fapiffime funt ab offis carie, ab offis particulis &c. A vermibus etiam ibi generatis meningem pungentibus & erodentibus: fæpe à lumbicis cranio fubtus adnafcentibus, ut in morbo Gallico aliquando fit &c. *Fieri loco cit.*

OBSERVATIO CXIX.

Capitis dolor à verme nigra tunica involuto, quæ cerebelli fubftantiam à dextro latere feijungebat à reliquo corpore.

Luterianæ puellæ annorum XII. curatis variolis tantus capitis dolor fupervenit, ut trium menfium curriculo nec dormire quiverit, nec quiefcere, nullas dolore inducias concedente:

Tandem cum Tabida obiffet, ftatim aperto cranio deprehensa fuit *universa cerebelli fubftantia in dextro à reliquo corpore fejuncta*, nigraque tunica involuta: Rupra tunica nigra, vermem nigrum pilofum, duobus punctis fplendidis loco oculorum, prodidit latentem; ejuſdem fere mollis quæ reliqua cerebelli portio, qui duarum horarum ſpatio fupervixit: *Thomas Bartholinus centur. 1. hiflor. 64.*

S C H O L I A.

Nec dormire nec quiefcere &c.] Vermium in capite figna recentis *Reverendi de Abdin cap. 100.* Siles, aut, interdu accutus & pettiflor dolor in capite excitari quem *Gæzel* Cephalalgiam vocat, fcilicet talem quo caligine oculi, alioceur mens, cietur vomitus, fupprimatur vox, frigefcat corpus & ipfa denique deficiat anima, tantum eft videre: Nam & nos amicum habuimus, qui cum his omnibus ageretur malis, & adveniente die 7. mors ipfa, nullis conferentibus auxiliis, jamjam adelle videretur, vi tandem robuftioris natæ vermem à dextera nare palmo longior em eiecit: quo propulſo omnis itam cum eo amorus eft languor: Hæc figna adducit *Rafa. cap. 10. l. 1. contra.* Corroſionis ſentium in capite, odorem fœtidum

& augmentum doloris ad motum capitis: De iis agit *Avicenna* *Fen Thact. 2. c. 1. l. 3. can. loubenat cap. 9. de cap. aff. Hoff. 1. de morb. int. c. 1. Memus Anaf. l. 4. c. 19. Th. 1. f. 3. comm. adducit hæc: Puella annorum 18. aliis. Aliquando autem vermes non localem habent in cerebro generationem, fed per aures itrepunt, de quibus no ante hiftoria hæc: Puella annorum 18. in ditioce Bapebergi, in prao dormiens, i vermibus, coandis, dimidiis auricularis longitudinis, lumbicis, caſſide adequans, aurem fubioravit dextram, & paulatim rodendo in frontem ascendit, inibi que per 4. ſeptimanas hoſpiarius incommoda puella peperit quamplurima: Deiecit ab omnibus facie jac, Berach pharmacopæus, in aures puellæ reclinat*

G

reclinat

reclinat capite immittens oleum juniperinum : quo aliquoties facto, duo eieci vermiculi minores albi, prædicti soboles : Post ulteriorem illius olei infusionem, tandem & genioi or illosum rubei coloris enectus compaui, soboleque intolerabili circa frontem dolore, qui suffusi gonni Ammoniaci, una cum effluuii saniei ferentis, fuit sopitus.

Hac ætate adit me vetula annorum 68. hæc ante virginis annos, cum incautus molem graminis capiti impostam gestasset, feila lineamini illius sarcinæ, infestis scateni, capiti supposito obdormivit, itreperant dextram ejus auiem formice, dictæ alias foibdinæ, quarum una Chirurgi ope fuit extracta relicta aliis, quas elicere vel solentissimi consulti Medici nequiverat : Hæcenus immensis eorum copia cerebrum inter & cranium commota, in diesque immensius reddita, ærumnosa muliercula vitam reddidit, ut hac illac repetentibus insectis, dolorem tam in manuum quam pedum extremis sentiat. Quod si caput illico, hinc inde mover, interiori capitis crepitare adstantes non obicere audiant : Hæc verò, ut ait auxilio esse anniebat, incallum tamen omnes nostri abiecti conatus : Ballium sulphuris terebinthinum auribus ejus immisi, præter unicam (sed enectam, non poti elicere : Insectum enim illud meatus istos adfusus longo facti tempore quasi obvallat vero admodum est simile : Famo gummi Ammoniaci cerebro usi mire delectabantur vetula, dum ad exitum accurrere forbicinas semper observaret : Cum itaque nullam superesse videret ista fecmina auxilium, ad extremum vitæ terminum toleravit hoc malum decrevit, rogans saltem, ut exandatis tandem hujus vice

ærumnis, calvaria ejus aperiretur, ut que ex tanto infestorum hospitiū grege tormenta fuerit perpassa, omnibus immoesceret.

Mense hoc Augusti paupercula consilii gratia me convenit, cujus filiula fere triennis finitæ aui vermiculus ante triduum, etiamnum vivens, forme & magnitudinis, quales avellanarum esse solent, pluresque ante, calentis beneficio panis erepere : læta est alioquin puellula : Vtrum vero hoc insectum extrinsecus ingressum, vel intra genium fuerit, in dubio relinquatur : Adco vita quoque nostra vermium ipsorum præda est. *Joh. Georg. Puckner in Mysel. casuor. anni 1672. observ. 166.*

Univerſa cerebri substantia in dextro ſynclia ere] In quibusvis animalibus cerebri compages in duas partes, per totam fere crassitiem, scilicet usque ad corpus callosum, quod fundi loco est, dividitur, pariterque ac in seniois omnibus cerebrum quasi duplex habetur, ut coetera unius lateris defectum alterius supplemento provideatur : Porto in homine, cui cerebrum præ cæteris animalibus capax & amplum est, utrumque hemisphaerium sursum in duos lobos, anteriorem & posteriorem subdividitur : Cere hæc cerebrum humani secunda partitio etiam in majorem ejus lateralem designari videtur, ut si fusus habes quædam alterum, aut utroque pilores lobos occupare, tamen postiores, si quidem discontinui sunt, uote vicinæ ac latius grassantis contagium evadant : Ita cerebrum, velut castellum, in plures arcus seu propugnacula divitum, eo munitionis & expugnata difficilior exitus. *W. parhel.*

cerebri cap. 2.

OBSERVATIO CXX.

§. 1. Capitis dolor à vermiculis circa nates & anum in cerebro latentibus. &c.

Doloribus rebellibus regiam mentis arcem instantibus, qui nullis præsidii expugnari poterant, fomitem subministrasse vermiculos circa nates & anum, tertii ventriculi cerebri collem & convallem docuit Anatome. *G. Rolinskius Dissertat. Anatom. l. 1. c. 13.*

§. 2. Ancilla quædam in Cimbricia diu capitis doloribus enervata, quum forte reclinato capite rhedæ incumberet, alius aurem ipsa inscia baculo fortius rhedam percuteret, statim fractum cranium dissiliit, innumerabilibus prodeuntibus vermiculis. *Th. Bartholinus cent. 6. histor. 3.*

SCHOLIA.

Nulla præfata &c.] Interdum natura robusta ejusmodi animalcula sponte propellit cum ægri salure : Sic *Ammonium* cap. 100. narrat cuidam Philippo nomine, dolore capitis acuto laboranti, mentis alienatione, caligine oculorum, aliisque prævis symptomatis, cum jam mors esset in propinquo, septima die adventante vermem ex dextera nate palmo longiorem exelatum fuisse, unde statim omnis languor amotus : Trineavellius lib. 9. cap. 11. de aff. partic. ait se Patitium quendam vidisse, febre & continuo capitis dolore affectum, tandem per nasum vermem, mucò & crasso sanguine solutum ejecisse : Refert quoque Durerus, Scholius in Holler, puellam album vermem, latum, recessisse per nares, nullo vomitu antecedente, præcedente acerbissimo capitis dolore : *Vide & Hædeman cent. 1. obs. 8.*

Circa nates & anum] Avic. lib. 3. tr. 2. c. 3. ait ex sententia Medicorum Indorum vermes nacti multoties in anetiori capite, & super locum qui est in stridularanarum, & possibile est ut nascantur apud velamina, quæ raro contingat : nacti vero possunt ubicunque re-

peritur materia apta : Enaribus emungi exemplo probat *Exc. Th. Barthol. obs. 64. cent. 1.* Casus tho molesto post fibriculam vexatus *Vit Magnus, Olum Vermium*, cum frequenter dolire capitis, post cibum sumptum ingruesscente, ex naribus emanavit vermiculus : In cerebro ab humorum putredine generatum extra omnem dubitationis ponit aleam : *Pilius cephalicus* levamen sensit & parco fami Tabaci usum : De se idem narrat *Ammonius* l. 10. *Miscell. p. 582.* *Nidus* de verme digiti longitudine l. 4. *observ. c. 11.* In oæena in aliis quoque vidit laudarus modo *Bartholinus : Beniventus* Exempla. Med. c. 100. in cephalalgia acuta palmo longiorem observavit, & *Zacutus* lib. 1. prax. adm. obs. 6. suspexit alias quibusdam fidel : Si quidem autem ex naribus cum mucò emunguntur, in cerebro genitos suspicamus. Puella, ait *Nidius* cap. de vermiculis, album vermem, latum, palmo majorem, satis crassum rejecit per nares, nulla tussis, nullo vomitu antecedente : præcesserat acerbissimus capitis dolor per duos dies : Observavit quoque *Valisium de Taranto* dolores capitis à vermiculis esse.

OBSER.

OBSERVATIO CXXI.

§. 1. Capitis dolor à Scorpionibus in cerebro natis.

Cuidam Italo ex frequenti odoratu Basilicæ herbæ natus Scorpio in cerebro, vehementes dolores & longos, mortem denique attulit. *Hollerius l. 1. de morbis int. cap. 1.*

§. 2. Puellam quandam in Gallia ajunt cum sæpe & multum odorata esset Basilicam herbam (minorem puto Gefneri) incidisse tandem in capitis dolorem incurabilem.

Et eum à morte dissecaretur ejus caput, inventos fuisse Scorpiones in cerebro ejus: *Gesnerus lib. 5. de Scorpionibus.*

S C H O L I A.

Vtique meo judicio nonnulli atomis, seu effluviis terminalibus, ad scorpionem generandum natis ab herba Basilico prodeuntibus, dein cerebri substantiam per parentes è palato in caput vasis illapsis: Sane de Basilico, seu, ut alij vocant, ocymo, apud *Plinium lib. 20. N. H. cap. 11.* asserunt aliqui (quibus quidam Plinius fidem non adhibet) tritum si operiatur ocymum lapide, tandem Scorpionem ge-

nerare: Item si eo die feriatur quispiam à Scorpione, quo ederit ocymum, fervari non posse: Quintimo manipulo ocymi, cum cancellis decem matinis vel triuiculis trito, convenire ad id scorpionem omnes, Vide quid de ortu scorpionum ex ocymo tradat *A. Katherus* in suo modo subterr. lib. 12.

sect. 1. c. 16. Fr. Ignatius Thomius
(*enfil. lib. 1. c. 6.*)

OBSERVATIO CXXII.

Capitis dolor à sanguine aortam & cavam replente, ibidemque concrecente.

Puella cum per diem gravitatem capitis passa esset, die sequenti extincta est: *Poli mortem immane cerebrum inventum*, sed in arteria magna & cava vena totus sanguis coagulatus. *Vide historiam lib. 2. Tit. de Syncope ex P. Salio Drersio.*

S C H O L I A.

[*Immane cerebrum*] Immane inflammationis, ulceris, livoris aut alterius affectus manifesti; non item obstructionum quoque sub obtutu non cadunt: Adfuisse autem obstructiones ostendunt causæ, quæ triplices sunt Galeno, humorum multitudo, eorumdem crassities aut visciditas: Sanguinis multitudinem, ejusque crassitiam ponit *Salius*; quæ si præterea fuit in valvorum truncis, abesse non potuit in eorum propaginibus & ramis:

[*Fugit mortem*] Mortis causa fuit concretio sanguinis in vasis: antecedentis vero doloris capitis gravitativus, valvorum plenitudo & dilatatio, inducta à copia sanguinis, frigidisque succis & crassioribus admixtis, liberam circulationem illius impediens, ac concretione accelerans; Qui enim noverit, (inquit *Salius l. c.*) quæ ratione sanguis extra venas concreseat, poterit eadem causas ad sanguinem intra venas existentem adaptando, rem ipsam declarare: Sanguis à vena ejectus concretis statim evanescentibus spiritibus, ad quorum dispersionem sequitur ichoro-

se partis separatio, quam excipit non parum modo & syncere sanguinis partis coagulatio, sed & cæterorum ei admixtorum humorum, maxime si glutinosi sint & viscosi, quales in sanguinis emissis superficie aliquando cernuntur, vix acie culti divisibiles: Medendi rationem insinuat *Hypoc. 4. de rat. vict. in ac.* Sanguis copia superfluit, succisque frigidis & crassioribus abundat, ideo priusquam fixa sint omnia quoque contrahant, (scilicet tum spirituum humorum) sanguis per venæ sectionem è brachio copiose educendus: Qui si legerit effluat, quia adsit concretioni initium, præcedant sonus ex lancibus; subsequatur purgatio superabundantium humorum, præmissa crassiorum attenuatione, viscidorum detractione &c. Fluxilis reddatur sanguis usu salium volatilibus, ex variis præsertim animalium partibus paratorum, quibus insignis vis inest coagulata & conglutinata omnia in corpore humano dissolvendi, eademque ad pristinam fluiditatem reducendi, inter quos eminent sal volatilis cornu cervi, spiritus salis Armoniaci, &c.

OBSERVATIO CXXIII.

Dinturnus capitis dolor cujus nulla alia deprehensa causa quam ulcus in ventriculo.

Paulum Constantium Derebeeque, puerum decennem, avi mei fratrem, perpetuus dolor capitis fatigavit & ad iuratum usque; irritis enim omnibus remediis, illum tandem tumulo indidit.

Aperto cadavere, Salvum fuit cerebrum, ulcus autem in ventriculo deprehensum est: *Ex communic. Clar. D. D. I. Constantii; Medici Lanfannensis.*

S C H O L I A.

De capitis dolore à ventriculo natales ducente, vide Notas ad observat. primam.

G 2

ANATO;

ANATOMIÆ PRACTICÆ LIBRI PRIMI SECTIO II DE APOPLEXIA.

OBSERVATIO I.

5. *Apoplexia oborta ab oclusione vasorum quæ spiritum vitalem ad cerebrum velunt, scilicet concursus omnium crassæ meningis sinuum, Torcular dicti.*



UM paulo penitius rem introspicere, vasaque cerebri singula diligenter perlustrarem, deprehendi tandem locum, quo tanquam è fonte sanguis & spiritus cerebro communicantur, & ex cujus obturatione cerebrum suis spiritibus, si non omnibus, tamen pluribus simul, privari possit: hicque est concursus omnium crassæ meningis sinuum (quem Torcular aliqui nominarunt, eo quod veluti è torculari sanguis è venis & arteriis in canales istos effusus in universam cerebri substantiam exprimitur) obvis in posteriore cerebri sede, prope apicem futuræ lambdoideæ, ubi tertius & quartus sinus oriuntur: priores vero duo ad futuram prædictam ascendentes conjunguntur, omnes autem exiguæ foramine congregiuntur, quo obturato (ut facile fieri potest, siquidem circa id, etiam in cadaveribus nonnullis violenta morte peremptis, sanguinem, humorem crassum, sæpe & viscida pituita permixtum, concretum & valde compactum, ad obstructionem ejus aptissimum, deprehendi) nil sanguinis spirituumque in tertium & quartum sinum effundi potest, cerebrumque maxima spirituum copia destitutum suis functionibus omnibus privatur & vera Apoplexia proculdubio generatur. *Gr. Nymmanus Tract. de Apoplexia cap. xv.*

S C H O L I A.

ERAR doctissimus cateroquin Vir, quod è Torculari, tanquam ex concursu omnium crassæ meningis sinuum, sanguinem è venis & arteriis in canales seu duplicaturas istas effusum, in universam dein cerebri substantiam sursum exprimi credat: Sanguis, per venas in sinus crassæ meningis sursum non effunditur, sed ille ipse sanguis qui per arterias in sinus prædictos illabitur, à venis jugularibus inferius quæ in sinus illos, maxime vero laterales, à natura in hunc finem inoculantur, rufus absorbetur, atque circulationis lege, non sursum in substantiam cerebri, sed è capite deorsum ad fontem vitalem cerebatur: Ac proinde quamvis inquam opinio Viri Clari, coarctat, nihilominus tamen si assignatus ut ab auctore locus paulo aliter explicetur, summe tamen apoplexiæ sedem plerumque habebimus: Nam venæ illæ jugulares inferiæ, quæ in dictos meningis sinus, præcipue laterales, ad reducendum è cerebro sanguinem inferre sunt, si crasso, mucoso, plenissimo sanguine (quod meo judicio frequentissime in apoplecticis contingit) obstruantur, atque adeo assusum ex arteriarum carotidum, internarum & vertebrarum, ramis sanguinem non resorbent, cum enim vero debita circulatio sanguinis in cerebro impeditur, & cordis ceu Solis micro-

smici interior influxus seu irradiatio prohibetur, subsistens nimirum in carotidibus, aliisque ree mirabile & plexus choroidæ constitutibus arteriis, vitali sanguine; qui dum ibi tueret, non tato in cerebri substantiam lechali vomitu effunditur: Hinc porro cerebri naturalis motus, omnesque animalicæ functiones turbantur, delesunt: verò, concordit & subsistent omnia, & finestum patitur, prout eleganter insinuat Nymmanus, Lunæ microcosmi sidus Eclipsin.

Objicies, hanc modo enervatam sinuum duræ meningis obstructionem, à sanguine pituitoso & crasso factam, nonnullis succellive & lente contingere, atque adeo agnosci non posse pro causâ conjunctâ ac formali veræ apoplexiæ, utpote quæ plerumque ex improviso ingruit & hominem valentem deterpente occidit: Respondeo, quamvis non negetur Apoplecticos deterpente, mactare pecudis instar, interitum proferri; atque etiam focum concedi possit subitaneum causam ad essentiam hujus mali pertinere, haud tamen exin sequitur causas hoc malum efficientes omnes succellive non pullulare: neque enim dicitur quod omnis & qualiscunque obstructio sinuum duræ meningis Apoplexiam essentialiter constituat, sed

sed talis demum quæ affluentis vitalis sanguinis motum totaliter vel maximè ex parte impedit, atque cerebri mentisque operationes omnes evertit, unde præcedentia Apoplexiam symptomatica, ut vertigo, capitis g. avelo, dolor, & quæ sunt similia, quæque magnam similitudinem cum Apoplexia habent, merito imminentia Apoplexiæ dicuntur præludia: Interim non dico omnem Apoplexiam à tali sinuum in meningibus dependere obstruccionem, sed certam esse sæpè diversis sæpe causis hanc cerebri coincidentiam produci &c. *Frans. Ignatius Therman confil. med. lib. 2. cap. 2.*

Ex causa obstruccionis cerebri &c. Apoplexiæ causas omnes ad Ncoresicorum mentem egregie tradidit Clar. Dom. D. Joh. von Flammerdinge, Divi Marci Eques, Medicus Francofurtensis, Disputatione de Apoplexia: Apoplexia, ait, Th. 1. est repentina actionum animalium hæmum, sensus scilicet & motus cum facultatum principum læsione oblatio, oborta vel ad alium sanguinem ad cerebrum denegatum, vel propter sinuum animalium exitum è cerebro & cerebello prohibuitum, falsis quadamvis respiracione & pectus. §. 2. Causa proxima, uti ex definitione patet, est v. l. sanguinis ad cerebrum affluxus inhibitus: vel spirituum animalium è cerebro & cerebello effluxus prohibitus: Cum enim ad generationem spirituum animalium, cerebrum vivifici liquoris nectaris perpetuo appulsi indigeat, illo impedito, nulli generari possunt: vel sanguis licet ad cerebrum appellat, in quo illo generetur spiritus, ipsi interim in nervos singulos in nullum concedatur, quid juvat illos genitos fuisse? utro quippe modo partes agente suo deficiant, illarum actiones perficere necellum est. §. 4. Sanguinis autem ad cerebrum impulsus æreus, vel obstruictus, vel compressus arteriis, cum carotidibus interitis, tam vertebralibus: Obstruictio contingit, vel truncis vel ramis Truncis potissimum, à corporibus fibrosis pituitosisque, qualia in vacuis vasculis sæpius reperitur & nomine polypi veniani, quæque vulgo in cavernulis thalamorum cordis radices egerunt, unde ad notabilem magnitudinem excreverunt, alius affligunt, & in conata cordi vasa longe lateque se pandunt: Sanguine autem quæcumque ab causis vehèmentius commoto, corpora illa, præsertim si fracidiora fuerint, abrumponitur, fueruntque cum copia lruentis sanguinis per dictas arterias translata, eas vel non procul ab ingressu intra cranium, aut in ipso ingreditur vestibulo, simul & conjuncto quasi obcurant: Eo etenim loci ubi decreta sunt isthæ obstruementa, vasa imbi distendi neicia penitus obdiciant: Primo quippe *vertebrales arteria* per peculiare sibi, apophyses intra cervicis transversas, magnitudini illarum exacte respondens, exsculptum foramen; cerebrum utrinque, os inter occipitale ac petrosum, flexuose subeunt: *Carotides vena interna*, sub osium petrosi, basilaris & occipitalis confluens, ventriculosiores efficiuntur, quo suo venire, seu alveo, locum concedunt corporibus illis fibrosis, sanguinisque tenacibus & lentis particulis, imbi & stagnatis & incrementa capellulis, donec sanguine vehèmentius commoto, ulterius adhuc angustiores versus eandem arteriarum introitum, juxta scilicet scellam equinam, compellantur, ubi crassa mentis est densissima simul atque suis obliquis per quam agglutinata, & consequenter cedere neclia: unde liquet isthæ corpora eo semel adacta angustis undique premi, & quibus, seu vitiis, nec remeare queunt, nec alius evelli, v. p. ut quibus ulterius omne redditum sit, & faviam & *obstruictio*

His si accedat & obstruictio, iidem de causis, jugulares intra venas & sinus cerebri, tanto celerius Apoplexiæ apparatus omnis ille in actum erumpet, morbi enim tales scilicet & clanculum sunt, ac deceptante & fulgus more expledescent. §. 5. Tali Apoplexiæ extinctus videtur Læsius, quo *Observatione 16.* Talia certe corpora D. D. Franc. Sylvius & Fr. van der Schagen in carotide arteria videntur, quo retracto, motum aliquem in quatuor ulque sinum animadvertent, ut & Wepferus &c. §. 6. Anatomicæ carotides & vertebrales simul hæc comprimi possunt ut sanguinis fluxum inhibeant, valde dubium, vixque concipi potest, nisi in illis quia luxacione vertebrarum colli diu paralytici decubuerit, serumque in eorum cerebro stagnans, subito ac copiose per infundibulum in glandulas pituitarias irruens, illas breviterumefaciat, atque hac ratione ad illius latera ascendentes carotidas compulsi, sicque fluxum sanguinis ulteriorem prohibeat: In liquore suspensis etiam Apoplexici quid observare est: Verum non tantum arteriæ carotides in illis comprimuntur, sed & venæ jugulares intere, unde ingellus & egellus sanguinis perinde æreatur: Illis vero in locis ubi carotides suspensorum humeris insulatur, apophyses cum spinosæ, tum transversales secundæ colli vertebrae absumuntur, atque hoc modo vertebrales arteriæ quam arctissime comprimuntur. §. 7. Porro valorum illorum ramis obstruuntur, vel à solis particulis lentis ac viscidis in sanguine præexistentibus, vel accedentibus quandoque ad illas, circulationis ope, particulis fibrosis aliis, jam descriptis: Hanc itidem obstruccionem promovebant cerebri tam constructio frigida, tum compactior moles: forte enim vascula hæc, ab ipsis generationis primordis angustiora præstitant, sicque sunt obstruccioni magis obvia: Illis autem obstruictis, cerebri medullarum spiritibus suis orbatur, sicque patitur eclipsum. §. viij. Exiis vero spiritibus nullas concedere, vel oppleris vel compressis substantiæ cerebri, cerebelli medullæque portis, vix potest ipsarum vis, Teite enim Galen. in *Apoplexiæ capiti cerebri magis affligit, ventriculi enim*: Imò cerebri ventriculos laterales lædi posse clia Apoplexiæ causam, constat ex illa Galen. historia de juvene Smyræno, quem utroque ventriculo cerebri antico faucibus curavit: Compressio autem, vel opplesio illa, contingit vel à sanguine, vel ab humore pituitoso ferolore eo loci erectis: idque potissimum si tumor quispian, seu hostis inquilinus, sceleratum illam vim, quæ cerebro inferitur, suo compressu eo adjuvet. §. ix. Sanguis potro effunditur è suis vasculis vel per *arterias*, vel per *arterias* vel per *arterias* *arterias* accidit potissimum à plethora sanguinisque tenuitate nimia, *arterias*, vel à vulnere, vel ob vas obstruictum, & à sanguine affluente ita distentum, ut amplius distendi nequeat, quocirca appellente ad illud novo sanguine vehemèntius motu, crepet necesse est: Sic in plethora cerebri vasa usque distendentur, ut cum simplici tunica conflent, levem ob commotionem rumpantur, ut à ead. collopho, inclinatione capitis &c. Tandem effi sanguinis aliorumque humorum acrimonia vasa erodens, ac rara bæ causa locum habet: Sanguis igitur quæcumque de causa effusus sit, sibi ipsi noxam movet, & hac sua effusione exitum sibi facit, dum omni commæu seipsum interdicat, & vasa sanguinea comprimendo, vel potius confringendo, inhibet ne novus ullus tubulus in compressis contractisve confluat: §. x. Ab ista vehemèntiore in oculum similiter Apoplexiam fortem vidit *Fernelius*, de qua

Observatione 19. Apud *Hieris*. ab *Hier* mulier pugno percussa iuxta lacerillum, mox apoplectica concidit, vide *Observationem 19*. Sic, notante *Tulpio*, quidam ab ictu in pectore concecit attonitus, *Marona* ira incallescens, apoplectica xvij. post hora obiit. *Juvenis* dum sese incurvabat, torolos & athleticus intra xv. horas obiit, Apoplexiam quoque à plethora ortam observavit *Tulpius*, ut & *Wesserus* in viro 45. annorum, *Observatione 20.* Idem in septuagenaria apoplexia defunctæ capite singularia observavit, vide *Observationem 18*. *Rufus* idem in senagenaria, quæ ex monticulo prodierat, notavit totam cerebri basin sanguine obfartam, *Observatione 15.* ⑥. 21. Humores terosi sæpe intra cerebrum cumulatur, in illis præsertim quorum sanguis sero fenet; serum enim facile à sanguine secedit, uti ex urina, sudoribus aliisque patet, illis præsertim assumptis quæ effervescentiam in sanguine excitare valent: Infundibulum quoque obtulit & compitimi, atque sic serum intra cerebrum colligi posse existimo, locutelo enim hujus feri ad glandulas pi-

uitarias scilicet, & per consequens illius enim cerebro haud concessio, restitit regurgitare in ventriculos omnes, quos repentina clade premet: Si insuper vasis Lymphaticis cerebrum destitutum non est, uti ipsis puto illud non destitit, quidni reliquorum vasorum more hæc isidem suum quandoque humorem affarim effundent subjectasque partes inundabunt? ⑥. 21. *F. Platerus* illum videns humorem aliquid copiosum per os, in apoplexia demortuis effluxisse, eundem copia & loco præcasse concludit: Idem cerebri contumacato opificio diruto, ac incisa cerebri meninge crassa, copiosum humorem profluentem vidit: ipsam insuper cerebri substantiam lactis cremoris instar dissolutam per faciem effluxisse observavit, *Observat. 14.* Apud *Wesserus* quingegenarius apopl. exinfectus serum pallidum effudit, *Observat. 47.* Quantum aetate his in casibus compressio valeat vel ex his immorsetur: *F. Platerus* insignem tumorem supra calliosum cerebri corpus deprehendit: Vidit & *Cl. Drelin.* Tumorem stercoris consistens.

OBSERVATIO II.

§. 1. Sanguis in Apoplecticis non solum frigescit, sed etiam concrevit.

Constat refrigerato cohibitoque spiritu sanguinem non solum frigescere sed concrevire, quod in catalepticis & Apoplecticis, aliisque id genus disiectis observatum. *Hallerius comm. in Coenac. 1. lib. 1.*

§. 2. Highmori focer Haydocus, in Apoplexia laborante sanguinem in venis adeo concretum invenit, ut medullam sambucinam referret. *Goib. Morbium Fundam. Physiologic. cap. xiiij.*

S C H O L I A.

Idem in hysteris & omnibus affectibus, in quibus cordis motus subito cessat, fieri dicit *Hygemen*, qui addit rationes, Nimirum in Apoplexia, aut hysteris affectibus, aliisque ejusmodi emortuis, subito prosteruntur vires, ablatisque spiritibus cor statim à motu desinit: quiescente vero, sanguis ulterius non movetur, sed statim dum adhuc calidus est uniantur partes ejus homogeneæ, fibræque incitæ statim concrevunt serumque sepiatur: In alijs vero qui sensum moriuntur, cordis pulsus sensim etiam languor, adeo ut sanguis in emortuentibus, licet non tam præcipiti agitur cursu, ut in sanis, semper tamen concutatur: & ut calor in corpore sensim debilitatur, sic & pulsus semper languent, motusque in sanguine sensim diminuitur, donec plane nullus sit: Atque hoc modo fibræ dissipantur & discutiantur & à concrectione conservantur.

Sanguinem in venis emortuis Quod sanguis in venis non concrevit Attilor. venarum calori adscribere videtur: *Fernelius* vero ab eorum ingenta vi provenit exitimatur, quem in mortuorum venis sanguis non coagulatur, In corpore autem vivente è venis in ventriculum vel intestina lapsus, concretus fuerit deprehensus: *Laodarus Highmorus* Pullum sanguinem à concrectione præmunire; hoc probat, *Sanguis enim, ai, à coagulatione præservatur dum partes homogeneæ commixtae motu ab unione separantur & perpetuo separantur: Atque hoc vel micellum natum est, quæ ut sanguinem sustinet à concrectione præservat, crebra agitatione vel manu, vel basto illum concutiant fibræque dissipant, donec resorvantur, ne ingromescat.* Ad eam rem temen etiam pluriimum spiritus virales actus calentes facere putamus.

OBSERVATIO III.

§. 1. Apoplexia à grumo sanguinis in carotidibus hærente.

In dissectione cadaverum Apoplecticorum grumus sanguinis in carotides delapsus repperitus est. *I. Crato Consilio xxxvii.*

S C H O L I A.

In carotides delapsus Vel in iis in ascensu interco-

rum animalium è cerebro: vel intercluso aditu sanguinis ad cerebrum, qui sit per artenas carotides & vertebrales.

OBSERVATIO IV.

§. Ab Apoplexia accidentalī qui extinguuntur, iis Extravasatus sanguis, aut Abcessus mortis causa fuit.

Defunctorum quorundam eadavera dissectui, sed tantummodo fere post magnam capitis lesionem, uti ab ictu aut casu sideratorum, in quibus omnibus sanguis extravasatus aut Abcessus mortis causa fuit. Apoplexia Habituali defunctos ne aperiamus sepius sine ab amicis prohibemur, qui eos redivos expectantes, prope finis differunt, ita Anatomem prorsus vetant.

S C H O L I A.

Distinguendus est variis hujus morbi insulbus, quatenus nempe interdam sine praevia quavis diathesi, aut procatara, à causa subita, solitaria & saepe invincibili excitans plerumque lethalis existit; contra hunc nulla medendi methodus praeservatoria insitui potest; & quae ubi solet methodus curatoria, plerumque inefficax evadit. Vel 1°. paroxysmus Apoplecticus causam antecedentem, sive procatarxin praevia habens, propter varias occasiones, sive causas evidentes in actum deiciunt. Quod ad prioris generis Siderationem spectat, nempe subitam ac improvisam, causa ejus conjuncta & proxima, aut est magna Solutio continui, alicubi intra, aut prope cerebri medullium contingens, propter quum potius & meatibus ejus obstructis aut compressis, spirituum emissio omnis supprimitur: Vel est ingens ac subita spirituum in cerebro degentium profligatio aut extinctio: Siderationem continui majorem intra cerebrum efficere solent Sanguis extravasatus, Abcessus suppuratus & disruptus, atque Humoris serosi copiose inundans diluvies. 2. A Sanguine intra Cerebrum effuso, sive extravasato, ibidemque aut in grumos concrecente, aut loca affecta fuggillante, insulbus Apoplecticus saepe induci autopsy Anatomica comprobatur. Tales autem sanguinis intra cerebrum extravasationes morbosas, vel à causa externa, uti casu ab alto, capitis ictu, aut allusione ad durum, concussionem & similibus, vel à causa interna procedunt, in quantum scilicet cum sanguis acris & tenuis, atque valorum oscula, eorumque inertitia nimis laxa existunt istae sponte aut occasionaliter plus solito effervescent, & per hanc extensus, in mollem & facile cedentem cerebri substantiam intrampit: Porro, licet huius morbo sedem in corpore calloso assignamus, sanguis tamen ubi circa, aut supra ipsum effusus, quia loca affecta intumescendo medullam substantiam comprimit, insulsum Apoplecticum inducit. 3. Apostema, sive Abcessus, raro intra cerebrum, in meningibus vero saepe, & propter eandem fere occasionem, quo sanguis extravasatio accidit, excitari solet. Donec suppuratus, cephalalgiam aut rorem fere tantum inducit: verum ubi disruptus, sanies ab ipso in cerebri corticem decidens, cum erodit se putreficit, & deinde particulas puridas, & spiculis, plurimum infectis cerebri medullis sentim instillans, postremo morbi Attonici paroxysmum citat. 4. Serola cutlavies è sanguine in caput suffusa, est raro aut nunquam per se, quandoque tamen ob causas evidentes fortiores, affatim adeo in cerebrum utitur, ut poros ejus medullares mox omnes impletus ac inferens, aphoniam producat. Id quod quibusdam à nimio vini tenuioris, & aquarum Acidularum potu, mox super dormientibus condigisse novi: Similemque effectum à ro-

tali & diuturna urinae suppressione, etiam in haemorrhagiis subito cohibitis observavi. Denique in febribus malignis, recurrenza serola, metastasi critica ad cerebrum translata, aphoniam saepe lethalem ingulerunt. Causam Evidentiam, à quibus sideratio extemporanea inferri solet, genus alterum consistit in spirituum subita profligatione seu extinctione, quod quidem non raro efficiunt Narcotica fortiora, & Aquarum atendum potus immoedens. At praeterea observamus hunc morbum quandoque Habitalem esse, scil. in quibusdam hominibus diathesis constantem manere, propter quam illos primo vellicationes, easque leviores exercent; postea ex intervallis brevioribus accessiones graviores occupant, à quibus plerumque ultimo intereunt Super his inquirendum, 1°. Quae sit morbi hujus causa conjuncta, ejusque Ratio formalis? 2°. In quibus diathesis Apoplectica sive morbi procatarxis consistat; dein 3°. Quas insuper causas Evidentes habet. Quoad prius, ingruente paroxysmo Apoplectico, supponere liceat materiam quandam in Cerebri ambitu prius aggestam & dispersam, demum in medullium ejus deictracit, ibidemque spiritus omnes adorti, ac in ipso emanationis hae fonte suppressere & profligere, est non planè constat utrum illud efficiant aut medullae poros tantum intectendo, aut ipsius ipsos profligando, illique narcolin indigendo, verisimile tamen est utroque simul modo fieri. Et quidem cerebri poros medullares nonnihil obstrui aestimamus, quoniam eadem materies quae primo corpori calloso insidens aphoniam instillat, exinde inferius in corpus striatum prolapsa, ejusque deinceps poros inferens, hemiplegiam excitare solet. Attamen haud tantum à medulla cerebri poros impletis siderationem osti concludere liceat, quia tunc paroxysmus saepe paulatim & lente intercept: in quantum scil. potius non simul omnes, sed successively, & alii post alios à materia insidente occupari possunt: quandoquidem vero hac affectio subita ac istar fulguris insulsi, quid minus concipere possimus quam spiritus à materie intrantem contracti maligno & velut affatu proflerant? Videtur enim quod particulae ejus undique quae cerebri ambitu in medullium, sive corpus callosum descendentes, ipsamque ex omni parte subeuntes, & meatus, utpote angustiores, prociuas implere, atque spiritus huc illuc fugare atque in arcum cogere solent: quo deinde obfidi & in angustias redacti, tam nec diutius resistere, nec in poros alios à materia morbifica occupatos penetrare queant, demum prostrati succumbunt. Animae cognoscens functionem omnem dimittentes: dein vero non facile nec cito emergunt, quia nec à materiae malignae complexibus seu vinculis se expedire, nec in spacia ullibi vacua & aperta transire possunt,

quapropter diu suppressi jacent, donec tandem aliquando materies illa vel sensum distilla, aut in sanguinem resorbetur, aut medullæ porulis exadans, in cerebri ventriculos prolabitur: vel demum materies illa paulo inferius subsident, & corpori strato, nempe uni, aut simul utrique insæta, hemiplegiam aut paralyin accersit: interim ut spiritus intra corpus calidum denso liberi, & spatio ampliora nacti, membra pristina resumant, quæ quidem exequuntur, donec materies nova in cerebri ambitus repulsa, & sensum aucta in corpus calidum descendens, paroxysmum alium inferat, è quo, si neutro ea prædictis modo spiritus evadant, penitus succumbentes sensum disperiunt. Quod si de materis hujus motibuscum indole live natura inquiratur, suspicari licet spiritus animales in Apoplexia plane alio modo ac in passionibus convulsivis affici, nempe seditioni obnoxiosos copulam explosivæ contrariam, hoc est viciflicam potius quam microsulphuream adscribere, proindeque ab ea spiritus animalia, ipsorum particulæ pocius figi, ac à motibus live explosivis quibuscumque incandens subibent, non locus ac cum particulæ vitæ, cum auro fulminante trixi & combinari, virescent ejus explosivam seu icloperisiam profus adimunt, & tanquam

aure glaciali afflicta particulas alias qualvis activas congelari & immobiles reddunt: Non abimili modo se habere videntur spiritus animales, eorumque copulæ live diversimoda adjuncta, quorum nempe alia virtutem elasticam & valde explosivam, prope in affectibus spasmodicis, aliisque illis stuporem ac immobilitatem, uti in morbis soporosis, etiam in apoplexia & paralyi inducunt.

Hæc de Apoplexia Habitualis causa conjuncta, & Ratione formali, Quod ipsorum ad causas ejus protractas, simili ritu habent ac in plerisque aliis hæc hæc aff. Cibus, nempe & sanguis in viro est, quod particulas extraneas, atque spirituum animalium texture live constitutioni plurimum adversas, & velut extrinsecas, aut in se gignens, aut aliunde accipiens, quod ipsorum suggerat: Et deinde cerebri culpa est, quod in crani imbecillum, secundum potius & meatum ejus, laxum & diffusum animis, materiam motibuscum à sanguine obtusam ita facile & sine repudio semper admittit, Utriusque rationes particulares, variorumque fiendi modos non opus erit hic speciatim recensere, quoniam potius huc referri possint quæ de cephalalgia & lethargi protractari ediderimus. *Tr. de la Trail de An. Brit. par. II. cap. V. 112.*

OBSERVATIO V.

5. Apoplexia ab arteriæ magnæ orificio summe dilatato, & corde sanguine distento.

LEgatus Florentiæ apud Gallorum Regem, subito incidit in Apoplexiam omni vita destitutus, qui antea omnino sanus erat.

Aperto cadavere Cor tumebat, & ad sanguinis libras tres vel quatuor apertum emittebat, Arteriæ magnæ ore ita patente ut brachii æquaret amplitudinem. *Andreas Laurentius in controversiis Anatom. pag. 803.*

S C H O L I A.

Hinc colligitur Morbum Arteriarum potius quam nervorum obstructionem Apoplexiam parere, quod non ab eo solum sed & ab aliis observatum: firmat exemplo allato à *Fabrizio Hild.* cent. 3. Observat. 11. *Simoni Clerici*, hominis sanguinei & robusti, hæmorrhagiæ naturæ à juventute obnoxi, qui ex ejus cerebro secuta periculum metuens, appenso collo amuleto fluxum cohibuit quidem, sed succedente Apoplexia lethali, & xii. ab obitu horis, quum cadaver sepulturæ jam tradendum esset, sanguis copiosus è naribus & ore manavit: Videantur & alia exempla allata. Ipsa Apoplexia curatio affectionem corroboret. Ea enim licet sæpe sola phlebotomia liberantur: Et hæc inquit *Methodus* lib. 1. Exerc. 6. nisi juxta spes in angustio est, æstusque fere de vita ægotantem. Si autem obstructio nervi in causa foret, quem usum præstaret V. S. certe humor è nervis nec evacuetur nec revelli posset semel extravasatus. Ipsa medicamenta apoplexiam curantia idem corroborant: Piliula extravasata si nervo sese insinuasset, certo à nullo medicamento posset emolliiri, effluere omnis incurabilis: Vis enim medicamenti solum communicatur sanguini & cum eo circulator, possitque obstructiones in venis & arteriis solum tollere, non quæ extra venas *Methus Fandam. Phylolog. p. 38.*

Cor tumebat, &c. Apoplexia non in cerebro semper quærenda, ait *Exul. Bartholinus in consilio de Anat.*

prol. 5. 13. Nonnumquam in vasis cordis obstructis, intercepto cœore descendit. Firmat illius sententiam *Clar. Wilsow* cap. de Apoplexia, cujus verba, commentaria prius huc adduco. Quod sanguis, ait, in Cerebrum affluat aliquam tantum ea parte inhibito negamus, id totali ejus exclusioni concedendum erit, propterea namque *ambrosius* exacerbat sæpe animadvertimus, qui tamen affectus pro morbo Artonito raro habetur, sed Syncope potius aut Leptothymia, vel passio hysterica appellati solet. Si quando enim cordis motus in totum supprimatur, illico sanguine extra cerebrum retento, spiritus animales concidunt, non secus ac lux flamma suppressa evanescit. Cordis actio supprimatur aut imminuitur, vel ob sanguinis incursum disproportionatum, uti in violentis timoribus aut tristitia passionibus, vel ob spirituum animalium, qui motui ejus interviant, influentiam à Cerebello denegant: Hoc autem ob ipsos nervos cardiacos spasmo affectos, aut alias contrictos accidere putamus: horum autem inordinationes *ambrosius* sequitur, in qua laborantes aliquandiu sine sensu & motu, cum pulsu diminuto & raro velut exanimati jacent: Præterea tamen verosimile videtur cordis motum non raro supprimi aut inhiberi, ob spiritus animales functioni vitali destinatos, in ipso fonte, nempe intra cerebrum suppressos, &c. Vide de hac Apoplexia specie scholia infra.

OBSERVATIO VI.

Apoplexia raro contigit ob Sanguinem cerebro exclusum; frequentius ab immodico illius excurso.

Licet sanguinis affluxum quandoque cerebro denegari perhibemus, non propterea Apoplexiam semper oboriri credimus: Alibi ostendimus Arterias cephalicas, scilicet carotidas & vertebrales, omnes inter se invicem ita variis in locis communicari & mutuo inofculari, ut si contingat Illarum plurimas simul obturari aut comprimere, sanguinem tamen unius tantum arteriæ, sive carotidis sive vertebralis, ductu ad *ἐνκεφαλον* admissum, statim illius partes omnes, tum exteriores tum interiores pervadere; quod quidem experimento satis probavimus, in quantum atramentum unius vasis trunco injectum, brevi ductus omnes sanguiferos implevit, ipsumque cerebrum ubique tinxit. *Olim Tabidi Cadaver aperui, in quo arteria dextra, & carotis & vertebralis, cranio superato, effusa ac impervia facta, sanguinem ab isto latere præcludebant, nec tamen Ager morbo Attonito unquam obnoxius fuit.* Quare dubitare subest utrum sanguis ob arterias quasdam obstructas, aut compressas, à cerebro exclusus morbum istum pariat. Certe longe plus periculi est à nimio ejus incurfu & intra cerebrum extravatione. At vero quod sanguinis in cerebrum affluxui, aliqua tantum ex parte inhibito negamus, id totali ejus exclusioni erit concedendum. *Willis cap. de Apoplexia.*

OBSERVATIO VII.

Apoplexia ictum capiti insitum & casum sequuta, ob sanguinem per cerebri anfractus & in ventriculos effusum, ex disrupto torculari, aliisque vasis fuitinis.

Claudius Finalis, Calmuntiosesugianus, Limbolarius Textor, annos natus xxxviii. Calendis Junii anni 1673. Genevæ circa horam noctis 1x. in declivis vici descensu, dicti *le Perron*, Lapidis ictum supra supercillum sinistrum excipit, ubi vulnus contusum transversum insitum, quatuor digitos transversos longum, pericranium attingens: Ictus vehementia prostratus in latus dextrum fuit: à casu vulnusculum in auriculæ lobo excitatum, cum circumscissurarum partium livore & ecchymosi ad synciput usque protensa, maxime temporalis musculi. Ictus, & casus vehementia impedimento non fuisse (animos intendente vindictæ cupiditate) quin promptè exsurrexerit, quanquam sanguis per nares & aures prodiret, domum properaturus, gladiumque, in illarum injuriarum ultionem, arrepturus. Scalam descendens, in ejus ultimo gradu sistitur, ubi deprehensus, ventriculi saburra, qua per vomitum se liberaverat, circumfusum: post octodecim horas sit aphonus: Tertia die lethalis apoplexia succedit.

Cadavere in Nosodochium delato, primo vulnus supercilio insitum stylo exploravi, num alte pervaderet: Hinc animadversa insigni ecchymosi, totum capitis latus dextrum occupante, monitos volui Mag. Dav. Denrand & Benjam. Noel, collegas & Nosodochii Chirurgos, ut res ad Senatorem deferretur; Ex primi Consulis jussu cadaver à me dissectum, quo interitus causa pateret, præsentibus Clar. D. D. Alexandro Diodati, Facultatis Medicæ Decano, & Francisco Cailleo Medico Jurato; Sublata superiore cranii parte, in conspectum se dedit dura meninx non livida solum sed & nigricans; qua reseda Pia semiputris & fœrens deprehensa est, cum insigni sanguinis extra vasa effusi, ac in grumos concreti, tum per anfractus tum in ventriculis copia, inter quos unus insignis, ovum galinaceum mole æquabat. Torcular enim ejusque rami, per duram matrem disseminati, necnon venarum jugularium aliquot propagines, lacri & disrupti erant: Demptra cerebri ad corpus usque callosum parte, virium & labem id contraxisse compertum est: Ecchymosis parti capitis dextræ impressa, partes interiores non attigerat. *Ex communicatione Mag. Bailly Chirurgi Genev. peritissimi.*

OBSERVATIO VIII.

S. Apoplexia vulnus sub oculi sinistri orbita insitum sequuta, ob lesionem dextrum cerebri ventriculorum, effusum sanguinem ad basim cerebri & cerebelli regionem, &c.

Studiosus infra orbitam sinistri oculi, prope nasum ense punctum vulneratus fuit; Paulo post loquela & ratione privatus tandem cum stertore Apoplecticus mortuus est: Aperto cranio

cranio vidi vulnus per orbitam oculi & os cribrosum prope cristam galli factum, dextro quoque cerebri ventriculo insitum: ex quo etiam magnam portionem sanguinis atri, grumosi & fibrosi, ad crassitiem & longitudinem medii digiti extraxi: Basis cerebri & regio cerebelli copioso sanguine extravasato referta erant, præterquam quod tota cerebri moles quasi ab inflammatione etiam rubicunda apparet. *J. Jac. Wepferi Exercit. de Apoplexia, ex communicatione Max. Henrici Eggermejeri Friburgi Professori, &c.*

S C H O L I A.

A B ista enis non statim loquelam & rationem amittit, quia cerebrum adhuc spiritibus abundat, & sufficienter ad nervos loquelæ intervenientes illos influere, paulo post autem utraque facultate privatur, non ob ventriculorum dextrum vulneratum, cum neque in anterioribus, neque in terrioribus, neque in quarto ventriculo spiritus animales generentur aut allerventur: quæ vero regetur tantum esse non videntur ut contrariam sanare possint, nam ad spirituum productionem cavitatem aliquam insignem requirit non universalem est. Semen omnium calculo corpus spirituosissimum, è sanguine ex arteriis in minutissima filamenta tractum gignitur, quorum cavitates neque ab oculatissimo animadvertuntur, atque etiam forte tunc quando jam invalida ejaculatoria transeunt, adeo ut quidam cava esse negare ausi fuerint, quamvis revera talia sint, & in taurinis videantur, & succus manifeste exprimi possit (videatur Regn. de Graef.) Chymici spiritum vini subtilissimum parant, per spongiam oleo imbutam, aut chartam Vulcani beneficio illum adigunt, seu corpora minutissimis foraminulis & solummodo spirituosissimis pervia: In corde quidem ventriculi, ut creduntur spirituum vitalium odicina, præstiti sunt, at tamen quoque tum dexter tum sinister donati sunt apertis ostiis, per quæ materia spirituum affertur, iterumque spiritus sanguini immixti magna vi prorundantur, in cerebri vero ventriculos mactam spirituum ex arteriis fundit, atque per oscula quædam reorberi, hæc tamen sensibus nondum constitit, nec aliter demonstratum fuit, imo si in illis vel tantillum temporis persisterent, certius vel millies disploderent per spacia inter duram & piam matrem quam ut in medullam adigerentur, ut alia taceam: Quoniam spiritus animales quovis semine & vini spiritus subtilis corpus sunt, quod nervorum minutissimas fibrillas, ex quibus nervos spinalis medullæ compositos esse nemo dubitat, & jam idem de cæteris nervis afferitur, ad sensum & motum impetientium peruenit: rectius cerebrum & cerebellum, nam quoad medullas substantiam, spirituum illorum otheinæ stantur, in primis si considerabatur arteriarum distributio omnem admirationem superans, earundem immersio intra cerebri substantiam ac concentorum communicatio, quæ nonnulli sumeretur corpus esse potest, cum medullam nullibi inquinant qui candorem lacteam obscurant: Imo existimo *Rationem & Loquelam* paulo post apud *Juvenerum* istum perire, quia arteriarum jamis anterioribus vulneratis, cerebrum spirituum animalium materia & calore illud vegetante frustratum, quin etiam ipsissimum non leviter fauciarum fuit, nam enis à sinistro latere, ad dextrum usque ventriculicam adactus fuit.

Cum sterite apoplexiam mortuam off] Post viginti quatuor horas elapsas, quia interea sanguis extravasatus eoque accumulatus fuit, ut Cerebrum, cerebellum ac medullam oblongam premeret, ac spirituum omnem effluxum intereiperet: insignem enim hæmorrhagiam intra cranium fuisse, citius copiosius circa basin cerebri & regionem cerebelli, gurgus ex dextro ventriculo exiit, & tota cerebri moles seu ab inflammatione rubicunda indicant: Fortan ad sanguinis intera craniæ accumulationem, multum conculcerunt supinus decubitus & collapsa vulneris labia, quæ nihilominus abique magno emolumento declinati potuissent. *J. Jacobus Wepferus l.c.p. 362.*

Basis cerebri] Apoplexiæ subjectum immediatum & proximum sunt spiritus animales cerebri regionem istam, ubi Principes animæ cognoscens facultates resident, nempe corpus Callosum incolentes; Subjectum immediatum, Cerebri medullium esse conclusimus, quoniam hinc spontaneorum motuum instinctus procedunt & in hoc sensibilibus omnium perceptiones terminantur: quo ritu cerebellum ac præcordia, aliæque partes omnes, scilicet animales tum vitales, secundario afficiuntur, alibi exponemus: *Wepferus de Apoplexia.*

Basis cerebri & regio cerebelli.] Paradoxum licet, hand tamen rationi incongruum videtur Apoplexiæ duplicem statuere, atque unius Cerebelli, & alterius sedem Cerebri medullitum assignare, aut simul utrique communem statuere: Cerebrum huic morbo magis obnoxium denotat præviæ & frequentes leptomæ & vertiginis affectus. Cerebellum male dispositum arguit creber Incubus, Pallus intermitiens, syncope, leipothymia frequens. Interdum enim contingit cordis motum supprimi aut inhiberi ob spiritus animales, functioni vitali destinatos, in ipso fonte, scilicet intra cerebellum suppressos. Hæc causæ proculdubio tribui debet quod in nonnullis observavi, post magnam in occipite gravitatem, Animi delirium, cum repentina functionum omnium animalium privatione succedere, in quo laborantes immoti & insensiles, cum pulsi & respiratione valde diminuta, per totum frigidescerent, per plures horas, imo diem sæpe unum aut alterum, mortuis similes quam vivis decumbunt: Quicunque autem ab huiusmodi insultu, sive breviori sive longiori expergiscuntur, proinde nunquam in paralytin aut hemiplegiam incidunt, qui plerumque Apoplexiæ effectus sunt. Porro nullus dubito quin multi ab huiusmodi causis morbificis inereant, quorum mores perperam aut Synopsi lethali, aut

Apoplexiæ ita proprie dicte adscribiunt. *Wepferus ibidem.*

OBSERVATIO IX.

§. *Apoplexia à sanguine sub duram meningem, postica parte effusa, in basin cerebri; in fistulam spinæ dorsæ, cum sero cruento in ventriculis anterioribus, &c.*

Iohannes Eberlin, Vir robustus, statura oblongus, 50. Annorum, Vino deditus: Auniga in Nofodochio nostro, anno 1672. d. 12. Decembr. Ebrius Vesperihora 7. ex scalpapræceps decidit atque occiput in ultimo scalpæ gradu validissime impexit, adeo ut gradum illum liquorem allisione hac violentissima propemodum fiderit. Post casum sublatus ad aliquot passus obambulavit, brachia movit, sanguis ex aure dextra & ore copiose emanavit; mox vomuit bis cruorem tum sincerum tum nigricantem. Neque Medicus neque Chirurgus vocabatur vesperi: Rusticus capillos obiter detondit vulnusque leviculum in occipite aceto cluit ac Empl. quodam viridi obtexit. Post horam septimam lecto impositus loquebatur plerumque rationi non consentanea; querebatur vinum subdole auferri (nam alias ad rem attentior erat) aliaque inepta effutebat; quæ tum Vino, anne vero casui ascribenda forent? dubitarunt astantes: Quandoque de lapsu hoc gravissimo querelas fudit: quandoque potum poscebat. Prima hora postquam decubuit crebro surgere ac abire ex conclavi conabatur. Ante decimam peccata sua agnoscere, deplorare & deprecari cœpit, seque precibus ac suspiriis Deo commendavit. Neque indormivit ac cum stertore respiravit. d. 13. Dec. Exc. D. D. Christoph. Harder vocatus fuit, qui Apoplexia fortissima affectum invenit; nam omnes sensus extetni cum motu voluntario aboliti prorsus erant, ut nullo ingenio excitari posset, oblatas aquas Antapoplecticas & Syrupos deglutire nequit: Respiratio cum validissimo stertore supererat, cum pulsu; ac facies rubebat, & totus habitus adhuc calebat. Vesperihora quartam demotus est D. 14. Dec. Cadaver cum D. D. Hardero aperui. In sincipite dextro occurrit tumor ex folliculo, quos Nattas vocant, olivaris, nuce juglandæ minor, qui vas sanguiferum ex poro cranii emergens recipiebatur. In medio ossis Lambdoidei dextrorsum sedes visa fuit, sine fractura aut fissura foris conspicua. Foris in occipite ad collum usque omnia sub cute sanguine suffusa erant. Remota olla plurimum sanguinis grumosi sub dura meningē in tota postica parte, maxime dextra, qui ibidem quoque antrorsum effusus erat, & in ipsa basi cerebri copiose invenimus: quin etiam multum sanguinis grumosi, per ostium magnum in fistulam spinæ dorsæ penetrasse visum à nobis fuit. Ventriculus dexter plenus erat sero cruento: sinister serum continuit multo minus dextro, minusque cruentum. Intra anfractus nihil cruoris invenimus, quamvis meninx tenuis alicubi sanguine suffusa esset. Cerebrum plane non subsidit, imo totum cranium ad summum usque implevit, non secus ac apud alios videtur, qui nihil apoplectici passi sunt. Avulsa meningē dura ab osse Lambdoideo, cæterisque in basi, nulla quoque vel rima vel fissura conspici poterat, ibi ubi sedes foris ossi impressa fuit: at in basi & ima ossis Lambdoidei parte fissura manifesta erat, quæ inde ad os cuneiforme & sellam equinam usque in dextro latere extendebatur, adeo ut pressa foras cuti in occipite ichor cruentus exsudaret, ossa amplius hiscerent & quasi divulsæ moverentur. Alia quoque fissura reperta in processu interno ossis temporum, qui os petrosum continet, eaque transversa, quæ cum priore non continua erat; nec sutura reputari poterat, cum in sinistra parte non observaretur. Os cuneiforme cum Lambdoideo sep in Viro jam propeclæ ætatis, in unum os coaluerat. J. Jacobus Wepferus Exerc. de Apoplex. hist. l. p. 313.

S C H O L I A.

Ex ista deditis, &c.] Affectus iste Apoplexiæ nominis non defraudandus videtur, quamvis à causa externa & violenta, scilicet gravissima capitis allisione evenit: cum non raro occurrat. Egri, apud quos subito actiones animales, respiratio & pulsus exceptis, citissime abolentur, brevique eneantur, quamvis nulla causa externa huic violentiæ pat præcellerit, potissimum à sanguine copiose intra cranium effuso, qui uno ore Apoplectici dicuntur. Hæc apoplexia merito fortissima nuncupatur: nam post horam duodecimam à casu, adeo omnes actiones animales abolitæ, ut non solum nullo ingenio excitari, verum etiam non amplius deglutire poterat. Fortan jam post horam tertiam in vigore erat, id altissimis non adver-

tentibus, & somnum circa decimam naturalem credentibus, nam jam tunc cum stercore respicavit.

Post casum sublatus, &c.] Post casum ab accurrentibus comubernalibus sublatus, ad aliquot passus obambulavit, brachia movit, loquebatur: omnia (salva putabant, cum nulla fractura aut luxationis signa comparerent. Ad illos illas perficere valuit, quia spiritus animales adhuc in medulloso cerebri corpore abundabant, libertèque ad musculos armam & loquelæ intervinientes effluere poterant. Quamvis vero scienda sit cerebri gravior commotio, atque ab illa pendens spirituum animalium perturbatio, quam nonnulli solum quandoque sufficere opinantur ad actiones animales aliquandiu vel abolendas vel im-

minuendas:

minuendâs: Certe si quidpiam valeret in gravissima hac allusione ita statim illa labefecisset ad gressum ineptus fuisset, coque magis quia insuper mox à lapsu quoque sanguis intra cranium copiosius facis profusus fuit, & ex sanguine ex aere & ore manante conjicte licet.

Sanguis ex ore & aere, &c.] Sanguis ex ore & aere dextra copiose promanavit & bis citiorem tum uncozum, tum nigricantem evomuit, non quod sanguini ex cavo cranii via manifesta aut occulta sensibus vel per aures, vel per os cribroforme, vel per basin cranii patuerit, id enim si factum fuisset, sique in his sedibus sanguis exitum invenisset, non tam celeriter, nec irrevocabili futo omnes actiones animales pessimum dedidisset, cum alii post idem, casum, &c. cranio perforato, etiam non multo sanguine primum emanante, levamen experiantur. Potius ab eadem violentissima capitis allusione, vasa sanguifera intra aurem dextram epusque canalem, & in externa basi cranii disrupta fuerunt, quod alias à capitis percussione evenisse memini, salvis arteriis interioribus cranii, vel certe non graviter laesâs, cum circa motum aut sensum interiozum læsionem contigerit. Fidem huic assertioni etiam oblitatissimè facient fissuræ ossis sphenoidis penetrantes, quæ allusionem tam validam fuisse innotant, ut parifaciliat, quæ os crassissimum fundebatur, etiam vasa tenuissima non solum intus, sed etiam foris, iidem proximè ossi connata rumpi potuerint.

Lagubatur rationi non constantia.] Decubitus verbis & factis se deducit ostendit. Vino delirium adscribatur merito in principio, postquam veto crebro surgere & ex conclavi protipere se conabatur, jam sanguis extravasatus incallescens, gravior spiritus animales perturbans, ac meningis exquisito sensu præditas alligens acutissimas videtur inde enim anxietas quædam surgebat, quæ phœnix pœus quidpiam imminere prædicebat quasi, quomobrem, non solum crapula penitus profligata, peccata sua deplorare & summum Numen precibus sibi conciliare studebat. Forte etiam crapulae impetus retulus fuit sanguine copioso non solum intra, sed etiam extra cranium profuso.

Postea indormivit, &c.] Somnus circa horam decimam obrepens, naturali proxime accessisse videri posset, cum hora ista somnum capiendi consueverat seque paulo ante largioribus hauribus ad illum invitari: Verum respiratio cum stenore jam apoplexiâ in procinctu fuisse arguit, quæ invalescente somno per momenta, continuè ex arteriis sanguine intra sparium meningum expulso, augebatur, donec ad summum vigorem pervenisset, seobibus sopore soporolis & nec vel minimum oblitentibus.

Respiratio cum pulsu supererat, &c.] Abolitis omnibus actionibus cæteris, Cor nihilominus, etiam sequente die, validissime adhuc movebatur, quod ex pulsu, faciei rubedine & calore in toto habitu consuevit; hæc namque non nisi à sanguine libere & lægieret, proptet integritatem cordis motum, in universum habitum distributo proveniant. Cordis motum, atque respiracionem, spirituum animalium ministerio perfici negari nequit, postquam Vici Clarissimi & de universa Medicina optime Meriti Dom. Willelmi & D. Læverri veritatem hanc præclaris experimentis stabiliverunt. Cur vero cæteris actionibus animalibus prostratis, istæ supertites manserint? nullum aliud effugium certius arripere licebit, quam si cum Exc. D. Willis statim actiones animales non voluntariis imperio subiectas à Cerebello dependere: atque plures arteriarum ramulos à venteralibus proximi-

me oriundas atque ad cerebellum abeuntex integros post casum pertulisse: non equidem omnes à laceratione immunes dixerim, non solum propterea quia multum sanguinis in occipite & circa oblium magnum & in fistula spinæ invenimus, cum illic sub sinibus lateralis & basi hac transfuere potuerit, sed potissimum ob mortem celeriorera, quam ut vel sanguinis profusioni largiori, vel reliquarum actionum animalium abolitiori adscribi deberet: nam quotidie experimur multos sanguine etiam ad libras profuso, & quasdam hystericas omnibus actionibus animalibus, etiam pulsu & respiracione ad sensum diutius subta is supervivere: ut taceam apud hunc apoplexiâ istâ defunctum plurimum sanguinis in valis maioribus mediâ & imi ventris redundasse.

Plurimum sanguinis grammis, &c.] Apoplexiæ istius causam proximam fuisse sanguinem copiosissimè intra cranium profusum abunde sensibus patuit. Hoc sanguinis diluvium casum præcessisse, aut apoplexiæ consequens & effectum fuisse, ut quidam opinantur, nequaquam vetosillimè est, nam ante casum sanissimus fuit & cuticulam curavit. N. gæi quidam nequit remolentiam calus paratam fuisse, dum aut mentem perturbavit, ut notissimas sobrio vias in tenebris invenire nequeat, ut pedibus manibusque robur ademerit, ut firmo gressu incedere & vicinis ad micula apprehendere non poterit. Verum ipsissimam capitis allusionem vehementissimam ad arteriarum ramulos in basi avellendos, rumpendos, & lacerandos sufficiensissimam fuisse, luculentè demonstrant fissuræ in basi cranii, scil. ossis Lambdoidæi parte ima ad os ulque coniforme crassissimum, & in processu interno ossis temporum; non superficialiæ & leves, sed profundæ & totum os utrinque penetrantes, ut pressio vel fuit vel inus his ossis sanguis transfuderit. Sanguis copiosissimè in sparium quod inter meningis citi, in dextro latere impetis, ad basin cerebri, ad ventriculos, ut & ad fistulam spinæ per ostium magnum in occipite, brevi tempore, profusus fuit ex arteriarum ramulis ruptis & avulsis ob perpetuum & validum pulsum, nam Cor in Viro tam & robusto vegetum erat ac vena merito incaluerant. Apoplexiæ veto fortissimam productile non una ratione videret, nam ab hac largissima hæmorrhagia medulloso substantiæ non solum in basi, verum etiam in vicinis partibus, ubi crura medulloso emergunt, spirituum animalium materia subacta fuit, ipsa medulloso substantia necesse hoc vivifico onba in se collapsa densior evasit, ut spiritibus animalibus, qui in anteriore & superiori cerebri parte ex sanguine arteriole per ramos carotidis anteriores anfractus & corpus callosum perreptantes alato, adhuc generabantur, transiunt denegare; denique foris à copioso sanguine extravasato amplius coarctabantur, totam enim compressionem à sanguine intra sparium meningum stagnante, ad apoplexiâ faciendam sufficere, evincunt illi qui omnibus sensibus & motu privati, solo typano à præsentissimo interitu vindicantur: quod ad aliam observationem plenius, Deo volente, explicabo.

Ventriculus dexter plenus fuit, &c.] Serum in utroque ventriculo repletum copiosius in dextro, parcius in sinistro, in utroque cruentum, minus tamen sanguine tinctum in sinistro, forte quia serum à sanguine concreto separatum, per rimas ventriculorum veros basin hians inerat: quamvis non negam aere casum illud in ventriculis redundasse, ramibulose erat: verum licet omnis contragii cruenti expert fuisset illud apoplexiâ

plexiam nec effecisset nec illam admodum accelerasset, cum non raro maiore copia serum in his sedibus reperiretur, qui plane alio morbo quam apoplexia, aut affinitate aliquam cum ipsa haberent, diem suum obicunt.

Nada ingimo traxit &c.] Millelo nihil opis Medice adferri potuisset: Revelentia cuiusvisque generis vix tantum valuissent, cum nec vel minimam lacera vasa, vel glandularum ostia omnibus sensibus abolitis refoverissent: Vix sopitam suicidentia trunco adnota

fuissent: Trypanum infante fecissemus, quamvis enim sanguinis extravasati fonte tantillum eduxissemus, peritississet tamen in basi potior & nocentior pars, insuper ad quemlibet pullum nova effusio supervenisset, cerebrumque magis magisque suo calido influente, non sine maiore actionum animalium prostratione, obtutum fuisset: ut taceam fissuras in imo ossis Lambdoidei, offe cuneiformi & processu ossis temporum semper aliquid monstrari alentes & vel solas inmedicabiles. *Idem.*

OBSERVATIO X.

§. 1. Apoplexia à Sanguine ventriculos cerebri infarciens.

I Ob. Chiffletius pater meus, ut patet ex ipsius observationibus, anno 1600. Vidit in D. De Lessii ex ictu sanguinis ventriculos cerebri sanguine fartos, unde in quatuor horis mortua est. Talem exitum ei dudum prädixeram, quia sectionem venæ recubabat. *Iacob. Chiffletius Dadalmatum lib. 1. cap. 4.*

SCHOLIA.

Ita sanguis] Ego pro certo habeo per illum sanguinem nihil aliud intellexisse veteres quam Apoplexiam, ortam à sanguine cerebri meatui impediens, quod ipsum videtur sensisse Chiffletius. Inter antiquos scriptores *Eutropius lib. 8. Breviarii de L. Antimo* hac naret, *Obis tamem cum à Concrevis crinitis Albinum proficere, & cum fratre in ventriculo fideret, subito sanguis ictus, iasa morbi, quem Graeci Apoplexiam vocant, &c.* Itaque suspicor hanc Eutropii, & alio-

rum Veterum scriptorem phrasin ? Ictum scilicet sanguinis) ansam postea dedisse plebeis de cadente gutta sanguinis, opinioni; Si quidem facile fuit ut hanc *ictum sanguinis* haud aliter quam *Gritam Sanguinem* versus cor delabentem, illudque unice quasi ictu intercurrentem, interpretarentur sublequenti hithororum, vel etiam medicalorum vulgus, rei Anatomice inexperum *Præc. Ignatius Thesaurum consilii med. lib. 2. cap. 2.*

§. 2. Frequenter in iis qui Apoplectici moriuntur cerebri ventriculos sanguine repletos deprehendimus. *Waribon Adenogr. cap. 24.*

SCHOLIA.

Accidit frequenter in Apoplexia arterias & venas, ipsaque glandulas plenas choroides intumesce, quo casu facile fit ut sanguis glandulas dictas infarciens, cum permeare non possit, cômque novo subinde afflatus ab arteria impellatur, glandulas dictas

disrumpat, aut venarum capillarum ostificia divellas, atque in cerebri ventriculos effundatur, Et omnem quam forte fit ut consimilibus morbis occumbentes, largem sanguinis copiam, etiam post obitum & naribus profundant. *Idem.*

OBSERVATIO XI.

§. 1. Apoplexia à cerebri ventriculis concreto sanguine turgentibus, ex rupto plexu choroides vase expresso.

IN cadaveris muliebris à Cl. Vesslingio Patavii 1644. nostram in gratiam aperti, ex Apoplexia, illique succedente Paralyti tandem defuncti, Aperto cranio repentinè mortis innovit causa: omnes cerebri ventriculi concreto sanguine turgebant, ut ne gutturam atropius exciperent: *Th. Bartholinus cent. 2. historia 60.*

SCHOLIA.

Sanguis iste ex rupto plexu choroidis vase expressus concretusque, liberum spirituum animalium commercium impediens Apoplexiam excitavit, quam deinde paralyti sinistri lateris ad finem usque vite pertinax, inseguens est: Hanc igitur causam apoplexie sine causa negat Nymanus, quam & Chiffletius observavit (vide Obscrv. 2.)

Reptens moris &c.] Nova suborta apoplexia,

cum ex hac in paralytin, & vicissim, facili fit *hæmiplegia*: Priorem vero alteri causæ adscribam velim, nec enim sanguinem è vase effusum diu impune fert pars princeps, sed cito succumbit, præsertim si insignis vas disrupsum sit, quale statuerendum in prædicti casu, cum omnes cerebri ventriculi sanguine oppleti reperiuntur.

H

§. 2. Evenit

§. 2. Evenit interdum ut quidam qui obmutescunt, nullo alio auxilio quam Sanguinis missione releventur, In quibus vas aliquod in cerebro, aut in partibus internis est disruptum: Priotus exemplum vidi in Tribuno arario. Et in alio quietiam repente interitit, *ventriculis cerebri sanguine repletis. L. Botallus de Curatione per f. m. cap. 11. §. 4.*

S C H O L I A.

Ventriculis cerebri, &c.] In theatro tamen Anatomico P. De Marchis anno 1651. advertit in Apoplecticorum cerebro se nunquam deprehendisse ventriculos materiam repletos, sed venas & arterias per cerebrum sparsas, quibus repletis fit apoplexia, Quod & Anatomicus Molinetti in publico demonstravit anno 1656. *Joh. Rhodius cent. Observ. 67.*

Ventriculis cerebri sanguine repletis.] Dubitat Cl. Caspar Hofmannus, An sanguis in ventriculos intrare possit. *Quis aut, ventriculos, L. 3. Infl. cap. 92. in observat. p. 419.* Sanguine oppletos in apoplexia vidit un-

quam? Id tamen possibile esse patet attendendo ad sanguinis motum, vasorum naturam ac partium intra cranium conformationem: Sanguinis enim, praefectum in arteriis, continuus est motus, nisi quid obstat: hinc aperto vase brevi tempore copia sanguinis effunditur: quod intra ventriculos fieri potest, per hiatus ambos laterales ventriculorum, ubi prope basin adhaerent sunt: descendit quid obitabit, si intra spacium, quod inter utramque meningem est, impulsio novi sanguinis ascendat?

OBSERVATIO XII.

Apoplexia à Sanguine effuso & concreto in utroque cerebri ventriculo, Plurimo sero cruento devoluto in tertium & quartum, Arteris durae meningis sanguine tumidis, Plexus choroidis rami ruptura, &c.

Illustris matrona octoginta annorum plethorica valde, à multa diæta & exercitio nullo, laxeunte Decembri, ipso plenilunii die, hora nona vespertina, mentis accumbens, protinus ira incaluit, ac duriusculum quid intra dentes distringens, cecidit sensus & motus expers, cum stertore multo, oculis rubris atque clavorum mote defixis, manibus resolutis ac frigidis, postredie febte correpta fuit, & xvi. ab insule horis vitam exhalavit.

Aperta calvaria, arterix tumidae erant, tum in dura meningis exterioris, tum circumcincta cerebri gyros omnes. In utroque cerebri ventriculo majori aderat grumus sanguinis, isque spississimus, & ad ovi anserini magnitudinem concretus: Insuper plurimum serum cruentum devolutum erat in tertium & quartum ventriculum, ac spinam medullarem usque: Plexus autem choroides juxta suatum alarum concursum, eo scilicet loci quo sanguinem suum in *venam magnam Galeni*, seu in *quartum cerebri suum* effundit, crepuerat medius, atque nihilo fecius per omnem suum, intra ventriculos illos anteriores decursum, vesiculis aqueis tumidissimis adunatis, & conglobatis repleta atque summe decolor erat. *Ex observationibus Clar. Caroli Drelincurtii Lug. Batavorum Professoris Practici & Anatomici.*

OBSERVATIO XIII.

§. 4. *Apoplexia à sanguine per cerebri gyros diffuso, ex diffractis arteriis vas, caroticis & vertebralibus.*

Septimo Martii 1671. Lunæ nondum impleta falce, juvenis armiger, laute victitans, torosus & athleticus, statim post prandium, dum sese incurvabat, 'deregente corruit sensu motuque privatus, ut pote Apoplecticus, nonnihil tamen univèrse convulsus est & intra quindecim horas animam expiravit.

Dirutis cerebri manibus, nigerrimi sanguinis quantitas ingens, ab arteriosis rubis, & caroticis & vertebralibus, gyros cerebri naturaliter perreptentibus; ibi denique praternaturaliter passim diffractis, ubique reperta est, sub meningis scilicet dura, à cerebri basi ad verticem, & ad anteriore cerebri lobo in posteriorem usque, juxta utrumque illius hæmisphaerium, ventriculis ejus quaternis illis & intaminatis. *Ex Observationibus Clariss. D. Caroli Drelincurtii Professoris Practici & Anatomici. Lugdun. Batavorum.*

OBSERVATIO XIV.

Apoplexia ab atro sanguine cerebrum occupante.

Iuvenis Lutetiae Apoplexia cum perisset, illico caput ipsius fuit apertum, ex quo quam plurimus sanguis ater atramenti instar effluxit. *Ex Observ. Georgii Bauhini.*

OBSERVATIO XV.

*Apoplexia à sanguine cerebrum suffundente ad basin usque, Eodem collecto inter
piam matrem & cerebri substantiam, Ac feri conge-
sione inter ventriculos, &c.*

Anna Waltherin è pago Loninga, sex circiter stadiis ab urbe nostra distante, oriunda, sexagenaria major. Habitu corporis mediocriter carnosò prædita. Vitam à primâ in sania vixit rusticam, pauperulæque omnes operæ rusticæ subeundæ erant etiam gravissimæ, quæ in vineis colendis, ab utroque sexu eò loci peraguntur; aliquot prolium marer fuit: hinc senior facta ad obstetricis munus peragendum ordinata est. Cerebro sanguinem, tam Venæsectione, quam scarificatione, malo nostrorum more, profudit. Solent enim nostrates, rusticolæ imprimis, ter quaterve in anno Venæ sectionis usurpare; & qualibet vice duas, quandoque tres, non raro quatuor venas pertundendas curant; emittunt sæpè binas sanguinis libras; nulla cura est vel temperamenti, vel sexus, vel ætatis: Videntur quandoque gravidæ, quæ bis terve gestationis tempore sanguinem V. S. effundunt, nec etiam partui vicinæ à V. S. sibi temperant, persuasæ salubrius tum puerperium agi. Vidi senes octuagenarios hoc remediî genus expertos: nec sanguine fuso solliciti admodum sunt, quæ ratione inanitæ venæ præstantiore sanguine replendæ sint, frequenter enim statim ac Vena secta, & cibo & potu nimio corpus infarciunt; videres sæpius ex urbe nostra domum properantes titubare, nec pedes vestigia servare; & sæpe sæpius vel altero die ad consuetam victus rationem & solitos labores redeunt: alios errores taceo.

An verò & quibus morbis afflicta fuerit scemina hæc roto vitæ curriculo, ab astantibus intelligere non potui, præter quam quod jam vetulæ incessus difficilior fuerit. Anno 1655. decimo tertio Julii, sexto die à plenilunio, circa vesperam domo, ad vicina pago dumeta, sarmenta collectura, egressa est. Ea nocte à suis desiderata & quaesita, sed non inventa fuit. Sequenti die juxta septem in temporis sinistri medio leviuscule vulnera & mortua reperta est. Tertio die cum inopinatus casus ad Rev. D. Ludov. Splissium vigilantissimum pagi pastorem delatus esset, viso in tempore vulnere, operæ pretium esse duxit me accersisse, ad indagandum num ex hoc vulnere, forte violenta aliqua manu illaro, an verò vi morbi alicujus latentis occuberit? quo postmodum Amplissimus Magistratus noster detora re certior fieri posset. Detracta itaque cute, in tempore sinistro inveni vulnus vix cutim transiisse, & temporalem musciculum parum in superficie attigisse: Ablato musculo temporali os ad sensum integrum erat. Hinc cranium sustuli, adjurus præcipue fratris charissimi Johannis, Medicinæ studiosi operâ. Dissectâ durâ matre neque serum neque sanguis in spatio, quod inter utramque est, occurrit. Neque vel minima macula in interiore parte ossis temporis, vel in dura matre contigua, eo in latere ubi vulnus accepit, apparuit. Adeo ut mortis repentinæ causam vulneri huic tribuere nullatenus potuerim. Mox elevato & non nihil reclinato cerebro, omnia sanguine suffusa comparuerunt: quæ ut rectius viderem, nervos dextri lateris absidis. Hinc accuratius conspexi totam basin cerebri, quaquaversum cruore subductam, effuso illo intra piam matrem & substantiam cerebri. Suggillatio hæc diffundebatur antrorsum supra nervos opicos, retrorsum usque ad foramen sacrum sub medulla oblongata, & ad latus ejus utrumque in ambobus cerebri lateribus, etiam intra anfractus longè lateque spectari poterat, maxime verò ~~in dextro latere~~ in dextro latere, parte scil. vulnere opposita ultra dimidium cerebri intra gyrorum hiatus & per superficiem eorum emicuit. Circa orificium magnum in occipite, intra duram & piam matrem, etiam aliquid sanguinis grumosi inveni. Omnes ventriculi sero flavescente stagnabant, cui innatabat grumus sanguinis in tertio ventriculo fabæ magnitudine. Aliquot hydarides parvulas plexui choroideo adnatas vidi: glandulæ hujus plexus manifestè turgidulæ & duræ erant. Cor in dextro

ventriculo replebatur copioso & grumoso sanguine, nec finisset ab eo vacuus erat. Pulmones aëre distendi, totam pectoris cavitatem occupabant, ut videri potuisset potius inspirationem ultimam vitæ actum, quam expirationem fuisse. In cæteris partibus imi & medii ventris nihil notatu dignum deprehendi.

S C H O L I A.

IN historia Annæ tota basis, medulla scilicet globosa & oblonga, intra medullarem substantiam & tenuem meningem, sanguine suffusa erat, pertingente suffusione ad anfractus aliquosque: quod factum forte ex ruptis radiculis, seu filamentis illis arteriosis, quæ à vertebralibus & carotidibus in basi exorta, immediate intrantque medullam ibidem subeunt: Rupta autem fuerunt ex casu, cujus proculdubio vertigo occasio erat, quam redundans in ventriculis aqua peperit, nam ad pedem colliculi motu inuenta fuit, samentorum fasciculo, quem collegerat, in editiori loco jacente, unde etiam vulnus in tempore accepit, licet enim neque os temporis, ubi vulnerata erat, neque meningis fauix fuerint, nihilominus reticulatæ arteriæ, conculso vehementius capite, abrupti poterunt, quod eo facilius quoque contigit, quia ob *redundans in ventriculis serum*, in ventula flaccidiores erant: Hinc *Fernellus*, (vide *Obs.* 19.) observavit in quodam qui ex sinistro oculi vehementiore isto subito attonitus corruvi, &c. Videantur *Exc.* *Talp.* *Obs.* 1. & 3. lib. 1. Cum indagatus & arteriarum per cerebrum distributionem, aliquot boum capita appetirem, animadverti ex percussione si ootis, quæ boves velut apoplectici concidunt, non solum supernas cerebri partes & ventriculos cruore infectos, sed & in basi omnia cruore suffusa fuisse, proculdubio ob ictus vehementiam, filamentis illis arteriosis abruptis: quin etiam ob eandem causam os cuneiforme in basi flaccidum semel conspexi. Apoplexiam autem huic veru-
la, sanguis huc effusus ideo videtur attulisse, quia sanguis arteriosus præcipue cerebri & cerebelli substantiæ, ubi spiritus plurimi animales generantur, & unde omnes distribuuntur, denegatus fuit, idque parim propter phas abruptas arterias, parim quia ab extravalato & grumescente sanguine reliquæ adhuc integre, in tota basi, compresse fuerunt, unde feri peritus ad hanc medullarem substantiam sanguini adius interitus fuit: ovis vero ob pressam & coactam medullam, cum sanguis paucus, nec ad compressionem

sufficiens, intra tenuem meningem ac medullarem substantiam, effluxerit, qui tantum per superficiem ejus diffundebatur: At quantum sanguinis ad compressionem totius basis cerebri conficiendam requiratur, vel ejus moles edocere possit. Ex quamvis arteriæ quæ anfractus intercurrunt integræ persistunt, cerebrum debito fomite refecerint, atque illud ex suggestio spiritui vitali, animales in superioribus partibus produxerint, illi tamen ad sensus & æternos reliquumque habitum corporis distribui nequiverunt: postquam enim globosa & oblonga medulla sanguine & vivifico calore spoliata fuit, porosam suam & facile permeabilem conformationem, frigidi reddita, perdidit, spiritibusque transitum ulteriorem negavit: Tantum enim valet sanguis hoc in loco extravasatus, ut etiam duo cochlearia ad iocivibilem celeritatemque mortem afferendam sufficiant, probante *Fernellii* historia: cum alibi intra cranium copiosior effusus, si mature succurratur, non semper occidit. *Idem*.

Hylaudes pleni choroides adnotat] Summi pustulæ aqueæ, veliculis illis non abimiles quæ ab emplastris epilepticiis solent excitari, utrobique enim summa pelliculæ tenuis & aquæ copia. In brutorum ventriculis cerebri sæpe reperiuntur, ex membrana eos succingente enasæ, forte veniunt in membranosis illis parvis, quod vas lympharum recurrenti destinata munere si quæ fungatur: Ejusmodi autem vasa in cerebro quamquam hæcenus aciem oculorum effugerint, his tamen cæcæ verisimile non est, cum humidi metropolis dicatur, aquosus excrementis sæpe plenum arteriarum refertum, ut quamquam patentibus palati, narium, pororum ductibus quotidie sic satis expurgeretur, tamen communi cum reliquis ventribus lege gaudere debeat. Vide *Cl. Bartholinum Cent.* 4. *hist.* 38. qui ductus salivales recens inventos, eorum propagines tenet.

Ex copioso & grumoso sanguine] Vnde suspicio apoplexiæ lyncopen quoque accessisset

OBSERVATIO XVI.

§. 2. Apoplexia à repletis sanguine Sinibus cerebri orta.

Nascitur apopl. aut quia spiritus animalis exitu, aut vitalis aditu ad cerebrum prohibetur: Spiritus animalis exitu prohibetur, cum cerebri sinus repleti sunt nimia abundantia pituitæ, nigri humoris aut sanguinis: *Ac dum replentur, nec dum repleti sunt*, symptoma est convulsivæ epilepticæ, quam excipit resolutio apoplectica, ut ipsi vidimus in Episcopo Nivernensi, & in Quæstore Ballomo, quibus vita defunctis inventa est repletio Sinuum à sanguine illuc prorupto. *Ludov. Duretus comm. in Cæc. Prænot. p. m. 366.*

S C H O L I A.

Notandum lib. de Apopl. cap. 15. omnem veram Apoplexiam oriri contendit ob Torcularis angustiam subito contingentem, ob quam & cerebro & cerebello spiritus vitales denegantur: Torcular autem vocatur concursus omnium crasse meningis siorum, in quos canales, venæ & arteriæ, sanguinem

pro universa cerebri substantia, expriment. Harvejanis ex principiis, & circulationis sanguinis fundamentis, sinuum hic usus est, ut superfluum tam à cerebri nutritione, tam à spirituum animalium elaboratione sanguinem recipiant, & per venas jugulares cordi reddatur. *Nymmani sententiam, spiritum magis quam solidam, re-*
sultant

festit Clar. Rolinkius meth. cognosc. & cur. cap. affectus dist. 9. p. 21. Quatenus possit admitti ejus sententia. Vide Notas ad Obsev. v.

Ad dum repletur nudum repleri sunt] Epilepsie & convulsionum Apoplexiam vel præcedentium, vel illius comitum, causa non in ventriculo querenda est, sed in meningibus cum nondum obliquiserunt, sanguisque incensus aut acer illas pungit, ut principium nervorum, spiritibus animalibus abundans, viis ac nervibus nondum interclusis, infargat, corrugationes motuque convulsivos violentissimos ad molestem meningibus illarum excutendam inducat. Epilepsium autem in dicto Episcopo & Quinsore Balomo, sequens est Apoplexia, sanguine largius in cranium effuso, tum quia fluxibilibus à violentissimo motu redditis fuerat, tum quia corrugato cerebro fortius superne exprimebatur, & inferne ascensu liberius prohibebatur.

Aut quis spiritus animalis exitu, aut vitalis aditu, &c.] Dubium tamen an Spiritus Animalis à Vitali distinctus detur? Hippocritus & Aristot. hic fuit ignotus: Galenum eum aditorem omnes sequuntur, quæ impugnat Argenterius, Zabarella & Jac. Sabazius. Est enim parenchymatum diversitas conditiones diversis supponere videatur, cum tamen necessariam non esse apparet ex hepate & corde, in quibus diversa parenchymata, non tamen specie differentes conditiones, cum in utroque sanguis secundum magis & minus differens elaboretur: non itaque sequitur ex cerebro & corde diversum spiritum emergere. 1. A cerebro diversi canales quidem produnt, sed probandum quod provehendi spiritibus sine subsecuti. 2. Quoniam dissecto nervo tollitur motus, hinc tamen inde inferior solum nervos motui inservire, non vero velle peculiare spiritus. 3. Obijciatur, si percutiente motu clementi vitæ tam in parte manet superfluo sequitur quod spiritus animalis, in servitio mortui & sensui, differat à vitali, quod in apoplexia & paralyti manifestum. 4. In forti apopl. ubi motus & sensus omnis perit, vitam omnino salvam & integram esse adhuc probandum, Paries paralyti

affectus si amittunt motum & sensum, tandem contrahunt, adeoque de vitæ integritate gloriari nequeunt. Hac vero provincia spiritus animales elaborandi si cerebro esset demandata, lesionem notabilem sine motus & sensus interitum non facile sciret, sicut corde vulnerato vita periclitatur: Testatur tamen histore cerebrum sepe in quibusdam insigniter fuisse læsum, salvis sensu & motu. 2. Sicut læso hepate vel liene in hydropo nullus laudabilis sanguis generatur, ita in hydrocephalo spirituum animalium elaboratio, adeoque motus & sensus debebat periclitari, Contrarium tamen testatur experientia & exemplum ab *Hileno* adductum cent. 4. observ. 10. 3. In paralyti si pars cujusdam sensus & motus perit, tandem ipsam partem quoque contabescere videmus, non ex defectu spirituum animalium, quorum partes non sunt nutritæ, sed ab influxu vitalium male se habente, qui nutritioni, simul sensui & motui præstant. Obijciatur, Si spiritus vitalis præstat sensum & motum, cur dissecto nervo perit motus? 4. Nervi revera motum juvant, sed solummodo trahendo articulum sive partem cui inseritur, & quidem imperante anima. 5. Ante accessum paralyticis vel apopl. plerumque homines conqueuntur de parit, quæ deinceps afficitur, aliquali frigidityte, id quod indicium spiritus vitalis instaurum impediri nervis enim nullam calorem ad partem venire certum. 6. Viti apoplectici quibus vel in agone, vel statim post mortem sanguis cum impetu & natibus, ore & faucibus prosiliebatur, quod hanc obicue arteriarum non nervorum obstructionem arguere videtur. 7. In Apopl. forti & motus & sensus in toto corpore perit, omnes ergo nervi debebunt simul obstrui, quod quam difficile sit factu Anatomis demonstrare potest. Pituita inquit, obstruit istos nervos, At catarrho laborantes, quibus totum cerebrum pituita perfusum, præ cæteris apoplexiam incurere debent, si pituita nervos ingredi posset. *Nymmann* his difficultatibus commotus aliam apoplexiam causam, sanguinis nimium arterioli obstructionem constituit, &c. *Motivum Fundam. Physiol. p. 24. & seq. ubi plurimum.*

OBSERVATIO XVII.

Apoplexia à sanguine ventriculum cerebri sinistram replente.

Dixit *Fernelius* Apoplexiam fieri posse à sanguinis effluvio in cerebrum, cum copia venarum anastomoses apertæ: at ut plurimum aqua tantum in illis post dissectionem; ex *Columbo* reperitur; Quare cum Apoplexiam à sanguine viderim, illam tacete non potui. Post Apoplectici enim obitum, aperto cranio, sinister cerebri ventriculus sanguine plenus repletus est: *Sanguinis igitur missione* plethorici talia accidentia præcavere debent. *P. Berhelii Cent. 2. Obsev. XXXIV.*

S C H O L I A.

Sanguinis missione) Quæ simili in casu necessaria est, necdum artis, cum à sanguine vel redundante vel servido oritur ducatur. Hinc *Capitulum*. Pract. l. i. c. 17. in paralytico apoplectico tres venas, infra hostas 11. nudi juberit: 1. in brachio, 2. in pede, 3. in fronte vel paribus: Imò quidam, ut *Nymmann*, omnibus convenire, sine plethorici sunt live non fluxui, ob ejus efficaciam incomparabilem in revellendis humoribus à capite; fusque deque habitis vinibus, quæ oppellat, non exhaulit. Inutilis tamen judicanda, imò noxia, si à sero intra ventriculos & cavitatem cranii effuso oritur, cum nihil de causa proxima dematur, visque ulterius atteratur. Nec momenti alicujus si fibrosâ corpora arterias vertebrales & carotides occu-

pent, vel torcular à simili corpore obstruunt. Quæ vas ruptum sequitur apoplexia, à V. S. non solvetur, quippe quæ incurabilis est, cum sanguis intra ventriculos, imò & ad basin effusus inde remane non possit, ubi statim in genibus concretis. Si serum intra substantiam effundatur, forte utilis erit si, m. quæ ferti organum, à quo sanguis in motum concitatur, sedat: Cum arteriolæ sanguinem per cerebrum substantiam venientes ab eo obstruantur, V. S. ejus motum p. n. inhibebit, unde minore copia eò confluet; nam v. g. aperta brachii vena, non parva sanguinis portio per axillares, ad retardandum illum qui educus fuit, brachia petit. Deinde reliquo ex corpore, arque ex cerebro,

H 3 sanguis

sanguis protinus ad cor, (quod per V. S. illo destitutum) properat, depauperato suppetias lanuus: hoc vero sarcina liberatum, remanentem sanguinem avarius ad cerebrum transmittet, eoque quantitate quæ

oculi & impedimento futura non sit; hinc deum, qui obstructionem in minimis vasis efficit, robore cerebri expellitur.

OBSERVATIO XVIII.

Apoplexia à parte cerebri sanguine suffusa, grumo sanguinis magno peculiari cavitate conclusa; ex rupto insigni ramo arterie carotidis anterioris.

B Arbara Zuberin septuagenariæ vicinior, totum ferè vitæ cursum in famulatio consumpsit, ac jam senex desponsata, utcumque vitam toleravit: Vidua in Nosodochium recepta fuit: Habitu corporis erat mediocri, & quantum mihi constat, non multum morbis conflictabatur, nisi quod ab aliquis annis visus ipsi imminui cõperit, quo quandoque tantum non penitus privabatur, quem tamen brevi, citra fere medicam opem, aliqua ex parte, recuperabat, protinus recrudescente malo: nunquam autem cœca omnino evasit. In utroque oculo manifesta suffusionis exordia conspici poterant. Jam ab aliquot mensibus apoplexiæ prodromi in ea ab altantibus animadversi sunt, dum subinde lingua titubavit, mox tamen hoc loquelæ vitio cessante, Anno 1647. 29. Jan. 10. à Plenilunio die, hora 3. pomeridiana, dum ut rebantur, sana cum focis fila trahebat, subito sermonis usum perdidit atque inclinare corpus visa est: mox ab ancillis in lectum ducta fuit, incesu illo observatum est adhuc dextri lateris pedem illam movisse, manum ad caput fustulisse atque verba quædam, sed haud intelligibilia, protulisse: statim tamen omnem sensum & motum animale amittit, permanentibus respiratione (quæ tamen paulo post cum stertore fiebat,) pulsu & faciei colore tubicundo. Remedia pauca adhibita, eum nihil amplius à primo insultu deglutire valuerit. Eodem die, hora sexta pomeridiana expiravit. Altero die post meridiem cum Clar. D. D. Hardcro, collega meo honoratissimo & harum rerum studiosissimo, caput aperui: olla ablata, orbiculari duram meningem mediam discidi, corpus falciforme à crista galli liberavi, ac laterales sinus dissecui: hinc reclinato ad laus cerebro, omnia nervorum paria, arterias carotides prope infundibulum, infundibulum ipsum, arterias vertebrales, ubi in occipite emergunt, ac denique medullam oblongatam, in ipso orificio magno occipitis, abscidi, atque ita cerebrum undique ab omnibus vinculis liberum, totum extraxi, quo penitus subiti easus proximam causam perferutari valerem. Exempto cerebro, durameningem ei adhuc incumbentem elevavi: apparuit pars dextra cerebri superior ac posterior, inferior, non tamen ad basin usque, & anterior frontem versus tota sanguine suffusa: Cerebrum ibidem molle erat & humor quidam in eo fluctans manifestè attractu deprehendi poterat: In exincedo hoc in latere rimam egit, ex qua prominuit grumus sanguinis nigerrimus, nuchæ myrtillicæ magnitudine: digito immisso sensum cultello rimam dilatavi: inveni cavitatem amplam ad frontem ferè antrosum, sursum ad corpus ferè falciforme & sinum tertium, posteriora versus ultra cerebri dimidium, ac deorsum etiam ultra dimidium dilatatam. Longitudo hujus cavitatis, seu antri præternaturalis, octo, latitudo quatuor, & profunditas duas cum semisse unicas superavit. Continuit grumum sanguinis ovum gallinaceum æquantem, præter alios minores grumos & fluentem sanguinem, pondere unciarum circiter octo, vel integræ ferè libræ. Ventriculum lateralem primo intuitu opinati sumus: verum accuratius inquirendo invenimus cavitationem hanc non esse ventriculum vel ejus portionem aliquam, sed peculiarem & p. n. à sanguine extra vasa effuso formatam: & quidem ex rupto ramo aliquo, sobole insignis ramus arteriæ carotidis anterioris, qui postquam nervos opticos transcendit, in parte anteriore & laterali cerebri notabilem anfractum ingreditur, ac non procul ab exortu in plurimos ramos scinditur, inter omnes cerebri anfractus medios incidentes, quandoque eorum superficiem scandentes, mox descensuri ac ulterius per medios anfractus sursum ad corpus falciforme ferè id minutissimos subdivisi furculos, ambulaturi: horum etiam non pauci nec uno loco manifestè cerebri substantiam subeunt: Et quidem hujus arteriæ ramos unum vel plures hoc in loco ruptos fuisse, clarè & sine dubio cognoscere potuimus, nam dum illius progressum in eo latere investigavimus, primum ramum ejusque furculos, tum in principio, tum in euncto reliquo incesu, vacuum omnino sanguine invenimus, secus ac se habebant arteriæ cæteræ omnes, tum in parte opposita, tum & posteriores in hoc latere, & anteriores quædam non ab hoc ramo profectæ. Præterea ubique incedebat hæc anterior lateralis arteria, ejusque rami, grumi sanguinis obviæ

facti

facti sunt, sæpe pertinaciter arteriis adhaerentes, idque tam latè & altè, quàm hæ arteriæ disperguntur. Rupea itaque una arque altera harum arteriarum, & sanguine intra anfractum profundiorē effuso, novi semper sanguinis appulsu; ut unda impellitur unda, magis magisque spatium anfractus dilatarum fuit, atque dum ab irridente sanguine perpetuo pulsū, humilior anfractuum superficies depressa, aliorum interstitium tenerum gracile, molle & sanguinis impetui cedens perruptum fuit, in hanc amplitudinem facillè excrevit, non secus ac in aneurismate fit, nisi quod citius in cerebro talis cavitas à sanguine irridente, quam in quavis alia parte, ob ejus molliem, conficiatur. Superficies anfractuum superius integra petmanit, id cavente pia matre, eos colligando & quasi uniendo: nec basis hujus cavitatis perrupta fuit, recto seu fornice ventriculi dextri magis medulloso & tenaciori existente, quam anfractuum interstitium: quod flaccidius est, ex cortice cerebri, ut vocat *Clar. Bartholinus*, confectum. In toto spatio illo, quod inter duram & piam matrem est, nullus humor ulibi, nec etiam in basi vel occipite occurrit. Ventriculus dexter undiquaque integer fuit: vix tantum feri subtruenti continuit, quantum dimidium nucis juglandis putamen caperet: In posteriore & ima ejus parte plexui choroideo hydatidis parva adhaerit. Sinister omnino vacuus fuit: In plexus choroidei medio ibidem calculum gypsum, candidum, asperum & inæqualem, feminis lupini magnitudine invenimus, alios, in utraque plexus parte, feminis milii & majore magnitudine hinc inde dispersos vidimus. In tercio ventriculo grumulum sanguinis fabæ magnitudine reperimus. Glandula pinealis non accurate præerat canali, è tercio in quartum ventriculum aperto, forsan quod ob tumoris hujus, seu aneurismatis cerebri magnitudinem sursum allquantulum, cum quarto sinu, rapta fuerit. In principio hujus canalis parietes ejus paululum sero subruento tangebantur. Verum quartus ventriculus mundissimus erat, nec vel minimam in eo labem animadvertimus: Omnes quatuor crassæ meningis sinus vacui erant à pituitosis corporibus, nec ullo in alio vase cerebri ea vidimus. In sinistro cerebri latere ne minimum quidem *hypophyseæ* apparuit, nec quicquam sanguinis grumosi vel alterius rei p. n. vestigium occurrit. Adeo hoc *ais de* apoplexiam fortissimam producendam suffecerit. Carotis interna utrinque ad latera glandulæ pituitaræ incedens, tum ante, tum post perforationem duræ matris, lamina ossea & tenera incrustabatur. *J. Jac. Wepf. Dissert. de Apopl. p. 5.*

S C H O L I A.

EX historia hac manifestum est liberaliorem sanguinis excretionem, infra anfractum anteriorem apoplexiam produxisse, cum in toto reliquo cerebro nihil à nobis inventum fuerit, cui vel proximè vel sociæ causæ nomen tribui possit. Modum generationis spicii hujus Aneurismatis in eneratione historix indiguit. Inquisitionem hoc meretur, quomobrem alia cerebri parte, & cerebelli sanis ad sensum existentibus, nihilominus omnium actionum animalem clausissime interficiens abolitio sequens sit. Cum in multisque ore sit ideo pleræque partes duplices esse, ut una læsa altera tamen officio communi fungatur: atque ob hanc causam cerebrum ipsam quoque in medio aliquoties divisiū nec *Gal. abnuat*, licet sint qui idem pernegent: Verum si quod res est fatendum erit, non aliter me extricare poterō, quam si dixerō cerebri partibus profundioribus & nobilioribus insigniter læsis, etiam alteram licet sanam, in consensum protinus rapi, non secus ac observatum est alteritō rene nobilior læso & alterum muneris sui quasi oblitum fuisse: Nam si quis statuendum putet alio aneurismate basin cerebri, etiam in altero sano latere pressam fuisse, illum hydrocephali redarguent, in quibus aque pondus longe hanc sanguinis motum superat: In Reitero quidem *g. xx.* sanguis extravasatus tale quid efficere potuit, at sanguinis longe major copia fuerat: frequentissime autem in apoplexiis, tum letalibus, tum in iis quæ vel ad integrum, vel aliqualem saltem valetudinem terminantur, alterutrum tantum latens à cæcis proxima occupari existimo, cum illa plerumque ab hemiplegia occupant, hinc aliquot novi, atquequam fatalis apoplexia pendens eos

obruisset, creta, vel aliis indicis, significasse quid sibi fieri vellet, quod de Fracastorio narratur: hæ vero maturius in hemiplegiam desinunt quam ut credi possit antecausam in utroque latere deliquisse: hemiplegici enim latere sano ita uti possunt ut plurimum, ut nulla in illo imbecillitas notari possit: Quomodo autem hæ compassio fiat, sententia mea hac vice *læsa*, diligentior inquisitio, atque aliorum labores *læsa* veritatem mihi *aperiunt*: Hemiplegia vero causa hæc difficulter in hæc *Barbara* reddi posset, cum dimidium cerebrum maximam partem sanguine spoliatur fuerit, effuso copiose intra anfractum sanguine, arteriis plerisque eo vacuis, secus ac se in opposito latere habebant. *Idem p. 132.*

Perke quædam etc. Sæpe vidimus, ait *Vallius lib. 5.* Epid. in historia Hippocrænis, Apoplecticos per quædam intervalla ad seise redire, loqui & sapere, ut videantur circumstantibus liberari, ac de novo corripri, idque bis aut ter, donec quum non possunt revocari, tandem moriantur: Quod conjectamus fieri expultricis cerebri opera: hæc enim si valida est, longè pellit & hominem liberat: si debilis admodum, ne moveri quidem, & tunc uno perpetuo paroxysmo moritur homo: Sin autem est inter hæc mediocriter debilis, non pellit longè, facit tamen succos abscedere, cum vero non satis renitatur pars que expulsi, iterum in ipsam rursus.

Facies colore rubicundo] Quibusdam apoplectici facies rubescit, remponit & colli arteriæ pallent, jugularesque turgidiores apparent, cum scilicet obstruantur carotides internæ & veterales, tunc copiosior sanguis per externas distribuitur: Arteries

aurem & venas affluente copioso sanguine facile extendi, pater in illis quibus merito incubat, sed maxime in gravidis, quarum vasa quadruplo ma-

jora redduntur, vacanteque humore subsident ac que pristinæ giaciliter prompte redduntur.

OBSERVATIO XIX.

Apoplexia à sanguine in cerebri basin effuso & concreto, arterias retiformes & plexum choroidem premente.

§. 1. **I**psæ sæpe ac multum de Epilepsia, quemadmodum & de Apoplexia causis dubitavi: cum enim aliquando vidissem virum viribus integrum, sinistri oculi ictu vehementiore, repente attonitum corruisse, moxque sensu ac motu privari, cum spiritu difficili ac stertore, & cum aliis fortis apoplexia indicijs, cumque nec venæ sectione nec alia potuisse ratione servari, quin horis xii. interiret, mortis causam investigatione dignam putavi: Dississo apertoque capite, neque ossis neque meningum, neque substantiæ cerebri quicquam confractum divulsumque, sed duntaxat interiores oculi venas contusionis vi disruptas animadvertimus, à quibus sanguis, cochlearium duorum mensurâ, in cerebri basin procubuerat, qui concretus arterias eas obstringebat quæ retiformem contextum conficiunt, & quæ illinc in cerebri ventriculos propagatæ choroidem alterum constituunt: Cerebri autem ventriculi protus illasi inanisque cernebantur: Fernelius de abd. l. 2. c. xv.

§. 2. Duobus à rixa colaphis inter se certantibus, alterius mater in primo senio constituta, mediam se, directuram pugnam, sistit, illic pugna percussa ad os basilare, ubi supercilia ad nasi radicem coeunt, mox apoplectica concidit, mediæque hora citius, mirantibus omnibus, cum in facie nec livor nec tumor ullus apparetur, animam egit: De causâ mortis controvertentibus Chirurgis, à Scabinis accerfor. Dico, venulis & arteriis quibusdam magna contusione fractis, à validissimo enim juvene vapulaverat, plexum choroidem, seu tete admirabile, concreto sanguine opprimi: Statim diducta calvaria & cranio ablato, quod dixeram omnium oculis visendum se præbuit, cum plurimum coagulati sanguinis tria coagularia, arterias illas prementia, notarent: inde enim Apoplexia fortissima, & cui succurri non poterat. H. ab Heer observat. x.

S C H O L I A.

Contusionis vi disruptæ] Rampantur vasa ob sanguinis vel copiam vel eopacitatorem motum, ut nam vasa disrupta vel eorum oscula referta fuerint ignotes: quosdam etiam faciunt extrinsecus impetuosius capiti insulantia, casus & ictus vehementiores: sæpeque autem hæc vasa rumpuntur, hinc cum vivencibus adhuc, & post mortem magnam sanguinis copiam per os & nares erumpere toties observavit Pieterus Pract. Tr. 1. lib. 1. c. 2. aliquoties sibi persuasit hanc potissimam apoplexiæ causam esse: Externe cause caput obtundentes si in caput incidunt, causas vasa imbecilliora sunt ac sanguine distenta, etsi sæpe levicula sint, nihilominus tamen vasa hæc disruptere valent, prout apud nonnullos legitur alapam, aut nullius momenti alia furam capitis allisionem, apoplexiam attulisse: Promptius quoque hæc vasa distinguuntur si iis obstructis sanguis vehementius moveatur, cum eodem sanguine. gr. in arteriola inclaso, ob ulteriorem progrediendum impetum major, continuo sanguinis motu, copia accedat, quam angustia arteriæ antea vel plurimum capere possit, facile rumpentur, idque citius quam alibi, quia arteriarum tunica tenerior quam aliis in locis, maxime senibus, quorum arteriæ, ut alix spermaticæ partes, sicciiores sunt.

Erosio rarior est, quin tamen aliquando fiat non impossibile esse videtur, si tota massa sanguinea corrodendis humoribus scaturat. Variolis apoplexiam supervenisse puellis cuidam audivi, quod proculdubio vase aliquo ab interna vascula eroto contigit, nam & ea intus circa partes membranas erumpere no-

tum est: Nisi forte incuria distansium repertus fuerint, & visiolus humor sanguini permixtus potius vas aliquod ruperit. J. Jac. Wesserm. Exercit. de Apoplexia, p. 237 & 239.

Venas disruptas à quibus sanguis] Apertio vasorum sanguiferorum præternaturalis cerebrum & cerebellum delinquit vivifico succo ad actionum animalium impetus summe necessario, unde etiam apoplexia quandoque consequitur: Non tamen quovisque vase quolibet in loco aperto, aut etiam ad omnem, etiam copiosissimam sanguinis profusionem, apoplexiam produci dixerim, cum sæpe mensium, hæmorrhoidum namque hæmorrhagiæ admodum nimis sint, quin etiam ob vulnera diversis corporis partibus iusticia, ooo raro incredibili copia effluit, nihil tamen hæc præsentibus apoplexiæ conchizat: Quamvis negari non possit actionibus animalibus hujusmodi hæmorrhagiis plurimum incommodare, ægrosque ad apoplexiam, nisi alius mortis genere præveniamur, disponi, quatenus aliis causis concurrentibus peteant: Hinc Arianna Tract. 5. Ven. 1 cap. 11. Qui plurimum moritur venæ sectione propter melancholicum suum sanguinem, multitudine qualem V. S. jurantur, sed in fine desinunt, quoniam moriuntur in apoplexia: Igitur quæ apertio vasorum apoplexiam efficitur est, potius intra cranium fiet, hæc enim ratione medullola substantia, sanguine, proxime in ipsius usum effusio, orbatur, quin etiam premitur, aliaque quæ ab extravasato sanguine, suam indolem protinus perdente ac noxio evadente, perperitur: Nec tamen quilibet sanguis intra cranii cavitatem effusus apoplexiam affert, ooo raro enim

enim congestio capite intra cranium rumpuntur vasa, sanguisque effluit qui per aures, nares & os effluit circa apoplexiæ diftentionem, dum vel trepano perforato crania sanguini exitus patitur; vel dum, æstusquam lechalia symptomata eorruptus efficiat, emplastris & fomentis congruis dissipatur, quod frequentissime nostris in ovis facilius, circa trepani usurpationem, absque nova ulla ægri præstium memini: *Wesperi Exercitii, de Apoplexia p. 222.*

Nulla ratione potestis ferpare An apoplexia à sanguine ad interiora cranii effuso peioris insensibilis, ut censet Petrus Salus de aff. paric. cap. 2. 1. Respondet Excell. *Wesperi p. 240.* Hactenus id penitus persuasum erat, cum enim sanguis extravasatus, repentinum hoc malum effecturus vel quantitate nimia, vel loco peccare debeat, vix perspicere potui quæ ratione, vel redandans vel lici noxius, cum ægri levissime austeri possit; Si namque tanta copia ventriculi, omneque cavum spatium intra cranium adimpleretur, quæ hæc loca in *Ravero* obl. 20. infarcta vidi, nullam viam invenio per quam nocentior ejus portio exhausti possit: Multo minus sanguis qui intra asfrictus in *Barbara* Obl. 18. delinquit, ulla autem cum commodo ægri elici potuisset: (ut tacitam viæ quemplam moraliū exriturum qui petmo insulsa perspicacissima ingenii vi causam hic absconditam subolsaturus sit) Trepano namque perfosso hic fucipulis osse, petuiss quin etiam meningibus & substantia cerebri, effluisset quidem sanguis: ut rupta arteria, ob perpetuum motum sanguinis, semper novus afflueret, per recens foramen cum viæ exitu delictus: Nec ille qui per basin fusus est sanguis, atque apoplexiæ ptooducit, ut in *Anna*

Obl. 15. alla arte tolli poterit, sensibilibiter enim sanguinem extravasatum ex his locis extrahere velle, insanie propius foret quam dentæ modendi rationi. Insensibilibiter diftentionis ad sanguinem, loco maxime peccantem, non penetrabunt: vel si penetrarent, malo nullam Medicinam afferens, sed augebant, dum sanguinem fluxilem magis reddunt, & ad elapsam exruptis arteriis, promptiorem: Atque ob hæc argumenta apoplexiæ à sanguine extravasato genitam adhuc immediabilem exitimo: Non tamen ignarus tum Rationem sæpe sibi discrimina fingere, quæ natura minus remediotorum operoso apparatu turbata, felicitur dissipit, timidamque eludit: Quod forte aliquando & in hoc casu evenit: videmus enim non raro quosdam, ex gravi capitis percussione, omnibus seculis & motu privatos, insar apoplecticum eotueri, qui nihilominus sæpe hæc difficulter curantur: Tribuere quidem vulgo id tubaris spiritibus animalibus, ob vehementis commotum cerebrum: verum si quis durationem symptomatum diuturniorem, & curandi rationem expendat, vix solis spirituum perturbationi hunc symptomatum causam adscribere poterit: Consideretur hystoria quam Excell. *Th. Ravennas* cap. 3. obl. 3. talibet de juvene, qui sine sensu, voce & motu, ab exploso sclopeto nucham verius, quinque diebus spatio jacuit: Præterea quotidie ex pettoris partes extimas vehementer contusis, rupis capillibus vas, integra cunctis, valde incomelctre, circa tamen suppurationem, vel sua sponte sublidere; vel tepelleuribus, & tandem difficultatibus admotis omnem extubertantiam evanescere.

OBSERVATIO XX.

§. 1. Apoplexia à sanguine effuso inter utramque meningem, circa basim cerebri, perque totam ejus substantiam & ventriculos.

Johann. Jacobus Reiter Kenzinga-Brisgoius, ætatis circiter 45. annorum; habitus corporis gracilis, capillis flavis & crispis præditus, ingenio pollens, honestis patribus, patre scilicet. Consule prognatus; à puero literis opetam dedit, ac lautè victitare potuisset, nisi miserranda & Germaniam universam devastantia obstitissent fura: quæ cum & patriam communi calamitatis involvisent, varia passus, inprimis truculentam famis tyrannidem gravissimè anno 1634. expertus est, quæ malefuada ipsum coegit etiam iis vefci quæ natura, ceu venenum, alias horrere solet. Hinc post multa discrimina & varios casus Rheinvium appulit, ubi aliquot annis Ludimoderatore egit: Tandem à Reverendissimo & Amplissimo D. D. Bernhardo à Freiburg, celeberrimi ejusdem Monasterii Præsule optimè merito, Domino meo plurimis nominibus colendo, intra Monasterium addiscus fuit, ubi Cubicularii munere aliquot annis fideliter functus est. Parcius semper, quamdiu ipsum novi, comedit, Indulsi verò plus poculis adeo tamen ut non nimium Baccho licaret. Ad iram paulo prionior, non tamen rixarum amans, nec lites ex litibus serens. Aliquoties, in hoc Monasterio vivens, podagra excruciatu fuit, quæ primis annis in pedum articulos sævit, sequentibus tamen nec reliquis articulis pepercit: Dum cum hoc morbo luctabatur, nihil ægrius tulit quam si podagræ nomine insignitus ille fuit. Ab anno vetè & quod excutrit, ante obitum nunquam ejus consuetam sævitiam sensit, sive id medicamentorum clanculum usurpatorum culpa, sive naturæ imbecillitate, non poteris morbi causam amplius ad articulos, ceu ignobiliora loca pro trudere, factum sit. Hinc circa id temporis tussi molestissima diu vexabatur, adeo ut phthysicum crederent, quæ podagræ suppressæ tribuebatur. Verum idoneis à me propinatis remediis, tussis cessavit, & satis commode per integrum fete annum valuit, si herniam intestinale excipias, quam tussis violentia effecit. Anno 1655. 7. d. Novembr. quinto die à plenilunio, mane sanus salvusque, quantum omnibus constitit, Reverendissimo D. Præsuli sacra peragenti adstitit, quibus peractis in conclave suum se consueto more contrulit: cum forte fortior famulorum quidam ipsum

ipsum convenite voluisset, reperiit ipsum humi prostratum, ad vociferationes surdum, ad concussiones & corporis vellicationes, instar trunci, stupidum; & accurritur, infunditur aqua antiapoplectica, atque alia, iis, quæ ad manum erant, tentantur, sed omnia frustra. Accersor & ego: cum post bihorium adventassem, vidi illum ex pallore livescentem, sensibus omnibus & motu animali orbatum, sola respiratione, primum satis ordinata, excepta; & nisi respirantem vidissem, primo intuitu leipothymia vel omnino syncope affectum dixissem, adeo ex sanguis facies erat ac livebant extrema, & cum naribus ad tactum perfrigebant. Pulsus primò validus, magnus, celer, mox debilior, minor & crebrior, respiratio quoque laboriosior, mox inæqualis evasit, ac sæpe penitus cessatura videbatur. Nul- lum genus congruorum remedium omisi, venam in debili tamen & brevi expiratorio tundere non ausus fui. Hora decima antimeridiana motu quodam convulsivo aliquoties totum corpus concutiebatur, plurimumque sputi albi, viscidæ, lenti ex ore emanabat, nihil verò cruoris: hinc magis magisque vires labascere, ac extrema amplius frigescere ceperunt: Hora prima pomeridiana ejusdem diei vivere desit. Statim ac morbo correptus fuit, plurimum fecum nigrarum per alvum excrevit, quod vino cuidam chalybeato tribui, de quo tum temporis, nescio ex cujus Empirici consilio, aut quem ob finem, singulis mane & vesperi cyathum epotare solebat. Indulgentia Reverendissimi D. Præfatus antea memorati, Parroni literarum omniumque bonarum artium summi, caput aperui: remoto cranio ac discissa dura meningē plurimum cruoris profluxit ex spatio, quod inter eam & tenuem meningem satis capax est, copiose p. n. undique & undique eo effusus; neque enim solum circa basin cerebri porus stagnavit, sed & ad verticem usque & ad anteriora & posteriora pertigit, quin etiam intra anfractus, quotquot fere cerebri sunt, se insinuavit. Ventriculis detectis reperi & illos omnes cruore adimpleto, nec quarto quidem excepto, quorum laterales, prope basin quasi laceri, ac si nimio cruore distenti simas egissent. Cruoris extravasati quantitatem duarum librarum pondus superasse haud difficile divinare potui. Toto cerebro, ventriculis & superficie à nimio & grumoso sanguine contaminatis, ulterius nihil observare, nec vel ruptam venam aut arteriam deprehendere valui. Hoc tamen certum est, nullam causam violentam externam, sive idem, sive casum, tantæ rupturæ vasorum sanguiferorum auctorem, præcessisse, cum derafis capillis & ablata cute, ne minimum quidem contusionis alicujus vestigium apparuerit. *Ioh. Jacobus Wepferus Excerpta citatione de Apoplexia historia 1.*

S C H O L I A.

A *Liquores Podagra excreti* In omni diuturno abscessu, sive sit cum evacuatione, ut nileus, fistula aut hæmorrhoidis; sive etiam sine ea, ut vetus podagra, videndum est quomodo cures: Plurimi enim eorum qui tali morbo multis jam annis laborant, solent in nephritidem, aut asthma, aut etiam aliquam apoplecticarum passionum incidere: Vt contra multis fieri videt ex Epilepsia, aut alio cerebri magno morbo nephritidem, & ex hac podagram: Tales igitur abscessus, cum jam sunt inveterati, etsi cum evacuatione non sint, dico esse aliorum morborum medellam & curari sæpe prohibeo; *Valisii lib. 6. epid. sect. 3.* Cuidam ventriculi dolore periodico, post dolores hæmorrhoidales & articulorum affecto, Podagra revocationem suadet *Silvius cent. 2. conf. 74.*

Reodo litarum Quomodo vini liberalior usus ad Apoplexiam disponat ostendit *Excell. Wepferus p. 157.* Plurima sunt, air, caput repleta, ut abstinentiam, citius, allium, capsa, semen sinapi, cannabis & alia: Quæ autem ratione isthac cerebrum repleant, Vini exemplo, pro virili explanabo: Vinum in stomachum reconditum (maxime si parum solidioris alimentis, aut nihil assumptum prius fuerit, quæ aliis humida imbibere de quasi absorbere solent, ac diutius in ventriculo detinent) citò elabitur, ac per venas lacteas & novos ductus chylicos ad cor properat, & sanguini permixtum proximo cum eo in orbem agitur: Cum ad rena pervenerit, aquosius ejus portio ab ipsi emalgemat & mature eminguitur: Spirituosior pars dum amplius cum sanguine indefinenter move-

tus, magis magisque incalcescit, simulque aquosiores sanguinis partes, facile in halitus solubiles, incidit & attenuat: hac ratione affectum, per arterias superna quoque petit, ac per minutissima arteriolarum capillamenta, medullas cerebri & cerebelli substantiam subintrat, & quia aliquot circumgyrationibus cum sanguine subtilius ac spirituosius redditum est, cum vitalibus spiritibus, per arteriolarum poros, in meatus, spirituum animalium vias, irruit: Si moderate id fiat, haud ingratus est hospes, sed torpidiores animales spiritus excitat alacrioresque reddit, unde Poëtarum Pegasi appellati meruit: Si immoderatas irumpat, turbantur spiritus ac deliria oboritur, pro temperamentoque varietate diversa, quæ in compendio *Hotaciius Carm. lib. 3. od. 21.* piam suam testam decantando tradit: Qui plusquam humano more vinum ingurgitatur, præ bestia turpissimis abominandi sunt, ut truncorum instar sensu & motu expertum tractandi sine: Dum sputi isti spiritus cum halitibus, aut feri tenuioribus porriunculis & veris vitalibus, (animalium spirituum materia) interiores sacri hujus palati aditus invadunt, quia solitò plures sunt, arteriolarum foraminula, ad vias spirituum animalium parentia, ampliora reddunt: unde si crebrius vini peccetur abusu, parulis magis fictis foraminulis, sensim medullas substantiam ad promptius recipienda spiritibus animalibus, eorumque actionibus adversa, disponitur: hinc etiam fit, ut qui juniores adhuc strenui posuores erant, senes uno atque altero cycho evacuato statim inebrientur: Postquam ebriofii

et bioſi deſeruerunt, atque crapulam edormierunt, portionibus ſubtilioribus diſſipatis, reliquæ intra meatus diſtos, à peculiari, cui par non eſt in corpore, medulla ſubſtantiæ coagulatur, ac in humoros degenerant, ibidemque ſubſiſunt, cùm ulterius nervos, ob eorum cavitatem anguſtam, pergere facile nequeant, reſtreſſasque ad arteriolas, ob perpe- ruum novumque appulſum ſpiritus vitalium prohibeant, unde bibones manſe ſtupent manſueque eorum eremunt, donec denovo venaſtetro incalcant: Si itaque quotiſdie in bibendo errores committantur, magis magisque cerebrum à cerebroſum apoplexiæ proximam redditur, quæ levi ad iter effluveſcentiam occaſione data, diſſipatos obruit: Ex his forte paretur quæ ratione & reliqua, quæ cerebrum replere creduntur, hoc puerile: viſum enim agendo, vel vincunt, vel infirmoſaſanant, prout ſcil. ſanguini permiſta, citius vel tardius in partes tenuiores vel craſſiores reſolvuntur; & plures vel pauciores ſanguinis portiones attenuant, ſecumque intra meatus rapiant, ac ſui veliſſima graviora vel miſciora ibi relinquunt: hocum enim quædam tamen efficacie ſunt, vi ſi in ſiſ ſumenda nimium peccent, vel primæ vice intecimant, quod opum & vini ſpiritus non ſi mel- effecſiſe ob- teneant, ut vino tardius id effecſo.

Infundunt aquas apoplecticas | Aquas apoplecticas recipiunt Crato Medici Celsitius cap. 37. ad apoplexiam præparantur; *Aquarum huius, aut, vix innotuerit magna illi valetas, forma in ipsi valetas, atque non notius interduam quàm videretur, quæ huius morbi mater est, cum eodem modo cerebrum afficiat, docet, Reverti ita vinum cerebrum replet, efficacius id prælabunt spiritus illi, ex liquoribus fermentacionem percipit, educit; Hi frequenter affligunt, non solum apoplexiæ obnoxium cerebrum efficiunt, sed & alia non concurrente causa, tolli sæpius indemerunt. In ipso tamen paroxismo apoplectico iuvabit certum cū, diffusis ab ipsi vaporibus cerebrum obidentibus,*

Hinc ad tria videtur Gale-
 ni fœmencia, apoplexiam quiri ab omni modo ventri-
 calium cerebri obstructione, Epilepsiam à dimidia-
 tis: atque motus bus convulsivis factis fuisse ante
 quam cerebri ventriculi omnino faciant infusum: Sed
 notandum quod Adr. Spigelius l. 2. de fœm. cap. 16.
 refert, Dari multum affectum ex apoplex. & epilepsia,
 in animum illi qui in Pannonia frequens est, & ab
 Austriaco & Sclavonibus appellatur, in quo cadunt æ-
 gri velut apoplectici sine sentia, motum tamen non desiti-
 unt, nec ut epileptici convelluntur, aliquando inter-
 mittunt, nec tamen difficili morbo paralyti incurrunt:
 Judice Rolihukio conf. 15. lib. 2. is est affectus quem
 describit Salus de aff. part. cap. 2. & vocat *apoplexiam*
 & *fœmenciam*; certum non affectu ullo ventricularum,
 nec liquidibus animalibus, sed valis sanguinem arteria-
 rum ad firmos vehementibus, & ex illis ad venas vehementi-
 bus. Convulsiones autem accedunt concussione fe-
 nervorum initio: Cùm enim sanguis concussus ad sa-
 piores partes ituit, vasque replere aliquomodo
 incipit, natura cogens extinctionem & apoplexiam
 totalem, forte etiam à qualitate acti sanguinis irritata,
 insurgit ad ejus propulsione, ut fit in singulis à re-
 pletione: Eoque magis natura insultu quo magis à
 repletione vasorum sentit se gravari: concussio autem
 nervorum initio, in consensum etiam trahitur pro-
 pagines: Hunc affectum Hippoc. l. de vict. ac. 4.
 innuere videtur sub Aphonia voce; quem locum
 afficere libet, quod claudicat in sanguinis motum in-
 pediret innuere videtur. Cùm quo *repente* vas deficiat,
 quod *cursum* sit, venarum insuperationes affligent, ubi

[illegible]

arterialis: principes turbantes alii, & animalia spiritus in organa sensu & motu non influunt.

Syncope afflicti duximus.] Apoplexie cogitari affectus sunt, 1°. Lethargus, à quo distinguitur quod hoc affecti excitari possunt & in somnum recidunt, adest febris: Apoplexici oio excitantur, excitati paralytici incurant hinc febre. 2°. Carus, in quo respiratio est integra, sensum iuvadit; eo affecti puncti sentiunt: In apoplexia sensus: 3°. Suffocatio ureti, in qua facies color mutatur & fit lividus, In apopl. non. 4°. Syncope, in hac color faciei mutatur, denec, os, manus, clauducur: In apopl. laxa manent: in syncope respiratio nulla & pulsus nullus. I. Cacathas suffocativus, qui hominem sensu & motu integro jugulat.

Ventriculi defectus.] Medicorum & veterum & oostericorum magna cohors Galeno adhaeret, stantenti Apoplexiam obstructionem ventriculorum cerebri, à pituita crassa & viscida factam, sequi: Hanc opinionem invenit commentitius illorum ulus, spiritus animalis esse *hypocritas*, atque illine quaquaversum in nervos diffundi, qua *hypocritas* prohibita, sensu & motu destitutum animal procius concidat. Hæc sententia à plurimis impugnata est, & à Clat. *Hysmanio* illar. med. l. 2. cap. 64. expugnata, qui excrementorum receptacula tantum asserunt: Inter cætera argumenta quibus hoc officium destituit, illud sufficit, Quosdam apoplexicos factos salvis & sanis omnibus ventriculis: Et contra alios, ventriculis omnino repletis, ab apoplexia fuisse immunes, fidem faciunt *Hystrocephalorum* hystoria: *Wæfferum*.

(rursus extravasata quantitat.) Apoplexie originem plerique referunt ab humore frigido, viscido & lento, dictos ventriculos replente & obstruente: Quæ opinio omnino assensum non meretur: A sanguine enim produci ipse Galen. Hippocratem sequutus 4. de vict. Acut. comm. 21. & 27. asserit, non per obstructionem ventriculorum, quorum nobilitas elasta, sed qui sanguis circulari motu prohibito, *stagnare* vel *ariditate* spirituum animalium impeditur.

Nos vel rupturam venarum &c.] Sanguis intra cranium extra vasa effunditur, vel repleto eorum oculis, vel frequentius ob rupturam: rarius in crosis. *Sanctus*

vix videtur admitrenda; rarditas enim & paucitas effluxus, ad generationem sufficiens, qui in momento erumpit, indooea videtur: Ad anatomosio prodecedam hic eadem quæ alibi causæ concurrunt, sanguinis copia, tenuitas aut æstus, accedente aquali valtorum tenuitate: adde quod arteria in cerebro subtiliori tunica dooentur: A supprella familiaritatem hæmorrhagia, redundante sobole, Simon Clericus, apoplexia tactus subito interit, xtr. horis ab obitu sanguine copiose à naribus & ore manante, apud *Falsinum* *Hild. em.* 3. *Obserr.* 21. Idem næræ hystoriam mulieris Vesontinæ, cui osata sarcinam meotrualtem per næres expellerebat, qua vacuatione desineore, invasit apoplexia; sanguine copiose, plocibus post excessum horis, per os prodente: *Obserr.* xtr. *obidid.* Valorem ora promptè recludentur si sanguis intra vasa æstuer, coacturus ab animi aut corporis motu: Ab hac causa profectum apoplexiam io Reitero, suspicari inducit ejus temperamentum calidius & metacritius, qui solidiorum ciborum quantitate superabat. Ruptionis suspicionem amovet obiteria contusionis velligiorum, et si humi prostratus reperiatur sit. In defunctis ab *Hildano* notaris credibile est *pign* præcessisse, iudice *Placero* *Pract.* lib. 1. c. 2. quibus de viventibus & mortuis afflicti sanguis ore & naribus erupit.

Nullem rursus valentiam.] Apoplexia non semper ad quamlibet sanguinis intra cranium effusionem sequitur; quandoquidem extant exempla ejus oio non solum intra cranium & duram materem, sed & intra hanc & tenem, quin & ipsam cerebri substantiam, immo forte & ventriculos anteriores clari iooorie, qui possimodum per os, næres & aures effluxerit, vel per tympanum parato exitu, vel dissipatus idoneorum topicorum admonitione, quod minutiora tantum vasa læta fuerint: sed lores rata hæc reponenda: Sic memini anno 1659. Friburgensem quendam, Epilepsia obnoxium, ebrium, præcipitem io cæpit & scala cecidisse, hinc sensu & motu privatum; sanguinem autem per os, oares & aures afflicti erumpente, non solum loquelam recuperasse, sed & sensum & motum, adeo, ut postidie, soluta crupula, in salutaro hospite & domo evaserit, ac cymba veltus lacum Neocomensem trajecit.

OBSERVATIO XXI.

Apoplexia à sanguine in ventriculos cerebri illabente, ibique concreta. Plexus choroeideo quasi confuso.

MAttrona 73. ætatis anno subito exinguitur: Reperti in cerebri ventriculis tres grumi sanguinis; amygdali mole: *Vide hystoriam Tit. de morte subita lib. 2.*

OBSERVATIO XXII.

Apoplexia à sanguine supra & infra membranas cerebri effusa.

Iuvenis ictus in pectore concidit repente attonitus in terram, spuma ex ore manante & c. Causa fuit partim evidens calvarix rima, partim sanguis effusus ubertim supra & infra cerebri membranas: Pulmo habebat plurimas lividas maculas. *Vide lib. 2. Tit. de Suffocatione.*

OBSERVATIO XXIII.

5. Apoplexia à vasis cerebri & meningum sanguine turgidis, Aqua limpida totum compagem inundante.

Dominus fuit, per multos annos affectibus spasmodicis obnoxia, convalescentiz spem quandam concepit. Interea tamen conquesta erat de capitis dolore & gravitate insigni:

insigni: post in paroxysmum convulsivum valde horrendum incidit, qui statim in Apoplexiam cito lethalem transiit: Calvaria exempta, vasa meningas & cerebrum perreptantia sanguine plena & distenta apparebant; cum in reliquo corpore inter disseccandum vix quicquam sanguinis effluerit: Meninge crassiore amota, per alteram tenuem & pellucidam, aqua limpida cerebri anfractus implens, ejusque quasi compagem totam inundans cernebatur &c. (*Vide Tit. de Convulsione.*)

OBSERVATIO XXIV.

Apoplexia, vulnus sequuta, ab humore ventriculos cerebri replente, & sanguine putrente circa os cuneiforme fractum.

Septuagenarius delapsus ex altiore loco contraxit in calvaria amplum vulnus: post tri-die rediit ad se, sed die 4. excreatis prius sputis purulentis, periit ab inopinata Apoplexia: Interiora capitis perfruantibus, obtulit se primo frequens humor replens ventriculos cerebri: mox ingens ossis cuneiformis fragmentum, à reliquo osse segregatum, supra quasunque partes circumpositas: in quarum remotiori recessu plurimum delitescibat sanguinis coagulati: Sed morbus attonitus traxit originem partim ex obstructis processibus spinalis medullæ (qui sunt verum nervorum principium) partim ex angustia retis mirabilis, quod constat ex intricato venarum jugularium, arteriarum carotidum & cervicalium concurſu: Quibus nobilissimis partibus impeditis, homo sensu, motu & vira privatur: juxta illud Celsi, S. 26. Servari non potest cui basis cerebri perculsa est. *Tulpius lib. 1. cap. 3.*

OBSERVATIO XXV.

Apoplexia sequuta fracturam laminae secundæ cranii, integra prima.

Nobilis ictus est in btegmate, alioqui casside armato: 6. die apoplecticus interit: Fracta erat lamina secunda, restam ex se remittens, quibus tanquam aculeis cerebri substantia pungebatur, illæsa prima. *Vide lib. 4. titul. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXVI.

Apoplexia & paralysis post vulnus capitis, à cruoris copia intra cranium effusa.

Quidam venabulo supra tempus sinistrum ictus, brachio dextro resolvitur: nam in illa capitis parte, non in sinistra, venæ disruptæ multum cruoris effuderunt, unde sine sensu, mente, voce, in tertiam diem supervixit. *Vide ibidem.*

OBSERVATIO XXVII.

§. Apoplexia à sanguine seroso intra spatia meningum concluso; Letham promovente sanguinis in thoracem insigni effusione.

Illuſtr. Dominus Rudolphus Hannibal, Comes de Reichenav, annor. 39. habitu corporis obeso & statura mediocri præditus, à multis annis melancholicus, facie atrorubescente, raciurnus, ~~maxillæ~~, literis addictus, ac in legendis historiis plurimum occupatus, anno 1671, 16. Jan. mane è lecto surrecturus anxietatem quandam percepit, quam vomitus sequutus est: eodem die parum comedit, potulenta rursus vomuit, noctem habuit inquietam, parum dormivit, noctu incaluit: Hodie pilulas sibi familiares sumpsit ante prandium, inde bis vomuit, quater deiecit: die 17. Jan. vomitus cessavit, parum comedit nec multum bibit: manus & facies per totum diem erant pallidæ & frigidæ, noctu melius dormivit: Die

18. Jan. nonnisi de anxietate præcordiorum conquestus est, parum comedit, bibit vinum cum decocto Rhabarbari & macis alteratum: circa vesperam rursus pejushabuit, cenavit parum, varie faciem affidentes immutata observant, noctem habuit quietam: die 19. Jan. Illustr. D. plane restitutum putabant: in prandio melius quam hætenus comedit: à mensa hora prima pomeridiana surrexit, inque locum secretiorum fecerit, ubi per horæ quadrantem commorabatur: famulus ibi humi jacentem invenit; domesticis confici facti omnes statim occurrunt, inque lectum deportant: Post biliosum adveniens ipsum fortissima Apoplexia jamdudum defunctum inveni: Apoplecticum vero fuisse conjeci, quia Aulici ajebant Illustris. Dominum post casum adhuc respirasse, atque illi sacris provi- fuisse:

Die 20. Jan. cadaver condituræ causa aperui: In ventre infimo omnia se naturaliter habebant, præterquam quod Lien valde corrugatus esset, varix incisuræ & corpora duo cartilaginosa in superficie apparent. Inter secundum Chirurgus diaphragma læsit, unde ex Thorace magna sanguinis quantitas, dimidium circiter libram ponderans, defluebat: Thorace aperto nec cor, nec pulmones, ob maximam sanguinis grumosi copiam, primo in conspectum veniebant; pendebat libram cum dimidia fere: In pericardio & cordis ventriculis nullum plane sanguinem deprehendere potui: Pulmones nullum vitium contraxerant; Redempta calvaria in capite, extra ventriculos cerebri sanguinem quoque, sed magis serosum deprehendi, dimidiæ plus minus libræ pondere: Cerebro dissecto omnia diligenter examinavi, nec quicquam tamen vitiosi animadvertere potui. *Observatio D. D. Emanuelis Hurteri, Medici Schaphusiani.*

S C H O L I A.

Affectum quo Illustr. Comes humi pronus jacuit, Apoplexiam cum Cla. D. D. Hurtero potius quam Syncopen appello; quia omnibus sensibus & motu voluntario abolitis, adhuc respiravit; neque alia vitæ superstitis indicia præbuit, unde quoque ipsi Saceris provium fuit: Apoplexiæ causa primis non fuit sanguis copiose sub sterno coarctatus, cum illa post adhuc latiosam hæmorrhagiam non contigerit, frequenter enim experimur per vomitum, feculentum, in hæmoptoe, narium hæmorrhagiâ, uterum, per vias urinarias, ex vulneribus majorem non raro sanguinis vim citra apoplexiam profundâ, & licet lepius talibus leipothymia superveniat, restaurari tamen viribus nihil apoplexiæ superveniente: Scitotici cuidam vegeto, in vicino nobis oppido à Barbitionore ex vena in brachio secta, ultra quinque libras sanguinis emitebantur, qui primam cumulo de soltro lictus est, & ne frustra perfolveret largiorem sanguinis effusionem præcepit: nulla quidem apoplexia sequebatur, verum in dyspnoeâ, & paulo post in hydrope semmedicabilem incidit, potius præcipua culpa sanguini seroso ad libram dimidium intra spatium meningum repento defrenda videtur, qui cerebrum premendo, & spirituum animalium fomite defraudando Apoplexiam produxit; quamvis non negem hanc dimidium sanguinis libram potentius in cerebrum vim suam extensisse, quod ante ipsius effusionem intra hoc spatium cerebrum, jam à prægressa hæmorrhagiâ in pestore, debilitatum, & tanto pondere impar fuerit, nam magna sanguinis penuria illud laborasse credibile est, quia nullum in cordis ventriculis sectione invenimus: Quando vero intra cranium sanguis exillat, incertum est, nullo vero modo deum post obitum effusum credere possum: nisi enim hunc cretorem apoplexiæ causam si putemus, nulli alii adscribere poterimus, cum cætera in cerebro omnia sana reperta fuerint: Vita vero citius abrupta fuit, quia insuper cor & pulmones a sanguine sub sterno gravabantur.

Nihil incitum etc.] Invasio morbi febrili insulsi non multum ab omni fuit, nam post comam sanus le-

tham petiit, mane surrecturus anxietate & vomitu correptus fuit, cum appetitus deiectione, nocte inquiete æstuvit: peritis anxietas cum inappetentia ad tertiam diem, noctes fuerunt in quiete. & die tertio a vino lædebat: Si marulus vocari huiusmodi, forte certiora feb. signa expulsi, urina, attracta, lassitudine spontanea deprehendissimus.

Anxietatem quandam percipit] Causam anxietatis exillimo sanguinem sub sterno copiose effusum & collectum: De istius autem anxietatis causis vide plus a capite proprio lib. 4.

Illustr. Dominum plane restitutum putabant] Nox quidem facalem diem præcedem quietus fuit, nocte quoque doemivt, quia cerebrum ob hæmorrhagiam litam perfigeratum fuit, unde etiam somno aliquantulum Illustr. Comes resocillans in principio diei quartæ melius habere, & extra periculi aleam constitutus aditibus videbatur, quamvis angust in herba lateret:

Ex Thorace magna sanguinis quantitas etc.] Sanguis statim in principio invasionis hac effusus, nec deum appropinquante morte, aut post obitum hieccoli. Etas fuit, statim enim appariebant sanguinis hæmorrhagiæ effectus, & spatium sub sternum amplius erat quam ut à moribundo corde sanguis hac peli medullinam extravassus à sternum avellat, multo minus omni motu cessante solo pondere sinum aut cavitatem aliquam efformare potuisset: Ex vasis autem enormiter sanguis extrudebatur, ob copiam & tenuitatem seu fluxibilitatem; nam plethoricus erat, ut ex habitu corporis obæso & facie præ sanguinis copia attonitescere patuit, Cumulavit sanguinem ob vicium lautorem & viam desiderem, cætera omnibus sanis & validis quæ ad sanguificationem requiruntur: unde vero sanguis fluxibilior, & forte etiam acior evaserit dubitatur? Liene m causabantur adstantes, verum utique illi. Comes melancholicus, vel potius paucorum vel bonorum & medicamentorum fuerit, & Lienem valde corrugatum vasis incisuris, & duob. corpor. cartilaginosis in superficie re- in cadavere prædixim conspexerunt, nihilom. li. nem sanguinis acrioris & fluidioris auctorem neutiquam

discerni,

dicitur nam neque sanguificat, neque sanguinem qualitate aliqua peculiari ad vitam vegetantem necessarium imbui, cum plurimorum experimento constet illo dextre incisio animalia facit commode supervivere: ad illum proxime per arteriam splenicam affluit sanguis, laudatissimus, omnibus numeris absolutissimus, & non minus perfectus quam cerebro aliunde parvi nobili cor impetrat, nullaq. mora ad immutationem necessaria conceditur: & si vel decem guttulae in quolibet appulsu resistunt, non mentium, non septimanarum, sed paucorum dierum spatio in molem valissimam excrescit, quoniam praeter venam splenicam arteria proportioni rite respondentem, nullum in eo, ut in glandulis conglomeratis, vas excretorium reperitur: In ventriculum per vas Bive, aut per ductum Pancreaticum se exonerat antiqua & pridem ab oculatissima Anatomica explorata opinio est: Per nervos ad cerebrum aliquid inde deferri nondum sufficienter probatum est, nihilque magis magisque omni verisimilitudine caret videtur, postquam aliquot nervorum extremitates, vel in membranas expandi, vel cum musculorum et membranas fibris, seu filamentis intime locari esse visum vidi: Vasa lymphatica ipsi non detraho, verum haec communia habet cum ventriculo, intestinis, hepate, utroque alisque partibus membranis obvoluta, quae hanc ob causam sanguinem peculiariter nequaquam alienare credam ut: Quamvis lien autem singulari parenchyma, scilicet ex fibris mixte inter se contextis obtineat, quod non contemnendus usus actionemque aliquam pollicetur, etiam tamen definit non artem, cum alibi cuipaula fungosa, ex similibus fibris contexta in corpore humano reperitur, quae ad sanguinis neque coactionem, neque depurationem, neque immutationem vel minimum momentum afficiant, adeo ut haecenas *De novo* nonnulli *Sanguis* aliquid *derivationis* putarent, ne scilicet plenum impetu ad hepatis rueret, quod non sine instituto naturae factum arbitror, quae vilius hoc multis arteriis confilio dote et nobili: Quae de sanguinis spaciola inter fibillas implentis, & per venam splenicam ad hepatis fluentis divitiae in colore, sapore & consistencia referantur, quae praedictum ablit, forte tanta non erunt: ut non facile reliquarum venarum similitudo repolari possit: certe à multis acor ille in lienibus breviorum effulcentis via ab Apicio haecenas deglutatus fuit: & in vivis animalibus ex splenica emissus, à venae cavae sanguine viz notabili aliquo discrimine distinguitur: Aliquot Lienae magno praedictos novi, & non perfunditote tractavi, aqua quos nunquam effectus illos qui apud humores redundanti tribuuntur, expertus fui. Apud illoslibr. Comitem sanguinis fluidioris & acrioris, oscula vasorum vel sua

sponte, vel progressu quidam non memora violentia referantur, causa felicitas alibi queritur, nimium ad chyli coactionem, ejusque & sanguinis per minutissima vasorum capillamenta distributionem, illi quoque necessario non exigua quantitate requiritur, unde non minus potenter quam effulcentia apponuntur: Si potenter suo manere desincent, aut redundans per vias conflictas, & à natura destinatas, scilicet tenues, habitum corporis seu glandulas conglomeratas cui subtrahat, quarum nominum Extell. D. Srenonio debemus, aliasque rite excernatur, sanguis legitimam consistenciam adipiscitur ac retinet: si vero potenter largius ingruerent, nec debita ratione excernatur, sanguis fluidior & aquosior evadit: simul acrimonia aliqua, si potenter sale quodam acido impraegnata sint, aut si cibis tale & aromatis nimium condiantur, aut in butyro aut oleo figerent, aut alias fale aliquo abundent, quo nulla effulcentia destituunt, in coactionibus tum in ventriculo, tum in massa sanguinea in apicem deducitur, prout manifeste apud hydropotas observatur, qui non minus citius multo sale rurgidum emingunt: quam vini potores, & cuniculos solo toncho aut lactea passos acerrimam urinam excernere sator naves longinquo feriens probat: Nec solum in massa sanguinea sal volatile, sed etiam fixum immisceri, calculi renum & venter urinae carum & aethilicorum topheviunt: Illi Comites potenter in massa sanguinea cumulat, non propter excessus in putu, nam ipsum temperamenter à multis annis visile & adivi & vidi, verum potius ob habitum corporis obicem & viam desidem, & neglectum exercitium à juventute consuetorum, quomobrem potenter lea aquosiora, calore motus beneficio exhalando non attenuata, nec ad excretionem faciliorem disposita fuerunt, nec liberius effluvia nata, ductulis à glandulis tubularis ad cutis, poros hianzibus à pinguedine compressis, in massa sanguinea perstitere: Forte etiam alibi ubi victum laetorem & corporem, glandulae plures à moco infectae, & ad secretionem lymphae ineptiores reddidit fuerunt. Sanguinem simul acrimonia quadam imbutum fuisse nullis dubio, quae in uno patia feculis divetis & varis conditis bibebatur, bibatque vinum Tyrolense generosius: Car autem sanguis potius sub sternum primo quam in alium locum profusus fuerit? dubium est, fortan ob frequentem lectionem inclinatio peccore, effecit ut vas aliquot sanguiferum sub sternum, varici aut aneurismali simile resudaret à sanguine stagnante, vel ruptum vel aliter relectum sit. *Joannes Jacobus Wirsing Exercitationes de Apoplexia pag. 35. & seq. libr. 10.*

OBSERVATIO XXVIII.

Apoplexia à repletis sero ventriculis, & sanguine obstruente processu spinalis medullae.

Septuagenarius ebrius, delapsus ex altiori loco, contraxit in calvaria tam amplum vulnus, ut commode per ejus hiatum educeretur quicquid inhaereret extrinsecus cerebri membranae: Inadvertentibus ipsum nihilominus illico vertigine, vomitu ac stupore, sive à residua crapula, sive à conussio cerebro, Sed posttridie rediit ad se, expertus febris & immunis omnium aliorum symptomatum: Verum die 4: excretae prius spuris purulentis, perit praeter omnem spem, ab inopinata apoplexia.

Cujus ergo interiora capitis penitus perscrutantibus, obtulit se primum frequens humor replevis ventriculos cerebri: Sed mox longissima rima excurrente continuata serie, per frontem oculique foramen usque ad sellam equinam, prope ossis cuneiformis medium: quo loci animadvertimus (quod jure in omnium oculis fuit rarissimum) ingens

I 2 ossis

ossis cuneiformis fragmentum, ita sejungatur à reliquo osse, ut manifeste elevaretur supra quascunque partes circumpositas: In quarum remotiori recessu cum deliresceret plurimum sanguinis coagulari, verisimile est ex ejus putredine prodixisse, postremo vitæ die quod excreavit pus: Sed morbus Artonitus, qui ipsum occidit, traxit originem partim ex obstruendis processibus spinalis medullæ (qui sunt verum nervorum principium) partim vero ex angustia *retis mirabilis*, quod constat ex intricato venarum jugularium, arteriarum carotidum ac cervicalium concursu: Quibus nobilissimis partibus impeditis privatur homo, non modo sensu ac motu, sed ipsa vitæ, juxta illud Celsi lib. 5. cap. 26. Servari non potest cui basis cerebri percussa est. *Nicolas Tulpinus Observat. lib. 1. cap. 3.*

OBSERVATIO XXIX.

§. *Apoplexia, diuturnum capitis dolorem sequuta, à sanguine circa cerebri basim effuso.*

Uxor D. D. N. (vide Observat. 1. sect. 1. lib. 1.) capitis dolori à pluribus annis obnoxia, tandem eo ingravescente Apoplexia gravi corripitur, quæ intra paucas horas lethalis fuit. Ablatò definitæ cranio, venæ duram matrem irrigantes dilatatæ ultra modum, nigrae & varicosæ repertæ sunt, sanguine distentæ, cujus portio in cerebri substantiam basimque decubuit.

OBSERVATIO XXX.

§. *Apoplexia meningum phlegmonem suppuratam sequuta, post gravem cephalalgiam.*

Quidam post diuturnam Hemicraniam in apoplexiam incidit: capite aperto phlegmon juxta locum dolentem in meningibus accrevit: hinc sanies decedens substantiam cerebri livore & putredine affecerat. *Vide Tit. de Dolori capitis.*

OBSERVATIO XXXI.

§. 1. *Apoplexia à viscido humore, cerebrum opplente genita.*

Dilecti non semel qui ob fortem Apoplexiam obierunt, in quorum cerebro magnam aquæ copiam reperi, perspicuam quidem sed glutinosam. *Realdus Columbus Anat. 1. 15.*

S C H O L I A.

Aniquitas humorem crassum frigidum assignavit, obstruentem cerebri ventriculos & meatus, atque adeo spirituum animalium influxum in nervos prohibentem: Quam sententiam ego non æque ac multi hodie faciunt, sine discrimine explodendam esse censo. Nam posita sanguinis in cerebro circulatione, quid facilius quam in cerebro, & cavitatibus illius, succum crassum subfrigidum cumulari? In cerebro, inquam, ubi videtur sanguinis ab arteriis in venas non adeo prompta transmissio? Ubi extrema valorum minutissima; major arteriarum quam venarum copia; ipsum parenchyma parvis respectu frigidum, ne dicam pituicosum sit: Mortale peccatum est in cerebro si motus ille sanguinis retardetur, retardatur aërem facillime in vasis corporibus, ac præcipue in quibus calor debilis est, parenchymata viscerum essentia, impulsus languidus, instrumenta annosa, sanguis viscidus & ad circulationem lentus: Atque hinc potior est quod in venas (vel etiam in vasa lymphatica si

quæ sunt) recipi minus aptus, viscosus latex, & respectu frigidus cuor, in cavitatibus cerebri, in finibus duæ meningis levi negotio substat, yasa, meatus, ventriculos, & basin seu nervorum principium successive repleat, ductus coarctat, atque ipsum denique cerebri motum, pro causarum magnitudine, impedit sustinque. Confirmantur ista experientia & autopsia: nam humida & austera semper, capta pituosis humoribus repleti, & plucimos apoplecticos fieri observamus sæpius, & recte annotavit *Fernelius* lib. 10. Obscrv. 70. Porro probabile est antiquos, dum unam solum Apoplexiæ causam, nempe ventriculorum obstructionem proponunt, ad eam solum Apoplexiæ, quæ sine causis evidenter ac violentis, à sola causa interna accidit & sensibus familiaris est, respectu, ut recte *Sennertus* lib. 2. Instit. part. 3. sect. 2. cap. 6. notavit. *Franciscus Ignatius Thurnæus conf. lib. 1. cap. 2.*

§. 2. Cur stante tanta aquæ copia in Hydrocephalo, cerebri ventres replente, apoplexia non invadit? Causam quis posset assignare quod aqua tantum cavitates cerebri oppleat, non autem parietes & substantiam ipsius, quod in apoplexia requiri docuimus: Dic potius quod aqua illa tenuis est, & non crassa & glutinosa, ita ut transiret spirituum animalium in illis admittat, Eam enim aquam, seu potius humorem aquosum qui in apoplectis, quorum

quorum capita fecimus, inventus est, glutinosum fuisse observavimus. *Marc. Donat. hystor. mirab. lib. 2. cap. 6.*

OBSERVATIO XXXII.

Apoplexia à pituitosis humoribus spinalis medullæ principium occupantibus.

A Tris post obitum, à pituitosis humoribus supra spinalis medullæ principium, ejusque caudices collectis, id subortum ferale symptoma bis docuit. *Kölsch. Dissertat. Anatom. lib. 1. cap. 13.*

S C H O L I A.

C Ar. Pilo lib. de colluvie fetosa, tres Apoplexiæ species constituit, fortissimè causam statuit motum humorum sive solum, sive potius sero immixtam, sed ea proportione ut ille hoc moliam superet: Levem à sero solo, sive macori permixto, sed in paucis admodum quantitate, alias in paralytiā non desinere,

OBSERVATIO XXXIII.

5. Apoplexia à pituita crassa & viscida quarti ventriculi foramen obstruente.

C Errum est ac indubitatum, multis experientiis confirmatum, in Apoplexia obstrui ventriculos cerebri, sive in choana; sed potissimum quarti ventriculi foramen, quod apophysi scilicoide clauditur, à pituita crassa & viscida ibi hærente, quæ si non discutatur & removeatur, vacuata per choanam, lethum infert. *Riolanus Encheirid. Anatom. & Patholog. lib. IV. cap. 2.*

S C H O L I A.

Quarti ventriculi foramen] Ventriculum medullæ obilem vocat Excell. *Thomas Bartholinus*, quem locum generationis & elaborationis animalium spirituum constituit; quod eo loco sinus sitae undique cæ-

ca se in omnes nervos spiritum animale effundere possit, cum ceteri ventriculi excrementorum sine tantum receptacula: Vide *Anatom. Reform. lib. 3. cap. 4.*

OBSERVATIO XXXIV.

5. Apoplexia à crasso & viscido humore ad retiformem contextum invento.

A Iterum quicquid causam externam apoplexia extinctus esset, dissecare visum est, in quo crassus & viscosus humor ad contextum retiformem inventus est, cerebri ventriculis nec oppletis aut obstruatis: Hinc ergo ratiocinatus, consentaneum putavi iis arteriis vel obstruatis vel compressis, apoplexiam gigni. Quod tum cerebrum nihil spiritus è corde per subjectas arterias recipiat, sitque necesse illius motum sensumque petire: Quidam hæc, opinor, animadvertens, recte dixit fieri apoplexiam interceptis viis quæ sunt cerebro cordique communes. *Fernelius l. 3. c. 15. de abd. rerum causis.*

S C H O L I A.

Crasus & viscosus humor] A Sero apoplexiam sepiissime induci supra demonstratum: An vero & alii humores qui ad cerebrum & cerebellum deferantur apoplexiam parere possint? dispiciendum, Quicquid humorum intra medullam dictarum partium effunditur, per arterias illuc transportari ante dictum: Arteris autem naturaliter nihil nisi sanguis includitur: præter naturam bilis & mucosus quidam humor confunditur, quibus valgo melancholia additur, Io sanguis si refrigerat, juxta *Clar. Placentium*, non secus ac in lacte, triplex substantia conspicitur, Buryrota, tenuis, splendide rutilans & superficem veiliens: Caseosa, crassa & fibrosa, huic subjecta & ima potius: ac Serosa, ambabus circummissa; nunc pallidior nunc flavior, instatque urioæ, lacrymarum & sudoris salis. Si caleat & moveatur sanguis, nullum in eo partium discerni observatur, tubique undiqueque similis, ex vena vel arteria aperta ciliens, com-

spicitur: sique ex recenti vulnere profiliens, dum adhuc fervet, per linteum colatus, omnis minutissima foraminula, nullis, vel certe rarissimis fibrillis in linteo resistantibus, permeat, ut etiam in examine sanguinis leprologum, qui valde adustus & crassus creditur, iterum observari: Serosam sanguinis portionem à reliqua massa segregatam, meatus obstruere aliquando posse, hætenus ostendi: reliquæ autem due substantiæ, si in halibus subtilissimos vertantur, eisdem meatus ingredientur; sed tantum abest ut damnum inferant, ut potius summopere conducant, spirituum enim animalium materia sunt, & quod puriores & nitidiores, eo etiam præstantiores animales inde resultant: crassiores vero earum partes hos meatus, utpote minutissimos omnemque viam fugientes, lubie nequeunt, unde etiam medullis os substantia marmoreo splendore splendet: Si quis autem p. n. ob vim illarum, nimiam dilatatis menibus iterum, illud quod à

I I sanguine

sanguine extravasato, & intra poros aliarum partium ethaio sit, accidit nimirum inflammationi gignitur, alius ab apoplexia morbus, aliusque illius symptomatibus de forte non tam universalis, omnemque cerebri & cerebelli *et quis occupatis*, prout in apoplexia huius necessum est: Quae praeter naturam sanguini admiscetur, ut aliis partibus quas sanguis aluit, nocens, ita non minus cerebro ac cerebello obesse eorum actiones turbare & pellundare valet.

Supra dictum viscida ac mucosa sanguini confusa omnem aditum spirituum vitalium ad interiora medullae substantiae interciperi posse: Per se quidem ac sola, insula, ob meam angustiam, penetrare nequeunt, ac calefacta cum sanguine, & motu attenuata, seroque dilata, non solum cum illa in profundiora medullae irumpunt, ac affectum graviores atque citius difficiliorem reddunt, utpote calori plane immorigera.

Bilis equidem omnino majorem in hepate proventum esse quam hactenus credebar, invento *Glossii* innonotico, quotquot enim rami venae portae per hepae disperguntur, tot ramulos ductuum biliferorum sibi accumbentes habent: Si itaque liberius bilis excretio per ductum & poros cholidocos impediatur, regurgitat illa in cavam, sanguini permiscetur, ac ferro diluta minutissimos quoque meatus transiit, ut *lectus* comprobatur, in quo urina crocea evadit, sudores non solum flavescunt tingentes lineae emergunt, ac albiginosa oculo tum tunica, alius densissima flavescit: ac proinde oculum dubium interiora cerebri & cerebelli permeare, unde *icterici* spontanea lassitudo, capitis dolor & vertigo quandoque obvenit, An vero unquam apoplexiam producat? credo id sine exemplo esse: si qua fosse eam sceleris, non solum praestitisse videtur, sed cum sero mixtam, ac propterea forte eadem ejus ratio erit quae apoplexiae a sero meatu obstruente est.

A melancholia omnem apoplexiam ortum dicere contempsit *Cajdinus*: Fernelius nullam ab ea produci assumat: Verum cum humorem illum melanch. qui *infectum* a liene ex epate, aut venis malaricis, per venam splenicam allici, ac ad peculiare pelcio quos usus praeparat credebar, non eni censeram, apoplexiam a tali humore praeterire. *Wisspenn* pag. 273.

In arteria obstruere.] Supra dictam arteriarum vertebraliū & carotidum ramos cerebro & cerebello, tum in basi maxime, tum intra nostras, minutissimos & penè innametos laticulos impetire, qui se immergunt substantiae eorum, et de medullae oblongatae, Queri itaque posset, an non & ipsi subito obstrui possint, atque impedita communicatione spirituum vitalium cerebro ac cerebello, ea proportionem quae ad animalium spirituum generationem ac repARATIONEM necessaria est, amon inquam hanc ob causam etiam apoplexia oboritur? Et si prima fronte id creditur difficile sit, cum arteriolarum ramentis ingens exitat, qui a diversis ramis, diversis in locis suis originem trahuntur. Verum consideranda sanguinis varia constitutio, ejusque motu aequali sine omni defectu, sinuulo exiguitate, cerebri cerebellique nativa indole, vitiosis ipsi tum ab internis tum ab externis causis evenientibus, forte etiam hereditariis morbis concurrentibus, ac denique multiplicibus in viciis et viciis, non adeo impossibile videtur quin succali omnem simul & semel obstruantur: At si obstruuntur necessario apopl. consequetur, cum cerebrum vel tantillo temporis sit caute nequeat, cerebra actionum animalium omnino abolitionem. Et quare per duram materem liberius fluat sanguis, aut per majores ramos

anfractus intercurrentes, nullum tamen commodum in cerebrum & cerebellum redundabit, cum sanguis ille ad sinus properet, hinc per jugulares ad cor refertur, medullosa interim substantia ipsarum communicatione quasi obata existente: Sanguinem eorum primum quod arinet, nemo negabit illam pro temperamentorum, aetatis, sexus, viciis, regionis, temporis anni variare varium quoque esse, & non raro V. S. emissio sanguine conspiciatur: nam si feotum affertur ac frigeat, saepe tota ejus superficies viscido phlegmate operitur, quod citra digestionem conpurcationem non semel a reliquo sanguine, pelliculae instar avulsi: si vero aquae permisceatur, aut cum illa tepida, virgulis immixtis idem phlegma, magna quantitate tenaciter adhæret vidi: qualem sanguinem si sequenter in ichthyophagis, otiosis, obosis, ac laetius victimibus animadverbo. Sanguis autem iste pariter per omnes arterias, citra omnem delectum propellitur, neque tenuiora sursum, calidiora deorsum tuunt: nullamque sanguini inertia arterias vel mora vel requies est, ob perpetuum cordis & arteriarum motum, sanguinis particulis semet, ut vasa modum rudimentibus, non secus ac in aquis videtur, aquae rivales, qui data porta per appropositos canaliculos sibi undiqueque similes erumpere: Si itaque diu & lapsus in die (i. e. enim horarum spatio aliquoties sanguis circulari) vasa haec medullotum substantiam permeant, talis sanguis, cui viscido plurimae ac lente particulae permixtae sunt, rantescent, sensim quodam huiusmodi portunculæ adhærescent, prout canabiles, per quos saepius thermae aqua rapidissime fluit, topoi accrescunt. Licet igitur non ita in arteriis hae, vel post per quos spiritus vitales medullae substantiae communicantur, a tenuis his humis penitus obstruantur, ac etiam ad oppilationem paulatim disponuntur, quae tandem contingit si sanguinis vitium non emendetur, sed diutius perseveret, aut si exteris causa accedat quae sanguinis motum acceleret, ut major copia feruat, aut ejus motum per vasa haec remoretur. Aque obstruio eo facilius eveniet, quia vasa haec exilia valde sunt & vix capillis aequantia, unde non pauci doctissimi viri cerebro illa denegare ausi fuerunt: ad quam produciendam non parum quoque facit si haec hereditaria quasi nec minoriora sunt, unde forte quaedam arteria hereditaria est? Obstructionis quoque generationem non minus promoverit ipsa cerebri constitutio, quae frigida est, nisi perpetua à sanguine irroratur, & ponderosior, quae non sufficiunt resista collabunt, ac vasa p. n. angustiora amplius constabunt, atque ad pleniorum obstructionem disponit: Quid causae exierit ad hunc affectum producendum valens, historice docent, quaram incuria subito quidam apoplectici collapsi sunt: Ex si in corpus viscido sanguine praedium, qui diu haec capillamenta arteriarum aluit, incidunt, facile obstruuntur aliquando productus admodum viscosus est, idque plurimarum vel plerarumque & in momento quidi: harum enim vis id est sanguinem vehementer concitate & fundere, atque in copiosior ad cerebrum properet effluere, qui ad capillamenta delatus, cum ob eorum exigentiam & parum capaciem transire nequeat, parum praegressum validius impinget, atque obstructionem pariet, quae haud difficulter suboritur, cum ipsi illi qui in medullarem substantiam ex arteriis possunt, oppido effluere debeant, eos enim permittit necessum est subtilissima spirituum animalium materia, quae cum fulgore & ocyor aurs, quocumque nervos, ad quodlibet imperium voluntatis pervolare debet, parum subsistet, unde

unde aliquomodo refrigerabitur, atque ceterior ob-
structior oborietur.

Obstructio vero hæc non una ratione animales
actiones prosterit, sed pro eius conditione nunc
plures nunc pauciores, prout scilicet pauca vel multe
arteriarum perfectius vel imbecillius obstruuntur.
Hinc quidam tantum loquela privantur, si uno la-
tere oppletur, hemiplegia subsequetur: si utrinque,
vera apoplexia exoritur, curatio facillior vel pertinacior,
prout imbecillior vel validior illa fuerit. Ipsa
curandi ratio frequenter tales apoplexias, maxime
illas à quibus ægri plenam valetudinem brevi recu-
perant, è tali obstructione nasci comprobant: quidam
enim sua sponte, citra omnem remedium usum, ob
naturæ robur & obstruccionis levitatem: alii cepha-
licorum viis, non pauci sanguinis effusione sanari
reliquitur. Quæ indicio sunt apoplexias tales, si ve
imperfectas si ve imperfectiores, graviorum certe
presumptas, potius ab arteriarum (earum maxime
quæ in basi oblongatam medullam & rotundiorum
functus) obstructione proficisci, quàm ab aliis qui-
busvis proximis causis. Quælibet enim cæterarum
apoplexiarum ab aliis causis oriunda, vel plane in-
curabilis est, vel si medicabilis sit, longius tempus ad cu-
rationem postulat, vique usquam tam diligenter et fide
curetur, quin indelebilem labem vel intus alio-
quo, vel in motu post se relinquit. Si ve enim ab ob-
structis carotidibus & vertebralis, si ve ab oppilato
bulbari à corporibus pituitosis, si ve à sero intra me-
dullas substantiam effuso: si ve ab eo extrallam in
cavo cranii & ventriculorum fluctante, si ve à san-
guine extravasa profuso efficiatur, tum efficaciora
remedia postulantur, tum longè diutius medicamen-
torum usus, dubio cum succellu, continuandus erit.
Wisserm pag. 105. & seq.

Incomposita] Compositæ arteriarum alteram mor-
bi genus est, propter quod sanguinis aditus ad partes
prohibetur. An vero in apoplexia generanda sola,
calda alterius morbi concursus, locum habitura sit,
valde dubito: quocumque enim mentem veritam, viæ
causam reperio quæ carotides & vertebrales, prope
et post ingressum intracranium, ut earum propaga-
nes omnes, vel maximam partem sola, exiguique tem-
poris intervallo, ita comprimere & coarctare possit,
ut omnium actionum animalium abolitio consequatur.
Suspendium quidem aliquid apoplectici efficit,
verum non solum carotides comprimendo, atque in-
gressum sanguinis prohibendo, sed & venarum juga-
larium coarctatione, relaxum ejus impediendo jun-
ctæ sanguis intra cerebrum & cerebellum cumulat, atque
propterea Apopl. generabitur eo modo quo
Galenus ob *παρὰ τὴν διάνοιαν*, & Salus de aff. o-
missis cap. ii. aut Hipp. c. eam produci putarum, nisi
luxu jugulo etiam vertebrales arteriæ à vertebra
premanur. Serum intra cranium, copiosissimum
quoque, si ve purum purum sit, si ve pituita permix-
tum, viæ arteriæ coarctabit, ut vel solæ hydroce-
phalorum historie docent. Atque in hydrope ascite
observatur sanguinem per arterias, medias inter un-
das fluctuantes, ita saepe eludari & libere fluere. A
sanguine extra vasa intra cranium effuso, atque in
gutturis concreto, licet arteriæ premi possint, non
tamen ob compressionem potius quam aliam ob cau-
sam apoplexia gignitur. Verum an non aliquando in
illis, qui ob luxum colli vertebrales vel paralytici de-
cubuerunt, quibusque ob eandem causam vertebra-
les arteriæ angustiores redditæ fuerunt, an non in-
quam carotidum utraque tubia compressio superve-

nire possit, atque ita apoplexia gigni? Et hoc certe
statuere non audeam, haud tamen adeo à verisimili
abest quin aliquando hoc fieri possit: Experimur
enim quotidie paralyticia, aliasque glandulas subro
insumescere à terosa defluxione, accedente ob dolo-
rem tenioris sanguinis afflumi, sæpeque ad insignem
magnitudinem excrecere. Cum itaque Paralytici ob
exercitii defectum, plurimum scilicet cumulant intra
ventriculos cerebri, illudque sæpe situ acie evadat,
si subito per infundibulum ad glandulas pituitarias
ruat, nec omne ad palatum expurgetur, non admo-
dum absidue dicitur glandulam tumidam valde, bre-
vi tempore evalutam, atque ad latera ejus incenden-
tes carotides compressuram, unde cerebro ac cere-
bello, tam vertebrellum quam carotidum vitio, san-
guinis influxu privatis, apoplexia secubitur, ac mi-
sericordis hinc paralytici aliquando subito ætterna-
rum finem afferit: quamvis autem aliis arteriarum
intracranium compressio sola apoplexiam non gene-
ret, symbolum tamen suum non ita ad illius produ-
ctionem conferet. *Wisserm pag. 110.*

Cerebrum nihil spiritum à corde, &c.] Omnium cla-
rissimè capite plexi demonstrant quam cerebrum in-
dignum cordis perpetuè & non interruptè ope sit;
quamprimùm enim caput certice recubatur est, omnis
sensus & motus animalis, etiam in capite pete, cum
tamen si cerebrum sibi sufficeret, nihilque à corde
acciperet, ad minimum palpebræ & oculi sentire &
se movere debent, quod nemo animadvertit. Ex qui-
bus patet cerebro continuo sanguinis influxum per
arterias, tum ob alia, tum ad actiones animales per-
agendas, omnino summe necessarium esse, & si forte
eo deficiat, itacum ejus actiones omnes petitus
cessare. *Idem pag. 193.*

Quidam velle dunt, &c.] Quæ videtur fuisse senten-
tia Hippocratis lib. 2. de morbis, quæ apoplexiam essen-
tiam statuit fixationem sanguinis à viâ arteria-
li, &c.

Interceptio viæ quæ fert cerebrum cordisq; communis]
Notandum est à Galen. lib. 2. de morbis, interceptionem
venarum, de qua Hipp. lib. 2. de morbis. eandem esse
cum Galeni *διὰ τὴν φρεσίναν* cerebri, ut videtur est
Id. de morb. caus. c. 3. & 4. de viâ. acur. Cernum autem
est sanguinis circulationem, arteriarum cerebri diffu-
sione, ac itaque vero usu inspectis, nunquam il-
lam probatum est, nec Cl. Nymani legamenta, qui
contra eam assert lib. de Apopl. cap. 11. superari possit.
Veram agnita S. C. novissime linum usum, arteria-
rum ac ivulorum ad finem progressu, Si unquam
Tortular obstructum fuit, vel oppilari potuerit
(cujus occlusionem ut probaret dictus Nymmanus
dictam tracturam adnotavit) haud difficulter intel-
ligitur unde sanguinis tanta copia irruat, quæ vasa &
tam repente opplet possint, ut omnes meatus com-
primere valeant, & eae senibus præ æthlis & pho-
thoricis obtingat: Si itaque vel tortular, vel latera-
les sinus, ibi ubi jugularibus venis uniantur, subito à
corporibus pituitosis (qualia æquè in venis ac ar-
terias reperiuntur) obtenerunt, quicquid sanguinis
per arterias carotides & vertebrales, perpetuo ejus
moto affluit, intra dictarum arteriarum propagatione,
per cerebrum, cerebellum, meningem tenuem & an-
tiachas diffusetas, ut & in rivis ab his profectis &
ad finem abeuntibus, itagnabit, brevique lum mope-
te replebit ac distendet, unde medullæ substantia
undiquaque artissime comprimitur, omneque spi-
rituum animalium motus claudens, subitoque
apoplexia oborietur. Et cum tenes ob calidi nervi

ad interitum vergentis debilitatem, crudos humores imprimis comulent, illi prae athletis tali apoplexiae obnoxii erant: atque hac ratione explica-

tam Cl. Nymanni sententiam de convulsis obstru-
ctione explicandam arbitror.

Wissens pag. 101.

OBSERVATIO XXXV.

5. *Apoplexici Caput, Pectoris regio, stomachus, pulmones, materia pituitosa referta erant.*

Cellarius quidam in collegio Panzermaniano, assumptis à circulatore floribus Antimonii, incidit in Apoplexiam, qua durante in validissimum pryalissimum incidit, ita ut per aures & os spumosi phlegmatis facile mensuras sex expuerit.

Corpus defuncti apertum fuit, & pulmones, tota Pectoris regio, stomachus caputque materia ejusmodi plena fuere reperta.

S C H O L I A.

EX hoc colligere licet, quod licet Antimonium diaphoreticum optime preparatum est Pulmonum singulare remedium, in suo nondum sulphure

arsenicali & mercurio, calcinationum & dilutionum vi, exoritur, summum est venenum. *Paulus de Serapis in Med. cur. anni 1673. Observe. 170.*

OBSERVATIO XXXVI.

Apoplexia ob cerebrum pituita perfusum, Ejus venarum ab eadem obstructionem, ventriculos sero repletos, & Polypum cordis fibris adnatum.

Momma Baxius, homo torpidus ac hebet, occisus repente à morbo attonito, obtulit fecanti Chirurgo cerebrum flaccidum, & membranas ipsas tam frequenti pituita perfusas, ut opus fuisset eam spongia detergere: Qua eadem pituita replebantur utrique & venae per cerebrum dispersae, nec minus Sinus falciformis, & quidem utrobique tanta copia ac lentore, ut inde potuerit extrahi instar longioris alicujus filii. Movente hac concretà pituita non levem polypi suspicionem, sed quem id temporis frustra quaesivimus in naribus, illum offendimus deinceps inscii in sinistro cordis ventriculo: Sed redeundum ad pirustofum hoc cerebrum, in cujus ventriculis invenimus, non tantum plurimum aquae (quod attonitis familiare,) sed spinalem medulam ita humidam, imò udam, ut necesse fuerit exuperantes liquores prius spongià absorbere, antequam licuit inquirere in naturam nobilissimae hujus partis. Constabat autem is Polypus ex alba ac concreta pituita, inclusa membraneo involucro, & inhaerens suis radicibus carnis Cordis fibris, asurgebat bifido trunco, obcuratum non minus arteriam aortam quam venosam: quarum nobilissimarum viarum obstacula impedimento fuere, ne deinceps vel aërem libere attraheret, vel fulgines debite expelleret Cor, nedum exactè se clauderent valvulae post egressum spiritus vitalis; cui tamen usui illas ibidem loci destinavit sollicita natura, unde factum ut partim ob exclusum aërem, partim vero ob retentas fulgines, & spiritus plus aequo dissipatos, infirmaretur usque eo cordis robur, ut nequirit amplius officium facere, multò minùs spiritus vitales quibuscunque partibus impartiri: quorum calore ac foris ubi carentium fuit, refrigit inde confestim corpus, emarcuit animus, & torpuit tam vehementer cerebrum, ut tandem perierit à gravissima Apoplexia. *Nic. Tulpium lib. 1. Observ. cap. xxvij.*

S C H O L I A.

Pituita replentur & vena] An arteriae carotides & vertebrales obstrui possint, dubitatur, cum eum sanguis à sinistro cordis ventriculo ad cerebri ejectionem, super admodum per minutissima capillamenta venae arteriae in arteriam venosam transiit & quasi per colares fuerit: insuper in sinistram cordis ventriculorum infusus novus vires novaeque calorem acquirit, nullatenus credibile videtur sanguini permisceri viscidos siquē lentos humores, sufficientes futuros ad eorum arteriarum cavitatem amplissimam in specu capillamenti oritur, quae paulò ante singula percuraret, obcurandamque sanguinisque liberum transitum ad cerebrum & cerebellum peni-

tus prohibendum. Vicumque autem haec argumenta valida appareant, non tamen omnino impossibiles generationem apopl. ab obstructione earum arteriarum credo: Atque ut hoc credam me persuadent corpora, sive pituitosa, sive fibrosa, quae saepius in cadaveribus cachecticorum, diuque & frequenter ex morbis decubitorum inveni. Usplurimum haec corpora radices agunt in cavernis thalamorum cordis, atque ibidem non raro ad notabilem magnitudinem excrescunt, & ut quidam observarunt, quandoque ovi gallinacci magnitudinem superant; hinc è sinistro ventriculo ramos sursum deorsumque per aortam emittunt, qui pro arteriarum capacitate & nu-

mero in plures & miniores ramulos pariter diffunditur: adeo ut respecto tali corpore in una arteriarum non dubitanti simile in alia quavis arteria latitauerunt, periculoseque faciendo rem ita se habere sensibus compertum. Si itaque fibrosa hæc corpora, infelices ægri cordis germina, pariter carotides & vertebrales arterias, non procul ab ingressu intra cranium, aut in ipso ingressu loco occupent, non dubio haud difficulter obstruuntur obstruuntur; & quidem talem quâ illis harum arteriarum vel penitus occidantur, vel saltem angustiora eatenus reddantur, ut sanguis sufficiente ad cerebri refectionem & spirituum animalium generationem, copia infusere nequeat: cum enim non raro sanguis ad vehementiorem motum, & præter solitum concitetur, impetuosis versus cerebrum quoque sit, unde facile corpora hæc absumuntur, maxime si facida sint, atque pertinacius harum arteriarum ostiis implunguntur, elique penitus occludunt: Vel si forte tenuiora existant, ut non raro sunt, nihilominus obstruuntur obveniente potius, tum à copia sequenti sanguinis, tum à corporibus istis, simul & quasi concurso ad obstruendum concurrentibus; qualia, obstruuntur generatim ab humorum & sanguinis copia, subinde mole & redundancia viam præpediunt, passim Medici memorant.

Obstruuntur autem minime arteriam, &c.] Si corpora hæc in corde primas radices agant, ibi adolescant, atque hinc equaliter, pro numero arteriarum dispergantur, non tam apoplexiam quam alios affectus producant, atque hominem è medio tollentes, quales sunt orthopnea, syncope cardiaca & similes: Faciendum equidem illis in quorum corde & arteriis buxumodi corpora delirunt, nunquam integra valetudine frui, sed illi cor palpitare, difficulter respirare, in omnibus actionibus turbidiores esse, faciēque illis de magno sædo livore conspicui, inde subito interfici non obdignare apoplexia verè hic dicta: At nihilominus existimo apoplexiam quandoque lethiferam ab illis effici, quæ syncope nullatenus discenda, cum permanentibus actionibus vitalibus omnes animales aboleri ab his corporibus queant: cum enim dictarum arteriarum conditio prope cerebrum sit ut amplius distendi nequeant, si occupentur penitus, tum ab his corporibus tum aliis humoribus, ad obstruendum patiendam concurrentibus, omnino apoplexiam contingit circa alios mortiferos affectus: reliquæ namque arteriæ & cor ipsum, utcumque hæc corpora contineantur, aliquem tamen & ad vitam sufficientem sanguini transitum concedunt, unde abolitis omnibus animalibus, vitales aliquandiu superstitēs esse possunt: cum enim cor & arteriæ molles partes sint, & ad distensionem aptæ, si tales corpora in illis hospitem, sanguine vehementius moto cedent, ampliorēque evadent: Obstruuntur tamen quosdam cum istis corporibus diu satis commodè vixisse, atque plerumque vitæ munia obivisse: & licet per periodos, aut ob causam externam quandoque vehementer cor palpitare, pulsus inæqualis diu fuerit, sæpeque althma vehementer affligeret, non tamen ita ita occidisse. Venerunt enim sanguis ad imperium protinus in cor iterat, atque ipsi suffocationem minetur, quin tamen in motu suo calidum est, imprimis si ad has angustias redigatur, statim exurgit & quod molestem est excutere annititur: quod haud adeo difficulter præstat dum per parulas & membranas aeternæ noxiæ evomere qualibet sphylo potest, aorta impulsu sanguini non pertinaciter obstat, sed post tot expulsiōnes cedere: unde quidem tunc cor à molestia ali-

quomodo liberatur, graviora passuro cerebro si ab expulso sanguine obstruuntur gignatur, quamvis negari non possit, si cor languidum sit, nec sanguinem amplius propellere valeat, syncopen porius cardiacam productum iri quam apoplexiam, corde maturè tanto oneri succumbente: Arque ita affecti plerumque vivi videnturque pereant, morteque præsentiant, atque altissimis eam præsumunt: Si verò primum animales actiones omnes cessant, salvis adhuc vitalibus, non video cur non affectus apoplexia nominandus sit, utcumque syncope, aut eiusque mors superveniat: Si enim huic affectui apoplexie nomen denegandum, nulla lethifera apoplexia erit, cum omnis mortem affertens, mediante syncope, seu omnium vitalium actionum abolitione finiatur.

Humor tempidus ac lberis, &c.] Huic apoplexie si potissimum obnoxii videntur qui perpetuo otio torquent, obzeli, alimenta vitida lenia ingerunt cachectici, quibus facies & manus livent, aut iactant rubefcentes quibus pulsus perpetuo inæqualis est: althmici, qui denique seros quandoque inultus palpitantes cordis experientur: Hæc specie repente occidius videntur. Brevius ille: ubi primum observandum. Si talia corpora in corde & arteriis existant, eadem etiam in venis infallibiliter occurrere: a. venas & arterias cerebri plerumque pridem non accorare distinxisse, si, et si plurima aqua maduerit cerebrum, quintum spinalem medulla valde nda ab ipsa reddita fuerit, non tamen primas partes aquæ in efficiendo apoplexiam hanc deferendis esse, cum eque plurimum intra cranium & ventriculos cerebri sæpe cumuletur circa apoplexiam productiōem: insuper consistit apoplexia hominem tullit, quid aqua præstat neque: quævis non negem occupatis arteriis à purosso corporis ramis, aquam abundantiorē ad accelerandam apoplexiam multum consiluisse *Wegf. pag. 100.*

& seq. Exer. de apopl.

Rati mirabili] Magna contentio est inter Anatomicos de Rete mirabili Galeni: In quadripedibus existeret illud pauci negant: An verò in homine tale reperitur ambigitur valde: quidam enim man scite reperiri affirmant: quidam obicere & totum ejus quædam lineamenta & rudimenta apparere adferunt. Nonnulli illi Plexum choroidæm subsunt. Sunt & qui novam & diversam, ab hoc Galenico, loco situm excogitant: Roslinkius Anat. Dissert. lib. 6. cap. 40. scilicet testimonio Rete hoc in homine confirmari ait. Si in suspensio carotidem in collo inflaveris arteriam, id rete cum flatu substat: imo etiam si leviter vulceratus fuerit, sanguinem exposit. 2. Si duram meningem, quæ circumdat tellam, scalpello aperueris, aut ab osse sublatro avulseris, à sella usque ad os occipitis innumeras invenies foliolas, immixtis arteriis repletas, quæ rete hoc expriment. Consule Anatomicos de hac controversia & citatum Roslinkium.

Sed morbus atrox, &c.] A sanguine extra vasa effuso quomodo apoplexia obducitur, ostendit *Plautus* Prælib. 1. cap. 2. Extra vasa, ait, sanguis delatus, si non in cerebri substantiam effusus, inflammationem pariat (tunc enim phrenitis fieret) sed asinatus de ventriculis subito oppellendo obducitur, nervorum initium premat, stuporem & apoplexiam causat: Vt frequenter rupta vena accidit, idque nonnisi quæ ob plethoram ad vasa, ipsi præteritis quibus consuebat hæmorrhagiæ subsisterant: Quibus & vivens adhuc, & post mortem, magnam sanguinis copiam per os, nares, emantet rotes observari, ut hæc potissimum apoplexie causam esse aliquoties mihi persuasuerunt.

suasem: Idem à causa externa violenta, ut cerebri contusione ex ictu vel casu, potest accidere, etsi cerebri substantia vulnera minimè sit, ut sanguis quoque cerebri cavitates, ipsiusque substantiam, iis locis præsertim ubi convulsa, est opplet, sicuti in ratorum securi percussorum cerebro fieri quotidie vident mulieres, quando cerebrum, antequam coquantur, à sanguine grumoso prius reputant: unde apoplexiam fieri subito necesse est, nisi is per aures, aures, aliave partes seu vias vicinas, ut quòque interdum fit, statim exumpat, aut levius fuerit calius, unde levior obstupescens potius accidit: Licet & sæpe in grumos conversus sanguinis affluxus retentusque diutius, si potest, phrenitidem, convulsiones, quæ ante obitum lethargos & apoplexias sequuntur, quòque jugulant, pariat.

OBSERVATIO XXXVII.

In plurimum ab Apoplexia extinctorum cerebri aut cordis vasis, reperta corpora viscida, glutinosa, in Polypi dicta.

§. 1. Quotquot Apoplexia aut carattho (suffocativo mortuos aperui, in omnibus corpora illa callosa, viscida ac glutinosa, aut in corde, aut in cerebro, aut in ambobus aliquando reperi, de quibus scribit Wesperus, &c. *Ioh. Georgius Griesel Miscellan. Curios. anni 1670. Observat. 74.*

§. 2. Vidi & ego, præsentibus viris magni nominis, corpus tale ex corde, & truncis ac ramificationibus, cum arteriæ tum venæ pulmonalis, uti & ex finu duræ matris longitudinali, in homine quinquaginta annorum, apoplexia demortuo, educum. *Ioh. Von Flammerdinge, Eques Divi Marci, Medicus Meno-Francoff. Dissert. de Apoplexia, Thesi V.*

OBSERVATIO XXXVIII.

In Apoplectici sinistro cordis ventriculo pinguedo reperta.

IN sectione Apoplectici cuiusdam nupera, observata fuit in sinistro cordis ventriculo pinguedo in arteriam venosam ascendens, ubi cum ejus orificium clausisset, in duo cornua dividebatur, ad similitudinem literæ Pythagoræ: Si, ut volunt, à causa frigida concreverat pinguedo, mirum certe in calidissima regione adeo luxuriare. *Thomas Bartholinus Centur. 1. Epistola 2.*

OBSERVATIO XXXIX.

Apoplexia ab humore aquoso per cerebri substantiam diffuso, ventriculos replente, cum sanguine atro & crasso in arteriis temporalibus.

EGO multum magnificæ Dom. Mariæ Justinian. de Arrivabensis Dispensatorem, forti Apoplexia percipitum secare iussi: Totam cerebri substantiam aquoso humore perfusam & oppletam reperimus, quæ etiam & in cerebri ventriculis redundabat: Et (quod mirum sane fuit) dissectis arteriis temporalibus, tanta copia sanguinis atrii & crassi effluxit, quamquam vix in toto corpore reperiri credidissim. *Marcellus Donatus Histor. mirabil. lib. 2. cap. 6.*

S C H O L I A.

Tanta copia sanguinis atrii, &c.] Meminit *Jul. Alexandri* Salubrium lib. 24. c. 2. Antonii morbi qui interceptis venis arterisque à multitudine fit, quos usque adeo infarctas obstruat, ut exploras ad plenum, quam nec superfluum vacuum, nec recipere extrinsecus quod refocillando nativo calori necessarium est, ulterius valeat, sed suffocato repente calore animal illico concedat: Hujus quoque febreæ fuisse *Rafin* constat, quippe qui venas Guidæ, i. e. lumbares, in apoplecticis secandas moadat, ut pote quibus oppletia affectio oriatur, inanitus vero solvatur. Quare si corpus sanguine plurimo redundante apoplexia deprehensum, sed non validissima, nobis occurrat, aqua dicitur ad arteriarum temporalium sectionem devenire operæ pretium futurum maxime crediderim &c. *Idem ibidem.*

Cerebri substantiam aquoso humore, &c.] Apoplexiam

causam inditæ Dispensatore refert *M. Donatus* ad oppletionem arteriarum, nec meminit cerebri aquoso humore perfusi & oppleti & in ventriculis redundantis, cum tamen à sero & humore aquoso apoplexiam induci certissimum sit: Adeo ut à duplici causa originem duxisse hæc videatur, sed revera simpliciter, Sanguini enim arterioso copia preccanti, cum liber aditus per arterias in cerebrum non patet, in iis crassitudo adeptus est, imò pene coactevit, serumque, quo plurimo abundat sanguis arteriosus, ab eo secretum est, quod in cerebri substantiam ejusque ventriculos exandavit; adeo ut apoplexia hæc ortum ducat, tum à negato influxu spiritus vitalis ad cerebrum, ob dictam arteriarum oppletionem: tum à spiritu animali exitu prohibito, ob serum in cerebro redundans.

OBSER.

OBSERVATIO XL.

5. *Apoplexia à Sero plurimo in ventriculis cerebri, per substantiam diffuso, & in sacra fistula, Hydatibus in plexu choroideo, &c.*

VRsula Puleu Frisen, habitu corporis Sanguineo phlegmatico prædita; victu gaudebat lautiore, qualem scilicet rustici melioris conditionis hæc loca incolentes nanciscuntur, potissimum fere lacticinis, quæ illorum delicta sunt, fruebatur: Aliquot liberorum mater erat: menstruus fluxus extra graviditatis tempus rite manabat: 1661. circa 37. ætatis annum iterum gravida, diu continuos eosque savissimos capitis dolores passa est cum vertigine: Quarto mense conceptionis, scilicet circa principium Maii, mane è lecto surrexit, humi sedit, ac caput manibus sufficiens, de consueto capitis dolore conquesta est, atque malum quoddam gravissimum sibi imminere prædixit: mox oculi pervertebantur, vomituriēbāt, maritum & liberos miserabili vultu intuebatur, at æpavē facta amplius alloqui nequibat: potius instar trunci omni sensu & motu privata concidit, sola respiratione salva manente: In lectum traducta per triduum, eo situ quo locabatur immota iacuit: Iuscula & aquas antiapoplecticas, spiritum vini redolentes, absque labore deglutiit: Post diem tertium ad mentem aliquantum redit, compellata annuit, & paulo post artus sinistri lateris denuo movere valuit: Intra mensis spatium nullis aliis medicamentis adjuncta, à marito aliisque adstantibus suffulta incedere potuit, ita tamen ut dextrum pedem trahere, & manu dextra ad opus aliquod perficiendum impotens esset; Intellectus semper debilior mansit: Appetitus constitit, mense Octobris 1661. delirio melancholico corripiebatur, circa finem Octobris infantem vivum enixa est: Appetitus ad xiv. diem puerperi, integer permansit: hoc die subita debilitate obtuta omnem cibum fastidivit, simulque delirium mitius evasit & ipsa quietior aliquandiu fuit: Rediit Delirium cum cephalæa solita, atque ad anni 1662. fixissecium usque perduravit: In hoc delirio notissimos & omnia cura timebat, maxime à fragore lignorum minus aridorum in foco crepantium percellabatur: sepius in sylvas ambegit, ut vix satis custodiri potuerit: ter violentam mortem sibi inferre nitēbatur, jamque laqueum collo sibi met adaptavit, totiesque mariti providentiā à tanto facinore vindicata fuit: Nullam penitus liberorum curam habebat, nec famelicos vel mica panis refocillasset: nonnisi coacta comedit: Delirium hoc plerumque sub auroram incepit, duravit usque ad vespertam; hinc minus sibi met metuebat, quietior erat nec custodiam sui exegerat: Medicamentorum nescio tamen qualium usus frustraneus fuit: Empirici suavis Vere, Æstate & Autumno singulis mensibus, hyeme vero alternis, large vena secta sanguis emittebatur, unde delirium propulsatum fuit, quin etiam capitis dolor mitigabatur, & vertigo ablata fuit. Ultimo vitæ semestri venæ sectionem omisit: ob nimiam sanguinis profusionem vividus faciei color perit & cachectica evasit, postea iterum concepit fortūque vivum peperit, quem ad terminum suum usque fatalem lachavit. Ab illo tempore quo ab Apoplexia prostrata fuit, totum dextrum latus debilius persistit, adeo ut inter incedendum imbecillitas quædam observaretur, insuper manu dextra corpora crassa & ponderosa facile attripuit sitmiterque tenuit, at gracilia & levia apprehendit quidem, verum invitæ & inficæ statim iterum elabebantur: Die 21. Febr. 1664. noctu in lecto horrore concutiebatur, subsequente æstu cum dolore lateris dextri punctorio: Pleuritidem neglexit: vinum bibit, &c. die 26. Febr. mortua est.

Die sequenti cadaver secui: Remota cranii olla, dura meninx tumida & elata erat, ac si fibræ distenderetur, ejusque arteriæ sanguine turgidæ: Sublata dura meningē, tenuis ita omnes anfractus colligavit & æquavit, ut tota cerebri superficies levis & æqualis apparuerit, crassioribus debito fuerit: Ista faucia, ex omnibus anfractibus tam dextri quam sinistri lateris copose serium emanavit: vasa sanguifera tenuis meningis ubique ma'ora & sanguine pleniora videbantur: In utroque ventriculo laterali serum subcrevntum abundè stagnavit: Simile quoque serum in occipite circa medullam oblongatam invenimus, quin etiam antrosum inclinato capite, ex foramine sacro juxta medullam, ad unciam hujus feri effluxit: Utriusque ventriculi lateralis superficies lutea penitus & quasi rubigine obducta videbatur, obducta enim erat mucō croceo, illi simili qui circa aquas ferratas cōspicitur, & lapidū & terræ superficiem incrustare solet: Eodem quoque Plexus choroideus infectus erat: pertingebat rubigo ista quoque ad tertium ventriculum, Quartus prorsus mundus erat: In dextro plexu choroideo plures hydatides, quarum quædam pisio majores invenimus: In sinistro itidem plures aderant, quarum una nuce avellana major, angulosa instar humoris crystallini

crystallini perspicua, solidaque à nobis visa fuit : Cerebellum valde flaccidum erat : medulla spinalis multo naturali gracilior nobis apparebat : sterno remoto, &c. (*qualis Pulmonum fuerit constitutio vide l. 2. Tit. de Lateris dolore*) In ventriculis cordis invenimus corpora pituitosa, quæ ramos in pulmonum vasa spargebant : Ventriculus & intestina flatibus admodum distenta erant, ut gravidam putarent, hepar pallidum & renes flaccidi erant : Lien naturalis visus : In utero nihil p.n. apparuit. Mammæ adhuc lacte niveo abundabant. *Wesfer. Dissert. de Apopl. p. 410.*

S C H O L I A.

S *Evilissimus Capitis dolor, &c.* Recurre ad Tit. de causis horum dolorum.

Aque salta, &c. J Vera Apoplexia correpta fuit mente Maijō 1661. nam humi le dens, post oculoꝝ motum convulsivum, *Aque salta*, omnes sensus & motum animale: respiratione & deglutiitione exceptis, amisit, & trunci instar in lectum reposita, immobilis jacuit : Causam hujus insultus non possum conseruationem quandam reputare, quamvis ob seueriorem doloris humi sedens gravia malum sibi imminere prædixit, & miserando vultu suos intra fœrit, nam apoplectica vere ad diem tertium permanse, artuum dextri lateris impotentia toto mense Mayo perduravit, & postea totu reliquo vice tempore, se ad quantum annum imbecillitas in incellu, atque apprehensione rerum leviorum & minutionem obiecta fuit : Sanguinem extravasatum hanc fecisse omni probabilitate caret, nam vel cervice ipsam enecasset : Nec vasa distendendo illam produxit ; remisit enim ante V. S. & postea vasis longo tempore admodum turgidis, & cephalalgiam seueram cum vertigine parientibus, nullam reividiam experta est : Serum in ventriculis & sub meningē tenui conclusum, post obitum sepepium, minus erat quam ut cerebrum comprimere valisset, & revera nihil apoplectici arulise ex moris genere constitit, quo tot ob dextri pulmonis inflammationem insignem, spirituum vitalium corruptelam & animalium immutationem, in motu sublitit & veloci suffocata obiit : Verisimilius est ob vehementem capitis dolorem cataclysmum quen-

dam feri in medulloſam cerebri substantiam irruisse, non secus ac alias deotium, articuloꝝum aliarumque nervosarum partium doloribus tumores serosi sæpe ocyus superveniunt, quem promptius debilitata, ut ex vertigine constat, sensibus omnibus & motu animali sopitis, admittit ; nam principium imprimis noctu & in somno contigit, unde mane surgens calamitatem insignem, forte ex igitis quæ affari nequit, prædixit. Seram inextingua cerebri subiens apoplexiam produxisse livancia evincunt, motum enim & sensus recuperavit usque antea apoplectica & parciore cibo, quibus seum absumptum fuit, quod soli huic humoris proprium esse sepius non sine ratione *Carolus Pissus de styfo salutaris* iuculcat : quo penitus dissipato, sensus & motus magis magisque adepta est, relicta quadam imbecillitate, cum raro humor ille à peregrina militia immanis sit : Doloribus perleverantibus non cedit Apoplexia, quia in dies incrementa summe, multum lecti alioꝝum abreptum, in partu cum luctibus portio profusa, & dum infantem lactantem aliquid etiam sublatum ; denique post tot catasique venæ sectiones cephalalgia sopita, nova feri irrumpendi ansa præcisa fuit.

In plexu choroides plaris hydatides] Hydatides insigniores in plexu Choroides, nullas turbas exactas testantur auxilia, quæ illis permanentibus symptomata sustulerunt, nisi quis acurmet ignavus aquam à meningē tenui, & è ventriculis ab illis glandulis propter hoc plexus vitiū resorptam fuisse. M.

OBSERVATIO XLI.

S. Apoplexia ab aqua plurima anfractus cerebri alluente, In utroque ventriculo, præsertim dextro; cerebri mollitie & flacciditate; mucos in Glandula pituitaria, &c.

Juvenis quidam annor. circiter 24. staturæ mediocrit, macilentus, cute fusca & strigosa præditus, quantum ex vestitus semilaceri forma conijcere licuit, miles profugus, ex morbo aliquantulum convalescens (nam circa illud tempus plurimi Gallorum in Marchionatu Badenſi inferiore, febre Hungarica, Dysenteria aliisque gravibus morbis aegrotabant, in vicino colle extra urbem nostram propemodum frigore cinctus d. 14. Nov. 1673. reperi- tus, moxque in Xenodochium deportatus fuit : Statim accersitus fuit Exc. D.D.H. Scretæ deprehendit ægrum quamvis in hypocaustum calefactum delatum, & lecto plumbeo forum, toto corpore, non solum in capite & artubus, sed etiam pectore, dorso & abdomine tactu frigidissimum esse : Artus rigebant adeo ut nec brachium nec pedes flecti potuerint, brachium tamen sursum facile sollebatur : ore hiabat, verum aquarum cordialium ne guttulam quidem deglutiit : pulsus nullum invenire potuit ; nulla inflammatione, vellicatione, aut frictione excitari valuit, ut vel minimum alicujus sensus superstitis indicium præberet, oculos semper clausos tenuit ; respiravit cum stertore, In lingua maculæ rubræ videbantur ac si illam convulsus mordisset : Vespere circa 4. vivere desuit.

Die sequenti cum D.D. Scretæ cadaver perlustravi : Foris in pectore latere sinistro duo ulcera rotunda, dimidii Bazii amplitudine aliquouſque sinuosa, ultra cutim sed non ad pleuram penetrantia, pus coctum continentia invenimus : In dextro latere circa costam tertiam, cutis palmi latitudine sagillata erat : omnia sub cute ad pleuram usque sanguine suffusa visa sunt

sunt, sive à percussione sive à casu contigerit: Abdomine aperto Omentum pertenuè & macilentum occurrit: Venterculus & intestina, præcipue tenuia, flatibus & fecibus liquidis subflavis plena erant, ipsædem fecibus quoque colon infarctum erat: Foris, à colo imprimis, papillæ plurimæ, aqua limpida turgidæ pendebant: Hepar fuit rubicundum, Vesica biliaria tumida & quasi inflata, Pancreas album: Lien lividus major debito, nam duos palmos longus, palmo latior, crassitie dimidii palmi erat, aliquotque in locis quasi fissuris præditus, sed non perviis: Renes consistentia & colore naturales, sed omni pinguedine destituti erant: Ubi vasa emulgentia renes subeunt, loco pinguedinis humor aqueus subflavus, in gelatinam concretus sinus impleverat: Vesica distendebatur ab urinæ retentæ copia. In Pectore Pulmones dextro & sinistro lateri per fibras oblongas hinc inde laxæ, non toti nec firmiter accreverant: In dextro latere Pulmonis lobus inferior debito rubicundior & paulo durior fuerat, ita tamen ut inflammationem nec magnam nec pridem enatam credere potuerimus: Omnes Pulmonum lobi aëre pleni & turgidi erant: Cordis dexter & sinister ventriculus, venæ item cavæ & arteriæ aortæ rami, superiores & inferiores, sanguinem profusus fluidum, nevisquam fibrosum continebant & effundebant, adeo ut ne minimus grumulus à nobis inveniretur: Extravasatus in pectoris cavum, diu post effusionem grumescibat, ita tamen ut maxima pars fluida persisterit. Cranii superiore parte dempta, antèrè sub fronte dura mater admodum rugosa apparuit, ac si ibi à flatu vel aqua distenta fuisset: Prope cristam galli, incisa dura matre in sinistro latere, protinus multum aquæ promanavit, quod eidem incisione in dextro latere facta contigit. Dura mater à crista galli utrinque juxta finem tertium ad sinus laterales incisa, vidimus in sinistro latere sub osse syncipitis versus tempus, duram matrem tenui meningi, fere dimidii dactyli amplitudine præter naturam intermedii sibi validissimè firmiter accretam fuisse: sub pia matre, intra cerebri anfractus, aquæ plurimum undique fluctuabat: Reflexo corpore falciformi, diducto cerebro, vidimus insignem arteriam super corpore calloso incedentem, sanguine vacuum: & quamvis arteriæ & venæ sinum tertium adcentes sanguine plenæ essent, nihilominus tamen sinus tertius & laterales non usque adeo sanguine implebantur. Cerebro cum cerebello cranio exempto, separata dura meninge circa fessam equinam, ostendi utrinque arteriam carotidem tortuosam esse, prout supra p. 38. depingitur: nevisquam vero ut in brutis in plexum, seu tete mirabile discesci, quod aliis quoque vicibus feci: nec hæcenus altam arteriæ faciem in his locis inveni: Ausimque dicere talem semper apud homines repercam iri, ut quoque tandem aliquando fatebuntur Retis mirabilis patroni, si modo ipsi quoque rei periculum facient. Inversa cerebri & cerebelli mole, vidimus quoque arteriarum veritèrallum & carotidum conjugium, ramisque varios hinc inde per universam machinam dispersas, cujus distributionis historia plenior supra p. 99. extat. In dextro ventriculo multum aquæ limpide continebatur, minus in sinistro: multum quoque aquæ ex fistula spinalis medullæ sublaro trunco emanavit, in glandula pituitaria, duplo majore solito, sinum inveni plenum muco, qui in gelatinam subflavam pellucidam concreverat: Meningem tenuem citra cerebri lacerationem longe latèque avellere potui, evulsis simul innumeris fibrillis arteriosis substantiæ cerebri immeris, qua sublata in superficie denudati cerebri, rimulæ innumere conspectæ fuerunt, à quibus, presso levicule cerebro, sanguis exsudabat: Id aliis vicibus præstare potui, quoties madidius cerebrum debito fuit, aut si per biddum aut triduum cerebrum frigido & humido aëri exposui. Cerebri pars cineritia flaccidior medullosa, utraque flaccidior debito, quin etiam cerebellum mollius quam in aliis observaveram. Non tamen cerebri substantia tam flaccida erat ut in se conciderit ac subsiderit, aut pulacea evaserit, quamvis undique aquæ immerfa fuerit, nam etiam extra calvariam exemplum cum cerebello figuram suam retinuit, etiam sublata tenui meningi in locis plurimis: adeo ut spectatoribus cætera cerebri & cerebelli curiosè demonstrare potuerim: ut taceam imprimis cerebrum intra cranium, corpus falciforme fibrisque & ramulos arteriosos, tum ab ipso tum alibi à dura matre profectos, suspensum tenuisse. Intestinis à foridibus mundatis, in medio Sejuno invenimus tumorem juglande majorem, inter intestini tunicam externam & internam conclusum, proprio folliculo circumdaturum, continens corpus mire fibris & vasis sanguiferis intertextum. In principio Sejuni reperimus quoque valvulam seu circulum membraneum, coli valvulæ similem, ascensum impediens. In recto plurimos serobiculos superficiarios, dimidiati pisi capaces vidimus, ac si non ita pridem dysenteriam passus fuisset, quæ tunc militibus epidemica fuit: Certe diarrhoeæ vestigia clinici in indumentis invenerunt, cujus quoque indices fuerunt fæces intestina replentes: Vesiculæ seminales continebant humorem copiosum in

gelatinam concretum: utraque ductu insigni & proprio prædita, qui ambo quoque osculo proprio ad latus monticuli in urethram capaciorem hiabant.

S C H O L I A.

Affectus qui militem ætium è medio sustulit, Apoplexia fuit, nam sensibus omnibus & motu, ipsaque deglutiendi facultate abolitis, respiravit adhuc cum sterore, à decima antimeridiana ad quartam vesperinam: Tetanus comes non incommode diceretur, omnibus artubus rigidis existentibus, nisi brachium atroliti potuisset atque os hiallet: Convulsivi tamen quidpiam ante apoplecticam invasionem passum fuisse, macule in lingua, morbus proculdubio illius, probabile sciunt. Syncope vero neviticam appellaverim, quævis totus habitus perfrigerit, nullique pulsus indicium tactu inveniri poterit, respiravit enim cum sterore flex integris horis sed ultimam vitæ momentum usque: Fritus præcipuum huius Apoplexie causam fuisse existimo, nam intensissimum tunc erat, præcipue in colle edito, nivosus obiecto & libere ventris exposito: dum enim ex itinere, licet brevi, & morbis prægressus bellus quieti in rempessiva indulsit, tandem nemine expergefaciens, somno, æterni paratio, obdutus fuit, higus languinem, cerebrû & spiritus animales ita cõgelavit, ut nec spiritum animalium materia suppeditaretur, nec si forte aliquid sanguinis arteriosi accederet, in cerebro & cerebro percolaretur, nec si spiritus confecti adhuc fuissent, nervi ad loca debita detulisset: Frequenter id viatoribus Alpes Helveticas tempore hyberno transcurrentibus, etiam robustissimis & ianissimis evenit, nisi soporem, plurimis per loca nivosa molestissimum, omni nixu excutiant: Ad congelationem, caloris & spirituum extinctionem à frigore faciendam plurimum fecerunt morbi prægressi. Ad promptiorem congelationem, & spirituum ac calori, extinctionem intra cranium plurimum quoque conculit aqua intra meningas, sub tenai meninge, in ventriculis & fistula sacra redundans, nam quoniam immobilis itagnavit, facillius vim frigoris recepit, ac efficacius sanguinis & spiritibus impiecit: Foras tam copiosa aqua intra cranium collecta fuit, ob febrem continuam & cephalalgiam, quam proculdubio sevam diu sustinuit, ob tenuis meningis concretione cum dura matre, dimidii daleti amplitudine sub sinistro fincipite. Propter aquæ abundantiam sub tenai meninge detentam, illam haud difficulter longe latere à cerebro abstrahere potui cum fibrilla arteriosa, remanentibus simul, ex quibus pressio levicula cerebro sanguinis guttulæ prodibant. Cerebrum flaccidius detesta meninge, non pulsus fluidioris instar distinxit, quamvis forsan diu irrogatum & veluti inundatum, ab aqua & à frigore quasi congelatum fuerit, figuram enim suam integre servavit: Alias cerebrum per horum aliquos clausum aliarum glandularum more, firmius & durius evadit: Glandula pituitaria duplo maior naturali: in medio sinu prædita, qui mox subdavo, gelatine simili plenus erat, ad aquæ cumulationem symbolum contulit, dum nec serum intra cranium itagnans allexit, nec aliorum excrev, ob conformationem vitiosam.

Ex morbo convalescens: Affectus graves (qui ad congelationem & caloris ac spirituum extinctionem à frigore faciendam plurimum fecerunt) non ita pridem luvem hunc perpassum fuisse non obfcare patuit: *Færem* continuam præcedunt abientibus phibitus signis, habitus valde excoctus, cutis itri-

goia, Omentum & testes omni pinguedine privata: Renum situs, ubi vasa emulgentia intertunt, gelatina loco pinguedinis occupata: Duo lumbi alia, ampliora quam posthumunculos relinquuntur, quæ non anihaciis reliquias dixerim, cum pus laudabile & coctum continerint, fustan ab inflammatione febris comite vel sequela, hæc supetant. Dubium an *Pleuritiam* fuerit necne? Sogillatio in utroque latere non est signum pleuritidis, cum foris cutis aerotubescens fuerit, quod alias non observatur: potius casus alicuius effectus, quia in valle, per quam huc proficiscibatur, via proclivis ad calum ob græu copiam, apud juvenem gressu minus firmo utentem: In dextro latere pulmonis lobus inferior rubicandior duriculus, aliquid inflammationis adscribere velimus. Intercepit subito sanguinis circulationi, circa nimum vitæ anticulum, in pulmibus hunc ruborem & apparentem inflammationem adscribere velimus. *Dysenteria* perpetua velligia in intestino recto, erant scrobiculi dimidii pili capaces, & diarrhoea biliosa superflua.

Cordis ventriculi sanguinem fluidum, etc.] Sanguinem in cordis ventriculis & valis majoribus fluidum, nec post obitum gummescerem, in cadaveribus fibri continua defunctorum aliquoties, & nonnunquam vena sectione crassum, fibre malignæ agrotantibus observavi: an ob febrem continuam talem consensitiam apud luvem hunc adeptus sit, non vero frigus spiritus & calorem exiguus illam effecerit: dubium est: Febri enim continua perseverante, in ter pedes perficere nequivisset, etiam brevis, quia potius antequam Disiorem nostram attingeret petierit in via.

Neutquam in Rete mirabile diffusi.] Retis mirabilia sub dura meninge, juxta luvem ephippii, ubi in plethiqæ quædum pedibus situm est, in Homine hoc Gallo ne minimam umbram inveni: ibidem, loco hujus retis, spectatosius arteriam infusam, prout supra pag. 38. depingunt, ostendit, eamque solam citra accessum illius tam arteriæ vena bialis. Supra datam meningem, in basis cerebri parte posteriore, demonstravi canalem ex arteriis carotidibus & vertebralibus unitis resultantem, de quo supra pag. 111. qui tamen neutquam Rete mirabile est, quale à Galeo lib. 9. de usu part. 4. describitur, de quo supra pag. 116. videatur, multoque minus Retis nomen meretur, quam arteriarum ramuli qui intra anfractus cerebri feruntur. Proinde Reti mirabili in homine nullum unquam usum, seu non Eni tribui: In Quadrupedibus quidem, quoniam panno capite incedunt, putavi sanguinem aliquorum remotari ne impetuose in cerebrum mar, quod tamen non universale esse Equi monstrant, quos Reti mirabilis carere Exc. D. Willis in præclara cerebri Anatome scribit.

In medio Jeyuno intertenuum Tumorem.] Tumor inter duas Jejuni intestini tunicas, nucis juglandis magnitudine, conclusus, proprio folliculo per ductum, & continens corpus ex fibris & valis sanguiferis contextum, non impedit chyli & fecum protrusionem, ut ex contentis illi & crasso intestinum patuit.

Vesica distendebatur ab urina venena copia.] Vesica ob paralytism unam propellere nequit, nullum enim impedimentum circa ipsius colum reperiebatur, cui urine retentioni imputari poterit.

OBSERV.

OBSERVATIO XLII.

§. *Apoplexia à feri & pituita copia in toto cerebro & ventriculis.*

IN Anatomia Serenissimi Principis Apoplectici I. H. L. cui præfuit D. Buncceus 4. April. 1652. Cerebrum magnum & grande, sero & pituita plusquam refertum repertum est, maxime in ventriculis. I. D. *Horstii Observ. Anat. iij.*

OBSERVATIO XLIII.

§. *Apoplexia ab aqua limpidâ cerebri plicis implente & totam compagem inundante.*

DOMINA Ill. diu affectibus spasmodicis obnoxia, post capitis dolorem & paroxysmum convulsivum in apoplexiam lethalem incidit. Mortuæ vasa meningum & cerebri sanguine plena apparebant: Omnes cerebri cavitates colluvies serosa impleverat. *Vide Tit. de capitis Dolo.*

OBSERVATIO XLIV.

§. *Apoplexia levis à seroso humore in cerebro stagnante.*

Vir Ill. Febre tertianaria prehensus: quinto die oblivio, desipientia, aphonia, sensus sepultas, motus abolitus sequuntur. Reperta aqua plurima in toto capite stagnans, &c. *Vide Tit. de Febribus. lib. 4.*

OBSERVATIO XLV.

§. *Apoplexia à feri ingenti copia inter cranium & duram meningem, In salce & illius reduplicatione, omnibusque cranii cavitatibus.*

ANNO 1667. Anicii Vallesiorum, in Gallia Narbonensi, Sequutus Patres Regios capitales, Vocatus fuit cum Dom. D. Meyronnetto & Coralle Medicis, Magistris Nicolao, & Vicario, primariis Regis Chirurgis, & Odonnetto, Chirurgorum Decano, aditurus Matronæ Nobili, Dominæ de Fernois, proxima consanguinitate conjunctæ Generosissimo Vicecomiti à Polignac, urbis Gubernatori, Apoplexia tactæ: Præsidia ex arte à dictis Medicis fuisse præscripta & administrata, tam Pharmaceutica quam Chirurgica, scilicet Venæ sectio utriusque brachii, Cuneatæ scarificatæ, Sinapismi, Vesicatoria, Erithina, totius corporis succussiones, cauterium actuale summo capiti, ad normam H. Fabricii ab Aquapendente; quorum remedium ea fuit efficacia ut intra xv. horarum spatium sensus perditum fuerint restituti, tam interni quam externi, superstiti tamen Paralyssi brachii sinistri: Elapsis autem 7. diebus de novo ingruit affectus, quem mox statim excepit, nec animadvertentibus qui ægræ assidebant: Tenetæ autem constitutionis fuerat, lubricæ valetudinis, macilentæ, fluxum hæmorrhoidalem passa ab anno ætatis xviii. à quo tempore vixit obnoxia *hemiplegia*, totam capitis partem anticam & sinistram occupandi, adeo molestæ ut plerumque decumbere cogereetur & ab omni consortio abstinere: fatigabat dolor plerumque semel in hebdomada: usu purgantium pilularum xv. interdum diu inducias concedebat dolor, quandoque mensis integri: quo remittente copiosas lacrymas fundebat oculus lateris affecti, quod illi certum erat indicium affectus ad declinationem properantis. Interdum naris è directo multo stillabat sero. Si id accidere per menses integros feriebatur dolor; cujusmodi vacuationem laxissima ferebat. Febris præterea quartana frequenter eam prebendebat, præsertim hyeme. Vultus alias non omnino erat decolor *μαυροσφαιμε*. Naribus sæpe siccis sed sputatrix, multasque emittens urinas. Appetitu pollebat vegeto, cibum sat copioso diluens potu, vino scilicet sed temperato: In dextra non delinquebat quanquam saporatis & aromaticis gauderet, ut & fructibus omnigenis; à dulcibus abhorrebat & saccharo conditis, nisi acidiuscula essent: Musica organica illi erat in deliciis, cuius erat petitißima, præsertim citharæ & monochordonis. In actionibus omnibus moderata: Menses illi per sanitatem modice fluebant, qui anno 47. desierunt: Obiit autem vidua, annos nata lvi.

Rogantibus confanguineis, & Doctoribus Medicis nominatis, Capitis apertio à me instituta fuit, præsentibus Chirurgis, quòd, rum recidivæ, tum mortis causa innotesceret, Adstant Viri Illustres Domini Caralanus à Porta & Pugetius, Regis Consilarii magnæ Cameræ Parlamenti Tolosani? & alii, Inter duram matrem & cranium, Item in hujus cavitatibus, tam anterioribus quam posterioribus: Tum & in falce ac reduplicacione duræ matris (abscessis prius fibris, quarum interventu futuris adalligatur.) Inventa aquæ flavescens, medioeriter salitæ, Pinta una, seu libræ medicinales circiter quinque: Actu mæ. mensis Januarii anno 1667.

Ex communicatione D. Bayly Chirurgi Geneva peritisf.

OBSERVATIO XLVI.

Apoplexia à Sero humore cerebri anfractus alluente & ventriculos replente.

Virgo post cephalæam immanem, intra triduum apoplectica interibat: Capite aperto *latex flavus* cerebri anfractus profundiores, ejusque cavitatem anteriorem, seu ventriculos inundabat. *Th. willis Anat. cerebri cap. xii.*

S C H O L I A.

L*atex flavus*] Ab omni humore induci posse Apoplexiam ostendit *Walshus* comment. in hystoriam Androthali, 7. *epulum* cui lingua sicca erat, plerumque admodum amara, aliquando cordis dolore afflictebatur, tandem post decubium duorum aut trium dierum mortuus est: unde colligit humorem qui

occupare cepit & obstruere cerebrum, biliosum aut acrabiliatum fuisse. An bilis apoplexiam parere possit, videbitur infra cephalæa immanis virginem prædictam affligens, cui successe apoplexia, humorem acerrima vi prædictam supponit.

OBSERVATIO XLVII.

Apoplexia à Sero inter utramque meningem; Inter piam ac cerebrum & cerebellum; Madore substantiæ cerebri, Repletionem ventriculorum ab eodem sero, & effluxum illius in sacramissulam, orta.

Iacob Reutinger Viterdinga, ditionis Per-illustris & Generosi D. BARONIS HORN-STEINII oriundus, quinquaginta circiter annos habens, temperie totius ad calidam & siccam vergens, coloris fusci: habitu corporis urcunq; earnosus erat, capilli nigri & crispi, rari, dimidiunq; caput, juniori adhuc, calvities turpabat: ad iram vehementiorem proclivis. Pauper victum & amictum duris laboribus, præcipue viticultura acquisivit. Multum ipsi usum cum Baccho fuisse & non raro sicca labore pectora servido maduisse mero, Gurtarosea, quæ faciem fœdabat, fidem fecit. Quibus morbis toto vitæ tempore afflictus fuerit, ut de homine ignoto impossibile, ita hoc loco id referre supervacuum existimo. Quantum mihi constat, ab aliquot mensibus sæva cardialgia excruciabatur, ob quam & mea opera usus est, quæ purgantibus & stomachum roborantibus cessavit, brevi ramen ob pravam victus rationem, fame & pauperie etiam noxia imperante, rediit: hinc ope mea non contentus etiam carnificem consuluit, (nam & hoc genus hominum his in oris medicinam facere consuevit, & nulla non mortalium *expurgamenta* sacra hæc invadere audent) & haud obscure intelligere potui, illum nec à benedictionibus, ut vulgo loquuntur, rectius ab incantamentis, abstinuisse, ad quæ sæx plebis, ceu ad sacram anchoram, non raro confugere soler, adeo ut nefanda impietas vix satis dissuaderi possit. Aliquot septimanis ante obitum crudelissima cephalalgia totum caput, frontem præcipue & occiput afflixit, à qua ipsi nec mora nec requies; sustuldivit omnia medicamenta: Extrinsicus quædam muliercularum suasu applicita fuerunt. Præ dolore quandoque amens erat, ut quicquid vel diceret vel faceret non raro nesciret. Tribus septimanis ante mortem cæcus omnino evasit, nullo vitio extrinsicus in utroq; oculo apparente, vera scil. gutta serena excæcatus. Doloris quidem savitia in capite aliquantum runc temporis remisit, at remansit quædam anxietas, ob quam corpus hinc inde jactitabat, nec, procul dubio mente æger, causam hujus volutarionis per lectum revelare valuit. Medicamenta plurima adhibita, sed serò, ideoque sine successu. Quatuordecim diebus ante fatalem diem, lectum permingere cepit; paucis diebus post hanc calamitatem nova excepit, Paralysis sc. pedis dextri, quam secuta paulo post & sinistri. Quatriduo ante obitum Apoplexia fori ractus fuit, jacuit sine omni sensu & motu animali, nulloque ingenuo excitari potuit. Toris his ultimis diebus largiter sudavit: per furegrum diem cum stertore

stertore respiravit. Quamdiu decubuit *amplius* erat 11. Febr. & 11. à plenilunio anni 1656. viram cum morte commuravit. Altero die cranium aperui, saucia dura meninge profluxit serum pallidum spicei coloris, cum impetu quodam, non secus ac mediana vena brachii secta sanguis erumpit, & quidem tanta copia, ut cyathi aliquot unciarum capaces eo impleri potuissent. Hoc serum maxima ex parte colligebatur in spatio, quod inter duram & piam matrem est, quod mihi amplius & capacius esse videbatur quam naturaliter existere solet, sero præ nimia copia duram matrem undique, ubi nullum obstaculum inhibebat, expandente, ac cerebrum cerebellumque deprimente. Quin etiam feri plurimum intra piam matrem ac cerebrum & cerebellum continebatur, unde tota cerebri & cerebelli superficies, tam gyri quam, divulsis gyris, anfractibus cerebri, quæquævis obfisti videbantur, qua cultello læsâ serum exstillavit sincerum, simile fere illi quod inter duram & piam matrem cumulatam fuit. Imo ipsam substantiam cerebri & cerebelli plurimum feri imbibisse, clarissime cognoscere potui, nam summo opere utrumque flaccidum & molle erat, ut instat fere pulvis, etiam leviculo artatu dissolverentur, ita tamen, ut non disfluere, prout vetulæ apud Cl. Platerum contigit, cui pulvis forma cerebrum emanavit: nam citra artatum, & figuram & terminos antiquos cerebrum & cerebellum, ablata quoque pia matre, aliquo modo servabant. Tota cerebri externa facies pallida, vasaque sanguinea tantum non omnia exsanguia erant: ablata portione cerebri, raræ sanguineæ maculæ pullulabant. In omnibus etiam ventriculis serum redundavit; mucum nullum vidi orificium, seu canalem è tertio in quartum ventriculum patulum, obturantem: Verum presso cerebello, plurimum feri in tertium ventriculum regurgitavit, Plexus Choroideus totus erat luridus & sanguine fere privatus, quamplurimis nodulis varicosis subduriusculis præditus. Abscissa medulla oblongata prope orificium magnum, elevatisque cerebro & cerebello, nonnulli declivi posito capite, plurimum feri ex ostio illo profluit, ut non dubitavi, rotam quoque fistulam sacram eo repletam fuisse: Adeo ut non crederem, morbum hunc Hydrocephalum cerebri, & *id est* quandam speciem appellitare. In reliquorum viscerum conditionem lubenter quoque inquisivissem, sed nec prece nec pretio quicquam à defuncti uxore & affinibus impetrare valui, ac potestatem mihi caput aperiendi factam fuisse, pro magno beneficio reputare debui; Ex superstitione enim quadam, plus quam ethnica, plurimi nostratum opinantur cadavera humana injuriâ quadam affici, si studio alios agros juvandi, fecerunt, brevi verum esca alias futura.

S C H O L I A.

SI ullus humorum in corpore nostre poros medullæ substantiæ, in cerebro & cerebello, subito oppila poterit, serum id præ reliquis præstat: Est enim peculiarem cum cerebro familiaritatem habere videatur, cò quod tenuioris pilulæ, quæ serum est, metropolis dicatur, atque in embryone cerebrum instat feri fluidum conspicitur, pueritque *Lympha Bartholiniana* ex spiritu animali coagulato generari, quin etiam frequenter, si non perpetuò, intra ventriculos aliqua feri portio repetitur, quandoque magno impetu in catarrhis exeat, ac denique nervosis partibus lætis, quasi suppetias lararum affluat. Nihilominus tamen si copia aut loco peccet, nullam emolumentum affert, quin potius ejus familiaritatem destruit, atque in actionibus suis perturbat, & non tardè eas penitus abolere valet: Fluxus autem horum pororum, si non omnes, Serum per ceteris hominibus obstruere potest, quoniam individui sanguinis comes est, ac cum eo per universum cerebrum intra capillares arterias fertur, ac tenax est & visciditatis fore experta, ut minime foramina transire ac angustissimis meatus se insinuare possit, non secus ac aqua spongularum cavernulas, aut spongulis densiores corpora pervadit. præterea non difficulter à sanguine segregatur, ut non solum urina, lacrymæ ac sudores testantur, sed etiam morbi quidam, ut catarrhi, diarrhoea serosa, atreidis aliique comprobant: videtur de his aureus liber *Car. Pissini* de Serosâ colluvie, ubi constat purum serum subito saepe à sanguine secretum, mulierum

malorum causam existere. Serum hoc sive sanguini intra arterias adhuc confusum sit, sive jam extra illas pulsum sit, mobile admodum est, impetuque pulsoris libenter cedit, ut profunde intra cerebri poros adigi possit. Si itaque serum intra vasa effervescat, ac ab illo se segregetur, in cerebelli ac cerebri substantiam quasquævis extrudi poterit, ubi tum spiritus animales corrumpet, tum vias ac meatus eorum obscurabit: & quia arteriæ omnes eorum particulas subeunt, nulla à feri ebullentis ac tumultuantis irrigatione immans eiat, unde omnes animales quoque actiones, nec sensibus internis exceptis, peribunt; acque hanc ob causam felicius omnium sensuum abolorum ratio reddi potest, quam si solum basin coarctatam aut obstruatam in apop. dicamus, nec nobis ad liberiores spirituum motum prohiberi recurrendum est. Inde quoque manifestum evadit quomodo, sensibus externis & motu separatis, sepe intentionum sensuum imbecillitas aliqua remaneat: utcumque enim de feri natura sit facile discuti posse, quia tamen profundis cerebri partibus se quoque immergit, quotum medicamentorum virtus vi penetrare potest, aut quia non raro ipsi aliquid mucosi, ut Cl. Pissini monet, miscetur, non exigua ejus portio inmotâ perstitit, & à reliquis istis facile labes aliqua sensibus aspergetur, quæ ægre emendabitur: Eadem reliquæ occasionem recidivæ, frequenter apoplecticis quibusdam eventum præbent: Non autem exultandum est ob capillarum

arteriarum, medullarum substantiam transeuntem, existantem, non tantum feri copiam in illam effusum esse, quae ad tot actiones abolendas sufficeret, perpetuo enim sanguinis motu jugiter novum serum affluit, quod cum sanguini consensum sit, ac ad secretionem promptum & facile, praegressum absque mora sequetur, donec ad quantitatem illam pervenerit, quae ad effectum hunc producendum requiritur: Non equidem negaverim huic feri imbrem, aliquando largiorem, quandoque pauciores, saepeque illam plures, non raro etiam pauciores medullae substantiae partes perplere, unde etiam fortior vel debilior apoplex. ensitiae, nonnunquam ob feri ignaviam & mediocremruptionem le tantum vel hunc vel imminuentis indicia ostentant: Consuli Chæ. Symp. apud B. Raskinam dissent. 9. l. c. p. 25. brachii finituli paralysis & loquelæ vitium, capitis gravitas, indormitenti obigit, parva procul dubio feri quantitate poros medullae occupare: Idem pag. 38. ibi. his in mobilibus egrotis observavit sensum tantum, manente motu, abditos: Non raro à primo insultu tantum lateris alterutrum praelis, cum levi sensuum internorum & loquelæ vitio oblectat: Si copia feri iterum adhuc minor sit, sopores praeter naturam producat. Verum enimvero nemo hominum effi, cuiusque demum temperamenti & aetatis sit, cujus malle sanguinea non quoque serum permeatur, & saepe satis copiosum, quod toto vitæ cursu frequenter effervescit, ac fermentarum quasi & ebullientis intra vasa non raro à sanguine secessat, atque vel manifeste & sensibilibus excretatur, vel in partem aliquam decumbens, illam tumidam reddit & dolore afficit: Rarius autem apoplexiam gignit, imprimis in senilibus ac pueris, quibus apoplexia est coevo rariore albo: Igitur haud immerito de hujus affectus à sero generantur illi dubitabit: Quoniam autem omnis actio ab agente fit in patiente disposito, forsitan hoc Philisophorum animam in anaximandro simplo, dubium hoc expugnati, oterit: Est enim saepe in corporibus coluvies humorum redundat, non semper tamen morbos producit: id enim apud quosdam temperamenti robur, ac potius quaedam ea virtus est, ut saepe validissimas morborum causas eludat: Itaque si ferum dicta ratione apoplexiam producatum est, praesupponenda est praevia cerebri & cerebelli dispositio atque imbecillitas quidam, ob quam serum intruens promptius recipitur, validiusque & efficacius actiones animales omnes prostermit & abolet, quamvis aliquando serum fermentantem vis tanta sit, ut citra talem dispositionem sola id praestare valeat.

Si quid in re obicuta definire licet, *Dispositum* hunc consistere existimo in porum illorum, qui ex arteriarum capillaribus in medullarum substantiam hiant, spiritibusque vitalibus transsum largiuntur, nimis laxitate, ob quam non solum spirituosae sanguinis partes, sed & tenuiores feri portiones transsudere possunt: & in praevia repletione meatuum ac cavernarum per quas spiritus animales moventur, sensum à serosis humiditatibus introducta, propter quam, si feri nimbus ingruat, spiritus animales corumpuntur, eorumque viae penitus obstruuntur, subsequente actionum illarum, quarum instrumenta sunt, ablatione, non secus ac loca alia terrena, ab imbre permeantur: Dispositio hanc originem suam ab illis, quae caput vulgo repleti dicuntur, ducere auctor non: quorum etiam incuncta diffusionem excrementorum tercia confectionis impeditur, illa profundius implenda & incrassantia, ut de poros ac meatus consuevit: His si hunc ditario jure, & à viarum

modis aliquid accedat, eo citius dispositiones illas parabuntur: sicut etiam apud illos fieri solet quibus caput natura debilius est, & vel à fragrantiore odoramento laetum, ut cerebrumque impleti sentiant, quod calidum & humidum cerebrum habentibus evenire solet &c.

His expeditis, haud difficile intelligitur quomodo brem non omnes qui sero abundant, aut quibus admodum intra vasa sanguifera summiuntur, apoplexia obstruunt, sed solum illi in quibus medulla substantia, vel ob vitæ errores, vel hereditariam infirmitatem, promptius & largius serum à massa sanguinea, mediante quadam fermentatione secegitum, recipit ac sibi obstruendum inferri non renititur. Serum ergo, rebus sic cum hominis valetudine constituit, apoplexiam, si redundans in vasis sanguiferis ebullit & fermentescit, efficit: celerissime enim cum sanguine universo movetur, & copiose brevi tempore in partem ad receptionem dispositionem illam, nomenque medullae corporis angulos pervadere potest, ut minus non sit etiam principes actiones aboleri &c.

Recte vero concludit Car. Pilo, praeter reliquos humoribus serum hujus apoplexiae causam existeret, Neque enim viscidum, lenum & crassum humorem detegit, excusit & in principium nervi um depelli subito potest, neque humorem talem cavo nervorum, sentum fallens, celeriter se intinuat, neque in nervi tractum, penitus inquam resolvit: (quod tamen in hac paralyti factum, non raro diem, aliquando mensium spacio, observatum fuerit) Cùm enim id caloris beneficio fiat, potius humores glutinosos induratum, prout in calculorum generatione & crustarum naturam productionem cernitur, quam dissipationem. Non minus verè asserit certum hanc apoplexiam ab obstruptione, quam ab compensione aucti: nam compensatio causa non ita celeriter simul & semel omnes actiones abolet, nec tam cito materiam omnis expelli possit, aut hemiplegiam efficit: quò enim radice serum fornicetur cerebro & cerebelli incumbens, locum suum deiecit, ac tantum dimidiat medullae infusare possit: quid serum ad alterutrum lateris medullae adigere, nervisque quibusdam potius quam omnibus impingere valeat?

Non parum autem in eo falli videtur quod putat apoplexiam fieri impletis à sero ventriculis: hemiplegiam verò subsequi ejus decubitus in nervosum principium: vel enim soli hydrocephali illius opinionem falsitatis arguere possent: Praeterea non video qua ratione serum è ventriculis in medullam alterutrum lateris, potius quam ad utrumque deponatur, vel enim pondere eo ruit, vel pellitur: quocumque modo id fiat, aequali impetu ad medullae subiectae partes ferretur, nullaque hemiplegia superveniret: nam humores ventriculis inclui, live pellantur, live infra gravitate moveantur, cum tres anteriores unica caritas sint, nullum in motu lesu observant, sed quo poterunt, abibunt, ab subiectam scilicet partem, ubi utriusque medullae propaggines emineant: Taceo serum potius per infundibulum, amplo focamine praedictum, elapsum, quam cecos ductus medullae celeriter introitum: Impossibilitas obstruptionis totius medullae corporis intra cranium, ac morbi causa repentinus decubitus, quae hoc in loco causatur, tribuenda sunt ignorantiae circulationis sanguinis, quam si novisset Vir Sagacissimus, monumenta haec sua illustriora reddidisset, nec haec in dubium vocasset:

Notandum porro est, apud Pilonem, hanc apoplexiam vel difficilioris solutionis esse, prout hinc-

rum

rum ferum est, vel modis permixtum: Sed & ad talem apopl. fortioiorem vel levioiorem, soluta facillio-rem vel difficillioiorem producendam quocque faciam, feri maior vel minor copia, partium obstruendarum multitudine vel raritas; cerebri robur vel imbecillitas, à paroxysmis vel nullis vel crebrioribus jam progressus indicata; quorum pertinet dispositio perniciosa, vel ad emendationem pronior &c.

Non pauca autem indicant istum *Remington* sero abundasse, quod sensum intra calvaciam collectum fuit, ob vigilas, quas *cardialis pepsis*: urgebant ob ingentem *capitis dolorem*, unde *Gastra frena* oborta est: cumulatam vero amplius, ac per occipitum occipitis juxta spinalem medullam defluens, urina involuntarium profluvium, hinc pedum paralyin, tandem fortissimam apopl. attulit subito. Et quidem serum, non solum omnes ventriculos cerebri, spatium intra meninges & subalium spinalem, per quam medulla descendit, adimplendo, sed & cerebrum ac cerebellum comprimendo apoplexiam effecisse, amplius spatium intra utramque meningem, quam naturaliter esse solet, indubie multi persuasi: Est enim tunc guttula sanguinea, ob defectum spirituum vitalium, illam generatam humore videantur, non tamen huic adscribendam arbitror, cum non penitus defecit, nam sanguis & vitalis spiritus per arteriolas pulsi intrant, ob quem aqua incumbens aliquamodo repellitur, ut aliquis adhuc influxus fieri possit: rariore autem erat, quia per aliquot dierum decursum nihil omnino alimentum assumpserat: Non negamus tamen minutissima capillamenta, superficiei perceptantia, in quibus pulvis elanguescit, à compressione non ita fuisse, quæ forte etiam raritatis guttulem aliqua causa erat: at hacum compressio tunc non est ut universam molem sanguinis influxum privare possit, cum intra profundiores anfractus majores arterie reparat, quæ sanguinem ipsi impertire possunt.

Cerebrum cerebellumque deprimitur] Non minus universalis cerebri ac cerebelli *Compressio*, quæ apopl. causa, controversa est, ac fuit obstruatio omnium meatuum spiritus animalis: Qui impossibilium judicantur, excogitantur cerebri compressionem in basi, quam ad actiones animales abolendas sufficientem putant: Verum non incisescentur *Clar. Nymmann* aliusque, qui prævident nec sensus internos nec externos omnes hac ratione petiuros, nec restitutionem salvam fore: sed primo vicium passivam, cum diaphragmatis & pectoris musculi nervos à medulla accipiant, quæ, præ aliquot nervis, cerebro & cerebellum in basi compressio, necessitudo lædunt: Itaque si *Compressio* apoplexiam factura est, necesse est ut cerebrum & cerebellum undique prematur, omnes spirituum animalium viæ coarcentur, spiritibusque omnis effluxus concludatur, cum nervorum radices quaquaversum in utroque diffundantur. Difficile autem erit tale corpus intra cranium reperire, quod cerebrum ac cerebellum eoque comprimere valeat, ut spiritibus animalibus omnis transitus idque brevi tempore denegetur: Sanguis eoque idem, siue arteria siue vena insigniore referat, tunc in habitu corporis quàm in partibus internis, celerissime magnaque copia profundius: nec ab eo interiora crania immunita sunt: verum illa plane ratione apoplexiam tabi hæmorrhagia gignit quam premendo, scilicet cerebrum & cerebellum, cum ipsius vitalibus, animalium materia: tum calore, omnium actionum *avipsa* privando: & si forte copiosius effusus compressa, non tamen pressioni in abolendis actionibus animalium primas partes tribuenda sunt, cum pereant antequam

quicquam premendo valeat: non secus ac alibi profusus, & vitales & animales actiones destruit circa aliam compressionem. *Salem* tanta copia huic affluente, ac cerebrum in fecerit, sine exemplo est, nec quæ in universo redundat hepate huic compressioni sufficeret: ut tactam bilem sinceram, semper mordacem alios effectus producantem, maxime circa meninges, partes exquisitissimo sensu præditas, collectam, quàm apoplexiam. *Pavisa* crassa, viscida, lenis, in & extra ventriculos nunquata tanta copia observata intercranialium fuit, quæ tantam molem comprimere valuisset. *Serum* ingenti copia non solum inter ventriculos, sed & in spatio, quod utramque meningem intercedit, cumulari nemo negabit, nisi in lætione observationum medicarum hospes sit, aut nunquam cadavera secuerit: Negat tamen *Nymmann* serum magna quantitate in his locis collectum comprimendo apoplexiam efficere, adducto 1°. argumento Hydrocephali, in primis autem exempli adducti à *Vesalio*, vide sup. in quo aqua abundantissime in medullis cerebri, & in puella bienni, (in qua ætate cerebrum flaccidius & mollius adbec, atque baud illibenter incumbens impulsui cedere ac coarctari potest) congesta fuit, circa alias actionum animalium lætione uti ad mortem usque 1°. Serum magna quantitate minime subito & confertim in parte aliqua vel generatur vel colligitur, sed sensim cumulat, si ex his ipsi per consueti loca denegatur, unde etiam subito & unico quasi momento premendo, omnem cerebri actionem aboleret, hominemque actorem reddere nequit, sed unam actionem post alteram perfundabit, donec tandem omnes cum vicia desinant. Insuper vix credibile est cranii cavitatem, repelli ventriculis & spatio inter meninges, plus teri admissuram, cum cerebrum & cerebellum multis modis solidiora sunt aqua, cujus impulsu potius retundent quam cedent, sero, seu corpore humido & facile mobili, vel intra vasa relicturo, vel potius retrocedit ad alibi exitum quaesituro: Denique addit illos qui in apopl. defunctis serum copiosum conperitur, non meminisse fore semper in ventriculis cerebri aquosum humiditatem reperituri in his qui apoplexiam nunquam laborant: neque animadvertisse crassiores humores alibi existentes, secus ac *Columbus*, qui in gravi apopl. demortuis aquosum humorem purissimum, sed semper glutinosum invenit. Inter ea quæ spirituum animalium vias in cerebro & cerebello comprimunt, referunt decantata *Galenus* *diabur parvum*, quod perit in *anfractu* & *anfractu* *est* *quædam* *hypocritæ*. Quid illa sit, explicat *P. Salus Diverses* c. 2. de eff. partium, illosque erroris arguit qui exposuerunt hanc: *diabur* vel inflammationem, vel erysipelas, siue meningum, siue cerebri ipsius esse, cum ab ipsis alia symptomata producantur, nec spirituum animalium effluxus prohibeatur: Ipse vero statuit illam consistere in venarum arteriarumque nimia repletionem à sanguine, cujus ratione sua confusio & confusio, ut non tantum spirituum transitus impediatur, sed & ipsi strangulentur & suffocentur, unde perfecta succedat apoplexia.

Sunt præterea alia quæ cerebrum ac cerebellum premere possunt, ut tumores frigidi, sensum intra calvaciam prognati, calcoli in cerebro & circa meninges reperi, globuli plumbi, telorum fragmina &c. Verum cum hæc non universam molem coarcent, sed portionem saltem ejus aliquam, eoque exigam, non apoplexiam efficiunt, sed aliter cerebri actiones lædunt: aut si ad hæc apoplexiam nunquam sequantur, alia longe ratione illam proculdubio quam comprimendo

do produxerunt: neque sola illa effecerunt, sed concurrentibus aliis causis, nempe, vel sanguinis profusione, vel affluxu ejus decemti impedito, vel excrementorum nimia collectione, vel alienorum humorum praesentia, vel laesionem aliquam particulæ internæ: à similibus enim vix fieri potest quin interiora lacerentur.

Atque hæc sunt quæ apud quosdam compressionem cerebri & cerebelli, seu apoplexiam causam proximam, si non impossibilem, certe difficilem reddiderunt: Et hinc quidem quod accidet, ut & *puerum crassum* viciamque, qualis quandoque emangitur, ac *Melancholicum*, nunquam illam compressionem fecisse haud invitus largior: quin etiam fateor *Sanguinem* extra vasâ copiosum intra cranium effusum, porius cerebri ac cerebellum necessariis spiritibus vitalibus privando, quam universam molem premendo ac coarctando, hoc malum frequenter afferre, cum sæpe ad largiores sanguinis in interiora profusiones, apoplexiam sublequatur, antequam ea copia ex vasâ elabatur quæ ad compressionem sufficiens foret, ut proculdubio haud obicere secunda & tertia historia comprobant.

Sed alia est ratio: observatum enim abundanter admodum illud intra cranium collectum fuisse: ipsæque vidi non solum ventriculos, sed & spatium inter utramque meningem eo repletum, ut ex histor. super. patet, quæ ad confirmationem hujus non parum faciet. Si itaque serum tanta abundantia, tum in ventriculis, tum in spatio inter utramque meningem conualeat, ut naturalis & congenita horum cavitas illud amplius capere nequeat, quin etiam cum sanguine perpetuus novusque ejus affluxus accedat, nec per solitas vias excreetur, non video quare, utcumque vasta sit cerebri & cerebelli moles, ab illo non undique comprimi possit: quotidie enim expectimur serum intra cavitatem aliquam corporis nostri concludum, ac tanto novo jugiter accedente, illam magis magisque distendi ac ad stupendam magnitudinem excrescere, & tandem non parâ mole tumpi: Quidni etiam ab incumbente, ac singulari momentis incrementa fumente feri appulsu, cerebrum & cerebellum comprimantur, atque ita coarctentur, ut spiritibus animalibus tandem omnem transitum deneger, cum cranium densum ac ossilem & cedere nescium, nulla vi expandi possit, cerebri vero ac cerebelli consistentia, multis modis musculorum ac membranarum substantia mollior sit, acque haud difficili cogita in se cogi possit.

De hydrocephalis argumentum insuperabile non est, incertis scilicet. In his intra ventriculos aquam stabulari, ac potissimum puerili ætate, historiz docent: cum autem in teneriore ætate cranii suturæ non tam arctè combinentur (accedente membranæ ejus constitutione) haud difficulter intelligitur quare minùs in illa quàm in adultiore aut provecita ætate ac senibus comprimitur cerebrum ab aqua: in hac enim suturæ non tantum æctissimè junguntur, verùm etiam non raro cranium planè coalescit, unde prius aqua priusquam cerebrum premat; ventriculos distendit, crescente illo, etiam suturæ non agere cedentes divellit, tandem etiam membranas expandit, ut caput ad hanc molem excrescere possit: hinc aqua capacius spatium habens, nec amplius angustis cranii cancellis coarctata, minùs comprimendo valet: quorum cum neutrum senibus contingere possibile sit, ob cranii densitatem ac unitatem, aqua quotidie intra cranium incrementa fumens, sibi spatium parat, ac obvia, quælibet fuit cerebrum & cerebellum, premat, atque eousq;

premendo pergit, donec coarctatis omnibus spirituum animalium viis, apoplexiam sequatur. De puerili Augustana hydroc. vide tit. de Hydroc.

Sed autem mirabilem copiam semper in cavitate aliqua corporis nostri sensim colligi falsum est: Sæpe enim, brevi etiam temporis spatio, magnam ejus quantitatem cumulari, vel soli hydroc. sublevari abunde docent: nam sive ab eroso rene, aut rupto uretere, aut majore vase lymphatico, sive ab ingurgitata avidius aqua, calefactis nimium viscibus, hanc, brevi abdomen ad insignem magnitudinem attollitur: quæ etiam sanior ratio probat, cum enim serum facile à sanguine segregetur, promptè secretum per patentia loca ex vasâ excretaur, ac ob perpetuum sanguinis motum, indelinentur novum adcretionem similem afflat, non longè tempore magna ejus copia in cavitate aliqua cumulari poterit, maxime si in massa sanguinea redundet, nec exaus patet in cavitate illa in quam affusionis primordia habent. Et posito serum intra cranium sensim cumulari, non tamen sequitur illud nunquam universam molem, exiguo temporis intervallo, comprimere ac apoplexiam inducere posse: pluries enim morbo, cum causæ pleniusque sensim conservantur, sæpe dum in corpore delincent, nullasque molestias exhibent, & non raro paucæ sui indicia præbent, antequam in actum deducantur, quod sæpe fit subito, quod Vesalii hydrocephalus ostendit: Si vero adhuc copiosius in prædictis locis serum colligatur, nec ulteriores exitus, nisi forte per ostium illud magnum in occipite, pateat; magis magisque accumulabitur, atque actionem unam post alteram proleget, nervis illis primum læsis, quos serum debiliores & ad patiendum præ cæteris adaptatos inveniri: Et postquam exitui copia redundaverit, quàm dicta spatia capere nequeverint, cerebrum ac cerebellum, longa irigatione infusioria ac stercidiosa redditi, aliquando subito coarctantur, ac ab incumbente reno comprimuntur: unde spiritibus animalibus omni via ad exitum præclusa, restantibus in medulla suffocati, & forte vitalibus aditu negato, ob capillarum arteriarum superficiei prepturium coarctationem, consilium omnes actiones animales abolentur, quod eo facilis sit, quia pleræque actiones jam tubæ sunt.

In hac autem commentum est cranii cavitatem interiore non plus feri admissuram, quam ventriculi & spatium intra meningem capiant: Ecce enim cerebrum & cerebellum aqua solidiora sine, quia tamen impetu & pulsu affertur, cedere coguntur, non secus ac in macrocosmo torrentem nullis obitacula remorant: Et quantus feri juvenis impetus sit, vel soli hydroc. docent, in quibus nihil aquæ injvium est, & nihil non petrumpt, ceduntque læpæ, ventriculus &c.

Quæ ultimo loco Cl. Nymannus attulit; ipsi suo modo largiri possunt, ac facendum est sæpe malum fieri, in & extra cerebri ventriculos reperiri fuisse citra apopl. At tantam copiam, qualem Cl. Platerus invenit, & ego in *Wormio* observavi, absque productione Apopl. unquam intracranium, consolidari aut fimitur combinari ejus tenuis: vilius fuisse ambigo: Quæ de crassiss. alibi inquirendis humoribus monet, *quam caridus* de Torcularis obstructione sagunt, cui Columbi authoritas non parocinatur, ut enim ille ventricularum obstructionem factam rectam confiteret, humorum aequalum purissimum, simul glutinosum memoravit. Atque ita ex his apparet Serum copiosissime intra cranium, in ventriculis & spatio inter meningis collectum veram apoplexiam

Com-

Comprimendo producere posse : quam sententiam amplius quoque videtur Clar. *Platerus* Tract. 1. l. 1. c. 2. *Abiata portione cerebri rari sanguinea macula*] *Aristoteles* lib. 1. lib. 1. Anim. in omnibus cerebrius exangue ait esse ; & neque parvum neque magnum vas ait desumere in ipsum] Sequitur *Vesalius* Fabr. corpor. humani lib. 1. c. 14. ad dilataurque *Riolanus* : Revera magna vasa, qualia hepar, lienem, testes &c. subsunt, per cerebri substantiam non decurrunt, at parva trahi veterum & recentium auctoritate demonstrari possunt : *Hipp.* lib. 2. de morbis sæpe eorum mentionem facit, *Galen.* 2. de admin. anat. l. 9. c. 2. per cerebri & cerebelli venas diffunditur terribit : *Fallop.* in Obsev. Anat. venulas & arterias capillares plurimas, per candidissimam cerebri substantiam in disquisitis se ostendisse ait : Idem asserunt *Baehnius*, *Spigelius* & alii, in super puncta subta apparentia argumentum sunt sanguinem in substantiam cerebri effusum vasis coarctati : abscissa enim cerebri portione, sanguis se expandit, punctumque, quod primo exitum erat, diffunditur acque amplius redditur. De vatorum autem distributione per cerebri, ex qua de circulatione sanguinis per illud, contra, vide Clar. *Weserum* l. c. p. 99.

Summopere utramque fluidam & molle erat] Dubium an deum extrinsecus cerebro ac cerebello incumbens, hæmorrhoides Apopl. gignere valeat : Id primum periculis penitus erat, cum enim paralytici particulæ, ab humore nervos alluente & admodum madescente ori ei cederent, facile existimavi, idem omnium nervorum principium, & quidem facilius, quia nervis mollius, perpelsum : Verum aliud me docuerunt, non solum hydrocephali *Pyssalis*, sed & anatome viri 70. annorum, qui phibili obiit : hic fete ad ultimum usque halitum loqui potuit, ac ingentem dolorem in utraque semotis parte interna petulit, quin

etiam afflicto caput doluit &c. Vide historiam de cap. dolore. Si itaque quicquam serum extrinsecus hæmorrhoides valuerit, unam saltem vel alteram actionem hic abolivisset, & loquelam præ multis, cum undique serum diffusum extitisset, ac superficiem cerebri se infundere cõpuleret : Idem ibidem pag. 199.

Com sterat respirari] Quod fortis ac vehementius apoplexiæ indicium est : Superstitis autem in apoplexiæ respiratio, cum motus careretur partium aboletur, rationem hanc reddit *Ramus Med.* 4. p. 102. Quia spiritus animales, qui supersunt, viam per nervos, respiratio instrumentis dicar, ad infundendum invenirent : hi enim nervi ob motum respiratiois (quorum inde à prima in insensate, & dormienti & vigili, sine ulla intermissione continuatur) magis quam reliqui omnes totius corporis reliqui nervi & musculi (quippe qui per vicis diutius sæpe quiescunt) ad spiritus videlicet recipiendos sunt adaptati : Et cum hæc manifesta de luctu causa sit, nequaquam ad miram & oculum naturæ providentiam, ac summam respiratiois necessitatem conflegendum abicitur. Idem.

Ad eam præterit] Itacondi duplices sunt, aut ob abundantiam caloris in corde, aut ob excessum caloris actis in ventre, qui os ventriculi contrahit & proinde animam ; quæ duplex causa in *Seneca* coniungebat, ejus temperies ad calidam siccam vergere &c. Præterea sæpe cardialgia torquebatur, quæ bilis dominatum in ventre arguebat.

Multum ipsi niam tam saepe &c.] Est ad apoplexiæ generationem immundiciæ vini usus conferat, A vino tamco indocta non est, nam quæ ex vino sit, quantumvis fortis, crebro solvitur cum ipsa crapula : tamet hanc non raro interimat, præcipue scnes, & eos qui diuina ebrietate cerebrum excrementis implevere. Quomodo ad Apoplexiæ generationem conferratur videri. Vide Not. ad Obsev. 20.

OBSERVATIO XLVIII.

Apoplexia à plurima aqua cerebrum diluente.

A Poplecticus concidit *Sereniss.* & *Celsiss.* Princeps *Wilhelmus Lantgravius Hassiæ*, ex acidulis redux : aperta calvaria, aqua plurima diluebat cerebrum. *Cass. Rolfin-kium Meth. special.* p. 144.

S C H O L I A.

E X acidulis relax] Hinc. ab *Hæc* refert virum sexaginta annos natum, ex potu aque spandæ in Apoplexiâ incidisse, cui paralytici fuit succedanea, &

qua defunctus, cum acidulas resorpsisset, novo apoplexiâ facis concessit : Plures alios senes intempestive illis aquis utentes consimili morbo sublatos vidi.

OBSERVATIO XLIX.

Apoplexia ab abscessu seroso in cerebro.

M ARIA N. post contusionem sincipitis vertigine afflicta fuit, tandem Apoplexia fortissima subito obiit. Inspecto cerebro, in sinistro latere tumorem, ovi magnitudine, cerebri tertium ventriculum comprimentem, aqua limpida repletum reperi. *Vide tit. de Vertig.*

OBSERVATIO L.

S. Apoplexia epilepsiam sequuta, à sero acri in cerebro, inter meningis & in ventriculis stagnante.

V Ir annorum 30. (*Tit. de Epilepsia*) occubuit Epilepsia terminata in apoplexiâ : Inter piam & duram matrem, ubique, uti & in ventriculis, magna feri copia stagnavit &c.

Q U I A.

OBSERVATIO LI.

Apoplexia à vesicis rotundis aquosis corpori calloso incumbenribus.

Sacerdos quidam in fine consecrationis stolidus cum magna admiratione factus, & paulo post tempus apoplecticus brevi mortuus est: Secto cadaveris capite, *vesica aliquot rotundae* albidæ, humore pituitoso repletæ, supra corpus callosum invenire fuerunt, quas hujus lethalis morbi immediatam causam fuisse existimatum fuit. *Dom. Panarolus, Pentecoste 1. Observat. 17.*

S C H O L I A.

Vesicae aliquot rotundae] ὕδαντες vocatæ, de quibus supra. Si humor lymphaticus per vasa propria libere non excurrat, inde fit ut pars illius in transitu haerens, exudet in cavitatem ab initio per exiguum, ciformatam in membranosa partis substantia: eadem-

que ex novo materiae affluxu paulatim aucta, cellula quædam in tunica oboritur: Humor autem eo conflatus, initio tenuis, postea crassescit, & pueritæ formam induit. *Vide Barthele Præf. lib. 4.*

cap. 4. §. 9.

OBSERVATIO LII.

Apoplexia ab abscessu in dura matre disrupto, cum corrosione tenuis & corticis cerebri, à pure inde manante.

Novi abscessu in dura matre excitato, & postea disrupto, cum à pure fortidissimo meninx tenuis, os & cerebri cortex exederentur, ægrotum primo in stuporem, & demum in Apoplexiam lethalem incidisse, qui tamen in toto morbi decursu symptomate quovis Epileptico immunis degebat. *Thomas Willis Pathol. cerebri cap. 2.*

S C H O L I A.

Inde inferit Excell. Vit meningis in Epilepsia primario non affici: Idem autem pus, à quo incoincit & cerebri cortex exesit, ad originem nervorum decumbens apoplexiam induxit, compreffione aut obstructione facta; immediate aut mediante cujuspiam

vasis erosionem, unde sanguinis effluxus: Sic variolæ apopl. in puella supervenisse cæcitæ Exc. II. *Wesserm Excic. de Apopl. p. 139.* vult aliquo ab interna variola cæcitate; Eas quippe interiorum partium, non secus ac exteriorum oblidere membranas compunctum est.

OBSERVATIO LIII.

§. Apoplexia à Tumore steatomatico constituto inter cerebrum & cerebellum.

Vidit Clariss. Dom. Drelincourt Tumorem steatomatis consistentia, pugniæ magnitudine, cerebrum & cerebellum inter, eo præcise loci ubi conarium utrique subternitur choroidis plexus alæ, spatio semestri à sensibili læsione, cæcitarem primo, surditatem subinde, omnium denique sensuum & functionum animalium abolitionem, & necem ipsam intulisse. *Joh. von Flammerdinge Dissertatione de Apoplexia, Thesi 12.*

OBSERVATIO LIV.

§. Apoplexia à cerebri subsidentia, dissolutione & fluiditate, ob pituitam ejus molem irrigantem.

Si pituita cerebri substantiam longo impulsu adeo irriget, ut magna illa cerebri moles mollior laxiorque facta subito diffuset & subsidat, nervorumque principium in basi calvariae à cerebro prodientis premat, & spiritum animalium transitum præcludat, Apoplexiam gravem parit: uti quando ventriculos seu cavitates cerebri pueritæ subito adimpler, non obstruendo, cum spiritus animalis non in ipsis, sed in cerebri substantia undique & nervis sedem suam habeat, nec per ventriculos transeat, sed eodem modo cerebri basin gravando, apoplexiam quoque inducere potest: Quæ tamen, si humor ex illis descendens nervorum ductum sequatur, in paralyfin potest desinare: Hæc omnia sic se habere in Cæco & apoplexia mortuis, ex eo quod copiosius hic humor per os tunc illis effluxerit aliquando deprehendimus, & sectione quoque diligenti aperta crassa cerebri membrana, in quibusdam copiosum humorem magis profluentem per capitis regionem ad thoracem usque descendisse, ipsam adeo

adeo cerebri substantiam in Anu quadam defluxisse observavimus Monspefuli, quæ subito apoplexia tacta expiravit: hujus calvariam cum aperiremus, cerebrum illius in meningē crassâ hinc inde fluctuare deprehendimus: Quod & dissecta apertaque dura dicta matre, liquoris alicuius spissioris & albi pulstem referentis per faciem universam defluebat, & hinc inde in pannos dispergebatur. *Platerus Pract. lib. 1. c. 2. & Observat. lib. 1. p. m. 16.*

S C H O L I A.

U *Imago illa cerebri moles mollior &c.* Quæ sit causa radicalis hujus universalis resolutionis, magna est apud Viros doctos discrepatio: Credo ego substantiam, seu corpus totius cerebri perpetuo motu, systole & diastole, naturaliter agitari, sive ille motus cerebro cumpetat ex natura sui pætochymatis, seu communicetur per pulsum arteriarum, membranas cerebri ipsiusque substantiam perperantiam: Motus ille necessarius esse videtur ad circulationem sanguinis, ad spirituum animalium elaborationem, & denique ad illorum per nervorum genus in totum corpus propagationem, aut, (si cui ita loqui lubet) irradiationem: Idem loquar cerebri motum, si impediantur & subsistat, ipsumque cerebrum quasi subsistet, dico causam esse principalem radicalem Apoplexiæ, seu Impotentiam hanc motus cerebri esse ipsum formale & Essentiam hujus morbi: omnes etenim effectus, omnia symptomata in apoplecticis occurrentia, fuscidi sunt istius pellimæ radicis, ita quidem ut etiam omnes & singulæ conculsæ ad Apoplexiâ efficiendam nate, illam ipsam radicem respiciant, foveant, augeantque: Quod si dicas pro radice hujus mali assignandum esse potius motum impedimentum, unde spirituum motus & actio omnis tollitur, prout ex Hippocrate monuisse videtur *Pr. Memorab. lib. 2. de Morbu vers. 67.* Respondet, quod quodvis cerebrum mentis principale est organum, spirituum animalium officina, nervorum demum prima radix, à quibus motus & extensus omnes dependent, equidem non video, cur non rectius in cerebro quam ulium alibi Apoplexiæ essentiam repotuer, præcipue cum omnis morbosus agendi impotentia, non in humoribus, qui viâ videantur carete, sed in partibus viventibus, (quale cerebrum) necessario consistat. *F. Ignatius Thurmairus, consil. med. lib. 2. cap. 2.*

Spiritus animalium transfusum præcludat Primus quod sciam inter recentiores G. Nymann ausus est negare ullam veram Apopl. generari à spiritu animalium effluxu omnimodò inexcepto: Nostra autem sententia id fiet ob principii omnium nervorum, vel Compressionem subito factam (ut in allato exemplo) unde denegatis spiritibus, quantumvis abundant vitalis, apoplexia lequatur, vel ejusdem obstructionem: De Compressione vide Notæ ad c. *Wyssem p. 243.*

Non obstruendo ventriculos &c. Si non ventriculos saltem substantiam cerebri & cerebelli: Utrumque enim potiorum esse, non solum antecolatum (quorum plurimam recipi) ratio, cuiusmodi poros non paucos oculis observare licet, sed & proprii spiritus animales, qui ex substantia utriusque in nervos propellendi sunt, supponendum est: Hos enim spiritus eotus quoddam esse, qualibet fere particulares partium paralytes & nervorum ligaturæ docent. Si namque spiritus isti in numerum qualitarum spirituum animalium referendi essent, hos obices facile possent superare (non secus ac lumen densissima vitæ transiit, æque odores elatam à piscibus profundissimis alveis immeritis

percipiuntur) nunquamque ulla vel ab humore vel vinculo paralytis generaretur, sed omnis nonnisi difficilis nervo heret. Deinde necessum & ut pori medullose substantiæ patefiant arterioli per eam dispersis, nisi enim aperti sint, citissime deficiant animales spiritus, cum summopere indigeant perpetua spirituum vitalium refocillatione, quæ deoegua brevi actiones animales petunt: Quibus positis, haud difficulter intelligitur medullas substantiam cerebri obstrui posse: atque hinc quoque manifestam evadit unde humor obstruens affluit, quia enim duo tantum vasorum genera substantiam hanc subintrant, venæ scilicet & arteriæ, his potius hæc provincia deferenda erit quam illis, cum per arterias in omnes partes influant, per venas ad cor refluant: Lymphatica vero vasa hæc loca intrare nondum notum est. *Wyssem pag. 243. &c.*

In humor ex illis descendens nervorum dactum sequatur &c. Catol. Pilo de morbis à sero sect. 1. p. 2. cap. 5. Apoplexiæ tres species statuit, Fortissimam, quæ spirituum faciem admittit, interminque: Fortem, quæ violentiam intenuemque & sublimem spiritum reddit; Levem, quæ difficilem adhuc & explicatum ante spiritum trahit: Primam à mucoso humore fieri statuit, sive solo, sive potius sero immixto, sed ex proportionem ut ille hoc multum superet: Levem contra à sero sive solo, sive mucosi permixto, sed in paucâ admodum quantitate, ut serum longe mucos prædominetur: Fortem denique à miscella utriusque noo valdi dispersa mensura coalescentis: Restatque inferat productionem levem apoplexiæ, & ejus quæ vel medicamentorum usu, vel citra hunc, paulo post à paralyti utriusque vis latens excipitur, parum latis sensibus letentis, serum præcipuum causam existere: quod crassius, vitidius & lenis humor vix possit in principium nervorum excurrere subito; aut cavum nervorum, sensibus impervium, subintrare, aut in eos deductus, omnino resolvi & dissipari, cum enim id à calore sperandum sit, potius in humores glutinosos, in halitum dissolvat.

In Paralyti potest desinere Quod facta obstructione potius quam per compressionem coninget: comprimere enim causa vix poterit simul & temel omnes actiones abolere: nec adeo subito omnis materia expelli, aut hemiplegiam inducere: Quo pacto enim serum, cerebrum & cerebellum ambiens, huc potius quam illi medullæ parti se insinuat? Quid ad alterantem, aut quosdam nervos, aliis intractis impellere valebit?

His humor per os effluerit Affio est exemplum quod addacit Car. Pilo l. c. de puero 12. annorum, qui circa solstitium hybernorum, siue sensu ac motu de repente concidit, ac 12. morbi hora suffocatus est: hunc ait merum mucum, sed spumofum, cum anima per nares reddidisse, confertim non stillantem, quomodo affectus pulmonibus aliquando excrentur, ut ablit omnis suspicio è thorace manasse.

APPENDIX.

§. *Historia Apoplexia à cerebri subsidientia contingentis, ob tumorem cranii resectum.*

Mulier Leidensis tumorem in dextra sincipitis parte gestavit externum : ablatum ille fuit Chirurgi periti celeri manu ; & sine ullo graviore mali metu tres dies effluxerunt : Sed quarto die, subito invadente apoplexia, moriebatur, ut prædixerat alius motus similibusque exemplis Clar. Walæus : Quia in huiusmodi capitis tumoribus læditur pericranium : quumque hærentes matres internæ dilantur, concidit cerebrum comprimique ventriculos. *Thomæ Baribelinus cent. 4. histor. 86.*

S C H O L I A.

Concidit cerebrum comprimique ventriculos] Hofmannus subsidientiam totius molis cerebri ceu absurdam irridet, At si illi accedat causa comprimens, non omnino impossibilis censenda est ; Univerſum enim medullarum corpus spiritibus tam vitalibus quam animalibus reſertum elevari, & tantum non omne cranii ſpaciū implere, iis vero orbem ſubſidire vel infantes moribundi probant, dum in ſilis, non ſolum circa ſuturam lambdoideam & ſagittalem, manifeſti & profundi ſulci conſpiciuntur, ſed & membrana cranii diſpoſitio, prope conjunctionem ſagittalis & coronalis ſuture, foveolam nanciſci deprehenditur : non aliam ob cauſam proculdubio, quàm quæ cerebri univerſa moles, ob inſtantiem mortem frigidior & gravior facta, ſubſidet, ſecumque falſiforme corpus & laterales ſinus annexos detrahiti : Si ergo ſubſidentia compreſſioni ab incumbente corpore accedat, coarctatis in univerſo cerebro menſibus, & impedito ſpirituum effluſu, utique apoplexia generabitur. *Wifſen pag. 198.*

OBSERVATIO LV.

§. *A ſanguine circa baſin cerebri & rete mirabile effuſo, cum cerebelli ſyderatione.*

Quidam lætus à ſciopero concidit protinus in terram &c. Videre fuit prope plagæ locum, extimam cerebri membranam tum lividam, tum flaccidam, & non uno loco cruore arro obductam : cerebellum vero plane ſyderarum &c. *Vide lib. 6. de Pulveribus.*

OBSERVATIO LVI.

§. *Ab hydatibus circa temporales arterias, cerebri flacciditate. &c.*

Puer præceps in caput ecciderat &c. ac poſtremo apoplexia enecatus : Detracta deſuncti cute ex capite plurima effuſit aqua : circa temporales arterias hydatides reperiæ plurimæ &c. Aquæ tantillum in cerebro ſubſtantia plane flaccida &c. *Vide lib. 6. de Pulveribus.*

OBSERVATIO LVII.

§. *Apoplexia cito interimens, cerebro omnino ſalvo & incolomi, Solo vitio in Pulmonibus apparente.*

Senex Theologus, vir probus & pius, e corpore obefo, nec non collo brevioris & toroſo præditus, diu in valetudinarium & vitam ſedentariam agens, ænochymiam valde ſcorbuticam contraxerat : reſpiratione diffiçill & anhelofa & capitis gravitate & torpore inſolito affectus, vix quiequam præterea laboris aut exercitii præſtare poterat quàm quod quotidie de cubiculo ad ſacellum iret & rediret : Quodam mane capellam paulo ante præces ingreſſus, dum genibus provolvitur, derepente percuffus & mox *apponit* & inſenſilis factus in humum eoneidit ; Illicò vero ſublatus & veſtibus exutus, lecto concalſacto imponitur : Ipſe aliique Medici mox acceſſiti reperimus eum, non modo abſque ſenſu, pulſu & reſpiratione, ſed toto corpore frigenrem & plane rigidum : nec ullis remediis, aliquandiu læet diligentiſſime adhibitis, ad viram aut incalcſcentiam revocari potuit, unde ſuſpicati ſuprà à primo ictu cordis pulſum penitus Inhibitorium fuiſſe, flammaque ejus extincta ſanguinis ſtatim omnem motum ſuppreſſum fuiſſe.

Poſtredie cadaver exanime ſatis & obriguiſſe viſum, aperuimus, nihil dubitantes quin affectus ita ſubito lethalis veſtigia ſatis clara, intra *ὑνέπαλον* relictæ, in conſpectum prodirent : Verum illic, aut in alia quavis parte, morbi, licet atrociffimi, ne vel umbra quædam ſuper

supererat vas meningas irrigantia sanguine mediocriter repleta fuerunt, absque ulla tamen phlogosi aut extravasatione: Cerebrum, cerebellum & medulla oblongata, cum processibus eorum omnibus & prominentiis, ubique firma & bene colorata, tum extra, tum intra per totum apparebant: Nec serum nec sanguis effusus ullibi intra eorum poros & meatus, nec etiam intra ventriculos majores coacervabatur: quiniuo plexus Chorocides tum intra cerebri cavitatem, tum pone cerebellum consiti, omni culpa immunes videbantur: adeo ut materies morbifica, æque tenuis ac subtilis ac sunt spiritus animales, quos affecerat, prorsus inconspicua maneret, ejusque illic præsentiam tantummodo ab effectu arguere liceret: Attamen ne alibi extra caput lateret illa, post singula hæc *examinata* contenta accuratius inspecta, ad Thoracem devenimus, ubi pulmones discolors & ichore spumoso per totum infarcti, respirationis difficilis & anhelosa causam satis manifesto probebant: Cor vero satis sanum ac firmum, obstructione quavis aut polyposi concretionibus immune prorsus existerat: Porto, nec in vicinis ejus, nec in aliis circumcirca visceribus, abscessus quispiam aut apostema, à cujus contactu aut fectore cor opprimi, aut spiritus vitalis (si modo hoc possibile est) derepente suffocari potuit, reperiebatur.

S C H O L I A.

Quamobrem in hoc casu nihil aliud suspicari licuit, quam spiritus animales intra cerebelli medullam confusos, à particulis quibudam malignis, sive narcoticis, sive alias infectis, subito profligatos &

quasi extinctos fuisse, proinde ut cordis, quasi primi in machina elarctis, motu illico deficiente, statim cæteræ omnes functiones, earum impulsibus ademptis, prorsus cessarent. *Widius Tract. de An. Brut. parte 2. d. p. 375.*

OBSERVATIO LVIII.

§. In cuiusdam quem apoplexia extinxit cystide fellea, decem calculi reperti.

Anno 1653. Aprilis 18. Caltris Nob. D. Ferrand Apoplexia mortuus est, in cuius cystide fellea decem calculi nitentes; coloris flavi subobscuri, & aliquomodo triangularis figuræ, fabæ magnitudinis reperti sunt, quorum duos ego in musæo meo curiositatum asservo, *Petrus Borelius cent. 3. observ. 22.*

S C H O L I A.

Nea vesicæ felleæ obstructio Apoplexiæ causa esse potuit? In dubium enim revocatur nimis tam concitate possit. Vide Notas ad caput 17. Sed quamquam hæcenus deprehensa non sit Apoplexia à bile genita, certum tamen necesse non semper bilem quotidie genitam ad ambitum expellere sed sæpe ad alias partes, imò nobiles: *Galenus Acriam. Chæurg. Observ. 18. air fe secaille cadaver Nobiliis.*

Galli atrocissimis coli doloribus confecti, cujus colon intestinum cancro occulto affectum erat, proculdubio ab obstructione pori biliferi, qua parte duodeno iniecit, inferius etæ lapillus pisum æquans, natura bilem ad colon deponente: Idem ibidem ait Venetam Cancro uteri exulcerato interemptam fuisse, cujus cystis fellea à calculo indigui omnino obstructa fuerit.

OBSERVATIO LIX.

§. 1. Apoplexia à fulmine excitata.

Puellam vidimus in qua nullum ictus vestigium apparebat, circa dorsum duo tantum erant signa à summo ad imum pertracta, quæ à pyragra candenti facta videbantur: Inrus nihil erat incommodi præterquam in una pulmonis pinnula, in cujus fine exustio quædam videbatur. *Brassavol. comm. ad lib. 1. Hipp. de vit. acut.*

§. 2. Anno 1581. Vesfontione cum campanati contra tempestatem campanas pulsarent, quidam ex illis fulmine petitus interfuit: Torum ejus corpus inspectum sine ullo vulnere & pellis integra apparuit: eo excepto quod collum denigratum nonnihil, & collare induratum fuisse: Ejus corpore aperto, præcipua viscera cor, hepar & lien desiderata sunt, reliquis minoribus intestinis sideratis: His qui ipsi adfuerant pedes tantum amputati fuerant: *Ex Observ. 1. Gilberti. Medici Vesuntini.*

S C H O L I A.

A Fulmine induci posse apoplex. ait *Emirius de abd. cap. 31.* qui patrem & filium uno & eodem momento, à fulmine tactos, apoplecticos evasisse, iterumque inægre sanatos fuisse refert: hujus enim potentia tanta est ut humores cerebri commovere, huminesque attonitos reddere valeat. Narrat *Hildanus cent. 3. Obs. 26. de quodam famulo fulmine icto*

& occiso, cui caput paulo post intumuit & nigrum evasit, unde graviter læsum fuisse cerebrum constat. Rarius tamen veram apoplexiam excitat, nam ut plurimum, vel plane occidit, vel ita prostermit, ut colore faciei vivo deperdito, pulsusque & respiratione prorsus sese ablatis, icti mortui similes appareant.

L

OBSER.

OBSERVATIO LX.

Fulmine icti & enecati Anatome.

Casus hic accidit die 19. Maji 1666. Medleji, quod hinc uno milliari abest. Duo Scholares Collegii Wadhamensis, qui soli fuerant in scapha quadam a litore non pridem remota, Medleji ad redeundum domum, positi in capite scaphæ infelici ictu Tonitru aut Fulguris statim ex scapha in aquam excussi sunt: Alter eorum ita ictus est ut plane rigidus moreretur, & ex aqua post vix unius minuti moram (uti ex relato acceptum) extractus, nullum vel vitæ vel sensus motusve indicium proderet: Simul atque ex aqua mortuus fuit extractus nihil remedium in expertum relictum est, sed frustra erant omnia: Quare posttridie ejus diei in urbem sepultura causa delatus est, ubi Doctores Willisius, D. Mellingtonus, D. Lovverus & Ego accessimus, avidi lustrandi corpus mortuum, si forte in eo particularia nonnulla observanda venirent.

In universa ipsius cute nullum apparebat vulneris vestigium: Facies & collum nigra erant & livida: sed non in majore gradu quam solet procedere ex sanguinis sedimento: In dextera colli parte macula quædam parva nigricans, digitem unum longa; quartam vero digiti partem lata, ad summum, nota ferro candenti inulta haud absimilis conspiciebatur: Habebat & aliam paulo maiorem, ut memini in altera, i. e. sinistra colli parte, infra aurem: Directe intra, in latere pectoris sinistro, locus erat novem circiter digitos longus, & duos digitos latus, hic amplius, ibi minus, qui erat adustus & durus ut corium igni duratum, colore rubro valde sensibili, in nigrum vergente, cui porcelli affati similis: In parte anteriore humeri sinistro aliam habebat similem maculam unius circiter folioli magnitudine, quæ tamen tam nigra & notabilis haud erat quam illa quæ in collo apparebat: A vertice humeri dextri deorsum, versus dictam pectoris partem, erat tenuis linea similis cutis adustæ, quasi aliquid in eam juxta collum intrasset, & infra versus pectus delapsum ibi se laxasset & ad finem callis ampliorem campum aperuisset: Maxima pars globulorum Thoracis ejus ablata fuit; collare fuit disruptum, Pileus mire erat laceratus, non quidem exacte per cacumen, sed per latera pilei & extrema: à latere ejus erat foramen majus pugni; quædam ejus partes omnino abruptæ, & inde undique hiatus sparsi erant, quasi pileus fuisset dissecus aut laceratus instrumento obtuso; Et præter illos una aut duæ fissuræ alie erant, quæ non committebantur foramini in latere: In reliquo vestimento nullum casus illius vestigium cernere liceat, neque odorari odorem aliquem sulphureum, cujus rei causa fuerit, partim quod jam temporis nonnihil post casum elapsum esset, partim quod vestimenta statim aquam hauerint, in quam inciderat homo: Sequentæ nocte tres Doctores supra memorati & Ego convenimus, & capitis apertionem fecimus, ut animadvertere mus si quid in eo veniret, sed nullum contusionis indicium apparuit: cerebrum erat integrum & optime constitutum; Nervi quoque erant integri & nullo malo læsi: vasa cerebri plena & bene disposita, sic ut nihil extraordinarium in illis oculis nostris subiceretur: Negandum quidem haud est aperturam illam factam ad lumen candelæ, non examinari potuisse pro vocis, quamvis partem satis accurate ob brevitate temporis (mox enim humarum erat cadaver) lustraverimus, Sunt qui imaginantur vidisse fissuram quandam in cranio exigam quique illud tenuerunt dum ferra dissecabatur, asserunt ibi se quandam percepisse rupturam, seu dissonantiam in manibus, apparebatque in oculis simile quid, verum tantillum id fuit: Ad tempus dextrum capilli manifeste erant adusti, & inferior pars dextræ auris paulo nigrior partibus circumstitis, sed mollis, & fortassis illius causa tantum fuit sanguinis sedimentum: Pars superior humeri sinistro & sinistra colli, facies etiam aliquanto nigriores apparebant reliquis partibus corporis, sed an illud eveniret ex ictu rumpente collare, & inuente ei rotundam rubram maculam, aut tantum ex sanguinis sedimento, non satis compertum habeo: atramentum puro maxime fieri potuisse, ut tam caput quam partem illam colli læserit prægrandis ictus, cum contusione in sequente (videturque ita accidisse ex dilaceratione pilei & disruptione collaris, & fortassis ex fissura cranii) nullo tamen existente signo contusionis, quia per immediate sequentem necem non licuerit sanguini, ad illam partem congregari ibidemque subsidere, (quod in contusionibus est causa nigredinis) ita ut non secus esset ac si corpori recens mortuo talis ictus infusus esset, ubi non solet accidere tale symptoma contusionis postquam sanguinis circulatio desit.

Examinato itaque capite, Pectus quoque apertum est, & inventa adustio transisse pectus totam curem, quæ in locis illis adustis dura erat, & quasi cornea ac contracta, sic ut non

non esset tam crassa ac tenera seu mollis cutis quæ circa litam erat; interquàm tamen sub cute nullum ejus rei erat vestigium: Musculi erant in situ suo naturali, neque quicquam ordinarii coloris amiserant (fortassis ob rationem jamjam memoratam de capite, collo & humero:) Tum sublato sternò, pulmones & cor coloris soliti nihil remiserant, neque quicquam alterationis probebant:

Hæc igitur sunt quæ imprimis illo in casu sunt observata, quibus & hoc addo, noctu corpus multo magis tumidum fuisse quam mane, odoremque sparsisse penetrabilem & foetidum; id quod forte tribuendum æstui tempestatis & calori quem multitudo in conclavi effusa concitaverat. *Actorum Philosoph. Londinensium anni 1666. pag. 107.*

OBSERVATIO LXI.

§. 1. *Apoplexia Ischuriam sequuta, ob vitium renum calculis obfessorum, serum non excipientium.*

Matrona post sanguinis & materię purulentę euni membranis mictum, urinę suppressionem per 14. dies passa, Apoplectica interibat. Illi Ren dexter omnino defuerat, Alter materia sabulosa & calculis undique oppletus. *Vide lib. 3. Tit. de Urinis non natural.*

§. 2. In cadavere muliebri ex Apoplexia defuncto visus ren dexter atrophia correptus, cum calculo in pelvi sinistri: *Vide lib. 3. Tit. de Ischuria.*



ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO III.

DE RELIQUIS AFFECTIBVS SOPOROSIS,

Lethargo, Caro, Cataphora, Comate somnolento & Vigili.

OBSERVATIO I.

§. *Lethargi causa interdum est serosa colluvies, cerebri anfractus exteriores
ejusque poros alluens.*

LETHARGVM à serosa colluvie cerebri anfractus exteriores altruente ejusque poros & meatus corticales subeunte, interdum oriri observatione Anatomica sæpius comprobatum vidi: In multis enim ab hoc morbo defunctis, plicarum cerebri interstitia aqua limpidia repleta, Quin & extimam ejus substantiam à nimio melle mollem & minus firmam: Insaper in nonnullis cavitates interiores lymphæ turgentes, & totius cerebri compagem hydropæ, seu potius diluvio inundatam reperi: *Th. Willis Trail. de Anima Bruti. part. 2. cap. 3. p. 294.*

SCHOLIA.

Lethargum] Somnii p. n. quatuor præcipue proponimus differentias, Coma, Lethargus, Causæ & Apoplexia, quæ cum ut plurimum ab iisdem causis oriuntur, eandem curationem postulant: Differunt autem inter se, quod in Comate seu cataphora, est quidem somnus profundus, sed à quo æger excitatur, & oculos aperit & respondet, moxque iterum profunde dormit: In Lethargo est somnus comati similis, sed cum febri & delirio: In Caro æger febri caret, ut in comate, sed somnus est profundior, ita ut æger excitatus oculos vix aperiat, & non respondeat, sicut in prædictis, atque vellicatus sentiat, & integra maneat respiratio: In apoplexia somnus est profundissimus, cum omnimoda sensus & motus privatione, ac difficili respiratio. Causæ horum affectuum plurimæ assignari possunt, & potissima est humor pituitosus vel aquosus in cerebro p. n. contentus, qui in minori copia cumulat, cerebri substantiam itrigans ac refrigerans, ejusque meatus insensiles obcurans, Coma generare solet: Si vero in eadem copia collectus puritatem concipiat, sive in tumore collectus sit, sive per totum substantiam dispersus Lethargum producat: Quando vero majori copia collectus est sine puritate, & totus propemodum cerebri substantiæ imbibitus, Causæ edicere consuevit. Si denique copia adhuc majori affluens, non solum cerebri substantiam, sed etiam ventriculos opplet: aut saltem mole cerebri concidente comprimat & angustet, nec non principum nervorum in basi calvariæ à cerebro productis premat, & spiritui animali transcursum præcludat, Apoplexiam facit: ij. A sanguine etiam redundante in cerebro soporosi affectus sunt, maxime si eruditior, serosior ac trigidior fuerit, unde spiritus ani-

males condensantur, & motui ineptiores sunt; tum copia cerebri gravando liberum eorum commercium impedit; ac pro majori vel minori copia, vel frigilitate, hunc vel illam affectum soporotum parit. Iij. A sanguine etiam extravasato, & cerebri ventriculos opplente vel comprimente, præsertim apoplexia, rupta vena, vel ob plethoram ad vasa, vel ob contusionem capitis insignem, vel ob vulnus punctum aut exitum factum: Sula cranii fractura cerebrum premendo comæ osum affectum producere potest iv. A Tumore in cerebro genito pondere gravante, coma accedere potest, ut in Barone de quo infra: v. Vapores immodici ad cerebrum delati, qui si copiosi & halitulosi sint; spiritus animales aggravent, & velut caligine suffundant, sicut nubes in majore mundo radios obtenebrant: Si vero crudiores fuerint, cerebrum adeo humentant ut languidam ad actiones fiat. Sic ebrii sopore profundo detinentur; Sic pueri lambicis, scatenes, Sic in febribus nonnullis intermittentibus sopor inexpugnabilis accessio in initio contingit: v. A medicamentis narcoticis coma indicitur, imò à specificis & maligna humorum putredine. *Ex Rivieri Pract. lib. 1. cap. 2.*

Cerebri anfractus exteriores, ejusque poros & meatus &c.] Somni essentiam in eo consistere statimus quod Anima corporea se paululum subducens, & irradiationis suæ sphaeram contrahens, inprimis extimam cerebri amblium, sive corticem ejus, & dein exteriora quæque sensus & motus organa spirituum emanatione destituit & quasi foras occludit, proinde ut illi reflectionis gratia intra revocari succumbant & quieti indulgeant; Interim cerebri exterioris pori & meatus à spirituum excubibus immixtus & vacui, liquoris mixti è sanguine

è sanguine pro novis spirituum copiis exsiliis adi-
cam præbent: In somno naturali & affectu bine hæ
causæ, tanquam ex natura pacto quodam mutuo
consistant de simul contingunt, scilicet eodem tempore
spiritus recedant, & humor nervus subintrat. In
somnia autem non naturali sive extraordinario, causa
interdum hæc, & quandoque illa prior est: nam vel
spiritus defecit, aut avocati, se prius subtrahunt, &
humor nervos per foras aggit introitum præ-
bent; vel humor nervus uberior localia adpellens,
& quasi vi viam faciens, spiritus repellit, eorumque
meatus subiens, quasi inundat: Somnus præternatu-
ralis, sive insatiabilis sopor (qui præcipuus in Le-
thargo & morbis soporosis symptoma est) ab illorum
priorum causis in majorem insignem evectis, quibus
somnia non naturalis exoritur videtur, nempe aut spiritus
animales prius affecti exteriori cerebri ambuum
deficiunt, humorque non tantum nervos, sed & se-
rosum, aut alius vi, solo, introitum concedunt: vel hu-
mores superflui & excrementitiosi, macum nervos, ce-
rebricunicales fores peremptum, ejusque poros &
meatus velut inundantes, spiritus exinde repellunt ab-
guntque: Causa modo hæc modo illa prior & posterior
existit, quandoque utraque simul etiam contingit:
Quandoquidem igitur in Lethargo immani & funesto
sepe ad modum in histosis naturam habuisse con-
stat: in somnolentia minor & curabili, taltem exte-
rius cerebri oras humore nimis irrigatis, trachusque
spirituum plane obstruere suspicari licebat: præcipue
si lymphæ aut feri cilia alia capitis partes abundantius
signa apparebunt. *Item ibidem.*

A ferâ collata Non tantum à feri, aut alius hu-
moris morbiheis copia, sed interdum à malignitate
ejus somnolentia gravis excitari solet: nam sæpe ac-
cidit materiam quandam infestam & virulentam è
sanguine in cerebrum infillatam, quæ subitaneæ coti-
calis poros subiens, spiritus perfugiat, eos nempe aut
extinguens, aut interior adigens, proinde ut regione
hæc ab his destituta torpor & oblio succedant: Hoc
in febribus malignis, aut male indicatis passim ac-
cidere nullus est qui non advertat: Porro in cachexia
semibudica, lethæ & aliis quibudam morbis chro-
nicis, loco succi nervi subtilis & spirituosus, latex sæpe
iners & vapidus, torporis & oblivionis parens sup-
peditat: hæc lethargi causa conjuncta scilicet hu-
moris nimis aut incongrui intra cerebri cunicales po-
ros aggestio: Sed & in viro est sæpe sanguis tanquam
causa procrastina, materiam morbiheam parti affe-
ctæ suggerens: Enimvero in aliquibus magnam la-
ticæ aquosæ, in aliis feri talis & scorbutici quanta-
tem; inque aliis humores excrementitios & regimini
animalis infestos, à visceribus, modo his, modo illis
surreptos, ad caput transfert, atque data occasione,

una cum sacro nervo, ex arteriis cerebri oris exitibus
infillat, ibidemque materiam hujusmodi morbihe-
cam, vel paulatim insinuat, diutina congestione
nubem atram induci: vel subita illius metastasi
simul & semel cerebrum extensum inundat, spiritusque
incolas tanquam materiam impens, fugat & veritas in-
teriora compellit. *Item ibidem.*

Sæstentiam à nullo dolore mollem Materies mor-
bifica, aut cupiosa aut infesta è sanguine in caput
suffunditur, affectionem lethargicam minime pro-
ducit, nisi in seipsum culpæ partem asilicatur facile de-
bilis aut violata cerebri constitutio: Hoc enim li ro-
bustum & bene temperatum fuerit, humor quocum-
vis appulsiis facile resistit: imo errores & enomi-
tates in se non naturalibus impune fert: Quibus
tamen hæc pars nimis humida aut frigida est, ut
pueria & senibus, item cacochymicis, hydropicis, scor-
buticis, aut malacis affectis, illi in somnum valde pro-
clives, à causa evidenti fortiori quandoque in veter-
num incidunt: Præterea qui cerebrum debilis, &
quodam poro nimis laxum obtinere, ut excrementis
à sanguine obstruendis facili pateat aditus, somnolen-
tia crebet, imo & lethargo obnoxii evadunt: nam
crapulæ aut compositioribus dediti, inque peractis
stium obdormire soliti, cerebri sui tonum labefa-
ctant, ejusque poros succo crudo & scorbuto im-
plete, ac nimis aperient, proinde ut cum illud ob
tales neccaliones superfluitates scolas in se admittent
diu aduerent, postea nihil oblatum repudiare valeant,
quin meatus ejus tanquam illi in culo nimis rarefac-
to & excelsu, paniculas quasvis crassiores, aquotas,
salinas, terrestris, facile trajiciant. *Item ibidem.*

Cerebri anfractus externæ cre Si inquiratur cujus
partis aut regionis incolæ spiritus, somno primum
occupati, & ante alios quosvis somno indulgere in-
cipiant? Supponere licet spiritum primo dormientes,
eos esse qui intra globosam cerebri partem itantes,
phantasie & memorie actus creant: Hi nempe aut
iponte sua, aut ob alieni incursum à cerebri exterioris
poris, in quibus exspirant solent, decedentes, in peni-
tiores ejus medullas se recipiunt, ubi tanquam otiosi
decumbentes, spiritus ibidem continos in partem defi-
diam allecant, aliosque in nervosum genus emanantes,
ab effluxu revocant, ac ad ortum sollicitant: Reverta
spiritus cerebrum exteriori inadiantes primo obore,
pelcere, & recessu suo somnum inchoare, vel hinc
constat, quoniam amillos interdum ab expansione repri-
mi ac introitum urgeti necesse est, aut suæ nervosæ, seu
materiei, pro novis spirituum copiis, cerebrum in illa-
lande cedant locus: quare veterani illi, non solum
delassari è statione recedant, quin ab humore plentia
fruenne velut inundati, ab excrementis pelluntur. *Item,*
ibidem Part. I. cap. 16. pag. 219.

OBSERVATIO II.

*Somnus naturalis & p. n. oritur à latice aquoso cerebri poros & meatus occupante,
hinc in ventriculos detruso.*

Plures sunt instantiæ quæ plane evincunt humores serosos in cerebri ventriculos passim
deponi, observationes Anatomicæ hominum plerisque morbis cephalicis, ac in primis
affectibus soporosis defunctorum hoc ratum faciunt: Quinimo opinari fas sit somnum na-
turalem succedere in quantum cerebri pori & meatus à latice aquoso, qui spiritibus pro
vehiculo est, occupantur infarciunturque: Dein quoties à crapula aut vini potu quen-
dam sopor profundus invadit, causam esse quod spatiola in medullari cerebri substantia

L 3 spirituum

spirituum motibus destinata, humore narcotico aut aquoso nimis obstruuntur; Cujus reliquæ quædam in vaporibus resolutæ, & à spirituum confortio detruxæ sæpe in inanem hoc spatium transsudent, *Th. Willis Anat. cerebri cap. 9.*

S C H O L I A.

IN *Cerebri ventriculis &c.* Antiqui hanc cavernam adeo magnificerant, ut illuc sternerent spirituum animalium officinam, ubi & procreentur ipsi & præcipua functionis animalis opera moliantur: E contra Recentiores ita vilipendunt, ut eadem materia excrementicia foras amandandæ meras cloacas esse asseruerint: Profecto ista veterum opinio facile concidit, eo quod spiritus animales, upore valde lubiles & avolare apti, non tam spacia ampla & aperta, quam meatus & poros angustiores, quales in cerebri substantia exarantur, requirunt; nam hi spiritus (si quidem pro variis animæ facultatibus, in varias series & diversos ordines componi & *diversitas* oportuit) idcirco intra peculiare veluti tractus & orbitas commoveri debent: Porro si quis cerebri fabricam exactè considerat, quod hi ventriculi non ex primaria nature intentione efformantur, ac secundario tantum & accidentaliter de cerebri complicatione resultent, longè abest ut suprema animæ sedes illic figatur, ubi nobilissimo spirituum sacellio stipata functiones suas exequi aut obire possit: Neque enim omnino eonstat ex quali materia & quo artificio spiritus ibidem progignantur, nec quibus exinde emanationum viis

in reliquis cerebri aut systematis nervosi partes deriventur: Quare Anatomici fere omnes, qui citiores sæculi fuerunt, illud villis cloacæ officium interloco huic cerebri cameæ delegarunt: Cui opinioni fides nonnihil adstruunt ex eo, quod hi ventriculi in demeritis sæpe aqua repleti conspiciantur: etiam ab illis tum verius infundibulum, tum in os cribiforme, excretionum viæ patere videntur: Observare est, quod ubicunque sanguis in partem aliquam copiosius infuset, eamque irriget, illic è sero superfluo, ac inæ circulari demerito, vapores aut humores aquosi progignuntur, qui ne plurimum, aut per effluvia vaporosa foras exhalant, aut per venas, aut per vaia lymphatica in sanguinem redacuuntur: Cum vero sanguis uberi satis influat cerebri, non modo corticem, ac etiam interiorem medullam irrigat, Restat ut latex serosus (si quando magis in sanguine abundat quam ut superfluitates ejus immediate per venas, vel per lymphæ ductus, si qui adfuerint, reduci, aut à glandulis secerni queant) in specum hunc intra plicatam cerebri excavatum dilabatur, obstruções anatomicæ hominum affectibus (porosis defunctorum hoc ratum faciunt &c. *idem ibidem.*

OBSERVATIO III.

Lethargus non generatur ob interiores cerebri ventriculos affectos, sed cerebri oras extimas madore persusas.

EX observatis Anatomicis mihi sæpius constitit Lethargum non oriri (ut vulgo putatur) propter interiores cerebri ventriculos affectos, quippe novimus hos frequenter lymphâ inundatos & interdum sanguine extravasato distentos, & tamen laborantes, dum vivunt, Comate & torpore quovis magno immunes.

S C H O L I A.

QUandoque fateor, totius cerebri hydrops veterum insert, verum in hoc casu non tantum cavitas interna, sed & anfractuorum externorum interstitia aquarum diluvio impletur: Itaque Lethargo ad cerebri oras extimas perfinito, limites ejus ita constitimus, & ipsis istis, una cum medullis interspersis fere in totum occupatis, somnus perpetuus & inextinguibilis, cum oblivione inducitur: Cerebri interim modicullio, sive corpore calloso, è quo spiritus animales in partes omnem sensum motumque moerces irradiant, fere illaeso, namque hujus eclipsis totalis Apoplexiam insert: At vero ultra citraque hos fines affectus torporosi passim repetiuntur; Somnolentia enim nimis sedes, prout Lethargi, in cerebro exteriori collocanda est, verum hoc discrimine, quod hujus effectus causâ materialis, sive composita, est semper & præ fortibus urget, minus alæ quam solet in Lethargo penetrat, quin fere tantum cerebri superficiem, sive anfractuorum substantias mere corticales afficiat, modiculis inclusit fere unctis: Entimvero suspicari licet, quod dum languis cerebri oram citius densissimis ubique perfluens, et laicem tubilem pro spirituum materia ubique instillat, cum illo sæpe lymphæ copia affluens, ac una corticem subtingens, ibidemque

mansens, ipsum valde implet, ac (instar analacæ in habitu corporis) intumescit, & passivam hanc corticalis ad hunc modum tumefacta & velut hydropica, anfractus medullares ubique substratos ita comprimit, ut spirituum expansione, ob cerebri exterioris poros nonnihil restrictos, impedita, somnolentia inducatur: cui accedit quod sanguis propter cerebri corticem, ab aqua quasi intertuita tumefactum, per totam viciniam minus expedite circuletur, adeoque vaia & sinus implere, in lique itagnare aptus sit: Ex quo fit ut exterior cerebri limbus adhuc magis comprimatur, proindeque spatia pro spirituum emanatione requisita adhuc magis coarctentur: Reverti hoc in causâ partem adiectâ inde liquet, quoniam hujusmodi somnolentia, ob sanguinem in capite hæc liberè circulantem, & propterea itagnantem, facies cum livore tubescere solet: Porro dum hanc illuvem in cerebri cortice eggestam, liquor tubilis, qui pro spirituum materia est, penetrans, in medullas substratas pergit, probabile est cum illo particulis quasdam extravasatis, sive narcoticis minutissimis interperare, que spiritibus mox accrescentes, eos torpidos, & ipse in decidium pronos reddunt. *Willis de Anima Brutorum Part. 2. cap. 4. pag. 322.*

OBSERVATIO IV.

§. *Lethargus ab aqua limpida sub meningibus, cerebri corticem obtegente & madefaciente excitatus.*

PArvulus paulo supra tres annos natus, cerebri humidi, prout ex ophthalmiis graviorebus & faciei exanthematibus aquosis, quibus interdum fuit obnoxius constat, incun- te Autumno male habens, cum febre lenta & appetitu dejecto torpidus admodum & somnolentus evasis, ut dies & noctes fere continuo dormiret: Experrectus vero adstantes novit & interrogatis apte respondit: Huic idonea remedia, scil. Enemata, vesicatoria, cathartica, &c. statim & sedulo adhibita in tantum profecerunt, ut intra 6. & 7. dies æger febre immunis, satis vigilians & alimenta poscens convalescere, & cura medica vix amplius opus habere videretur. Brevi tamen postea, (in certum ob quam occasionem) recidivam passus, & denuo Soporosis, torpore statim graviori afficiebatur, adeo ut integre expergibilis vix quicquam novit aut sciret fecerit: Postridie plane stupidus, etiam si acrius vellicatus oculos aperiret, eosque huc illuc obvolveret, nihil videbat, atque intra diem unam vel alteram totius dexteri lateris paralysis insequuta est: Huic remedia priora repetita, insuper sternaturotia, apoplegmatica, sanguinis detractio, cataplasmata pedibus & epispastica toti capiti raso applicanda cum aliis medicamentis & administrationum modis ordine præscripta nihil profuere, quin æger postquam ita per 4. & 5. dies insensibilis jacuisset, respiratio- ne & pulsu tandem fatiscens interibat.

Cadavere aperto, in imo & medio ventre fere omnia satis sana reperimus, nisi quod in dextro tene humor ichorosis albicans, quasi sanies tenuis, congeri experat, qui ex renis dissecti & compressi partibus quibusdam copiose effluebat; hoc abscessus futuri initium sive rudimentum quoddam fuisse videbatur, & forsitan ob serum haud satis ubertim hic secre- tum, copia ejus major ad cerebrum influxerat. Nam calvaria olla exempta, anterior & hy- pocephala regio, fere usque ad sinus quarti sectionem, aqua limpida per membranas trans- fluente obtegitur, intumescerebat, quæ meningibus dissectis statim effluebat: porro illic loci, cerebri assularum dissecti portiones nimis madidæ, & fere sine punctis rubentibus, sive san- guineis apparebant; in Posteriori autem cerebri limbo vasa cruore rubescebant, & sub- stantia corticalis sine tumore, aut aquæ diluvio, depressior & firmior apparebat: Ex his Lethargi causam à cerebri exterioris illuvie aquosa, & velut anasarca pendere manife- sto liquebat: Cerebro assularum abscisso, & foramine in cavitatem anteriorem, à lympa distentam facto, aqua limpida, quasi prius intra spatium angustius coarctata exiit, cujus in- gens copia ventriculos omnes, ad summum impleverat ac, uti videtur, thalamos opticos comprimendo, cæcitatem; atque corpus unum striatum, aut potius ejus subeundo, aut comprimendo Paralysis intulerat: Plexus choroides tanquam semicoctus, subalbicans & fere exanguis apparebat.

S C H O L I A.

PRobabile est ex iis vasis Plexus choroides, lym- phi, quæ ventriculi cerebri inundantur: omnem, aut quoad maximam ejus partem, exudasse, quamquam in hoc causa si (prout nonnulli existimant) latex a- quosus & cerebri cortice inferius subsidens, demum cerebro penitus trajecto, in hos sinus deplacere po- terit, non incommoda inde ratio petatur, quare Lethar- gus primo sanati vultu, mox immantior cum cæcitate & paralyti adiecit redierit, nimirum quatenus pri- mo marea soporifera petus & cerebri cortice in cavitatem ejus prolapsus est, functio animalis paulu- lum inclauit: postea vero cum nova materies in ce- rebri cortice palliaretur, & hæc in sinus prolapsa ad plenitudinem aggreteretur, ideo morbi prioris reci- diva cum illis unita & paralyti videretur contig- it. *W. H. Traité des Animes Brat. port. 2. cap. 9. p. 416.*

Torpidus admodum & somnolentus Lethargi prop- ter dicti ratio in hoc consistit, quod spiritus animales cerebri incolæ interioris, à motu & emanatione sua solitis inhibiti, somno profundo & inexplibili suc- cumbunt. Inhibentur autem, vel proprio ipsorum

vitio, quatenus absumpti aut narcosi affecti, velat cor- gelantur & immobiles fiunt, vel quia illorum in cere- bro exteriori orbitæ sive tractus obstruantur, & ab hospite alieno occupantur, proindeque ut illis spatium pro expansione sua idoneum minime concedatur.

Torpidus, somnolentus, Stupidus, nihil videbat, &c. Hæc- us morbi symptomata præcipua sunt Somnus & O- blivio; Functionis cujusque alterius cognoscencia aut spontanea cessatio: Respiratio inæqualis & tarda; Febris, Et non raro, affectu in pectus emere, Spasmi, ren- dium subultus, ac demum convulsiones univer- sales ac lethifere. Quoad bina horum præcia, alibi ostendimus ob eandem præter rationem cum som- nus excedat memoriam deficere; Quod spectat ad alias animæ corporeæ facultates, scil. Imaginationem, Appetitum, Sensum & moram, etiam nulla spiritibus in hæc munia destinatis vincula narcotica injiciantur, acque interiores poti, intra quos inspicari solem, satis patere videntur: at tamen hi spiritus, si quidem durante paroxysmo, cum aliis obstructis com- muni habere nequeunt, etiam sponte succumbentes,

somno obruntur: Quippe veterino circa animæ sensitivæ radicem, nempe cerebri conloco inchoato, mox tota illa provincia, scilicet Animæ pars cognoscens, appetens & ipsoe movens, quasi velo obducto obscuratur: Porro ipse interea Intellectus, & sensus ubique oculis vix quicquam speculatur. Porro hujus morbi potentia, etiam in alteram animæ sensitivæ partem, Cerebelli ejusque regiminis præsidem, quandantenus extendi videtur: Propterea namque durante Lethargi paroxysmo *Respiratio & Pulsus* alterantur: Illa namque inæqualis & tarda, cum inspiratione modo alta & longior, modo repetita seu reduplicata: & æque hic magnus de celer calore febrilem per totum corpus diffundit: Prioris ratio est, quod eadem causa morbilica quæ cerebrum exterius ejusque incolat, etiam ex parte cerebellum, ibidemque spiritus præcordiorum motibus interveniens afficiat: qui proinde perturbati & præpediti, licet pensæ suæ non omittant, ea tamen difficulter & interrupte peragant: hinc ut diaphragma & thoracis musculi systolas suas non facile & celeriter ut prius, sed laboriosas, & tunc longiori conatu, interdum niubus repletis obeant. Hujusmodi respiratio inæqualis, longa & anhelata, frequenter etiam in Phrenitide contingit, quare nonnulli tum hujus tum illius causam Diaphragmatis inflammationem esse censent, sed perperam hoc, quia symptoma illud in utriusque hujus morbis cephalicis, à cerebello, cerebri gravius affecti noxam participante, dependet.

Cum *fibris* J Quod spectat ad Lethargici febrem, ex pulso magno & citiori, expiratione calida, cum lingus & faucium ardore abique insigni extremorum æstu dignoscendam, Nonnulli hanc ob eandem causam ac Lethargum, nempe vel à pituita in cerebro putrescente, Vel à cerebri inflammatione frigida deducunt: Alii contra febrem statunt primum affectum esse, & proinde materiam morbilicam à sanguine effervere in caput transferri. Super his ut de pituita in cerebro putrescente, aut inflammatione ejus frigida (quod idem fere sonat ac ignis glacialis) nihil dicamus, Lethargum non raro febri superveni-

re concedimus, nam si hæc maligna aut mali moris fuerit, etiam si hoc pueris, senibus, aliisque pituitosis, scorbuticis, aut valde cacochymicis accidens, non bene judicabitur circa morbi *æquum*, sæpe citius loco, marces febribus in caput rapta, torporem immanem, & non raro exitialem inducit, qui tamen non moribus sed febribus ipsius symptoma censeri debet. Ad hunc modum sæpe obstruunt febres soporosas, & velut narcosi quadam insignitas quibusdam temporibus, ob malam anni constitutionem exortas, & epidemice grassatas fuisse: Verum tamen non minus utilitatum est, cum Lethargi affectio principalis fuerit, febrem succedere, eique tam originem suam quam solutionem debere, quippe si bris post veterum incipiens, eo diffuso innox sponte cessat: talem itaque non à sanguine, ob particularum intestinalium dissidia effervere, sed propter corporum continentiam & vicinorum impulsus, cutium ejus varie alterantes ac interturbantes exoriri putamus. Enimvero recta sanguinis temperies non tantum à particulis ejus rite committis & subactis, sed insuper à motu cordi & valis impetore, sive circulatione organica plurimum dependet. *Vide lib. de Febribus. Will. Tract. de Anima Brutor. part. 1. cap. 5.*

Tota pars dextra paralyti resoluta J Interdum materia morbilica, quæ Lethargum aut eandem inducit, alius subidente, Et à corpore calloso in corpus stratum unum, aut simul utrumque polapia, cerebrum paulo clarescit, ita ut affecti circumpiscantur, loquantur & cognoscant: aramen in toto præterea corpore paralyticus aut hemiplegia succedit: Verum neque hæc, quoad vitam, res in vado est, nam sæpe quando cerebrum resolutum, cerebellum deterius habere incipit, ut proinde spiritibus, qui functionis vitalis & mere naturalis munia exequantur, ibidem male affectis, aut spasma in visceribus aut præcordiis, aut pulsis & respirationis impedimenta lenthifera excitantur: quandoque tamen, cum materies morbilica, nec admodum copiosa, nec nimis maligna est, illa partim in sanguinem resorbetur, partimque discutitur, ita ut affecti integre convalescant. *Vide lib. de Anima Brutor. part. 1. cap. 4.*

APPENDIX I.

De Lethargo febri male indicata succedente, imperfecte soluto.

Hortulanus febre putrida laborans, & circa morbi *æquum* loco crificos in veterum incidens, per tres aut quatuor exinde dies Sopore obrutus, nullius remeditu usu ita ex somno excitari poterat ut perfecte evigilaret, Tandem vero cum raso capite per totum fere ipsius ambitum vesicatoria applicata, ulcuscula plurima & copiose manantia excirassent, experrectus aliqualem sensus usuram recuperavit, aramen memoria ferè in totum abolita, adeo stupidus evasit, ut nullius nomen aut verba recordatus, vix supra brum saperet: Cum ad hunc modum per duos pene menses ingenti vacuum & somni plenus mansisset, nubes paulatim dispelli cepit, atque is demum ad solitos labores rediens, mediocriter convalescit, eundem vero animi vigorem, & pristinam solertiam qua ante morbum pollebat, numquam iterum recepit.

S C H O L I A.

IN hoc casu proponitur exemplum Lethargi febri male indicatæ supervenientis, in quo materia morbilica, lubita & copiosa metastasi in cerebrum exterius facta, non tantum poros & meatus omnes paulisper impleverat, verum & eorum conformatio-

nem ita laeserat, ut Spiritus aliquandiu exclusi, & demum immixti facti, nonnulli multo post tempore, orbitas & tractus suos priores & solitos recuperarent.

Will. ibidem.

APPENDIX II.

5. De Lethargo ex usu Opiatorum orto.

Lethargi ex usu opiatorum orti, typum satis exactum memini me olim observasse in pargo quodam. Ad casulum perexiguam & humilem deducor, ubi patrem senem & filiam inveni profundissimo sopore obrutos, qui pridie ipsos oppresserat, postquam radices hortulo nunc recens effosso crutas comedisent, pro palstina habitas, cum sorte hyosciami essent. In utrisque post vomitionem oleo & oxymelite gulæ infusus, pennique gutturi intrusa copiose proritatam, tincturam castorei, ex cochleari aquæ Theriacalis, crebra vice per totam noctem exhibendam præscripsi; insuper ut eadem tinctura tempora & nares illinantur, & si fieri posset enema acris iniciatur, die sequenti primo senex, & postea filia evigilantes, ad se redierunt torpore excusso penitus: In hisce affectis, post narcotici reliquias, ne amplius nocerent, per vomitum reiectos, tantum opuserat ut per idonea medicamenta (in quo censu castoreum, contra opiatorum venena merito habetur) spiritus excuscatati, à narcotici infusca liberarentur: Idem ibidem.

S C H O L I A.

Spiritus à narcotici liberantur? Somnus patet nasci, sicut & non nasci, excitatur, quis aut spiritus animales prius affecti, exteriorum cerebri ambitum destitunt, humorique non tantum nerveo, sed & seroso, aut alias viciolo introitum concedunt: vel humores lapsi sunt de excrementis, una cum nerveo cerebri corticis foras pertrumpunt, ejusque poros & meatus velat inundantes, spiritus exinde repellunt abiguntque. Priorem causam superius allata spectant; posteriorem appendix secunda, spiritum scilicet à parte affecta decellum, qui usumque eam alteram causam faccedere: Hoc ab opiatas fortioribus, sine prævio cerebri corticalis diluvio non infarscha, passim contingere unicuique obvium est. Nec enim probabile est Narcotica humores concitare, & ad cerebrum mittere, cum plane consistat horum effluvescentia omnes, & fluxiones ab illis sedari. At si modis & ratio quibus Opiatæ somnum, & quandoque Torporem exitalem inducunt, inquiratur, dicendum erit pharmaca hæc quoddam veneni genus esse, spiritus animales afflatu suo pessandam & quasi extinguenda: sanguine incertum de partibus solidis, pene illevis, quætopet, cum spiritus animales efficiat, imo & velut uestro percitis, huc illac septoripientes, compesci & sedari nequeant, Opiatæ exhibeant, velut aqua flammæ nimis aucte injecta, eorundem manipulos quosdam exitum perimunt, proinde ut reliqui statim minorca facti introitus fulguri placide succumbant: Narcotica autem ore sumpta vires sua parum in ventriculo, & quidem immediate, partimque in cerebro, tum illo, tum massa sanguinea mediantibus exerunt. Dum tamen in ventriculo operantur, quomodo somnum provocem dilquirendum? Quæ ratione tam brevi interdum spacio, & vix domo intra cum soluro somnus obrepit, id fieri existimo, quia iter à ventriculo per sanguinem ad synapsin satis expeditum est, & exiguo tempore transigi potest: Verum insuper opinari ducor, Opiatæ nonnquam immediatius in ventriculum agendo, atque merito contracti ejus, ante ullois fraginis commergunt somnum aliquatenus invivare. Inter affectus hujus causas evidentes alias assignavimus ventriculi aggravationem: quous enim quisque est qui cibis crassioribus & dyspepsis comestis, acque ventriculo molestis, & onus facessentibus, non statim somnolentus evadit? cujus ratio videtur esse quod cum inter spiritus stomachi, ac illos cerebri incolas maxime fit necessitudo & sympathia intima intercedat, ita ut utrique alterutrum afflictiones &

mala invicem subeant, hinc facile accidit ob spiritus illos qui ventriculo præsident, summe oppressos, & ab expansione libera præpeditos & quasi repulso, mox totius Animæ hypostasin, ac imprimis partem istam principem cerebro præpositam, pariter coarctari, vela sua contrahere & se totam somni jugo submittere: Quanto magis opinari subest, si quando spiritus stomachi succum Opiaticum imbibentes venenatur, ac in magna copia delinuntur, statim cunctos illos circa hypostasin excubantes concideat prius & somno opprimi? Si quis ergo in dosi nimis larga Opiatæ sumit, tunc in ventriculo tum in cerebro noxam illico periscient, nempe in stomacho gravitas insignis & velut pondus immobile, ipsum & partes vicinas opprimere videbitur, indicio sane illius loci fibras (spiritibus qui prius aëtiabant eas interceptis) inanimas & velut cadaverosas fieri; D. inde ob particulas Opiatæ cum sanguine ad cerebri ambitum circumductas, ejusque cortici instillatas, spiritibus inde fugatis aut exinctis, corporis irresistibilis, & non raro lethalis subest quærit: quibusimò à noxa graviore, fere tantum ventriculo narcotici fortioris usu indicta, novi interdum mortem ipsam, priusquam somnus longa ambage accendens obreperet, insuper quam fuisse: *Trat. de Anima Bruta. parte 2. cap. 5.*

Iterum vero inquiri, Annon etiam ab humore narcotico, intra nos gignitur (proxi à chymicis quibuldam asseritur), exoriri possit? Id satis constare nibitor aliamodi particulas morbificas, quam sunt elementares & humorales, in corporibus nostris produci, eaque variis modis afficere, videlicet præter aquosas, terrestres, biliosas, pituitosas aut atrabilarias, etiam vitiolicas, nitro-sulphureas, aliaque scilicet ut sulphurum enormium participes, atque malo nostro aditum deerege licebit: Pathologia ipsa modica non alia ratione explicari potest, nisi supponendo corporecula quorundam extraneæ, & velut nitro-sulphureas, quæ spiritibus adherentia, & ab illis denuo elisa ipsorum impetus quasi explosivos clement: Partes opinari fas sit alias aliis indolis, forsan sulphuris vitiolici aut narcotici æmula progigni, quæ si quando in cerebrum & nervosum genus interceptis, spiritus quosdam animales extinguntia & hængia, eorum deliquia & celypsas, quales in venigiis, apoplexia aut paralyti obveniunt, passim inducunt, Quare in somnolentia quavis diuturna spiritus animales tali copula lethara onustos suspicamus. *Mem.*

malignæ aut male iudicæ, vel cum cephalalgia, aut affectibus quibulvis convulsivis supervenit: vel à capitis ictu, casu ab alto, aut propter abscessum in meningibus disciprum excitatur, nam propter hujusmo-

diaccidentia, interior cerebri medulla ita comprimatur aut succui, aliove alterari solet, & proinde ita itumescit spirituum orbitæ sive tractus obliterantur. Th. 1788. *Traité de l'Anima Hum. part. 2. cap. 4. p. 317.*

OBSERVATIO VI.

§. Sopor ab aqua dura meningi circumfusa.

Ferdinandus III. Rom. Imperator, variis affectibus tentatus, tandem Somnolentus, &c. In eo cerebrum, cætera penitus saluum, præter humorem aquosum, qui duræ meningi copiosius infusus somnolentiam ei ultimis mentibus causavit. *Vide l. 3. tit. de vomitu.*

OBSERVATIO VII.

Sopor ab aqua cerebrum inundante.

Hydrocephalus familiaris pueris affectus, qui non solum, ut *Celsus* ait, cutem inflat, i. e. extra calvariam gignitur, sed etiam inter membranas cerebrum obvolventes, & sub ipsis sit, & etiam in adultis, ac quandoque in senibus, de quo *author Introductionis*: Quod tandem *inquit* intra meningem cerebrumque incidit, insanabile est. Hoo morbi genere laboravit, cum obiit, admirabilis Princeps *Clemens VIII.* Pontifex Max. cujus cerebrum repertum est in aqua natans: Erat autem illius aquæ quantitas circiter libram & amplius: Hinc Somnus fere inexpugnabilis. *Hieronymus Rubens ad cap. 2. lib. 4. Medic. Celsi.*

OBSERVATIO VIII.

Sopor ab humiditate serosa copiosa in cerebro.

Pellus nono vitæ mense soporosis, imo lethargicus suffocatus obiit, In cujus capite dissecto apparuit copiosa humiditas, serosa potius: *Raymundus Iohan. Fortii Centuria IV. Consult. LIX.*

S C H O L I A.

Serum sanguinis vehiculum, cum natura sua mollescit sit, ac frigidum & humidum, somnolentiam cum est excitare; *Insidiary* quidem si solum & simplex, ob naturam ejus facile resolubilem: So-

porosum autem & *Insidiary*, si excremento cerebri mucoso, vel aliis humoribus (præter bilem) commisceatur, *Cervinus Psyl.*

A P P E N D I X.

Caraphora inducta à collectione humoris inter cranium & capitis cutim.

Mihi perspectæ fuerunt duæ collectiones humoris inter cranii os & capitis cutem contenti, unde in altero agro extitere *motus convulsivi*, in altero tandem Caraphora gravior. *C. Fictor Schneiderus lib. de Affect. Soporosis pag. 241.*

S C H O L I A.

Collectiones humoris, &c.] Ideoque *Hollerus* lib. observat. §. 1. molliter digito contingendum locum suadet, ut si quid saniei vel puris subest, aperiat locus mentis gravioris mali, Anno 1655. meæ curæ & Clariß. Dom. D. Alexandri Diodati, Facultatis Decani, commissus est D. N. Senex optimus, melique amantissimus, qui ex sedili malo collocato deciduus, occiput pavimento allisit: Casum nulla insignis noxa pro tempore consequuta, sed, opificio per tres hebdomadas vacavit, quamquam torpor & gravitas caput teneret: At tandem caraphora interpluit, per plures dies continua, comite summa virium debilitate, ut per octiduum cæcio proximis

creditus sit. Lacessitus & vellicatus ad interrogata respondebat, sed faceret, quod nequaquam illi innotatum erat, protinus in veterum relapsus, Toto in valetudinis decursu manum occipito afferebat, & quoque remota, sponte illuc inclinabat. Multa parti admota topica, caraplastura, foras, liras, emplastra, pulli extenuari, &c. Inani successu. Tandem me auctore, & assensiente dicto Excell. Dom. Diodati, ampla ab experientissimo Chirurgo Francisco Sabourin, admoveat cucurbitulum cum profundis incisuris, cujus ope multus elicitus cruor nigricans, sed adeo celesti inopia, ut proximis discussus sit sopor, vires restituitur brevique sequens valetudo

valetudo; omnibus desperata; supervisique optimus senex totos annos decem, silicernium factus, & nonagenario proximus. Ambigua fuit apud alios morbi idea, ego *Cerephoram* vocavi, nec enim *Lethargus* fuit, quia defuit febris *crassa*. Noo Carus quia *ager* excitatus respondebat. Nedum Apo-

plexia, quia integra fuit respiratio, nec sequens paralyfis levis apoplexiæ soboles, cum omnimoda lentus & motus privatione. Affectus causa verisimiliter fuit cruor inter cranium & pericranium collectus, quem exhaustis cucurbitula: Ostendit curatio.

OBSERVATIO IX.

Coma Lethargicum ab aqua limpida copia in ventriculis.

Quidam melancholicus, Comatosus & aliquantum Lethargicus factus est, &c. magna satis aqua limpida quantitas in ventriculis reperta est. *Vide Tit. de melancholia.*

S C H O L I A.

Aqua limpida] Lymphæ proculdubio: Vasa lymphatica, ait *Excell. Th. Bartheolinus* Cent. 4. hist. 38. in abdomine, thorace & annis hæcenus innotuerunt. Solum caput ita cætere præter æquum & fas ita visum est, &c. hæcenus tamen accurata diligentia nihil comparavit quod nomen hoc meruerit. Pauciores sint occisæ est, partim quod emunctioris

alio abundet caput, partim quod cum recurrente per venas jugulares sanguine secum infestota perat, partim denique quod phaenomena morborum id evidentius testentur; Propter istam enim lymphaticorum paucitatem aqua expe principio nervorum immittit, paralyfis Apoplexiam, Soporem, stuporem, aliaque generi nervoso inimicas affectiones inducens.

OBSERVATIO X.

S. Lethargus à sero ad libræ quantitatem ventriculum cerebri dextrum implente.

PVer XIV. annorum, duobus mensibus ante obitum caput casu ex alto alisit, & in dolio à literarum commilitonibus rotatus fuit, postea in febrem incidit, & primum empiricorum opera usus, hinc Ego vocatus fui: Inveni puerum leviter febricitantem, stupidum, intus ebrii incedentem, non sitientem, conquerentem de dolore capitis, absque rubore aut inflammatione; postea oculis clausis obmutescere, dentibus stridebat. Frustratis clysteribus, cucurbitulis aliisque remediis, & licet loquutus sit, mox tamen obmutescere, Paulo post moritur.

Aperto cadavere, Inveni pulmonem dextrum & epar accrevisse, & ventriculum dextrum cerebri aquæ libræ continuisse, Cui Lethargus imprimis adscribi debere videtur: *Chiffletius Observ. Singular. 11. p. 9.*

S C H O L I A.

Aque illi ventriculum cerebri dextrum opplenti cum in ea æque tantum aquæ, cerebrum premendo, ooo sine talioe Lethargum adscribere videtur, actiones animales plurimum affligere valocit.

OBSERVATIO XI.

Sopor Lethargicus ab aqua anteriores duos ventriculos opplente, substantiamque cerebri adeo premente ut anfractus inconspicui essent.

VIdi puerum (*Tit. de Hydracephalo*) cui caput in incredibilem molem increverat, ac tandem in Soporem lethargicum lethalem incidit. Invenimus in duobus anterioribus cerebri ventriculis aquam crystallo clariorem ad libras XVIII. quæ substantiam cerebri ita distendebat ut gyri cerebri non conspicerentur.

OBSERVATIO XII.

Comatosus affectus, ab aqua citrina nervorum origini incumbente.

PVella post epilepticum insultum, in Comatosum etiam affectum incidit: Scissa transversim cerebri substantia, stagnantes aquæ citrinæ nervorum conjugationes inundantes patuerunt. *Vide lib. 2. tit. de Turpi.*

OBSER.

OBSERVATIO XIII.

Sopor profundus à sero ad caput amandato ob vitium renum perforatorum.

Comitissa quædam stertilis, in reditu ex Thetmis Helveticis; in profundum incidit Soporem, adeo ut nocte tota, matutinoque tempore ad vespertam usque somno obruta, non nisi admodum impulsâ ab eo excitati potuerit, à cibo potuque abstinentes, & ubi per unum excitata vigilasset, mox iterum obdormiscere solita: insuper & aliis accidenibus, inter quæ & pedum tumor atque inflatio erant, oppressa tandem expiravit.

Corpore aperto, abdomen pinguedine supra modum, transverse manus spissitudine obiectum, intrinsicisque omentum, mesenterium eadem admodum repleta deprehensa, uti & hepar lienque vitata. Renes insuper perforati erant, sicut in hydropse aëte, qui ab epate fisso & renibus oritur. Præterea in vesica fells, quæ tota ampla, sed nigra erat, loco bilis qua destituebatur, Calculi innumeri inclusi erant, coloris cinerei & subviridis, è quibus sex magnitudinem nucis moscharæ æquabant, rotundi, sed angulosi ac laeves, minores vero circiter trecenti, alii pisi alii sem. coriandæ, alii sem. taparum magnitudinis. *Fel. Plateri Observat. lib. 3. pag. 894.*

S C H O L I A.

Obscura hic Soporosis causâ, cum caput referatur non fuisse: Sympathicam aliquando esse fatetur, sed causam ex memoratis, per anaromen corporis deprehensâ, causâ sit accepta ferebatur, non liquet: Succedisse dicitur in reditu ex themis: An externus fuerit usus non constat, Si internus, nec commearint aquæ, eorum refectus ad cerebrum Coma potuit inducere, non dissimili ratione qua apoplexiam in Sereuili Langravio Hassia de quo Ohi. 48. Tit. de Apopl. Neque à pingui aqualiculo origo repetenda: Dubium an à Renibus perforatis, an à Calculis in cystis fells (felleis) ruptis & præterea aliquando accideret, quia, ut explicat Duretus, diffusio bile per totam compagem, delaudatur cerebrum suo elementari calore & sale: Itaque sicut apparetur in aliis, ita in huiusmodi. At hic nulla lèxi mentio, ut suspicio sit bilem, cui denegatus sit exitus ob oculum porum cholidochum interiora occupasse, atque ipsum profunde cerebrum, in quo vigilas porus & symptomata præterea quam præterea parere apta nata est. Nisi

admittatur feri in caput admissio, ob affectos renes, qui perforati erant, ac ob id serum vel non alliciebant vel à sanguine non secernebant, unde inducitur sit spiritum penuria, ad quam torpor & somnolentia succedisse; quo me verum nescio: Amplexendaque erit sententia C. Viç. Schæderi, qui lib. de affect. cap. Soporosis, Traç. de Lethargo, ejus sedem subjectum Cerebrum esse negat, etsi pinguis patri ad instar spongiæ infarcitur, & de solo cerebro coerceri principes facultates, quas vult toto corpore diffusas esse; nec edi ex organis privari, sed ex animâ sicut inftar luminis fundi: Itaqueque membri cupulibet dolore facultatem sensitivam per totum aliquando ita irritari posse, ut inde cuncta facultas animalis faciat: sed etiam in animam alius, et ejus operatio deficiat sicutque velut eclipsis, Cæci, aut, causa proxima est ejusmodi defectio, qua facultas animalis cuncta altissime in animam sese mergit, ut ægre revocetur ac quam minime interdum labefacta simul facultate vitali: causæ remotiores sunt et omnia que quandam animæ facultatem ita concite percutit, ut inde alliciat graviter faculas animalis coactas: Omnes animæ facultates latere ad tempus queant ac quasi intermori: Videtur dñm Schæderum L.

OBSERVATIO X.

S. Carus à Cerebro humidore genitus & sero in vasis totius redundante.

Virginem febri quam *Fernopola* vocat Galenus, infestabat: circa 6. diem *exceper* per protopathiam genitus, nam & remissionis tempore perseverabat, &c. Aperto capite cerebrum erat humidius quam è natura foret. (*Vide Tit. de cap. dolore.*)

S C H O L I A.

Cerebrum humidum Lethargum non à crassa lentagis pituita temper, sed sæpe à seroso humore, in toto primam, tandemque in capite universo ebulliente pendere probat (*Ar. Phys. de Morbis à sero part. II. sect. 2. cap. 6. exemplo Præstis, qui arthritidi vix accubissimæ, cum febre magna & continua semper conjunctæ obnoxius vixit, doloribus vero languentibus non ita post succedebat sensim gravis Sopor, qui vix duobus septenariis excui posset: cui accedebat morbus toto corpore & bre-*

vibus intervallis infestans, qui in vigilante conquiescebat, in sopito perpetuo excitabatur, cum oculis inconvulsius, sed semper madentibus, facie prætumida, ingenti mentis stupore & oblivione: Hinc demonstrat Vir Clariss. Lethargum humoris serosi isobolem esse, i. Quia symptomatum, quibus Lethargus definitur, congeries, febri arthritidi conjunctæ, non nisi jam aliquatenus progressæ, sub finem scil. primi septenarii, vel etiam serius, supervenire & nonnunquam præterire consuevit: Itaque Lethargus tan-

quam primigenia capitis affectio continui nequit sed per propagationem materię serosę capitis communicat aliunde, ex vasis totius, superfluit tamen priore foco succrescere sarendum. 2. Quia veteris ille ter quaterve, & saepius quotannis periodice recurrens, sponte sua & sine ulla artis præsidio soluitur. Quomodo igitur hoc fieri potest si à crassa lenisque materia, qualis est mucosa capitis pituita, duntaxat foretur. 3. Tumor faciei aquę concolor, id manifestum fecit. 4. *ipsum* ac utinam copiosę & aquosę peroris, dejectionesque liquidę. 5. Convulsio in toto motus serosum humorem fervore suo membranas cerebri varie impellentem ac distendentem & in se contrahentem & concutientem, et si non membrana ipsa, siue ob contractionis parvitatem, siue ob mollitiem nervorum vetustate morbi jam effectorum.

Febrii quam, &c. De febre Tritaphya comarosa vide eundem *signum* sect. 2. p. 2. cap. 4.

Nam per propatiam genus Somnus siue sopor, quacunque hora diei omnibus hemictanicis sensim obrepens, doloris aliqui nonin iucundum carmen

sive falcinus, à qua alia amabo causa, nisi ab humore seroso ex se *am*, i. e. irritantis qualitrax capere susciatur, in meatus scil. sensum expresso, à membranarum cerebri compressione, & sensus tardia deviniente quoad loci tempore fuerit resolutus? Quoniam igitur ex quatuor humoribus in sanguinis massa coarctatis in capitis vasis, bilis vigilas potius infert sua acrimonia & siccitate, reliqui autem, una cum eacremento cerebri mucoso, præ infra crassitie haud facile possunt solvi, itaque in meatus sensum appulsi non levem aut brevem somnum, qualis hemictanicam comitatur, sed contumacem afferunt: serum autem, cum natura sua mollebre ac frigidum humidum, tum præ tenuitate facile resolubile, proindeque somnum primis generi natum est caciare, & cum qui sit alioqui doloris præstantissimum remedium, (quod calor exactus pleonexiam serosam discutiat) ex alia autem parte idem est de vapore bilioso neque de ipsa bile iudicium; relinquunt profecto serolum in capite humorem somni in hemictania esse occasionem ac fomitem. *idem.*

OBSERVATIO XV.

§. Coma à refluxu feri exire prohibiti ob calculum renum & vesicę.

Margareta Nicola infestata aliquandiu à dolore lumborum, proclit tandem in crudeli calculi renalis tormentum cum urinę difficultate, & interdum tanta ejus pressione ut totos 18. dies nihil lotii reddiderit, unde excitabatur ipsi ex sero sursum recurrente Sopor, & mox contractio nervorum, ut cogeretur vitam cum morte permutare.

Dissecto cadavere apparuit ren sinistèr intus frequenti aqua & pluribus calculis infarctus, quorum maximus insinuaverat se, acuto suo apice, tam longe in ureteris principium, ut id integre occluderetur, neque permetteretur illac descendere quicquam lotii. *Nic. Tulpii lib. 2. Observ. XLV.*

§. 2. Joh. Anton. Maginus Mathematicus celeberrimus, à morte scđus, fāt magnum in vesica calculum ostendit, qui uncias x v. pependit, tot scil. malorum causam quę ille in vita perpessus erat: Nam integro octennio continuo urinę stillicidio & acrimonia graviter divexatus, cum semper de calculo dubitaret, & omnia in destillationem humoris falsi referret, doloribus tandem succubuit, superveniente febre continua cum Comate, quę causa extitit ut eum plerique apoplexia mortuum crediderint.

§. 3. Ejusmodi soporem profundum doloribus à calculo ingentibus supervenientem in V. C. Joh. Jacobo à Brunn Medico Basileensi observatum memoravit G. Segerus oratione de vitę ejus & obitu. Multos præterea ex Ischuria 5. 6. 7. dierum Comate extinctos vidit. *Joh. Beverovicium lib. de Calculo c. 9. Velschium Epistagm. Observ. LXIV.*

§. 4. Scribit G. Cleminius Jurisconsultus de Joh. Hebenstreit Medico præclaro 1593. Eum causarium diuque afflictum Calculo vesicę obisse, cui ovi magnitudine, sectione à morte reperto, per triduum sideratio accesserit, ætatis anno 64.

Coma ex Ischuria à calculo curatum commemorat J. Bevetovicus Epistolo ad Guid. Patinum scripta appendice de calculo. *Velschium Epistagm. Observ. 64.*

OBSERVATIO XVI.

§. Lethargus in Apoplexiam desuens, à vasis tenuis meningis circa synciput, sinu tertio sanguine turgidis, ventriculis lateralibus pure oppletis ab eorum ulceribus, &c.

Bartholomæus Feer Triboldinga Turgovius, adolescens x i. annorum, circa principium Novembris 1656. capite doluit, assumpta evomit, hujus causę carnificem consuluit, qui purgans propinavit & V. S. suavit; an præterea aliis medicamentis & qua dixta usus fuerit rescire non potui: In dies morbo in deterius vergente 11. Novembr. ad Nosodochium delatus fuit: Febricitare mediocriter videbatur, dormivit plurimum, expegefactus stupidus quasi erat & delira loquebatur: nec cibum nec potum petiit, oblarum & intrusum deglutit, cibandus erat infantis instar: urina naturali simillima. d. 15. Novembr. quo ipsum

ipsum cum D.D. Hardero conveneram, profundissime dormivit, ut ipsum nulla ratione excitare potuerimus: aiebant adstantes ipsum interdum dormire noctu vigilare, attamen inficius lectum perminxerat: In respiratione nullum adhucdum vitium observatum fuit: die 17. Nov. hora 10. noctis mortuus est: Ex ore demortui plurimum cruoris effluxerat: Dum ceufanus adhuc vivebat, odontalgia obnoxius erat, cuius causa fumum Tabacci hauriebat: an crebrius id fecerit? nobis non constitit.

Die 18. Novemb. caput aperuimus, Sublata cranii olla per duram meningem vasa tenuis meningis in synypite, ad sinum tertium meantia, vidimus valde cruore oppleta & triplo ampliora quam alias existunt, adeo ut primo intuitu circa verticem omnia sanguine suffusa apparent: verum incisa dura meninge nihil extravasati invenimus, ipse quoque sinus tertius sanguine turgidissimus erat: Remoto corpore fulciformi, primo cerebrum ad ventriculorum sinistram incidimus, protinus serum flavum satis copiose affluxit: Sublato prorsus fornice, conspeximus utrumque ventriculorum cerebri lateralem, maxime sinistram, humore purulento, viscido, instar pulvis fluidioris turbido, copiose imbutum; hic quoque ad ventriculorum tertium defluerat: Ventriculus quartus plane mundus, nec vel minimum confurcatus erat. Superficies utriusque ventriculi aspera & inaequalis & insuper flaccida fuit, dum enim blanda manu & levicula pus detergebam, saepe cessit statim medullosa substantia candido suo nitore privata, corticis cerebri instar flavescentis aut fuscifuscae apparens: In dextro ventriculo observavimus superius tabulatum seu fornix, imae ejus parti, humore hoc purulento intermedio aliquomodo agglutinatum fuisse: Plexus choroideus iisdem sordibus inquinatus fuerat: Aperto pectore, inciso pericardio effluxit aqua limpida flava: In corde nihil morbofi visum fuit: Pulmo in dextro latere leviter pleurae accrevit; minus rubebat: in sinistro latere firmiter pleurae adhaesit undique, admodum cruore suffusus: in abdomine, ventriculus, intestina, lien, pancreas, hepatis & ceterae partes à naturali dispositione non desciverant, quantum quidem oculis usurpare licuit: vesicula biliaria, bile coloris fusci plena fuit.

S C H O L I A.

Quall morbo primum Iovenis iste affectus fuerit, ignorabamus: cum 11. Nov. ad Nosodochium delatus iam Letargium esse, multum dormiret, experfectus deliraret, stuperet, obvisceretur ciborum & potus assumendum ut infans instat cibandus esset. Quamvis urina naturalis similis, non tamen protinus à febre immunis erat, licet intensio non fuerit. Die 15. Nov. quo ipsum cum Cl. D.D. Hardero conveni, Letargicus in Carum degenerasse quidem videbatur, quia à somno excurrit nequibus, verum & tunc remporis adstantes fidem faciebant illum interdum alio Sopore obdormi, noctu autem vigilare, sed omnium inmemorem, nam inficius lectum permixerat: In cadavere plura occurrerunt, quibus tum febris tum propemodum fere insuperabilis dormiendi necessitas deseri possent: In imo ventre nihil quidem visui per naturalem apparuit, nisi vesicula felica bile subfusca distensa, qualem in puero aliquando cephalalgia, & causam fuisse reperiit, nullo ad sentium vicio in cerebro animadvertito. A veribus in intestinis inductum Letargium tradidit Obliquus Obl. 10. pag. 8. In medio ventre pericardium aqua limpida flava plenum fuit, verum cordi nihil p. n. inerat quod manifeste febrilem fumem sanguini infelle produceret. Intra cranium per duram meningem tenuis quasi inflammata apparuit, verum illa difficilia vasa tenuis meningis, ad sinum tertium tendentia, triplo ampliora circa inflammationem, ipsique sinus tertius sanguine plenissimus apparuerunt, quod evenit à sanguinis circulatione impedita, vel protius intercepta. Pridem hoc factum fuisse credere non possum, quia cordis motus & respiratione integrus, via inflammatio cerebri, vel vasis rectorio in tenui meninge emanassent: non tamen negarim hanc sanguinis stagnationem mortem accelerasse: Potissima Letargii

causa in ventriculis cerebri lateralibus & tertio latuisse videtur, in sinistro enim ventriculo plurimum feri flavi, minus in dextro continebatur, quia tabulatum superius inferius parti agglutinabatur: Insuper amborum ventriculorum lateralem superficiem humore viscido, purulento, turbido, instar liquoris pulvis fatinacei, quo etiam ventriculus tertius & plexus choroideus inquinati erant, ventriculo quato mundo, quia glandula pinealis hujus humoris decolorum eo aique impeditur: denique deterso pure manifeste superficies ventriculorum exolcerata erat, nam aspera, inaequalis & flaccida fuit, & à blanda quoque detensione medullosa substantia secessit, summumque nitorem candidum aliquovis amittit, subflavique & corticis cerebri similior apparuit: Exulcerationem hanc cerebri proculdubio effecit serum flavum, a quo limpidiore, acius forte non nisi prius inflammatione quadam, An Tabacci fumus quo contra Odontalgiam utebatur, aliquid ad exulcerationem contulerit, certo non constitit, nam quomodo illo abusus fuisse nesciam, nec in reliquo cerebro fumi illuc penetrantis vestigia observavimus. In luvete isto serum non ceu primariam causam accusarem, cum plus aequo intra cranium contenta apud alios nihil Letargici pepererit, alioque motus genere perierit. Igitur plus tribuerem ulceribus in utroque ventriculo laterali superficiem depauperantibus, idque satis profunde, nam non solum magnam stragem spiritibus animalibus inferre: Illorumque curiam interceptare & communicationis filum abruptum valuum, unde dormienti quaedam necessaria & rerum obliquo enata est; verum etiam inquinamenta putrescentia ad substantiam medullosam sanam alius penetrarunt, deliriumque excitarunt; quaedam massa sanguine intra cerebrum

admixta febris lente causa evenerant, Apoplexia notem potius quam syncope exinctus videtur, nam vesperi ante obitum adhuc bene respiravit, nihilque minus ad stertres cogitavit quam illa nocte illum exinctum iri: Ad producendum Apoplexiam omnia vasorum repleto in cerebro, aque redundantia & ventriculorum ulcera conspirant.

Pulvis nimis ruber, &c. Pulmones in dextro latere cum pinnullo rubore leviter accreti erant, firmius in sinistro latere, similique admodum cruore suffundebantur, ut vel *Pleurisidem*, secundum Plateri sententiam, vel *Petipneumoniam* ostentarent; Verum hanc suffusionem sanguinis, vel nullam vel nonnulli recentem inflammationem dixerim, causam à sanguinis motu subsistere ab cordis motum in latente plethorico

subito abolitum, non fere ad ultimum halitum nunquam ad actum valde assuavit, facile respiravit usque ante obitum vespera, namquam tussis, ac urinae consistentia & colore naturalem exercebat.

Ex ore demantur plurimum cruoris Post mortem multum cruoris ex ore emanavit, qui oco ex cranio cavo effluxit, cum nihil cruenti sibi, sedulo cranio, visum fuisset, verum prodixit è facibus, ob venam aut arteriam aliquam in illis sedibus resectam, quod non raro accidit sterculentae sanguine post obitum, quibuslibet nulli particulis, sublato rectore ad sua principia tendentibus, aut ad praedominantis iussu aliam formam affectantibus.

J. Jacobus Wepferus Exercitat. de Apoplexia, historia xvi.

OBSERVATIO XVII.

Sopor sequutus insignem bregmatis sinistri contusionem.

Iuvonis vulnus in regione bregmatis accipit, mox Sopor adhaerit, &c. Tota regio bregmatis sinistri contusa deprehendebatur, unde sua sponte octo ossa abscesserunt, de quibus unum acutius in ipsam substantiam cerebri impressum per meninges inveniebatur.

Vide l. 4. tit. de Vulnribus.

OBSERVATIO XVIII.

Lethargus gravem sinistorum temporum contusionem sequutus, à sanguine cognato & nigro lateralem ossis sphenoidis sinistris cavitatem adimplente.

Marcus Prcné, ex pago Ondrevilliers, Ultrinæ ferrariæ in Audincourt Operarius, vir robustus, ann. 30. sub vesperam diei xii. Maii anni 1670. cum alio quodam ejusdem Ultrinæ operario firem habens, impaeto in sinistra tempora palo graviter ictus concidit. Surgit paulo post, & prolaris aliquot verbis, Casam passus forte 40. illinc distantem petit, portatilem bombardam in vindictam explosurus: Uxor maritum, quo minus clavis pendentem arriperet, colapho excipitur. Illico post super arca recumbit Marcus, & sopore profundo correptus proxima nocte mortuus est.

Vespere diei xiii. seq. visitato cadavere, nullus tumor, nulla lividitas externe apparuit, sanies è naribus putidissima & cadaverosa effluebat, & eadem lecti lintea è sinistrae auris effluvio madebant. Jubeo Chirurum raso in circulum capillitio, circumscissa communia cerebri involucra calanticæ instar scemovere: Hoc facto, sinister musculus temporalis ruber, lividus & confusus apparuit, nulla ruptura vel contra fistula: scitarto & remoto cranio, sanguinis circiter ijij . coagulati & nigri invenimus, qui lateralem ossis sphenoides sinistris cavitatem ita adimplebat, ut ab ejus copia incuneata, compressa meninges & cerebrum, ademptra spirituum animalium commeatus libertate, mortis unica causa iudicata sit, quæ nullibi in tota cerebri substantia & ventriculis quicquam inventum sit quod contra naturam esset. *I. Nic. Benningerus Cent. v. Observ. xxvii.*

OBSERVATIO XIX.

S. Coma à venis meningum sanguine melancholico refertis, Aqua in ventriculis.

Dom. N. melancholicus, comatosus & aliquantum lethargicus factus est, &c. Venæ sublato cranio apparent plenæ sanguine melancholico: magna satis aquæ limpide quantitas in ventriculis. *Vide Titul. de melancholia.*

OBSERVATIO XX.

S. Sopor à dura cerebri membrana sanguine & pure suffusa.

Quidam ad sinistram capitis partem percussus, mox Sopore prehenfus: Capite aperto reperta durior cerebri meninx sub osse petroso sanguine omnino suffusa cum purulento humore. *Vide l. 4. Titul. de Vulner.*

OBSERVATIO XXI.

Lethargus à Tumore scirrhoso membranis cerebri accreto, Et aqua limpida cerebrum alluente.

Mulier post gravissimum sex mensium capitis dolorem, tandem in Lethargum incidit. Cranio aperto, è latere sinus tertii, tumor scirrhosus membranis accreverat; cuius interventu utraque meninx aliquanto spatio mutuo accreverant, & vasa sanguifera constipabantur. Porro cerebri anfractus & cavitas interna fuit aqua limpida repleta, *Vide Tit. de cap. dolore.*

OBSERVATIO XXII.

§. Sopor à cerebri partis corruptione ortus.

Quidam vulnus accipit in superiore dextri oculi palpebra, sequitur Sopor: vulnus os penetraverat, Durius membrana & vulnerata & sanguine multo periusa erat, Jam corrupta cerebri portione proxima. Vulneri substantia ac viriata, quæ proculdubio exiti causa: *Defid. Tacot. comm. ad aphor. 3. lib. 1. sect. 3. conc. Hippocr. Vide l. 4. tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXIII.

Sopor à purulento humore circa cerebrum consistente, dura meninge sanguine suffusa.

Quidam baculo crasso ad sinistram capitis partem, supra aurem percussus est: Huic mox supervenit Sopor. Reperta est durior cerebri membrana, sub osse petroso, sanguine omnino suffusa: Purulento etiam circa cerebrum humore consistente. *Vide lib. 4. Tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXIV.

Carus à cerebri subsidencia, dissolutione & fluiditate excitatus, ob pituitæ copiam.

Si pituita substantiam cerebri largo humore perfundat & refrigeret Carum efficiet: Hæc sic se habere in Caro & apoplexia mortuis ex eo patet, quod copiosus hic humor per os tunc illis aliquando effluerit: Et sectione quoque diligenti aperta crassa meninge in quibusdam copiosum humorem mox profuscentem observavimus: *Vide supra Tit. de Apoplexia.*

OBSERVATIO XXV.

Sopor à flacciditate cerebri, Lapide in eo cum aqua in prioribus ventriculis.

Adolescens XIV. annorum, semisatus, Somnolentus fuit, &c. Substantia cerebri omnino erat flaccida, Pia mater illi circumjecta. Aqua salsa inter duos priores ventriculos, Calculus in dextro reperitur. *Vide hist. tit. de menis sapore.*

OBSERVATIO XXVI.

§. Sopor à cerebri Substantia Sphacelo affecta.

Cvidam vulnus illatum in superiore capitis sinistra parte, &c. Supervenit huic Sopor: Reperta est dura meninx sinistra parte livens, sub hac cerebri substantia sphacelo correpta. *Vide lib. 6. cap. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXVII.

Coma ab abscessu in penetralibus cerebri.

NOb. N. catapulta ictu circa Tempus dextrum laesus est; hinc comatosus factus: In cerebri penetralibus abscessus est reperiens. *Vide l. 4. tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXVIII.

Cataphora inducta à carie ossis frontis, & Lesione superioris orbitae.

Quidam grandævus Gravedine capitis afficiebatur, tandem subito in cataphoram incidere, & quidem lethiferam: ea nec levare poterat nec liberari: Patfacto capite defuncti, reperiatur os frontis carie confectum, & quidem aliqua tantum ex parte, cerebri salvo ac ejus integumentis integris. *C. Vidler Schneiderus l. de aff. cap. Soporis pag. 241.*

S C H O L I A.

Galen. 4. de loc. cap. 2. testis est urgete cataphoram, vel minima squammula ossis faciat mota: idque saepius compertimus: Cuidam os frontis & sinuiparis erat gladio scissum, sic ut innarent meningibus frusta ossa: Si soclex vel dexterime admoventur, in cataphoram labebatur miles, interdum motu convulsivo repetitus: Inde nec comprimebatur cerebrum, nec initium nervorum, nec spiritus animales consumebantur. Mercatoris cuiusdam filius sex annos natus prono ore incumbere in obtuse fistigiarum lignum, mox omni vi renitens prosternebatur, ut illud effringeret superiorem orbitam oculi sinistri: Hic dicto citius stertere cepit, cum aliter soporatus: interrogatus inclamatusque qui haberet leti respondit vertigine se laborare, ac oculis flava oberrare ac viridia, ac inrenitente simul consilcantia fulgura: Hic ea cataphora nec excuti poterat ullatione, nec exolvi: sexio die quam hanc exceperat plagam interit cataphora: aegre exciebat, mox obuebatur facultatis animalis ablatione, graviter stemens: integer mentis erat, animique sensa non verbis sed motu probebat: jam excisus; nec ulla jactabatur

febre: Illa pontio orbitae leviter laesa erat, unde nec ee ebri medulla, nec ventriculi, nec denique initium nervorum potuerunt comprimi, ita ut deinde deficerent spiritus animales: Uti sumus, inquit *Hierales Saxonia Pract. lib. 1. de dilem cap. 2.* cerebatione, & invenimus os corruptum, & supra meningis copiam pituitae, unde in soporem & paralytin incidebat semper: quo tempore foramina erant aperta, melius habuit, sed cum ocellulum esset foramen (nam invito Chirurgo excrevit caro) Sopor rediit, & ita perduravit usque ad mortem. Multi perspicue fuerunt duae collectiones humoris inter cranii ossa & capitis ceream, consenti, unde in altero agro existeret motus convulsivi: In altero tandem cataphora gravior; Tam mira est proprietates facultatum animae; Ab earum enim consensu status originem soporosis affectuum deduco, non à vapore narcotico, nec à spirituum animalium defectu, cum proxima causa; ita utens tam esse ceptam cum facultatis animalis, cumque abolitionem, ab aliqua facultatum animae male affecta:

*Qui plura vult, videat dictum
authorem.*

OBSERVATIO XXIX.

Sopor cum stupore à Tumore duro in cerebri, & aqua cerebrum irrigante.

Soporem vidimus in Barone quodam qui longo tempore attonitus, nihil secundum rationem agebat &c. Aperta post mortem calvaria, tumor p. n. durus, supra callosum corpus reperiens, cum humoris copia qui cerebrum irrigabat. *Vide hystoriam integram Tit. de mentis lesione.*

S C H O L I A.

Supra callosum cerebri corpus] Quod spirituum dispersioni potius quam generationi destinatum est; unde illo ab equimodi globoso corpore com-

presso, inertia functionum omnium animalium subsequuta est. *Vide Clariss. Wilsium Anat. cerebri cap. 10.*

OBSERVATIO XXX.

Sopor morti proximorum & scorbuticorum, à spirituum penuria pendes, cum cerebrum ab illiusvis serosa immixta reperiatur & satis exsuccum.

Somnolentia & Torpor insignis scorbuticis frequenter accidunt: in quantum scilicet spiritus animales particulis vel aquosis aut narcoticis onusti ac plurimum aggravati intra cerebrum, etiam valde obstruatum, motus pernices & expeditos non facile ineunt, neque

neque functionum suarum actus & exercitia diu continuant, quin succumbere, ac otio & quieti indulgere amant: Porro hujusmodi affectus quandoque à spirituum animalium defectu penuria excitatur: Etenim à sanguine plurimum vitiato & quasi efferto, liquor nonnisi tenuis & vigoris omnisfere expers cerebro & nervoso generi suppeditatur: A tali *œmptio*, In moribundis Lethargum excitatum novi, quo scilicet affecti, licet somno continuo indulgere videantur, interpellari tamen illico adstantes noscere, & affatis quibusdam respondere solebant: Spirituum vero animalium copia fatiscente, nec diu evigilare, nec ad colloquia longiora attendere valebant: Tales demum cum somno perpetuo obritos apertui, cerebrum faris exsuccum, ac hydropo aut colluvie serosa, quibus Lethargici plerumque afficiuntur: prorsus immune deprehendi. *Thomas Willis Traç. de Scurbuto cap. 4.*

S C H O L I A.

Spirituum animalium copia fatiscente } Baro Caci speciem quidam volunt que har arteriis carotidibus & intusculis temporalibus affectis: cūmenim hæ spirituum viralem, animalis materiam ad cerebrum vehant, illis lætis, huicque transiui negato, priorum generatio non fit. Stabilire hanc caci speciem videtur *Polydorus Anar.* lib. 6. cap. 11. quē refert *Columbanus* publice in theatro demonstrasse in adolescente, soporem induci ab arteriis carotidibus compellitis vel constrictis: Huc quoque pertinere videtur hystoria à J. Colleo allata disquis. physiolog. lib. 6. cap. 6. Movendi sentiendique opera (ait) non sine spirituum fieri afflumi docente circulatorio: Capra illis est, cuius nervis atque arteriis jugularibus injectum vinculum est, quod arbitrari suo contrahere possunt & laxare: eo igitur clam contracto, attonita illa coeruleo, laqueo repente, resilit: simillimo argumento prius prohiberi, mosque in corpus admissi spirituum curus: Lucem addere videtur relatio de Mahumetanis, qui Christianorum adulterum præputia amputauri, colli arterias de venas constringere solent ut indolens exerceatur operatio.

A sanguine &c.] Ex sanguinis circulatione male peracta soporosis affectus excitari posse demonstrat Cl. *Rafaelus* Dissect. Anatom. lib. 6. cap. 50. Somnus na-

turalis ait, quies primi sensorii ut sensorii, sit vaporibus vel humoribus per arterias & rete mirabile ad nervorum principium deluuiis: Præternaturalis, imo Imaginationis retolutio in Caro, ab eisdem obstructione, vel spirituum à sulphureis narcoticis, per arterias ascendentes vaporibus, fixatione: Per calidam arterias ascendentes vapores & humores narcotici & fixi, excitant Coma somnolentum & Vigil & Catalepsin, nisi per venas debita circulatione moveantur. Et *Carpius*, lib. 1. ubi sumit p. n. iuxta recentiorum placita, causas per soporem adducit, Lethargi causa immediata; ait, est impeditus spirituum animalium in organa sensus & motus transitus: Mediatæ sunt humores crassiores, pituitosi, in massa sanguinea contenti: Ad Chymicorum placita si respiciamus, accusari queunt hic Sal. Sulphur, Mercurius; Ad Helmontii placita, Acor: Ad Fabri Staurata, Chyli pravitas; Sylvius si assiduat, peccabit Sal acidum fixiviosum, & Sulphur oleaginosum, pancreatis & fellæ vesiculæ errore non expurgatum: Humores hi non generantur in cerebro, sed in visceribus confectioni & depurationi sanguinis destinati, corde nimirum & jecore præcipue, indeque, orta cacochymia, & per *adventum* ad promoveatur.

O B S E R V A T I O XXXI.

Soporiferus capitis dolor ab abscessu sanioso circa nervum opticum, una cum glutinosa & pellucida aqua.

SOdæ subethicæ hic jam multos interficiunt poros, quorum è numero ante sex dies D. N. filium cūm eum xiv. die sopor citra febrem rapuisset, Dissecto corpufculo omnia salva reperimus, tantum modo in media parte cerebri sinistri, supra oculum sinistrum, prope nervos opticos, sinum apostematæ, castanæ magnitudine, vacuum deprehendimus, (jam enim in ipsa serratione calvarix pus per nares exierat mortuo) quem cum amplius videndum palparem, & sinisterius cerebrum eximerem, erupit clara muicilaginis subtilis instar aqua ad dimidium usque libram, quæ sub cerebro supra nervos opticos & rete mirabili vocaro delituerat. *Epist. Ach. Gasseri ad Gesnerum & I. F. Rumlerum observ. 73.*

O B S E R V A T I O XXXII.

§. 1. Sopor ab apostemate in cerebro, vulnus capitis secuto.

IN Nosocomio Patavino 1645. caput aperuimus viri in osse temporum vulnerati, qui sine delirio, paralyti & pulsu febrili x. die soporosis decesserat: Vulnus ad cerebrum penetraverat, ubi Apostema excitatum pure copioso abundans, vicinis partibus ad nigrorem vergentibus. *Thomas Bartholinus cent. 2. hystor. 34.*

OBSERVATIO XXXIII.

§. 1. *Lethargus ab abscessu & pure in anteriore cerebri parte.*

Mulier quædam honesto loco nara, cum aliquot diebus capitis gravitate laborasset, adeo fuit somnificulosa ac in somnum propensa, ut quæcunque agens dormire semper cuperet ac assidue in somnum dilaberetur, à quo initio excitari potuit, tandem vero accedente febre non potuit: Remedia multa huic tarde adhibita, sed tandem mors supervenit.

Capitis hujus cranii osse sublato, abscessus in anteriori cerebri parte repertus, & pus interiori ossis cranii parti adhærescens, quod & à natibus paulò ante mortem irritatis profluxerat. *Dedonam Observat. Medic. cap. 7.*

S C H O L I A.

Aetius ex variis causis Lethargum originem ducere refert, & aliquando cerebrum per consensum, quandoque vero primario laborare: verum iste Lethargus propius cerebri morbus fuit, & quidem partis anterioris, cujus patris affectum Lethargum esse veteres testantur. Fit autem cum pituitosus sanguis præpoller, quem in presenti lethargia copiosum fuisse pituitosus sanguis ostendit, atque adeo quidem lentus ac viscosus, ut simul cum aqua permixta instar juris carnis muculosæ concretus mox fuerit, tenuis gelatinæ speciem & consistentiam referens, quod nonnihil admodum crudo, pituitoso viscidoque contingit: Talis autem sanguis in quocunque morbo apparuerit, crudorum, pituitosorum humorum tedandantiam ostendit, & morbum lethalem, aut diuturnum & difficile curabilem: nobis certe lethales observati sunt morbi tali apparente sanguine. *Idem in annotationibus.*

Accedente febre] Putrescentem ut cerebrum pituitum Lethargum efficere docent, febremque comitem inde accendi: Verum nos ex pituitæ putredine, præsertim in capite, febrem accendi posse negamus, qui non capimus quomodo idem humor pituitosus putridus, sua frigida Carum, & calore febrem accendere; atque unum idemque & frigidum & calidum

esse queat, cum contraria in eodem subiecto non possint consistere: Ideo longe aliam Lethargi causam, eamque à Carli illius qui febres sequitur, non adeo diversam assignamus: In venis melancolicis febrium intermitentium materia putrescens calore attenuata, copiosiusque sursum, in prima pueritiam invasione, ad caput delata, soporis hoc symptoma, in tertianis & quartanis nonnullis, in principio accessionis, dum frigus adhuc preget, necdum corpus penitus incaluit, accidens, & interdum ad insomnium usque parasitimi petiverans, parit: Sed & in febribus continuis, cerebrum dolore præcedente diuturno & grave labefactum, in vigore, vel post ipsum, Caro subloquente percolsum, ægrium in summam difficultatem adducere læpe observati: Quod & in principis continuarum febrium si accidit, & mox propter nimiam evaporationem princeps hæc pars, cerebrum aliquo pacto præsertim ad Carum dispositum, ita labefactum ut sopor gravis sequatur, Lethargus is est qui cum febre continua copulatus est & mox cum illa invadit; ab alio Caro qui in declinatione febrium accidit, periculoso quoque, nisi quod statim cum febre incipit, differtur. *E. Platneri Pract. lib. 1. cap. 11. Vide Semertum Pract. lib. 1. part. 2. cap. 20.*

§. 2. Juvenis cum lapide ad tempora ictus, statim in Caron & profundissimum somnum incidit, à quo non potuit excitari, quanquam à Chirurgo bene tractatus, altero die somno permanente obiit: Quemadmodum alius puer annorum novem, qui cum instrumento ligneo oblongo paulo supra frontem percussus, Caro etiam percussus fuit, febre acuta etiam superveniente, sed hic somnificulosus vitam longius produxit, & in septimo obiit.

Capitis hujus cranii osse sublato, in anteriori cerebri parte abscessus repertus est. *Forensis libro 10. Observat. 40.*

OBSERVATIO XXXIV.

Lethargus à cerebri apostemate, cui Sphacelismus successit.

Puer 11. annorum Julio mense 1545. cum prius Lethargo laborasset ante paucos dies, vel stupore quodam non admodum gravi: à quo cum sanus factus videretur, demum in Lethargum gravissimum incidit & statim cerebri sphacelismus: Videbatur autem dum profundissimo somno detineretur hemiplegia laborare, nam tota pars dextra paralyti resoluta, neque movebatur neque sentiebat; nihil loquebatur, quamvis subinde garrire videretur mulitando, quæ nemo intelligebat, neque ullo modo, caudicis instar jacens, à somno excitari poterat, Tertius dies erat ita jacens absque loquela in castello patris: Ad hunc evocatus, thymum (cum nihil aliud esset ad manus) contritum cum aceto, glandis instat cum aceto nari dextræ imposuimus ad excitationem à somno, ut & materia crassa viscida dissolvi posset & ad nates derivari: atque hoc adhibito remedio nonnihil reviviscere videbatur, ut oculos

ut oculos aperiret & verba quædam indistincta proferreret, & è nare materia quædam crassa valde corrupta, sanguinolenta, viscosa instar putridæ saniei prodiret : Hæc cum vidissem puerum abscessum una cum sphacelo in parte dextra cerebri habere pronuntiavi & cerebrum corruptum esse, unde nec puerum diem supervivere posse prædixi ob materiam corruptam, non solum ventriculos cerebri obstruentem, sed & totam ejus substantiam corruptentem &c. Eo quarto die ut prædixeram, defuncto, rogatus fui ut cadaver aperirem.

Cranii osse sublato, cerebrum & cerebellum in parte dextra, vergens ad posteriorem partem, omnino saniosum, putridum, corruptum, sanguinolentum inventum est, apostemate ex lethargo in abscessum & sphacelissimum permutato : sinistra vero pars cerebri album, sanum & incorruptum habebat : *Forester lib. 10. cap. 11.*

OBSERVATIO XXXV.

Lethargus non semper sequitur ad apostema cerebri.

Non semper Lethargus ex capitis apostemate provenit, Neque omne capitis apostema Lethargum inducit : Observavi enim quendam ex diuturno dolore capitis, longæque vigiliis afflictum; tandem levi delirio & convulsione correptum perisse : Et aperto cranio inventus fuit abscessus, cum pure admodum fortente & corrupto : Quare dici debet non semper lethargum ab apostemate induci, sed tunc præcipue cum non circumscripta margine, sed in omni cerebri substantia humor diffusus putrescit : Vel cum apostema circumscriptum mediam & præcipuam cerebri regionem, in qua arteriosi plexus continentur, occupat, ita ut spiritus omnino opprimantur vel corrumpantur : Cum verò apostema locum certum circumscriptum in cerebro habet, & reliquæ ipsius partes remanent liberæ, nec spiritus opprimuntur in illis, & possunt ex illis ad organa sensuum diffundi, tunc non sequitur, neque lethargus, neque comatosus sopor, licet apostema fiat, ut in exemplo allato, *Sebastianus Nafius Meth. Med. Part. 2. p. 243.*

OBSERVATIO XXXVI.

§. Carus & Soporosis affectus à tumore Phlegmonode meningum & cerebri exterioris ambitus.

In dissectionibus Anatomicis sæpe vidi meninges, imo quandoque & cerebri exterioris ambitum, tumore phlegmonode obfissas; atqui laborantes minime phrenesi, verum è contra torpore affecti à Caro aliisve morbis soporosis interibant. *Vide tit. de Phrenit.*

OBSERVATIO XXXVII.

Carus ab abscessu tunicato post vulnus in capite genito.

Miles acinace faucibus fuit in posteriore capitis parte, Die 22. loquelam amisit, cerebrum Caro fuit correptum: die 23. obiit. Remoris proximis cerebri integumentis, Abscessum tunicarum monstravimus, in sinistro cerebri latere latitantem, ex quo pus foetidum magna quantitate fluxit : His consideratis ventriculorum cerebri sinistram aliquantulum compressum : dextrum vero aqua limpida distentum vidimus, &c. *Vide tit. de Paralyfi.*

OBSERVATIO XXXVIII.

Lethargus ab abscessu purulento in substantia cerebri, vulnus orbitæ oculi sequuto. Et osculo duram membranam pungente.

Rusticus consistentis ætatis phalangie in palpebram superiorem oculi sinistri vulneratus, parum sollicitus de vulnere non admodum conspicuo, Chirurgum accedit ob imminuentem capitis dolorem, qui ea quæ oculorum & palpebrarum vulneribus conveniunt, imponit, à quibus solutio continui penitus curata videtur : At vero cum circa septimum Coma quasi vigilans, & sensuum torpor sese offerret, accitus quoque fui : vires ægro adhuc ita constabant ut ex superiori contignatione in inferiorem ad nos descenderet : Consideratis circumstantiis, anguem in herba latitare dixi, tum ob subitam consolidationem externæ lætionis,

læſionis quàm ob læſionem ſenſuum interiorum? Arſequentibus diebus magis magisque inclinatio ad ſonnum augetur, donec die obierit nono.

Poſt mortem cranium apertum fuit, ubi interiùs orbita oculi in ſuperiøre parte punctim ita læſa conſpiciebatur, ut una etiam officulum in duram meningem dilaceratam imprimeretur: Separata vero dura matre, tenuis meninx etiam in eodem loco foramen inſtar fonticuli ſaniem expellentis exhibebat, ſub quo rannus abſceſſus putulentiſſimus latitabat, ut ſuperior cerebri ſubſtantia omnino in pus converſa videretur, quo undique cerebri ventriculi, ſuperius & inferius replebantur. *Gr. Herſium Tomo 2. lib. 2. Obſerv. 4.*

S C H O L I A.

Mirum tam brevi tempore abſceſſum geotum fuiſſe? an forte canicularium æſus antiam præbuit? hinc ſere quibuſdam in locis calidiõibus vulnera omnia capiti lethalia ſunt. 2. Mirum præter lethargum imperfectum graviora non ſuccellile, paralyſim, convuſionem aut apoplexiã? An forte quod vulnus baſin cerebri, adeoque initiũ nervorum non attingeret? 3. Mirum in tanta cerebri corruptione ratiocinationem, licet obtuſam, ſere ad mortem per-

manſiſſe? An quia cerebri ſubſtantia primatim operationis cautã eſt, quæ ex altera parte adhuc illæſa conſpiciebatur, quæ ratione ſæpe jecur ſcitino &c. laborans, nihilominus ſana ſua parte ſanguificat? Mirum in tanta copia repletis ventriculis cerebri per materiam putulentam, nihilominus animales operationes, licet imperfecte fuiſſe præſtas? An quia ventriculi cerebri ad extremum recipienda putillimum formati ſunt? *Mem.*

OBSERVATIO XXXIX.

§. 1. Lethargus ſymptomaticus à Pulmonum vitio inductus.

Domina le Boindre morbo Medicis incognito, ſed tandem inter legendum ab Hipp. deſcripto perit, Cujus ratio renenda eſt ad unguem, quoniam Medici valde decipiuntur: Er Domina Garnier non diſſimili morbo conſumpta fuit: utraque comatoſa, ac velut lethargica interiit, Affecti valde Pulmones reperti ſunt. *Cul. Ballanius Epid. & Ephem. lib. 2. pag. 118.*

S C H O L I A.

An lethargus à Pulmone eſſe poteſt? Ita ſane eo modo quem Hipp. deſcripſit 3. de Morb. *Morb. Lethargi appellati ſunt idem ſtatu ac peripneumonia, & non omnino remota ab humida peripneumonia: Tuſſis & ſopor ipſum tenet, cum moriturus eſt, multum & liquidum egredi: Idem repert. lib. 2. de morb. Ac Lethargus proprie eſt affectio cerebri: ſed hæc affectus, qui proprie affectiõnem pulmonis ſequitur, & facile cerebro communicatur, ob pulmonum & capitis viciniam, biſariam aut triſariam à ſimilitudine quadam Lethargus appellatur, 1. quia hominem lethargum l. e. ignavum & comatoſum cum febre reddit: lethargum enim impotentem, ignavum & abjecti animi hominem vocat. 2. Quia lethargicam in cerebro diſpoſitionem facit, quæ craſſorum vaporum elevationem à pulmonibus concaleſcentiã excitatorum: talis enim ſpecies peripneumoniæ à petuiſa putri eſt, cujus craſſior vapor ſerrens cerebrum, veluti hominem lethargicum facit: Sic enim obſervavimus ex Galeno in febribus, & præſentim earum acceſſionibus ſæpe ſoporofos affectus per ſymphuſiam contingere: 3. Lethargus dicitur, quia cum obſtructi ſint à pulmonibus pituita inſarctis marandis, & viæ liber aditus, & exiùs ſpiritus non ſit, & ſic lethargicum quid inducitur, quia ſoporem inſtar eorum qui lethargo tenentur: Hæc notanda ſunt, ne male conſulas capiti cum omnino ad pulmones ſtudium referre oporteat: *Mem. thidem.* Rem prope affectus Saxoniae Pract. Lib. I. cap. 4. locum Hippocr. 3. de Morbis & Coac. prænot. afferens, qui lethargum àſſe deſignare ad ſupparationem præcipue*

pulmonum: Ex exemplum uxoris, quæ à lethargo lethaliſſe decubens, accedente tuſſi & fixato pectore liberata eſt; ſed errat rarus poſt illud à cerebro in pulmones decraſſe, cum ibi locum habuiſſe generationem probet hæctica focia, affectum pulmonum potius quam cerebri comes: Alique habui ægros eo morbo laborantes, ac inter hos anno 1671, menſe Julio Veredarium quendam nomine de Ræ: qui à de-glutiis pilulis ab Agyra quodam, & Zogarte Turci, exhibitis, in peripneumoniã lethalem incidit, cujus toto morbi decurſu inextinguibili lethargus comes fuit: Pauci diebus ante obitum, (quod prædixit Hippocr.) alvus plura & liquida egeſſit: Eodem tempore quinquagenaria mulier, dicta Vidua Doty, eodem plauſe modo interiit ab aſſumptis illis pilulis.

Pulmo inſpuitur nimis &c. Hippocr. l. Coac. 145. Lethargi ſolutionem per Thoracis affectiõnem cerebro fieri inſuit, dicens, *idem à morbo & lethargo, ut in morbo peripneumonia: quæ verba multo interpretes: Martianus vult Hippocr. voce Lethargi, non morbum capitis ſed pectoris intellexiſſe: Sed quorũ morbus hæc ſubterfugia? cum ſæpe contingat materiem morbiſicam in capite deſixam primo veterem excitare, dein poſtea eandem materiam à ſanguine reſorptam, & in pectore depoſitam, empyema aut ſputum inſtar abidoniũm producere. In deſcriptione febris Epidemiciæ ſoporofiæ anno 1661. (l. de morbis convuſ. c. 9.) quamplurimis accidiſſe notavimus. *Idem Thid. de anima Br. part. 2. cap. 3.**

§. 2. Vidua Dom. Garnier in morbum incidit; aderat corporis torpor, ignavia, rerum omnium contemptus: Febris continua fuiſt: Comatoſa erat nec niſi interrogata reſpondebat: genarum erat rubor, urinam ſub finem reddebat involuntarie, alvus etiam involuntarie deſcendebat, deliria aderant, tremor &c. Aperto cadavere reperti ſunt

fure pulmones veluti putres costis adhaerentes. *Idem Conf. 45. lib. 1. Vide bystr. Titul. de Febribus.*

§. 3. Virum illustris febris prehendit cum sopore & thoracis dolore, a hoc quarto die evanescens sopor redit, genarum rubor &c. In eo pulmo insigniter tumidus & quodammodo exesus repertus, in lique unus humor albus & renax ac purulentus delitescens. *Vide lib. 4. Titul. de Febribus.*

OBSERVATIO XL.

§. *Lethargo affectus habuit Calculos in meatu fellis, qua duodeno inferitur.*

Rever. & Illustr. Elector Moguntinensis Vigili comate in Lethargum transcurrente correptus, me circa morbi vigorem demum accersiri curat, sed mali violentia victus occumbit: Ejus naturalibus visceribus primum inspectis, dum intestinalis eximendis occupantur, nescio quid durum occurrit: postprehendimus meatum bilis duodeno insertum, præpinguem admodum, larum & utriculi instar inflatum, quem rei novitate perciti præcidimus, colligatum cumque calculis undique refertum invenimus: Ex quibus majores omnes colore & forma exacta nucem moschatam ita referebant; ut vel Apellis manum vincerent: Minores plerique omnes plumbeum splendentemque colorem adeo representabant, ut plumbeos globulos (*dragée de plomb*) ingestos diceret: fracti non admodum renitebantur, velut etiam artritri, intrinsecus flavi, gustu amari. Perpetuo ille dum viveret incredibili Siti torquebatur, adeo quidem ut subinde argenteum scyphum aqua plenum ori proluendo, sitisque mitigandæ ergo ad manus haberet, Princeps alias temperantissimus. *Schenkins ex Traffelmanni communicatione.*

OBSERVATIO XLI.

In quodam ab assumpto Opio extincto, id cordi adhaesisse deprehensum est.

Medici apud Italos homines facinorosos, qui morti addicti sunt, certo anni tempore præfectis impetrant, in dissectionis usum, & quo rei Medicæ studiosi in re Anatomica exerceri possint: Itaque ne ullos humores dissipati contingat, aut crassiores spiritus evanescere, omniaque se aperte proferant, Opii, hoc est, succi nigri papaveris binas æternasve drachmas ex vino meracissimo, mortem commertis exhibent, qua portione hausta, primum exhalarefcere incipiunt, velut risu sardonio perfusi, mox in somnum soporemque resoluti, morte sopiuntur: Tanta siquidem pernecitate venas ac vitalia corripit, ut dissecto eorum, qui opio portionati sunt, corpore, Cordi adhaesisse compertum sit. *Levin. Lemnius de occ. natur. mirac. lib. 2. cap. 52.*

OBSERVATIO XLII.

§. *Lethargus à Vermibus in intestino tenui conclusus inductus, Sano Cerebro.*

Puellæ x1. annorum Lethargus quadraginta horarum spatio funestus fuit: Aperto cranio cerebrum sanum citra inflammationem, & ventriculi mundi reperti: In intestino vero tenui vermes duodecim oblongi, conglobati, & intestinum cum insigni rubore inflammatum fuit, frustra injectis clysteribus, cauterio futuræ coronali applicito & cucurbitulis affixis: *Chiffletius singularium Observ. 10. pag. 8.*

S C H O L I A.

Pueros lumbricis laborantes comatosi affectibus corripit apud praticos in consensu est, elatis copiosis vaporibus ex crudis & pluviosis humoribus eos patientibus: Sic in febribus nonnullis intermittentibus sopor inexpugnabilis accessionis initio oboritur, ob crudorum & putrescentium humorum, præsertim la melsacis copiam, à quibus vapores exsurgunt spiritus animales aggravantes & velut cal-

gine suffundentes. Castilius mercurior, referente *Galieno Epid. lib. 2.* cum febre continua Caroticus erat aut Comatosus: (Vocatur Gortæus (aliis Medicis quod referunt causam nescientibus) quo iudicio valebat, præfecit id à vermibus fieri: contra vermes pugnatum, cessaverunt ea symptomata: Etiam in viris suspicari oportet de vermibus ut in pueris,

OBSERVATIO XLIII.

§. Coma vigil à repletione vasorum meningum, sero flavo in ventriculis cerebri.

Sartor incidit in capitis dolorem, Exinde vigilias, Subinde etiam somnum ad horas tres vel quatuor extensum, profundum, inde evigilabat &c. Mortui vasa turgenta in meningibus: Cranium nimiam cerebri molem non poterat capere: In ventriculis anterioribus occurrunt unciz octo feti flavi: Vide Tit. de capitis dolore.

S C H O L I A.

Comatis Vigilis duplex imò triplex est ratio: primo enim quidam id nominis imponunt vigiliam, & somni vicissitudini, si sese identidem excipiant, ut in Sartore: 2^a. Sic vocant delationem in somnum, quo tamen ægri non fruuntur; ita ut adstantibus dubium sit vigilent an dormiant; Scilicet cum clausis oculis frustra somnum capere tentent: Ex Galieno item, libro de Comate, unum est Phreneticum, cum delirio: aliud non Phreneticum, quod fierum duplex, vel ignavum, cum ægri vix moventur; vel Expeditum, cum ægri valde delirant ac prompte moventur, & ubi evigilant è lecto profluant ac nonnunquam adstantes invadunt, Cuius exemplum habetur apud Heurnium. Causam Comatis vigiliæ promitue perhibent bilis cum pituita variam permissionem, ut ab hac somnus, ab ea vigiliæ procreetur: Placuit & Semerius vapores narcoticeos accusari, simul mentem conturbantes, quod in spiritus vini, solano mani-

co aliisque deprehendere est, una somnum & delirium excitantibus; Febricium malignarum familiare id est symptomata, & quorundam venenorum soboles: Illud Coma, quo laborabat Sartor, ad priorem causam & vulgatam referendum videtur; Si modo serum, in ventriculis ejus anterioribus repertum, pituitæ nomine dignandum sit: Ab hoc enim propensio in somnum (vide scholia proxime sequentia) causa deducenda videtur, sicut à vasorum plenitudine, capitis doloris & vigiliarum: Soli quoque sero uterque effectus imputandus videtur; quæ enim serum, pituitæ indolem sapiebat; quæ flavam, bilis miscellam arguebat; ut sic Comatis secundam speciem latere debuisset in Sartore, non primam: Dixerim ergo eam somni & vigiliarum vicissitudinem serum sero ascribendam, quod mobile, prout hanc vel illam cerebri partem occupabat, alteramque symptomata invexit.

OBSERVATIO XLIV.

Coma vigil ab abscessu in substantia cerebri, officulo duram meningem pungente.

Rusticus citra palpebram superiorem oculi sinistri vulneratus, septima die comare quasi vigil corripitur; 9. is obiit die. Aperto cranio, interior orbitæ oculi punctum ita læsum erat, ut una etiam officulum in duram meningem dilaceratam imprimeretur; quæ separata, tenuis foramen exhibebat fœnem expellens, sub quo ingens abscessus purulentus &c. Vide Tit. de Soporosis affectibus.

S C H O L I A.

Officulum imprimeretur &c. [Galien. 4. de loc. cap. 1. ait urgete cataphoram si vel minima squammosa offis fœciari mora sit, quod huic Rustico contigit: Abscessus quoque cerebri consequi Soporosis affe-

ctus supra demonstratum, ut hic duplex Comatis concurreret causa: Quæ vero causa vigil effectus: an duræ meningis dilaceratio dolor? An sanies acida & ulcere manans, tenuem vellicans?

OBSERVATIO XLV.

§. Coma vigil ab aqua plurima in toto capite & corpore stagnante.

Vir Illust. febre prehenditur in cujus episternia coma pervigil se adjunxit: Defuncti aperto capite reperta aqua plurima in toto capite stagnans, & adhuc in cadavere refes, nec ab ardore febrili desiccata. Vide histor. lib. de Febris.

S C H O L I A.

Cui miram videbitur coma pervigil febris episternia statim se adjunxisse? coma inquam, sive quod è sanguine in capite, patet ut in toto ebulliente, vapore plurimo elato; aut sero in ipso expulso siccus cerebri compleretur, ac commatu reciproco spirituum interducerent: sive quod vasa ipsi sanguine fervescere magis distenta quam ante oblitarent eodem siccis: sive quod aqua in capite ægri, seorsum à sanguine jam aote delatens, tum fervore coarctio ferueret in ventriculis obstrueretque, sive potius quia serum cum sanguine ebull. ens in j. su vasorum stipi-

cibus, sursum concitato quodam raptu impetere cerebrum: sive denique vapor dentax, isque crassus, humidus plurimus è sanguine in toto confertim effluere in caput: Tot enim sine modis haud dubie caput aquoso humore in principis febris, vel cens vapore aëreo, simul ac semel compleri potest; qui tamen vapor, necessario oportet in capite aquietat: Sed pervigil coma, scilicet à bilis ichore sero mixto, aut fuliginibus è sanguine adulto permixtis sero, sopore identidem interrupto. Mem. idem.

Coma febre Coma vigil raro morbus sollicitus, sed plerumque

plerumque symptoma est, aliisque affectibus in febre phrenitide, lethargo & similibus superveniens: Ideoque remediis primario indicatis adjuvenda alia cephalica.

Aqua plurima in toto capite &c.] Causam statuit Clariss. quod pori & meatus in cerebro, qui spirituum ambulacra sunt, à materia crassiori & sopsificata, & cruoris massa lassa, plurimum occupantur, ut spiritibus à solita expansione & motu commercio plurimum subhibitis, Sopor jamjam gravis & inextinguibilis imminere videatur: At veto in quantum spiritibus istis particulae quaedam acres, & summe agiles, velut totidem aculei adhaerescunt, illi perpetuum in moras inchantur, Ideoque illorum aliqui vias utraque perclusas & sepimentis obductas perirunt, & diècte aut oblique, quae ullatenus data via est, occurrunt; atque talis eorumdem motus, neperie confusus, & propter Impedimenta divaricatus, licet functionis animalis exactum complementum exerceere nequeat, tamen istius iniquum & cessantem facile interpellat, propterea quidem ut hoc morbo affectus (non aliter quam sub polo di genibus, quibus Solis tangent medietas supra horizontem versatur) neque perfecta nox inest, neque perfecta augeat dies, sed illi tangent medio inter Somnum & Vigiliam crepusculo simulantur.

OBSERVATIO XLVI.

§. Coma vigil à venis cerebri varicosis, cerebri & membranarum siccitate; Sero multo in ventriculo medio.

Adolescenti (de quo Tit. de Phrenitide) modo somnus erat profundior, ut vix excitaretur, deinde Coma vigil & inaequalis symptomatum mixtura &c. Aperto capite venae quali varicosae, rabo & sanguine nigro turgentes videntur: Serum multum in medio ventriculo; Medulla cerebri sicca, membranae siccissimae &c.

SCHOLIA

Hoc est exemplum Comae Vigilae Phrenitidis, ejusque quod Expediunt nominari diximus: Eleganter autem istius affectus ideam tradit, cum causae exall. *Wallysi* l. scriptis citato, cap. de Vigilis: Comate Vigilae laborantes, aut, cum in somnum continue proclives sunt, attamen vix omnino dormire possunt, quia Taurali in morem lethaeo flumini labio tenas immergi videntur: cui piscando, quoties se alius demergunt, toties aquae labefcentes semper inferius subducunt: Sentiant illi immanem capitis gravitatem, cum sensuum & facultatum omnium torpore; ut seise quaquaversum in lecto movere, aut altitrium alloquio interurbari aegre ferant, & saepe mox som-

nam placidissimum inituros expectant: cui tamen cum penitus indulgere, ipsumque actum amplecti censuerunt, phantasmata varia animo obversantia usque eos vigilae detineant, neque somnum, illi semper in prociñdu esse visum, omnino capessere sinuntur. Haec non raro delirium accedit, ut dum clausis oculis aegri jacent, absurda & incompotica perperio fabulantur, ac brachia & crura huc illic mordant jactent, excrucii torum immineant: Usuratum est febricitantes tota nocte velut Sopore obrutos manere, interea ut vix horae minimum sileant quia vasa secum obstruuntur, etiam aliquando clament, ejulent, atque lecto caillant.

OBSERVATIO XLVII.

Coma vigil à parvis quibusdam pilis plexui choroideo adnatis.

Iuvenem hoc morbo interemptum secui ad investigandum quanam huius morbi sedes affecta esset: Referato capite, in primis ventriculis, ubi sunt plexus illi choroidei, in dextera & sinistra parte, duae parvae quaedam pilae compactae ita erant, ut non sine magna laceratione separari possent: Pilae vero una quaeque magnitudine ciccris, sed aliquantulum majoris, tunicam interne flavam habebat, substantia vero erat alba, sed aliquomodo dura, externe vero tunica rubra erat: Hoc ut vidi, collegi undenam proveniret quod huic morbo invalida essent medicamenta omnia, quandoquidem nec medicamento nec ferro, nec igne superari potest. *Domin. Panarolus Pentec. 2. Observ. 9.*

SCHOLIA

Duae parvae quaedam pilae, &c.] Pilas illas plexui choroideo utrinque adnatas, nihil aliud fuisse probabile est quam glandulas induratas: plurimae enim minutae illi adhaerent, suspensitates adegatas aborbentes, & admittit expellentes: Haec iucuo concreto turgidae, non amplius officio fungi poterant, & premendo vasa vicina, ex quibus plexus ille contextus est, obiaculo fieri forte quo minus à sero superficiali liberare se poterant, quod restigans coma & delationem in somnum inducere possunt: A sero enim abundante & cauto, & coma, & Lethargo speciem, & omne soporoso affectum genus deducit Clar. *Wallys* lib. de colluvie ferola: Vigil autem

Coma erat, au quia acie fuit id serum, aut aliae causa vigilas patientes una adfuerit? Inter usus enim Plexus Choroidei hunc recenit Clar. *Wallys*, repudiat vulgo allato, ut scilicet tanguis cerebro destinari pars aquosior, in hujus vasa delegetur, eo quidem sine ut reliqua laticia cruenti portio, in spiritus exillanda magis sincera & defacior evadat; Sanguis ergo aquosior hujus plexus vasa atteritola subiens, ex illis in venas traductus, versus cor remandant; Interim ne serum in vasis istis nimis redandans & ebulliens, circulationem impedit, suspensitates ejus in aliquo tempore à Glandulis tenuioribus, detestissime interferis, cum à Pineali excipiuntur: Vel dic

N duar

duas illas Glandulas tumidas, fere copiam admittere non valentes, in causa fuisse quod vas plexus choroidei impuro sanguine scaterent, ideo spiritus minus sinceri & puri, ac ad functiones principes edendas inhabiles geniti sunt, torpidi, unde actionum segnitias, neutram statum inter somnum & vigiliam referens, ortum duxerit: *Galenus* enim loco superius citato Coma ignavam quoddam statum, non phreneticum, ad quod istud à *Paresi* allicum referendam, fere ad mentis stuporem quandam, quo affecti zepi neque vigilantium neque dormientium speciem ex-

hibent, quod *Egneti Broussieris* accidit. (de quo etiam de mentis stupore) in cuius cerebro tumor globosus repertus: Si juxta multorum mentem, status plexus choroideum sanguinem & spiritum vitalem pro generatione spiritus animalis preparare, dic Piles illas plexus adhasas, horum generationi in sufficienti copia obtulisse, sanguinem & spiritum vitalem diutius in vasis detinendo, unde ex animalis penuria actionum corpore obtutus sit, Comacis Vigilis nomine indigitatus

Paresis.

OBSERVATIO XLVIII.

5. *Coma Vigil à Pulmonibus tabidis parte sinistra, dextra humiditate multa suffusa.*

Illustr. Marchesia N. febre continua affecta &c. fere continuo in somnum propensa est, dormire ramen vix potest, unde colligitur coma vigil &c. In dissecto cadavere reperti pulmones pene rubei & exsiccati, præsertim quoad partem sinistram; multa tamen humiditate suffusi ob inflammationem à sanguine pituitoso circiter latus dextrum &c. *Vide l. 2. Tit. de lateris dolore.*

S C H O L I A.

Hoc est exemplum vulgo assignatæ causæ, ab inflammatione enim inductæ sunt vigilie; quia vero sanguis pituitosus eam excitavit, inde pro-

penso ad somnum: A pulmonibus autem cataphoram induci ostensum supra.

OBSERVATIO XLIX.

In cujusdam Comate vigili affecti meatu felleo Calculi deprehensi.

Reverend. Elektor N. à vigili comate in Lethargum transit, In quo deprehendimus mearum bilis duodeno insertum, calculis undiquaque repletum. *Vide supra Observ. 40.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO IV.

DE CATALEPSI SEV CATOCHO.

OBSERVATIO I.

Catalepsis à crasso sanguine, majores venas que à posteriore capite ad synciput decurrunt replente, Et serosa materia posticam cerebri partem occupante.

IN ANATOMIA eorum qui Catoche periissent, majores venas, quæ recta decurrunt à posteriore capite ad synciput, plenas concollo crassoque sanguine vidimus, & posterius cerebrum serosa materia occuparum; Atque revera in hoc malo posteriora magis affici vereres Medici putaverunt: *Galenus* meminit cujusdam condiscipuli in Prorrhet. qui ex hoc, sed levi malo, ut scribit, evasit: Nam in omni genere morbi, hic gravior ille levior est. *Iacotus commun. ad aphor. 7. lib. 2. Concarum.*

S C H O L I A.

Majores venas crasso sanguine plenas] Hinc Rendeleium infert Catalepsin frequentissime à sanguine natales ducere: argumento ducto ab adolescente illo

cujus meminit *Alsius* cap. 4. ferm. 2. tetrab. 2. qui magno sanguinis profluvio per nares liberatus est: Item à muliere, quæ cum syncho (sanguinea febris) est.)

est) laboraret, decimo nono die Catalepsi correpta est, sed largi tandem fluente è naribus sanguine, recuperatis sensuum functionibus, tanquam ab orco revocata est: Etsi vero sanguis actu humidus tensionem & rigiditatem partium inducere non posse videatur hic paucus, copiosius tamen, venas & arterias distendendo, tensusque retinendo (non absumpti ratione qua plethora convulsione nervorum induci) rigiditatem partium pariter: Sic venarum sanguine eurgentium indicium est, cum manus in pugnum, prae vasorum plenitudine, vix contrahi potest: Hinc lumborum tetrum ex anabialis humoribus in vasis cunctis ait Hippocr. 4. de ratione vict. in acutis: Ideoque hic affectus in circulationem sanguinis impediam & vasa illius refert potest, qui concretens in vasis moris occasio fuit his qui Catacho perierunt: Ab affectu vindicati sunt, ut juvenis ab *Antio* memoratus, & mulier syncho laborans, de qua *Rondeletius*, quibus larga cruoris effusio contigit: Quod si Apoplexia circulari sanguinis motui inhibito plenitudo ortum debet, cur ad eandem causam finitimus affectus non referatur?

Posterior cerebrum § *Historia Saxoniae* Puzos. Pract. par. 1. cap. 11. Cataleptosis naturam indagatur, ad sensus recurrit & ad ea quae manifestiora ex anatomie sunt reddita, atque in cerebello causam latere statuit: Cerebellum, inquit, unum habet ventriculolum in quo spiritus animalis continetur, qui deinde per meum quandam posteriorem, qui contrivatur apertus à processu quodam, (vermiculatus vocatur) per hunc inquam meum spiritus animalis transmittitur ad nervos omnes motores: habet & meum anteriorem, qui pariter deferat animalem spiritum à postremo ventriculo in medium, ut sensum tribuat nervis qui sunt in parte cerebri antérieure: His sic statibus, dum cerebelli pars posterior, aut comprimatur, aut obstruitur, ita ut spiritus ad medullam spinalem non possit confluere, tollitur sensus universi corporis, sed manente aperto meo anteriore, spiritus potest confluere ad nervos oculos & auditivos: Potest quoque imaginationi interservire, ita ut aliquando in Catalepsi cum amissione sensus torus corporis, servetur tamen visus, auditus & imaginatio: Quod si integra fuerit vel compressio, vel obstruatio uniusque meatus, tunc in catalepsi tollitur etiam sensus & motus, & torus corporis, atque omnium etiam nervorum sensitivorum operatio: His sic statibus dico resoluto, omnem materiam quae in cerebro continetur, quaeve in cerebrum potest confluere, dummodo transmittatur ad cerebellum, sive comprimendo sive obstruendo meum posteriorem, posse hunc affectum producere.

Venas plenas sanguine, posterior cerebrum serosa materia occupatum § Ideo exillatam idem Saxonia non unam sed multiplicem esse materiam quae catalepsi facit, ac magna ex parte melancholicam; quia, aut hic humor duritie, frigiditate & licetate apertissimus sit ad compressionem, adstrictionem & obstruccionem inducendam: idem spiritum generet crassum, qui per nervos distributus, indurationem efficiat: Ex pectus fieri, colligit ex Galeno 53. metha. 11. 4. de loc. affect. 1. ubi recenset affectiones quae sunt ex sanguine pectus, inter quas recenset Catalepsi: Et *Remi-*

mius de admirandis proponit casum Cataleptici, qui epilepticus factus est: Ille affectus, ait *Dodanov* in comm. factus fuit ex pectus: De materia Bilioa hoc idem, (Saxonia) videtur affirmandum posteaquam scripsit *Hederus* ad Coacem 12. lib. 5. Post delirium factum esse catocen: Affect vero Catocnes historiam, quam vidit Venetis, quae persuadet ex bile potuisse hunc affectum fieri: *Camillus Rallius* annum agens 14. temperamenti biliosissimi, incidit in febrem acutem ab initio cum vigiliis & dolore capitis intensissimo: 4. die phreneticus evadit cum rixa & furore, cum vigiliis perpetuis, nullis conscientibus auxiliis: 14. die delirio existente maximo, subito corripitur Catalepsi, rigidus manet, supino venite, apertis oculis & inconveniens, aperto ore sex horis continuis: Post sex horas redit sensus, & cum eo delirium, sequenti die eadem bosa Catalepsi, perduravit 18. horis: sequenti die reverente accessione, eadem obiit: Io hoc casu jure optimo posset quidpiam, addi, arbitrii in tanto delirio catalepsi factam esse ex materia biliosa; quamvis existimet possibile disrumpi abcessum ex magna inflammatione obortum, & abcessum materiam huius catocnes causam: De sanguine non contendit: Ab humore melancholico bis mihi contigit videre Catalepsi, in uno laborante leihalem: Prior fuit Nobilis Vaseo annos natus 27. qui ex Papiensi obsidione rediit, anno 1655. in transitu per Genavam, Autumnus, primo erratico febre, hinc quatuor corripuit (erat autem ille stigmatus, temperamenti admodum melancholici, nomine Datis) post multos paroxysmos, in unius diei aphoros evadit: Holpea illius, Chirurgus, (vocatus Lamon), me advocat syncope gravi illam prehensum dicens: Accurro & verum Catalepticum video, immo is omnibus, imo rigentibus membris, sine sensu, ad vociferationes & vellicationes insensibilis, solius palpebrae superioris motu ratione vix indicia dantem: toyctus acels clyster, ad more encubitu dorio, lumbis & partibus imis adhibita ptarmica, oblatum naribus castoreum, frictions valde institutae, portiones hidroxiae datae: ac biborio post ad se redit, gravissimae se fuisse affectum nuntiavit, sed nihil praetera afferens: Sequenti paroxysmo, catalepsi iterum prehenditur, illdemque paroxysmi sed citius revocant: Interim obitare rogat ut sequenti accessione obviam eatur, de se actum si simili paroxysmo recurrit: Quapropter ex illo quid tam grave periculum sit, ut imminens vix periculum existimet? Respondit se ferre non posse, sed certissime scire vix filum abruptum sit: Quare ea praesidia (& alia) quae per accessionem administrata sunt, ante ejus advenum in usum duco, sic à Catalepsi immunis fuit, imò & à febre quae media hyeme soluta est: advenire vero vix, debilis adhuc, insalutato Medico & hospite discessit: Alterum exemplum est cuiusdam Auxisabri, Genevensis, nomine Rival, qui nescio quo morbo decubens, (Pharmacopoei enim curae se commiserat) post singulis missionem in brachio factam, Catalepticus evasit, cujus causa advocatus fui, sed nullis conferentibus auxiliis, paucis post horis obiit, anno 1668. mensis Decembris.

OBSERVATIO II.

Cataleptis à sanguine concreto in majore vena quæ medium caput perrepat, Et sero rufo in posteriore cerebro.

Secretarius Vasco in febris declinatione, & alvi profluvio, urinis bene coctis certam valetudinis spem præbentibus, cataleptis prehensus uno die obiit.

Aperto cadavere pulmones & hepar corrupta sunt inventa: *Serum quasi rufum cerebro posteriore contentum. Et sanguis concretus in majore vena quæ medium caput perrepat. Scholiographus ad caput 3. lib. 1. Hollerii de morbis int.*

S C H O L I A.

Sanguis concretus in majore vena] Carochæ quadrifariam potest occupare cerebrum & actiones quæ à cerebro sunt labefacturæ, 1. per præsentiam humoris, 2. per intemperiem; 3. per resolutionem, & primigenii humoris & spirituum primigeniorum cerebri absorptionem, ut quid hæc in cerebro esse videatur, i. e. 1^a. modus super alterationem, 3^a. per alterationem; 4^a. fortem aliquam imaginationem ætatis, in spirituum animalium vel hæc conculcatio oppressioque, vel dissipatio: quomodo tunc melancholia dicitur, & cum effectibus melancholicis congruit: Quæ omnia nisi ad unguem teneris, de Catalepti nil unquam certum habueris: Maxime verò ad veram ejus essentiam non tam præsentia humoris requiritur, quam ex intemperies sollicitudineque animi, concurrente maxime corporis & cerebri temperamento, ut corpus sit siccus strigosusque: Præsentia humoris est, vel ut sit sanguis, vel succus melancholicus: Sanguis bifariam, vel sua quantitate premens, vel qualitate, i. e. ut mora in cerebro, per vigiliis aut morores melancholici humoris naturam acquirit, florem enim facile suum & nitorem sanguis amittit: Sua quantitate dum prehendit premitque cerebrum, præsentem si libera est respiratio, utpote partibus obiectis posterioribus, & si juvenis est, qui cum non facile obnuetur & stupidus pœat, & copia sanguinis pressus, veluti vigilans manet: Tunc cataleptis sanguinea dicitur, & ad hæc æquior proximè accedit: Sin qualitate positus sanguis preat, tamen si pœas esset laudabilis, melancholica cataleptis dicitur: Fit autem cum plenitudo est aliqua in cerebro ad vires, quam cum natura non regit, dum moram ibi trahit sanguis, facile immutatur, præterit siquis calor alioquin adveniat, ut rora affectio *Kupand* esse dicatur: Ex quemadmodum corpora sanguinea si effluvia non habent, melancholica redduntur, quod in toto corpore fit, id in capite fieri potest, ut particularis sit suppressio, & ob congenerem suppressionem morbi congeneris generatio, quo in *scnda Hippoc.* 1. Protrh. pag. 14. *Fuerit autem humor & maffus multa malum*: quo loco Gal. demonstrat quomodo *Epilepsia* melancholica fiat, cum facile sanguis aduratur & succi melancholici naturam acquirat: maxime vero sanguis in capite immutatur, si quis aut natura sit melancholicus, aut ex eventu & non *ad partem occupat*: Nam cum melancholici, utrovismodo sint, perpetuo aliquid animo vertent & volant, facile ea cura agiturque sanguini mutationem conciliat: atque eo modo tales in cataleptin promi sunt, præterit vero si qua causa extrinsecus adventat, quæ semen morbi ipsius sepulchrum exciaverit: Et tales cataleptes repente possunt incidere, ut de *apoplexia & epilepsia*: At non sic quæ ab intemperie frigida & sicca, aut quæ a resolutione, aut à morore, quæ explicare consiliam est: Si quis avidius

& diutius incumbit literis, præterit si noctes infomnes ducit, dissipatione spirituum & siccitate præterit humorum fluxum & spirituum, rigida potest manere de cataleptis, quali in cœlum capta: Sic non est quod si arguti requiri longum valde tempus ad inducendam itam intemperiem si rigida & sicca & præterit quod pertinet ad alterationem, & fluentes tum spirituum tum humores, quid enim iam facile instauratur & dissipatur quàm spiritus & restantur ii qui natura famelici sunt, qui se cum expulsum & dissolvuntur, guttula vero vini ad se redeunt: Et dum quis ita exhaustus labore cerebrum, jam rudimenta future cataleptis habet, prout pervertebat effluvia spirituum, sed malum non apparuit, quamdiu pames solide invadi ceperunt: Sunt enim quidam morbi qui non prius apparent, quam jam valde clamque aliquo tempore percurant, & cum non prehendant, jam pene in vigore sunt: Est & alia Cataleptis a quadam resolutione, per alienationem cerebri, & ea repente incidit, sed non solvitur facile, imò lethalis est: quod repente incidit, id audiendum est quoad sensum, non quoad generationem, nam occasio causæque fovebatur sensum, sed affectum malam se e representat: unde cum nos a loquimur agros, videmus eos statim mutos, & oculis apertis catalepticos fieri, dispositione hæc iam contracta, & vicio impresso partibus se statim perferent: Et de catalepti idem quod de phrenitidi dici potest, quæ duplex est, manifesta, in alteratione cerebri; altera occulta in alienatione, & hæc deterior est: Propriè autem cataleptis, quatenus speciem morbi elicit, ob alienationem coningit, ut non solum spiritus & humores fluentes vim pati sint, sed & in partibus solidis ipsius cerebri nota insinuat: Talis cataleptis in morbos longos & febres incidit, cum dissipatio facta est animalium spirituum, calor naturalis imbecillior factus & hæc dispositio indulta in cerebrum: Dicam quod nobis videre contigit, Servus Equitis roqua i roram hyemam quærana duplex cum febre lena laborat: exhaustus & marcidus pene erat, repente catalepticus factus est, squallidus & sicci redditus spiritibus, sic generatio longa fuerat, sed invasione modus subitus fuit, sed non est solutus morbus nisi cum morte: Sic cum requirunt arguti ad generationem caral. nescio quid ut cito fiat & solvantur, revera quæ per resolutionem fit, non solvitur cito, quia ab exhausto est, sed longam habuit generationem: Et eo modo *Galeus* quodam in loco ad phrenitidis generationem longum quoddam tempus requirit & in alio docet etiam subito fieri: Sed nodus hic solvendus est priore modo explicato: Filius Consulis Regi catalepticus interit, cum duos menses tertiana laborasset & pene extubisset, Et revera ut plane flear, ut repente adoriatur cataleptis, non tam facit sicca intemperies & squalor

(nam

(nam potius ad tarditatem invasionis faceret) quam morbi quidam symptomatikus qui quodammodo suscitatur, impellit & avertit malum hoc quod in viceribus & medullis latebat: unde iste poer catalepticus capite dolebat ante, & in ipso morbo catocho tantus ardor percipiebatur ut manus ureret: sic dispositio ad catalepsi in capite foeta aliaque sese proutit per translationem symptomatikam ejusdem venenati vaporis, aut naturae sese in cerebrum exonerante & morbi larcinam deponere volente: Et tales cataleptis sunt ab exhausto: De his audiendas Hippocr. aphorismus p. 4. lib. 3. perorhet. *Quae cum exolutione sunt intestina & apertae, postea*. Sequuntur enim summam paupertatem caloris naturalis & naturae imbecillitatem, suntque mortis praenymphi. *Quarta species cataleptis* sequitur fontem imaginationem rei aliquid, praesensum iustis, & animi concussionem agritudinemque, ut viduis accidit, aut merore confectis, aut pauperibus & metu constrictis: semidectari manent oculis apertis & corpore immobili: ideo pace Rondellii dicam, id quod poelle acciderat congressum

mariti repudians, fuit quidem catalepticus, sed non tam humoralis fuit, quam, ut sic dicam, mentale & spirituale: Putat id fieri à sanguine qui in succum melancholicum conversus fuerat, ego vero potius animi parthenia fuisse judico, per vim fortem imaginationis, quae efficit ut nobis quodammodo abstripimur & extra nos simus: quamquam fieri quidem potest ut humorum & naturae & propensitas corporis ad id concutatur: *Gar. Balianus* (enst. Med. lib. 2. hyl. 1.

Serum quasi rufum, & sanguine censum] Quia Scoliographus Hallerius partem cerebelli ait plenam fuisse quodam sero rufo, censet *Saxonia* Catochicorum duxisse potius ex illo sero quam ex sanguine in vena contento: Eo quod non sit praerelationem abstrahi illud serum rufum transmissum esse ab illa vena in qua sanguis crassus etotridus continebatur: Quandoquidem si ex vaporibus ortum ducere aliquando potest Catalepsi, ut colligitur ex Galeno. 2. de sympt. causis c. 7. ubi scribitur ex ore ventriculi fieri posse & melancholias, & comata & cataleptis, potius jure fieri potest ex lechore, & possimum pravo.

OBSERVATIO III.

In Catalepticis sanguis etiamnum concrevit.

Constat refrigerato cohibitoque spiritu, sanguinem non solum frigescere, sed concrevissimum, quod in catalepticis & apoplecticis, aliisque id genus dissectis observatum: *Hallerius comit. in 1. concam. lib. 1.*

SCHOLIA.

Catalepsi est subita omnium sensuum, motus & mentis prehensio, qua qui corripimus regidi in eo statu, in quo prehensi fuerunt, apertis ac immoti oculis permanent: Caulae variae statuuntur, Senectus credit à vapore fixativo spiritus ita figi & immobiles reddi, sicut à fulmine & spiritibus à terrae cavernis praerampentibus homines & bruta rigida redduntur: Adest aut à quibusdam vinum in dolio à fulminis spiritum interdum congelari: In nigro & plumbis aliis mineralibus insignis reperitur vis figens: plumbi vapor mercurium ita figit ut malleabilis eva-

dat: *Platerus* spirituum animalium nimiam in nervos effusionem è cerebro accular: Vide cap. 2. lib. 1. de mentis conformatione: Exemplum cataleptis à flatibus pituitosis & melancholicis nervosam substantiam replentibus vide apud *Salvianum* coof. 76. cent. 1. Inducta à male curato Erysipelate pedum, apud *Grav.* Ait. & *ruin. l. 2. c. 1. §. 11.* Ex nimia animi intentione apud *Platerum* l. 1. Obi. p. 29. Ex amore apud *Thalium* l. 1. Obi. 12. A vapore melancholico, apud *Thom.* Sec. *Sanguinem concretum*] Cui sanguis concretus in vasis vide *Tit. de Apoplexia Obiervat. 2.*

OBSERVATIO IV.

Catalepsi à sanguine nigro & tabo venas varicofas capitis reddente, cum cerebri & membranarum ejus siccitate.

Adolescens primo febre leni, mox phrenitide & catocho corripitur: Oculi illi fixi & rigentes.

Aperto capite, venae quasi varicofae, tabo & sanguine nigro turgentes videntur: Medulla cerebri, quae mollior & friabilis esse debet, sicciore: membranae sicciissimae &c. *Vide infra Tit. de Phrenitide.*

SCHOLIA.

Perit et haec Catalepsi ad eam speciem quam *Balianus* proficisci ait ab exhausto, & cum quid heciticum ipsi cerebro impressum est: Sicciitas quip-

pe cerebri & membranarum primigenium humorem consumptum indicabant: utrobique melancholici & adusti humoris dominium adeat.

OBSERVATIO V.

Catalepsi à cerebri circa superficiem siccitate exorta.

Civis Leodiensis mercator, à rivali suo in carcerem conjicitur, è quo dato vade liber domum reversus, totum melancholiz se immergit: paucos post dies acutè febricit,

sine delirio tamen : à febre liber ; in amentiam primum , dein *furor*em versus , vinculis coerceri debuit : numcllas manus stringentes tanto interdum quarebat strepitu , ut fracturus crederetur : uxoris collare dentibus arreptum , non discepit sed pene instar farinæ moluit : Melanagogis per epicrasin diu sumptis , conciliatio etiam multis noctibus somno , ad mentem rediisse visus , ut omnino restitutus sibi videretur , xx. à captivitate mense *fastissimus* factus & repuerascens sub ætatis annum xl. primum sinistra *maius* digitus tres ultimos *ita* *lunavit* ut nulla arte extendi possent : Purgato capite , applicitis medullæ spinæ oleis calefacientibus & humectantibus , digitorum usum recuperavit sed paulo post omnes digiti ejusdem manus incurvati riguerunt , & , ut in catochico , nullo ingenio dimoveri potuerunt ; paulo post & dextro captus brachio & utroque crurum , *aphanus* factus , immobilis jacuit , multis litibus & fomentis & gargarismis linguæ usum recepit : Sed roto biennio ad mortem usque vocem articulatam formare non potuit , instar infantis semelstris lallabar , alienaque manu cibum capiens sustentabatur : alvus interim utcunque respondebat , respiratio semper liberrima pulsusque optimi : tandem sub anni quarti finem facis concessit.

Ad anatomen vocatus , volui primum cerebrum inspicere , quod ablato cranio siccissimum , durum , adeoque in summa parte digitis meis friabile , flavedine citri æmula , undique ad altitudinem digiti tinctum , observatum ; Circa ventriculos & basin mollius & humidius , colore tamen aliquantum viriato ; rete admirabile depressum : nervorum origines siccae solitoque gracilliores : Thorax , Imusque venter nihil observabile exhibebant. *Henr. ab Heer. Observ. Medic. 3.*

S C H O L I A.

Hæc Catalept. species ad tertiam speciem à *Balis* nem & primigenii humoris absorptionem : concurrentibus simul causis quantam speciem inducere apta.

OBSERVATIO VI.

§. Congelatio à sanguine concreto in venis , ob haustum hydrargyrum.

Argentum vivum si largius sumatur congelare sanguinem testatur Conciliator , exemplo cujusdam septaliarii , qui febre ardenti laborans , cum ad sitim sedandam imprudens aquæ vice , vasculum argento vivo plenum invenisset , illiusque magnam copiam ebibisset , Congelatus interiit.

Aperto cadavere sanguinem circa cor concretum Medici invenerunt. *Primrosius de vulgi Error. l. 4. c. 29.*

S C H O L I A.

Inter venena à plurimis recensetur hydrargyrum : Ictum tamen à plurimis ad difficilem partum & vermes necandos innoxie exhiberi : *Brassavolus* se pueris dedisse ait ad ʒj ; *Amatus* in Diotc. praxis ignorantes vocat eos qui illud vituperant , ac præstantissimum antidoton ait pueris fasciatis & à vermibus infectis : Idem sentit *Martinius* cap. 28. lib. 6. Et propterea si congelavit sanguinem , ut refert Con-

ciliator , id quia largius sumptum præstiti , nec ideo magis noxia illius virtus quam aliorum medicamentorum censeri debet : Imo *Romani* coarct. 20. ait Germanum sibi vexarum ac potum quærentem , vas in quo argenti vivi ʒvi ʒssj. repositæ erant exhaustis , quod mane in lecto prope se repererit : Venenum itaque nullo pacto esse potest , nisi forte gravitate sua , non aliqua lethali qualitate.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO V.

DE INSOMNIIS ET INCUBO,

OBSERVATIO I.

Insomniis & Incubo cujusdam vexati cerebri ventriculi aqua distenti reperti sunt.



CADEMICUS Oxoniensis, hydrope pectoris extinctus, postremo morbi decursu somnum nisi prona facie & inclinato capite capessere non potuit: Si enim capite in pulvinari reclinato somno se componeret, intra tertiam horæ partem horrendis Insomniis & terroribus tristis semper evigilavit, quin & Tremore cordis & ejusdem oppressione maxime diu postea afflictus fuit:

In cerebro post mortem aperto ventriculi aqua summè distenti reperiebantur, nulla autem præterea notabilis culpa in toto capite apparuit.

§. Novi quendam Incubo olim maxime obnoxium, virum alias robustum & satis sanum, qui per duos annos nunquam in dorsum conversus dormivit, quin simul affectu isto corripere, adeo ut necesse haberet servum contubernalem in eodem lecto decumbentem admittere, qui statim ac gemitus & suspiria, quibus affectus iste incipere solebat, exaudiret, ipsum in latus alterum converteret, quo factum est semper ut insultus illi præcaverentur.

SCHOLIA.

Inde] Cum ventriculus quartus cerebello subiectus multo declivior & magis in profundo situs sit quam reliqui in cerebro, & quam ipsum etiam infundibulum, ideo fit ut lymphæ in ventriculos cerebri & plexus choroeidei secreta, in dictum ventriculum reliquis magis declivem, potius quam in infundibulum defluat, præsertim si capite reclinato somnum quis capiat, Ex quo humorum decubitu cavitas illa plenius repletur, & eoque aggravatur ut ponderis ejus sensus nervi præcordiorum communicato, sæpe cordis oppressio & Incubus inducatur: Atque adeo solenne hydrocephalis fere omnibus ut nunquam supini impune dormiant, quin in latus hoc aut illud decumbere cogantur, quo melius hujusmodi molestias prævertant: Quia & plurimos iocundos recens edidos, si moribus convulsivis obnoxii fuerint, nunquam diu aut placide in cunis dormire, sed variis spasmodicis & æreum subulibus corripì observare est: Causa hæc videtur, quod si quidem eorum cerebra multa aqua abundant, ex hujusmodi supino decubitu, qualis in cunis est, aqua in ventriculis cerebri contenta, ob situm magis declivem in ventriculum quartum potius quam ad infundibulum defluit, & proinde medullam oblongam (ex qua nervi præcordiorum oriuntur) valde aggravat, & comprimendo illam spirituum in nervos transiitum impedit, unde cordis gravamen & motus convulsivi tandem succedunt: Atque hoc ideo magis verisimile est, quia in contrario situ, scilicet intra alias nutritum, vel in eadem situ, ubi caput magis attollitur, placide & secure magis obdormiunt: *Richardus Levrier. Tract. de Cereb. cap. 2. p. 150.*

Insomniis.] Dimittis Insomniorum significationibus, solummodo inquiri quasi spirituum animalium

motu & agitatione in cerebro producantur: Dicimus igitur quod spiritus animales, licet alternamotus & quietis tempora naturaliter affectent, dumque requies indulgent, humorum nervosum cerebro recens instillati complexibus, velut catenis, ne motuum inane, sese colligari patiuntur, tamen plerumque accidit quod spiritus nonnulli hoc vinculum facile excutiant, atque alia inter reliquorum silentia hoc illuc expatiari ament: Atque revera Insomnia sunt tantum exarsus quorundam spirituum in cerebro ligatione solutorum, qui dum cæteris acie restrictis, hæc illuc sine duce aut regulatore quovis divagantur, atque motuum typos veluti choreas prius edoctas repetunt, rerum prius actuum cogitationes, licet more valde confuso, repræsentare solent: Spiritus qui aliis interim restrictis custodia soluti varie discutunt, duplici ratione in motus libertatem vindicantur: Nam mirum spiritus nonnulli somni captivitate effugiant, plerumque ob nimium cerebri calorem & agitationem, prout à vini potu, nicotianæ fumo, exercitio immodico, necnon passioibus aut studio acriori accidere solet: his enim modis spiritus stimulatione quadam citantur ac velut in impetum adiguntur, ut somno licet obrepente, una omnes contrungi ac coactari nequeant, quin aliqui velut spectra in cœmetio inter reliquorum sepulchra obambulantes, & suspensas rerum appariciones faciant: Alii spirituum quorundam in cerebro, qui Insomniis producuntur, excuscatio, fit ob spiritus quosdam in aliis partibus, ut in præcordiis, stomacho, liene, genitalibus, &c. perturbatos, à quibus dum perturbatio eadem per nervos in cerebrum communicatur, unus foras aut alter spirituum manipulus ibi coactus variis phantasmata repræsentare facit: In affectione *Incubi* dicta,

cum pericordia ob nervos constrictos, aut alias impeditos in motu sibi sunt, animal aliquod, aut pondus grave pectus incumbens respirationem inhibere somniamus. Humor genialis in vasis turgescens, eademque irritans Insomnia impudica producit. Cibi dyspepsi & crassiores in cornu comesti, quatenus ventriculum aggravare & molestia afficiunt, Somnos item perturbatos & phantasmatum reticulamentis infestis reddunt, &c. Dum spirituum turba quasi privata in cerebro exsuscitatur, & hac illuc se proripientes, phantasiam exercent, illorum excusius modo *regulariter*, modo *irregulariter* contingunt; proindeque Insomnia, aut rerum antea actarum ictus, aut tantum Chimærae, sive notiones omnino dispares & incongruas praesentant; Porro dum Spiritus animales, eo ritu intra cerebrum agitati, Insomnia seu cogitationum simulachra producant, non raro in genus nervosum resiliunt, ibidemque spiritus alios cientes, motus locales diversimodos producant, quos nonnulli, etiam quando alie dormiunt lecto exurgere, huc illuc ambulare, &c. solent: Quinimo de pleurisque ira lemarum more noctis vagari solitis observare est, quod exasperati fere nihil rerum in somnis à se gestarum recordantur, quasi diversum aliquid à Somniantibus pareretur, namque hi se motus locales edere concipiunt, quos revera minime edunt, verum illi loco moventur, nec tamen illi consilii sunt. In somniantibus spiritus excitati omnino interitus versus corpus callolum laei, tantum imaginationem & memoriam afficiunt: In somnambulibus vero, illorum manipuli quidam exportecti, *per se* suam solummodo exteriori versus partes mortices dirigunt, interim sensu communi, imaginatione & memoria minime affectis: Minus est quod Sagis passim accidit, nimirum dum Somno profundo sepulcrum sunt, se loca multum remore adiffere, &c. imaginantur, quia procul dubio Diabolas rerum Ideas phantasiae illorum obliquit, adeoque fortiter imprimat, ut sese illic interfuisse pro certo credant: Econtra Somnambuli toties divagantur adeo, carumque procinthus, & actiones diversimodos revera perficiunt, quarumque vigiles facti prorsus ignari sunt. Si huiusmodi passiois ratio inquiratur, hic primo occurrit quod taliter affecti, facultates tum sensitivas tum locomotivas isto tempore libere exercent, quippe non tantum pedes & brachia, velut certis modis & numeris movent, uti solet machina rotis ac elatere instructa: at insuper auribus audiunt, oculis vident, motus locales variant. Quibus hinc concludere licebit spiritus quosdam animales, intra cerebri medullarum posterius, forsan etiam corpora strizata inordinate exsuscitatos, nervorum capicella ferire, aliisque deinde spiritus, longa

serie intra ductus nervos, & partes morderices confusim exelcere, inque motus prius affluens inenodis adigere, hinc ut corporis & membrorum lationes divitiusmodè prodellantur: Attamen quia spirituum excitatorum *per se* tantum exteriori tendit, & non omnino interitus in corpora strizata & callolum resedat, proinde ut nec commune seniliorum nec imaginatio afficiantur, idcirco agentes nec actiones suas percipiunt nec recordantur. Quod si intorquetur (si quidem sensus communis hoc tempore obdormit) quo insistent spiritus animales juxta sensibilibus impressiones, ac motus locales lujus aut illius generis obsequio determinantur? Dicendum erit quod hac sentis & motus reciproco à consuetudine porissimum dependet, spiritus scilicet hoc aut illo ritu ordinat prius affluat, in somno actionis libertatem nacti, sponte sua ad solitos agendi modos componunt, non secus acque dum citatus aliquid quippiam medietur, digiti ejusmodi modulaminis, numeros prius edociti, fides miro ducimine & agilitate exatè poliam.

Itaque Somnambulatoris causa in eo consistere videtur, quod spiritus animales sine effecti nimis & inrequirit, ut una omnes minime succumbant, verum aliqui, ceteris seriantibus, sponte exillant ac motum incant: propterea item quod spiritus ita ad exspandendum *per se*, pro exaltis suo in medulla oblonga, juxta originem nervosam potius quam in cerebro aut medullis ejus spacia liberiora obtineat. Videus enim quod durante somno, post & meatus in globis cerebri compage inferantur, adeo ut spiritus illi, non secus ac lymphagula constricta, una omnes usque compingantur: antem intra medullares cerebri & medullae oblongae procellus, qui versus omnes nervos ducunt, substantia laxior & humore adremittio minus occupata existat, ut ibidem spiritus in motum prompti se facile exferant, & nervorum capicella subeuntes, motus locales, quorum sensus communes, & superiores Animæ facultates protius ignoreant, producant: Eiusmodi talis cerebri, ejusque appendicis dispositio, quae ad Noctivagationem inclinatur, tanquam à peculiari quadam organi conformatione dependeat, quibusdam hominibus à natiuitate propria exillit, nec quibusvis indifferenter accidit, aut unquam ab inordinata victus ratione contrahitur: Novi in quidam familia ubi & Pater & mater omnes huic affectioni sunt obnoxii, fratres noctu in somnis saepe per domum discurrere, iterum convenire, ac invicem obviam factos comprehendere adeoque se mutuo exsuscitare: Attamen alii quibus hac labe haud ab ortu imprimatur, nulla *causa* seu manifesta occasione in hunc afflictiorem incidunt. *Widly Tract. de Anima Hum. part. 1. cap. XVI.*

OBSERVATIO II.

5. In quodam Incubo aliisque affectibus cephalicis extincto, repertum cerebrum quoddam venulas nigricans, & cum pauca materia saniosa in superficie; Et copiosa sanie cum muco in sinistro ventriculo.

Juvenis (de quo Tit. de melancholia) prae supina tristitia continuo suspirans, caput praeterea morem in sinistram latus inelinans, paulo ante nocturnis terroribus atque Incubo simul praeventus: Paulo post accessit vertigo Epilepsiae finitima, capitisque & visus debilitas, &c.

Mortui cranio dissecto & separato, prodit cerebrum, post remotionem duntaxat meningis, qua venulas nigricans & lividum, cui in superficie inerrabat materia pauca saniosa cerebro impressa: Dexter ventriculus naturalis, &c. *Lothium Observ. lib. 4. cap. 4. Observ. 3.*

S C H O L I A.

HUjus affectus Aetiologiam hanc infirmitat Exell. *1789* *1790* *1791* *1792* *1793* *1794* *1795* *1796* *1797* *1798* *1799* *1800* *1801* *1802* *1803* *1804* *1805* *1806* *1807* *1808* *1809* *1810* *1811* *1812* *1813* *1814* *1815* *1816* *1817* *1818* *1819* *1820* *1821* *1822* *1823* *1824* *1825* *1826* *1827* *1828* *1829* *1830* *1831* *1832* *1833* *1834* *1835* *1836* *1837* *1838* *1839* *1840* *1841* *1842* *1843* *1844* *1845* *1846* *1847* *1848* *1849* *1850* *1851* *1852* *1853* *1854* *1855* *1856* *1857* *1858* *1859* *1860* *1861* *1862* *1863* *1864* *1865* *1866* *1867* *1868* *1869* *1870* *1871* *1872* *1873* *1874* *1875* *1876* *1877* *1878* *1879* *1880* *1881* *1882* *1883* *1884* *1885* *1886* *1887* *1888* *1889* *1890* *1891* *1892* *1893* *1894* *1895* *1896* *1897* *1898* *1899* *1900* *1901* *1902* *1903* *1904* *1905* *1906* *1907* *1908* *1909* *1910* *1911* *1912* *1913* *1914* *1915* *1916* *1917* *1918* *1919* *1920* *1921* *1922* *1923* *1924* *1925* *1926* *1927* *1928* *1929* *1930* *1931* *1932* *1933* *1934* *1935* *1936* *1937* *1938* *1939* *1940* *1941* *1942* *1943* *1944* *1945* *1946* *1947* *1948* *1949* *1950* *1951* *1952* *1953* *1954* *1955* *1956* *1957* *1958* *1959* *1960* *1961* *1962* *1963* *1964* *1965* *1966* *1967* *1968* *1969* *1970* *1971* *1972* *1973* *1974* *1975* *1976* *1977* *1978* *1979* *1980* *1981* *1982* *1983* *1984* *1985* *1986* *1987* *1988* *1989* *1990* *1991* *1992* *1993* *1994* *1995* *1996* *1997* *1998* *1999* *2000* *2001* *2002* *2003* *2004* *2005* *2006* *2007* *2008* *2009* *2010* *2011* *2012* *2013* *2014* *2015* *2016* *2017* *2018* *2019* *2020* *2021* *2022* *2023* *2024* *2025* *2026* *2027* *2028* *2029* *2030* *2031* *2032* *2033* *2034* *2035* *2036* *2037* *2038* *2039* *2040* *2041* *2042* *2043* *2044* *2045* *2046* *2047* *2048* *2049* *2050* *2051* *2052* *2053* *2054* *2055* *2056* *2057* *2058* *2059* *2060* *2061* *2062* *2063* *2064* *2065* *2066* *2067* *2068* *2069* *2070* *2071* *2072* *2073* *2074* *2075* *2076* *2077* *2078* *2079* *2080* *2081* *2082* *2083* *2084* *2085* *2086* *2087* *2088* *2089* *2090* *2091* *2092* *2093* *2094* *2095* *2096* *2097* *2098* *2099* *2100* *2101* *2102* *2103* *2104* *2105* *2106* *2107* *2108* *2109* *2110* *2111* *2112* *2113* *2114* *2115* *2116* *2117* *2118* *2119* *2120* *2121* *2122* *2123* *2124* *2125* *2126* *2127* *2128* *2129* *2130* *2131* *2132* *2133* *2134* *2135* *2136* *2137* *2138* *2139* *2140* *2141* *2142* *2143* *2144* *2145* *2146* *2147* *2148* *2149* *2150* *2151* *2152* *2153* *2154* *2155* *2156* *2157* *2158* *2159* *2160* *2161* *2162* *2163* *2164* *2165* *2166* *2167* *2168* *2169* *2170* *2171* *2172* *2173* *2174* *2175* *2176* *2177* *2178* *2179* *2180* *2181* *2182* *2183* *2184* *2185* *2186* *2187* *2188* *2189* *2190* *2191* *2192* *2193* *2194* *2195* *2196* *2197* *2198* *2199* *2200* *2201* *2202* *2203* *2204* *2205* *2206* *2207* *2208* *2209* *2210* *2211* *2212* *2213* *2214* *2215* *2216* *2217* *2218* *2219* *2220* *2221* *2222* *2223* *2224* *2225* *2226* *2227* *2228* *2229* *2230* *2231* *2232* *2233* *2234* *2235* *2236* *2237* *2238* *2239* *2240* *2241* *2242* *2243* *2244* *2245* *2246* *2247* *2248* *2249* *2250* *2251* *2252* *2253* *2254* *2255* *2256* *2257* *2258* *2259* *2260* *2261* *2262* *2263* *2264* *2265* *2266* *2267* *2268* *2269* *2270* *2271* *2272* *2273* *2274* *2275* *2276* *2277* *2278* *2279* *2280* *2281* *2282* *2283* *2284* *2285* *2286* *2287* *2288* *2289* *2290* *2291* *2292* *2293* *2294* *2295* *2296* *2297* *2298* *2299* *2300* *2301* *2302* *2303* *2304* *2305* *2306* *2307* *2308* *2309* *2310* *2311* *2312* *2313* *2314* *2315* *2316* *2317* *2318* *2319* *2320* *2321* *2322* *2323* *2324* *2325* *2326* *2327* *2328* *2329* *2330* *2331* *2332* *2333* *2334* *2335* *2336* *2337* *2338* *2339* *2340* *2341* *2342* *2343* *2344* *2345* *2346* *2347* *2348* *2349* *2350* *2351* *2352* *2353* *2354* *2355* *2356* *2357* *2358* *2359* *2360* *2361* *2362* *2363* *2364* *2365* *2366* *2367* *2368* *2369* *2370* *2371* *2372* *2373* *2374* *2375* *2376* *2377* *2378* *2379* *2380* *2381* *2382* *2383* *2384* *2385* *2386* *2387* *2388* *2389* *2390* *2391* *2392* *2393* *2394* *2395* *2396* *2397* *2398* *2399* *2400* *2401* *2402* *2403* *2404* *2405* *2406* *2407* *2408* *2409* *2410* *2411* *2412* *2413* *2414* *2415* *2416* *2417* *2418* *2419* *2420* *2421* *2422* *2423* *2424* *2425* *2426* *2427* *2428* *2429* *2430* *2431* *2432* *2433* *2434* *2435* *2436* *2437* *2438* *2439* *2440* *2441* *2442* *2443* *2444* *2445* *2446* *2447* *2448* *2449* *2450* *2451* *2452* *2453* *2454* *2455* *2456* *2457* *2458* *2459* *2460* *2461* *2462* *2463* *2464* *2465* *2466* *2467* *2468* *2469* *2470* *2471* *2472* *2473* *2474* *2475* *2476* *2477* *2478* *2479* *2480* *2481* *2482* *2483* *2484* *2485* *2486* *2487* *2488* *2489* *2490* *2491* *2492* *2493* *2494* *2495* *2496* *2497* *2498* *2499* *2500* *2501* *2502* *2503* *2504* *2505* *2506* *2507* *2508* *2509* *2510* *2511* *2512* *2513* *2514* *2515* *2516* *2517* *2518* *2519* *2520* *2521* *2522* *2523* *2524* *2525* *2526* *2527* *2528* *2529* *2530* *2531* *2532* *2533* *2534* *2535* *2536* *2537* *2538* *2539* *2540* *2541* *2542* *2543* *2544* *2545* *2546* *2547* *2548* *2549* *2550* *2551* *2552* *2553* *2554* *2555* *2556* *2557* *2558* *2559* *2560* *2561* *2562* *2563* *2564* *2565* *2566* *2567* *2568* *2569* *2570* *2571* *2572* *2573* *2574* *2575* *2576* *2577* *2578* *2579* *2580* *2581* *2582* *2583* *2584* *2585* *2586* *2587* *2588* *2589* *2590* *2591* *2592* *2593* *2594* *2595* *2596* *2597* *2598* *2599* *2600* *2601* *2602* *2603* *2604* *2605* *2606* *2607* *2608* *2609* *2610* *2611* *2612* *2613* *2614* *2615* *2616* *2617* *2618* *2619* *2620* *2621* *2622* *2623* *2624* *2625* *2626* *2627* *2628* *2629* *2630* *2631* *2632* *2633* *2634* *2635* *2636* *2637* *2638* *2639* *2640* *2641* *2642* *2643* *2644* *2645* *2646* *2647* *2648* *2649* *2650* *2651* *2652* *2653* *2654* *2655* *2656* *2657* *2658* *2659* *2660* *2661* *2662* *2663* *2664* *2665* *2666* *2667* *2668* *2669* *2670* *2671* *2672* *2673* *2674* *2675* *2676* *2677* *2678* *2679* *2680* *2681* *2682* *2683* *2684* *2685* *2686* *2687* *2688* *2689* *2690* *2691* *2692* *2693* *2694* *2695* *2696* *2697* *2698* *2699* *2700* *2701* *2702* *2703* *2704* *2705* *2706* *2707* *2708* *2709* *2710* *2711* *2712* *2713* *2714* *2715* *2716* *2717* *2718* *2719* *2720* *2721* *2722* *2723* *2724* *2725* *2726* *2727* *2728* *2729* *2730* *2731* *2732* *2733* *2734* *2735* *2736* *2737* *2738* *2739* *2740* *2741* *2742* *2743* *2744* *2745* *2746* *2747* *2748* *2749* *2750* *2751* *2752* *2753* *2754* *2755* *2756* *2757* *2758* *2759* *2760* *2761* *2762* *2763* *2764* *2765* *2766* *2767* *2768* *2769* *2770* *2771* *2772* *2773* *2774* *2775* *2776* *2777* *2778* *2779* *2780* *2781* *2782* *2783* *2784* *2785* *2786* *2787* *2788* *2789* *2790* *2791* *2792* *2793* *2794* *2795* *2796* *2797* *2798* *2799* *2800* *2801* *2802* *2803* *2804* *2805* *2806* *2807* *2808* *2809* *2810* *2811* *2812* *2813* *2814* *2815* *2816* *2817* *2818* *2819* *2820* *2821* *2822* *2823* *2824* *2825* *2826* *2827* *2828* *2829* *2830* *2831* *2832* *2833* *2834* *2835* *2836* *2837* *2838* *2839* *2840* *2841* *2842* *2843* *2844* *2845* *2846* *2847* *2848* *2849* *2850* *2851* *2852* *2853* *2854* *2855* *2856* *2857* *2858* *2859* *2860* *2861* *2862* *2863* *2864* *2865* *2866* *2867* *2868* *2869* *2870* *2871* *2872* *2873* *2874* *2875* *2876* *2877* *2878* *2879* *2880* *2881* *2882* *2883* *2884* *2885* *2886* *2887* *2888* *2889* *2890* *2891* *2892* *2893* *2894* *2895* *2896* *2897* *2898* *2899* *2900* *2901* *2902* *2903* *2904* *2905* *2906* *2907* *2908* *2909* *2910* *2911* *2912* *2913* *2914* *2915* *2916* *2917* *2918* *2919* *2920* *2921* *2922* *2923* *2924* *2925* *2926* *2927* *2928* *2929* *2930* *2931* *2932* *2933* *2934* *2935* *2936* *2937* *2938* *2939* *2940* *2941* *2942* *2943* *2944* *2945* *2946* *2947* *2948* *2949* *2950* *2951* *2952* *2953* *2954* *2955* *2956* *2957* *2958* *2959* *2960* *2961* *2962* *2963* *2964* *2965* *2966* *2967* *2968* *2969* *2970* *2971* *2972* *2973* *2974* *2975* *2976* *2977* *2978* *2979* *2980* *2981* *2982* *2983* *2984* *2985* *2986* *2987* *2988* *2989* *2990* *2991* *2992* *2993* *2994* *2995* *2996* *2997* *2998* *2999* *3000* *3001* *3002* *3003* *3004* *3005* *3006* *3007* *3008* *3009* *3010*

spiritus nonnulli, circa nervorum extremitates hospitantes, ab objecti furoris impulsu expulsi facti, alios in communem sensum extulcunt, quo, sentitio peragitur, & dein ita ulterius confectio, una omnes velut dato signo in arma vocat, subito evigilant, acque excubitis accinguntur: Ejusmodi insensatio molesta, quæ spiritus animales à somno expulsi fecit, non tantum à sensibili externo inferitur, ut cum sonitus ingens, aut plaga cui insidit, soporem excutit, verum aliquando ab humore acris, pharmaco, lambicis, aliisque affectibus interius insit, partes nervosæ vellicantur, indeque spasmus aut dolore oborto, spiritus in motum coguntur, ut propterea à somnis excirentur. *Idem parte 1. cap. 16.* Ne tamen hæc spirituum expansio (quæ vigilia est) usquam ad membra illorum jactans diutius quam par est protrahatur, Et spiritus tubide defesse staccantur, ac velut sponte decumbunt. Ac una liquor nervus in cerebri corticem suffusus, eorum meatus infertit ac occidit: Hinc sequitur vigilas præternaturales à duobus hîc, nempe etheri aut simul utroque pendere. Aut enim illi nimis effecti, ac velut cætro petri, hæud sponte succumbunt: Aut liquor nervus cerebri exterioris poros non ita implet & obturat, proinde ut spiritus illinc introsum ad requiem cogantur: utriusque horum typi observandi passim occurrant. Et 1^o, advertere licet spiritus animales interdum effectos, ac ita elabiles, aut alias inermes factos, non modo non sedari & quiescere, sed intra propriam emanationis suæ spheram vix contineri posse, quapropter in Vigilia continua expansi, cerebrum ita impleant ac repleant, ut tunc nervus, præ foribus licet copiose aggeitis, minime admittatur: quod si, ut ipse ingreditur, spiritus à cerebri cortice introsum revocetur, itam illi coercit, vel intra cerebri medullium tumultuantes, phantasmata mille & sæpe horrenda concitant, quibus sumus accret: aut illinc ulterius potè suum in genus nervosum disingentes, magnas ibidem inordinationes elent, quæ somnum, ut inirentem & insitæ viam, continuo abigunt & absumunt. Quoad prius, horum sæpe observavi quosdam vigilia affectos, qui somnum, licet optatissimè rogarent, inire perhibebant, quamprimum enim dormituri oculos clauderent, denuo statim exilientes, confusa phantasmata multitudine sese mox adigi ad insaniam clamitabant, proinde ut necesse habuerint somno abstinere. Secundo, Spiritus dum effectiores facti propter somnum, ab ambra cerebri versus interiora revocantur, quandoque in genus nervosum suas convertunt, & tunc, aut in nervos præcordis aut visceribus distinctos tumultuarie lucentes, in partibus respectivis inordinationes elent, (hinc taliter affectus quodam clausis oculis somnos invitant, aut cordis tremores, subsalsus & constrictiones cum spirituum deliquis, & respiratioe impedita: aut viscerum inflammationes & intumescenzæ, præfocionis sensus aliæque symptomata, pro hystericiæ vulgo habita, succedunt.) Vel secundo, spiritus ab excubitis vocati, & in genus nervosum conversi, quandoque in spinalem medullam, nervosque exinde in membra quæque exteriora protensos, imperius suos transmittunt: quamobrem nonnulli dum lecto commissi somno indulgent, mox in brachiis & cruribus tendinum subsalsus & ipsam, tantæque membrorum iniquitantes & jactationes succedunt, ut laborantes suad pliquam equales tori dormire possint. Olim pro summa Nob. consulebat, quæ interdicta cardialgia & vomitu acerrimo tentari solebat, noctu autem, & somno tubide appropinquare

vifo, ob affectiones ejusmodi spasmodicas, cum ipso simul invadentes, impediebant, nec quidem tota nocte dormire poterit, nisi tandem in doxi suis largæ prius exhibito: quare medicamentum hoc primo tantum bis in septimana permittit postea quotidie, per tres circiter menses lumbar, nulla exinde noxa aut in cerebro, aut circa aliam quamvis functionem contracta, & cômque ab aliis inter ea remediis utis, sanguinis & lucci nervosi dystrasis emendatis, spiritus animales benigniores mitioresque fierent, illi posthæc opio prius relicto, mediocriter dormire poterit. Hujusmodi affectus somnifugi, sive intra cerebri medullam, sive intra genus nervosum, aut interioris aut exterioris concitati, omnino à spirituum animalium mala constitutione pendere videntur: nam qui mites, clari & lucidi corpora consistentia blande adjuvat, & suffusentia benigna irradiare debent, æres & effecti, ac tanquam effluvia ab aquis stygiis emissæ coerceri inhabiles, ea nimis dilendunt, voluntatis imperio regi, & à somno sedari recusant, quin uno in loco cohibiti mox in alium tumultuant: Talis spirituum animalium constitutio à sanguinis gignendis, & lucci nervosorum fovendis & augmentis dystrasis acris, & sæpe quasi vitiolosis procedit. Quoniam vero ejusmodi Pervigilia diu tolerari non possunt, ideo impudens adhiberi debet quæ spiritus demulceat, eorumque inordinationes blande leniant. Quod si illi irrequiesci blanditis compesci vultur, in telationem vicalis & verberibus quasi illictis eos cogere oportet: eorum copiam diminui, simulque spacia, in quibus liberi & sine tumultu expandantur, dilatasi, & ab aliorum humorum se, sanguinis ac feri insalutibus, expediti debent: In quos fines venæ sectio interdum convenit: Velicaria fere semper locum habent: Opiata, si bene conveniant, crebro assumantur, atque interea dum hæc indolis à morbi violentia præbent, hujus causæ sedulo aliorum remedium uti, quantum fieri potest, eradicetur: Quapropter quæ sanguinis & suæ nervi acorem tollunt, eoque dulcedini restitunt de die in diem horis medicis exhibeantur: In quo censu pulvis testaceos, apozemata & aquæ destillatæ alterantes, ac antiscorbuticis temperatis, chalybis præparata minora. Spiritus fuliginis & præsertim Tinctura Animonii. Restat altera Pervigialis species, cujus causa aliqua ex parte, si non maxima, consistit in pororum sive meatuum in cerebri cortice fere continua apertione, sive nimia debilitentia: præterquam enim quod spiritus animales æres & nonnulli effecti, sponte sua succumbere & quæri indalgere cœnsant, inupei illi nulla repagula, aut jura è liquore nervo cerebri poros subeunte, imponunt, quin liberi omnique sarcina immunes, illi etiam intra cerebri exteriora spacia ubique vacua expanduntur: quare ob hanc causam pervigiles nullum torporem, aut principis gravitatem, nullum somni appulsum aut desiderium sentiunt. Novæ quosdam ad hunc modum affectos, qui cum plures noctes continas prius inermes digressi, usque tamen alacres & impigeri stomacho valentes & ad negotia expediti, somno oodum canisise videbantur. Hujus causæ proculdubio est Sanguis rectoris & atrabilis, qui cerebro exteriori succum cerevum, non mitem & benignum, sed assatum nimis & patetis adultis referunt suppeditat, qui proinde nec intra poros cerebri diutius manere, nec spiritus animales blande compescere & consistere aptus sit: Puto ipsi spiritus ex eo procreati, ex natura sua nimis elastici & irrequiesci evadunt, propterea ut nec facile sedentur, nec in soporem sua sponte proclives exi-

stant. Cæterum fiores illi haud prompte avolant, sine magna refectione perdurant ac vegeti persistant. nec cito defatigari flaccescunt, quin longo tempore

line magna refectione perdurant ac vegeti persistant. *Th. Willis Tract. de Anima Hum. part. 1. cap. 5.*

OBSERVATIO II.

§. *Vigilia excitata à phlegmone meningum, &c.*

Juvenis cum per duas septimanas de gravissimo capitis dolore conquestus esset tandem febris aucta & vigiliæ ac mors succedere. Calvaria aperta, vasa meningas obducenria, erant sanguine referta: Porro ipsæ membratæ tumore phlegmonode per totum affectæ apparebant. *Vide Tit. de dolore cap.*

OBSERVATIO III.

§. *Vigilia à phlegmone cerebri partis posticæ exorta.*

Juvenis sub cane in gravem capitis dolorem incidit cum vigiliis perpetuis, febre obscura & levissima, &c. Aperta calvaria magna sanguinis nigerrimi, etsi diluti copia effluxit itatim: Cerebri tuniæ venulis nigro torridoque sanguine turgentibus conspersæ apparuerunt. Pars posterior non solum nigricans, sed & membratæ puniceo colore & gangræna correptæ visæ, &c. *Vide Tit. de cap. dolore.*

S C H O L I A.

Eltæ obscura & levissima) Causam affectus Rufus quod cerebrum solum laboraret, frigidum nausea & humidum. Idvero veramine sit pure in dubium revocari: Viti gravissimi Placuit & Wigfoni. Revera, si ad magnitudinem & numerum arteriarum, tum ejus substantiam subeuntiam, partim superficiem petreptan-

tium: Si morbos calidos, quibus obnoxium est, faciliusque caloris susceptionem: Si necessitatem multi sanguinis calorisque ad tot actiones admittendi, rectè id calidam, si non insito, (altem influente calore censendum. Copia autem excrementorum, quibus redondar, multitudini alimenti ipsi necessarii adscribenda est.

OBSERVATIO IV.

§. *Vigilia orta à plenitudine vasorum meningum, nigro sanguine distentorum, Ulcere sub medio ossis sincipitis dextri, Seri copia in ventriculis, &c.*

Vir 46. annor. (de quo Tit. de capitis dolore) incidit in dolorem sincipitis, quem insequantur continuæ Vigiliæ, Mortui aperto capite reperio 1. venas arteriasque duras & piæ meningis turgentres plenasque nigro sanguine: 2. Sub medio ossis sincipitis dextri, ulcus oblongum cum sanie crassa & muleum flava. 3. In ventriculis antetioribus, 3 x 11. seri limpidissimi. 4. Plexus choroideus non nihil erat arrofus & putrefactus.

OBSERVATIO V.

§. *Vigilia inducæ à cranio sphacelato, & ichore putrido sub eo contento.*

Taurini Quæstor (de quo sit. de cephalalgia) jam menses aliquot infomes peregerat ex capitis dolore: Eum secuit N. ubi cranium ad coronalis & sagittalis commissuræ regionem sphacelatam putidumque invenit, Et cranio sera aperto abundans ichor putridus profluxit, &c.

OBSERVATIO VI.

§. *Vigilia diuturna ab abscessu cerebri excitata.*

Observavi quendam ex diuturno dolore capitis, longisque Vigiliis afflictum, tandem levi delirio & convulsione correptum perisse: Et aperto cranio inventus fuit abscessus eum pure admodum fixente & corrupto. *Sebastianum Nasium meth. med. p. 2. quæst. 16.*

S C H O L I A.

Hinc inferendum non semper Lethargum ab apoplemie induci, sed tunc præcipue cum non circumscripta margine, sed in omni cerebri substantia humor diffusio putrescit: Vel cum apostema circumscriptum medium & præcipuum cerebri regionem, in qua arteriosi plexus continentur occupat, ita ut spiritus omnino opprimantur vel eustrampantur: Cum vero apostema locum circumscriptum habet, & relique partes sunt libere, nec spiritus opprimuntur, tunc non sequitur lethargus. *idem.*

OBSERVATIO VII.

Vigilie à vasis utriusque meningis sanguine turgidis, Ulcere oblongo sub sinapite dextro, Plexu chorœideus nonnihil artoso, &c.

Vir Nob. incidit indolorem sinapitis, quem insequuntur Vigiliæ continuæ, &c. Illi vasa utriusque meningis sanguine erant turgida; Aderat ulcus oblongum sub medio ossis sinapitis dextri, Plexus chorœideus nonnihil artosus. *Vide Tit. de cap. dolore.*

OBSERVATIO VIII.

Vigilie perpetuæ à Pancreatis abcessu latente excitata.

Mercator ætate virili & *Compos*, cujus facultates naturales suo probe fugebantur officio, Verum de Somno apud Medicos duntaxat ipse conquereretur; Cum enim dormire conabatur, tum in leiporhythmiam & totius faciei frigidum sudorem incidebat: Propterea qui tum ipsi aderant Medici, ob stomachum, quem male affectum esse opinabantur, hieram Galeni propinarunt, sed frustra & absque ullo commodo, imo vero assumpto pharmaco multo quam antea deterius se habuit: Quare Medici mutarunt sententiam (quia ex juvenilibus aut lædentibus non solum noscuntur interni morbi, sed curandi indicationes sumuntur) & ad Cardiaci intrus & foris adhibenda confugiunt, ex quibus tamen nullum quoque commodum prorsus percepit: Itaque cum prorsus nihil dormire posset, tandem miser ille interit.

Post sectum est cadaver, in quo Pancreas, interno salvoque vitæ principio & stomacho, duntaxat repertum est abcessu putrefactum: Unde per somnum spiritibus ad extremis partibus ad sua revocatis principia, tetros malignosque vapores cor ferientes, & forte etiam stomachum efferti excitarique Medici post hac conjectarunt: &c. *1. ac. Auberj. p. 44. ad lib. de abd. Fernelij.*

S C H O L I A.

Pancreas abcessu putrefactum, &c. Hæc fuit temora & mediata Vigiliarum causa; Ut somnus obrepantia requiramus, Cerebri temperies, Animi tranquillitas & suavis Anathymiasis, qualis ab abcessu laborante parte efferti non potuit. Tetet vapor inde manans, imo sanies, per ductum patens in Wirsungio ductum in Pancreate, in duodenum hiancem, prompte ventriculo inferri poruit, lacessitisque ejus orificiis, extimio sensu perditis ob insignes nervorum propagines, & leiporhythmiam frequentem & petennes Vigiliæ, ob communionem qua ventriculo cum Cerebro intercedit, & perpetuum vaporum ascensum parere voluit. Inter affectus quos Pancreas male constitutum accersere solet, Vigiliæ recensent *Nalpin lib. 4. Observ. 32. Rivinus Pract. lib. 1. cap. 4. Hyemius in disquisitione. Anat. in Nobili matrona Epilepsia & convulsionibus frequenter temera, salva cuncta fuisse, præter Pancreas quod ulceratum reper-*

tum est; Ex renote *Sylviana* doctrinæ accusanda venit Pancreatici succi excedens aciditas, aut ejusdem visciditudo cum bile effervescentia, Cum consilet acidus aut acres succos Vigiliarum parentes esse.

Ob stomachum quum male affectum Vel idiopathice, vel per consensum, ut hic à substrato Pancreate abcessu tentato: Excellens. *Willems* narrat de senese hypochondriaco, ipsam inter alia symptomata, eructationi crebre sonoræ & valde moleste à pluribus annis obnoxium fuisse: Eructationem istam in Pervigillum permutatam esse, nam affectu eo multo remissius habente Virum illum totas sæpe noctes insonnes traduxisse; Remediorum ope Pervigilio sensum evanescere, Eructationem redidisse. Hinc ut consilet, ut, utriusque causam eandem fuisse, scil. particulas adultas & irritativas è massa sanguinea modo in ventriculi tunicas, modo in corticalem cerebri partem suffusas.

Et propterea convulſio procedere, quam obrem antiquiores diaphragma *phren* appellabant: Verum illis non opus fuerat ſi conſiderarent diaphragmatis actionem omnem à ſpiritu animalium & cerebello effluu pendere, & propterea neceſſe eſſe, ſi materia phrenitica cerebellum invadente quædam pars ejus in cerebrum ſumum irruat, ut præter deſipientiam, inſuper ſepti, ex ſe licet inſonitis, motus alteretur.

Itaque Phrenitidis ratio formalis in eo conſiſtente videtur, quod ſpiritus animales, imprimis in toto cerebro, plurimum irritari, in motus inordinatos & valde confuſos, ſimilique impetuosos adigantur: proinde ut functiones ejuſque animalis actus depraventur de varie pervertantur, ſerum idem ſimul plurius à memoria luſcitaret, veteres cum novis, aliæque aliis male conjunctæ, aut diſtincte conſiſtunt, phantasmata multiplicia & pene innumera, & que tantum incongrua imaginatio ſuggerat. Senſibilium ſpecies diſſortas, duplicatas aut incoherentes, ſenſorium commune repræſentat: hinc ut mens & voluntas conceptus, & paſſiones nonnihil ridiculas & impetinentes eliciant, atque corporis actiones ſere tantum irregulares odi faciant. Porro non tantum in cerebro, ſed etiam in cerebello, & ubique in nervoſo genere ſpiritus velut æſtu periculi tumultuant: qui ephrenetici non ſolum deſue loquantur, ſed inæquales reſpirant, vociferantur, pugnos cedunt, manus & pedes jaciunt, quin & membra quæque viribus intentis cùmque impetu validiſſimo lacerant, revera ut tota videatur anima in toto corpore fuſioſa expandeſcere & deſubari, ſeu potius velut incendio correpta inflammari: Ex quidem Phrenitis nullo modo apertis definiti potelt, quam quod ſit totius animæ ſenſitiva, ſive ſpirituum animalium, quoad totam eorum hypotheſin, phlogiſis ſive inflammatio: Incendium hoc à ſpiritus cerebri incolis ſemper incipiens, & exinde in reliquis animæ ſenſitivæ partes emigrans à ſanguine igne febrili prius æſtuate, tum materiam primo incendiariam, tum conſtans incendiis pabulum accipere videtur: Enimvero probabile eſt ſanguinem febriliter ardeſcentem, particulas interdum ſulphureas una cum ſpirituofis cerebro offundere, quæ ſemiacceſſæ, & quodammodo efflagrantes, ſi una cum alteris penetrant, exinde mox omnes ductus medullares & nervos ſubeunt, ſpiritus ubique adherens, eoque adeo inflammatus ſumme efferos & impetabiles redditur: Certe verifiſſimus eſt Phrenitidem hoc ritu à ſpirituum phlogiſi, potius quam à meningum aut cerebri inflammatione, quæ cephalæam aut Jerchurgum, certius quam furorẽ (prout ex cerebri Anatomia compertum habui) inferrent excitari.

Et quidem iſa fieri hæc noſtra tantum aut nova proſus opinio eſt, verum Hippocratis præcipuus ille ſectator & Interpret optimus P. Maronius idem expreſſis ſere verbis ſtatuit, *Vide Subtilia ad cap. ſequ.* Ubi maniſeſte diſtinguit inter *calorem & flammam*, æque iſtum reſpectu qualitatũ, & hanc reſpectu ſubſtantie alterationem eſſe ſtatens, Phrenitidis cauſam ſpirituum inflammationi plane adſcribit.

Spirituum à ſanguine in cerebro productionem deſtillationi chymicæ ſæpius comparavi. De qua obſervare eſt, ſi liquor ſpirituofulphureus igne nimis intenso urgeatur, eum inter exſtillandum quandoque ignem concipere, ac efflagrantem cum ſtamina aperta in alembicum accendere. Hoc de oleo Terebinth. per ſe, aut cum floribus ſulphuris ebulliente

quibuſdam magno ſuo damno ſais innoſcit. Pariter opinari licet ſanguinem intensius ardeſcentem, etiam ſpiritus de ſe exſtillatis nobis raro incendium communicare, ſcilicet, particulas quaſdam ſemiacceſſas cerebri poris inſinuare, quæ in ſpirituum ductus omnes, tum ibidem, tum in appendices ejus irruentes, ſpiritus ubique accendunt atque in motus pernicioſiſſimos ac velut fulguratos eorum.

Quod autem febribus non omnibus, nec tantum maxime ardentibus, Phrenitis ſuperveniat, ratio eſt quod cerebri clauſtra in tantum obſerata eſſe debent, ut non modo iſis nihil extraneum ſuſtendantur, ſed nec ſanguinis, ut ut ſumme flagrantis, & circumſcriptæ conſuſi ſtamina intenſior eo perſumpere valeat: quare nonnullis febre cauſo affectis eſt error totus ardeſcit, torrentur viſcera, æſtuant medullæ, lingue & fauces velut à carbone vivo æſtuant, uſque tamen cerebro ſumiteſ oculoſas functiones animales ſanæ recte præſtant: Verum è contra alii, quibus cerebrum debiliſ & nimis laxum eſt, atque ſanguis plus debito ſulphureus, non tantum à febre ardente, ſed interdum à miſtiori viſa phrenitide evadunt.

Sanguinis autem prævia diatheſis, diſponens ad Phrenenſin, requiritur, quæ modo ſimplex modo duplicata exiſtit. Prior eſt conſtitutio ejus calida & acris, ſive biliſſa, nempe quod plurimas in ſe particulas ſulphureas continet, quæ plus debito in febre accenſæ, ſanguinem magis efflagrare, atque incendioſum ſuum cerebro inſinuate aptæ ſunt: Diſpoſitio hæc quando potius & ſumme æſtuata fuerit, morbum iſtum perſe non raro producit: plerumque vero ſub eſt altera ſanguinis diatheſis, quæ periorẽ illam adjuvat, & magis efficacem reddit, nempe quod præter particulas ſulphureas & inflammabiles, adſunt aliæ aſperæ & penetratiæ, quæ videlicet ſubeunt & aperiunt, adeoque priores faciliſ introductur: Hoc corpuscula ſalina ſulphureis conjuncta quodammodo efficiunt: hinc biliſſi & melancholici febricitantes, in furorẽ ſunt magis pronives: Anamen longe potentius particula heterogeneæ cum ſanguini inſunt, à febre commove, cerebri oſtia aperiunt & inflammabiles quaſque inſormitant: Quapropter varioli & febribus malignis ac peſtilentibus Phrenenſis cerebro ſupervenit.

Requiritur & alter ad Phrenenſin apparatus, qui cerebri eſt, qui partim in iſius temperie & conformatione, partimque in ſpirituum incolamẽ indole conſiſtit. Quoad prius, cerebro calido & ſiccò præditi in Phrenenſin maxime proclives reperiuntur, non quod ea conſtitutio inflammationi ſive phlegmoni magis obnoxia ſit, (nam ad hanc minus apta eſt) ſed quoniam in tali cerebro, ſecus ac in calido & homido; vel frigido & ſiccò, pori & meatus apertiores ſunt, & nimis deſiſcentes materie incentivæ à febre ſoggeſtæ adiũm præbent. Quæ inſuper multo facilius admittuntur; ſi ſpiritus admodum fugaces & pathetici, levi quavis occasione in triſtitiæ, timoris, iræ aut oſi paſſiones apti fuerint; proinde ut materie extraneæ inſectibus minus obſiſtant, ipſique incendium promptius accipiant.

Quod autem febribus non omnibus, nec tantum maxime ardentibus, Phrenitis ſuperveniat, inde eſt quod cerebri clauſtra in tantum obſerata eſſe debent, ut non modo iſis nihil extraneum ſuſtendantur, ſed nec ſanguinis, nec ſumme flagrantis, & circumſcriptæ conſuſi, ſtamina intenſior ea perſumpere valeat

valeat, quare nonnullis febres causospectis, etsi cnuor totus ardeat, roremur viscera, astuant medullae, lingua & fauces velut à carbone vivo assantur, utique tamen Cerebro summe oculo functiones animales sane recte perstant; venum è contra

aliquibus cerebrum debilius & nimis laxum est, atq; sanguis plus aequo sulphureus, non tamen à febre ardente, sed interdum à minori viâ Phrenitici evadunt. *Wille de Anima Error. part. 2, cap. 10. pag. 423. & seq.*

OBSERVATIO II.

Phrenitis à retrocessu humoris bilioli erysipelas in tibia parientis, in pulmones ac cerebri membranas irruentis, in quibus pustulas, &c. excitavit.

ANno 1664. mense maio Tolosæ degens discipulus M. Franc. Prieur Chirurgi, Vicarij Dom. Francisci de Barnouin, Regij Chirurgi primarij, accersitus sui sanguinem missurus juveni Typothetæ Lemovicensi, cui subortum erat erysipelas in tibia dextra, totam partem anteriorem, à metatarso ad genu usque obfudens: Legitimum id fuit, solo rubore ad citrinum colorem, citra tumorem, |vergente se prodens, comite dolore punctili & insigni partis astu: Dom. Mulaterius, Doctor. aggregatus Facultat. Tolosan. congrua præscripsit remedia: accedenti vero mulierculæ porioriorem fidem adhibuit ægerquam med., qui cholagogo cum purgari curaverat, præmissa sanguinis missione, appositis parti affectæ linteis lacti tepenti immeris & expressis: mediacra vero usâ fotu ex lenticula palustri, umbilico veneris, solano, foliis pruni sylv. malicorio aquæ fabrorum & aceto rosaceo incoctis, frigido actu adhibito, humorem intro repressit, qui illico remisso calore evanuit; at retrocessum diu non impune tulit æger; postmodum enim cruris sensus stupidus evasit, affectu altius irrepente, regionemque epigastricam, umbilicalem & hypogastricam simul invadente, nec non thoracis latus dextrum, accedentibus febre, leiporhymia, nausea: Et quantum periculum imminens ab ejusmodi fotu patefecissimus, ideo tamen non destitit: hinc remisit quidem omnino affectus, sed in pejorem & lethalem desitit: Exaëto enim triduo intumuit ægri caput, ab occupato membro principe: Succesit his ingens spirandi difficultas, siti quæ sedari non poterat, ob quam lingua extra os perpetuo exerebatur: Apertæ fuere venæ brachiorum & pedum: præscriptus litus ex unguent. rosac. albo Rhafis, citrino; Adeo insignis fuit capitis totius cum rubore intumescencia, ut prioris formæ vix ulla superesset vestigia: Postmodum discussus tumor, succedente Phrenitide, & die morbi x i. morte.

Juvenis apertum fuit cadaver, anno x x v i i i. denarij, coram Dom. D. de Quayrats, Primarij Medic. Prosectoris, & Mulaterio Chirurgo. In imo ventre repertum hepatis exiguum, exsuccum, lividum, Intestina vacua & quasi contracta. Thoracis regione aperta, Pleuræ pars dextra pustulis miliaribus obfita deprehensa est, necnon Pulmonum loborum membranæ, ante & retro. Dempso cranio, dura mater similibus pustulis conspersa apparuit, omnino exsucca & arida. Earum quædam dissectæ humorem crassiusculum effuderunt, sebo non admodum similem. Factor summus, præsertim capitis, ulteriorem disquisitionem prohibuit. *Ex communis. Magist. Bailly Chirurgi Genæv. peritissimi.*

S C H O L I A.

Erysiplæis citram inmit Hippocr. aph. 25. sect. 6. *Erysiplæa ferè intro vari malum: intro vero ferè bonum: Quasi dicat, (commentatur Harmanus) In Erysiplæa non est valde refrigerandum, nam bonis ægrotorum rebus fit mutatio intus focus: laudatur enim semper exclusio in partes infirmas ac ignobiles & externas partes: Quare non repelle ubi morbus est malignus, natura debilis, & materia copiosa & acris cum phlegmone viscerum: Ita in pleuritide & peripneumonia non repetimus materiam, nam repressus intro sanguis ægeret horum viscerum phlegmonem; Quicquid igitur ex visceribus ad cutem abijt non debet remitti: Excludenda tamen est causa antecedens, interdum phlebotomia & pharmacia, seroque lactis pro-*

pinato ac julpilis temperandus fervor: Quia topica frigida & humida admovemus, non tam repressoria quam temperationis gratia: Si causa antecedens non magna subijt, linteis immerge aqua soluto madentia admovemus optimo successu, maxime si acerrima vel maligna fuerit materia, & si vicus germin morbosum habet, vel si seors fuerit, aliis de causa vires titubant: Præclarum remedium est stercus recens bobulum, si in sartagine coquantur cum adjectis floribus chamæmeli & sambuci ut fiat cataplasma, quod tepide admovetur; Ex aceto rosato & ex aqua ranarum coquantur myrrha, & ea aqua applicetur. *De Erysiplæa cura inter ceteros consulendus Samartius Pract. lib. 5. part. 1. cap. 7. & lib. de Febribus.*

OBSERV.

OBSERVATIO III.

§. Phrenitis à cerebri inflammatione & membranarum.

Phrenitici biduo extincti caput apertum, in quo cerebrum & membranæ cum rubore adeo tumebant, ut venæ ab ipsius substantia separari possent. *I. Rhodius Centur. 1. Observ. XXXIX.*

OBSERVATIO IV.

§. Phrenitis à Pie matris inflammatione illeso cerebro.

Fabritius Bartholetus nihil falsius est se in plurimis phreniticorum cadaveribus invenisse piam matrem sine omni cerebri noxa inflammatam. *I. Rhodius Obs. XL. Cent. 1.*

OBSERVATIO V.

Phrenitis à dura matris exulceratione, V asorum ejus plenitudine & Pia, cum Abscessu in cerebello flaccido.

Quidam per biennium conquestus fuerat de dolore in Occipite, tandem hic Phrenitide ac convulsivis motibus correptus subito interit. Huic crassa cerebri membrana aliquot locis exesa erat variis foraminibus, idque potissimum in bregmate sub sagitali sutura, ubi ea cum coronali jungitur. Ex his foraminibus effluebat, & per membranam dictam effusus erat sanguis ferme concretus, ater ac adustus, admodum fortens. Tali quoque sanguine distenta erant vasa per exteriorem crassæ meningis superficiem discurrentia, quin & ea quæ numerosa per tenuem disseminata sunt. Huic intra cerebellum abscessus humore non naturali scatens repertus fuit: erat is humor colore ex citrino ad pallidum vergens, palida nimirum bilis. Ipsa cerebelli substantia flaccida omnino molliorque multo quam cerebri substantia. *Petrus Parvius Observat. Anatom. VIIII.*

S C H O L I A.

Convulsivis motibus] Sulcatus ab ea pallida bile quæ abscessum cerebelli fovebat, Aut ab eodem humore qui cerebri membranam aliquot locis exercebat, Imo Phrenitidem Epilepsiam complicatam vidit *Sexennis* io adolescente, qui Phrenitide capitis singulis diebus ac noctibus plerumque trigentes capiebat: Epilepsia, quæ declinante ita in redibat Phrenitide, qui vixit usque ad 14. cum his symptomatibus.

OBSERVATIO VI.

In quodam ab obscura Phrenitide extincto reperte sunt vena cerebri varicosa, medulla cerebri siccijsima, membrana siccijsima.

Adolescens medio Octobri capite doluit; febris sed ea fallax, cum se febre non putaret; nulla dum intermissio officii, lex vitæ neglecta, dolor tamen capitis aggravescebat: Extrema accusabantur, ut ætas ad omnia prona: Tandem febris aucta, dolor capitis auctior; febris verè κεφαλαίη τυφώδης: nihilominus tamen sui negligens ruri modo in urbe fuit, securus omnium tandem lecto affigitur & affligitur: fallax pulsus, ut in morbis capitis, urina fallacide, ille febrī non respondebat, & in capite secus erat; segnities alvi, nec nisi arte provocata quicquam ex alvo profluebat: æstus viscerum, sed major capitis, oculus ardens, facies rubra, maximè genæ: aliquid pulmonicum suspicabamur; dolor capitis major ad sinistram: omnia nodu graviora, clamores, iactationes, deliria fugacia, indecora corporis compositio, mox ad se rediit: rursus deliria intra veba, somnus profundior ut vix excitaretur: deinde coma vigil, & inæqualis symptomatum mixtura: mox catochus; nisi quod dellratio jugis non foret, mox lethargicum quid, mox typhomaniæ species: taudam oculi fixi & rigentes, ut in catoche: obscura phrenitis, blanda, contrectabilis, dextrarum

parrium tigor revera *anæsthesia* & deinde paraplegiacum quid; Sifiafin quandam & *phlogosum* fufpiciari fumus: difficilis respirario, qualis peripneumonia: omnia vifa sunt mitiora: Convalefcendi fpes aliqua; morbus variè lufit oppugnatus, fed non expugnatus invaluit, dolores repetunt, omnia in pejus ruere, per dies 40. traxit, mors.

Aperto capite venæ quali varicofæ, tabo & fanguine nigro turgentes videntur: Item obfervatum in ventriculo medio ferum multum: medulla cerebri, quæ mollior & friabilis effe debet, ficcior: membranæ ficciffimæ, quali per firaiafin & deflagrationem arefactæ & rigentes, vix lacerabantur, vix novacula præcidebantur, acutiei fecantis refiftentes: imò fectæ crepabant more membranarum arietinarum atque occalefcenciam: Pulmonis partes dextræ lateri adhæfu contumaciore, lacerabiles necdebantur plenæ vomitis tabo & pure fcotentibus: hæc reliqua ex gravi peripneumonia, quæ anno præterito illum oppreflit ac pene confumpfit: Hepar labem conceperat, fed non maximam qualtem pulmo: *Balfonius lib. 3. conf. 71.*

S C H O L I A.

Membrana fiffiffima] Causa interitus & fymptomatum fuit illa Sifiafis & phlogofis, perieritum membranarum cerebri: In his & in cerebro non tam fuit alteratio quàm alienario: Et in his fuit quedam hæctica incompertis diftinitate temporis contracta: Accessit pulmonis dextri impuritas, in quo vomice erant, veteris tabi & puris reliqui ex peripneumonia: Hippoc. notat ex pulmone quoddam lethargos, cum effluat cerebrum tetri vapore, unde maior cerebri, & marcet æget, nec fari potest; ut uno dicam verbo, Typhomania erat potius species quedam, mixta fymptomatis phrenitidis & lethargi; non vera & aperta fuit phrenitidis, in qua ad omnem audaciam prompta mens est, fed ob impetellam inftantem que hæctica cerebro & membranis incompertem obfcurem. Vulgus designat phrenitidem ex motu, clamore, infulsibus, involata, in obvium quemque ungibus, delirio perpetuo, fed alia est fine his manifestis: id quod *Galenus* manifestè expreflit in proth. Citat locum Hipp. ex Epidem. *Nihil phreniticorum valde infansit, fed reversa ad fonnam inclinatione gravati periant:* Et bi phrenitici obfcuri vocantur: & id læpe vulgo ignotum & Medicis: Eos demum vocant phreniticos qui clamant & exiliunt: In obfcura virium languor est, & hæctica quedam affectio phrenitidis est: Idem contingit quod lanis tinctis quæ colorem non deponunt: ita quidem hæc affectio cerebro impreffa hæctico modo vi ejui potest. *Idem ibid.*

Dolor capitis, Deliria, Somnus cxi.] Symptomata quæ caput exercent, aut funt Caraphorica cum fomno profundo: aut Paraphorica, cum delirio: aut Caraphorica cum fluxionibus, aut Cephalalgica cum dolore capitis: Tria fufficiunt æget, paraphorica, cephalalgica, caraphorica.

Fallax pulfus ut in morbo capitis] Quod in apoplecticis præsertim deprehenditur, quorum pulfus ingruente affectu vi immutatur, qui li concidat, cotruentis simul vitalis facultatis cum animali, instantique fari certum indicium præbet. An vero cordis Pulfus à fpiritu animalium per nervos influxu ira neceffario dependeat, ut eo prohibito cordis actio omnino cefset, difquirat Excell. *W. Hufius Anat. cerebri cap. 24.* Ac pro declinatione experimentum in cane vivo factum affert, Cicco Jugulum, cuse per longum difciffa, utriusque parvis vagi trunco fecutum atrepto, ligatura valde ftricta injiciebatur: quo facto itatim canis orpescere vifus, obdormit & circa hypochondria motus convulfivos cum magno cordis timore paffus est: verum hoc affectu brevi ceffante poftea quali moribundus jacuit, ad motum quemvis impotens ac alimenta quævis oblata refponfens, nihilominus vita ejus adhuc perduravit, nec, poftquam Nervi isti penitus difsecta-

rentur, itatim exstinguebant, quin per plures dies fuperstes tamdiu vixit, donec faxe præ longa inedia viribus fenfim artibus enecaretur: Cadavere aperto, fanguis intra cordis ventriculos, & vala illinc undequaque provenia, fcil. tum arterias, tum venas valde coagulatus in grumos concreverat: nimirum proinde quia fanguis, licet poa vita utcumque fufficiens aliquatenus ci cuaretur, maxima ramen ex parte tum in corde tum in valis stagnaverat: cujus ftagnationis causa non alia videtur assignanda, quam quod præcordia, prohibito fpiritu animalium influxu, tollitus motus deficeret. Quod si ultra inquiratur, unde fpiritus animales (præclufo utrinque parvis vagi ductu) cordi adhuc motum ejus pervenientes fuppedirentur? At id fieri poffe per nervos Recurrentes, utpote è quorum nodis fuculi & fibræ plures cardiacæ produant, atque præterea nervi utriusque extremitas Nervo à fuperiori plexu dimiffio occurrentes uniant: Notandum vero quod fpiritus animales intra nervorum ductus ultro o c in ove deferri poterunt: quæ, cum vitæ neceffitas urget, fpiritus penus diminuitur licet, è plexu prædicto dimiffus, à nervi recurrentis cauda excipitur, ac illinc comenatu retrogrado in ramos cardiacos, & c. dum in cor ipfum derivatur: Utrumque experimentum illud concludere videtur cordis motum non minus à fpiritu animalium, quam à fanguinis influxu pendere: utriusque privatio totalis vitam admittit; æque à fanguinis defectu (quaenon fpiritus cordis influxu copula fupphæa denegatur) cordis vigor ac via elastica fupprimitur, ut pulsu fenfim debilitato vita paulatim exstingatur: Proculdubio in tenore pulvis explorando temper attendi debet qualis ipfi alteratio fpiritus animalium & fanguinis vitio inducatur. *Vide plura fua dicta.*

Deliria intra verba.] Tremula, obfcure blandæque delipienfæ valde phrenitice, ut Didymacho in Co obvenit, ut citat. *Hippoc. i. Proth.* *Galenus* in comm. meminit phreniticorum, de quibus loquitur *Hippoc. 3. Epid.* Nullus phreniticorum, ait, vehementer infanivit, velut aliis affa venit, fed alia quedam veterofa in fomnum inclinatione capite gravi peribatur. *Et paulo poft.* Phrenitide ex biliofo iacco generationem habent, cum is in cerebrum decubuerit, principio quidem qualitate ipfius nondum toti corpori cerebri permixta confufque, tumultuofæ funt delipienfæ: procedente vero tempore fimile quippiam conerabitur lanis quæ à tinctioibus appellari ricturam accipitur: nempe è hæc vir claudibiles redduntur, non fecus atque ex quæ ab initio colorem habent: Talis igitur cerebri tinctura, delipienfiam hæcticam habet, atque ob id affectio horum, ut febrium hæcticarum prava est.

OBSERVATIO VII.

Phrenitis à tumore inflammatorio in substantia cerebri.

AD invensum puerum duodecennem accersitus, arteriam in carpo contemplore duram cum pulsu frequenti & exiguo: ægrum imaginatione laborare deprehendo, continuo delirantem, floccos carpentem, insomnem, immortigerum: cui lingua exusta, fuliginosa, nigra: excrementa sicca, dura, pilularum instar: Hunc phrenitide confirmata laborare, eaque exitiali mihi persuasi: nam triduo post, nullis auxiliis aptis proficientibus, migravit è vivis:

Secundo capite, contemplatoque cerebro, in ejus medullari substantia repertus est tumor nucis juglandis magnitudine, rubidus, & venis turgentibus sanguine tepletus, qui hujus noxæ causa fuit certissima: rupto abscessu, emanavit foetidus ichor, cochlearis quantitate, & venæ jam ante tumide, subsederunt: Nicol. Fontanus Analecl. cap. 1.

S C H O L I A.

EO exemplo probat cerebrum posse inflammari, quia venis arterisque prædicitum est, & quia natura temperie calidum est: Objectionibus autem, quo fiat inflammatio requiritur humor in parte destitutus & circumferibatur, ut diffilari prohibitus putrescat, qui ob tenuitatem a cerebro laxiori cohiberi non po-

test, sed diffilari: Respondet bilem tamen si sit humor tenuissimus, tamen acredine sua facile in cerebro laxo, aliquo peristere posse tempore, non obstante hujus laxitate aut mollietate, cum pulmo molliis & spongiosus phlegmones quoque sic capax.

OBSERVATIO VIII.

Phrenitis à verme utramque meningem perforante.

IN Anatomia cerebri vermis inventus est, qui pia & duram matrem transfoderat, unde phrenesis generata fuit: Paracelsus lib. 2. Paramyr. §. 2.

OBSERVATIO IX.

Phrenitis à meningum, præsertim pia, inflammatione.

Laboraverat juvenis gracilis & sicca Tertia quadam continua, pravis comitibus symptomatis: imò quotidie sevens cephalalgiam concitavit, ex retorridis fuliginibus caput ascendentibus: Ob dolorem, accedente etiam vigilia, vaporibus tetris oppletum est caput: quorum copiam multam cum cerebrum reciperet, factum est ut nono die paraphrenitis invaserit ægrum, ex qua paulatim Phrenitis suborta, & sevis stipata symptomatis superveniet, quæ nullis auxiliis levata est: sed cum pulsu duro, arte arida, rubentibus squallidisque oculis, furiosus, amens, inquietus & insomnis, 63. die occubuit.

Defecto cranio, cerebrum sine læsione inventum, sed maculis sanguineis undique respersum: Meninges, præsertim pia, tumens visa est, sanguine nigriculo turgens, & eo excessu, ut omnes ejus ramuli, qui per totam cerebri molem dispergantur, aliquatenus appaerent tumidi & accensi: quouiam igneus inflammationis calor, alteratione per continuum facta, imò communicatis fuliginibus, universam tenuis meningis molem inflammavit ubertim: Nic. Fontanus Analecl. cap. 2.

S C H O L I A.

Tertia quadam continua] Duplex est generationis phren. modus, primariò scilicet vel secundariò aff.cto cerebro: Si à causa aliqua externa, ut insolatione, meri potu &c. æstus concipiat, sanguis ejus vas conceptus extra illa in ejus subtiliora & meningum effunditur, ubi fit syctrophica inflammatio, cujus calor ad cor ulque diffunditur, febremque symptomatice dictam concitat: Quod eadem à vulnere, contusione &c. fieri potest, Phrenitisque hoc modo genita Primaria dicitur: Secundaria autem illa est quæ febribus ardentibus vel malignis succedit, detrita humoris morbilici ad cerebrum portione: Pierumque enim in talibus contingit, ut natura à causa morbilica læssita, hujus partem in vi-

scus aliquod extrudat, inde ortu variis in partibus phlegmonarum: quæ depositio si ad cerebrum fiat, fiet hinc Phrenitis, in qua febris delirium præcedet. Cum in primariis delirium ab initio conspicuum sit: Harum generationem dat Hipp. lib. de affect. Quæ febris inquit, hyeme sive ex viro, sive ex læitudine, sive ex quavis alia re oritur, diligenter observanda sunt: interdum enim in acutis transiunt, earumque transitus fit hujusmodi, Agitatio duobus humoribus, tum hinc tum praeterita, ubi quæ inveniunt convenienter corpori admoveantur, ipsi in sese collecti in eam corporis partem quamcumque fors obvolaret, moventur, sique phrenitis aut &c.

Tumens visa est] Admissa sanguinis circulatione, Phrenitis hanc habet generationis viam, Cæculatone turbata,

raibata, viscosus, biliofus atomis perfusus sanguis, nauseabundo valorem & dictum fatidum & vomitu, egestus in inaniam spacia circa cerebri substantiam medullarem, tot meningem ipsam investientem, calefacti, inquit (aut lib. 1. de morb. totum corpus reliquum & deicit homo, & non sibi constat pte febris copia. *Garr. Ralsulguu Dissert. anat. l. 6. cap. 1.* Pass mitens humores est totam corpus, quod potentia superat omnes partes seorsim sumptas, inque cerebrum substantiam suam exonerare potest: non minus est humores hos petere summa: magna vis in angustis valorum meazibus est coactionis, ut unde trahendum, non solum deorum, verum etiam suum, ita etiam sanguis: In circulo non est neque sursum neque deorsum, ita neque in sanguine circulo: proptio moti biliosi sanguinis non est solum à naturali ad motum inclinatione, verum etiam præternaturali à fermentatione & quadam ejus *dispositione*, segregatione. Humores hi non generantur in cerebro *essentia*, sed in visceribus coactione & depuratione sanguinis destitatis, corde nimium & jectore præcipue; indeque orta cacochymia, & per

placenta quæ eò promouetur: Impositi solum ibidem, eam & *quædam* quadam infamati, inque conuulsionem quadam spasmum infatu faciant, atque & crispationes, exitum non inueniuntibus per majores arteriolas & ductus, in minores qui infuserant humoribus. *idem conf. 3. lib. 1.*

Membrana sanguine nigrescente turgens] Exemplis edoctus Clar. Bartholinus afficit membranis cerebri inflammatis, vel spinali medulla sphacelata delirium ortum. *Epijl. 86. centur. 3.*

Rodentibus squallentibus oculis] Inflammatum meningum signum: Sed & ex eorum motu incomposito Delirii signa petuntur. Nam licet (*aut Ex. edocta, & Elegent. Menenius Dissert. de Delirio*) datur, *turbasque* *suppressiones*, à pectus bene compositus, liquidum tranquillumque animum arguit; sic *suppressiones* *degitur* est *depressiones*, trucelementumque fluxus consuetus delirium parit, ut etiam oculorum *passus*, inconstans volubilitas: Nam cum oculi prorsum sint cerebro, ac vena arteriis, nervis, membranisque cum eo conlocati, solent primi inter tenus ipsi laborant *essentia*.

OBSERVATIO X.

Phrenitis vulnus sequuta, hinc abscessum sub calvaria genitum.

Miles in occipitio vulneratus moritur: Aderat rima & depressio folii laminæ internæ cranii: hinc ortus abscessus sub calvaria, qui introduxit Phrenitidem. *Vide lib. 4. Tit. de Vulneribus.*

SCHOLIA.

Abscessus ex vulnere aut consusione capitis genitus sequentibus signis dignoscitur: Post acceptam consusionem Torpor quidam & mæstia apparet, animalibus spiritibus à materia extravasata labefacti incipientibus: Morbo invalescente flucticula exoritur, materia putrescere incipiente; His capitis dolor succedit & somnolentia: mox aucta putredine omnia symptomata ingruunt, febris in-

tenios evadit, æget à profundiori somno emergens subito vociferatur & surgit lecto, statimque iterum decumbit: frequentes mæstia ad caput adhaere: Ex his plerique ante obitum paulentiam materiam & vitelocem ore aut nabus ejiciunt. *Riternu Pract. lib. 1. cap. 12.*

Abfcessu sub calvaria] De abscessu hypocranio vide sectionem 1. Observ. 33.

OBSERVATIO XI.

Paraphrenitis ab inflammata dura meninge, plexu choroidæ, Ichore inter meningis & cerebrum.

Medeus N. post varios morbos tandem aucta febre, cum paraphrenitide extinctus est. Dura mater erat inflammata: Inter meningis & cerebrum ichor multus: Plexus choroides inflammatus. *Vide lib. 3. tit. de Cachexia, ex Hildano.*

SCHOLIA.

Paraphrenitis extinguitur eff] Cur non potius Phrenitide, ad cuius *essentia* meningum inflammatio requiritur, quæ hoc in casu adfuit? An quia tumultuosum non fuit delirium, cum exanderentia, para-

phrenitidis nomine donavit? Ar in homine vitibus jam fracto à præcedentibus agri malis, non potuit vehemens ille impetus, qui in cæteris adest phrenitidis, quos morbus ab incerto adoriatur, observari.

OBSERVATIO XII.

5. Phrenitis ab abscessu sub cranio latente, Putredine meningum & particule substantiæ cerebri.

Agricola, cujus caput diu Solis radii verberaverant, (*vide tit. de dolore cap.*) primo dolore capitis, febre &c. affectus fuit, die 5. accessit Phrenitis: Paulo ante obitum per os, nares & aures dextras pus foetidissimum effluxit: Dempto cranio in conspectum venit Tumor avellanæ magnitudine, qui apertus pus effudit foetidissimum viridantis coloris:

coloris : Dura & pia mater putredine affectæ erant : Substantia cerebri labem passa erat, quæ fortidissima, à me resecta ad usque ventricululum anteriorem dextrum : Doloris sedes vix affis Gallici magnitudinem æquabat.

S C H O L I A.

De *φ. acutis Phrenia*] Cerebrum vel primario afficitur, cum immediate à causa aliqua procacitatis incalcescit; vel secundario cum febribus ardentibus vel malignis Phrenitis succedit: usu enim

venit ut natura à causa morbifica lacerata, illius portionem in vilius aliquod excutiat, hinc petipneumoniz, angina, hepatitis &c. *Vide Hippocr. lib. de Affectionibus.*

OBSERVATIO XIII.

§. In Phrenitici cerebro nullæ phlegmones notæ repertæ.

Ego Phreniticum jam phanaticum redditum, qui septem diebus *μηνὸν ἔς τετρακόν* inuens quovis invadebat, à fatis secui, Nec ullum unquam phlegmones vestigium deprehendere potui. *Hæurnius de morbis pector. cap. 1.*

S C H O L I A.

Septem diebus &c.] Phrenitidem vocat Hippocrat. Delirium cum fibre continuum, ab inflammatione earum partium quæ rationi & menti inserviunt, àa enim spiritus animales, quorum virio d. li. a fuit, non simpliciter modo incalcescunt, sed & secundum substantiam alterantur: hinc fit ut Delirium se continuum in phrenitide, substantia enim spirituum vitium ex febris remissione, aut aliqua se adveniente emendari non potest: Quod perpendens Hippocr. Phrenitidis causam in sanguinem viscosum retulit, quo existente impuro, perfectam spirituum animalium generationem fieri est impossibile: (1. de morb. c. 2. v. 277.) Cum igitur ad Phrenit. generationem spirituum animalium substantiam & temperiem vitia sit necesse, merito dictum hunc ab inflammatione earum partium pendere quæ menti & rationi inserviunt: Inflammatio enim putredinem supponit, quæ spirituum substantiam & temperiem alterare promptè valet: Menti verò inserviente, Jecur, septum transversum, cor & cerebrum: *Jecur*, quia materiam generationi spiritus vitalis subministrat, ex quo animales spiritus animæ instrumenta generantur: *Aquam*, quod flabello instat cordis & spiritus vitalis fervorem temperat; & cerebrum facultatis animalis sedes: De *Jecore*, 4. Epid. v. 343. legitur, Quibus in dextris ditionis sub mollis, Phrenitici sunt: Et de hac phrenitide specialiter tractavit lib. de affect. v. 92. Aciepto transverso phrenit. excirari, in *Hippocr.* doctrinâ adeo frequens est, ut hanc solam Phrenit. causam agnovisse vitus sit: Cerebro inflammato eam fieri cecum est: Phrenit. cordis inflammationem sequentis nullus mentionem facit, quia mors eam occupat: Quoties autem hepar inflammatione corripitur, ea tanta esse debet ut totum viscus occupet, & præsertim vasa omnia per illud disseminata: Cum enim pars aliqua ab inflammatione libera est, sanguis in parte non læsa genitus, purus existens, spiritus vitalis materia evadit: Cor enim optimum ad se trahit, unde spiritus puri generantur, quo casu nulla materia lesio concingit: hinc non omnes inflammatione hepatis decetis Phrenitici sunt *Pr. Martium comm. in lib. 3. de morb. v. 99.*

Nec ullum phlegmonis vestigium] Scil. in cerebro & membranis: quæ potuisset vel in diaphragmate vel iecore, aut etiam corde, juxta Martianum: Ob oculos autem habere Medicus *Balimicus* curationem consil. 71. l. 3. tradidit: Saepè aut, capita hominum morbo capitis consumptorum aperta sunt, in quibus nihil commemorabile repertum est quod mortem intrasset, cum alioquin Medicus aut abscessum, aut simile quid repertum in pronuntiasset: Ipse augurantium ipsa inspectio fecellit, & eorum fiducia, & expectatio in splendore venit, ac si cum ipsa anima mortis occasus evolisset,

Uterque ventriculus aqua &c.] Ex absentia inflammationis meningem, confirmari potest sententia *Paracelsi*, qui Phrenitidis causam propinquam & præcipuam deducit ex sublimatione mercurii: Generationis modum lib. 1. parameron de orig. membr. cap. 4. pluribus proponit: Mercurius ille ab alio quopiam (necessario aliquid extrinsece assumit) sublimatur seu elevatur, & primo quidem calore virtutis digestivæ, quæ accidentaliter est, prevalente, eumque ex inferioribus partibus propellente: deinde calore exercitii 3^o, calore astrorum: postquam verò mercurius diu fuerit motus, adeoque subtilis effectus ne in suum ascendat gradum, tunc depellitur suo Alto (quæ depulso corporis est morbus & morborum omnium principium) tunc nequitiam suam exercet & præparatione subtilis modo adeo fit subtilis, quæ nemo ipsi possit resistere ob vim internæ naturæ: sulphur & sal non possunt ipsum coherere ob vehementissimum calorem qui repellit hæc duo. Hinc collige phrenitidem Paracello esse morbum mercurialem in liquoribus existentem, & quidem sublimationem, quæ fit à calore interno vel externo. *Paracelsi Dissolutio p. 18.*

Mercurio Choriæ vase &c.] Idem lib. 1. de Virib. membr. spir. c. 3. Phrenesim & maniam generari ait ex oppilatione spiritus vitæ, quando nempe meatus per quos spiritus vitæ ad cerebrum transit, obstruuntur, tunc oritur potestas & exaceratio; & cum juncum spiritus suffocato & mortificatione adest, tunc totum corpus febili paroxismo percutit:

OBSERVATIO XXX.

§. Phrenitis ab aqua cærulea cerebri ventriculos replente, à qua sinister excessus erat.

Iuvenis anno 1583. Phrenitide xvij. die perierat; Hunc secuit Matthias Grabigfadius Medicus Germanus: Inventi cerebri ventriculi aqua pleni cærulea, Ab hac sinister ventriculus

ventriculus excusus erat, acerrima enim invenna est: *Observatio Nerei Nerei Medici Florentini*

S C H O L I A.

Cerebri ventriculi aqua cerulea pleni erant. Causa huius morbi ex Parac. est Mercurialis liquor: absque humore igitur morbus hic non fit: humor ille calidus est, subciliis, acer, pungens, bilis dictus: Neque intelligit humorem biliosum, quia solum calidus est & fuscus, nuda nempè qualitates primas, sed talem substantiam quæ in se habet *diversam, variam* igitur & impressionem validam, quæ ubi ad *insimul* pervenit & à reliquis secreta sunt, *exorsum* adspicitur, ut Hipp. loquitur: Secretum autem fit & divorcium, cum vel quantitate cæteros humores nimium excedit, vel à calore p. n. nimis exsiccat & adæscit, unde paribus

benignioribus, quarum humiditate temperabatur, exhaustis, acior, amarior & corrosiva magis reddita, cerebrum in similem intemperiem abipit & morsu quodam vellicat. *Petrus Nafing. p. 29.*

Acerrima invenna est Vt in externo Mercurio sublimatio sine salium administratione, à quibus illam acrimoniam & corrosionem consuevit, petraginequit, ita in interni elevatione concurrunt Salia corrosiva, quæ partes membranofas rodunt, & atroces dolores inferunt, licet ob mentis agilitatem non sentiantur.

Vide Petrum Nafing. Harmon. part. 1.

cap. 2.

OBSERVATIO XV.

Phrenitici cadaver exhibuit Diaphragma gravi inflammatione correptum, Hepatisque partem inferiorem, cum Polypo in sinu longitudinali duræ meningis.

DEc. 11. 1674. aperui cadaver defuncti Phrenitici: Diaphragma gravi inflammatione correptum notabatur, similiter ac hepatis pars inferior: In sinu meningis duræ longitudinali, materia continebatur alba, tenacissima, quæ non tantum sinum ipsum videbatur replere, sed & ad omnes sinus huius rivulos, meningem tenuem pererrantes se extendebat, sic ut quoties stylo digirovè traheretur materia hæc sinu dicto hærens, eadem ad aliquot digitorum longitudinem se extendens moveretur: fibrosa maxime erat, & in filamenta plurima separabilis, non rarum quæ sinu derinebatur, sed & quæ sinus huius ad anfractus cerebri excurrentibus propaginibus: Exacte faris hæc cognoscere licebat, quoties elevata substantia ea quæ in sinu hærebat, funiculorum ab ea ad sinus dictos rivulos extensorum unum alterumve lenta manu extraheremus: Phrenitici hic quod moru convulsivo obicit, valde probabile mihi faciebat digitorum utriusque manus, brachiorumve contractura: graves, quales in demortuis aliis haud notari solent. *D. Blasius Observ. med. 2. p. 6.*

S C H O L I A.

DE Phrenitide exorta ab inflammatione diaphragmatis, Iecoris, aliarumve partium naturalium, vide Notas ad Observat. 13.

OBSERVATIO XVI.

§. Phrenitis absque inflammatione cerebri & membranarum ejus, ab aqueo & pituitoso humore in pluribus partibus cerebri;

ANno 1567. mense Augusto, Mulier ex ingenti animi mœrore, febris ardenti cum capitis dolore, cui postea Phrenesis supervenit, correpta, vulgus duxit Hungaricum illum morbum fuisse: Signa omnia attestabantur hanc *Phr. ex sanguine fuisse*, ridebat, jocabatur, cantabat, omnibusque gestibusque hilaritatem exhibebat: Iurarem ad interrogata responsum dedit, aliquando non; frequenter manum capiri, tanquam istic dolorem persentiret, admovebat: Tempestivè fuit levibus medicamentis purgata & vena secta; sanguis erat majori ex parte pituitosus, crudus & serosus: tandem resipuit & paulò post obiit.

Aperui caput: dum ferra cranium removebam, effluxit aqua loturæ carniarum similis: Tenuis membranæ & *plexus choroides vasa aquosa & pituitosa sanguine surgebant: interque ventriculus*, tam dexter quam sinister, plenus aqua fuit inventus: *Nullam nec in membranis, nec in cerebri substantia deprehendere quivi inflammationem*: Ex finibus duræ membranæ cerebri, ut alias ex suspendio enecatorum cerebris, extraxi fibras, seu filamenta crassa, lumbricis non dissimilia, ex alba pituita conflata; Similes sumpsi ex cordis ventriculis. *Falsch. Coiter. lib. Observat. Anatom.*

S C H O L I A.

Phrenitidem ex sanguine fuisse Deliria sunt vel *per se* qualia artificum, tanquam apud se essent, de arte sua differencium: Illa à sanguine excalescente, hæc à bile oriuntur,

orionur, luntque in medittallo posita delipit: neiarum
scilicet arum atque feroculum, ab ara bile originem du-
centium, per quas aegri oculos ignotosque adducit-
ur: Sanguis autem est *gualidus*, geminam illius
causam, gaudium scilicet & adurationem accedendo:
Gaudium quod arrior, et splendore sanguinis exale-
bit: Sanguis redduntur laetiores, unde instante ha-

[illegible]

OBSERVATIO XVII.

6. *Phrenitis absque febre, cum inflammatione cerebri & meningum.*

A Vicennas & Rhazes nobis describunt quandam Phrenitidem verè similem, tamen absque febre, atque adeo sine apostemate, cæteris autem similem inflammationi meningis: In hac, inquit, stringitur ipsius anhelitus, & sitis ejus, & cum bibat aquam, stragulat eam, & expellit ipsam, & plures mortes ipsorum sunt cum lramulatione &c. Dices, non est hæc phrenitis idiopathica, quia sine febre & apostemate, sed tantum similis in multis accidentibus? fateor, verum eadem ratione, imo majori, potest id contingere in ea vera Phrenitide quæ sit cum febre & apostemate, si sit maligna & ferina, ut ex bile acerrima & quasi venenosa, ut aliquando accidit, imò in plerisque: Et possum ego sanctè hoc affirmare, vidisse in Medicinæ praxi aliquos Phreniticos, qui statim 2. aut 3. die hæc symptomata passi sunt usque ad mortem, quorum unum memini me præsentè didicisse, qui ex phrenitide notha & remissa incidit in paralytim & apoplexiam, ex quibus perit: Ei inventa est meningis purulenta, & medullæ cerebri exterior pars vicina inflammata, partim ex rubro nigricans, partim purulenta: Alios aliquos omnia idiopathica Phrenitidis signa habuisse, qui idem passi sunt quod diximus: nulla tamen inflammatio diaphragmatis aut angina primariæ experti sunt: Ejusmodi affectus, aut phrenitis idiopathica, cui similis est, necessario habet *spiritum parvum & frequentem*, ob necessitatem ventilationis, atque adeo vocem acutam quæ prius non fuerit: Quare spiritus, parvus, frequens, ac vox acuta non sunt necesseium inflammationis diaphragmatis, (quod vuls Laurentius) sed communia Phrenitidis idiopathicæ. *Theodorus Collado Advers[us] lib. 1. cap. 20. §. 16.*

SCHOLIA

Spiritus parvus & frequens.] Delirantium respiratio nem exponam: hi autem negligentes sui, nec eorum volantes ante fese erigit ad functionem inquam acrior sculso excitata fuerit in phantasia per luculentum necessitatis: unde nonnulli impudenter suffocationis metu respirant: huiusque respiratio natiua rarietas magnitudinem compensant, natura intermillionis dispensandi reluciente: quod enim inerta alibi meos opus respirations rarietas exequatur, hanc monstrant & mœtiores; & idiotæ ad spectacula suspensi, & amantes, quorum spiritus gerembudus est. Nisi dum autem omni deliratio vitiosa inesse puto in ista maxime, sed et in omni, nimirum si magna fuerit expatiens mentis perturbatio, visque motus robusta fuerit, cum obedientia organorum ipsiabilium. potest namque tam parva esse mentis paulisper late digestio, ut respiratio indolentia maneat: postea quocunque alia affectio delirii complicari, qui ipso potior sit ad perveniendum respirandi ordinem, ut vitium iactura, & dolor angustiae in membris spiritibuslibus: his namque de causis cum pectus sufficienter dilato non

possit, crebrius adjungitur, quæ magnitudinis defectum supplet. Itaque vigente solo delirio, spiritus magnus est atque rarus: urgente solo dolore partium thoracicarum, parva & frequens est respiratio: delirio & affectu dolorifico simul concurrentibus, respiratio inæqualis redditur, nunc magna & raris, nunc parva & frequens, pro alterutris causis dominio: quamobrem in libris Epidemicis multi ægri de quibus leguntur, qui tantum spiritum magnum & ex longo intervallo non duxerunt. *Mementum Diff. de Paralyti.*

Sine adfingitur Cr. I.e. *apud inspectionem non potest fedari, quia nequit depletare aquam ob impedimentum triangulationis vel ipsam fortis in ipsa tualibus*: tanea est necessitas ispiracionis crebra, ut nequeat tandiu retinere spiritum dum aquam depletat, sed statim ab aere sursum expellitur, & exit per os & oares & spumula, etia valde sicut ob vehementiam aciditatis cerebri & guttulis: Hic ergo aderit etiam vox acuta ob siccitatem & angustiam.

Abique febre] Capitaem aëuiſiſſe veriſimile eſt, de qua vide l. de febr. c. 1.

OBSERVATIO XVIII.

Phrenitis ab inflammatione meningum, cui successit earum syderatio.

Quidam saepius in dies ebrui, cum vino se faburraffet, cephalalgia corripitur cū omnium sensuum deiectione: cum viderem ipsum assidue exiliētem, corpus, manus pedesque maxime jaclantem: nec verbum, et si aciculis premeretur, proferentem, dico videri mihi *phacelo cerebri* corruptum &c. Mortui invenimus meningas valde lividas omninoque syderatas &c. *Fide Tit. de Capitis dolore.*

 $SCHO-$

S C H O L I A.

Sphaceli cerebri] A paucis auctoribus descriptus, licet ab Hippocr. annotatus sit lib. 5. de morbis: Est autem substantiæ cerebri suppuratio vel corruptio, quæ gangræna vel syderatio ejusdem nominatur: causa immediata est cerebri substantiæ inflammatio, quæ tamen à Phrenitide distinguitur quod in hac membræ potissimum inflammantur, & ab illis inflammatio parti tantum exteriori & contrigæ communicatur: In hac vero inflammatio partes cerebri interiores, ac totam propemodum illius substantiam occupat: Magna autem illa inflammatio, in parte humidissima & molliissima brevi sphacelum accersit: Inflammationis causa est sanguis supercalcfactus, vel admodum biliosus, in cerebri corpus & partes ejus intus afflicti itrans: Causæ procatartice sunt quæ sanguinem calidum copiosum in toto corpore cumulare & ad caput transferre valent: (præteritum meri potus) sed frequentius vulnera capitis gravia & contusiones: Hinc tamen genus abscessus & sphaceli à priori differt, quod in hoc tor cerebri par-

tes ut plurimum non occupat, sed uni præcipue adhaeret: unde symptoma leviora, saltem ab initio esse solent, & affectus ad plures dies protogatur: Signa Abscessus & sphaceli, sine vulnere aut contusione producti, ita se habent: Invadente affectu ingens capitis adest dolor, qui per occiput collo & universæ spinæ communicatur, cui mox succedit sensuum omnium tum interiorum tum exteriorum abolitio: Variis modis & inordinatis sese agi exagitant, ut vix uno in loco contineri queant: manibus interdum partes superiores invadunt, easque divellere ac dilaniare conantur, faciem unguitibus dilacerant, erines avellunt, ac procedente multo corpus languescit & ad motum impotens efficitur: *seba* acutissima est ab ingenti inflammatione: Agi neque cibum neque potum admittunt, & vix aliquid in stomachum intro-mitti potest, unde citior visum exolutio. Abscessus ex vulnere & contusione signa vide supra Obs.

10. RHEUM. PRAX. lib. 1.

cap. 12.

OBSERVATIO XIX.

§. Delirium à vasis meningum sanguine turgentibus, Cerebri substantia aqua madida, &c.

Puella febre tentata Delire loquuta est de sua veste in aquas delapsa querebatur &c. Mortuae aperto capite, vasa meningas perreptantia sanguine plurimum turgescere conspiciebantur, quasi vero tota cruoris massa in capite aggereretur: Membranz ubi cerebellum involvitur ac à cerebro dirimunt, sanguine extravasato suffusa: Cerebri substantia profus madida humore aquoso irrigata &c. *Vide Tual. de Convulsionibus Willis Parthol. cerebri.*

S C H O L I A.

Delirium excitatur in quantum spiritus animales, aut nimis irritati, aut in confusionem acti, hinc illuc intra globosam cerebri compagem (ubi phantasia & memoria sedes habent) à sensu & tumultuose efferrantur: Ita namque dum variæ imaginationis & memoriæ species simul excitare invicem confunduntur, phantasmata tantum abiqua & incongrua animæ rationali obijciuntur, & proinde tum intellectus, tum voluntatis actus solammodo inordinate eliciuntur: Porro, quemadmodum hi intra cerebri medullarum, sive corpus callosum, tali aestro perciti, cogitationes multiplices & valde perturbatas ciunt, ita dum extra hujus confinia in originem nervosam feruntur, loquelam incongruam, corporis & membrorum gestus absurdos, & non raro motus convulsivos producant: Si quidem vero talis spirituum organis (sicut ac in plures aut mania) statim deservelit, & à tumultu illicum peracto nulli tractus devii in cerebro cudentur, Delirium cito petransit, & affecti iterum mox animo constant, sine reliquis delirientis vestigiis:

Sanguine plurimum turgescere &c.] Quod si inquiratur unde hic furor brevis spiritibus cerebri incolis impetitur, ut excussis animi habentis ita in æconomia sua omnia suisque degenere habent, dicimus eos duplici ratione hujusmodi inordinationem concipere: nempe actum hoc, aut è sanguine cerebri compagem perfluente ita immediate confectus; aut spiritus quidam animales exterior, intra nervosum genus degentes, à vasis quandam primo ineunt: deinde eadem cerebro per ductus nervos communicata, spiritus ibidem hospites pariter afficiunt in delirium cit: Utriusque horum variz sunt species & causæ, quarum præcipuas breviter hic attingemus &c. t. ostendit

detur, quomodo & ob quas occasione sanguis aut nimia effervescens tumidus, aut materia venenata pregnans, quatenus vel particulas effusas & indomitas, vel malignas & regimini animati insititas cerebri poris & meatibus inhiunt, Delirium patens existit.

Quod prius, in febrium intermitentium paroxysmis & continuorum æpis, à quibus incendo immodico effervescens interdum mox ebullitionis hinc impetu delirium concitat, in quantum scilicet ille plurimum turgescens, dum exiles arteriarum propagines per cerebri exteriorem ambitum ubique diffusus pertransit, eas valde instat de tendit, proindeque cerebri substantiam comprimens, spiritus valde impellit & quasi in turbas valde confusus cogit: Porro & sanguine cum spumosa ractatione ita turgescens, caloris effluvia, cumque his particule heterogeneæ, cerebri poros & meatus subeunt, spiritus exagitant, & hinc illic tumultuaria corrumpit: 2. Propter similem forte hinc rationem Ebrietas aut alium soporem, aut Delirium infest, in quantum scilicet massa sanguinea spiritus vitiati particulas (à quibus effervelit) in cerebri poros & meatus immittit, à quibus spiritus ibi hospites aut plane obstruuntur, aut in motus inordinatos & confusos aguntur: Quippe indomita vini aut cerevisiæ uberius copios corporculis, cerebri cupisvis, uti firmi & sani, claustra referant, atque alius in ductus medullares penetrantia, & rationis & imaginationis actus perturbant & plane evectant: 3. Nec tantum sanguis particulas febriles & turgidas, aut vinosas & indomitas, sed interdum malignas & quasi venenosas regimini animali suggestens, cum, vel sine febre Delirium cit: Quod prius, in peste, variolis, febribus malignis (etiam calor moderate habeat) materies maligna ad cerebrum translata, quatenus spirituum copias

copias dissipat (potius quam quod eos in tumultum adigit) notiones abruptas, incoherentes & tandem distractas parit : 4. Ob parem hanc rationem Toxicæ quædam & venena inius sumpta, ac (ut nonnulli asserunt) exterius applicata Delirium cito nocentur. Hoc de solano furiolo, mandragora & radicibus psittinacæ sylvæstis vulgo fecit, Væcum intæper adveniens, Delirium à spirituum animalium penuria & dissipatione magna nonnuquam excitat : quippe illorum series abruptæ, & ab invicem distractæ, non sicut ac tumultuarie conglobantur, notiones confusas & incongruas suggerunt : Hinc observare est quosdam à magnis hæmorrhagiis, aut longis vigiliis & diuturna inedia delirasse : propter hanc rationem plures moribundi deliræ & incongrue loqui solent.

Restat altera Delirii species, in qua sanguine intonctæ, spiritus animales alicubi in Nervoso genere sca-

temes, primo *inæstus* subsunt, dein eadem affectio per ductos nervos ad cerebrum percrepans, spiritus modè ulji eas incolas in Delirium ciet : Hoc satis obvium est in passionibus quæ dicuntur Hythericæ, nempe post ventris intumescensiam & cordis oppressionem, demum modo *inardens*, modo *subulationem* absurdam, cum risu & fletu succedere : Patitur in colica atroci observavi interdum immensa, circa viscera aut lumbos crucians, mox in delirium cessasse, deinde paulo postea hoc cessante, tormina rediisse : Hæc etiam fidei quod sæpius adverti, à gangræna in membro quodam externo incipiente Delirium accelerari, Atque hoc pro sigis lethali in vulnere aut ulcere passim habetur, quia denotat spiritus animales in parte affecta interfectioni datos. *Ibidem Tract. de Anima brutorum part. 2. cap. 10.*

OBSERVATIO XX.

Paraphrenitis à vasis cerebri sanguine turgentibus nigro, ut & cordis : Bile multa in cystide &c.

AUlriga ex febre ardente quasi furibundus obiit : Ventriculus etat plenus humore ex viridi nigricante ; E cysti fellea exsudabat bilis crocea ; vicinas partes corradens : vasa cerebri turgentibus sanguine nigricante ; E corde dissecto idem dimanabat. *Vide de Febr. I. 4.*

OBSERVATIO XXI.

§. Delirium occultum ab apostemate cerebri in Sphacelismum abeunte.

Puer in lethargum gravissimum incidit : nihil loquebatur, quamvis subinde garrire videretur, musitando quæ nemo intelligebat &c. Hæc cum vidissem, puerum abscessum una cum sphacelo in parte dextra cerebri habere pronuntiavi : Cranii osse sublato, cerebrum & cerebellum in parte dextra omnino sanioque, putridum inventum est, apostematæ ex lethargo in abscessum & sphacelismum permutato. *Vide Tit. de Soporeis affectibus.*

SCHOLIA.

Garrus videtur &c.] Hæc Phrenitidis præbodium, in qua ægri non loquuntur, qui tamen & dormire videntur : Memis emotiones re-

mutæ, obscuræ, pulsantes, valde phreniticæ sunt, ait. *Hippocrat. lib. 1. Phrenit.*

§. 31.

OBSERVATIO XXII.

§. Delirium excitatum à tumore phlegmonode meningum.

Iluecis (de quo Tit. de Capis. dol.) cum per duas septimanas de gravissimo capitis dolore in conquestu esset, Tandem febre aucta, mox vigiliæ, confabulario delira & mors succedebant : Calvaria mortui aperta, vasa meningas obducentia erant sanguine ditenta : Porro ipsæ membranæ tumore phlegmonode per totum affectæ apparebant &c.

OBSERVATIO XXIII.

§. 1. Delirium à phlegmone intra calvariam, Dura meningis inflammatione.

Mulier percutitur leviter in capite, 3. die febris, capitis dolor, mox Delirium &c. 5. mors. Ingens phlegmone intra calvariam invento : dura meninx tumens, dura, livore affecta &c. *Vide lib. 4. Tit. de Pulveribus.*

§. 2. Virgo à casu vulnusculum in capite contraxit : 4. die febricula, Delirium &c. Sanguis sub cranio collectus erat, Cerebri membranæ inflammatione correptæ. Ibidem.

SCHOLIA.

Percussur in capite] Delirium vel est innatum, vel adventitium : Hoc oritur à causis seu externis seu internis, causæ externæ sunt *trauma*, medicatio-

nes cerebri & ætate; ætus solis, quo cerebrum una cum spiritibus suis incalcescit ; idus capitis con-

quantens cerebri machinam spiritusque animales penuriam.

perturbans : Ossis *Assendi* si invicem, h. e. spatium cranio & meningibus interpositum penetraverit : Item inapitio vel à venere immodica, vel à vigiliis, vel ab immoderato sanguinis profluvio : *Ibid*, scilicet Innam, sic ob infaulta *de mente de*

quoniam, natura novercantis primigenia, duplexque est, aut à parentibus devolutum in prolem ; aut non hereditarium, cui congenitum, ab accidentatio feminis viris &c. *Morbus Delirium de Delirio in genere.*

OBSERVATIO XXIV.

Delirium à sanguine vasa utriusque meningis replente, Ulcere sub medio fincipitis dextri, Plexu choroides vitato &c.

V Ir Nob. incidit in dolorem Sincipitis, quem sequuntur vigilie & Deliria interpoluta, post continua, suavia tamen, non irata aut furiosa ; In mortuo repetta vasa meningum sanguine turgida, Ulcus oblongum sub medio fincipitis dextri ; Plexus nonnihil erat atrofus & putrefactus &c. *Vide Tit. de Capitis dolore.*

S C H O L I A.

Plexus *choroides*] In hoc, ut & in rete admirabili, sanguinem ad spirituum animalium generationem in cerebro preparari voluit : Vitium quod huic inerat, ab acrimonia humoris inductum, prædictam impedivit generationem & elaborationem spirituum animalium.

Deliria interpolata post continua] Paraphrotylen à phrenitide hoc voluit differre plurimi, quod phreniticorum jugis sit desipientia, cui modo increscat modo decrescat, pro majore aut minore phrenitice bilis exacerbatione : At *Paraphrotylen* per intervalla intra rationis septa reverti, quod in fibris laxatione, si quæ evaporatione contendant tutum, ea & parior

sit & mitior quam ut mentem transversam agere valeat : Verumtamen signum illud est tubilitæ fidei, quoniam febri continua tam incensatæ cendi potest, ut in suis quoque remissionibus hanc prædictam *Paraphrotylen* ad caput evehat : Deinde quia si febris eadem eunt tenore, ut Synochus *quisque*, ac multo magis si vires eundo acquirit, ut *synochus immutabilis*, perennem excitat paraphrotylen nihil impedit : Ubi tandem quoddam compertum est non paucos febrientes plurium dierum, ac interdum septimanarum ipsa *synochus* desipientia detior. *Morbus Delirium de Paraphrotylen.*

OBSERVATIO XXV.

§. Delirium excitatum ab ulceribus in ventriculis cerebri lateralibus, pure oppletis ; Vasis tenuis meningis distensis sanguine &c.

B Arthol. Feer (de quo Tit. de Soporosis affectibus) capite doluit, febricitabat mediocriter ; dormiebat plurimum, expers factus stupidus quasi erat & Deliria loquebatur : Mortui aperto capite, per duram meningem, vasa tenuis in fincipite, ad sinum tertium meantia, vidimus valde cruore oppleta, & triplo ampliora quam alias existunt : &c. Sublato prorsus fornice conspeximus utrumque ventriculum cerebri lateralem, humore purulento imbutum : Superficies utriusque aspera & inæqualis, ab ulceribus depascentibus, idque satis profunde, quæ non solum magnam stragem spiritibus animalibus inferre valebant, unde rerum oblivio, verum etiam inquinamenta putrefactia ad substantiam medullofam sanam, transmittentia, Delirium excitant.

S C H O L I A.

Vide *remem oblivio*] Respirationis, famis, sitis, excretionum cæterorumque operationum animalium prætermissiones ad *urquæ* *urquæ* fallo reduci consueverunt, cum vis imaginatrix illis actionibus det operam, non intervocente memoria : hæc enim circa res præteritas, priusque cognitæ, minime vero circa præsentes occupatur, ac idcirco quibus memoria circa desipientiam proflua est, ii memoriam symptomata haud patiuntur : Galenus ergo delirantes respicere tardius utramque emittere scribens, quia oblivione tenetur, nomen oblivionis non sumit pro privatione actus memorie, sed *urquæ*

urquæ, & juxta politicum diceodi modum, communique, ut *urquæ*, solum pro inconsiderantiaphantasie, quæ presentia objecta non animadvertens, sui muneris oblivisci, hoc est, eo non fungi dicitur : Hanc esse Galeni mentem liquet ex lib. 2. de Dyspnoea, ubi magnam raramque delirantium spiritationem, non oblivisci sed visiois actionis affectum esse docet, ut enim, ait immoderata facere spiritus attractionem, iurisque immoderata quietem, ejus est qui enim quando desinere actionem oporteat, novis, neque quoad sursus incipere &c.

Morbus Delirium de Morbo Delirium.

OBSERVATIO XXVI.

Delirium vulnus sequutum, à dura meningis & cerebri phlegmone, unde sphacelus.

C Uidam vulnus illatum in superiore capitis sinistra parte, Supervenit sopor, delirium. Reperta est dura meninx sinistra parte livens, necnon subdita cerebri substantia sphacelo correpta. Vide lib. 4. Tit. de Fulcris.

S C H O L I A.

Cerebro afflicto mens non percellitur quamdiu spiritus animales inviolati permiscui: inde fit ut frequentissime à vulneribus capitis, aliisque gravissimis cerebri morbis absit delirium, quod spiritus animales sunt *Arteriæ*, ac ex adverso à tenui vapore spiritibus inquinatis, vel supra modum agitati, simulque cerebro quamvis exiliter alterato, mens saepenumero subvertatur. *Meningitis.*

OBSERVATIO XXVII.

Delirium in muliere, cujus cerebrum tenue serum madefaciebat, & ventriculos implebat.

I Uvenis mulier (de qua Tit. de Parafsi) ad extremum Delirio ac Epilepsia occubuit: Ex cerebri substantia inter dissecandum effluxit aqua tenuis: Ejus omnes ventriculi eadem tenuissima, limpidissima, & pura scatebant.

S C H O L I A.

Aqua tenuis] De Phrenitide ab aqua convulsa, acti in cerebro, vide supra Observat. 14. Alias putum putum secum, acrimonie exerts, delirium excitare non valet; ut nec pituita: quare Hippoc. mentionem faciens lib. de Morbo sacro, D.ipientie à pituita genite, per quam ægri nec vocantur, nec tumulantur, non intelligit pituitam naturalem frigidam & humidam, hæc liquidem ignava est, nec corrupta, verum minuit autem cerebri actiones, sed præternaturalem & putidam, ut in lethargo, quæ calore & acrimonia delicia mover, licet multi humaniora sique pacatiora quam bilis, propter sitaram qualitarum remissionem:

Ad extremum Delirium] An forte à defectu spirituum animalium, ut in moribundis? Quomodo autem spirituum animalium egestas citat delirium dubium est, cum facultas largida actionem imminuat non corrumpat: Plerumque facultates principes cura spirituum suppellestiles infirmari, ac ob ingentem potentie infirmitatem non solum *assidue*, sed etiam *perpetuo* exerceri actiones: licet enim hæc nomini a calore, qui *assidue* est, ut figus *causæ*, quæque insigniter depravari, utamen à causa quoque frigida, si potentissima fuerit ipsas mediocriter corrumpi posse affirmant, ut revera delirium exolutionem consequens moderatum existit; quemadmo-

dum, *inquies*, in tremore à debilitate? *Non*, præponderet *perpetuus* motus impotens et tumultuque pravus, ita dum objecta quæ ad mentem inbecillam deferuntur, vehementer in ipsis sunt, non mirum si autem animus in eorum comprehensione: Nos vero à facultate languida functionem continuo immisso, ac nunquam erroneam evadere arbitramur: quotidie enim actiones cujuscunque generis infirmissime, & tamen nullatenus depravate conspicimus: Tremorisque exemplum non quædat, quod tremor motus sit mixtus, partim à caduca vi mortice, partim à naturalis partis gravitate: *non* autem quancumvis manca atque defectiva, à sola facultate recte obeatur nullo interveniente motore externo: deinde est indones illa tremoris comparatio admitteretur, tamen objecta facilia atque analogæ menti debilitati propinquant, imo objecta modulum animi excedentia nullam rationi adjucent prævitent, sed mea inde exiger reum cognoscendum ignorantia, quæ à delirio longissime distat: Itaque spiritus animales si perpauci fuerint, in vacuo ac inani cerebri spatio amplius quam decet commoveant, sicque desipientiam addacere probabilis nobis videtur, ut in decipiens senibus, ac in qui morti finitimi sunt.

Meningitis Diffusione de Delirio in genere.

OBSERVATIO XXVIII.

Delirium & amentia à sero plurimo per cerebri & cerebelli substantiam oberrante.

I Reutinger (de quo Tit. de Soporosis affectibus) aliquot septimanis ante obitum crudelissima cephalalgia afflictus fuit; præ dolore quandoque amens erat, ut quicquid vel diceret vel faceret, non raro nesciret.

Mortui cranio aperto, & faucia dura meninge profluxit serum cum impetu, maxima ex parte collectum in spatio quod inter duram & piam matrem est. Imo ipsa substantia cerebri & cerebelli plurimum serum imbiberat, nam summopere utrumque erat flaccidum & molle &c. I. Jac. Wepferus Exercit. de Apopl. hist. 4.

OBSERVATIO XXIX.

Delirium à vasis cerebri & cerebelli sanguine refertis.

Miles vulnus in capite accepit; primis 4. diebus sat bene habebat usque ad 7. quo vomitus supervenit cum paralyti, Delirio frequentibus &c. Venæ omnes cerebri & cerebelli sanguine refertissime erant. *Vide lib. 4. Tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXX.

§. Delirium à membranarum phlegmone.

Virgo capite in postem incidit & vulnusculum in vertice contraxit, &c. Sexto morbi die comperi ipsam delirantem, faciem & oculos inflammatos, sequente die obiit, &c. Sanguinem sub cranio collectum & cerebri membranas inflammatione correptas invenimus. *Vide lib. 4. Tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXXI.

§. Delirium à putredine dimidiæ partis cerebri, ventriculi laterali & medio pure & aqua cruenta occupatis.

Quidam ab equo vehementer percussus in capite &c. 19. die accessit capitis dolor, delirium &c. paulo post mortuus est: Aperto capite, inventa supra memorata, &c. *Vide lib. 4. Tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXXII.

Delirium exortum ab abscessu in profunditate cerebri.

NOb. catapulta ista circa tempus dextrum latus est; 60. die plane restitutus videbatur: Dolor in veteris vulnere loca subortus est: *Deliria intra verba solum*: Eo mortuo in cerebri penetrabilibus abscessus repertus est. *Vide lib. 4. Tit. de Vulneribus.*

S C H O L I A.

D*eliria intra verba solum*] Mente captorum tres sunt classes, Alii cum sola cogitatione delirant, qui silent quidem, sed longam ridiculorum cogitationum telam ordiuntur; Alii verbo delirant, sic ab Hippocr. sect. 1. lib. 2. Epid. si *delirantibus* dicitur dicuntur qui inter loquendum temeraria ferunt a veritate, ratione, vel proposito dissentaneos: Alii denique opere etiam insanunt, qui cogitata dictaque sua factis insuetis vel indecoris expleunt: horumque nonnulli adhibent artes, summamque speciem linguarum præbent in capendis majorum operum occasionibus, sed exitu deprehenduntur. *Morvæus Dissertatione de Delirio.*

In cerebri penetrabilibus abscessu] Unde species Delirii ad furiam pertinens & dementia, exorta est; quia hic motus organicus adfuit; ac in Delirio simplici spiritus animalis solum patitur: Duplex est imaginationis instrumentum inquit idem Vir Exell. unum immediatum, primum & animatum, nempe cere-

bri substantia, alterum mediatum, secundarium & animatum, scilicet spiritus animalis, qui non modo ut medium internum sed etiam ut organum principibus potentis famulatur: Præcipua igitur Delirii causa est cerebri morbus, non quidem organicus (hic enim fatuitatis & dementiæ potius quam delirii author est) sed similis vel communis, ac frequenter calida intemperies; Duplex autem est in cerebro spiritus, unus insitus, fixus & animatus, ad cerebri integritatem pertinens: alter influens, vagus & inanimatus, impetu corpori contiguus non continens, qui proprie animalis dicitur: hic à genuina conditione recedens, *delirio* à *causa* patit deliria: ille veto à naturali integritate declinans, pura impulsio ac intemperatior redditus, delirientiam promoveri *delirio* à *causa*, quales plerumque sunt melancholicæ: spiritus influens afficitur salvo insito, sed spiritus insitus sibi eam suam influenti illico communicat; quod ejus creator sit ac *delirio* à *causa*. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO XXXIII.

§. Delirium ob pus è cerebro exitu prohibitum.

Rusticus vulnus circa dextrum os bregmatis baculo accepit: 8. die vocatus inventum ipsum febricitantem & delirantem, rubicundis oculis, &c. Huic dura mater ita adhærebat cranio ut nihil puris exstillare posset. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXXIV.

§. *Delirium à collecto sanguine intra meningem duram & cranium, venis omnibus sanguine tumidis &c.*

Milles vulnus in capite exceperat, Sanguis vix sisti poterat: Empiricus aluminis parum ossi intravit, hinc paralyticus factus, delirius frequentibus adjunctis &c. Sanguis plurimus intra meningem duram & calvariam collectus erat extra venas: Dura meninx puris acrimonia erosa; venæ omnes cerebri & cerebelli sanguine refertissimæ &c. *Vide lib. 4. Tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXXV.

§. *Delirium ab ingenti phlegmone intra calvariam; Tumore dura meningis &c.*

Mulier exiguo in fronte vulnere vulneratur 3. die febris, delirium &c. 5. mors: Ingens phlegmone intra calvariam inventa: dura meninx tumens; dura, livore affecta & ingenti puris copia suffusa &c. *Vide lib. 4. Tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXXVI.

§. *Phrenitis à phlegmone postica partis cerebri.*

Itivenis sub cane in gravissimum capitis dolorem incidit, hinc phreniticus factus &c. Aperta calvaria magna copia sanguinis nigerrimi effluxit; Ubi detectæ sunt cerebri tunice, mox universim venulis nigro torridoque sanguine turgentibus conspersæ apparuerunt: Parte posteriore membrana gangræna correptæ visæ, ut & fere tota basis cerebri cum cerebello & initio spinalis medullæ. *Vide Tit. de Capitis dolore.*

S C H O L I A.

Itivenis post capitis dolorem phreniticus] Cause efficien-
ti adjicitur cause suscipientis dispositio, etque
duplex, generalis & specialis: Nam in genere cere-
brum, cui temperie donatum algidiore, prompte ta-
men incalcescit ob infirmitatem mollioræ junctam;
reocerta enim, non minus intra quam extra corpus,
& gelantur facile & uruntur: In specie vero Delir-
ipientia frequentius appetit Juniores, biliosos, ira-
cundos, studiosos, caput nativum vel casu invalidum

habentes, cura, exercitio, ac præsertim inedia vexa-
tos: Jure his consulti Hippocrat. lib. 1. de Dietæ:
ut pleni potius quam jejuni gerant negotia: Mixto
enim familiari alimento stabilior redditur anima
quamdiu cibi indiga est: Leves etiam ac turbulenti
homines, vel parvis occasionibus, firmi vero &
constantes nonnisi magnis de causis delicti fiunt,
ex Galeno, *Memoria Dissertat. de
Paraphrenis.*

OBSERVATIO XXXVII.

Delirium ab inflammatione, hinc suppuratione septi transversæ.

Virgo sævis doloribus cruciatur ad alam sinistram & costas mendosas, cum febre & Delirio: Secto cadavere inventum est septum transversum in interiori parte suppu-
raturum. *Vide l. 2. Tit. de Lateris dolore.*

S C H O L I A.

Docet quondam Plato in Timæo, septum trans-
versum cerebro visceribusque naturalibus, qui-
bus anima brutalis tanquam ad præsepe vincita est,
fuisse interpositum, ne rationis domicilium ab his

violaretur: Sed istud debet intelligi de statu homi-
nis naturali non morbofo. An Phrenitis oriatur
à septi inflammatione vide Obicerv. 2.
hujus sectionis.

OBSERVATIO XXXIX.

Delirium in quodam cui pulmones corrupti & nigricantes.

Quidam febre ardentissima correptus Deliria nocturna habuit: doluit etiam à latere:
Pulmonibus corruptis & nigricantibus inventus est. *Vide lib. 2. Tit. de Lateris dolore.*

S C H O L I A.

Delirium nocturnum] Causa adjuvans parapsychosymes est nocturnum tempus vaporum præcedens dissolutionem: ac observare est in febribus deliria de

nocte præferri vigere, quod Hippocr. 4. de diagn. acut. notavit; *Noctis magis quam dies Delirium frequentius præbet.*

OBSERVATIO XXXIX.

Delirium ab abscessibus tentatis Pulmonibus.

A NNO 1601. in Ducatu Urbini grassabantur pleuritides, peripneumoniar, anginae &c. Ægri floccos aut palcas à parietibus carpenres iv. aut v. delirii die peribant, Sectis cadaveribus reperti sunt pulmonum abscessus: *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

S C H O L I A.

Ægri flocci carpenres] Signa delirii è quadruplici fonte hauriantur, 1. ex dissimilitudine morum, qui à natura non longe abeuntes desipientiam minuantur; ab ea vero plurimum deficiunt, ægri mentis valetudine jam tenaci commonstrant: Mores autem duplices sunt, insiti & intinui; illi quia temperiem necessario sequuntur, sunt mutabiliores: Hi, quia per Philosophiam acquiescunt, non pendunt per se à temperie, sed apud animum habitant, & ut ardua est eorum comparatio, sic difficillima depulsiō, ideoque plus potest morum adfectionum quam ingenitorum innovatio ad diagnosis delirii. 2. Delirium petitur ab *alio* laborum: hinc Hippocr. 2. aph. 6. Qui parte aliqua corporis dolentes, dolorem non sentiunt, iis motus agrotat. 3. Delirio

detegitur rerum propioque dictarum & factarum repentina ac extraordinaria oblivione, per quam æger eadem verba sæpius repetit, inconstanter orationem narrando perterece non recordatur: Quanto, omnis actio arbitraria quæ citra causam evidentem vel deficit, vel exopæat, vel indecenter fit, Delirii notis assumitur; ut pertinax silentium in homine loquaci, *nocturnum* in taciturno: Huc refertur manuum gesticulatio, lineæorum & operimentorum indecora nec necessaria collectio; aut ubi æger cæcorum more suspensa manu, aut cum primo aliquid vestiget; aut inani opera mûcas vnetur, de paciete stipulas legit, tomentum & floccos à litargulis detrahit &c. *Mentium Differet.*

de Delirio in genere.

OBSERVATIO XL.

Delirium ab inflammato ventriculo ortum, impuro.

V Ir xxiv. ann. usus fuerat dum caleret maxime, alias bene sanus, frigido potu: altero die Delirio corripiebatur vehementi, adeo ut vix derineri ab adstantibus potuerit: sæpius, porci instar, foveis terræ se abscondebat, stramineque etiam summe impuro contegebat;

In defuncti corpore reperiebatur ventriculus totus, imprimis quoad inferiora, inflammatus, repletus materia flava, mucosa, qualem etiam aliquor diebus anrequam obiret, maxime autem ubi agonisabat, vomitu excreverat. *Blasius observ. med. 21.*

S C H O L I A.

Ventriculus inflammatus] Anathymiasis *apertæ*, ad rationis aciem obrepunt, vel ab intestinis verminantibus aut ileosis: vel ab inflammatis partibus internis, ut pulmone, jecore, diaphragmate:

vel in febrium locermitrentium paroxysmis ab eorum foco: vel à toto corpore, ut in augmento aut vigore, ac interdum etiam in principio febrium coarctatum. *Mentium Differet. de Parapsychosyme.*

OBSERVATIO XLI.

Delirium sequutum Tuberculi in ventriculo disruptionem.

I llustris Ferrariz Duci Alphoso Tuberculum in ventriculo disruptum est, Habuit hæc symptomata Exolutionem, vomitionem, animi defectionem, imo & mentis alienationem. *Vide lib. 2. tit. de Syncope.*

S C H O L I A.

Mentis alienationem] Scil. paulo ante obitum. Huc pertinet illud Hippocr. 2. Prothet. Deliria *apertæ* *nocturnæ*, prædebilitatorum pessima sunt, quod à causa perniciosa oriuntur; videlicet extrema spirituum animalium indigentia: Si eo loci Hippocr. vires acritas considerasset, non velut causam delirii,

sed simpliciter tanquam signum assidens delirio, profecto nihil oovi nos docuisset, cum non solum in desipientiis, sed in quacunq; alia agitudine ruentem naturam moris prætorum esse nemini non notum sit. *Mentium Differet. de Delirio simplici.*

OBSERVATIO XLII.

Delirium à vitio uteri exortum.

PVella suffocationibus uterinis obnoxia, Delirio subinde afficiebatur. Iuxta uteri testes vesiculæ erant tetro humore plenæ: In thoracis cavitate humor aquosus sanguinolentus, ex vitio Pulmonum alimento. *Vide lib. 3. tit. de Hystec. aff.*

S C H O L I A.

In utero testis infusa] Ab utero, partibusve illi adnatis, semiot vel sanguine corruptis surgentibus Deliria orti, constans fama est; Hippocr. lib. de virgin. morbis, Sanguinem menstruum, si in virginibus viro maturis effluvio careat, ad eos & diaphragma præ multitudine regurgitat air, inde cor primum iofatuari, hinc torporem, & ex torpore dementium invadere. Putridum semen hysterica symptomata,

atque inter hæc Delirium patere notum est; emissio scil. vapore maligno, tenui & spirituosio ad mentis aciem, non solum per veas aut arterias, sed & per nervos ac cæca spiracula: Sed præter menstruum sanguinem & semen, quavis alius humor venenatus qualiter induere potest in partibus utero adici.

OBSERVATIO XLIII.

Delirium ab abscessu in apice gibbe hepatis partis.

ADolefcenti crus dextrum vehementer doluit cum acuta febre, & Delirio ex intervalis. Abscessus repertus cum pure albo in apice gibbe hepatis partis. *Vide lib. 4. Tit. de Doloribus externis.*

S C H O L I A.

De Delirio à vitio Iecoris & aliarum partium extra cerebrum orto vide Observ. 13.

OBSERVATIO XLVI.

Paraphrenitis à bile acerrima è cysti fellis exsudante, vasis cerebri & cordis sanguine nigro turgentibus.

Auriga ex febre continua, (*Vide l. 4. tit. de Febris*) adtente quasi furibundus mortuus secabatur. E cystide fellea integra exsudabat tenuis bilis portio, trium digitorum transverforum spatio, circumcirca partes vicinas croceo colore inficiens, quæ putredine quasi affectæ. Vasa insuper cerebri turgebant sanguine nigricante: E corde dissecto sanguis niger prodit: Unde facile colligendum vim bilis erodentem simul nervosum genus tetigisse & ægrum furiosum reddidisse.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO VIII.

De MANIA & RABIE seu HYDROPHOBIA.

OBSERVATIO I.

S. I. Mania à Siccitate cerebri in superficie, flavedine tincta, &c.



CIVIS Leodiensis totum melancholiz se immerfit, paucos post dies acute febrili, sine tamen delirio, à febre liber in amentiam primum, dein in Furorem versus, vinctulis coerceri debuit. Ablato mortui cranio siccissimum, durum, adeoque in summa parte digitis friabile, flavum undiqueque, ad altitudinem digiti tinctum observatum. *Vide Tit. de Catalepsi.*

SCHOLIA.

Melancholia se immerfit] Melancholiz Mania in tantum affinis est, ut hi affectus sæpe vices committent & alteruter in alterum transeat; nam diathesis melancholica in pectus eversa Furorem accendit; atque furor deservens non raro in diathesin acerbillissimam transit. Sæpe hæc duo quasi fumus & flamma se mutuo excipiunt coduntque: Et quidem si in melancholia cerebrum & spiritus animales fumo & densa caligine obfuscati dicantur, Mania istis quasi apertum incendium accendere videtur. At verosi quidem spiritus animales accensos; sive inflammatos, Phrenitidem cum febre (qua mania caret) exciitare ostendimus, illorum affectio in hoc morbo, sicut in melancholia, ex. *Liquorem Chylorum* analogia melius elucet.

Item in Furorem versus est.] Quandoquidem mania sine Febre, cumque insigni functionis animalis lésione excitata, continua & diu permanens esse solet, *Salsum* ejus proxiimum & immediatum est *Spiritus animales*, qui scilicet non per consentium, nec ab alio impetum faciente, sed per se & habitualiter affecti, ab indole propria & genuina, nempe *Spiritus salus*, in *Sulphure Salis* (prout alibi innuimus) Aquæ Stygiæ æmulam adfiscunt, proindeque actus inritum inordinatos edunt, æque ita perpetuam ægrediu persistunt: Huic illorum vitio aliquid forte Cerebrum, aut sanguis, aut alie partes contribuant, ac ipse spiritus primo & potissimum in culpa sunt. De Maniaci observare est hæc tria illis fere omnibus esse communia, scilicet 1.^o eorum phantasias, sive imaginationes cogitationum impetuolacum æstu perpetuo occupati, ut dies & noctes varia sibi obtrahant, aut clamando & ejulando proferant: Secundo, Notiones sive conceptus & incongruos esse, aut (sub specie falsæ sive erroneæ iis repæsentant. 3.^o Illorum delirio audaciam & furorem (sæpius adiungi, contra ac in melancholia, qui timore ac mentis semper affliguntur.

Primaria istæ Maniæ symptomata à Spiritibus animalibus indole *Aquæ Stygiæ* æmula præditi aptissime deduci ea sequentibus patet: 1.^o enim Aquæ Stygiæ particule summe agiles & irregulares, in motu perpetuo exsistunt, hinc ut effluvia ab iis decedentia naves continere ferant, atque liquor è vase effusus cor-

poribus quibique aliis occurrent, valde effervescat, eorumque poros & meatus penetret, Cujus ratio est, quod particule salinæ sulphuri conjunctæ, se invicem exagitant, cumque nullis aliis generis coherere: Patet: opinari licet spiritus animales è sanguine inediti & quasi nitrosulphureo exillari, in igni mobiliare sive iniquitate præditi esse, qui proinde è cerebri medullis quaquaversus tum in ambium eunt, tum in systema nervulorum expansi indeque perpetuo tellere, phantasmata effert, & fere nunquam interrupta, atque functionis tum sensitivæ, tum loco motivæ fluctuationes maximas & perpetuas producant.

2.^o Effluvia è spiritibus nitrosis sive Stygiis exhalantia, hinc tantum in spaciis apertis evapitant, quò valde penetrantia, in quovis tere suspecto poros & meatus, per quos transire possunt, ubique novos procedant, imò corpora plerumque hujusmodi spiritus continentia, aut vasa foraminis imposita, ab ipsis ita perforantur, ut friabilia statim reddantur ac in partes minores decidua. Patet opinari in affectione Maniaci Spiritus animales ex indole sua morbida, valde mobiles fieri & plurimum excoli, ita ut priores itum ac reductum tractus relinquant, ac in cerebro spaciola sive ambulacra ubique nova & plane devia sive eacavent, in quibus dum scambiant, notiones insuætas & valde abundas producant, unde necesse est ut affecti plenamque incongrua & tantum incomposita imaginentur, loquantur & agant: præterea præsentibus aut futuris, & contrariis vel oppositis simul confundant. 3.^o Observare est vaporola corporiscula è mineralium spiritibus nitrosulphureis decedentia, non (ut hinc à liquoribus acerosis emanantes) tantum in vicinia subsistere, sed longissime & quaquaversus in ambium remotum diffundi. Sæpius vidi cum spiritibus nigris buri Animæ omni committeretur, totam cameram fumo araro, è liquoribus istis stygiis ascendente impletam: Cum Aquæ fortis, aut spiritus nicti ex alembico vel lento calore avocatur, vapor acerrimus inde diffusit, procul adstantium & naves & pulmones percellit; quod certe contingit ob salis fluidi & sulphuris effectum conjugium, quorum scilicet utroque corpuscula se

mutuo

humus incitant, proindeque simul combinata loquias provehantur. Pari equidem modo circa spiritus animales in Maniæ habere videtur, qui si quidem ejusdem ac aquæ hygie indolis fuerint, idcirco tum cerebri compagem, tum appendicem ejusdem raptantes, affectus non tantum furiosos, sed velut Dæmoniacos efficiunt, adeo ut metu & languore quoque immensus quodvis audacter aggrediamur, ferro & flamme scilicet isorepido obijcimus, etiam ob prodigiosas spirituum eorundem excretiones robore immensi polleant, vincula de cæcis sæpe distumpant, atque viros fortissimos his obstantes, de coercere nientes simul plurimos debellant. Spirituum animalium cum aqua hygia, seu spiritus vitæ sulphureo coparatio, clare indicat quæ in moris conjuncta causa, live immediata, quæ nimirum consilire videtur non tam in bile adusta, aut humore aut vapore terro & acidi in cerebrum deiectione fustis, atque spiritus incolas in vultum & ocellum incitante (talis enim vapor vel humor aut ipse exhalatur, aut remediis ope cito diffilari potest, proindeque demencia inde condita æque cito & facile in hunc aut delirium à passionibus syderibus ejus producta transiret) quin potius habitualiter Insanos, seu Maniacos, ita fieri constat in quantum ipsi spiritus animales ab indole mixta benigna, æque ac subtili & tenui agili, nempe *serena-sana*, in aliam acerrimam, nempe salis fluidi ac sulphuris Aënealis participem, degenerant. Quod spectat ad Maniæ causas remotiores, sive Antecedentes, videlicet propter quas spiritus animales diaphanum acerrimum acquirunt, prius ostendere oportet quomodo & qua ratione latere quispian corpuscivus (quem supponimus spiritus animales cum vehiculo esse) in corpore humano progigni & subsistere possit. Profecto humores acerrimos interdum in corporibus nostris generati multis observationibus plane constat: Novimus Nobilem cerebri & nervorum affectibus graviter obnoxium, cujus focios (cum in paroxysmo esset) canisiam, quasi aqua forti tingentur, excedens, mox finibilem redderet: utrumque est ocellum & saepe lacrimam quasi vitriolicam & cephalicam palati rinitis erodentem, vomitus excreant; postea ulcera cancrofa, scrophulosa & pestilenta, humorem acerrimum, quo scilicet carnes & membranae velut ab aqua forti ita affusa cum acredine exeduntur, patitur. Porro observari est stigmata corrosiva huiusmodi in sanguine producta, citius miculosa aut viscerum parenchymatis alligi, sed multo frequentius in *liquore nervo* procreata cum latere ejus in partibus nervosis aut eorum emunctoriis deposita, apostemata ac ulcera phagedenica, septica, aut alias cacoerba producere: Hæc enim sapissime in glandulis, vel juxta tendines aut membranas exstantur, cumque humor ab illis decidens primo tenuis & aqueus sit, postea atratus, valde fetidus & coarctatus evadit, indico sane ipsium *liquorem nervorum* in ejusmodi puritagine abire.

Quemadmodum antea liquor iste ad hunc modum depravatus, in partibus nervis prædictis affectus elicit, ita non difficile erit concipere eundem latere, quemvis spirituum animalium in cerebro latentium pro vehiculo est: una cum spiritibus ipsis indolem corrosivam & quasi stygiam acquirere proindeque Maniam excitare. Spirituum animalium una cum succo cerebri irrigante depravato, Sive Dispositio Maniæ, variis modis & propter diversas causas excitari solet, ut plurimum vero affectu illa prout de melancholia observavimus, vel à spiritibus ipsis

vel à sanguine incipit. c. Mania à Spiritibus incipiens nonnunquam à causa evidenti solitaria, ut passio violenta exoritur, quandoquidem à procreant in cerebro jacta procedit, velut cum melancholia aut Phrenoia supervenit. c. Quando vehementes affectus quempiam à mente sana depellit, ad ita fieri contingit, vel quia spiritus animales proterantur nimis & in confusum adiguntur, vel quia supra modum elevantur & ultra sphaeram suam se expandere nungunt. 1°. Spiritus proterantur solent à passione violenta ac terribili: ita passim accidit quoddam à spectri innuui vero aut imaginario, mox panico terrore percolloni in Maniam perpetuam incidere: Porro nonnulli propter solitæ opprobrium, aut repudium, alii ob veluti amoris spem subito ac improvise frustrati, alique ob vota temere rupta, primo animo insigniter perturbati, mox dementes evadunt. Cujus ratio est quod spiritus animales extra series suas, & meatus solitos propellit, & in confusionem addit, tractus sibi oculos & devios procedunt, quos subeuntes phantasma mox delicta patiunt: Interdum foci nervi particule salinae, spiritus in depressa, à volatilitate delinunt, atque fluorem passæ, corpuscula sulphurea & sanguine in cerebrum, tunc debile & patens, tussula subinet assument, unde liquor hic ita in initia aque fortis acerrimus, atque spiritus animales effecti & plurimum incitati, fastidi evadunt: a. Spiritus animales quandoque dum *stravimus* nimis, partem modo & hibernæ & sacco nervo diaphanum maniacam inducunt: hinc ambitio, insipida, & æmulatio, quoddam insanie fecerunt: Cujus ratio est, quod dum Anima corporea propriæ excellentiæ opinione & fastu innumerosos se te erigit & quaque viciis amplissime ultra corporis oram expandere annuit, spiritus animalis *de insipiente* tumultuante vocat, intra solitas orbitas contineri nequeunt, ibidem vero relecti, & propter exertionem nimiam diversimode reflecti, in tractus novos & plane devios coguntur: quapropter tam ipsi & propter commotionis cursu extrahati, tam *liquor nervo* diaphanum (prædicto modo) acrem & incitativam cito acquirunt & proinde Mania succedit.

A felix liber in amensiam, hinc in furorem verus est.]

Hæc de Mania propter causam evidentem indolentiam excitata: Verum hic morbus insuper sæpe ob piccatum in cerebro præexistentem exoritur, & præcipue ob melancholiam aut Phrenoia præteritis: In illa spiritus animales cum succo nervo paulo magis exalati, & in hac aliquemculum depressi diaphanum Maniacum acquirunt.

Quoad prius, vulgaris observatio est Melancholiam tubitum & magnam plurimumque Insaniam proximam esse: cujus ratio est, quia cum spiritus animales, una & liquor nervus in acorem degeneres pervertuntur, tantummodo sulphuris accessu opus est, quo isti mox indolem stygiam nasci Maniam superinducant (veluti cum liquor acidus à vitriolo aut sale exstillandus, addito sale nitro aqua fortis evadit: At vero in immani Melancholia passione, quia spiritibus disturbatis cerebri meatus nimis debiliunt, & sanguine bilioso & rancido particule sulphureæ diaphanum priorem acorem lo stygiam seu Maniacam provecturæ, facilius adiutur invenitur: Hinc observare est si quispiam temperamenti calidioris in delirium atrabiliarium cum metu & metustia incidit, quandoquidem in humoribus ejus particule sulphureæ, quæ salinis in fluorem depressi adjunguntur, in promptu sunt, ipsam ab initio tristem & valde cogitandum, brevi postea insanum fore: Secundo,

Quod

Quod item Phrenesin in Maniam saepe definit, ratio fere eadem ac prior ista, sed diversa est, quatenus nimirum in Phrenide *spiritus & liquor nervos sulphurei nimis & inflammati*, postea deflagrantes, particulas salinas sibi conciliant, & proinde pariter indolem acerrimam & quasi stygiam nanciscuntur, quare tunc febre cessante, Furor coelestis & fixus evadit. 2. Dispositio Maniacae huius minus frequenter in massa sanguinea radices habet, & demum in actum producit, quando nimirum sanguis summe depravatus & nitro sulphureus, liquorem nervum, una & spiritus animales aut perverit aut malos suppeditat: cuiusmodi sanguinis labes aut hereditaria aut acquisita est.

3. Communis Observatio est homines è parentibus ortos quandoque Infantie solitis, eidem morbo obnoxios fore, & quavis supra 30. aut 40. annos saepe prudentes & sobrie vivebant, postea tamen absque ulla occasione, aut causa evidenti in Maniam incidere, Cuius ratio est, quod sanguis eo tempore à debita crassi scilicet in nitro sulphureum desiccatus, spiritus animales, una & focum nervum indolis acerrimae participes à *hypothalamo* suppeditat. Olim ostendimus in complexione nostra particulas elementares scorum à secundariis per nutritionem suppeditari, durante vita persistere, atque suae cruditalis, maturitatis & defectionis tempora habere, quambobrem & morbidissima iuxta aetatem periodos in fluctus maturari censimus: Porro annotamus saepenumero morborum fluctus ejusmodi maturatos alligandus, aut perperno quoad vitam manere. quodque tamen velut sponte deciduos emacelceret, deinde nonnunquam aliquo temporis tractu ex mitiore relicto fugas novas repulsiare, atque ad *hypothalamum* praelatum alligere; Quapropter Mania hereditaria interdum continua est, quodque luteimittens, ejusque paroxysmi modo post breviora, modo post longiora intervalla repetere solent. 2. Quemadmodum Mania procacitatis sanguini inhaerens, saepe innata sive originalis est, ita nonnunquam eadem, aut mala vicinis ratione aut evacuationum solennium suppressione, ob febrem praegressam aut ob alias causas sensim propinquat, & demum ad maturitatem perducta, in Maniam erumpit: Usitatum est in magna annonae caritae pauperes quosdam, cibis tantum incongruis aut dyspepsia vesici coactos, primo tristes cum aspectu torvo & lurido, & brevi postea insanos fieri. Haemorrhoidum aut Caecæmiorum fluxus cohibiti, aut ulcera cacochymiae suppressa, vesius hunc morbum disponunt: Porro qui originaliter aut acquisite temperamento acriori, & moribus effratibus, & vultu minaci praedit sunt, propter sanguinis diarrheam nitro sulphuream propinquam, à causa evidenti fortiori in Maniam incidere periclitantur.

3. Fermenta venenosa sanguini & *saue nervos* influmata, ut impinis ab Animalium rabidiorum morsu, aut toxicorum quorundam assumptione insaniam

excitare solent. Sic novi Dominam Ill. quae ex acornici foliis teneris in acetario coactis, intra octididmeri spatium Maniacae obiit.

Hæc de Maniacae causis, his insuper adijcere visum est Audaciam, Roborem & quod labores quovis vique indefatigati, dolores illati tolerent: Maniaci, non nisi melancholici, nitescentes ac timidi sunt, verum audeces ac plurimum confidentes, adeo ut pericula fere nulla effugiant, & res quasque difficillimas aggrediuntur: Cujus ratio est, quia spiritus animales effecti admodum ac incitissimi imaginationem fortificant, ut nullum obiectum ei solito majus aut immensius videatur: non præcordia cum vigore actuum, proinde ut sanguinem nervole ac celeriter ejiciant, inque ultima corporis oras vegere propellant. In hoc affectu Anima ultra corporis ambitum effecti & quasi exiliter laxiglit, adeoque quaquaveris emittens, contra quovis exteriorum incursas sese interpidam gerit. 1. Insani usque ad prodigium validi ac robusti sunt, adeo ut vinula & carenas discurrant, &c. cujus certe causa est quod in sanguine ac liquo nervo maniacarum particulae quasi nitro sulphureae, aut alias acerrimae, ac velut stygie continentur, unde spiritus animales vi elastica, seu explosiva stupenda, & longe supra naturalem immaci pollent. 2. Observare est Insanos fere nunquam delirari, non licet debacchando aut eluctando plures dies & noctes membra sua validissime exercere, ac interea jejuni ac insomnes degant, vix omnino oblangescunt, nec viribus exolevis ac adionibus deficiunt. Quod proculdubio ita fit in quantum spiritus animales, etiam valde mobiles & elastici, non tamen volatiles ac facile dissipabiles, quia ob particulas salinas à volatilitate in finem deprellas, cum sulphureis combinatas, firmi & faiores evadunt, & ob id in activitate sua diuissime perdurant: pariter ac observamus de Aqua fortis, quæ licet in vase aperto coacta effluvia quamplurima perpetim emittat, usque tamen substantiam suam illibam fere, ac vim corrosivam retinet, secus ac spiritus vini aut sanguinis, quorum vitas cito evaporat. 4. Ob eandem pene rationem quantumvis tolerant aut assilugunt, minime letantur, sed fugas & alium, Vigiliis, jejuniis, verbera & vulnera absque ulla sensibili persequuntur, quia spiritus fixati & robusti, neque tergiversantur nec avolant; potro sanguinis dyctatam nitro sulphuream nactus, cuiusque alius sublimis mutationis incipax est, quare licet transpiratione insensibilis inhibeatur, alioque vacuationes solennes supprimantur, aut succi cutitili supplementa denegentur, nec cartharus, nec febribus, nec atrophis, nec cacochymia Maniacae facile superveniunt; Nam in hoc affectu, quamvis sanguinis particulae valde turgescant, attem ob salis copiam incendium febri le minime concipiunt. Ut etiam Aqua fortis, etsi multum efferveat, & alia subiecta ab ea, ipsa tamen non omnino inflammatur, quin potius incendio resistit. *Ubi cap. de mania.*

OBSERVATIO II.

Maniaci affectus in puero, ab atra bile vasa dura & pie matris occupante, Eadem in vasis partium vitalium & naturalium contenta.

ANno 1677. 14. mensis Maii, dissectus est puer annorum quinque à Magistro Bailly Nosodochij Genevæ Chirurgo perit. in Orphanotrophio, me præsentem & D. D. de Communis Nosodochij Medico Præstantissimo. Vividi erat ingenii puer, agilis, macilentus, qui per quatrimum tantum ægrotavit. Conquevisus est de dolore capitis, cum febre mediocri,

mediocri: Tertia die morbi, noctu ululabat instar carnis, cum brachiorum varia agitatione; de die satis erat quietus, sed quid garriret nemo intelligebat, adeo ut assistentes obfessum a cadomone esse crederent, Latine & Græce eum loqui asserentes: quæ causa fuit quod culro anatomico expositus fuerit.

Aperto medio ventre: 1. Peritonæum divisum apparuit, nec non omentum, quorum pars supra, alreta infra retracta erat. 2. Intestina flatibus tumida apparere, præsertim colon, cum paucis fecibus in omnibus. 3. Mesenterium aridum erat, exilibus admodum vasis præditum. 4. Jecur diaphragmati adnatum erat pluribus in locis per fibras membranas. 5. Vesica fellis magna, bile fusca, grumosa repleta. 6. Lien fere orbicularis figuræ, in orbem convolutus. 7. Renes pro ætate magni, intus & extra hydatidibus repleti. 8. Vesica lorio repleta. 9. Venterculus contractus, interius admodum rugosus, cum aliquo mucore: 10. Vasa omnia imi & medii ventris atrum humorem continebant, *Thorace aperto*, 11. Pulmones dextri coharebant undique partibus vicinis, sinistri summa tantum parte, per fibras ex mucosa humore concretas, qui pulmones extrema parte vestiebat, marmoris instar variegatos, scirrhosos, ruberosos, quorum vasa atrum cruorem, sed paucum continebant. 12. Pericardium plurimam aquam limpida continebat. Cor pro ætate magnum, omni piuguedine destitutum, cujus nulla in toto vestigia. 13. Diaphragma, parte qua inum ventrem respicit, hydatidibus erat coopertum. Nihil tamen hæcenus deprehendere licuit quod causam morbi & mortis innueret, at hæc in tertio ventre, scilicet Capite, manifesta fuit, nam ablato cranio superno, adeo rubebat cerebrum, ut eo reposito, intra proprios limites reprimi non potuerit, dissidentibus ab invicem admodum utrisque oris. Vestigia saturatum, coronalis & lambdoidea, duræ matri altè meningi duræ impressa erant, quæ se inter illas intruserat; vasa utriusque meningis atro sanguine admodum erant tumida, qui multus erat in sinibus & torculari. Inter dissecandum cerebrum: (more Sylvian) maxime in corpore calloso, infinita puncta sanguinis micabant, præsertim compressione facta. Abscisso collo, quod facilius cerebri partes in conspectum venirent, plurimum serum ex occipito emanavit, quod proculdubio in ventriculis continebatur, qui exhausti apparere: *Ex propriis Observationibus.*

S C H O L I A.

HAc ex historia manifestum sit verum esse quod ex *Ballone* Observat. 6. sequenti adducemus, in mulis qui insaniverant, vasa capitis inventa esse turgentia, dilata ac vascula. Atrum vero sanguinem in illis deprehensum, localem in cerebro non habuisse generationem, patet ex eo quod vasa imi & medii ventris atro humore scatebant, sed paucos, cujus pars maxima in cerebrum de Jæta fuit. Quæ causa raptus, insolatione ac alia, nos latuit; Id vero illi cum pleuriticæ fuit commune, quibus scilicet æter ac crassus

cruor in cerebro, vel alio in viscere reperitur, ut illud multum serum, à sanguinis massa secerum, in vicinia deprehendatur. Sic hoc in puero vasa meningum atro cruore erant tumida; relictis autem collo, copia soli insignis ex occipitis foramine exiit: In pulmonibus paucos erat humor, crassus, niger: at in pericardio plurima aqua; hydatides multæ diaphragmatis parti quæ inum ventrem respicit adnatæ erant, necnon pleuriticæ pectoris & abdominalis locis.

OBSERVATIO III.

In Maniacorum cerebro macula nigra deprehensa est, aut meningibus.

Maculam quandam in cerebro vel meningibus deprehensam sectione, Maniaci causam fuisse aliquando inventum fuit. *Platerus Præseis lib. 1. cap. 3.*

OBSERVATIO IV.

Meningum putredo in Maniacis aliquando notata.

Sicuti & nonnunquam putredinem in cerebri meningum aliqua sede natam inventum fuit: A quibus vapores tetros continuo suscitatos spiritus conturbasse verisimile est. *Idem.*

OBSERVATIO V.

Mania à vermibus in cerebro indurata.

§. 1. **A** Vermibus in cerebro genitis Maniam accidere posse aliqui prodiderunt; Quæ vitia occulta, cum post mortem calvaria aperta primum manifestantur, vix vivente homine qualia sint, nisi in genere ex eo quod alia signa, quæ alias demonstrabant causas, hic desint, conicere licet. *Idem.*

§. 2. In quodam milite qui resimis erat naribus, ex frædiore quadam eluvie diutius cohibitis, vermes duo villosi Instar digiti, intra nares geniti inventique sunt, qui tandem in Furorẽ illum aegerunt, febrẽque non admodum manifesta de medio sustulerunt. *Fernelius Patholog. lib. v. cap. vii.*

§. 3. Vermis qui generatur in Cerebro, & Maniam inducit Equo, an à putredine humoris? An ab apophysi vermiformi in vermem degenerante: (Initio quarti ventriculi apophysis quædam apposita est, à vermẽs figura vermiformis dicta) *Vercquin* Gallis dicitur, inde proverbium, *Chacun a son Vercquin en la tête*, ac si intelligerent istam apophysin Vermiformem. Quinetiam veterinarĩ istum vermem interficiunt ustione facta inter caput & collum. *Riolanus Anthrophag. lib. 4. cap. 1.*

OBSERVATIO VI.

§. Mania à venis cerebri varicosis ortum ducent.

Multis qui Insaniverant post melancholicas affectiones, caput apertum fuit: Venæ capitis inventæ sunt turgentes, dilatatæ ac varicosæ factæ. Idem capiti contigens quod venis varicosis. Imo affectus erat quem Hippocr. lib. 2. de morbis *capitis* vocat venarum: Supervomitionem & eructationem voco. *Ballonius Paradigm. 134.*

S C H O L I A.

Vena varicosa] Cæssori & exulso sanguine cieca valvula hærente & impacto, qui ibi rari & coacti quædam infusuræ, *varicosæ*, convolutationem quandam, spirarum instar faciunt, nodosque & crispitudines: venarum enim officium est sanguinem, per arterias jugulares ad cerebrum evehctum in Cor iterum revehere.

varicosæ, &c.] Affectum illum sic ab Hippoc. vocatum dolorem capitis inducere vult: ut vero mania inde deducatur, aliud præterea requiritur, occulta scilicet qualitas, humoribus ibi coactis inhærens, enormium illorum pathematum parens, quæ à manifesta causa soloque calore p. n. proficisci non possunt. Sic furor uterinus à semine corrupto, malignam & venenatam vim adepto ocitur: Sic hydrophobia, species mania, à morbo venenato canis rabidi, in quocunque temperamento, sine atrox bilis concussio ocitur: vene-

na præterea quædam, ut cerebrum multatæ & solutum manicum, cum infensum, quæquam non cogendum in melancholicis & acrabiliis frequentius producit, quod humor ille tali dispositioni inspiciente idoneus est.

Vena turgens, dilatata] Dispositio maniaca sæpe in massa sanguinea radices habet, & demum in actum produciunt: De sanguinis labe ad eum motum inducendam requirunt, *tense Observat. 1.* in Scholiis. Continetur namque in universi corporis vasa, nunc in cerebro propriis; Interdum in ipsis cerebri vasibus, unde etiam mitiora vel graviora & hæc vel illa symptomata excitantur. Totius corporis vasa materiam continuerunt in Eo qui per Transfusionem sanguinis curatus est, de quo consule Acta Loodensia: Cerebri vasa affecta fuisse præsertim in iis quibus post obitum venæ cerebri quasi varicosæ repertæ sunt.

OBSERVATIO VII.

In demorso à cane rabido, Pericardium sine humore repertum, & ex parte consumptum, Sinus cordis aridi.

Rabidi canis venenum quarto ordine calidum esse videtur, cum enim dissectum esset Monachi, cujusdam cadaver, tria notanda apparuerunt. 1. Nulla aderat humiditas aquosa in pericardio, tota erat consumpta ab hoc igneo veneno: 2. Sinus cordis conspicebantur aridi & sanguine prorsus destituti, 3. in Pericardio portio quædam fuit obiecta ferme combusta & in pulverem redacta. *Capivaccius præf. lib. 7. cap. 12.*

S C H O L I A.

Non inde tamen evincitur hujus morbi causam in qualitatibus primis consistere, cum cujusque temperiei homines invadere queat: defectus enim

aquæ in pericardio, Siccitas ventriculorum cordis & *ignis* nota in pericardio sequi poterunt ad potius abstinentiam quæ hydrophobiam sequitur: *Stra-*

tuant ergo causa venenum peculiari modo dispositum, à tota substantia, ut loquuntur, agens: Qualitatibus primis non adscribendam causam ex eo patet, quod in dies multæ mutationes in primis qualitatibus accidunt, quæ tamen rabiem non excitant. Expe-

riencia præterea teste, non in maximo solum æstu, sed & per maxima frigora conies in rabiem aguntur, quod non contingeret si à caliditate & siccitate maxime ortum duceret à causa enim frigidissima affectus calidissimus orti non potest.

OBSERVATIO VIII.

§. In quodam hydrophobia affecto summa siccitas viscerum reperta.

ANno 1674. mense Maio juvenis artis Saltatoris magister, à cane rabido mordetur; Tertia post septimana in hydrophobiam incidit, salvo tamen judicio; dantur illi pilulæ purgantes, à quibus ritè expurgatur: postulæ, quod nausearet, exhibitum vinum emeticum; Paulo ante assumptionem, cum alio ejusdem Artis magistro, cui cum jurgium extiterat, in gratiam redit munusque amplexibus uterque ejus firmitudinem testatur; tertia ab hausto hora extinguitur: Pro more loci, ante sepulturam, à Chirurgo, ad id officii destinato, cadaver examinatur: Ille livore digitorum animadverso, (quia convulsionibus Inter Iratos vomendi conatus ortus erat) malignitatem suspicatus, & ignarus eorum quæ præcesserant, aperiri cadaver voluit. Intactum fuit cerebrum, sed in visceribus naturalibus & vitalibus summa siccitas fuit deprehensa, quæ an veneni indoli, aut potius inanitionibus præcedentibus adscribenda fuerit, dubium remansit. *Ex propriis observationibus.*

S C H O L I A.

Dioscorides, eumque sequenti quidam practici, ubi Rabies ad hydrophobiam processit, Elæborum exhibent. At vero cum id venenum mere sit spiritale, facilius est propriis specificis oppugnare, atque per vesicatoria & caustica evocare: Inter specifica com-

mendantur eximie radix cynothodonis siccata & ad §j. pluries ex aqua quapiam hidrorica, e. g. cardui ben. exhibita. Forsitan ab ea efficacia, tolæ caninae & rubi canini nomen illi inditum.

OBSERVATIO IX.

§. Luporum morsus, præsertim Rabientium est venenatus, quod in eorum renibus serpentes nascuntur.

IN Luporum fenum renibus serpentes observavi, ita ut aliquando Lupus in uno rene duos habeat serpentes, quorum unus pedem longus, alter pollicis longitudine, alii etiam breviores sunt, qui venenatissimi redduntur & cum tempore Lupum enecant. Hinc videmus si animal aliquod à Lupo fuerit præmorsum, raro & quam difficillime curari, quod dubio procul propter peculiare venenum in Lupo delitescens usuvenit: pleraque enim animalia præmorfa moriuntur, aut saltem membrum præmorsum putrefcit. *Carolus Stephanus Agricola lib. 7. cap. 1. Gaspar Bauhinus lib. 1. cap. 17. de corp. hum. fabrica. Joh. Bauhinus Tract. de Luporum rabie memorabili p. 77.*

OBSERVATIO X.

In iis qui demorsi sunt à cane rabido nihil anginosum deprehenditur.

Mordendi desiderium in à Cane rabido morsus, magni nominis Medicus referebat ad inflammationem faucium, & conjunctam Anginae speciem: Sed aperta aliquoties cadavera, nulla inflammationis vestigia ostendere. *Cu. Raskinkius Dissertat. Anat. lib. 1. cap. 13.*

OBSERVATIO XI.

§. In Equis, Bobus & ovibus Rabie affectis vermes in capite deprehensi.

Ætas hæc sicca æstivansque multa animalia in phrenitidem & vertiginem agit, quod damno suo multi apud nos agricolæ experti sunt. Notandum id imprimis de equis, bobus & ovibus, vermes capiti inesse ita affectorum rusticorum nostrorum est observatio; *T. Bartholinus Cent. 3. Observ. 48.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO IX.

DE MELANCHOLIA & AFFECTIONE

HYPOCHONDRIACA.

OBSERVATIO I.

In Melancholico venæ meningum sanguine melancholico plenæ repertæ sunt, cum aqua in ventriculis.



RATER vxoris Dom. Baillon febre non apparente tenebatur, τὸν γλαυκὸν ἀεργὸν, quod melancholicum esse scribit Hippocr. taciturnus, sitibundus comatosus, & aliquantulum lethargicus factus est, ingens capitis dolor, mortuus.

Venæ sublatō cranio apparent plenæ sanguine melancholico: magna faris aquæ limpide quantitas in ventriculis reperta est, An id occasio mortis esse potuit. *Galenus Epid. & Ephem. lib. 2. p. 244.*

SCHOLIA.

τὸν γλαυκὸν ἀεργὸν, Hippocr. sect. 5. lib. 2. Epid. ait Balbos, celere lingua p. xinos, atra bilis humor obnoxios esse. *Arastanus* cap. de melancholia explicat quæ ratione blasi balbique Melancholici dicantur, Corpora, aut, habentia cor calidum. cerebrum autem humidum, sunt dispositioni melancholicæ opportuna, Nam caliditas cordis est cholera nigra in corde genitrix; Cerebri autem humiditas causa est cur facile impressio ejus suscipiatur quod in corde gignitur: Ideo balbi & linguae vacillantes ad melau-

choliam parati sunt, maxime si linguae lenes habuerint & oculos mobiles &c. cetera; Sic pilositas & rubor faciei calorem cordis significant: Blasias molitiesque linguae cerebri humiditatem: *Hæc Arastanus*, Quorum plurima in præsentem ægrum quadiant, Venæ enim meningum atro sanguine repletae, Sitis, Soboles sunt caloris viscerum & cordis: Aquaplurima in ventriculis reperta, humidus cerebri index est, unde linguae æsthetica, coma, dolor capitis.

OBSERVATIO II.

§. *Melancholia à mane ad vespertam vigens, orta à sanguine superfluo cerebri vasa replente & distendente, Ventriculorum & plexus choroidei superficie muco oblita, &c.*

VRsula Pulen Frizen (cujus vide historiam integram *Tract. de Saporefis affectibus*) diu continuos capitis dolores passa est, quos sequutum delirium in quo notissimos & omnia rura timebat; Sæpius in sylvas aufugit ut vix satis custodiri potuisset; ter violentam mortem sibi inferre nitebatur, &c. Delirium hoc plerumque sub auroram incepit, duravit usque ad vespertam, hinc minus sibi metuebat, quietior erat, nec custodiam fulexeget at, &c.

Mortuæ remota erant olla, vasa sanguifera tenuis meningis ubique majora & sanguine pleniora videbantur, &c. Utriusque ventriculi lateralis superficies lutea peuitus & quasi rubigine obducta videbatur, oblita enim erat muco etuceo, illi simili qm citra aquas ferratas conspicitur, & lapidum & terræ superficiem incrustare solet: Eodem quoque plexus choroideus infectus erat: pettingebat rubigo ista quoque ad tertium ventriculum, quartus prorsus mundus erat, &c.

SCHOLIA.

DELIRIUM ante & post partum aliquot meosibus sceminum hanc exagitans melancholicum fuit, nam omnia cura timuit, nec sine desperatione qua-

dam: Id in Delirio hoc notatu dignum quod à summo mane ad vespertam ipsam perterritus, noctem vero quietem indulsit, ut tremoris custodibus acquievere, causam

Causam in sanguine delituisse haurientem ex venæ sectione, frustra hic medicamentis, clarum fuit: Ventriculorum lateralia & testis, ut de pleura choroidei superficies mucro croceo oblita non patum me perturbata & varias suspiciones apud me moverunt, cum ventriculorum superficies, imprimis foris, splendeat & lucis alicujus participes sint, verum postquam tot venæ sectionibus melanco-

liam expugnatam fuisse, illamque placide vixisse perpendi, necessario melancholicæ causam in mala sanguine concludi arbitratus sum. *J. J. Wesserus Dissertat. de Apoplexia, hylar. v. p. 414. & 420.*

Ventriculi superficies quasi rubore oblita. Excell. *Wid. spirituum* in melancholicis diachetis spiritibus & mineralibus distillatione elicitis comparat, *Vide Scholia ad Obserr.]*

OBSERVATIO III.

§. Melancholia à Sanguine nigro in venis tenuis meningis.

Melancholicus juvenis Epilepticus obiit, &c. In latere dextro admodum turgebant venæ tenuis meningis multo sanguine nigro & concreto; Ea pars nigricabat, &c. *Vide Tit. de Paralyfi.*

APPENDIX.

Melancholia ab affectu cerebro circa Torcular.

Novit *Joh. Sylvius* quendam qui levem quandam melancholiam patiebatur, & aliquando similis furioso videbatur: is ardorem magnum dicebat se sentire interna capitis parte qua Torcular est, vasorum cerebralium ad futuram lambdoideam & in occipito ubi decidit vas insigne, quod reptans ad frontem usque inter duos cerebella protenditur, in quo solum cerebrum fixum afficitur: In hoc morbo sedio cephalicæ & basilicæ inutilis fuit, atque etiam poplitis; Forre vena Frontis secta utilis fuisset, quod animale faculterem exoneraret. *Dorvynius Apologia lib. 3. c. 2.*

OBSERVATIO IV.

§. Melancholia ab humore atro in dextro cordis sinu contento.

In mulieris melancholia hypochondriaca laborantis sinistro cordis sinu, reperta pars humoris melancholici ibi velut concreta ac fermentata, &c. *Vide lib. 2. de palpatione cordis ex Ballonio.*

SCHOLIA.

Sinistro cordis sinu] Melancholia vulgo definitur D. splentia sine febre aut horore, cum metu & tristitia conjuncta: Unde sequitur illam & cerebri & Cordis affectionem complicatam esse: Nam quod melancholici delirant, à cerebri & spirituum animalium in eo degentium vitio ac inordinatione procedit quod autem valde tristes & meticulosi evadant, hoc Cordis passioni merito attribuitur. Melancholia ergo non tantum cerebri & spirituum in eo degentium, sed insuper præcordiarum & sanguinis ibidem accensæ, & exinde in totum corpus projecti affectus est, & quemadmodum illuc delirium, ita hic timorem & metum producit, quo tamen tiru videamus: In metus imprimis animæ pars flamma, seu Fatalis, quoad amblium suum constituta, & intra brevis spatium coarctatur: Dein consequenter pars Animalis, sive lucida, sphaeram suam contrahit ac minus vigoretur: In Timore autem utraque subito reprimatur, & quasi unare, atque intra minima spatia se continere cogitur: In utraque passione sanguis non vegete & cum pleno incendio circularur & conflatur, verum circa præcordia aggeri & restagnare aptus, ibi gravamen aut deliquium citius ac iurim caput ac membra uberiori ejus affluxu destituta elanguescant. Quod autem istæ passionis in Melancholicis habituales sunt, Causa est partim in sanguine, & partim in Cordis actione animali; Enimvero sanguis ob par-

ticulas salinas exalatas minus inflammabilis existit, unde nec in pulmonibus facit accenditur, neque intra cordis & vasorum ductus flamma satis clara ac uberior ardescit, sed qualis ad ventri cujusvis flammam recipiunt & pene exustis apta sit. Hinc cum flamma vitalis tam tenuis & languida sit, ut ad motum omnem nunc ac trepidet, nihil minus est à Irritabilius velut animo subsidente & semiburno, tristis semper & meticulosus existit: Propter salinam huiusmodi sanguinis dysscrasiam Melancholicis rariis trebilitant: ea tamen correpti, propter irregulare sanguinis incendium, periculosum decumbunt.

Nec minus virum Cordis accidit Melancholicos ob sanguinis cursum retardatum, aut subinde revocatum, metus & meticulosus fieri: nam siquidem ille molulus spirituum nonnulli imbecillum & enormium induram acciunt, contractiones sua hand valide satis & constanter, quibus sanguis sine remora aut resissione in totum corpus propellatur, obire potest: Ita sanguis & spiritus animales libere reciproca le morao afficiunt & alterutris invicem noxam inferunt. Sanguis irascibilis, hoc est & particularis salinis, una cum sulphureis & veticis constans, spiritus animales indole acerosi præditi progignit, atque spiritus hi functionis vitalis manibus perperam obeuntes, eadem sanguinis dysscrasiam augere faciunt, *Vide Tract. de Anima Bruner. part. 2. cap. 21.*

OBSERVATIO V.

§. 1. In Melancholicis quibusdam cor aridum & exsiccatum reperitur.

Posse universam cordis substantiam aliquandiu pati, præter Marulli Mimographi historiam 7. de Adm. Anat. indubitatam nobis fidem facit *Melancthonis* autoritas, qui lib. 1. de animæ testatur *Cesimiro Marchioni Brandenburgio*, ob mærores & vigilias, humore quæ involuto cordis continetur, exhausto & exsiccatæ, cor exsiccum pyri tosti faciem retulisse: ubi proculdubio perpeSSI fuere tres illi humores (secundarii vulgo dicti) satis conspicuam cladem, si quidem eas in angustias redactum est cor non parvo temporis momento, quod ex assignata causa colligi potest, non adeo vehemente puta tristitia, qua sapiens in sacris voluminibus etiam ossa asseruit atescere: unde non modo levem, sed etiam insignem cur posse sustinere intemperiem opinamur, *serdanus de pestis phaenomenis lib. 1. cap. 16.*

§. 2. In Nobili matrona Vidua, memorabili, sed merito sine nomine dimittendo, exemplo, post melancholiam *demosthenis* laqueo sibi fauces præcludente, sicque strangulata, & cor exsuccum, & nullum in ventriculis sanguinem obervavimus. *Rosinccius Dissertatione de corde cap. 2.*

SCHOLIA.

In signem cur sustinere posse, &c.] Valgo tamen dicitur quod humor melancholicus, præterit cum naturam malignam acquisivit, cordi & nervo calori est tanquam capitalis hostis: Si hoc verum est, quomodo tandem durat & vivunt? quomodo morbos tam longos sustinent? quomodo tantas vacuationes & tam validas ferunt? Illud enim absque videtur calorem naturalem, imo naturam ipsam virulentia ipsius humoris melancholici aut atrebiliarii affici, & tamen tandem persistere: cum videamus solo saepe vapore aliunde elato vix filam absumpti, aut cardiacis contingere syncopas. Hoc non caret difficultate. A pure aut abscessu, aut à grumo solo sanguinis vapor clarus mortem intemat, cur non ab hu-

more melancholico Vapor clarus idem faciat? Fæta analogia est inter vaporem huius venetæ fætiem, & vaporem à succo melancholico aut atrebiliario exhalatum. Prior ille vim habet, non ad dissipandum, non ad necandum, sed ad alios quosdam effluens, idque per quendam *transpirationem*. Et tale venenum ad cutem & mûculos natura depellit, unde juncturæ arum dolores implacabiles. At vapor pestilens, aut à pure aut à grumo sanguinis excitatus dissipat spiritus, & propterea alio quodam propinacitate nocet & moritur fæti. Idem de meningis & scilicet compositis, quod hysterica pathemata non motum afficit. *Bartholinus Epidem. & Ephem. lib. 2. pag. 219.*

OBSERVATIO VI.

§. Melancholia ab atro sanguine in cordis cavitate, serositate in pericardio, & abscessu prope sinistram auriculam.

Puer trîum annorum, tempore quo cruciabatur, admodum mæstus & gemitibus vixit, repente verò obiit. Aperto cadaver, præter atrum sanguinem in cordis cavitate, & serositatem in capsula cordis, repertus est abscessus instar ovi prope sinistram cordis auriculam. *Observatio Ludovici Nonni Medici Antverpiensis.*

OBSERVATIO VII.

§. Melancholia ab atro sanguine adusto in cor de exsiccatæ & menterio.

Sanguis in quodam subiecto tam erat à melancholico humore exsiccatæ, ut omnes vena cordis & ipsum cor à perito Chirurgo dissecati nequivcrint. Turgida tamen mæstara cernebantur sanguine atro & luculento. *Bartholinus Cent. 3. hist. xciv.*

§. Dominus de Harfy Jurisconsultus, (Cujus historia extat lib. 3. Tit. de Ventris Tumoris,) affectione hypochondriaca à liene multis annis divexatus, post obitum dissectus in toto venoso & arterioso genere, in cordis sinibus, licnis parenchymate nihil præter atram bilem exhibuit; Melancholia pathemata singulari animi robore premebat ut inter sodales & ludicra festivissimus & in jocos pronus videretur; sibi relictus & inter familiares occultum aliis pathema manifestum faciebat.

OBSERVATIO VIII.

§. In Melancholici cadavere cor arefactum repertum est.

Quidam cum Melancholia tentationibusque variis vexaretur, proprio gladio se confodit: vulnus intra duos menses sanatum est, sed iterum de *abjuncta cogitationibus* conqueles vomitu vexatus expiravit, &c. Cor arefactum erat, copiosa aqua citrina in capsula, &c. *Vide lib. 3. Tit. de vomitu.*

S C H O L I A.

DE *abjuncta cogitationibus conqueles* Extant varia & multiformia imaginationis depravata genera, de quibus in communi observare licebit, quod affecti vel circa omnes, aut saltem plurimas res delirant, ut fere de nullo subjecto iudicium esse ferant; vel illi solummodo in uno aut altero particulari casu perpetram imaginantur, verum de plerisque aliis notionibus suis protius incongruas intinuant. Etiam melancholica universalis affectio deliria symptomata multiplicia continet, tamen illa in his nobis potissimum conspiciunt. 1°. Quod affecti in cogitando fere continuo occupantur, ut eorum phantasia vix unquam otiosa & quiesca fuerit. 2°. Inter cogitandum res passiones quam antea solebant, animo comprehendunt, ut sepe dies & noctes idem obiectum animo volutant: de rebus aliis, quæ inter eundem longe majoris momenti sunt, nihil solliciti. 3. Obiectorum sive conceptuum ideas sepe deformes & velut sub lava apparent, semper autem in maiore specie representantur, ita ut res quælibet exigua his magna & difficilissima videatur. Ad hunc modum phantasmata in cerebro male configurata, in intellectui obijciuntur simili fere rita ac species visibiles vitri cuiusdam opaci interventu fulsunt oculo, ubi nimirum obiectum quodvis monstrum horrendum ac ingens apparet, & propterea rei visibilibus in immensum aucte portio tantum exigua aspectu accipitur: dein propter horrendam ejus & insuetam *formam*, imago semel concepta non facile nec cito dissimulatur. Expendimus modo quali cerebri & spirituum affectioni hac phænomena contingunt.

Hic autem 1°. Inquirendum occurrit de *spirituum animalium distorsi*, seu constitutione præternaturali nam in quantum illi irregulari modo se habentes, in anomalis suis aliisq. ut semper percurrunt, cumque huic illorum affectioni non paralytis, apoplexia, vertigo, aut convulsio adiunguntur, quæ cerebri obstructions arguunt, inferre licebit quod spiritus animales, neque ab alieno impetu faciente in tales inordinaciones adiungunt, neque potissimum ob cerebri poros & meatus obstructos *affectiones* suas concipiunt, sed potius in hoc casu propriæ indolis vitio prædicta symptomata agere accutur.

Talis spirituum animalium indispositio ad hunc modum vulgo describitur fuisse, nempe quod illi cum transparentes, subtiles & lucidi esse debuerint in melancholicis obscuri, opaci, senebrosi evadant, ac quoque eorum imagines velut umbra, aut tenebris obduæ representantur. Cuiusmodi explicatio non incongrua videtur, si quidem ostendimus spiritus animales à sanguine accensio emanantes, se quodam modo tantquam lucis radios à flamma profectos habere: Atqui lucis contritæ lucem diversi modo se habere, juxta quod ab incendio corporum vario rivo effluantium, scilicet spiritus vini, olei, sevi, sulphuris mineralis, nicti, alio-

rumque procedit: patet & spiritus animales, in quantum à sanguine crasso modo hanc, modo illam aliamve nacti, aut subtiles & clari, aut hebetes, crassi & velut fuliginosi exsillantur, functionum animalium organa varie trahunt & irradiant, eorumque proinde actus diversimode perveniunt: Verum insuper, cum spiritus animales non uti lucis corpulenta prius, liberi & soluti exsunt, sed mutuo cohaerere, & ne animæ continuas abintempus, quodam laice contineri debent, idcirco ipsi una cum vehiculo cui inhaerent, liquoribus quibusdam Chymicis, è mixtis naturalibus per destillationem elicitis, satis apte comparantur: Quæ quidem analogia in explicandis *abjunctis affectibus* commodissima videtur, prout ex sequentibus patet.

Primo Liqueores Spagyricæ destillari, juxta quod elementa activa variis modis in his combinantur, diversi generis existunt: Horum præstantissimus, omnium consensu, perhibetur esse in quo spiritus salis unius cum volatiliat, invicemque ab eo acciunt & aliquatenus iturminantur: Huiusmodi indolis concipiuntur *Magnus Elan*, & *Liquor Alkæthæ*, &c. revera quodammodo sunt, *spiritus sanguinis*, C. *utriusque*, salis & sulphuris una combinati consistit, facile inflammantur, & sua sponte et aliis secedunt, & huc illuc qua data via se propiunt, cuiusmodi indolis spiritus animales in Phrenetide quadatenus participare ostendimus.

2°. Alii Liqueores Chymici sunt nimis *sulphurei*, & ardentes, uti spiritus vini & cerebriolæ, quæ cum spiritum & sulphure una combinati consistit, facile inflammantur, & sua sponte et aliis secedunt, & huc illuc qua data via se propiunt, cuiusmodi indolis spiritus animales in Phrenetide quadatenus participare ostendimus.

3°. Liqueores, sive spiritus quidam, ab opere chymico producantur, in quibus Sal fixum ad florem evectus domitio potius, cuiusmodi sunt qui ex acetico, lignis ponderosis & quibusdam mineralibus igne minori exsillantur, quorum particulæ sunt valde mobiles & inquietæ, sed minoris activitatis, ita ut effluvia ab eis longe emanent, ut, si in balneo destillantur, nihil præter phlegma insipidum in alembicum evehat: Et quidem spiritus animales huiusmodi indolem acetosam, cum salis fluidi dominio in affectibus melancholicis habere suspicamus, prout mox ostendetur.

4°. Singula quædam Spagyricæ prolicia quandoque sunt acerrima, in quibus nempe salis fluidi, una & sulphuris arsenicalis particulæ indomitæ simul combinatæ exaltantur, ut sunt *aqua Stygiæ* ex nitro, vitriolo,

virtuolo, antimonio; arsenico, viciis aere & simili-
bus exsiliare, quæ omnes nature sunt effera, valde
penetrativæ & irrefragabiles, ita ut effluvia earum mo-
tu perpetuo agitentur, quidvis penetrant, etiam lon-
ge lateque distendantur: Atque huiusmodi liquores
spirituum animalium diathesis in *Materia* aequilam
satis apte referunt.

Inque sententiam vero ut Melancholicis rationem *for-
malem* & *causalem* tradimus, opinari fas sit liquorem è
sanguine cerebro intillatum (qui *ἡ ψυχή* ejusque
appendicis nervoli poros & meatus omnes implens
ac irrigans, spirituum animalium & vehiculum &
vinculum est) à natura, miti, benigna & iucunda, in ace-
tosum & corrosivum (cuiusmodi sunt liquores ex
aceto, buxo & virtiolo prolatici) degenerare, atque
spiritus animales qui à cerebri medullis, cum in glo-
bosam ejus substantiam, tum in systema nervorum
irradiantes, sensum & motum tum interiorum tum
exteriorum functiones omnes producunt, paciter ha-
bere ac effluvia è liquoribus illis chymicis acetiolis
decedentia: De quibus observare est hæc tria, vide-
licet 1. Illa esse in perpetuo motu, 2. haud longe
emanare 3. non tantum viis apertis fieri, sed porosi-
tates novas in corporibus vicinis producere, usque
se infinire: Ex huiusmodi conditionum circa spiri-
tus animales analogia evenit, quod *Melancholici* tum
semper *agitantur*; quod res pauciores omnino com-
prehendunt; quod de iis notionem suam perpetuo in-
stituant: Singula hæc paulo explicatius perpendemus:

Itaque primo advertimus effluvia è liquoribus
acerolis stillatilis decedentia esse perpetua in motu.
Nam spiritus virtioli, aceti radicari, aut salis marini
continue evaporant, Cujus ratio est, quoniam istæ
salis fluidi particule ferè cum nullis aliis coherant,
quin ubiqueque sistuntur, mox subiecta sua develi-
quere aptæ, confortia nova ambire videntur: Hinc
quidam *mobile perpetuum* nulla ratione melius affin-
gendum censent, quam si acidis mineralium spiritus
phlogi hermetice obignata includantur, ita namque
vapores, sive effluvia circulatione continua vici
lætera percipiantur: Pariter opinari licet, à sangui-
ne interdum sale fixo, vel particulis virtiolicis, aut
aliis heterogeneis referto, *liquorem nervorum* acetosum,
pro spirituum animalium materia & vehiculo in ce-
rebro intillari, proindeque illos intra *ἡ ψυχή*
medulla illa admixtos, propter functionem animalium
actus, poros & meatus omnes non ocyus trajicere &
irradiare, sed tanquam *ἀρρηκτα* aciduliculas, lente sed
incessanter hac illuc petere, & velut formationis
motu quodam interire, per totam viciniam se pau-
latim diffundere: Hinc cogitationum æstus perpe-
tuus cietur, quibus sine intermissione cerebrum oc-
cupari soles, adeo ut melancholici phantasiam dies &
noctes continue perturbant habent; in quantum
scilicet eorum spiritus animales ex materia indefinenter
mobili constant: hinc item oculis introitis aut fixis
oblique aut torum ineuntur, aliasque facultates &
sensitivas & locomotivas inadverte enter exercent; in
quantum spiritus motus assiduisione utrius & dilata-
tione nervorum non bene actant aut irradiant:

2. *Ἔστιν αἰσθητὴ, ἢ αἰσθητὴ* Chymica parent, licet efflu-
via continue decedant, tamen ista non longe pergunt,
quin prope liquoris superficiem densissime agglome-

rata, corporibus tantum vicinis impinguntur, procul
confusa minime attingentia: Hinc spiritus viri solida-
lis, aceti, è cucurbita in alembicum altiore, nisi
calore valde intento uigetur, haudquaquam ascen-
dunt, at phlogi humidi in clausis epistomium perfor-
rant & corrodunt: Pariter habet circa *arrabitanorum*
phantasma, nam in quantum spiritus animales in na-
turam acidam degeneres, haud totam cerebri compa-
gem, utiptius irradiant & cito permeant, aut in medi-
ullis ita uigentes impetu suo in poros & meatus
tantum propinquiores feruntur, adeo cogitationes in-
de concitæ, utut perennes, tamen res pauciores com-
prehendunt: cumque ita plures spirituum copiarum sub-
stantias angustioribus coarctetur, obiectum quodlibet
exiguum & minoris momenti, iis pergrande & curæ
intignis videtur: pariter certe ratione & modo ac com-
petitum microscopium species visibiles traiecit
oculo infertur; nam quatenus ejusdem rei plures
radii concentrantur, ejus magnitudo in immensum
augeri videtur, ita cum species quilibet intentionalis
spirituum una plura consiluxerint in cerebro confirmantur,
ista solio major & gravior animæ apparet, Hujus
veritatem unusquisque nonnunquam in seipso experi-
tur, cum enim à viciis crassioribus & melancholicis
aut propter tristitiam passivam cogitandi evadimus
(cujus affectus causa est quod spiritus animales eman-
ationi liberi impares exsiliunt) tunc de minores
quibuscumque, tantum exinde illis nostris, aut fortassis
æternum periclitaretur, valde tollit & tam diu sumus
Hinc etiam, quia spiritus animales, licet fere tempore
in motu, usque tamen intra eorundem breves cancellos
limitantur, Melancholici sæpe rem eandem cogitan-
do, & in animo revolendo, dissilisse perisunt:

3. Verum restat adhuc alia spirituum animalium,
cum istis è virtute, aliisque salinis exsiliis, simile
do, nimirum quod sicut effluvia è spiritibus ejusmodi
acerolis dimissa, haud tam spaciis apertis & tractibus
prius excussis evaporant, quam poros & meatus sibi
novos in corpore obiecto producant, adeo ut libe-
rem vas continere forasani impositum facile per-
fuerint & friabilem reddant: quod minime accidit
spiritui vini ad eundem modum phlogi in clauso: Ita
quidem in melancholicis ista venire solet, nam in
quantum spiritus animales particulis salinis velut ac-
clatis, dum è cerebri medullis itantur, haud prius
tractus & expansionis suæ obiectis observant, verum
spiritui sibi nova & insolita intra globosam ce-
rebrum substantiam densissime excavant: hinc cogita-
tiones haud quales olim habuerant, at novæ, incon-
gruæ & pleuræque abusu de animo obijciuntur: Enim-
vero quod Phantasia circa rerum conceptus prævari-
catur, & propterea quod iudicii & rationis actus per-
peram efformantur, unde in causa est quod spiritus
animales sejects prioribus ambulacris, suisque tum
acreditum in cerebro viis, huc illuc in obliquum &
transversum laci, itinera omnia devia & inassueta affe-
dant, quod equidem illis agere ex diathesi acetosa
qua laborant proprium est: in quantum scilicet inhi-
tatione liquorum effluvia via haud directa & libera ema-
natione, velut lucis radii se expandunt, verum motu
flexuoso, & velut formicante, qua quævis in vicini-
am percipiant. *Id. ἡ ψυχή* de *Anima* *Enim.*
cap. de Melancholia.

OBSERVATIO IX.

§. Anatome Melancholici in cujus corde reperta vesicula atrum sanguinem continens.

N Dum viveret taciturnus erat, frequentia hominum colloquia non affectabat, melancholicus: &c. obiit ex inflammatione hepatis: cordis adhærebat dextro ventriculo vesicula juxta magnitudinis continens in se sanguinem atrum. &c. *Vide lib. 3. Tit. de Hypochondriacis doloribus.*

OBSERVATIO X.

Anatome Melancholici, in cujus cordis utroque sinu reperta pituita vitrea.

Iuvenis diu melancholici omnia se recte habuere præter cordis ventriculum utrumque, qui non sanguine, sed pituita potius vitrea repletus erat. *Vide lib. 2. Tit. de morte repcat.*

OBSERVATIO XI.

Melancholia ab atro sanguine in cordis cavitate.

Puer trium annorum (*Vide lib. 2. Tit. de Morte subita*) admodum mortuus & gemebundus vixit: Repertus atque sanguis in cordis cavitate, & serositas in capsula &c.

OBSERVATIO XII.

Melancholia ab humore atro in sinistro cordis sinu.

In sinistro cordis sinu mulieris melancholia hypoch. laborantis, reperta est pars humoris melancholici velut concreta. *Vide lib. 2. Tit. de Palpit. cordis.*

OBSERVATIO XIII.

In melancholici sinistro ventriculo cordis reperta caro nigricans & glandulosa.

In Nob. viri cordis sinistro ventriculo glandulose, sed nigricantis carnis libras duas reperimus, corde instar uteri ad ejus carnis molem extenso, & homine ante mortem habitu utuncunque melancholico. *Vide lib. 2. Tit. de Pulsu non naturali.*

OBSERVATIO XIV.

Melancholia à fatido humore in sinistro cordis ventriculo conclusa.

Civis M. per tricennium melancholia laboraverat hypochondriaca: In defuncti cordis sinistro sinu repertus tenuis, præteruber & fortidissimus humor. &c. *Vide lib. 2. Tit. de Syncope.*

OBSERVATIO XV.

Melancholica mulieris pericardium undique cordi adnatum erat.

Vxor N. per tres ultimos vitæ annos mortua valde & melancholica erat: Viscera inferioris ventris integra etant, Cordi veto toti pericardium ubique arte accreverat &c. *Vide Tit. de de Syncope.*

OBSERVATIO XVI.

Hypochondriaca affectio à ventriculi vitio, Epiplois humore melancholico insarcti.

In apertis cadaveribus eorum quos sua fors peremerat, alias inventa Pylori inflammatio, obstructionis & angustie causa: In aliis glandularum mesenterii durities, & quasi callus mesenterii, aut quidam sphacellus &c. *Vide Tit. de Famiru. lib. 3.*

OBSERVATIO XVII.

Hypochondriaca affectio à ventriculi vitio, Epiploï humore melancholico infarcti.

DOm. N. temperamento melancholico & adusto, vomitu contumaci affligebatur, crebris ructibus &c. Epiploon erat crassum, rubrum, scirrhosum, in quo humores melancholici acervati ad ventriculum refluxebant: hic lividus in fundo tenuis parte superna. *Vide Tit. de Vomitu lib. 3.*

OBSERVATIO XVIII.

Hypochondriacæ affectionis sedes in pyloro reperta.

NOb. N. hypochondriacus revomebat semper cibum & simul aliquid nigrum. Pylorus scirrhosus erat: Diocles subjectum statuit Pylorum potius quam venas mesaraicas. *Vide lib. 3. tit. de Vomitu.*

OBSERVATIO XIX.

Hypochondriaca affectio à Liene male constituto orta, Vasis mesaraicis atro sanguine turgentibus.

VIr 49. annotum, constitutionis melancholicæ, hypochondriaca affectione per aliquot annos mire divexabatur; maxime tamen de dolore hypochondrii sinistri conquestus est: Defuncti Lien quidem sat magnus, colore lividus & flaccidus: Mesaraicæ tam venæ quam arteriæ, tum & vasa gastroeiploica atro sanguine turgescencia & quasi varicosa conspiciebantur; Pulmones sanguine nigro turgescens fermentescens, Talis etiam sanguis in Liene & confinio venæ portæ, ac dextro cordis ventriculo conspicebatur. *Vide Tit. de Hæmoptysi. lib. 2.*

OBSERVATIO XX.

In Hypochondriaci cadavere omenti vitium deprehensum.

IN cadavere M. Beale hypochondriaci & scorburici, omentum nigricans, laceratum, friabile & fere putridum ac pinguedine destitutum inveniebam: Plurimis quoque in locis infra umbilicum peritoneo adhærebat, venisque nigris & turgentibus, certis obstructionis indicitiis scatebat. *Warthon Adenographia cap. 12.*

OBSERVATIO XXI.

Lien frequenter vitii accusatus, sæpe inculpatus in melancholicis deprehenditur.

§. 1. Lien olim affectuum melancholicorum reus actus est potius quam peractus: Neque sententia illa nuperis experimentis est consentanea, Plurimi enim istiusmodi affectibus obnoxii, & post obitum exenterati, Lienem ab omni tali culpa absolverunt. *Glisson Anatom. Hepatis cap. 45.*

§. 2. Franc. Sylvius non admittit peccare in melancholicis Lienem, qui in quinquaginta & ultra cadaveribus vix unquam se Lienis vitia deprehendere potuisse testatur. *Olaus Barriichius apud Th. Bartholinum cent. 3. Epist. 97.*

§. 3. In affectibus melancholicis obnoxiiis, & post obitum exenteratis, Lienem ab omni tali culpa absolverunt Medici. *Nath. Highmorus de aff. Hypochondr. cap. 4.*

S C H O L I A.

QUatenus inter partes in affectione hypochondriaca officii suspectas, maxime querere contra Lienem suscitatur: erit operæ pretium inquirere quali officio hoc Viscus defungatur: dein quoties ab eo desiciat, utrum huic morbo contribuat? Mihi probabile videretur à sanguine per arterias advecto, portionem quandam feculentiorē, scilicet materia terrestris & sale fere constantem in hoc viscere depo-

ni, quæ illic velut digestionē exalata, & in fermenti naturam erecta, denno sanguini per venas refluxo committatur, quæ ipsam quædam quædam insipit, atque circa *induratum* ejus idem præster quod fermentum nostrum vulgare melle fauinae commissum; nam sicuti panis incocti portio quædam, ad sufficientem servata, istam indolem assequitur ut panes alios fermentet, eorumque particulas alias segnes in motum

motum vindicat; ita videtur quod sanguis in liene reconditur, ibidemque velut stagnatione acieffens fermentum naturam induat, quo quidem reliquis cuoris massis, aliisque forsan humoribus tanquam spiritualitatis, in motum vividorem adjuvantur. Hic amplius annotare libet, quod in corporibus animalium ex elementarum quantitate constat, uti spiritus ceteris prepolere debent, ita quidem isti viscosi sulphuris & aque humiditate irremiti praejudicantur adeo, ut saepe vires suas vegete satis exerceere nequeant, hinc particulae salinae, utpote plurimum fermentibiles, ad hoc requiruntur ut corpuscula spiritus aliorum complexu leni obtineat ac tepore casusficientur, ac in motus libertatem vindicentur: unde in nobis ista experimur cum à sanguine nimis halituoso spiritus hebetentur, à liquoribus acetosis, uti palmaris visis tenuibus & puracis insigne juvenem praestant; hujusmodi enim remedia spiritui ex acutiori ac torpore quocumque excutunt: Talem omnino *Epidemiam* virtutem à liene recte se habente erga sanguinem & liquorem nervosum juxta exerceat scilicet credimus: Cum enim hoc viscus in pluri valvorum genere insitatur, scilicet arteriis & venis, ac in super magnis valvorum plexibus, sibi amque nervorum textus a consuetissima, singulorum visus ad hunc modum divini exsistent: nempe per arterias sanguis Lienis infertur, hinc secutentis istas, è sale fixo & materia terrefacta constans, in meatus & porosiores ejus deponit, atque istae ibidem reconditur, velut digestionem quandam in sacculo valde fermentatorem evolvuntur, cujus licet portio sanguinis per venas redeoens continuo permiscetur, adeoque tota ejus massa hujusmodi particulis fermentativa à liene inspiratur, à quibus eadem velut aetheris quidam & acutem cum motus vigore conciliatur, ita ut propterea ipse sanguis vegetius in valis feratur, etiam exinde succus nervosus & sanguine procreatus magis acutus regimini animi suppeditatur, ac vero haud tantum hoc sicut me diare & cuoris intervenit, lienis vires fermentativa cerebrum & genus nervosum inspicitur, verumtamen operari licet quod hoc aliquatenus immediato nervorum in liene dispersionem, committitur fuit: nam si quidem in hac parte nervorum & plexuum nervorum, fibrarumque ab illis octatum ingens satellitium anatomia detexit, merito ambigitur quasi usui interserviat. Super hoc imperitis annotetur ventriculorum & lienis cum cerebro intima commercia habere, in tantum ut Helmoecius in visceribus istis animae sedem posuerit, hoc autem nulla quam per nervos predictos commodiori via fieri possibile est; Quapropter hic merito suspicamus non tantum spiritus animales à meta alterutra ad alteram intermentios esse, quin etiam & liquorem nervosum, qui spiritum istorum tum pabulo tum vehiculo est, modo à cerebro versus hanc viscerem descendere, modo à visceribus hinc per nervos suscepum versus spiritum perferre, cujusmodi succus lienis ad cerebrum delatus spiritus animales excitat, eisdem fomes erigit ac in motus per nices litur: unde à liene intervenit & sagacitatem proficili vulgo fertur, & Lienis pro ingeniosis habentur: Ceterum probabile est quod passionum spiritus impetuque, à spiritibus cerebri incolis incipit, nervorum commisso in liemem feruntur, adeoque spiritus inibi degeneres pabore afficiunt, & sanguinem illic confusum in perturbationem fluctus exagitant; hinc enim aliquatenus procedit in ista, tribui à aliisque animi affectibus, juxta quod Lienis fermentum, plus aut minus communem sanguinem inspiratur, hujus liquor diversimode ebullit. Porro ob hanc rationem accidit liemosis, à

passione quavis violenta sinistra hypochondri inflatones & commotiones magnas fieri: Circa Lienis istam his ita praestabit in promptu erit, juxta hanc nostram hypothesein, symptomata pleraque ad affectionem hypochondriacam pertinentia explicare & singulorum rationes assignare:

Si quando enim Lien in officio suo deficit, h. e. cum sanguinis recrementa atrabilaria non fecerit, nec in materiam fermentativam coquit, sicut in pueris, aliisque temperamenti sanguinei aut nimis phlegmatici crebro evenire modo observavimus, animi insolens fit hebetior, corpus oculo pinguescit, quin & sanguis debito segnior intra vala stagnare, aut saltem minus vegete cheolati aptus est: E contra vero cum lienis vis fermentativa nimis exaltatur, aut pervertitur, sanguis proinde debito acrior aut austerior factus, hoc illic rapide transcurrit atque motum à normalis concipit: quin & succus nervosus à recta crasi desiccatus, spiritus animales copula heterogenea & explosiva imbutus, eoque adeo velut stimulus afficiens in crebros spasmos incitat: ut itum prolixus immetito Liene, perpetam habent plurima morborum genera impetuntur: dum autem accenduntur rationes, quibus Lien male dispositus passionis hypochondriacae symptomata producit, aut saltem eorum ortui contribuit potissimum hae frequentes.

Scilicet 1. accendat interdum spongiosum Lienis substantiam à sanguinis faece poris ejus nimis impacta, ibidemque stagnante plurimum infarcti ac obstrui, ut deinceps massa sanguinea recrementa haud satis excipiat, quin eadem illic delecta, sed minime suscepta, ut antea cerebra ramos propinquos regurgitet, unde statim in ventriculi membranas, omentum, mesenterium, aliasque partes vicinas deficiunt, istemque affigi solent: hinc viscerum istorum tonus in tantum labellatur, ut circa ebyli costionem debites monia haud rite exequantur, & membranae circumquaque confusa particulis heterogeneis & irritivis plurimum imbuta, si quidem fera continuo vellicantur, à spasmis hic illic succitatis doloribus vagis, contracturis, distensionibus & flatuum proveniunt graviter obnoxie sum: propter hujusmodi sanguinis à liene obstructo regurgitationem, verissime est pulsationem istam, quae in hypochondriaci subter ventriculum sentitur, excitari.

2. Cum sanguinis faeculentie Liene obstructo excluduntur, partibus ei vicinis, uti dictum est, affixae, sinistra hypochondri affectionem valde ordinariam pariunt: at vero licet vicus illud succum atrabilarium è crasso per arterias aditum satis excipiat, saepe tamen eundem haud rite coquit, verum sale plurimum exaltato in humorem nimis acidum lux alterum, vel alius generis vitiosum pervenit; quo cum tota massa sanguinea, atque succi alibilibis in sinu ejus continui penus inficiuntur, fermenti hypochondriaci fluctus in toto corpore repullant, sanguis indebito effervescent in quibusdam impetuosius agitur, simulque in aliis stagnare aptus est: hinc Likos familiaris est statim à passu faciem rubescere, manuum volas incallescere, hypochondria aethra, cordis oppressiones atque pulsationes à insignes succedere: ceterum particulis istis fermentativis & sanguine in partes solidas ubique transiunt, dolores vagi hinc inde transcurrentes, & pulsationum sensus in plerisque corporis membris acciuntur: porro ab hoc cuoris inquinamento, si quidem massa ejus à temperie benigna & balsamica in istam & saraceam mutatur, corporis habitus macilentus cum vultu livido & obfusco inducitur.

3. E sanguinea Lienis culpa depravato, etiam sanguinis animalis labes saepenumero infertur, nam particulae heterogeneae & spasmodicae non raro in cerebrum, indeque in nervorum genus infunduntur, ita ut spiritus animales in utraque provincia degentes, varias anomalias concipiatur propter noxam quae ipsos impellit, hypochondriaci variis phantasmatis & cogitationum mole fluctuationibusque tentari soleant. Intusper illis crebrae vertigines, isotoniae, cephalalgiae & non raro affectus paralytici contingunt: deio quatenus materiae motibiles e capite in nervorum genus prolantur, affectiones spasmodicae in plerisque corporis partibus, potissimum vero circa praecordia, ac imi ventris viscera excitantur; cum enim spiritus intra nervos, qui partes illas respiciunt, sentientes, propter animi affectus valde perturbantur, particulae spasmodicae istos ductus per compia subeunt, illisque spiritibus diachelio convulsivum facilius imprimunt: Itaque partim ob labem, mediantem cerebro transmissam; partimque ob noxam à Lienē (ut ostensum est) immediate communicatam, cordis palpitatio, tremor & frequens deliquium, pedum convulsionem, respiratiois impedimenta, somni dolor, rugitus, multa alia in istis visceribus accidentia hypochondriacis contigunt.

4. Praeter huiusmodi inordinationes quae sanguinis trajectu à Lienē in humores & partes solidas, ipsiusque cerebrum & nervorum genus devitari solent, & alia praeterea mala quae ab hoc viscere, eisdem nervorum commearum, exoriri videntur: quippe cum eorum propagines extremae, ipsaeque fibrae nervosae visceribus intertextae, eximis suis oculis humorum quendam imbibere, ipsiusque nonnunquam sursum convehere ostendimus, summe probabilis est fibras

nervosae Lienis dispersas (quarum ingens strellitum est) licetam ejus acerrimam suscipere, qui ductus nervos alius perceptos, motum convulsivum causa existit: Revera quod inter cerebrum & Lienem tam intima commercia habentur, nimirum longe citius quam quae per sanguinis ambages fieri possunt, opinari liceat nervos partis vagi & intercortalis, proximam commercii viam esse qua haec partes invicem communicant, ac sese mutuo adficiunt: Videtur enim quod cum strabiles in Lienē, aut sponte ut gesticulati à causa quadam evidenti commoveantur, particulae ejus fibras nervosae, eidem diffusissime distributas, subeant, quae spiritus animales in illis scarantes perturbant: inque explosiones, aut saltem à se ipsa quaedam adigunt: dein spiritus ita perturbati proximos, illique alios adficiunt, donec continuata spirituum serie passiolata Lienem incepta usque ad cerebrum propagentur, tandemque phantasmata inordinata, qualia hypochondriacis accidunt, producant: Eisdem vice vicla, cum gravis animi affectus, intra cerebrum occurrerit excitatus, spiritus ejus incolas, molestat, impressio phantasiae oblata spirituum iura nervos partis vagi & intercortalis constitutorum serie, & affectione successiva, usque ad Lienem perducitur: hinc ferreamus ejus magis commotum, tum in viscere isto, tum in tota vicula, fibrarum & membranarum ipsarum cito, & insuper sanguinem in fluxus & refluxus, variaeque actiones cogit; quin & ipsarum perturbaciones in cerebrum iet: tunc: Ab huiusmodi reciproca cerebri & Lienis affectione accidit quod Hypochondriaci adeo sunt irrequieti, instabiles & propolito quovis fluctantes, quali juxta Poetam Durae animi in se unda ariscent. Th. W. du Pathol. an. 1761 cap. 11.

OBSERVATIO XXII.

§. Melancholia à Lienis absentia prognata.

Vxor N. cutis atro colore erat tincta, absque febre perpetuo morsa: Medici causam judicantur consummationem lienis & mesenterii obstructionem, &c. cadaver sine lieno inventum est &c. Vide lib. 3. Tit. de liliro.

OBSERVATIO XXIII.

§. Hypochondriaco malo laborans Lienem gerbat quatuor librarum ponderis & Durum.

Lienis corpus praeter modum augmentum sumere posse, naturale, vel omnino praeternaturale, Anatomicorum observationes satis docent: Placet communicare observatum rarius recurrens: Quatuor nempe librarum pondus vix potuisse aequivalere ponderi Lienis alicujus, ex viro diu Hypochondriaco malo vexato excisui: Durus insuper hic lien. G. Blasius in observat. Anatom. p. 127. Et observat. med. 22.

OBSERVATIO XXIV.

§. Hypochondriaca mel. à Lienē scirrhopa.

Generosus N. hypochondriaci affectus symptomatibus & nephriticis doloribus crebro infestabatur: In mortui cadavere ventriculus medlocriter habebat: Lien scirrhopus erat: Jecur floridum, In mesenterio nulla apparebat noxa. Vide histor. Tit. de Renum doloribus, lib. 3.

OBSERVATIO XXV.

§. *Melancholia Hypochondriaca à Liene male constituto, livido, flaccido, Vasis mesaraicis atro sanguine turgentibus.*

V Ir 40. annorum constitutionis melancholicæ, hypochondriacæ affectione per aliquot annos mihi divexabatur, maxime ramen de dolore hypochondrii finistri conquestus est &c. In illo Lien fat magnus repertus est, colore lividus & flaccidus: Mesaraica vasa, & gastropiploica, atro sanguine turgentia & quasi varicosa conspiciebantur. *Laur. Wolfstel in Miscellan. curiosis anni 1670.*

OBSERVATIO XXVI.

§. *Melancholia hypochondriaca à Liene scirrhuso, cui adnatum tuberculum, & Mesenterio atro succo repleto.*

N Obilis marrona (*de qua lib. 2. Tit. de Phthisi*) hypochondriacas molestias & lienis tensiones annuatim quasi: circa Solstitia maxime & Aequinoctia, passa est:

Incitò mortuæ cadavere, Lien erat scirrhusus, appendice ovum columbinum æquante instructus, Hepar vero magnum & floridum: ventriculus & intestina omni fere humore destituebantur, mesenterium autem atro succo repletum erat &c. *I. D. Horfium Observat. anatomic. 8.*

OBSERVATIO XXVII.

Melancholia hypochondriaca à vitio lienis, orta, in quo vene varicose &c.

Dom. N. symptomatibus melancholicis affectus fuit: Corpus Lienis aliquomodo erar globosum, coloris diversi, in cujus medio, digiti latitudine, atra linea, In convexo venæ varicosæ, crasso sanguine furtæ &c. *Vide lib. 3. Tit. de Ventr. tumor.*

OBSERVATIO XXVIII.

§. *Melancholia à parvitate Lienis induc'ta. &c.*

D Nicodemo Sitzlino obigit natura frigidior ac siccior & plane melancholica, prout ex totius corporis constitutione arida ac macilentâ, facie livida, barba nigra patet: exin ab ipsâ statim adolescentia melancholicæ hypochondriacæ fuit obnoxius: cerebrum obvenerat frigidius ac siccus, quia æger & catarrhus, in rebus peragendis tardior: cor & ipsum frigidior donatum intemperie, cujus divitiæ metus, mæstitia, pusillanimitas jugiter molestantia: Hepar olim in inventute videtur fuisse calidius, cum ille arabilarius: ac progrediente ætate evasit frigidus, prout ex scrofa massa sanguinea, colore Jecoris pallido & plumbeo, & vesica fellis grandiore aquoso repleta humore, innotuit. Enormes in diæta commiserat errores, Baccho indulgens, non ram desiderio vini quam ad demulcendos acriotes atræ bilis fumos: Accessit ægeria plusquam annua, ut media nocte ad lychnum legere solitus dum somnus obrepit: crebrior usus validiorum etiam pharmacorum: Spatio annuo bis in acidulas profectus: exin vix ultra annunt in vira superstes mansit: Aliquot ante obitum septimanis, nocturno imprimis tempore, infestus gravissimis destillationibus affarim è capite destillantibus, & in asperam arteriam subito irrudentibus, ut non nisi *vela cervice spirare* fas, & non raro ingens impenderet suffocationis discrimen. *Quin & ex infernis partibus per anadrumen resurgentes serosus humores pectus replevisse à ratione hand alienum:*

Aperto demortui thorace, inventum pus in eo, dixisses lutum viscosum cruore imbutum: Erat defunctus *μαλοδυναχτος*: notatu per quam dignum omnia interna membra, Hepar, Pulmones & Cor, in tam arido & exsucto corpore, admodum grandia & pallida, ac pene plumbei coloris visa, haud aliter colorata ac adhuc viventis facies tincta & plane livida: Cum hepar sit officina sanguinis, nihil mirum totam massam sanguineam consimili colore è mortuo infectam, & exin progeneratum humorem melancholicum: Recordor cum aliquando venæ sectioni adesset, & sanguinem emissum contemplantus, eum lividi ac plumbei coloris observasse, haud secus ac hepatis constitutio deprehensa:

Quia

Quin & reperta vesica grandior, instar nivis candida, in gibba hepatis parte, pellucida, aquoso conferta humore, quæ hydropis prænuntia: Si fata defuncto diuturniorem lucis usuram concessissent, proculdubio hydropis fuisset extinctus, ab emphyemate & orthopnea maturius sublaris. Melancholiæ hypochondriacæ tam contumaci, & ultra 20. annos duranti, occasionem haud leviem suppeditavit viscosa Lienis à natura conformatio in diminuta quantitate; qui *admodum pusillus*, vix dimidiæ palmæ manus, & lividi coloris in conspectum venit, uncie unius pondus haud excedens. Cot ingens ratione proportionis corporis se ostentavit; quin & ejus duo ventriculi repleti sanguine crasso & nigerrimo, instar attamenti, qui index humoris melancholici. *Augustinus Thenerus Epistola 2. lib. 6.*

§. 2. Huic observationi adstipulatur *A. Laurentius*, referens sibi cognitam Illustræ familiam, melancholiæ hypochondriacæ obnoxiam, ex qua nonnulli præmatura morte sublati, nec ulli causæ præpropter fatum imputari potuisse quam exiguitas splenis, functioni à natura destinatæ satisfacere nequeuntis.

S C H O L I A.

Cum Lien cum in finem destinatus à natura ut massam sanguineam depurgeret à fecce melancholica, aut parte chyli crassiore; si is justo minor non potest tantum attrahere quantum natura exigebat, idcirco è venis regurgitans ac tellagrans, per rocam mesenterium dimanans ac distulit. *Idem Thenerus Ibidem.*

Ex inferius partibus humores præter replevisse &c. Pectoris omnino maxime cum hæmorrhoidali arteria consensus est, quod truncus ex quo arteria oritur à corde descendens, in primo istius exorta intercostales ramos propagat: Vnde accidit ut qui Hypochondriacæ affectioni & Scorbuto sunt obnoxii, sæpe de acerbissimis pectoris doloribus, istis tamen non diuturnis, ut & pectoris constrictione conquerantur, materia sterculenta, serosa, tenui & acri per dictas vias in musculos thoracis effusa, membranasque ibi velli-

canæ & distendente. *Sennertus Pract. lib. 3. part. 3. c. 2.*

Nonnulla cernua spirant Lienis pernubationi Respiratio difficilis patitur in hypochondriacis & scorbucis succedit: quia nervi splentici cum peripneumonici communicant: quandoquidem igitur utriusque materia morbida, sc. qualimodica obducitur, eadem in alterutris commota, spasmos ciens, alteros in affectus consensum trahit; *Wils. Pathol. sereni cap. 12.*

Lien admodum pusillus Excrementi melancholici receptaculum esse qui negant, id confirmant exemplo eorum quibus tristitia causa fuit mortis, in quibus partium interiorum examen influenti Anatomico, nulla fere occurrat quæ minus à itatu naturali recesserit Liene, eundem tulo excepto, quod spiritus vitales insigniter adeo descendunt ut minus aliis partibus afficiantur. *P. Barbette Anatom. Pract. lib. 1. cap. 15.*

OBSERVATIO XXIX.

§. Melancholia à liene corrupto exorta.

SECUIT nuper D. Van Horne quendam Martinum del Slaper, qui quod febricula tentatus carnificis ministerium occuparet, h. e. seipsum è clavo fenestæ suspenderet, cessit in prædam novaculis publicis: Duo in illo rariora, Totum pectus, imo & abdomen hispidum, imo & dorsum, sed præcipue brachiorum superiora, nec tamen pili illi, præsertim in dorso, ad inferiora vergebant, ut solenne alias, sed nitebantur omnes versus superiora: In humeris, quæ brachia exeunt, tam hirsuta omnia, ut pene Utii alicujus armos videre me existimarem: In cruribus tamen vix pilorum vestigium.

Quod ad interiora solus Lien peccasse videbatur, ablata enim, qua tegitur membrana, totum lienis parenchyma instar crassæ & nigre amutzæ diffuebat, nihil in eo solidum, ut non crederetur dissimile vero ex corruptione melancholici visceris, miserum in deliria actum, jus vitæ suæ laqueo dixisse. *Bartholinus Epist. 97. cent. 3.*

S C H O L I A.

Solus Lien peccasse Lien male affectus totius corporis æconomiam turbare plurimasque partes in consensum trahere potest: Imo quod ait Hippocr. de utero, quod famulus sexcentarum ætunianum auctor sit, idem de Liene affirmamus, quod infinitum fere calamitatum faber existat: Cerebrum licet à Liene

sit satis remotum, gravissime tamen ejus culpa potest affici, & in varia symptomata præcipitata: Melancholiam à Liene non recte constituto non semel observavimus, quod plurimorum quoque auctoritate confirmatur. *Médecin Parvum, Physiq. cap. 17. §. 8. 9. & 10.*

OBSERVATIO XXX.

§. Melancholiæ hypochondriacæ sedes est in vasis celiacis & mesentericis.

IN celiacis & mesentericis arteriis & venis melancholiæ sedem arbitrarur esse *Spigelius*, Illas autem hoc in morbo esse affectas, continua & vehemens illarum pulsatio & inignis calor suadent: Solebat idem in ægris hoc morbo defunctis præputio ostendere ab illis

illis irrigatarum : unde & solis clysteribus humectantibus & moderate refrigerantibus hos affectus debellari posse putabat. *Roskink Dissert. Anat. lib. 6. cap. 25.*

S C H O L I A.

P *Amulus partium etc.*] Morbi ideam, & qui maxime tunc obnoxii ostendit egregie *Ballonius lib. 1. cap. 58.* Qui sunt corpore squalido, macro, sicco, pulso facis insimulo, aut qui præteriti sunt (de quibus *Galen. 3. loc. aff.*) ii melancholiz hypochondriacæ sunt obnoxii : Item qui cæcis, agri tudinibus perturbacionibusque animi concutiantur, qui generosis viris dederunt se, eos in melancholiam hypochondriacam præcipites ruere testatur facis est : Quò sit ut mirum non sit si desideretur inflammatio aliqua in partibus illis, quæ & retrotrahit in hypochondriis humores & ita obstruat : Inde hypochondriacorum ælius inæqualitas in calore & figure, vincente viâtoque calore, & materia superrante calore & ab eodem superata : Itaque uomen phlegmones non ita thick accipiendum ut illic tumor sit, sed pro phlogosi accipiendum : Non quin calor ille qui eo loci exuperat, & materiam consumaciorem reddat, exalto tenui quodam humore in terram vaporem degenerante, tandem coarctet aliquid quod proxime in flatus

facelet, panimque tumorem aliquem in partibus illis exciet : Accedit quod dominari illius caloris, quodammodo fibrillis, vasa quadamtenus conuincant & coocidant, hinc major coarctatio, hinc obstructio, hinc alimenti impedita distributio : Sic nimirum hypochondriaci dum vel minimum alimenti sumpturæ, videntur impleti satiatique, nequeant distibui alimentis ob viarum angustiam : Itaque statuentium visio lptenis, mesenterii & intestinorum, melancholiam hypochondriacam contingere : Intemperies enim est mesenterii, vel venarum melanciacarum, quæ ad intestina & ventriculum deducuntur : Et intemperies illa potius juncta est cum caliditate & siccitate aliqua ; item cum obstructione à calidioris sanguine, cujus pars tenuior huius modo, à calore exente excitata summittitur in cerebrum, crassior autem desces ignavaque resistit, & calorem obrutus, & gravitatem in partibus illis afferens : Ut de curatione verbo dicatur, Temperatio illius caloris aeris, obstructionis libertas omni ratione est procuranda,

O B S E R V A T I O XXXI.

Melancholia essentialis & hypochondriaca, à cerebri venis atro sanguinis plenis, Sanie & muco in ventriculo sinistro ; Iecore & liene lividis, & Corde nigro sanguine repleto.

F Amulus metcatoris 30. annorum, verno tempore melancholia, sicut videbatur, hypochondriaca & vera laborabat, ita ut præ insolita & supina tristitia nihil præter mortem ultimamque diem optaret, continuoque suspicaret : Imprimis autem caput, præter morem, sinistram in latus contorqueret : paulo ante nocturnis illis tetroribus, atque *Incubo præuentus.*

Multis tentatis remediis 3. Julii, postquam à matutino tempore usque in vespertinam acerbè agone conflictatus esset, tandem supervenientibus haud obscuris convulsionibus, expiravit circa septimam vespertinam. Die sequenti cadaveris visitatio *Anatomica instituta.* Cranio dissecto & separato, prodit cerebrum, post remotionem duræ meningis, qua *venulas, nigricans & lividum*, cui in superficie inerrabat materia panca saniosa, cerebro impressa. Dexter ventriculus naturalis, nisi quod materia sanguinolenta, instat filamentum oblonga & renui esset infarctus : In sinistro verò maxime ventriculo morbi tam contumacis mortisque causa extabat, copiosa scilicet sanies, cum muco ac materia putrescente sinibi contenta, cui adscribendum quod Spasmi ejusce lateris initio affligeretur ; capite nimirum ac collo in id latus inclinatum. Eodem latere cadaver maxime lividum & intense nigricans notabatur. Juxta etiam dextæ manus *digiti* impense livebant nigricabantque : 2. *Aperto infimo ventre, intestina* flatibus redundabant : *Ventriculi* fundum vacuum : *Lien* extra, media sui parte, livebat, intus nihil mali præ se ferens : *Hepar* pariter gibba parte ex dimidio lividum, summa vero & intus naturaliter sese habens. 3. *Aperto medio ventre, Cor* dissectum nigrum multumque effudit cruorem. *Pulmonum* autem lobi omnino erant lividi, laniosi & corrupti. E qua rari, pertinacis & lethalis mali historia evidens est, non melancholiam, prout initio suspicio nascebatur, tantum hypochondriacam, causam & originem præbuisset, sed forte gravius alicujus veneni violentiam primum pulmones ; juxtaque cor, vitæ communis fontem, & sic deinceps ipsum cerebellum corruptis se materis *muco sanios.*

1. *Petrus Lotichius Observ. Medic. l. 4. cap. 4. Obs. 4.*

S C H O L I A.

M *Melancholia essentialis & hypochondriaca*] Interdum melancholia à spiritibus animalibus perturbatur, & in confusionem quandam ætatis incipiens, & aliquandiu persistens, sanguini diarrheam arabilariam accersit, quandoque item sanguis dyscrasiam istam primo contrahens, spirituum indolem pervertit.

Melancholiam à regimine animali septennumero otidii unusquisque à plebe satis advertit, quatenus nimirum spiritus animales à passionibus animi violentis inordinationes concipiunt ; in quibus cum diu persistunt, totam Animam, imò & corpus à debita crassi & constitutione delictant : Ita simplicis amor

R perditus,

perditus, trititia vehemens, terrores panici, invidia, pudor, cura & studii inmodica hunc affectum crebro excitare solent: Propter enim huiusmodi *æternæ* spiritus animales extra solitas expansiones ordinis depulsi, & ob passionis assiduitatem in errore suo permanentes, & cæsum in tractus devios includent, quos postea observantes, in priores ac debitus agere revertuntur: Dein siquidem propterea cordis motus & vigorem minuantur, ideo languis à debita crasi & *artificiosæ* deficit, atque fixior & salio sulphureo exinde factus, spiritus animales nonnisi lo acorem degeneres suppediit, adeoque sanguis à posteriori depuratus, à diathesi melancholicâ, à spiritibus inceptæ fontem tribuit:

Nec minus crebro accidit melancholiae feminae primo in sanguine jacta, deum spūibz labem istam impetire: Propter hanc rationem nonnulli hereditario jure isti morbo obnoxii sunt: Ceterum vitios inordinatus, exercitū diu assueti intermissio, evacuationes solennes, uti sanguinis menstrualis, aut haemorrhoidalis, item seminis aut ichoris terrofi subito suppetit, pluresque aliae occasiones sanguinem facile inquinant ac irritabilium reddunt, cujus dein gravam diabete necesse erit sanguini communicari:

Quod autem plerique Medici Melancholiam ab humore arabiliori alicubi primario & per se genito exoriri statuant, & pro genio eius loca fingunt, nuncupat cerebrum, lienum, uterum & totum habierum corporis affligant, non facile hec omnia concedimus: preterquam enim quod nulla talis humoris mine: & nisi forsan in Liene, nuncupat condire appareat, inasper ipsi sanguis est qui intertemperat arabiliorum, aut quavis aliam per se primo conuicta, deinceps menta eadem in indolis in propriis emittit: Quos in receptaculis deponit Nec enim flava bilis in vesica fellata, aut atra, sic dicta, in Liene reconderetur, nisi prius malla sanguinea humores istos progigneret. Si quando hic, aut alii extremum in alicubi depositi, & erosi excipiuntur, huius effervescunt, sed non statim, aut facile in temperiem eius producant:

Primo quod itaque melancholiz origo interdum capiti adscribitur, atque cerebri intemperies ab his, uti nimis calida, ab illiusque frigida accutatur, potius statuendum arbitror affectionem illam quandoque à cerebro, Animamque ipsam incolore, primo incipere, quod etiam *Hypocras* 6. Epid. em. Sect. 8. v. 880. 8. plane asseruit, Namque Epilepticos & melancholicos simul aut successively factos, quoad morbum rationes formales distinguunt, ait ad *pluton* et *hypocritas* se tota, *pluton* et *hypocritas* esse, Et *hinc* et *hypocritas*, *hypocritas* et *hypocritas*. Ita In melancholia Animam distrahit, & quasi seorsum à corpore suo cerebro affici innuit:

Secundo, quod morbi huius origo nonnunquam ab atra deducitur, non putandum est humorem atrabilem ibi primo generari, sed melancholice occasione inde procedere; vel quoniam ab mensibus suppressis, totus sanguis inquinatus & degener factus, postea in dyscrasiam atrabilem prolabitur: vel quatenus propter veneris stimulos, non sine magna animæ corporeæ relaxatione cohibitos, spiritus animales diu coerciti & retinisti, denum fluxores & melancholici evadunt.

Tertio Melancholiam quandoque à Lien male affecto, aut primario excitari, aut plurimum foveri, proindeque peculiari vocabulo *Hypochondriacum* appellari, & communis est & nostra huc sententia; Ac-

tamen sanguis prior in culpa, feculentis arrabiliaris
ab initio in se gigasem, in Liene deponit, quas postea
in mali fermenti oaturam exaltatas denuo excipiem,
ab eorum inquinamento in crasi sua magis vitatur.

Quarro, quod infuper alla melancholica species ab Hypochondriacis & pistoribus diffinita, simul in *Tota* *Hyper* piogigni perhibetur, nihil aliud est quam totius languinis mutam propter etiam in sex non naturalibus, & ob plures alias occasiones, a recta iudice degenerem, dyscrasiam arrationiam, (hoc est ubi spiritus deprello particula sulphurea, una & salina cum aliquot aliis terentis evehuntur) acquirere; cum sanguinis diarrheia melancholica plurimum affinis sit illi sulphureo-salina, quam in iconibus quodam genere propallere offendimus: *Præf. l. c.*

in his praesentibus] Juxta veterum decreta, lib ob-
fuzum prohibetur spirituum animalium, praeteritis
nervorum poris, in principio spinalis medullae con-
tentorum, carbonibus ex fundamēto ac casari po-
tēst crudus chylus per lacteas ad cordelans. Hic fi-
crassus, semicolidus, viscidus, flansellans, superari ne-
quit ac probi sanguinis nanciam lodare : Hic e cor-
de per arterias carotides et vertebrales transmissus,
in capillis vasis subtilis, nec ultra pergit, hinc
spiritibus animalibus formetur volubilius, ut inde-
centi copia ad partes sentit et morali delinatur
descendant : Atque inde sunt repetenda contortionalis
capitis in frithum laeas casia, a subsistente scilicet
ejusmodi chylo sanguini commito, in rarnis capilla-
ribus, aqne in cervicali arteria stagnante, unde di-
stentio fibrarum canolorum.

Cerebrum quæ venas nigricans & livida] A crasso & facultate sanguine per arterias in cerebrum delecto, qui nonnisi in venosis ductibus transfusus, sed cito *invenosus* fit ignis, spirituum animalium portatorem inficit ac perheumat melancholica induit. Sed annon materia limilis à circulatione in habitum simul abripitur? Ita fane est, Nec sola cava vasorum impuare scatur, sed & ipsa extra ea: præsertim partium infimi ventris, quæ generationi aut defecationi sanguinis inservit.

Apertis infans ventris 3 Prima mali sanguine: Hinc recte monet Ruffinus Pract. lib. 1. cap. 14. Incutitione melancholice, nudeque omibus tætere originem, hæc duo perpendenda esse, 1. ut totum corpus ab humore melancholico, omniaque aliorum humorum illius liberetur: cum tamen contra: ut, unica pars hoc humore obideam: 2. ut ad hypochondriacum curio precipue semper dirigatur, cum in bepore & liene prima humoris maligni, hollici generatio, & in illis partibus, totaque hypochondriaci regionis illius collectio fieri conuevit.

Linn. &c. Hepat. &c.] Gabriel (*nomen in apologia pro Vesalijs*, p. 102.) in melancholicis morbis & mania reperiit aut membranam quandam à jecore ad lienem tendentem, venticulo subjunctam, omnique illo intervallo melenensis vice fungentem, in qua pravi succi coacervantur, qui post longas varietates, modo condensas, modo intermittentes febres, interdum per vomitum, interdum per sedem excreantur: Sed negat *Worm* Cisternibello observ. se unquam invenire posse illam ejusmodi membranam, quamquam multa fecerit corpora: *Rademus* Annot. lib. 6. cap. ult.

Eam membranam nihil aliud esse quam
omentum duplicatum
cristet.

OBSERVATIO XXXII.

Melancholia à Iecore nigricante, œdematosa, fistulis affecto etc.

Nobilis quidam rerum suarum iacturam passus, gravi morore & animi dolore pressus, in Melancholiam incidit, assidue tristis, cogitabundus, ingemiscens: parsimonia iacturam reparare studebat: metuebat lemures & spiritus quosdam: Cum autem malum intenderetur, nec spes aliqua speressee videretur ut ad mentis sanitatem redire posset, commissus est monachis quibusdam, apud quos sui similis multis annis vixit. Postquam autem hoc modo annis plus minus 20. vixisset, tandem de virium debilitate conqueri coepit, & cibum ac potum averfari, quæ tamen citra appetentiam admisit: Nulla aderat febris: litis nulla, universum corpus frigere videbatur, pedes processu temporis œdematosi facti sunt: Urinæ autem rubicundæ erant, veluti si febris ardens aut jecoris inflammatio præcessisset, quæ quales reddebantur permanebant, nec ab aëre aut frigore perturbabantur: Malo autem ingravescente ad alium cibum sumendum, præter exiguum forbitionem adduci haud potuit: Ita tandem deficiente naturali facultate, inedia quodammodo confectus è vita migravit.

Hujus Hepar colore undiquaque nigrius quam secundum naturam apparuit, sed tamen minus nigricans quam pulmonis sphacelo correpti substantia: inpresorum digitorum vestigia facile retinebat, nec minus facile soluta parenchymatis unitate rûnas contrahebat. *Dodonæus cap. 3. Observ.*

S C H O L I A.

Manifestum hinc hepar sphacelo correptum, & urinæ ruborem haud à calore Jecoris, sed ex debili: & pene abolita facultate naturalis natum fuisse: utriusque autem eadem de causa talem permansisse qualis fuit reddita, quod crudissimis proprium est. *Dodonæus cap. 30. Observat. De causis hujusmodi morborum vide lib. 3. tit. de urinis non naturalibus.*

Gravi morore & animi dolore pressus Potentissimam vim passionum animi esse asserimus: Causa hæc agere necne dicatur, tamen ubi quis ex ægitudine tanquam causa procacitica in morbum incidit, gravissime omnium laborat: Ipsa enim ægitudine imprimis nescio quid animo, deinde corpori, animi instrumentis, unde functionum omnium & omnis economiæ ratio, & ut ita dicam, cardines concutit ac convelli videntur: Et nisi ipsa ægitudine resederit, ægre aures levatur ac cessat, vix ac ne vix quidem corpus suum primum robur ac vigorem recuperat ac retinet: declarat hæc itaque prompta ob ægitudinem animique pauperem & mortem generat: Quod enim vix longo intervallo facit febris, etiam tatis magna, id est contactis partibus & solidis partibus ipsius cordis hæc itaque non generat, id brevissimo spatio facit moror animique ægitudor: Immo notum ipsi experientiam judiciumque interponemus: Nos nos (inquam) in ipsius operibus Artis ex-

perientia didicimus eos omnes quos moror ægitudineque animi in morbum, itaque primaria ac externa causa coniecerit, aut lethaliter aut gravissime periculosissimeque agitare: vix enim ægri si liberari debent, etiam rebus omnibus rite factis liberantur: Tanta est vis ipsius ægitudinis perhæmarumque animi. Nam cum, ex illius ut *Tufano*, omnis ægitudine mileria est, cum etiam est carpitina, habet ædorem libido, levitatem letitiam gestiens, humilitatem motus, sed ægitudine majora quidam affectus, rabem, iracundiam, afflictionem, fœdiorum, lætat ipsa, ex illi animum planeque conficit, itaque cum ægitudine tale sit monstrum, & quod tenascens hydæ instar tepallulæ ac reviviscit, qua possumus ratione & animo pene herculeos oppugnemus, vineamus, elidamus, concutamus: Denique eam animi præsentiam instructionemque adhibeamus, quæ masculam virilemque virtutem in nobis inesse declaret ac testetur. *Galienus lib. 3. opposit. 5.*

Nulla aderat febris Affectu hypochondriaco obfessi horum aliquot spatio falso se brevitare putant, quoniam arteriæ omnes, cum ob vehementem æstum, tum propter compressionem arteriæ magnæ immodice pullare solent, & potissimum per horas ab assumpto cibo, vel à corporis motu, Cum tamen nulla sit febris, quæ tribus aut quatuor horis omnino cedat: quoniam febris lenta aut alia accedere possit.

OBSERVATIO XXXIII.

5. Melancholia Hypochondriaca ab atro humore in cavitate ventriculi, Pyloro arte ob scirrhum conclusa, mesenterio scirrhoso & lapidoso.

STrenuus & Nob. Vir in Germania ex Italis parentibus natus, ætatem consistentem prætergressus, raræ texturæ, picrocholis, crinibus subflavis, eucharismis cibis usus & facili digestionis, maxime his diebus quibus carui elus concessus, reliquis ex farinaceis cibis comedit, cum piscibus commode uti non posset: vinum bibit bonum, vetus ac clarum, ingurgitationibus non favebat, avide tamen comedebat ac celeriter more Itatorum. Nec hoc ab ipsius ingenio erat alienum, quoniam celeres haberet animi motus, quibus & acta mentis & cordis agerbat corpore agilis, unde etiam motus facilis, celer, inquietus. Non tamen ullam in exercendo corpori violentiam faciebat, quiescere tamen more gentis diu nequivit: Errata in victu fecit exigua, nisi quod conquefctus de potu vapæ, aut musti incertus fuit, & suæ afflictionis causam pronuntiavit: Hæsit in convivio invicis quod emptionis aut venditio-

nis causa instituitur, si quidem firmari omnes contractus fama est computatione: Ab illo tempore *pandus in stomachi sensu fundo*, ructus habuit foetidos, *flatus vagos, murrantes in abdomine*, dejectiones cineritias foetidas & saepius diarrhoeas acmantes, maxime primo anno *afus* quosdam sensus, sed eos non magno in *hypochondriis*: Appetentia non plane primo concidit, cibis vescabatur optimis & facili digestionis, ferre nullum potuit in bibendo erratum: *Distensiones hypochondrii* sensu & trilitia ac metus dedit signum, periculum ex hoc malo certo sibi praedicens: Augustani Medici pronuntiarunt statulentam hypochondriacam, & el morbo auxiliares manus votis potius quam perfolutione adhibuere: Negavi ego morbum durius tractandum esse, ventriculo succurrendum abstergentibus, eluentibus & evacuantibus fermentum hoc in ventriculo relictum, factum hoc pilulis aloëticis, syr. rosato laxativo, quum facilis solutionis esset, idque diversis & vicibus & temporibus: Pilulas aloëticas menstruum volui esse auxilium: Morbus longus est, & de quo oraculum Montani verissimum, Medicos nimirum & medicinas esse fugiendas, quae incendunt ventriculo afferunt, ut loquitur *Ferriolus*; carminativa & calidissima aromata exitio esse aegro: misere si quidem cum eo agitur cuius ventriculus à medicamentis exsiccat, ne flatuum fiat hospitium, quod extenuatus nostri aegri ventriculus probe docuit: deterrime quoque quum medicamenta fortia evacuantia ad faburram elucendam saepius propinantur: Labor Augustanorum Medicorum erat ut obstructions mesenterii reserarent, ventriculi faburram levi medicamento abstergerent & crudaribus omnem viam intercluderent; unde quidam vinum chalybeatum, quidam mecum alterata herbis brodia, cum pilulis interpositis, aut hircæ picrae, aut aloës rosatae, exhibuit, adiunctis carminativis hepaticis: Interim cum mali huius medela esset nulla perfecta, impatiens aeger moræ diuturnioris ab omnibus consilium petebat, obtemperabat omnibus, sed ita ut misceret omnium auxiliorum materias: Acidulus meo suasu ante biennium usus, haud deterius habuit, quamvis nec huius levaminis perseverantia, nec usus ritus fuit: Invterato malo accessit taciurna melancholia, praeter hominis ingenium, *lancinationes*, subversiones, deliqua cacotrophia, oedematosi pedes, difficilis incesus & aperitus casus: summa omnium functionum imbecillitas, defluxio ad aurem dextram brachium & femur, convulsiones ventriculi aliquae, tandem coma vigilans lucuosam praecedebat multis horis mortem.

Dissecto Nobil. (*Ottaviani à Taxii*) cadavere, diligenterque omnibus partibus perspectis, nullum in ulla alia parte notabilem affectum observavimus quàm in solo ventriculo ejusque inferiori orificio, & mesenterio: Ille namque à flatibus admodum distensus, valdeque extenuatus exstebat, in cuius fundo *atramento similis* copiosa & maxime corrupta (sicut faex denotabat) continebatur *materia*: Orificum vero, seu *pylorus*, *scirrhusus* arctissime constrictus, ut vix penna transire posset, una cum mesenterio toto scirrhuso & lapidoso quasi, *in cuius venulis sanguis ater*, serosus videbatur: Hepar, Lien, Renes, Intestina, vesica, Pulmones, omni parte integri erant, praeter quam quod cor multa pinguedine oblitum fuit: *Haec Bisterius observ. 3. Decade 5.*

S C H O L I A.

Historia haec Ventriculi & Mesenterii virium & ladem innoxio hepate & liene monstrat: Scirrhum ex praepostera cura & à calidioribus medicamentis fieri pauci dubitabant; M. Martini, de mor. mesenterii, affectus hypochondriaci octo differentias ponit, & in quarum numero hunc collocat, hic stomachicus & mesentericus dicitur, videri ibi possunt signa diagnostica:

In saepe fundo atramento similis humor est. Rutisom statumque vel sursum erumpentem, vel intus cum rugitu strepituque conclusionem huius affectus familiarium, causam statuit Fernelius praecipuam pathol. lib. 6. cap. 3. Bilem flavam vel atram ventriculo substraam, tunc enim liquidi flavelisque cibi pars maxima concoctione calorisque vi facit in flatum.

Pylorem scirrhusum est. Pylorus inferioribus imperat omnibus, ex sententia Helmontii, digestionis moderator: De ejus furore multa loquitur, ac in hac affectione multum molestari censet, nam in Pancreate, corpore glanduloso, molis fermentis donato, pro necessitate aequonimie naturalis, si peregrinum quoddam sit volatile, ex digestionem naturam, illic locorum interpresit, mediant latice vel citiore, tunc inclusum

hoc, quia non vitale actheo molestum ex manumque temporis incalcescit (omnis enim calor opera corrosivorum salinis fit, ait *Grenus* Arboc. inst. & min. l. 1. c. 7. §. 9.) hinc pervenit illa phlogosis hypochondriaci familiaris: Isthaec etiam exinde provenit dum arches partis hospitium exotum sentiens bilis alexantium excitat, & dum non valet expellere, varie commutatae, propter viciniam huius partis pylorus afficitur, induens pertinacem segnitie, ex qua legibus se aperit: tum si super cibum diutius retenti vis fermentalis desuper operetur, necesse est ut in flatum pars chyli transmutetur; huius per ructus non expellatur, tum solent compressionem excitare, de qua hypochondriaci fastidiosis lamentantur: Hinc conficit Helmontius in melancholia hypochondriaca Pancreas & Pylorus maxime affligi.

Flatus vagos, murrantes in abdomine. Non raro accidit ut humoribus & flatibus in ea omenti parte quae est inter Lienem, septum & ventriculum congestis & imprimis in cavitate illa in sinistro hypochondrio sub diaphragmate, ex ventriculi, omenti, coli & vicerum connexione oria exortum non habente, sed ita conclusa ut aquam continere possit, quam Sal. Albetus de Scorbuto lib. 71. signat aqua vidit, de qua accipiendus

piendus aph. 57. 7. ut Lien fultea accusetur, materia in omni uero consistente, & laepe abdomen in sinistra parte versus umbilicum in tumorem attollente: Accidit etiam nonnullis in dum ventrem attollunt vel compingunt, aut moventur, tunum & receptum quendam in ventre audiant, quod evenit ob humores & fluxus in hac omenti cavitare conclusos, hosque nonnulli *hypochondriaci* appellari putant. *Sanerius Præf. lib. 3. p. 3. a. b. Vite evadent de affell. hypochondriaci.*

Lamentationes Gra. J Ex Aristot. & experientia constat eos qui aceto succo abundant, ut dolendi ita conquiescendi finem non facere: At dolor non ob calorem, non ob frigus adest, sed ob inexplicabilem ineffabilemque qualitatem sanguinis, quam à nescio qua vitærum affectione & diabesi acquirit, Et natura cum succum ut non mitem & benignum refugit relegat: & quoad potest suis facultatibus expulseris per alvum ita repellit ac rejicit: Hoc dum fit, dolores in partibus nervosis, quia humor cietur, exstant: Et unum notandum est de iis, quod calis modo eorum calor fuliginem pravam excitat etiam benigni-

rare alimentis irrigatus, & à cibo sumpto deterius multo habent, imo febescitque quasi videntur, *Gab. Ballanius cons. 4. lib. 5.*

In mēstēti venatū sanguis atq. Gra. J Nam si ejus vitia ita extra vasa consistunt, ut in hac facile effundi, & proinde in corpus hinc inde diffundi non possint, tot symptomatum quor in affectione hypochondriaca animadvertuntur, causæ esse non possunt: Imo plerumque nonnulli in mortuis cognoscuntur, cum in partibus ignobilibus consistant: Et observationes Medicorum docent plurimos qui talia mēstēti, pancreatis, omenti mala passi sunt, de affectione hypochondriaca conquestos non esse: Itaque locus in quo affectus hypochondriacæ causæ continetur, talis constituendus est quo humores hinc inde fluere possint: atque ipsam ita uimus esse ramos venæ portæ & arteriæ hepaticæ ac mēstētiæ, qui ab hepate & lienæ ad ventriculum & vicina loca tendunt: Et certe ea mēstēti, omenti & pancreatis loca sunt in quibus in hac vasa humores vitiosi facile recurrere possunt. *Sec. Sanerius Præf. lib. 3. p. 5. S. 1. cap. 2. ubi vide plura.*

OBSERVATIO XXXIV.

Affectio hypochondriaca à vitio ventriculi, cujus tunica tenuis; humore atro in cavo eius, Pancreate, Hepate duris &c.

Erdinandus Imper. Affectionis hypochondriacæ pleraque habuit symptomata, borborygmus, ructus &c. In ventriculo libræ dux biliosi & melancholici humoris, Ejus tunica instar chartæ tenuis: Vas breve obstructum: Lien admodum parvus: Pancreas nigrum, durum, Hepar in dextro lobo scirrhusum; cystis fellis vacua &c. *Vide Tit. de Vom. lib. 3.*

OBSERVATIO XXXV.

§. In melancholici ventriculo, ranam vivam in eo se gestare rati, repertus scirrhusus Tumor.

Vidi virum rusticum, qui adeo graphice ranam se in ventriculo habere vivam multis Medicis pro consilio significavit, ut profecto licet hominem prima fronte melancholicum suspicaremur, nobis tamen de rei veritate dubitandi anas injiceret non graves: Aiebat annum esse quo hoc affectu detineretur: rimere se ne sperma ranarum cum aqua hauserit: coarxationem litidoremque ranæ in ventriculo existentis se inaudire sæpius; nuper ex vino adusto bibiro evacuasse se excrementa spermati ranarum simillima, oculis nigris distincta: Ex poru aque ranam in ventriculo innare, ac tunc sibi esse maxime infestam: mire vero debilitari illam ex allii decocto frequentissime sibi consuero: In vomitionibus Ranam ad gulam usque ascendere, sed ob magnitudinem ejici non posse, unde animal hoc exterius ad regionem ventriculi manibus se prehendere, ac derinere sæpissime constanter affirmabat: Interim dormire se, appetere, functiones alias recte peragere, nisi quod parum videatur emaciari: Profecto hæc rustici relatio. Viri cæteroquin prudentis, ac minime temperamenti melancholici, non immerito Medicos detinuit perplexos: Itaque adhibita sunt aliqua, utpote species diaturbich cum Rhabbarbaro, & mercurio dulci. Dara quoque Antrimoniar: Ranæ excrementis xgroti ad fallendum studio impostæ: Propositz pro absterione, evacuatione, acidulæ Agrenses, in vermibus nobis expertæ, vel aquæ salis ex Rhæria &c. sed omnia in cassum:

Anno iterum elabente, dum hæc scribo (1673.) virum hunc esse mortuum intelligo mæcie confectum: Apertum cadaver à Clar. viro D. Raimundo Maria Pistorino, Tumor Scirrhusus, ovi gallinacæ magnitudine, venis vaticosis distinctus, ventriculi pyloro proxime adhærebat, & paulatim canerosumuleus minabatur: Ecce Ranam quam tories rusticus manibus prehendebat, toriesque agitato per vomirum ventriculo ad gulam usque ascendere credebatur: Porro casus notabilis quem eo libentius recitavi, non quod rusticum hunc inter vere melancholicos repositum velim, sed ut appareat quam sæpe abstrusæ nobisque incognitæ causæ occultos morbos foveant, nec non prudentium Medicorum judicia mire suspendant. *Franc. Ignatius Thiermair. Consil. Medic. lib. 1. cap. 5.*

S C H O L I A.

Non inter vere melancholicos &c.] Ratiocinatio enim non semper multum lædiatur, neque in omnibus, & ut *Arctam* 1. de causis morb. diut. c. 5. loquitur, In melancholia in una te aliqua est lapsus, constante in reliquis iudicio: Ratiocinationis tamen aberratio hic adfuit, phantasie depravata & ra-

tionem præsentiam fingentis adfuit: Hypochondriacæ autem radicem hic adfuisse certum, scilicet tumorem, ad canceri naturam vergentem, cum ventriculus speciei illi naturalis sepe det. Historiam Joannis Rasmii vivum te in corpore alere existimantem & sanati vide apud *Platerum* in Obiervat. p. m. 47.

OBSERVATIO XXXVI.

In melancholico capsula atrabiliaria majores solito animadvertæ sunt & peculiaris figura, cum parvo Liene.

Capire truncatum anno 1551. aperui, vir fuerat melancholicus, firmo tamen corporis habitu & succi pleno: Lien illi exilis rotundusque: Capsula atrabiliaria dextra major & longior, duplici cavitate ampla, una rotunda, altera ad latus oblonga & angusta: Sinistra lator sed brevior: In utraque cavitate parietes tingebantur nigro quodam Th. *Bartholinus* cent. 1. hystor. 38.

S C H O L I A.

Capsula atrabiliaria] *Cassirum* Renes succenturiatos vocat: B. *Engelbium* (sub glandularum nomine) meminit: Excell. *Bartholinus* ubi utrum quem iis tri-

buit, Capsulas atrabiliaris, quia humorem quendam nigrum & fæculentum continere deprehenditur: Vide *Anat. Reformat.* lib. 1. cap. 17.

OBSERVATIO XXXVII.

§. In Hypochondriaci cadavere magna colluvies materie purulentæ inter duas mesenterii tunicas reperta.

Patritius quidam Intemperantissimus in affectionem hypochondriacæ non dissimilem admodum sua forma incidit: aderat & *nausea continua, creber vomitus & cogitationes melancholicæ*: symptomata levibus purgationibus & tempestiva sanguinis missione aliquando remissiora sunt reddita, at nunquam malum fuit extirpatum: aliquot diebus post sensu horrorem, & supervenit tumor & dolor in sinistro genu: itidem circa pubem tumor prognatus, qui vesicæ orificium ita compressit ut difficulter urinam reddiderit: hic tumor interdum augebatur, interdum minuebatur, unde causa flatibus adscripta est: quotidiano tamen incremento ita auctus est ut sese ad umbilicum & latus sinistrum extenderet & respirandi difficultatem excitaret: fuit redditus Carochymicus & cachecticus, & postquam cruciatibus morboque totus contabuerat, septimo à morbi principio mense obiit diem.

Apertum fuit corpus, & in eo inventa collectio materię purulentæ ac foetidæ, nimium inter duas mesenterii tunicas: Collectio hæc occupat majorum inferioris ventris partem & hepar sua purre dine infecerat: *Cassir* libello observat. *Anat. & Chirurg.*

S C H O L I A.

Hinc non mirum si facta mala sanguificatione tumoribus inflammationibusque cura infestata (ut hydropicis contingit) fuerit: opinaudum sane est multos similem materiam, tanquam gravissimorum morborum fomitem, in hoc mesenterio coacervare, à qua si non per vomitum vel per alvum liberentur, in tardiosos longos atque gravissimos morbos incidunt, & ultimo miseris consumpti occumbunt. *Idem ibidem.*

Inter duas mesenterii tunicas] An obstructio mesenterii hypochondriacam melanch. potest generare? Affirmatur, si materia obstruens exusta sit & scivida,

que melancholicis fomis & halitibus cerebrum perturbat & operationum principum depravationem inducit: Ratione enim obstructionis, cum sanguinis liber commensus impediatur, necesse est ut hinc plus justo incallescens aduratur, quod præsertim contingit in atrabiliaris: In virginibus chlorosis laborantibus, adeit ejusmodi mesenterii obstructio, sed sanguis ibidem collectus refrigeratur & recrudescit, hinc emergit aditus frigidus, quod color subalbidus lenit, crudorum humorum soboles. *Desaulti ultimæ & alii affectibus mesenterii vide inter ceteros Worseni Adenograph.* c. 1. item *MAUR. MARINI* de morb. mes. obstructis.

OBSERVATIO XXXVIII.

Anatome Melancholici hypochondriaci, in quo aneurysma sub clavicula dextra repertum.

D Pelet quinquagenarius, iracundus temperamento praeditus, cum gravissimis curis afflictus fuisset, post multa symptomata melancholiam hypochondriacam attestantia, passus est tumorem sub clavicula dextra eminentem, & ovi dimidii magnitudinem æquantem, mollem & reliquæ curi concolorem, in quo pulsatio insignis apparebat: iudicatum fuit esse aneurysma insanabile.

Eo defuncto inventa est arteria magna ascendens à corne ad claviculam, ita dilatata, ut brachii fere magnitudinem æquaret. *Laz. Riverius Cent. 4. Observ. 34.*

S C H O L I A.

Aneurysma] P. Barbette Pract. lib. 1. c. 3. ait patrem aff. etiam spissime, imo fere semper, ob arterias exorides, collum esse: et in aliis partibus, ut gremibus & brachiis, observatum.

Arteria] In cœliaci & mésentericis arteriis & venis melancholiam hypochondriacam sedem habebat. *Astr. Spiegelus* Ab his in cœteris potest transfundi sanguis feridus atque aneurysma parere.

Quinquagenarius, iracundus temperamento praeditus] Aff. quæ qui vulgo hypochondriaci perhibentur hominibus semper, cum iracundia, cum a pectore luctu & graciliiori corporis habitu, potissimum accidunt: Raro est quod morbus isti. *Isomorus*, vultu florido, aut etiam nimis phlegmaticos molestat: circa ætatis æquæ dignis manifestis se prodit. Hæc viri frequentius quam feminæ obnoxii reperiuntur: *Th. W. idu pueri cervicis cap. 22.*

Post multa symptomata melancholiam hypochondriacam attestantia] Symptomata quæ huic morbo accensentur vulgo valde multiplicia & diversimodæ indolis existunt, neque in omnibus eandem originem, aut eandem à se mutuo dependentiam observant: quippe in his ventris inferioris viscera, in illis præcordia, in aliis cœteri confinia plerumque affici videntur. In plexuque, verumtamen haud omnibus, ventriculus multum laborat, cetera appetitum saepe nimium, atque ab ingressu statim aggravatur, in sinistro hypochondrio distensus, pulsans, dolores, mucosa, &c. In Thorace sæpentero adeo magna contractio, respiratio difficilis: Insuper de cordis tremore & palpitatio, cum insigni ejusdem oppressione laborantes queri solent: item crebra spirituum deliqua & epileptizæ metus superveniunt, ut ægri moriemur iis semper imminere putarent: in hac regione circa membranas, ac præcipue mediastinum, dolor acutus, qui modo in una parte circumscribitur, modo ad scapulam extenditur, hujus morbi symptoma familiare est: At vero in capite malorum ilias hypochondriacos plerumque percutit, nempe dolores atrocissimi periodicè reverentes emergunt; item somnii, crebra vertigines, vigilæ pertinaces, cogitationum æstus & fluctuatio multissima, animi incertitudo, phantasia perturbata, rei cujusque formido & suspicio: morbosum, quibus immunes sunt, possessio imaginaria, plerumque etiam alie spirituum distractiones, imo interdum melancholia & mania hanc ægitudinem comitantur: Præter interiores hæc corporis regiones ab hoc morbo obfessæ, insuper partes fere quævis extremas dolores vagi, necnon spasmus & stupores cum fornicationis sensu invadunt; Sudores nocturni, sanguinis in facie & vultu manuum suffusiones, febres erraticæ & pleraque alia incertæ originis symptomata passim occurrunt: Interim observare

est quod præcipua hujus ægitudinis symptomata sunt ipsa modica, atque immediate à spirituum animalium & nervi anomalia, potissimum à viscetum cœliaci intestini cœliaci dependent: *Idem ibidem.*

Pulsatio insignis] In iis quos melancholia hypochondriaca male habet, sæpe pulsatio in sinistro hypochondrio percipitur, exagari scilicet. iis in locis hominibus fervidis, qui in vapores solum arteriarum systolen & diastolen intendunt; hæc pulsatio manum admoveant aliquando se exhibet, tum præsentem manifesta, cum ægi meti potu exercitiove incalascunt, aut in eam si contu: Concingit autem præsentem in cœliaci arteria, quæ illa parte insignior est: In morbo inveterato nulla quandoque de indicia, penalisque molesta, imo admodum manus percipibilis, morbi cœliaci curationem respicientis indicium. Indefinientem illum *epi* per aneurysma aliquando sequitur, quale observatum à *Fallope* lib. de Tum. p. n. cap. 14. Nec solum arteria cœliaci in iis pulsant, sed omnes quoque aliquando, tum ob vehementem æstum, tum ob compressionem autem, præsentem per horas aliquot & tempore cibo, vel ab immodico motu.

Ramus J. Ferris Consult. 89. Cent. 2. agens de ejusmodi Pulsatione in hypochondriaco, Tumens, an, qui modo pulsans percipitur primo observandus, tum immediate sub digito pulset, an mediate à magna arteria, quod hypochondriaci familiare: namque si immediate pulset, credendum foret arterias à ramo cœliaci illas petere, plus justo dilatas, simulque venam gastricam dexteram, pyloricam scilicet. sanguine crasso, ulso, copioso repleti, ac varicosam velut fieri. Quod si pulsatio ab arteria magna sub pyloro proveniat, coniciendum sanguinem crassum per cœliacam in pylori substantiam evomisse, sicque tumorem excivisse, &c.

Idem Excell. ferre Arteriarum pulsationis causam, non solum in calore sanguinis & spirituum refert, sed præteritum in infirmis & concumacis obstruccionibus, non mésentericis solum, verum vasorum Pæteritis præcipue; à quibus dum comprimuntur arterie magna, sanguis & spiritus continuo tandem præterfluentes, ac eorum transfluxu ob compressionem intercepto, viam sibi pariter nitentes, impetum faciunt, sicque non neutralis: sed violenta quodammodo sequitur ejusdem arterie pulsatio: *Consult. 17. Cent. 1.*

Nausea continua, crebra vomitus, &c.] In plerisque hypochondriaci ventriculus multum laborat: circa appetitum saepe nimium, ac qui ab ingressu statim aggravatur: cumque alimenta ob *spasmum* diutius in co morantur, eorum particule inane in fluxum evehunt, totum chyli massam in pulcritudo acidam aut

austeram, rhodo in salum aut acrem pervertitur; hinc cardialgia, fluxum ingens proventus, regitus ac crebra vomitio succedunt. Et quoniam ob *anacrem* defectum, chymus haud in totum volatilissatur, ac fortas provehitur, quin viscosae materiae sabarra ventriculi tunicle adhærescens, pone relinquitur, Sputatio fere continua eos infestat, Licet vero Ventrículum in hoc affectu sæpe graviter laborare concedam, cuius siquidem tonus sit laxus, & robur praestitum, propter alimentum indigestionem, pituitæ viscosæ sabarra usque in sinu ejus progignitur, cui ob particulas salinas diutina mora in fluxum crectus sæpe acor insignis aut austeritas accedunt: dein quia virum in prima coctione haud emendatur, in secunda *anacrem* illam sanguinis dyscrasie & inordinationis accipiunt: Verumamen in illam opinionem haud adducat ventriculū semper esse primum in culpa, aut cætera morbi hypochondriaci symptomata tantum à vitiosa illius constitutione pendere. Novi enim plures ægitudine ista immaniter afflictos, qui stomacho lais valebant: etenim de pulsatione in sinistro hypochondrio, de pectoris angustia & dolore vago in eo excitato, nec non de cordis tremore & oppreffione, cum metu continuo & imaginatione perturbata plurimum questi sunt; interim cibos copiose appetere, ac ingesta quævis sine ventriculi molestia aut gravamine, etiam absque sputatione aut rictu acido digerere solebant: Quinimo obis vavi alios bibaces, & mala victus ratione utentes, stomachi flacciditatem eum dyspepsia, flatulencia & crebra vomitione contraxisse, qui circa præcordia & faciliates animales sensus sanī, pro hypochondriaci haud omnino haberentur: Præterea in hoc affectu sæpe ventriculus, potius aliarum partium aut sanguinis vitio quam propterea culpa laborat: quippe ultimus est inquit modus ægrotos, quamdiu in lecto compotus multum perspirant, circa stomachum recte habere: cum vero excitantur, poi-

oculis, & massæ sanguineæ faculemia intus restagnante, statim cardialgia, fluxum aggestione & crebro vomendi nisu affici. Propter hæc aliæque rationum momenta, affectionis hypochondriacæ originem ab alio fonte quàm à ventriculi imbecillitate derivandam esse existimo: *Idem. Vides patholog. cerebri cap. xi.*

Ad sententiam Glendali induratas, &c. In mesenterio plurimas glandulas reperi omnes consensient, quas *Vesæus* & alii Anacremici in hunc usum fabricatas à natura scribunt, ut vas, quæ per mesenterium copiosa disseminantur, fulcrimentum quoddam ac firmamentum fiat, ne in violentis moribus discampanentur. *Fallopæus* autem censet eas obitare quoniam vasorum ductus comprimantur, vel à repleis intestinis, vel à prono decubitu animali, vel compresso abdomine quopiam alio modo. Utinamque vero usum prestare posse verissimè est si naturaliter sint constitutæ, cum spongiosa rara & levia corpora sint: si autem humore quopiam crasso & terreno, qualis melancholicus, repletum earum cavitates, si ut potius comprimantur vasæ & anadosi impedimento sint. Repletur itaque in hypochondriaci affectione ex glandulæ, ut testatur *Adversarius* in Anatomie cap. 13. humore crasso, atro & melancholico, affuso scilicet sanguine qui in valis multiplicibus, quibus abundat mesenterium continetur: Cam autem centram mesenterii insignis glandulosum corpus occupet, insigniores, ac primas vasorum distributiones suffulcietis hinc fit ut ibidem magna arteria, quæ *juxta* Cavam per dorsi medium verius sinistram partem percipit, si crasso humore & glanduloso hoc corpus repleat, simul & reliquæ encumulantur glandulæ comprimantur, accedente simul calidioris inemperie, insignis ratione compressionis in sinistro hypochondrio pulsatio percipiat. Alios præterea usus his glandulis assignat *Glissonius, Warthonus, Leaver* & alii.

OBSERVATIO XXXIX.

§. In Melancholico Omentum maximum & Scirrhusum, ob transfusum à Liene humorem melancholicum, deprehensum est.

IN Canonico Mospeliensi Omentum vidimus scirrhusum, totam epigastrii regionem occupans, & quatuor digitorum transversorum crassitudinem æquans. Ille autem tumor lienis colorem referebat, ut verissimè fuerit humorem melancholicum à Liene in eam partem translatum & cumulatam fuisse, cum æger temperamento valde melancholico donatus fuisset & via parentissima sit per ramos splenicos à liene ad Omentum: Per quos etiam ramos in hydropo, (ut docet Hipp.) non raro fertur aqua à liene ad omentum, è quo in capacitatem abdominis exfallat. *Laz. Riverius Prax. lib. 13. cap. 5.*

S C H O L I A.

Omentum scirrhusum, &c.] An hic vel similis tumor curabilis est? Valde dubium est, præsertim cum tales excrecentiæ non aliter quam ferro, seu sectione curari velint: ac quo modo in ejusmodi tumore interno sine viæ periculo hoc fieri possit non video. Si quis tamen sagaci conjectura principium tumoris observabit, non dubitandum quin uti consilio discutiendum & resolventium fortiorum aliquid præstare possit. Difficiliter enim (inquit *Serapion* lib. 3. pract. p. 3. cap. 3.) humores vitiosi in Omenti venas & subitantiæ effusi evacuantur, quia venarum illarum officia in locum evacuationi apertum non debilitant, ut venæ melaricæ, & si evacuati debent, necesse est ut regurgitent ad loca per quæ sunt illapsi:

quod verissimè non est fieri posse, cum expulsiæ hujus partis valde debilis esse videatur. *Greg. Hufsius problem. 10. Dind. 6.*

Per verissimè fuit, &c. Quod de toto Epiplooo ponit *Avicenna* id ejus portioni à colo dependenti assignat *Riolanus* Anatomicograph. lib. 2. cap. 11. Altera aut. portio Epiplooi à colo dependens, intestinis gracilibus superiensa, pendula est, pluribus venis intertextæ, hæc duas etiam membranis ad invicem distinctis cincta est: Quare facta fuerit hæc portio pendula infra colon dubitatur? An ut instat vitia crassam Lienis illuviem excipiat, quæ in illas Omenti venas transfertur si quando redundet? Nec mirum si Omentum venis amplis & evidentibus confectum fuerit

fuerit, quoniam nullas aut raras, easque exiles venulas in alio adipe quas deprehenderet: Quare existimo impuritatem & illuviem lienis in Omentum duplicatam; multis venis scatis deivari & conservari. &c.

Id annotatum ab Hippocr. lib. de locis. Ubi vasapin+ guedine vasa fuerint, & à splene florescente & angelice in omentum defluerit, utpote vicinam valde exillem, & varia habens eaque vacua, &c.

OBSERVATIO XL.

§. In Melancholico ab hypochondriis, glandula Mesenterii & Omenti scirrhosa & indurata deprehensa sunt, Tumor Scirrhosus in eodem, &c.

Rustica imaginabatur sibi ad mortem usque se ranas tres viventes per 4. menses in ventre gestare: Cujus falsæ imaginationis occasio hæc fuit: bibit illa aliquando ex fonte per fistulam scaturlente, & jam satiata, ore à fistula remoto, pedem ranæ fistulæ inhaerentem vidit, unde se tres, uti dictum, ranas imbibisse vulgus per rugitus stratusque, præsertim jejuno corpore, uti solent, discurrentes & quasi coarxantes, sedulo persuadebat: Accessit quod quasi capita ranarum tria in superiore abdominis parte tangi adstantibus, imo & Chirurgo videbantur: Ascitica tandem facta pie obiit, nec ante obitum, *liet non melancholica nimium*, ab hac imaginatione falsa seduci potuit.

Aperto abdomine, incisio peritonæo, aqua qualis hydropicorum est, affatim effluxit, unde partes infimi ventris fere omnes concidebant, erigentibus sese excrecentiis tribus, quas mortua, cum vulgo, capita ranarum putabat; Glandulas autem omenti scirrhosas & induratas fuisse depellendū: Adnatus hinc tandem tumor Omenti scirrhosus totus videbatur, Gissenti non absimilis, cujus Cl. T. insuls Therap. meminit, nisi quod libras duas cum uncis tribus solum penderit, ille contra libras quinquaginta sex: Totius Omenti tumorem ego hunc puro, nostrum ejusdem saltem portione, cum particulis Omenti adhuc invenerimus: Mesenterii autem glandulas majores, cum omenti quibusdam, induratas scirrhosasque fuisse affirmari posse videretur, quod tumoris pars inferior, quæ in centrum mesenterii definire videbatur, non sine laceratione à lumborum vertebra liberari potuorit. Ex observationibus Joh. Huldarici Streitter apud Greg. Horsium Tomo 1. p. 20. 141.

SCHOLIA.

Li et non melancholica nimium] Melancholia motum ab humore melancholico factum significat, quia hunc solum humorem illius causam esse multi putant ac ad eum solum remedia dirigant. Non tamen semper ab hoc humore ejusque vaporibus fieri multa ostendunt, nam multi sæpe hoc symptomate vacant in quibus nulla ejusmodi humoris prædominantis signa, imo cujuscunque temperiei homines sic affici interdum possunt, ex sola intemperie aut cerebri aut spirituum; Hippocr. solum timoris & morbis

meminit, ubi delirium omittit: Mathæus in Rhafin vult cogitationes fortes longas adducere ad hanc passionem non immutando scilicet complexionem, & homines fieri tristes cum non possant consequi effectum rerum de quibus cogitant: Videmus sæpe irriti conatu melancholicos ejusmodi à Medicis torqueri purgationibus aliisque remediis, qui statim postea curati sunt mutata solum imaginatione. Vide

plura apud Primasium de vulgi erroribus lib. 2. cap. 26.

OBSERVATIO XLI.

§. Melancholia vitio Cordis, Pulmonum & Iecoris exfluxum, cum cerebri ventriculi corruptione, excitata.

In capsula cordis observatur esse aqua rosi similis, ad cordis irrigationem necessaria in illo assiduo motu & calore: Hæc aqua in magna meretice paulatim arefcit, easque consumpta Cor contabescit, Id quod *anatomia* anatomica declarat, Vidi enim anatomen cujusdam mortui ex melancholia, cujus cor totum exsultum, Jecur totum fumosum, Pulmo inaffatus, ventriculus cerebri corruptus extitit. P. Beaysten Theat. mundi 1.3. p. 103.

SCHOLIA.

*C*or totum exsultum] Affici cerebrum, & quidem ut pars similis est, extra controversiam est. Verum cum, ut Fernesius verbis utar, negandum non sit dum iracundia, doloribus, gaudio, metu ceterisque ejusmodi animi perturbationibus concutimur, conspicimus atque insigniter Cor in nobis opprimi & gestire, atque perturbationes in corde fieri, Melan-

cholia vero sit delirium cum tristitia aut metu, aut certe alio animi affectu, concedendum est ea ratione in melancholicis simul Cor affici, imo plerumque principium melancholizæ esse ex corde: cordis enim temperies corrupta corrumpit temperiem cerebri, Et licet delirium hoc nunquam accidat nisi cerebro primario affecto, tamen si spiritibus vitalis impurus sit

& tenebrosus, (quod à Corda reuerſa ſignatur impuram quoque materiam ſuperſtatam ſecre ſumſe, Pulmoni- bus craſſaſſa vitium etiam impreſentibus) vitium hoc ſpi- ritibus animalibus & cerebro communicatur, & ita cor ſæpe huic delitio primam occaſionem præbet, melanique hoc fovet, & proinde tum non ſolum ad cerebrum, ſed etiam ad cor in curanda reſpiciendam.

Sennertius Prae. lib. 1. p. 2. cap. 3.

Ventriculus cerebri corrumpitur Melancholiz initia etſi poſſiſſimum, & non raro, ſecre tantum à ſpirituum in-

dole auſa procedunt, poſtea tamen ſæpe in cauſa partem adiciuntur ipſius cerebri conſormatio: Nempe quatenus ſanguinis aſtubilitati ſecre meiora peſſi- mum ſuſſula, ſubitaſſiam ejus magis craſſam & opa- cam reddunt, atque functionum animalium tracti- bus, ſive orbitis primariis pene deletis, novi, obli- quiores & denſi proceduntur, in tantum ut ſpiritus, etiamſi meliores ſuppeditantur, haud facile cerebrum irradient, aut ſtarim ductus priores recuperent. *Id. ibi cap. de melancholia.*

OBSERVATIO XLII.

Melancholiz hypochondriacæ ſedes reperitur plerumque in illis venis que alimentum è ventriculo excipiunt, ſanguine craſſo ac torrefacto tumefactis, quaſi varicofis.

Galenus 3^o. de locis aff. 7. *Flatuoſas vocatas melancholias credendum eſt plus calori quam deceat, in illis venis que alimentum è ventriculo excipiunt. in iſſis ſanguinem craſſiorem eſſe factum*, aſſerit. Sed neque hic finis præſentis p. n. affectus, quandoquidem tamen ali- quando accedit, quem ſubortum alias obſervavi, repletis venis illis craſſiori ſanguine, nec non de exuſto atque nigro tumefactis ac varicofis redditis, ut in *diſſectis cadaveribus obſer- vari* aliquando accidit, cum tenuior & ſeroſior ejuſdem ſanguinis portio à vaſis in Pylori ſubſtantiam ſe inſinuat, & reliquo non adeo tenui vehiculum præſtat, atque adeo partem in tumorem elevat. *Raim. Joh. Forſi. Conſult. 88. Cent. 2.*

S C H O L I A.

Afectionem Hypochondriacam in Legitimam & ſporiam diſtinguit Viſ Excellentiſſimas, Huius ſedem in viſceribus, lecore, Liene ac Meſenterio ſtauit: Sicut priores in Pyloro ac meſentericis, in quibus adeſt philogofis; Eo diverſa ab inflammatione, quod in illa ſervidas ſanguis in venis concludus eſt: In inflammatione vero extra venas effuſus & in ali- qua parte impaſſus: hincque fit quod in philogofis nulla fit febris, prout inflammationem ſemper eadem

necceſſario comitatur, quæ doctrina eſt Galeni loco in textu allegato: Utraque ab obſtructionibus ortum ducit, Spuria quidem in Laſſis venis, ob cruditates in ventriculo genitas, quæ à calore circumſtantiæ viſcerum ſiccæ, terreæ & melancholicæ redduntur. Legitima non à cruditatibus proveoit, ſed à ſanguine craſſo, melancholico, atque exuſto in locis memoratis. *Vide Conſultat. 1.*

ad 33. ſent. 3.

OBSERVATIO XLIII.

Melancholici vaſa meſaraica nigro ſanguine diſtenta reperta ſunt.

Melancholicæ conſtitutionis viduus conquerebatur de dolore ventriculi cum ruſti- bus auſteris, &c. Superveniente vomitu nigricantis ſanguinis & leiſpithymiis cre- bris obüt. Inteftina in dextro latere livida, nigricantia, ſphacelata viſa ſunt: Vaſa meſaraica in Inteftina deſinentia ſanguine nigricante turgida: Inteftini coli pars ſuperior ſanguine concreto, ſæculento, nigeriſimo inſtar picis, quale vomitu rejecerat admodum repletum. *Vide l. 3. Tit. de Inappetentia.*

OBSERVATIO XLIV.

Melanchol. Hypochondriacæ ſedes eſt ut plurimum in ſiniſtro hypochondrio, multo nigro ſucco ſcatente.

Cauſæ detinentes humorem melancholicum ſunt Lien, Venæ tam meſenterii quam hæmorrhoidales, Vaſa ſpermatica, Uterus, & aliz ventris inferioris cavitates, in quas vel intemperies, aut morbus organicus, seu obſtructio, vel utrumque cadere poteſt: Quo- rum ratione non ſemel viſi ſunt Hypochondriaci, quibus iſtæ corporis partes, ac ſiniſtrum cumprimis hypochondrium, multo nigro ſucco, tanquam atro jure, oppletæ diſtentaque fuere: aut quibus haud abſimilis humor, ſuſque deque, ſine tamen periculo, ſuit ejeſtus, qualem etiam *Solemander* conf. 7. ſect. 2. ad ſex aut 7. libras ex dextro hypochondrio citra noxam exploſum fuiſſe aſſerit. *Matthew Martini Traſt. de Affect. Hypochondr. p. 136.*

OBSERVATIO XLV.

§. In Affectu hypochondriaco laborantibus vasa mesaraica veluti varicosa & cancrofa evadunt.

Sunt multi qui in hoc & in aliis morbis nihil nisi obstructions accusant, Verum equidem non negamus in aliquibus vasis humores quasi impactos esse, ita quidem ut vasa ista veluti varicosa & cancrofa fieri interdum scribat Mercatus lib. 1. de morbis cap. 7. Etenim si natura vitiosos humores in vena cava per ramos ejus in certas partes depellere potest, ut in cruribus varices, in aliis etiam partibus venæ cancrofæ humore atro turgant, Cur non idem in ramis venæ Portæ accidere posset? Atque id ubi accidit, malum fere desperatum est & medicamentis facile exacerbatur, &c. *Sennertus Pract. lib. 3. p. 5. §. 1. c. 3.*

OBSERVATIO XLVI.

§. Melancholia hypochondriaca orta à Mesenterio nigris varicibus obfeto: Pancreate obftructo, Heparate parvo, nigro, scirrholo, Lieno duro, &c.

CElissimus quidam Princeps, staturæ brevis, melancholicus, pauciloquus, sedentarius, agens vitam, & deformem dorso, ad istar literæ M, screns gibbum, duobus annis ante mortem cepit ab ore insigniter furerere, cum excoriatione gingivarum & dentium notabili mobilitate: Octo diebus ante mortem correptus febricula lenta, cum virium resolutione, ob defectum probi sanguinis & spirituum carentiam in Domino obdormivit.

Ut debitus cadaveri balsamationis redderetur honos, apertum est abdomen, ubi primo sese omentum fetidissimum atque putridum sese obtulit: deinde mesenterium nigris varicibus undique circumseptum, cum pancreate induratis multis magnisque glandulis impervio: Hepar extitit parvum, nigrum atque scirrholosum: Ren vero infra hepar latens, major capite pueri duorum annorum, ponderans libras duas cum scissis, in cujus centro calculus 3 iij. 8. repertus, cujus acumem afficiens parietes ipsius renis, gangranam induxit: Infra hunc renem, circa muscolum psoas, aderat abscessus longus atque profundus, flavo ac fetido pure plenus, absque ullo femoris torpore vel dormitatione, contra *Fernelium*: Venterculus mediocris atro humore plenus: Lien longus, durior solito: Ren vero altior & naturalis major, continens ad minimum centum parvos lapillos, apparere: Hinc deventum est ad Vedium ventrem, in quo vise sunt duæ hydatides, ab humero usque ad septum transversum, inter pulmones & pleuram, aqua, veluti glaciata repleta, cum pulmonum, tam secundum substantiam quam secundum vasa insigni corruptella: Ita ut melancholia hypochondriaca, Scorbutus, Tabes, spirituum resolutio, viscerumque corruptio causæ fuerint istius interitus: Sed quod mirum est, toto tempore vitæ nunquam est conquestus de doloribus nephriticis, calculis, urinis sabulosis, aut difficulter vel diminute fluentibus, multo minus ad renis dextri ingens augmentum, femur dextrum torporem est perpessum. *Antonini de Poëzi Observ. 29. miscell. curios. anni 4.*

OBSERVATIO XLVII.

§. Sectio Gravide Hypochondriaca, hæmoptoica, In cujus ventriculo materia viscidissima, stradiæ coloris reperta, copia sanguinis concreti, Pylorus contractus, &c.

JAn. 26. Catharina Caspareidis, mater octo liberorum abortivit: Per totum tempus conjugii valetudinaria fuit. Per tres menses sanguis menstruus non est purgatus. A septem hebdomadibus in parte sinistra pectoris & hypochondrii dolores sentit, & in hypochondriis quoque tensionem, T errore à spectro incusso perterrita incidit in hoc malum. Frigus molestum non calor. Alvus respondet, Patitur subinde aliquid uterinis suffocationibus simile, Tum status erumpunt, unde levatur, ʒ. aq. pulg. 3 ii. Theriacal. 3 ss. tint. castor. ʒ ii. ol. succin. ʒss. iv. laud. op. gr. ij. syr. fenic. ʒvi. inc. Die 24. in variis levamen sensit: Dolores omnes minuuntur: Iteretur mistura 26. præscripta. Die 28. dolores leviores sunt. Quando respirat sibilus auditur in pectore: Iteretur mistura dicta: Die 29. suffocatio adhuc subinde

subinde urget: Nec heri nec hodie deiecit, Sed propter suffocationes non confutum purgare: Iteretur mistura dicta. Pro Tussi \mathcal{Z} . Massæ Pil. de cynogl. \mathfrak{z} i. f. P. n°. viii. *Die 3. Febr.* præterito die Sabbathi paroxysmum febrilem passa, cuius frigore durante incepit dolor rodens & molestus femoris & tibiar, qui adhuc durat: \mathcal{Z} . ung. marriati, ol. Nard. an \mathfrak{z} iii. ol. philosop. \mathfrak{z} i. m. *Die 4.* hodie mane circa 5. ex vehementi tussi in sanguinis vomitum incidit, ac subito extincta est.

Secuit Cl. Sylvius cadaver die 6. Febr. Rugæ se offerebant in infima ventris superficie, externa signa partuum antegressorum. In abdomine secto copiosa & laudabilis pinguedo, Colum sub umbilico situm: Intestina pleraque flatibus distenta. Illorum substantia tenuis & elegans, imprimis quo in loco distendebantur. Præ aliis tamen omnibus in immensum distendebatur intestinum tenue, ante sui inflexionem sinistrorsum versus: Intestina hinc inde colore fellis infecta: Folliculus fellis prægrandis erat & pallidus. Lien quoque solito multo pallidior. Plures in intestinis erant lumbrici. In ventriculi aperti parte inferiore nihil cruciuti, sed materia viscidissima spadicei coloris fere: Torus ventriculus valde rugosus & densus: Ex parte superiore extra insignis copia concreti sanguinis cum fluidiore, simul saporis austeri: Orificium inferius, sive pylorus, valde constrictus: Rugæ ventriculi tortuosæ & prope pylorum fere circulares. Intestini vero rectæ secundum fibrilæ intestinalis ductum. In intestinis nihil rubicundi aut obscuri: Hepar variis in locis per fibrillas diaphragmati annexum. Pulmo dexter pleuræ firmiter connexus, mollis, boni coloris, sed flatu distentus, thoracem totum oppiens, sectus apertisque liquorem limpido, salum subacidumque fundens. Sinister lividior distentus, passim connexus pleuræ, gelatinoso & viscido humore obductus, firmus nigrescensque, interius etiam, sanguinis instar coagulati. Pancreatis substantia elegans, à liquore per syringam immisso parum rugebatur. In latere complures glandulæ plane non tinctæ: Ductus pancreaticus insignis: Lien pallidior multo, in quo initia aposthematis: Hepar bene habebat: Bilis copiosa, pallida & tenuis. Humor in pericardio subfalsus & subacidus: Cor bene constitutum: In disseci ventriculo dextro parum sanguinis, in sinistro ne gurra quidem. Prope radicem Mesenterii connectuntur renes vertebris, ligamentis firmis. Hic suspicatur Cl. Sylvium querendas vias à ventriculo ad renes, per quas potus sæpe tam cito transeat. Papillares in renibus caruncule foraminulis perviæ, per quas urina colatur. Exrema in parte tubarum, variæ vesiculæ aqua repletæ, hydatides dictæ. Ligamenta rotunda uteri, extra abdominis musculos elapsa, parvum quasi musciculum adjunctum habentia, in varia tenuissima filamenta disperguntur, quæ partim ad os pubis, partim in pinguedinem, & forte cutem, partes & exrenas muliebres inferuntur: Arteria spermatica utraque ex trunco oriebatur, ut & vena spermatica dextra, sed sinistra ex emulgente, utri in viris: Rami illi, qui ex Iliacis ad uterum redeunt, hic fere æquales illis qui ad crura. Quarto mense gravida iudicata. Tota substantia uteri spongiosa & cavernosa multis magnis foraminibus, sive potius canalibus pervia, in locis quibuldam stylium crassum admittentia: In horum unum immissus sinistram versus, tubuli ope, flarus per uteri substantiam & venam spermaticam in venam renalem & eam transit, magisque tumens universus observatus utetus, quasi etiam in ipsius cavitatem flarus penetrasset. Inflata arteria spermatica ad ipsos usque testes mota & tumefacta placenta uteri cum secundina, sive membrana chorio, inirabili textura è tenuissimis fibrillis conjuncta. Funiculus umbilicalis in latere sinistro placentæ insertus: Fœtus caput in fundo uteri: Fœtus masculus lateri sinistro incumbens: Extremitates manuum pedumque, ut & narium albicantes: Umbilicus parte ventris magis inferiore quam in adultis. In totius corporis superficie venarum ramificationes elegantissimæ conspicuæ: Facies ruditer efformata. In arteria aspera sanguis coagulatus, in œsophago non. *Matthias Paisenium in Miscell. cur. ann. 4. & 5. Observat. xcvi.*

OBSERVATIO XLVIII.

§. Sectio cadaveris Puerperæ ex morore mortuæ.

A Clar. Sylvio in Nosocomio Leidensi anno 1664. administrata.

Fœmina erat 15. ante obitum dies fixum enixa, cuius vir ante 6. fere hebdomadas, morbo decumbens Nosocomium delatus ibidem mortuus: Obiectum forte fuit formiæ à vicinis quod male viri sui curam habuerit, eamque calumniam tam ægre tulit ut totam se mœrori dederit. Enixa deinde, nec sedato illo aniqui affectu, cum nullam

corporis rationem haberet, nec cibos aut medicamenta caperet, tandem mente destituta intra xv. diem mortua est.

In ipsius dissecto cadavere hæc imprimis inveniuntur præ cæteris rara & notatu digna. Omentum non omnia intestina, quæ nonnihil loco mota erant, tegebat, *Vide Cl. Sylvium colligebat feminam, dum in vivis suis, sæpius terminibus ventris colicisque doloribus laborasse.* Intestinum crassum non circumdabat totum abdomen cinguli instar, sed à ventriculi fundo infra umbilicum intorquebatur, indeque ad ventriculum redibat, facta fere semiluna: Cl. Sylvius addebat se in variis variè hanc inflexionem & gyrationem observasse. Idem intestinum, ut & tenue, inæqualiter flatribus turgebat, ita ut inter partes valde inflatas medium spatium interesset omnino vacuum & contractum, vix ad pollicis crassitiem: Cl. Sylvius affirmabat se in vivis animalium sectionibus, imprimis cuniculorum, idem observasse, & ita quidem ut pars quæ jam inflata erat mox detumuerit dum fecaret, & contra. In hoc cadavere quoque dum intestina movebantur, æqualiter omnia valde inflatas medium spatium interesset omnino vacuum & contractum, vix ad pollicis crassitiem: Cl. Sylvius putabat ob doloris sensum partes intestini constringi. Ejusdem intestini crassi flexus sigmoidis, qui alias infra rectum est intestinum & interiora respicit, contrario modo se habebat. Observabile etiam erat quod de tenui intestino, Ileo dicto, commonstrabat D. Sylvius, nempe oriri illud in dextro latere ad Ileum os, & post aliquot flexuras retro & deorsum tendere, ascendere deinde rursus sub umbilico per ipsum mesenterium, sinistramque latus occupare, sequè ad hypochondrium sinistrum, os Ileum & vicina reliqua loca extendere: Unde patet, docente eodem Sylvio, *Termina quæ hypochondriaci in hypochondriis accidunt, non alibi quam in hoc intestino latere, imprimis cum hoc antrorsum, ubi dolores maxime percipiuntur, vergat. Lien vero interiora magis petat, Et vix etiam in cadaverum sectionibus tales obstructions in vasis illis vix inveniuntur quæ tantos dolores producere possint.* Vasa quoque fuit utriusque ductus, tam biliarii quam pancreatici in intestinum illud inserti, quorum pori in cadavere hoc juncti erant. Hinc remotis Pulmonibus & ventriculo, apparuit Ductus thoracicus, sive Chyliferus, inter venam azygon, quæ ad dextram erat, & magnam, quæ ad sinistram, situs, una cum capacitate illa inferior sita, & nonnullis capsula dicta, quod chylum excipiat, alias nimis ductum illum obruturum. Flexuræ ventriculi in parte dextra subiacebat Pancreas. Dexter pulmo omnino naturalis erat constitutionis, sinister costis adharebat. Sub utraque mamma, quia lactis non habita fuerat ratio, apolstema erat repletum pure, quod tamen in dextro latere copiosius profluebat. *Pterus, quia omnino erat singularis, & nunquam ita à Cl. Sylvio observatus, ultimo loco accuratius secabatur, in eo hæc imprimis notata: Magnitudo ejus erat omnino insolita, superabâque fundi latitudo vel octo digitos transversos: crassities erat ad minimum quatuor digitorum, cum tamen mulier jam ante xv. dies peperisset: Crassities ipsius substantiæ uteri erat fere pollicis: Causa hujus magnitudinis, ut post sectionem patebat, erant relicta in utero placentæ frustula, uteri parietibus firmiter adhzrentia, quæ putredo & inflammatio consequuta fuerat. Cl. Sylvius conjectabatur maiorem inter alia hujus retentionis & coherentiæ causam fuisse, utpote quæ omnia in corpore duriora & magis fixa reddat, cum contra lactis eadem magis solvat: In vasis, ut ex cavernis, sive rubulis uteri, substantia viscosa & pituicosa hærebat hujusmodi, qualis si in corde & alibi hæreat, Polypus dici solet. Apparebat insuper in utero esse communicationem vasorum omnium in utroque latere: Inflata enim uteri vena, omnia vasa, ut & lateralia, & utrumque uteri ligamentum inflabantur: vasa etiam minima turgebant: Inflata etiam arteria, quæ ex iliaca oriebatur, ingressus inflati aëris observabatur ad totam uteri substantiam & sinus anfractuosis, sed sensim, quod in vena citius apparebat. Uteri substantia tota est cavetnosa, experimento per rubulum sumpto. Matthiæ Pasenii in miscell. cur. anni 4. Observ. 143.*

OBSERVATIO XLIX.

Melancholia à vasis spermaticis semine corrupto refertis.

Illustr. matrona à non exculto uteri fundo in melancholiam incidit. Vasa omnia spermatica semine, sed indurato turgebant. *Vide lib. 3. tit. de Hystericiis affectibus.*

OBSERVATIO I.

Anatome canis melancholici, in cujus hepate vermis repertus.

Magnus canis solitarie vivens, & magis quam alii canes melancholicus fuit, qui ob calorem quandam internum, pluviosum amabar tempus, adeo ut à pluvia nunquam recederet, seque madefaciendum præberet, dissectus fuit à D. Tardin, & in ejus hepate vermis hirsutus repertus est. *Petrus Borelli Centur. III. Observo. XXXIII.*



ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO X.

DE IMAGINATIONE, RATIOCINATIONE
& Memoria depravatis & abolitis.

OBSERVATIO I.

5. *Amentia à vitiosa cerebri conformatione inducitur, ob aquæ copiam cerebri molem inferiente & distendente.*

PER Hydrocephalo extinctus à robustis parentibus fatus, actionibus Animalibusque ex cerebro prodeunt, puta Ingepio, loquela, risu, &c. Destitutus fuit. In duobus cerebri ventriculis aquam crystallo clariorem ad libras octodecim invenimus, quæ non solum ventriculos, sed & substantiam cerebri distendebat. Ita ut totum cerebrum, (cecebellum excipio) in sacculum extenderetur, hinc fiebat ut circinvolutiones & gyri cerebri non conspicerentur, sed turgerent omnia. *Vide Tit. de Hydrocephalo ex Fabricio Hildano.*

SCHOLIA.

Stopiditas sive *insipiens*, est potissimum ad Animam Rationalem spectat, atque intellectus & judicii defectum significat, non improprie tamen inter morbos capitis, seu *insipiens* recensetur, in quantum scilicet ista Animæ superioris eclipsis ab imaginatione & memoria læsis procedit, atque harum deliquit à spirituum animalium ipsiusque cerebri vitis pendere.

Animam Rationalem in sensitiva sive corporea subsistere, ejusque sedem quasi principem imaginationem esse: porro ab hac & memoria rerum omnium quas Mens speculatur, aut noriones ipsas, ac earum occasiones suppeditari alibi ostendimus. Quare si quando has functiones corporeas deficere aut inhibere contingit, proinde intellectus acies, quasi oculis ejus obvelatis, hebetari plurimum, aut penitus officari solet. Itaque ut Stultitiæ & Stupiditatis pathologia rite tradatur, imprimis inquirent oportere de quatione & quibus causis Imaginatio & memoria læpe debiliatur vel præpediuntur. Super his ut methodice procedatur, huc referri debent quæ de Animæ corporeæ functionibus, earumque subiectis & instrumentis discussimus, Imaginationis sedem *Corpora Callosa* sive *Cerebri medullam*, atque *Memoriz, Cerebri corticis medullam*. Porro utriusque organa immutata esse Spiritus animales declaravimus. Quam-

obrem quod potentius istis (quæ functionis cujusque alterius scilicet. cum rationalis cum sensitivæ primi aut præcipui elateris sunt) præpeditis, Mentis imbecillitas & hebetudo, Tarditas ingrossi, Stupiditas, ac ipsa demum Amentia sæpenumero oriuntur, in culpa sunt aut Cerebrum ipsum, aut Spiritus animales, aut utraque simul, atque prius modo bi, modo illud.

Primo quoad Spiritus animales, cujusmodi illi ex propria & ingenua indole esse debent, & quales ob diathesin præternaturalem in Phreoside, Mania, Melancholia existum jam declaravimus: Verum insuper suspicari licet Spiritus istos interdum particulis æstivis fere destitutos, quali vappidis & effoetis fieri, nempe cum particula spirituoze præpollere, atque subime salinas volatilitates conciliere deberent, in Stupiditate cum hæc utraque, tum sulphureæ nimis deprelle, a quodvis vel terrestribus immergantur fere ac obruantur: Enimvero *fatus* non tam rudi crassaque Minerva quam Anima præditi esse videntur, eorumque Spiritus animales potius quam præcorosia ex luto effingi: Plures sunt causæ evidentes quibus Spiritus animales rectamque adeo levideoleam acquirunt, quam præcipuas attingemus. 1. Artamen haud frequenter evenit Stupiditatem mera spirituum, aut ipsius *Animæ corporeæ* culpa solitaria excitari: quin sæpius cerebrum ipsum potius aut prius in culpa esse repertum

reperitur. Quippe cum plurima sint requisita quibus hoc peridoneum functionis animalis subiectum live machina constituantur, si forte eorum quodlibet aut deficiat, aut depravetur, facile sequitur exiter affectus ingenio minus polleat. Primo vulgaris oblectatio est Indolem ac ingeniam nonnulli à capitis, & consequenter à Cerebri ejus Magnitudine & Figura pendere, nam quoad molem ejus, in adagio est Cerebri Partum aut Ninium stoliditatem arguere. Et quamvis hoc non semper, attamen crebro sic evenit. Cujus ratio est, quoniam in *perro* (*metu*) panices tantum spiritus gignuntur caeteris urque, (Vide Observat. 3. 4. 5.) Grandis autem textura plenumque villis consistens mentis acumini minus accommodata existit.

2. Cerebri figura genuina & optima Globosa esse debet, cil. in eam finem ut spiritus aequabili efflatu à medullis ejus quaquavertus in ambum diffundantur, & illinc aequibus ubique reflectionum angulis retroqueantur: Verumtamen qui capite depresso, vel nimis acuminato, aut alias improporcionato insigniuntur, ut plurimum functionis animalis labe quadam notabili afficiuntur: quomodo namque cerebra, tanquam specula distorta, rerum species non recte colligunt, nec Animæ rationalis ac vere obijciunt.

3. *Substantia cerebri* sit bene temperata & laudabilis texture, nec tantum quoad calorem & frigoris, siccitatis & humiditatis qualitates, verum sitalis ejus sale volatili & spiritui copioso cui modica reliquorum proportione consistat, sit Tenax & Aeræ, aut spiritus facili totum trajiciant, & sibi tractus protrudant; si mulque mediocriter firma & compacta, ut tractus & meatus exteri permaneant, nec ita à partium nimis mollium lubidinis delectantur. In stupida vero suspicari licet, modo in cerebro qualitates ejusdem manifestari, uti imprimis humiditatis aut frigiditatis excessum, propter quam rationem pueri & senes sensum hebetudine sæpe affici solent, modo *texturam* nimis crassam & terrestem esse, proinde ut spiritus non facile ipsum intradant, aut sibi tractus protrudant: nempe haud, plurimum locis radii, corpus opacum penetrare possint. Hujusmodi levidentis cerebri texture rusticorum & agellium nati, quasi ea pejore lato formati, cerebro obnoxii sunt: hinc in quibusdam familiis, multas retro progenies recolendo, vix unam sagacem & sapientem reperire datur: In quibusdam locis cæci ac alii influentia incolas ad stupiditatem inclinare perhibetur, ita in Dæotia nati, in adagio idem est ac Farum esse, *Vide Observat. 2. 9. 10. 15. 16. 18.*

Quarto præter hæc cerebri vitia, quæ ut plurimum originalia & congenita sunt, nonnunquam mala ejus secundum poros & meatus conformatio, propter inordinationes quasdam acquisita, in causa est quod functio animalis minus recte excolitur. Nam 1. quod attinet ad cerebri meatus & poros minores (quos ipsi spiritus per totam ejus compagem ubique protrudunt, inque illis pro functionum animalium exercitiis perpetuo sciant) nonnunquam accidit hos *desistere aut perveni*, proindeque mentis hebetudinem aut morosum accensum Spatio hæc *desunt*, in quantum cerebri consistens, aut obdurata aut fluida nimis, ea debito modo procedi, aut permanere non sinit. Cæterum, meatus illos *perveni* suspicatur, vel quatenus nimis laxi vel contracti sunt, vel quatenus eorum conformatio inæqualis est: Porri nimis stricti materiem pro spirituum copiis haud satis uberem admittunt: Supra modum laxi, aut cum materia ista particulas heterogeneas & regimini an-

malis infestas excipiunt: Inæqualiter conformati videntur, siquidem patentiores sunt in una parte cerebri, & angustiores in alia. Propter hanc causam putamus esse quod nonnulli res satis recte sentiant, sed male semper judicant; quippe notiones eorum & conceptus, velut species visibiles, medium diversimodum penetrantes, distorti evadunt: Porro ob hanc rationem fortasse contingit quoddam imaginatione & phantasia facis polleat, ac in memoria plurimum deficere, & alios e contra.

Tertio interdum accidit utraq; hæc Moræ causas conjunctas simul concurrere, nempe quod tum spiritus animales hebetes ac torpidi, tum cerebrum male conformatum faciat: Et revera quæcumque pars prior in culpa est, brevi alteram pariter ream facit: Quippe cum spiritus obtusi ac inertes cerebrum haud libere trajiciant, Porri & Meatus in eo vel non satis procedunt, vel denuo coalescunt; atque spiritus si ob malam cerebri structuram satis expandi nequeunt, ipsi tandem segnes & otio obtorpescentes diutius viciolam acquirunt. Vide *Observat. 11. 12. 13. 14.*

Hæc de Morosis causis conjunctis, quod ad procreatas & evidentes spectat, plures sunt *causæ* propter quas prædictæ labe cerebro aut spiritibus, vel simul utriusque inferri solent. Primo enim stupiditas interdum originalis fuisse comita est, & sic vel *hereditaria*, ut cum illi progeniunt stultos, Cujus ratio ratio parer, istam nempe paniculis effoetis, ad constituenda organa animalia in filio, quæ fuerunt in patre conducentibus, Vel stupiditas *congenita* quasi *accidentalis* est, nempe frequentes accidunt sapientes & tutissime ingeniosos infantes ac bardos progignere.

Secundo plures sunt *causæ evidentes*, quibus Stupiditas nonnullis originaliter laus induci solet: Quiddam prius solertes & ingenioli, meta ætatis declinatione, sine magnis in viciis ætatis, sentim hebetiores ac demum insuli evadunt, quatenus nimium *sanguis & liquor nervum* (quorum dyscrasis spiritus animales obsequuntur) tanquam vina quedam, aliquæ liquores fermentat, post fermentationem perfectam à vigore decedunt, & paulatim quasi in vappam degenerant: Enimvero observare est quorundam ingenia, juxta ætatem suam periodos, vasa incrementa & decrementa suscipere: Novi plures in pueritia sagaces admodum & summe dociles, ut literatura sua & discursu suo quovis in admirationem raptem, qui postea adolescentem obtusi & hebetes evaserunt: E contra evenit multos primo indociles, literatura prius inaptos, & valius inconcinni videri, qui ubi ex ephæbis excellent, eximia mentis acie & forma more pollent. Prioris ratio est, quod ingenium præcox, insitit fructus horarum, haud diu in eodem statu permanet, quin cito declinans brevi emarcescit. Quippe in omni mixtione & concretionem vite facta requiri videtur, ut progressus à cruditæte ad maturitatem lente & paulatim fiat, hoc est, elementa activa imprimis haud cæteris emittant & supra modum præpollant, quin ita obvolva paulatim emergant ac sese exerant. Secus enim ab initio libera nimis & tota facile avolvantur, libejum tuum effusum fore ac vappam relinquentia. Quapropter de pueris, qui primis annis paulo hebetiores videntur, ipsi erit eos postea cum cerebri temperies, (evaporata humiditate superflua) maturatur, laus ingeniosos fore.

3°. Interdum magna capitis plaga aut concussio, præsertim quæ casu præcipiti ab alto contingit, facilius animalis novam & debilitatem infert: Novi quosdam egregie literatos, atque summi acuminis ac iudicii homines, qui fortuitis huiusmodi casibus superstitibus, postea hebetes & crassius ingenii fore, Vulgo dicitur taliter affectorum *Cerebri substantia inersa* esse, & quidem vehemens cerebri concussio assuetos spirituum tractus & vias valde pervertit, & non raro comprimit aut occludit, proinde ut memorie & imaginationis actus in posterum ægrotæ aut perpetuam obeant, adeo ut nonnulli à plaga fortiori capiti inflata Bardi proctus & amentes evaserint.

4°. Ebrietas frequens & crapula, præsertim si poculis indormiant, tomno vinoque tepuli, quosdam ingenia plurimum labefaciunt & rationis usum infirmant: quatenus oempe hoc modo poti & meatu cerebri aperitur nimis, illique conspiciunt heterogenea & regimini animali valde infesta introducantur: Ob similem fere rationem frequens Opiatorum usus quibusdam mentis aciem valde pertrahit.

5°. Violentæ ac subitæ passionibus, quales impromptus sunt improvisus atque immanis terror, aut tristitia vehemens, nonnullis recordationes ligule, proinde ut sensu animi verbis exprimere, aut actiones vitæ familiares vix obire possent. Quod certe accidit in quantum spiritus cerebri incolentes, propter talem occasionem plurimum dissipant, & ab invicem distracti, præsertim morum suorum vestigia postea repetere nequeunt: pariter ac milites à subito ac violento hostis ingressu fugati, ordinem & stationes suas hand facile recuperant.

6°. Observare est quosdam homines ob morbos cerebri immaturos etiam Morolus contraxisse: In Epilepsia gravi & diuturna hoc frequenter accidit in quantum hostis ingressu fugati, ordinem & stationes suas hand facile recuperant.

& vehementer capillos pervertit, & feculentis infert, adeoque implet, ut spirituum tractibus occlusis sensuum motuumque interiorum actus inhibeantur. Novi puellam primò indolis acutæ ac vividæ ingenii, quæ postquam morbo comitiali diu laborasset, *impixæ puridæ* evasit. Porro stupiditatem *Paralyticam* comitari aut præcedere in plerisque notavi, nempe eadem materies quæ in corpore strata resolutionem, in *Cerebro* aggregata, si non apoplexiam aut cacum, (sepe morolus accersit: *Th. Will. parte 2. c. 13. Tract. de Animæ morborum.*)

Rabulæ parentium senu] Frequenter accidit Sapientes & summe ingeniosos, insulos ac bardos progignere; quod ob hanc causam ita interdum fieri putamus, quatenus parentes literarum studiis, imò & lectioni aut meditationi nimis dediti, spiritus animales cerebri hospites in tantum impendant, ut pro supplementis eorum generosissimæ sanguinis patulæ atque ad *hypocaus* accessant, paucioribus tantum & tenuioribus ad corpora spiritumica descendere permittit: Quando Anima rationalis de fœtu suo (qui intellectus opera sunt) edendo maxime sollicita est, tunc Anima corporea (spiritibus in alterius obsequia vocatis) aut minus aut imbecillius prohibea evadit. Alia ratio nimis frequens occurrat, nempe quod parentes intemperantia, luxuria & malis moribus, corpora sua ita infirmant enervantque, propterea ut natos nonnulli languidos aut valedudinarios gignant. Hinc ut plurimum qui parentibus seu senu hæc, aut nondum ætate maturis, aut cæcis, aut mollibus, aut effeminatis nascuntur, ingenio magno & liberali careant. Nec minus facilius animalis detrimentum his accidit quorum facies malis cerebri affectionibus, ut *pataly*, *epilepsia*, *caco*, *spasmus* & similibus obnoxii fiunt, ita ut ex parentibus nasci, quibus mens sana in corpore sano est, patrimonio amplissimo longe præstat. *Mem. ibidem.*

OBSERVATIO II.

5. Oblivio & Desipientia à sinistra parte cerebri laxiore reddita, Dura matre livida, &c.

Quidam vulneratur in occipite, die nona febris oritur quam *paralytis* excipit, subsequente *desipientia* & oblivione; xl. die moritur. Remoto cranio, Sinistra pars cerebri multo laxior apparebat, duræque mater circa tertium sinum, proflus livida, *Vide historiam L. 4. tit. de vulneribus.*

S C H O L I A.

Felici natus] Ab excitata phlegmone in tenui meningi. Alias interdum accidit Febrim quosdam stultos & stupidos sanale & acutiores reddidisset: Refert *Jaues Lhuatrus* in *Securinio* Ingen. quendam Cordubæ in aula Regia fœvum, cum febre maligna afficeretur, in medio morbi ad tantum iudicii & discretionis acumen pervenisse, ut universam aulam in admirationem raperet, & toto vitæ, quod residuum habuit, tempore prudentissimum perituisse. Novimus & nos quendam obtuli & plane *Bæotici* ingenii qui in febre delirans, dictæ acutissima, & plu-

rima sale condita celestissime promebat. Novimus & senem, memorie, & proinde discant utrum amissæ, qui ab interpretis febrili postea accedente juvenem maximum recepit: Quorum ratio videtur esse quod æquis febrilis caliginem cerebro obdactam quandoque rarefaciat & dissipet. *Willisus l. c.* Id usu quoque compertum in paucis febricitantibus, ut supra ætatem sapiant & ratiocinentur, calore scilicet febrili, humorem superfluum, cerebrum obruente, discutiente & ad temperiem rationationi congruam deducunt.

OBSERVATIO III.

§. *Fatuitas nativa ob parvitatem Cerebri & Plexus intercostalis, cerebro & cordis communis exilitatem.*

Cum nuper cujusdam à nativitate Fatui cadaver dissecaremus, nullum in cerebro, nisi quod mole perexiguum esset, defectum aut vitium reperire potuimus. Præcipua autem discriminis nota quam inter Illius & vitæ cordati partes advertimus hæcce erat, nempe quod prædictus Nervus intercostalis plexus, quem Cerebri & cordis internuntium & hominis proprium diximus, in stulto hoc valde exilis & minori Nervorum satellitio stipatus fuerit.

Dum hæc scribuntur, Cercopitheci Anatomen institimus, Cujus cerebrum parum ob eo quod in cane aut vulpe cernitur differebat, nisi quod proportionem ad sui corporis molem habita longe esset capacius, ejusque anfractus ampliores existerent. Prominentiæ orbicularæ, *Nates & Testes* dictæ; item *Proinherentia annularis* à cerebello dimissa, ad earundem partium figuram & magnitudinem in Homine propius accedebant. Quod autem præcipue notatu dignum occurrebat, hoc erat, scilicet quod Nervus Intercostalis, licet pariter ac in cæteris brutis affolet, eadem cum Paris octavi trunco vagina inclusus, per collum ferebatur, tamen iste ab hoc Neruo prope claviculam abscedens, antequam Plexus juxta superiorum costarum radices posito inferebatur, aliquot furculos in cor & appendicem ejusque fibras quasdam in diaphragmatis nervum mittebat: Quæ forsitan ex parte ratio est, cur hoc animal præ cæteris bestiis adeo solers & mimicum existat, atque hominis non modo gestus, verum passionem quasdam & getus, tam apte referre & imitari possit. *Willis Neurologia c. 26.*

S C H O L I A.

Nisi quod mole perexiguum, &c.] Vide Not. ad Obs. 9. *Nervi intercostalis Plexus (quem cordis & cerebri internuntium diximus):* Nervi Intercostalis descriptio nem & ramificationes vide apud eundem toto cap. xxv. præcedenti: Inter Hominem autem ac Bruium, quædam partes principales, nempe Cerebrum & cor, haud tam magnam disciplinam occurrere ait Vitæ Clav, quam est clava commeatum ab uno ad alterum, sive commercium quod ille partes ad se invicem habent: In utraque specie, propter functionis vitalis exercitium, spiritus animales ab *hypophyse* in præcordia constanti emanatione derivantur: quasi eorum dem influxu Nervorum Paris vagi ductus sufficiens videtur: quare in plethique brutis, & tantum hac via, & via omnino per illos Paris intercostalis nervos, adius ad cor aut appendicem ejus patet. Verum in homine Nervus Intercostalis, præter officia ejus in imo venire, hæc cum cæteris animalibus communia, etiam ante pectoris claustra internuntii specialis loco est, quæ cerebri & cordis sensa mutua ultra citroque refert: Cum etiam præter Vagi Paris nervos, etiam in præcordia humana arculos (qui certe ad functionis mere vitalis munia exequenda satis videtur) totidem insignes tam à prædicto plexu intercostali mittuntur, quodnam munus genus his attribui potest, nisi ut spiritus animales continerent, quorum opera & ministerio Cerebri & cordis mutual respectus & affectiones invicem communicentur? Dum hæc utriusque speciei differentiam perpendo, succurrit

animas Bistonum esse velut machinas apparatu simplici & minus operoso fabricatas, proindeque tantum unius generis motu instructas, sive ad idem prorsus agendum determinatas: Attamen in homine di versimode motuum series, & velut rotarum intra rotas complicationes apparent: Enimvero prædicti plexus commeatu, cerebri conceptus ita in afficiunt Cor, ejusque valvæ & reliquam, una cum diaphragmate, appendicem commoveri faciunt. Hinc sanguinis motus, ejusque in corde accensio, simul cum pulsæ & respiratione perficiuntur, proinde veto à corde alterato non modo eorundem nervorum ductu impressiones in cerebrum retorquentur, verum & ipsæ sanguis, cursu suo immutato, fluctuatione diversa aut inassecta cerebrum appellit, ad quæ spiritus animales variis impulsibus agitando, conceptus alios, & subinde alios, produci licet: adeoque propter has reciprocas cordis & cerebri affectiones, quæ longa serie vicissim propagari solent, cogitationum & phantasmatum multiplicitas oritur. Hinc veteres, tum Theologi tum Philosophi, Sapientiam in corde posuerunt: Certe prudentiæ & virtutum optima munus, quod cordi cum cerebro intercedit, commercio plurimum dependet, quippe ut cogitationes citra appetitum, aut iudicii actus, nec eliciantur, sanguinis fluxus in pectore coarctet, ejusque ac ipsius cordis inordinationes à nervis tanquam habentis tegi, inque motus aptos & sequitibus operet.

Idem ibidem.

OBSERVATIO IV.

Mentis Stupiditas à tumore globoso in cerebro, & a quo humore copioso ventriculos distendente.

Aspar Bonecuttius Nob. Eques sensum per biennium mente alienari coepit, adeo ut tandem omnino attonitus nihil secundum rationem ageret, & Cibum nec petebat, nec nisi per vim intrusum capiebat: lectum non nisi coactus petebat, sed ad mensam brachio innixus continuo dormiens fere sedebat, nec nisi interrogatus respondere

S 3 monitus

monitus, verba quædam, sed quæ ad rem minime pertinebant, proferebant: *stillebat* interim à *naribus pituita aquea* copiosa frequenterque. Quibus sic semi anni spatio se habentibus, tandem expiravit. In causis perquirendis nihil quod huic malo ansam præbuerit certius cognosci potuit quam *ictus capitis*, quo tribus aut quatuor annis ante percussus, cerebri imbecillitatem ab eo tempore cepit experiri, cum alias prius strenuus alioquin miles, nihil tale sensisset.

Calvaria post mortem ipsius aperta, cerebro diducto, *supra callosum cerebri corpus*, insignis tumor globosus, glandulæ instar carnosus, scirrhosus fungosusque, pomi mediocris magnitudine, deprehensus est, qui privata tunica investitus, venulisque erat confusus, ab omni tamen connexione cum substantia cerebri liber, adeo ut citra sectionem manibus exemptus, soveam insignem aqueo humore mox repletam, *quo & ventriculi admodum dilatati* diductique referti erant, post se relinqueret. Quem *globum* sua mole *cerebrum illiusque ductus comprimentem* irrigantemque, huius stuporis & torporis, tandemque mortis occasionem fuisse deprehendimus. *Plateri observationum lib. 1. pag. 13.*

S C H O L I A.

Ictu capitis] Iuvenem capite percussum semisærum evasisse, refert *Musæus* *Herculis* med. lib. 1. cap. 13. quem curavit forniculo suturæ coronali impresso: *Mildam* Cent. iii. Observ. 21, narrat, puerum decennem, ætatis vividi ingenii, memoria paulatim orbarum fuisse, post intellectus, ob depressionem cranii decimo anno factam: curationeque spreta, ac paulatim indurato cranio, depressionem cum functionum principum lesione ad extremum vitæ diem perdurasse. Vide *Borellum* Cent. 2. Observ. 73.

Tumor globosus] De tumore tunicato in cerebro genito, virginis & apoplexiæ causa, post consultationem capitis. Vide *de Presingione*.

Globum cerebrum comprimentem, &c.] Cerebrum porosum est, & in porosis & fungosis quasi ejus substantia spiritus animales generantur, continentur & moventur. Hi meatus & cavitates ut ad cerebri nutri-

tionem, spirituum generationem, conservationem, motum & in totum corpus distributionem necessaria sunt, ita illis angustioribus redditus illas actiones ledi necesse est. Angustie plures quid. in sunt causæ, hæc tamen meatus & cavitates præcipue obstringit ab Obstructione vel compressione. In dicto Nobili Compressione locum habet, quæ cum à causis internis vel externis contingit, inter internas sunt primo humores crassi & pituitosi; 2^o. sanguis ex vulnere, contusione, &c. 3. Valium *passionibus* *Adams*, 4. Ipsi cerebri substantia mollior flaccidiorque reddita; 5. ut hoc in casu, Tumor dumspondere illos meatus comprimens & angustiores reddens: generationi spirituum, illorumque libero exitui & commutui obstat, inter externas causas est cranii cerebri-que à causis externis compressio.

A P P E N D I X.

De Fatuitate à vitiosa cerebri conformatione, cujus indicium erat prava suturarum dispositio.

In fatuo Neopoli in Nosocomio Incurabilium cum M. A. Severino observavimus Sutures Capitis omnes uno quasi clivo exaltatas ac toro sublimiore prominentes: *Bartholinus* *Hist. xxx. Cent. ii.* In figura deviant Suture capitis Fatui cujusdam, quæ omnes uno quasi clivo exaltatæ eminebant. *Idem Anatomæ Reform. libello 4. cap. 5.*

S C H O L I A.

Suturarum prava figura vitiosæ cerebri conformationis index erat; de qua *Platerus* *Præteos* lib. 1. cap. 3. sic disserit: Conformatio prava cerebri, ut si nimis magnam aut parvam, vel alias non recte formatum existat Suseptam innatam, cum ab insitis causis à semine parentum, qui vel ipsi stulti fuerint, vel semen ipsorum aliquod vitium contraxit, hoc proveniat, plerumque procreat: Facillèque ex eo quod stulti facine ab ortu cogoscuntur, & quod caput cerebro inferni, magnitudine vel exilitate sui de-

formatione responderet: Quod vitium si ad nervos quoque aliasque partes peringat, non mirum hoc interdum vel ludos, vel motos, vel incurvos, aut strumosos aliòve modo viatos esse: Quam entè potissimum solutæ originalis causam esse, ut hæc ipsam deformationem interdum apparent, interdum non nisi sectione post mortem deprehensa ostendit: Theophrastus, qui minus decentem capitis figuram obtinuit, pravi ingenii & morum fuisse perhibetur.

O B S E R V A T I O V.

5. Stoliditas à lapide in cerebro reperto, Substantia ejus flaccida, & Cerebri cum cerebellomala coherentia, Defectu glandule Pinealis.

J Nicolai xiv. annorum adolescens, id ætatis inter rationis stultitiæque confinia traduxerat, semper somnolentus, semper capite obeso, ut si quid ageret quod hominem saperet,

peret, potius ex crepere cuiusdam rationis scintillis, quam ex vero ejus usu proficisci videtur. Is cum obisset in causam constitutionis inquitivi.

Substantia Cerebri omnino erat flaccida: *Pianwater*, quod in *hydrocephalo* fieri amat, ita laxè cerebro erat circumjecta ut nullo negotio posset ab eo separari; Cerebrum, non ut in hominibus sit, cerebellum magna ex parte obumbrabat, sed ab eo recedens, ut videre est in ovibus, nudum cerebellum primo aspectu oculis subiciebat; *Glandula Pinealis* ne vestigium quidem natura elaboraverat: An forte quia non decreverat homini huic indulgere (quod hic fieri quidam putant) animæ corporisque colloquium? An camphoræ instar aëri exposita in nihilum redacta? An denique resoluta erat instar salis ab humido? Ratiocinentur alii in quaslibet partes, Ego nihil nisi quod vidi & tetigi, aut alio sensu percepi in medium profero: Inter quæ aqua salissima, quæ priores duos ventriculos fatus hujus plus modica parte repleverat, quorum dexter etiam infusum servabat calculum colore albiæ antem, qui Medica statera examinatus grana pendebat tredecim: *Th. Kerckringius Observ. Anat. 35.*

S C H O L I A.

Glandula Pinealis ne vestigium] Castellus, ejusque sequaces, nobilissimum usum huic assignant, Animam quippe vult in hac sola sensibilibus externa, & omnes ideas quæ à quinque sensibus proficiscuntur,

apprehendere tanquam in centro & discernere, atque deinde ejus ope spiritibus ad varios nervos mittere: Vide de hac opinione judicium Clar. *Borlæus Anat. reform. lib. 3. c. 6.*

OBSERVATIO VI.

§. *Ossum capitis crassities nimia soliditatis indicium est & feritatis.*

Si præter modum ossa capitis crassa fuerint, indociles & parum à feris abhorrentes ac obliviosos ostendunt; Talia sunt Indis Hispaniolæ, ut *Oviedus* refert, atque adeo dura, ut consensu inrer Hispanos conveniret non esse ferienda capita, tametsi nuda, Indorum, quod enses frugantur: *Cardanus lib. 12. de Subtilitate.*

OBSERVATIO VII.

§. *Mentis stupor a sereno humore bile perfuso caput replente &c.*

Illi Virum horripilario cum lassitudine invadit mane, circa noctem oblivio & desipientia quædam obrepunt, &c. Aperro capite, aqua plurima in tora stagnans reperta &c. *Vide lib. 4. Tit. de Febribus.*

OBSERVATIO VIII.

§. *Fatuitas à cerebri siccitate in superficie.*

Mercator in carcerem conjectus totum se melancholiz immergit: 10. à captivitate mense fatuissimus factus & repuerascens &c. Cerebrum siccissimum inventum, durum, summa parte friabile &c. *Vide Tit. de Catalepsi.*

OBSERVATIO IX.

§. 1. *Mentis stupor ob cerebri molem justo minorem, & gyris paucioribus instructam.*

Vir Illustr. parentibus proavisque, aut cerebri aut nervorum dispositioni alias morbidæ obnoxius oriundus, circa ætatis *Sexuæ* stupore affici cupit: Dum cranio aperto morbi causam perquirimus, primo occurrebat cerebri inolem justo minorem & gyris paucioribus instructam fuisse, unde spiritus animales non satis copiose productos suspicari fuimus: *Vide Tit. de Convulsione.*

S C H O L I A.

Et si mentis stuporis nulla fiat mentio, eam tamen colligere licet ex causis præcedentibus: immediata, paucitate spirituum; Mediana, cerebri mole justo minore & gyris paucioribus instructa: Si spiritus animales, *inquit Simonius Præst. lib. 1. cap. 15.* sunt pauciores quam par est & deficient, omnes animales actiones languent, & ex defectu spirituum actiones

principis facultatis immutantur, abolentur aut depravantur: ut enim dum pondus nimium facultati moventi imbecilli offertur, tremor excutitur: Ita dum obiectum sensibile principi facultati debili offertur, Imaginario & Ratiocinario, obiecto non satis proportionatæ & debiles, vacillant. Homini præ cæteris animalibus ignobilioribus, ob functionum

animalium præstantiam & numerum, grande cerebro concessum est: Si inquitur quid cerebro gyri & convolutiones præstent? Respondet *Widius* Anatom. cerebri cap. 10. datos esse cum propter uberiores alimenti spirituosæ receptionem, Tum ob

commodiorem spirituum animalium in quoddam usus dispositionem ad varios Imaginatiois & memorie actus, intra certos & distinctos cancellos commotionem motuumque istorum per eisdem tractus sive orbitas iterationem crebriam. Vide plura L. c.

OBSERVATIO X.

Fatuitas nativa ob cerebri molem iusto minorem & tenuiorem.

A Pud *Widius* Anatom. cerebri cap. 3. Figura 4. extat affigies cerebri humani cuiusdam adolescentis, ab ipsa nativitate Fatui, & ex eorum numero qui vulgo Lemarum subdititii perhibentur: Cujus cerebri moles cum tenuior ac iusto minor fuerit, limbus ejus ulterius elevari & reflecti potuit, ut interiora quævis penitus conspicerentur.

OBSERVATIO XI.

§. Stupor mentis à vitio duræ meningis pustulis obstruæ, Cerebri spiritus nigro sanguine refertis, unde compressio anteriorum cerebri ventriculorum. &c.

Iuvenis diu in carcere detentus, languidus decubuit, perpetuo *Stupore* afflictus: Secto capite, pustulæ supra duram meningem apparuerunt, erosa ipsa, & cerebro per foramina eminente pluribus in locis: Omnes ejus spiræ nigro sanguine refertæ erant: In ipsa etiam substantia copiosus latebat, unde inflammatio exorta erat, & hanc ob causam anteriores ventriculi vix in conspectum veniebant: Ejus substantia mollior, sanguine pituitoso affluabat.* (*Vide Tit. de Epilepsia.*)

OBSERVATIO XII.

§. Stoliditas à vesicis corpori calloso incumbenibus.

Sacerdos quidam stolidus subito factus est, & paulo post apoplecticus: Repertæ vesicæ aliquot rotundæ, albidæ, humore pituitoso repletæ, supra corpus callosum. *Dem. Panarolum Pent. 1. Observ. 17.*

S C H O L I A.

Supra corpus callosum] Quod propter hunc finem seondum est (ex mente *Widius* Anz. cerebri cap. 10.) ut in eo spiritus undequaque confluentes,

velut in propria sua sphaera expandantur & facultatum animalium actus exercere incipiant. *Vide plura L. c.*

OBSERVATIO XIII.

Mentis stupor à seroso humore caput opplente.

Illi. Vir cum febre oblivione & desipientia prehendirur: Reperta aqua plurima in toto capite stagnans: *Vide Tit. de Febribus. lib. 4.*

OBSERVATIO XIV.

§. Mentis hebetudo ob anteriorem cerebri cavitatem sanguine cum feri copia plenam.

Iuvenis (*de quo Tit. de Paralysi*) post resolutionem unius lateris paulo postea in mentis hebetudinem quandam & torporem incidit &c. Capite aperto, anterior cerebri cavitas sanguine partim ichoroso, partim concreto & grumoso, cum feri copia implebatur.

OBSERVATIO XV.

Mentis stupiditas ab aqua cerebrum inundante.

Colonæ invisi puerum cui caput in incredibilem molem increverat: Cranio mortui dissecto inveni in duobus anterioribus cerebri ventriculis, aquam ad lb. xviii. à qua substantia cerebri ita distendebatur ut gyri non conspicerentur: Hic ingenio plane fuit destitutus &c. *Vide Tit. de Hydrocephalo.*

OBSERVATIO XVI.

*Mentis & totius corporis torpor & hebetudo à flacciditate cerebri pituita perfusa,
Polypo in corde.*

Momma Baxius, homo torpidus ac hebes, occisus repente à morbo artonito, obtulit secanti Chirurgo cerebrum adeo flaccidum, & membranas ipsas tam frequenti pituita perfusas, ut opus fuerit spongia eam detergere: Qua eadem pituita replebantur utique & venæ per cerebrum dispersæ, nec minus sinus falciformis: In ventriculis quoque non tantum plurimum aquæ, sed & spinalem medullam udam: Polypum quoque invenimus in sinistro cordis ventriculo, ex coniecta pituita formatum &c. *Vide Tit. de Apoplexi.*

OBSERVATIO XVII.

Fatuitas à summa siccitate cerebri superficiei. Retis mirabilis depresso.

Civis Leodiensis à melancholia in Furorem transit; Medicamentorum opè ad mentem rediit, sed post fatuissimus factus & repuerascens: Illi post obitum siccissimum cerebrum, adeoque in summa parte digitis friabile, flavedine citri æmula, utriusque ad altitudinem digiti tinctum, observatum: Rete mirabile depresso &c. *Vide tit. de Catal.*

S C H O L I A.

A cerebri siccitate] Ab ejusdem frigidityte, fatuitatem sed frigorem indutam animadvertit Excell. *Bartholinus* lib. 88. cap. 6. In tribus puellis nubilibus, quæ hyeme inventæ in theca circumductæ, domum reversæ, velut extra se capæ fatæ videbantur, per 14. dies, quas pelle vervecina calente, nuper à vervece detrahta, capiti imposita retinebat: Mentis

quoque stuporem, à spicuum fixatione observavit. *Idem* in Naura quodam, cui pedes frigidissimi aquæ immectis, redeunt ad cerebrum ex calcimels sanguine alterato, ei id algoris particeps fecerant, adeo ut vix annum (postum emendando) iussisset.

Retis mirabilis] In proverbio est, quod quando aliquis stultus apparet, dici solet, *Carni rete mirabile.*

OBSERVATIO XVIII.

*Stupiditas mentis in quodam cui lobus Hepatis, qui pertinet ad diaphragma, niger
exterius deprehensus est.*

Quidam morosus, stupidus, melancholicus: Lobus ille Hepatis qui pertinet ad diaphragma, erat niger exterius, ad palmæ latitudinem intra parenchyma. *Vide lib. 2. tit. de Vaci læsione.*

OBSERVATIO XIX.

Fatuitatis inveteratæ nulla in cerebro causa deprehensa.

Nobilis Virgo circa VIII. ætatis annum à vespertione demordetur: Paulo post stupor mentis accessit: adeo ut domi ad 35. annum conclusa maneret: Aliquot ante obitum mensibus de ventris doloribus conqueritur, qui mentis errori adscribuntur: Tandem morte subita abripitur: Viscera omnia limi & mediæ ventris corrupta inveniuntur, cum terrissimo fæcore, unde causa mortis evidens fuit: Cum dissectioni præfesset caput quoque; aperiri curavi, in quo cerebrum integerrimum, absque omni labe deprehensum est.

OBSERVATIO XX.

§. Oblivio excitata à serosa colluvie cerebri anfractus exteriores ejusque poros alluente.

In unaquaque fere Lethargi specie advertitur quasi signa pathognomonica semper adesse, & pari passu succedere Torporem & Oblivionem: Morbi hujus insyltum graviolem passi, si quando in declinatione ejus vi quadam excitantur, rerum omnium oblitii, haud propria aut amicorum nomina recordantur: Eriam qui pocula hæc lethæa aliquando parcius biberunt, quantum in somnum proclives sunt, tantum etiam in memoria deficiunt, ita ut superrime actorum immemores, idem sæpius agendum repetant, & eandem questionem multoties propolitam proponant: Quoad cæteras facultates, quales sunt Ratio, Phantasia,

Phantasia, potentia Sensitivæ ac Locomotivæ, earum deliquia aut defectus, juxta somni & memoriæ enormitates proportionantur: Eadem ergo causa quæ soporem Lethargicum, eadem & oblivionis causa est, serosa scilicet colluvies cerebri anfractus exteriores, ejusque poros & meatus corticales subiens, quam sæpe observatione Anatomica sæpe seprehendisse testatur *Willisius* Tract. de Anima Brutorum. Vide *ut. de Soporosis affect. cap.*

S C H O L I A.

Prospecto & somnus & vigilia ac memoria, eandem partium & locorum affectiones sunt: cujus non leve indicium est, quod experientia satis vulgari constat medicamentis opiana, quibus somnus provocatur, crebro exhibita memoriam ledere: Quin & ipse memini quendam ab hypnotico fortiori assumpto, postquam scilicet laborans plures dies & noctes insomnes degisset, memoriam quoad longe

præterita, fere in totum amisisse: Cam vero somnus excedit, memoria deficit, in quantum scilicet spiritus cerebri exterioris incolæ, aut egressi, aut tractibus suis expulsi, nec è corpore calloto cerebri corticem irradiant, quo fiat imaginatio & vigilia: Nec inde introitus latius, & vestigia præterita repentes, rerum ante actarum ideas, sive imagines representant. *Mem. ibidem.*

A P P E N D I X.

- §. A Lienis constitutione pendet morum diversitas, ut quibus sit coloris rubicundi, ut animi indoles ad hebetudinem, otium & molliem inclinet: Quibus coloris lividi, ut solentia, sagacitate &c. præditi sunt.*

Doctissimus Velschius in Liene fermentum, quo sanguinis particule segriores ad activitatis statum perducuntur, contineri, uti summe probabile constituit; Quippe animadvertens quod in pueris, aliisque temperamento sanguineo, & habitu corporis obefiori præditis, uti mores & animi indoles ad otium, molliem & hebetudinem inclinant, Ita Lien semper coloris rubicundi & sanguinei, uti hepar, florido repletus fuerit: hinc concludit in his Lienem, uti partes genitales ante pubertatem, aut in clumbis, minus officio fungi: E contra vero quandoquidem in viris circa mediam ætatem, præcipue in istis qui sunt vultus severi & corporis gracillioris, uti solentia, sagacitatis, constantia ac fortitudinis indicia se produnt, Ita Lien coloris lividi, & sanguine velut cænofo imbutus reperiatur: Hinc insuper arguit sanguinem in Liene, velut conditorio, diutius aservatum plane in fermentum abire, quo reliqua ejus massa subinde inspirata subtilisctur magis, ac spiritus acutiores in regimine tum animali tum vitali progeniti supponit enim corpora nostra naturaliter humiditate nimia scatere, qua quidem partium & viscerum plerorumque functiones plurimum hebetantur: At vero Lienem massæ sanguinis communicare partes solidas, constantes, firmas nec facile dissipabiles, atque has detergere illam humiditatem, simulque aliquatenus à sanguine & spiritibus illam molliem auferre, quæ in tenella ætate præpolleret, eo ferme modo quo Boreas, aut ventus orientalis, siccitate & robore suarum partium, aërem ventilans & intime penetrans aëri & corporibus nostris robur inspirat. Vide plura Sectione de Melancholia.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMÌ

SECTIO XI.

De VERTIGINE.

OBSERVATIO I.

Vertigo à seroso humore cerebri anfractus alluente, ejusque ventriculos replente & Arterias venisque coalitis, cum glandulis plurimis & duris adfistis.

TALVS quidam mercator, bene coloratus & bene habitus, in virili ætate sensim cepit vertigine laborare, quæ ætatis decursu adeo invaluit ut nec ambulare, nec in lecto se erigere quin corrueret, posset: Sic autem otiosus decubans dies noctesque in lectulo, cibum nihilominus capiens & bibens sanorum iustar & dormiens, mire factus est obæsus, atque eo modo multos annos, scabie interim quandoque infestatus, perduravit, tandem verò *Cere* correptus in somnum profundum incidit, quo diebus aliquot elapsis expiravit.

Causam indagaturi, antequam calvaria scutella detraheretur, à sectione vulnerata illa crassa meninge, aqueus humor copiose per faciem in corporis, quod erectum nonnihil erat, humeros pectusque defluens lintamina admodum madefaciebat. Calvaria dein pars separata, cum tenaciter duræ matri connata esset, ægre ab ea, & non citra illius dilacerationem avelli potuit. Intrinsicus omnes cerebri anfractus & ventriculi aqua madebant: Vas venosum, omnesque arteria induratae callosæque factæ occalluerant; distinctisque globulis toto ductu undique in capite, ad ipsorum juxta infundibulum insertionem usque protuberabant.

Ex quibus & aquam, longo tempore in capite collectam fluctuantemque & vertiginis & cari subsequentiis causam fuisse, uti & arteriarum illam obstructionem vertiginis deprehendimus: *Banbini Theat. Anat. cap. ultimo. de Similiariis partibus: Platerus obs. l. 1. p. 101.*

Repletionem cerebri ab humore aqueo, tam seroso quam pituitoso factam, vertiginem causare certum est, Quod ex ipsorum relatione constat, qui de fluctuatione in capite conqueruntur: Er aperta calvaria hanc humoris immensam copiam sæpe invenimus: In eoque cui arterias quoque occalluisse diximus, tantam illius copiam deprehendimus, ut aperto crânio undatim deflueret: Quæ & una cum arteriarum illa obstructione, geminam causam vertiginis proferens, eam tam diuturnam & incurabilem effecerat. *Idem Praxis lib. 1. cap. 7.*

S C H O L I A.

VT Vertiginis causa morbosica, & sciendi modus p. nat. eruat, inquirendum quo ritu eadem ali. cõio à rebus non natur. concitari solet, 1°. Quando humores aliquandiu circumgyratur, tum in motu isto omnia circumgyrari videntur, tum etiam à circumgyratione cessantibus phantasma illud persistit: Cujus apparitionis causa dependet à fluxu ipsius animalium substantia: Quippe inera cerebri sunt nervi non locos habent ac aqua, aut densa vaporum congeries phalæ inclusa, quæ una cum vase continente circumgyrat, & factio semel vertice, etiam vale quiescente, motum istum aliquandiu continuare persistit: Pari modo, cum quis circumgyrat spiritus cerebri incolæ, ab ista capitis, tanquam vasis continenti, circumductione, in motu torquiles ac velut spirales aguntur, eumque ideo solito induræ, & directo jubare nervos irradiare nequeant, hinc vos cum visibilium rotatione, sæpe scotomia & pedum vacillatio inducuntur: Hemisphærium vi-

sibile vocari videntur, quia spiritus speciem excipientes circulariter moventur: quare si quidem sensibilis receptio, recipitur per modum recipientis, prout spiritus ita objecta in orbem moveri videbuntur.

2. Ionius ab alio & ponitum transitus V. exaltant, in quantum ab objectis inassuetis, necnon à corpora sine, aut intellectu periculoso, imaginationi terror instigatur: unde ipsa valde sollicita quo pacto spiritus in nervorum organo rite ordinet, ac firmius dirigat, eos in cerebri medullarum revoCAT, adeoque à solito affluxu & irradiatione pervertit, cumque eorum aciem melius instruere, & certius dirigere satagit, cura nimia in confusionem quandam ac motum irregularem adigit: quare ebrii ac audaces, quia de spirituum animalium aurigatione minime solliciti sunt, nihil quicquam tale patiuntur; Navigatio, aut vectio lo contra, Vertiginem infert, quia spiritus valde fluxiles nimis agitati, tanquam aqua in vitro concussa, inordinatæ huc illic transiunt: Porro pterique in navi aut curru circumducti,

circumducti, etiam vomitioni sunt obnoxii, quia spiritus motu nimio & fluctuatione confusi in mēte rapi, nervorum parvis vagi capicella inordinate incurrunt, ideoque ipsos & motus convulsivos in visceribus excitant: 3. Ebrietati vertigo velut pathognomicum accidit, item Nicotianæ fumo, quod scilicet liquore aut vapore exhibitis, particula quedam effertur ac indomita, sanguinis vel lacri nervoli commearu cerebro inferuntur, quæ spiritibus animalibus, si quidem incongrue ac improportionate sunt, occurrant, eos hic illic, à follicis itum & redituum tractibus abigant, adeoque in vertices ac gyros agunt.

Hæ sunt præcipue causæ evidentes solitarie quæ Vertiginem in hominibus quibusvis excitare valent, cujusmodi effectum occasiones istæ producant, in quatuor spiritus animales extra statas series, & ordines suos perturbant, nunc intra cerebri meatus hic illic fluctuant & inordinate moventur, tum solitæ irradiationis suæ in nervosum genus quadam quasi fila intercipiunt: Enimvero, hæc duo sese semper reciprocata se munio excipiunt, & ab invicem dependent, Nempe Spirituum intra cerebri medullium perturbatio, eorumque effluxus in nervosum genus impeditur, quicunque de causa alteratur affectus interitur, mox alter subsequitur: Corporis circumpagatio, Vestigio in curru aut navi, ebrietate, insulsius Nicotianæ fumus, spiritus in cerebro inordinate circumstantes, qui proinde statim à debito in nervos affluxu inhibentur, ut affecti via stare aut progredi valeant: Pariter est contra, Intuitus ab alto, ponticum transitus, languor aut syncope ingruens, spiritus à solita in nervosum genus emanatione revocant, qui proinde intra cerebrum tumultuantes, aut inordinatus commoti: Scotomiam aut obiectorum circumrotationem inducant:

Inquirendam, his præmissis, quot modis à causa interiecta & præternaturali Vertigo induci solet? Super his annosum Vertiginem quandoque symptomata esse, ab affectu quodam alio modo intra cerebrum, modo extra ipsum confuso dependens; Interdum vero hunc per se motum esse, qui intra cerebri medullium excitatur, molestus admodum & terribilis, sæpe etiam exitu difficilis existit: Quo ad prius, plerique morbi cephalici, dolor acutus, lethargus, epilepsia, carus, apoplexia &c. Vertiginem sæpe adiunctam habent, in quantum scilicet aquabilis spirituum expansio, eorumque exinde in genus nervosum irradiatio, à variis ejusmodi causis moribificis facile interrumpitur: Cæterum hoc symptoma interdum ob affectum alios, longe extra cerebrum confusos produci solet, idque duobus potissimum modis, Nam 1^o, afflicto est Scotomiam oriri propter sanguinis affluxum à cerebro decrepente avocatum, ut in syncope ejusque approximatione: magna incidia, improbo labore, hæmorrhagia immentia, longæ jejuniis, violentiis stillicibus aut menas passionibus &c. si quando sanguini motus in corde deficit aut vacillat, ita ut altitudo in leporhythmum proclives sint, statim quia liquoris vitalis tributum subducitur, etiam spiritus animales in cerebro deficientes irradiationem in nervosum genus suum subtrahunt: quippe cum eorum ita torgeo præcandidatur, qui imperitiles sunt, ab emanatione sua resiliunt, confusi in cerebro oberrant, & affectus vertiginosus & non raro deliriosus erant.

Secundo spirituum animalium à viscere quodam, aut membro externo, inordinatus in cerebrum recurrere, non raro vertiginem inferre, in quantum scilicet spiritus à parte affecta, longa per nervorum ductus seque perturbant, dummodo alius cerebri medullium in-

colentes perturbant, inque partes à se ipsa obliquæ, propter hanc causam est quod humor, s. acres veniculoli fibras vellantes, quod materies sæpe infesta & irritativa in Liene, Pancreate aut Intestinis commota, leves in cerebro icotomias parit: Novi à dolore acuto, ulcere & spicacelo in pede aut brachio confusis, spirituum in cerebro quasi turbationes, & vacillationes crebras & leves inducitur fuisse:

Dum concepta spirituum inordinatio à loco affecto per nervos in cerebrum transferatur, formicatio, seu velut auræ frigide alencus peritenti videtur: quare hujus affectus causa vaporibus inde ad caput elevatis vulgo adscribitur, quem errorem alibi lais refutavimus: Porro quod multis cum jejunavimus, aut prandii horam diutius protrahimus, oculi obfuscati & caput rotati solent, & deinde max à levi commotione nebulæ istæ evanescent, si non quæ populi vox est: ita coniungit in quantum à stomacho vacuo flatus & vapores ad caput ascendunt, quos alimenta ingesta mox supprimunt, sed quoniam ventriculi fibre & filamenta nervosa iuncto nutritio quo irritari amant, destituta contragunt & ipsos leviores inire solent, cujusmodi ipsi & spirituum inordinatio, tum, liquidum per ductus nervolos in cerebrum continuatur, affectionem vertiginosam producant, quæ quam primum stomachi fibre contragiones suas remittunt, sponte cessat: Ob hanc rationem novi quodam à vomitorio exhibito, & ventriculi tunica lætescente, vertigine immixta conceptos: quæmo à cibis dyspeptis, aut cerebro ingruis affectum istum nonnunquam oriri suspicor.

Attamen vertigo non tantum symptoma, sed interdum primario & per se morbus est, cujus naturam ut penitus indigemus, inquirere oportet in subiectum ejus, rationem formalem & causas:

Vertiginis subiectum immediatum proculdubio sunt spiritus vitales, quos unusquisque hoc affectu laborans valde perturbatur, siquæ deinde obveniat percutit: Subiectum vero mediatum istæ cerebri partes sunt in quibus imaginatio & sensus communis resident, & inde in genus nervosum proxima via ducit: hæc sunt autem corpora Callosa & Sniara: Enimvero spiritus animales intra hæc loca medulloso quali in campum amplissimum quæqueris expandi & exasperari amant; quare sicut lucis radii medullarum omnes poros & meatus densissimos inbare plerumque & iterato trajiciunt: hinc dum una serie est corporis callosi oris extimis (nempe est corporis striarum & cerebri gyris) versus medullium & ejus blandie scintillant, imaginationes & phantasias incedas representant; damque alia serie & fortan per alios meatus illi est corporis callosi medullio in cerebri gyros emanant, notiorum referas pro memoria illos transmittunt, atque dum exinde in corpora striata & nervorum osti- gines tendunt, partes omnes motiles actuant, & ita quoties occasio fuerit, motum incedendum inlinditas deferunt: In vertigine autem aquabilis istæ spirituum, velut radiorum lucis emanationes, variis in locis intercepti & diversimode perverti videntur: quippe spirituum manipuli quidam obcurantur, alii alio inflectuntur, hæc illic in gyros & vortices aguntur, & non raro in transversum rapiuntur: Quapropter in cerebro, ob spiritus ita perturbatos phantasmata confusa, sensibilibus species vagæ & inconstantes, aut circumactiones representantur: dein quærens irradiatio in nervosum genus minuitur aut inhibetur, icotomia & functionis motivæ deliquit: ac vacillationes sequuntur: Quod si adhuc amplius inquitur à quo impellente, aut vias obstruente, spiritus

ita intra cerebrum aut deviare, aut cumulati coguntur? Probabile videtur tales eorum inordinationes à duplici causa pendere; scilicet, quod particule quædam effice de extraneis, cerebrum una cum succo nervo aliis ingresse, spiritibus adherent; eoque in moris enormis agunt: hoc autem à vini aut aquarum adentium potui immo dico, oculosque fumo in-
adfectio, vegetabilium quorundam etia, ab inunctione mercuriali quibusvis accidere cum experientia vulgari constat, in quantum scilicet corpuscula quedam heterogenea, & spiritibus infecta, eos usque in cerebri medullarum allequuntur & corripunt, quidni è sanguine aliisque humoribus plurimum vitiatum, ejusmodi particule morbosæ & vertiginosæ suggeri, inque cerebri conclave penitus insinuari possunt? dein
2. suspicari licet quandoque illavim serotina una cum succo nervo sensum interpere, & cum aliis demum penetraverit, pusillimas has medullas contamine, ejusque poros valde infarcire, proinde ut spiritus animales non luce clara & plena, sed debili, & multis quasi umbellulis intersectis fracta irascant. In vertigine habituali ac inveterata, causam consuetam utraque hæc complecti, indicio non levi à juvenilibus & lædendis desumpso constare videtur, nam in plurimis observari affectionem istam ob duo
causas genera in pectus aut melius alteram fuisse, nam quæcumque intus limpa particula turgida, & plus nimis effecti & effectivæ aptas præsignunt, uti vina, aque ardescentes, alimenta piperrata & stultenta vertiginosus fere afficiunt: nec minus notum tunc propter occasiones quibus cerebrum impletur & plus infarcitur, uti sunt cæpula, somni meridiani aut matutini protractiores, venus astrinus, aer humidus, nebulosus & crassus; habitatio humilis & paludosa, percipiunt: E contra autem idem à victu tenui & leviori, etiam à cibo sulo, atque solo aperto & peristano plurimum adjunguntur: Hæc de Vertiginis Subjecto, Ratione formali & causa Coniuncta, jam in causam Protracticam inquiritur, Ob quem scilicet apparatus, sive prædispositionem morbidam gemina hæc spiritibus cerebri medullarum incolentibus labes inferri solet: Hic autem in culpa deprehendimus esse cum cerebrum ipsum, cum Liqueore

iriguo; Tum sanguinem cum humoribus inquinis: Hujus tepidissimi vitium est quod à recta crasi in temperiem aciem, acidam aut alias vitiosam degener succum nutritium pervertat, ac insuper in suo loco secum & faculentis vari generis congerat, quas præsto est in caput suffundere: Plures autem sunt causæ evidentes, scilicet mala victus ratio & errata in quo naturalibus; item scorbutus, scabies diuturna aut maligna, alique morbi prægressi, propter quas sanguis adeo cacochymicus & dyscrasius nuxius evadit; Interca cerebri cimen est, quod temperies ejus humida & debilis, compages laxa & minus firma, cum potis debito apertioribus & nimis dehiscensibus existunt, proinde ut particule quævis heterogeneæ & elasticæ, limulque recte crementa serosa, aut alias morbida, è sanguine in caput suffusa, in cerebrum una cum succo nervo facile admittantur, & propter meatus ejus magis potentes usque in medullas, scilicet corpora callosa & fibrata, sunt obice decumbant: Hujusmodi cerebri nimis laxi & dissoluti habitudo, quibusdam innata & originalis existit: Porro qui tenere sunt constitutionis, scilicet viri ac femine, delicatæ, pathici & molles, quorum spiritus nihil fortius suffere valent, diathesis vertiginosam facile contrahunt, seu potius lucrescentem habent: quatenus nimirum cerebri spiritus, cum alienis incuriosis resistere nequeant, materiz cuiusvis appellenti aditum præbent: Cæterum aliis licet robustis, victus inordinatus, vita sedentaria, frequens cæpula, item somni ac studii intemperitia: insuper scorbutus, inveterata cæcæxia, febres diuturnæ, & morbi alii cephalici pravam hujusmodi cerebri dispositionem non raro accersunt, Quoad morbi hujus sedem, notandum, illam modo interitis, acuti videntur, in corpore calloso contingere, fere tantum in incipiente spirituum ramulos & vascillationes, atque notionum & sensationum ætus vagos, inconstantes & sæpe confusos habere: quandoque autem materiem morbosam potius circa corpora fibrata decumbentem, & eorumiam functionibusque motivæ deliquia cire, ut sæpe oculi oblaqueantur & gressus vacillent. - *Id. Ibid. Trail.*

de Anima Brutorum parte 2a.

cap. 7.

OBSERVATIO II.

§. Vertigo à sero caput replente ob suppressam urinam.

Ioh. Baptistæ d'Ornano Polemarcho, cum per dies undecim *suppressa esset urina*, In aperto cadavere inventum caput aqua plenum, causa vertiginis: Ren unus macilentus: Inter alterum & ureteres, durities inventa quæ aquæ fluxum impediverat. *Scipio Du Pleix in historia Gallica.*

OBSERVATIO III.

Vertigo ob ventriculum cerebri sinistram compressum; dextrum aqua limpida distentum &c.

Miles acinace sauciatus in posteriore capitis parte &c. (*vide historiam tit. de Paralyti*) ventriculum cerebri sinistram aliquantulum compressum: dextrum vtrò minime depressum, sed aqua limpida distentum ostendit: In sinistro plexus choroides pallidus, in dextro rubicundissimus apparuit: Ex dictis causam Vertiginis &c. habemus. *I. Sculpetum Armam. Chirurg. Observ. 19.*

T

OBSERV.

OBSERVATIO IV.

Vertigo ab aqua limpida in ventriculis cerebri & substantia.

Puella cum febre vertigine fuit affecta. Cerebri substantia prorsus erat madida, aqua irrigata; ventriculi omnes eadem impleri: vasa meningum sanguine turgida: *Vide lib. 4. Tit. de Febris.*

OBSERVATIO V.

§. Vertigo à vermibus in cerebro.

Anno 1571. grassatus est morbus epidemicus, paulatim vertigine affigens, 2. 3. aut 4. à decubitu die jugulans: Aperto cerebro repertus est (in quodam) lumbricus rubens, indice digito longior &c. *Vide Tit. de cap. dolore. Observ. 116.*

OBSERVATIO VI.

§. Vertigo ab abscessu sanie effundente in cerebri substantiam.

Rusticus aliquot vulnera in occipite & vertice accepit, quæ ad cicatricem fere perducta: 9. à vulnere die febris & scoromia supervenit &c. Sanies inventa est purulenta in ipsa cerebri substantia: In dextra occipitis parte pellicula instar abscessus contenta &c. *Vide lib. 4. Tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO VII.

§. Vertigo à sanie & muco in sinistro cerebri ventriculo &c.

Iuveni melancholia affecto, post incubo, &c. accessit Vertigo epilepsie finitima &c. Cranio dissecto prodit cerebrum qua venulas nigricans & lividum, cui in superficie inerrabat materia pauca saniosa; In sinistro sinu copiosa sanies cum muco ac materia putrescente &c. *Vide Tit. de Convulsione.*

OBSERVATIO VIII.

§. 1. Vertigo ab abscessu in cerebro aqua limpida repleto.

Anno 1634. narravit mihi Nicol. Reuten Chirurgus de suis oviculis, quarum una laboravit Vertigine, Ex relatione pecoris magistri, hoc malum pulchrioribus fere esse commune, ipsasque, toto cerebro in aquam converso, tandem subita morte perire: Dicitur igitur Chirurgus oviculam vertigine & longa circumgyratione debilitatam mactari jussit: mactatæ caput aperui: detectis meningibus cerebri substantiam, ejusque anteriores ventriculos perlustrans, ne guttulam aquæ repertis: hic 3^{ma}. & 4^{ma}. inspexi, in quibus pariter nullum aquæ vestigium invenire licuit, sed tertius concreto sanguine repletus comparuit: postea olfactus organa manubrio scalpelli anatomici officio elevavi, & in sinistro latere, inter cerebrum nempe & piam matrem, inveni abscessum instar vesicæ piscium, aqua limpidissima repletum, ptopeque oculum sinistram substantiam cerebri subnigram: Ego miratus fui, cum in hoc malo ipsissimum cerebrum afficeretur, cur ovicula non potius convulsionibus aut paralyti, quam vertigine laboraret.

§. 2. Anno 1645. una ex meis oviculis simili vertigine interit: quare secul caput, & ablato cranio, substantiam cerebri cum omnibus integumentis examinavi, statimque in sinistro occipitis quasi latere, sub dura matre folliculum, instar piscium vesicæ, crassum, aquaque & vermiculis, quales in caseis generantur, repletum, incipiebat enim ad fundum putrescere: Hic autem tumor tunicatus, magnitudine ovum gallinæ superans, in cerebri substantiam ita se insinuavit, ut tertium ejus ventriculum nonnihil comprimeret: hæc ovicula, opillone recte, tota sui interitus die in dextram sese partem circumgyravit.

§. 3. Quod accidit superioribus oviculis, illud etiam hominibus evenire potest: observavi namque similem affectum in Maria N. quæ post contusionem syncipitis à me curatam,

eam, per integrum annum de sola vertigine gravissimas querelas habuit, remediisque frustra usurpatis *Apoplexia* fortissima subito obiit.

Aperta calvaria, inspectoque cerebro, in sinistro latere tumorem, quoad folliculum & materiam contentam, superiorum duorum postremo non abimilem, qui magnitudinem ovi gallinae mediocri adaequans tertium cerebri ventriculum ex parte compressit:

Quaerentibus quoniam hujus tumoris tunicati causa extiterit? Respondi, nec forsitan adeo male, quod cerebrum ea parte vehementer percussum, debilitatem quandam contraxerit, ob quam affluens alimentum non in cerebri, sed in descripti tumoris substantiam fuit conversum, *J. Scultetus Chirurg. Armamentar. Observ. 10. & 11.*

OBSERVATIO IX.

Vertigo à vesiculis aëneo humore repletis, in cerebri ventriculis.

Vertiginum gravissimarum causam nonnunquam esse vesiculas, aëneo & seroso humore plenas, in tertio ventriculo conspicabiles, plus vice simplici in ovibus, & fœmel in homine animadverti. *Relatiæ Dissert. Anatom. lib. 1. cap. 13.*

Anno 1650. cum juvenca in pascuis crebrius vertigine corripeteretur, mactata fuit: capite aperto, ac cerebro denudato, sinistrum latus sub incipite tumidi & mollius reperit, quod cum durius attrectassem, profilit aqua limpidissima, faciemque mihi conspurcavit, tumor subsidit: divulso cerebro ad corpus usque callosum, ventriculum sinistrum aperui, *inveni vesicam tenerrimam* totam ejus anteriorem partem occupantem, quam citra ulteriorem lacerationem integram extraxi, superantem ovum gallinaceum magnitudine: In ventriculo, tam verticem versus superius, & infra, asperitas leviuscula, ubi vesica annata erat, apparuit, ac si feminibus papaveris albi aspersa fuisset: Ventriculus iste sinister duplo major erat dextro in anteriore parte: superior ejus pars & lateralis tempora versus, propter extensionem, tenuis & vix cultelli dorsum crassitie aequavit: cætera sana erant.

Retulit mihi N. frequentem esse morbum boum apud Subylvanos in Helvetia, se Vertigine prodentem; ac bubulcos esse qui ipsi medeantur hac ratione, primum malleolo cranium post cornua pulsant, ubi ex sono aliud vacuum spatium, ac ordinarie sunt in cranii bubulis, percipiunt: statim in pulsato loco perterebrant, ac foramini pennam induunt, & attracto spiritu vesicas hujusmodi extrahunt: Si in superficie existat, prompte succioni cedit: Si autem profundior & cerebro immersa sit, successu eos frustrari dixit, ac proinde semper lanis huic operæ adit, ut si de animalis valetudine desperetur, ipse curationis telam absolvat. Exempla curatorum se vidisse adseverat. *Wesferus de Apopl. p. 69.*

S C H O L I A.

Inveni vesicam tenerrimam] Hæc in brutis invenitur vesicæ, ex membrana vemiculos succingente enata, imitatur hydatidam aliarum partium, argumentum mihi sunt non adeo tenue esse ut valgo credimus,

vel tam porosam & spongiosam esse ut Clariss. Riolanus existimat; alias vel milles à tanta aquæ copia ruptæ fuissent, nec unquam ad hanc molem creviscent. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO X.

§. 1. *Vertigo ab Abscessu magnis juxta cerebri dextrum ventriculum cum Hydatibus, &c.*

Vrsula Aberlin (*vide histor. Tit. de Paralyfi*) ex pondere gravi capite gestato, sensit manifeste aliquid intra cranium ruptum fuisse: Hinc de Vertigine querebatur, ob quam pronam se casuram verebatur, hujusque sedem dextram potius partem dicebat, cum cerebrum præcipue turbari ibidem distincte sentiret. &c.

Olla calvarie ablata, divisa dura meninge, copiosum serum effluxit: Cerebri portione ad ventriculum dextrum usque ablata, protinus ex illa exiit aqua turbida: Dilatato amplius hoc ventriculo, occurrit abscessus ovi gallinacei magnitudine, peculiari tunica, crassitie pennæ columbinæ vestitus, cujus oppositum latus versus tempus dextrum expositigebatur: Inciso hoc folliculo aqua turbida subfusca effluxit &c. *J. Jac. Wesf. Diss. de Apop. p. 398.*

§. 2. Hydatides majores intra ventriculos Jumentorum Vertiginis causa vulgo creduntur, atque hujus causa ad eximendos folliculos aqua plenos trypano cranium perforatur, & vesiculæ sectione per pennam facta proliciuntur, ut supra, Obs. 9. memini: Id à rustico Berovienfi, hujus artis perito, Gurtvix 1664. præstitum, atque aliquot hydatides extractas fuisse vidi: Verum cum pluribus hydatidibus, quarum quædam nuce moschata non

minores erant, eductis vertigo non cessaret, Jumentum necessario protinus mactandum judicavit, quod plures in profundioribus cerebri partibus laterent eaque lethifera: In mactati animalis ventriculis cerebri, præcipue sinistro, & paucate intergerino, cerebrum à cerebello distinguente, ubi cerebrum respicit, plurimas inventi, plerasque instar ovorum serpentinorum, aut lacertarum coherentes, & tum internæ ventriculorum membrana: medullam operienti, tum parieti dicto accretas.

§. 3. Amicus quidam meus vidit in prædio suo vitulum anniculum inter armenta sua, ob Vertiginem semper ad latus inclinare ab aliquot septimanis: noluit illum veterinarii dubio experimento exponere, sed protinus mactandum curavit, & capite integro me donavit: Ablata olla & dura meninge, cerebri pars anterior quasi fumo denigrata apparuit, quamvis nunquam in fumoso stibulo commoratus fuisset: Detracta tenui meninge, cerebri superficies sanorum instar albebat: In dextro ventriculo nihil p. n. nisi hydatidis in plexu choroideo, ubi ejus ala cum sinistra jungitur, prope glandulam pinealem, apparuit: Aperto sinistro ventriculo, mox grumus sanguinis, longior & major ovo gallinaceo secundum longitudinem dimidiato, durus, tenax & granulis minutis, rotundis, albicantribus, feminis papav. albi aliquomodo similibus conspersus occurrit: Ventriculus ad methodum Excell. D. Sylvii undique dilatatus triplo amplior, ejusque tabularum superius tenue, verum multo tenuior & quasi membranacea erat pars ejus posterior cranio incumbens, ibidemque superficies interna sordido vulnere similis, inæqualis & viridis apparuit: deterfis blande fordibus, secedebant corpuscula lentis magnitudine, viridia, casco Glaronensi colore & consistentia similia: Plexus choroidei ala sinistra amplior, crassior & densior erat naturali, aliquot centenis granulis, magnitudine feminis papaveris albi conspersa, ea serie composita quæ semina bombycum aut araneatum conspiciuntur: In nullo ventriculorum lymphæ aut serum redundavit: Proccellus mammillares ambo caverant & sinistro dexter amplior, aqua limpidissima plenus: Grumum sanguinis non demum post mortem concretum existimo, nam citra percussionem capitis necabatur: Sinister ventriculus ita distensus erat, ut foris anfractus oblitterati essent: grumum compactum erat quam ut talem firmitatem statim à mactatione nancisci potuisset, ut taceam granula quibus aspersus erat: Granula ista, quæ ad manus, exsiccata, subflava sunt & pellucida instar succini.

S C H O L I A.

P Ostitum Cephalalgia (*Urstia*) sævior reclusit, accessit ei vertigo, qua sibi prone cadendum crebra, cuiusmodi casus periculum auxilii brachii sinistro pondus ab oedemate: Hujus vertiginis sedem ipsius dextram parietem esse designat, quia manifestè hanc turbati senserat: Proculdubio tumores duo insignes in ventriculo dextro, causa Vertiginis mente Augusto vaserunt, qui æne insulsum Hiempleticum, & postea demum aliquot elapsis mensibus hanc nondum excitarent, quia minores adhuc erant, & ipsorum animalium cursum nondum comprimendo medullas substantiam turbant, donec

ab erroribus in victu majorem molem acquisivissent: Plexus choroideo, utrinque glandulis alaribus & pellucidis referto, nullam vertiginis culpam tribuere possum, cum ab illo nihil ad cerebrum deferatur, verum sanguis à cerebro relictus per illum ad sinum quartum & iocular deducatur: Nisi quidpiam velis ob glandulas lymphæ turgidas sanguinis cursum retardatum aliquomodo fuisse: Serum intra meninges, anfractus & ventriculos stagnans forte quoque non in censum causæ Vertiginis veniat, quia copiosius apud Jac. Spreng. nullum existit.

Idem ibidem.

O B S E R V A T I O X I.

Vertigo excitata à repletione cerebri ab humore aqueo, sum ferofo tum pituitoso.

R Epletionem cerebri ab humore aqueo, tam ferofo quam pituitoso factam, Vertiginem illam causare quæ Apoplexiam & Carum præcedere aut minari solet, certum est, Quæ frequens & diuturna, & nisi præcaveatur, in hosce morbos terminari cum vitæ summo discrimine solet: Vt cum hoc refrigerando & humectando cerebrum non facit, cum agitato hæc spirituum quæ in Vertigine sit, sic potius impediretur quam promoveretur: Sed sit hoc cum cerebri anfractus spatiaque adimplens, maxima copia calvariam replendo, & statum simul copiam generando (qui ex aqueis humoribus sæpius quam vapores generantur) in ea fluctuat: Tunc enim sicuti in cordis involuero aqua redundans, cum agitur, palpitationem cordis facit, ita & hic cerebrum undique opplens, cum caput movetur, agitatus humor & capitis motum sequutis, talem sensum capiti præbet: Quod ex ipsorum relatione qui de tali fluctuatione conqueruntur, satis patet: *Et aperta calvaria hanc humoris immensam copiam sæpenuero invenimus, sicuti in apoplexia dictum. Platerus Præcox Tomo I. p. m. 183.*

OBSERVATIO XII.

§. *Vertigo à pleuritidine vasorum meningum, cerebro suffuso sero, aqua limpida in ventriculis.*

PUella febre laboravit absque calore aut siti lucens, vertigo fere continua molestabat &c. Mortuae calvaria aperta, vasa meningis perreptantia sanguine turgida conspicebantur, quasi tota cruoris massa in capite aggereretur: Cerebri substantia humore aquoso supra modum irrigata videbatur, ventriculi omnes aqua limpida repleti: *Vide lib. 4. tit. de febris. Ex Willis.*

S C H O L I A.

Vasa meningis perreptantia] Impediri hinc circulatione sanguinis: Sanguis autem vertiginem inducit, aut quia fervidior in oculis *est digne* domi restagnat, hinc inordinatus spirituum commotio, ut motus: Aut quia dum impurus & cacochymicus ad cerebri per arterias transferitur majoris à corde proportionis, hinc in minores, fibres suas non d. ponit in

membranas narium aut faciem, sed impetus ingreditur angustissimos cerebri ductus ac ipsam medullam, sic turbat spirituum animalium motu, Aut quia recto tramite non decurrit ad cerebrum, sed ob impedimentum & angustiam vasorum, exspit in via, inordinatumque spirituum motum inducit.

Ex lib. 1. cap. 9.

OBSERVATIO XIII.

§. *Vertigo à Phacelo cerebri in Bove genita.*

VETRES capita brutorum infestare creduntur, cum præter consuetudinem delirare solent: Tales subinde in cerebro Equorum vili: De quibus observat *Laurentius Rufus*: Equum semel vernibus infestatum nunquam in posterum ex solito agilem, tamen si integra valetudine appareat: In Bove Jani Johannis, Cauponarii Hagstedani, aliter observarum, in quo Vertigine laborante, cum mactaretur, Universa cerebri compages nigricans visa instar atramenti, & sicut aqua dilfluens, præsertim sinistra parte, ad quam plerumque vivus caput flectebat; Humide ætatis vitio id contraxisse existimandum; *Hipp. draculo Coaca 187.* Sideratos septem dies evadentes perire scimus si os disparatum apparuerit. *Bartholinus Act. med. anni 1671. Observ. 33.*

OBSERVATIO XIV.

§. *Vertigo vitio ventriculi, nigro succo ex dimidio pleni &c. excitata.*

ADolefcens (de quo lib. 3. Tit. de dolore ventriculi) cætapul indulgens, cepit vertigine laborare &c. In aperti cadavere inventum Epiploon putrefactum, Hepar siccus, ventriculus interior ad finem quasi contusus, nigro succo ex dimidio plenus. *Hollerius lib. proprio observat. 21.*

S C H O L I A.

INde Vomitoria in vertigine sæpius prodisse constat, cumque vertiginosi non raro sponte vomant, hinc opinio indolevis morbi causam fere semper in ventriculo lægere, quod iecus habere ostentum: Emetica autem juvant, quia maxima humorum à cerebro fit revulsio, & ipsius in eo tumultuantes quamprimum coercentur: Quando ventriculi & viscerum juxta consistorum membranz & fibræ velleantur, in eas partes valii humores, scilicet nervus, serosus, lymphicus, pancreaticus & biliosus attrahuntur, adeoque emulgentur, ut hæc &c. eorum affluibus immixtis periret, quin & plurimos jamjam ipsi impactos facile excutit: Dein quoad spiritus animales, alibi ostendimus inter eos stomachi, aliosque cerebri incolas maxima semper commercia

intercedere: proinde ut ventriculi ab assumptis affectio grata vel ingrata, spirituum in cerebro degentium ovationis aut dejectionis inferat: optatæ dum adhuc in cerebro commorantur Soporem accerfunt: Pariter in vertigine, aliisque morbis cephalicis, quò spiritus cerebri usque deque aberrantes, & enocimeter agitati reprimantur, ac in ordoies redeant, non parum conducet si contocili ipsorum, sive alines, intra ventriculum, à phlegmate inlante, consilientur, quippe dum in horum subsidia plurimà cerebro evocant, alii superfluit inordinationes suas remittentes, memia prestina resistent: Hinc certe est quod Emetica in affectibus manicis opem sæpe egregiam conferunt, usque adeo ut Empirici quidam his fere solè utantur. *W. lib. 1. cap. 390.*

APPENDIX I.

De Vertigine gravissima, memoria jacturam sibi adficiente, delirium & paralyfin, feliciter curata.

Genetosus quidam 66. annos natus, cum à longo tempore vertigine leviori, & sere tantum occasionaliter excitari solita, obnoxius degisset, circa finem novissimi Autumnii affectu illo gravius laborans etiam obliviosus fiebat. Hunc, postquam per tres circiter hebdomadas agrotasset, invisens, vultu & aspectu, utriusque vigore diminuto, valde immutatum reperi, Hunc, cum quotidie ad vesperam febricula, cum pulsu alto & vehementius vibrante afficeretur, sanguinem imprimis è brachio, & post 6. vel 7. dies è podice detrahendum præcepi: Insuper vesicatoria statim cervici, & subinde pone aures, etiam cauteria pro duabus amplis fontanellis inter homoplatas excitandis applicanda curavi: intus remedia cephalica cujusque fere generis horis medicinalibus quotidie sumebar: Intra mensis spatium recuperari visus, totas deambulare & res domesticas curare coepit: Ineunte vero hyeme à frigore, dum quotidie foras prodiret, contracto, in febriculam cum majori spirituum intra *ἡμέρας* perturbatione incidit: nam vesperi quotidie delirium, quod agere aut diceret parum conscivit: verumtamen intra 7. aut 8. dies, febre post sanguinis missionem & victum tenuem evanescente, cerebri affectio à pristino statu immutabatur: nam vertigine prorsus cessante, obliviosus valde, simulque in toto latere dextro paralyticus evadit: De capite sæpius interrogatus, num clarum illud, scotomia & phantasmatis confusus immune esset? respondit quoad ista nunquam intellexisse, nam bene intellexit infirmitatem suam, amicos &c. salutatum venientes cognovit, vix ullorum vero nomina recordari potuit: cumque de rebus quibusvis colloquia intrer, verba decant quibus animi sui sensa exprimeret: dein quoad latus affectum, in brachio & crure dextro, non modo resolutio talis & *ἀσθενία*, verum in utroque insuper tumor oedematosus ingens accreverat, in tantum ut non inodo curationis, sed & vitæ diu prorogandæ spes sere omnis deponeretur, imo magistratus officium jamjam alii cessagitabant: Utcunque ab opera therapeutica non desistebam: Aegro sedulo ministrans, pilulas solutivas ex intervallis sumendas, atque aliis diebus remedia cephalica, antiscorbatica, antiparalytica, horis medicinalibus capiendi dabam: Capiti raso emplastrum è gummi & balsamis imponendum, parres resolutas oleis & balsamis illinendas & fortiter perfricandas præcipimus: Dum hæc aguntur, cum aliquali quoad majorem intellectus claritatem successu, nescio qua de causa media hyeme in febrem incidit, adeo ut singulis noctibus cum calore & siti ingenti, somnoque interrupto valde æstuarer: lingua torrefacta & scabra pulsus altus, urina rubicunda & contentis saturata erat: phlebotomia abstinuius ob senium & paralyfin, & præcipue ob hydropem in latere affecto inchoatum: attamen victu tenui è jussulis hordeaceis & avenaceis imperato, iulapia, apozemata, aliaque remedia sudores & urinas moventia de die in diem adhibeo, cumque hoc tempore fontanellæ juxta homoplatas excitare copiose fluere, æger quoad memoriam & paralyfin melius habere coepit, & deinceps ab utrisque his affectibus, simulque à febre sensim convalescens, & quotidie proficiens, intra sesqui mensis integram sanitati restituitur, & etiamnum sanus vivit,

SCHOLIA.

In hoc ægotante marces morbosæ motus & varia metastasis notabilis fuit, nam quæ primo cerebri medicullio, scil. corpori calloso, insidens vertiginem insanabilem excitabat, eadem postea adacta, ac (ut probabilis est) ulterius in cerebri adactum distans, prior affectui oblivionem superinduxit: dein quatenus marces eadem à febre commota & paulu-

lum discussa, parim in corpus unum striatum decedens, hæmiplegiam insidit: partimque in cerebri ambitum expulsa memoriam penè sustulit, corpore calloso interea sudum obducens: denique novitate alterius fibris adminiculo fuit, quod marces morbosæ ab utroque his ultimis focus discussa penitus eliminaretur, Aegro ad sanam restituito. *Th. Willis ibid.*

APPENDIX II.

Vertigo aquæ limpidæ per nares stillatione desinens.

Novi aliquos Scotoniæ & affectibus vertiginosis valde obnoxios, quibus sub finem paroxysmi aquæ limpidæ ingens copia exallarit, cujusinodi evacuatione, velut critica, paroxysmus terminari solebat.

Novi

Novi feminam illustrem cephalæe immani, nec non Vertigine infestari solitam, quæ cum a gravi paroxysmo melius habere cœpisset, primo in cerebri fastigio motum formicantem, velut aquæ itequentis sentiebat: Dein motu isto paulatim anctus & deorsum progrediente, deinum aquæ limpidæ plures guttæ e naribus exstillabant: hoc symptoma illi passim obtingere solebat, ut minime dubicaret ægra quin lymphatica ab ipso cerebro exstillaverit.

Hæc ratio suadere videtur cerebri ventriculos, sive cavitatem à limbi ejus complicatura factam, esse meram humoris excrementitii cloacam, quodque humores illic congesti per nates & palatum expurgentur. *Willis Anatomies cerebri cap. 12.*

APPENDIX III.

De Vertigine emetico curata.

Theologus sexagenarius, postquam per tres circiter menses vertigine leviori, sive spirituum in sinu cerebra velut coruscatione laborasset, tandem morbo ingravescente *enormis* insuper ac caducus evasit, lutantum ut inter deambulandum quandoque promus in humum corrueret: Ad curationem vocatus, phlebotomiam cum cathartici leni ex intervallis repetendas præscripsi; insuper electuaria & mixturas sedulo exhibui, vesicatoriis itémque aliis administrationibus minime neglectis: Postduas septimanas nullo ex his levamine insecuto, Vomitivum ex sale vitrioli & infusione croci metallorum propinavi, à quo cum decies & facile vomeret, exinde statim melius habuit, Et cephalicis altetantibus per duas circiter septimanas adhuc amplius usus, perfecte convalescit, & ab eo tempore per sexennium vere atque autumno vomitivum, cum pharmacis quibusdam aliis quotannis cepit, & etiamnum integre valet. *Willis ibidem pag. 333.*

APPENDIX IV.

Vertigo Antidiluvii curata.

Vertiginosi cujusdam importunis querelis defatigatus, post alia multa remedia incassum tentata, præscripsi tandem ut mensis spatio Pulveris sequentis cititer cochlear his in die quotidie assumeret, superbibendo haultum decocti Salviæ aut rosinarini, Cofsee tinctura imprægnati, ℞. pulv. rad. pæon. mar. ʒij. flor. ejusdem contusor. & Sole exsiccator. ʒi. stercor. Pavonis albi. ʒi. sacch. albi. ʒij. m. Vix credibile quantum ab hoc remedio juvamen recepit, post mensem me denuo invisens, novus & altet homo visus est, vertigine immunis, confidenter ambulans, res domesticas curans, negotia quævis ardua tractare valens. *Idem ibidem p. 356.*

OBSERVATIO XV.

§. Vertigo à Semine in vasis seminariis conclusa.

Nobilis coitus addictissimus, ab eo per sex menses abstinens Vertigine concutitur, post Epilepsia eneatus est. Dissiecto corpore nullum vitium in ventriculo, cerebro reperiunt; sed in cavitate vasis semen in penem deferentis, quæ semine oppleta visa est, cum ulceribus sordidis inde contractis. *Vide Tit. de Epilepsia.*

OBSERVATIO XVI.

Vertigo à nigro succo in ventriculo contenta.

Quidam erapula indulgens cœpit Vertigine laborare: Ventriculus inferior ad finem quasi confusus erat, nigro succo ex dimidio plenus. *Vide lib. 3. tit. de Ventriculi dolore.*

OBSERVATIO XVII.

Vertigo à concrecente in venis sanguine.

Puella cum per diem capitis gravitatem, vertiginem, &c. passa esset, die sequenti moritur, In arteria magna & in vena cava totus sanguis coalescat, &c. *Vide Tit. de Syncope.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO XII.

De EPILEPSIA.

OBSERVATIO I.

*Neque cerebrum neque meninges subjectum sunt Epilepsiae, quod illa sequuta non sit
us à pure vellicatis.*



NOVI abscissa in dura matre excitato, & postea disrupto, cum à pure fortis-
simo meninx tenuior & cerebri cortex exederentur, agrum primo in *Stu-*
torum, & demum in apoplexiam lethalem incidisse, qui tamen in toto mor-
bi decursu symptomate quovis Epileptico immunis degebat. *Witth. Parhel.*
cerebri cap. 2.

SCHOLIA.

EPilepsia subjectum, sive sedem ubi materies mor-
bifica praesertim subsistit, reperire difficillimum
est: neque enim probabile est eandem per cunctas
cerebri partes diffusam: Nec tamen conitar in quo
loco singulari ea diffusa, ceteras omnes partes in
subito in eisdem noxe contentum trahat: E variis
sententiis duae prae ceteris magis probabiles videntur
& pari verisimilitudine assensum sibi vendicant:
 quarum una affectu cerebri medullarum, atque alia
Meningis ipsam invadentes esse primariam Epilepsiae
sedem: Prioris ratio in hoc fundatur, quod ubi ipsi
tum animalium som & ipsius animae sensitiva origo
constitit, ibidem huius morbi causa poni debet: nempe
cum principes fibrarum pulso laeduntur, ceterae
eandem noxae facile participant: venum enim
vero ut concedam in Apoplexia & spirituum Deliquio
ita habere, autem in convulsione, cujusmodi est
Epilepsia, non sequitur fibras & nervos omnes con-
velli, quia cerebri medullarum pars convellitur:
quippe hoc cum sit mollius & fluidius substat, ac
motus & sensus expertus, Contractionis sive altitudinis
spasmodicae minime capax videtur: Quapropter alii
Cerebrum & quavis ejus partem à morbi hujus cul-
pa eximentes, causam ejus omnino in meninges reji-
ciunt, afferentes membranas cerebri invenientes,
ac in primis illarum procellus cerebri ac cerebelli
fissuribus instructos, siquidem à materia morbifica
vellicantur, spiritus innames conspiciere: Dein à
meningibus istis contractis & dilatis, una cerebri
inclitum valde compingi & contrahi, ita ut poris
& meatibus ejus contractis & clausis indicatur, simul-
que nervorum & viscerum, quibus itaque meninx ap-
penditur, in contentum illarum perducit, etiam motus
convulsivos inane. At mihi ab hac sententia dis-
cedere visum est, quia nihilum haud constat quo riu
& quam ob causam imminente caduco, meninges itq
ipsas adeo horrendos concipiant: quinsimo nec
liquet quomodo ab istis, aut convulsis, paroxys-
mus Epilepticus inducatur. Quoad putas, impossi-
bile videtur meninges, quoad totas earum concavitates,
ita contrahi, ut illarum maxillae à clausis contractis, con-
tenta sua undique convellant ac in spacium angustius

contendant: quippe dura mater pluribus in locis cal-
varia humilime cohaeret, quin & illi pia mater, juxta
suum procellum, multo membranis nexu, &
ubique praetera vasorum continuare colligunt:
hinc facile patet utrumque membranam quoad ma-
gnam sui partem immobilem esse, itaque ipsas in-
versales nequaquam incurrere: Quod vero ad piam
minges animi, ut cum meningibus hujus, est illius, aut
talis uniusque portio quaedam convellatur, revera
talis evocare concedimus: nam lapsus audivi cepha-
lalgia graviori affectus, de magna partem sub cal-
varia laere, modo dextro modo sinistro consistant,
contractione immansur quati: nec tamen exinde
alios calici ipsius sequuntur. Porro ut membra-
nae istae intelligat laer vellicaciones maximas sub-
eant, haud propterea tamen paroxysmus epilepticus
inducti solet. Novi enim abscissam in dura matre exci-
tato, & postea disrupto, cum à pure fortissimo men-
niet tenuior & cerebri cortex exederentur, agrorum
primo in *Stutorum*, & demum in apoplexiam lethalem
incidisse, qui tamen toto morbi decursu sym-
ptomate quovis epileptico immunis degebat: Item
meningi duam matrem, cerebellum à Chiasmis Inpe-
rito adhibito valde dilaceratum: In alio casu cum
parte calvariae per visum abscissam, ut portio quaedam
cerebri exuberaret, nec tamen cuilibet horum
pallentia quavis epileptica supervenerunt. Quapropter
nec verisimile est sanguinem aut humores,
vel vapores meningibus istis impactos, majorem no-
xam inferre, quam aut plagam aut vulnera istis in-
flicta, aut tandem illi substat. Praeterea epilepsia le-
viori affectu, si quidem via concidit, ac per totum
morbi initium adhuc animo constant, membranas
ita contrahi, & cerebri globum à clausis compingi
percipere si ejusmodi quaedam affectu subacti
verum illi à contra cerebrum quasi inflatum, &
spiritus cum effusione quidam exallentes ac velut
explosos persentire videntur. Et quidem, aut veri-
simillimum, abbor paroxysmus epilepticus à spi-
rituum animalium cerebri incolatum (qui nempe
sunt primum & immediatus hujus morbi subje-
ctum) subita quidam rarefactione & explosione
concitari.

concocti: qua scilicet cerebrum ipsum inflatur adeoque insensibile redditur, simulque nervi appenti in convulsionem aguntur. Hinc enim vero contingit lumen morbi accenditionem desuper incipere, & perficere terminari, sine magna materiae mobilificae provisione aut reliquis, quia nempe libes non tam paribus fidelis quam ipsi spiritibus insensetur.

Alibi ostendimus (Vide *Scholia ad Obs. 1. Sædienti sequenti*) quo ritu copula heterogenea & explosiva, particulis uti videtur nitro sulphureis constans, spirituum animalium particulis spiritibus salinis accrescentis, ab illisque ob plenitudinem aut iritationem densa elisa & explosa, symptomata convulsiva producit: quamvis autem ejusmodi copula spasmodica, è sanguine in cerebrum primo exillatur, plerumque tamen spiritus ibi non prebendit, aut cum his saltem illic non diu hospitatur: quin potius versus appendicem nervosam illico detrusa, ipsamque particulares, & juxta loca affecta respectivos accersit: Interdum vero si quidem materies spasmodica ubertur & potens, atque cerebri consuetudo imbecillis fuerit, copula heterogenea spiritibus non tantum in nervo genere, sed etiam intra ipsum *hypothalamum* confinis affusa, diarrheam epilepticam insensetur, quæ ipsissimum & copulæ istius particulæ explosivæ ab invicem elisa caduci paroxysmum citius: Quandoquidem enim urgente Epilepsie insultu, *ab alio dicitur*, plerumque symptoma primum & fere pathognomonicum existit, insere licet spiritus animales, intra ipsam cerebri medullam scaterentes, ante alios affici, proindeque partem tam esse principalem morbi sedem: Dein quicunque aggravisatus casus sive in humum projectus, atque membrorum & viscerum ipsam *hypothalamum* illi succedunt, sequitur spiritus animales etiam systematis nervosi incolæ, eadem particula explosiva imbuta, cumque ipsi cerebri incolis in consensum trahi, ab illisque ad explosiones pariter inordinatas excitari, licet aliquando (sola spirituum tum in cerebro tum in nervo genere constituta series, insit longius pul-

veris pyri tracti ad explosiones prædisposita) ipsissimus exterior & è longinquo, forsan in membro quodam aut vilitate incipiens, posterius in cerebrum traducatur.

Inerim ipsius cerebri regio semper hujus morbi sedes primaria statuarur, atque pro affectus causâ conjuncta supponere debemus, non aquam in cerebri ventriculis contentam, nec humorem crassum aut viscidum, ejus poris & meatibus impositum, tales enim causæ sensum gignerentur, & proinde signa quædam paroxysmi imminenti præsumpta ederent: porro accessione morbi finita talis materia non ita brevi tempore penitus discerneretur, quin à reliquis ejus functionis animalis impedimentis quadam manerent, quod equidem in Epilepsia, nisi inveterata, rarius contingit: Attamen pro caduci insultu excitando, nihil minus suspicari licet quam spiritus animales, qui intra medullam cerebri substantiam scaterentes, sensus interioris actus perficiunt, copulam heterogeneam usque inordinatè explodi, proinde illis extra ordinem & stationes suas perturbatis, superiores regimini animalis scutulares eclipsim pati: Dein ab hac majori ipsorum explosione, velut à summe ignis, spiritus alios, appendicis medullaris & nervosæ hospites, etiam in explosiones prædispositos, similes à *nebris* concipere, paritèque explosos, corporum commensum motus convulsivos citere.

Quamvis enim cerebri medullam semper esse primariam Epilepsie sedem, & ab initio fere tantum in illa regione materiam mobilificam congeri statuamus, tamen affectu ingravescente hæc ubertus in caput delata fines suos lares explicat, adeo ut particulæ spasmodicæ, & in reliquo cerebri, & insuper in appendice nervosa, tanquam pulveris pyrii, sive seminis explosivi strata, huc illuc, longe lateque protensa jaciuntur, quo fit ut primo *ab alio dicitur* insultu convulsiones modo in his, modo in illis pagibus & non raro in toto corpore excitæ superveniant: *W. B. P. Pathol. lib. 1. cap. 1.*

OBSERVATIO II.

Lithopathica Epilepsia ex ventriculorum infarctu non semper suscitatur.

Quæ in cerebro fit Epilepsia, apertè eorum qui è vivis decesserunt capite, animadvertita est sæpius aliunde suscitari quam ex ventriculorum infarctu: Causam interdum deprehendi cerebri abscessum esse: interdum corruptam meningis portionem calvæ adhærentem, *summo dolore, quibus loci teter vapor in cerebri ventriculos penetrabat. Fernelius Pathol. lib. 5. cap. 3.*

SCHOLIA.

Hinc (insert.) non sola noxi humoris copia Epilepsiam inditiguit, quod in Sopore, ejus copia inut citra convulsionem: Quocirca præter humoris copiam, venenata & cerebri substantiæ graviter infensa atque inimica qualitas Epilepsie causa statuenda est, quæ quoties exagritur ac propeit in cerebrum, ea quidem feriente, cerebro autem contra pugnante, quasi à collisione quadam & dimicatione, fit Epilepsia: Ejus autem, *addit lib. 2. cap. 15. de alio rerum casu*, quæ ipsomet affecto cerebro fit, nopaliam videtur quam ejus quæ per consensum fit, causa: ut enim aliquando observavimus è summo capitis vertice, in

quon sub pericranio variatus venenosusque humor coerceretur, vaporem manifesto sensu intro subire, qui Epilepsiam concitaret, hancque postea caustico persanatum medicamento, ita proculdubio extirpari debet, intus vel circum meninges, vel circum cerebri substantiam visum contineri veneni æmulum, cujus ex intervallis imperu facto Epilepsia suscitetur.

Quibus à loco, &c. Idem ibidem, Vili est *inquit* Epilepsia quæ à summo vertice capitis originem habet, equo vapor quoque versum excurrens, si per externas partes solum vagabatur, vertiginem: Sin intro penetrabat in cerebrum, Epilepsiam citat,

OBSERVATIO III.

Epilepsia suscitata à carie cranii, parte interna juxta cerebellum.

Juvenis xxx. annorum diu capitis dolore vexatus, tandem in melancholiam taciturnam incidit; Sed capitis dolor, quando tunc temporis mitigari videbatur, ob affectu partis innatum calorem quasi emortuum, Epilepsia vehementissima corripitur, cujus paroxysmo tertio extinguitur.

Dissecto cadavere, diligentèrque calvaria: osse in posteriori parte interna, quæ perpetuo ante dolebar, perspecto, nullum ibi notabilis morbi signum notavimus. At capite aperto, *osse posterioris interioris partem*, juxta cerebellum *satis notabilem cariem* contraxisse vidimus: Terigimus ea in parte foramen quoddam, ad denarii magnitudinem, quod quidem usque ad summam laminam, exclusive ramen perveniebat.

Conjectandum hinc Epilepsia: & mortis causam, fuisse malam quandam auram ab osse & partibus affectis in cerebri substantiam sublevatam: Cujus mali causa exterior nobis fuit incognita, nimirum *capitis illinitio ex hydrargyro frequens*, non scdandi doloris gratia, sed aliam ob causam: Hydrargyrum autem usque adeo frigida est, ut vi narcotica dolores quovis sopiat quidem, at partium remutare corpora omnia, vel etiam durissima ossa subeat penetraretque, emolliat atque dissipet; unde frigiditate cerebrum valde offendit, nervos & artus valde infirmat, inde tremor & paralytis, necnon partium frigidarum corruptio aut caries, ut dentium aliorumque ossium. *Zecchi Consult. ix.*

S C H O L I A.

Hinc credendum Epilepsia: in hoc subiecto causam interiozem fuisse, vel malam quandam auram à carioso osse in cerebrum sublevatam; non frigidam etasimque materiam cerebri ventres obstruentem: Ideo sum in ea sententia vitium hoc sequi morbum in via, non obstrucentem ventriculorum cerebri, ab humore frigido, crasso, lento, quod vult Galenus, sed potius, adstrictionem seu angustiam meatuum ipsius cerebri, scilicet eorum ad melle enjulsam auræ, sive penitus humori gravet molestantis expulsiorem, quo deinceps excluso statim in pulsinum restituitur statum; qualem monum in ligula edit ventriculus, ubi acri mordent hamore, aut corrupto cibo mactatur, vel etiam cibi copia grauat. *Idem ibidem.*

[*Cariein satis notabilem*] Ramerum Observ. lxxv. notat Io Sartore vesicæ lue summe laborante & Epileptico, esse repperam crasam calvaria: partem posticam, saniatam fuisse redditam, quæquam postremo e a tæchio iustificativo & Epilepsia: paroxysmo succubuerit.

[*Capitis illinitio ex hydrargyro frequens, aliam ob causam*] Multos ipse vidi inde Epilepticos evasisse, quod in curanda lue Venerea, dum unguentis ex hydrargyro illinebantur nonnulli in autem & io cerebrum pene-

traisset. Talem igitur & in omni alia Epilepsia causam existimato, atque si quid aliquando putridi humoris inesse deprehenditur, non ex ea ipsa putredine, sed ex venenata quæ concepit qualitate, hoc mali suscitari: Itaque quocunque corpore in loco is fuerit, venenatus illius vapor in cerebrum sublatu, id ipsum meningisque totius substantia: insinuat acriter ferit. *Fernetus de Abduis lib. 2. cap. 15.*

[*Osse posterioris interioris partem*] Ex Hippocr. lib. de vultu. cap. Cranium est duplicatum, *duorum*, in capitis medio, id est cavum intra duas laminas, ut medullarem suum continet: ad nutritionem ossium: Addit Hippocrates, universum caput cagna pane excepta, spongiam replet plenam carneculis humidis, quas si digito premas sanguinem stillare cernes. Etiam tenuis venulas discentes videbis sanguine abundantes Ex illis carneculis vehementiore ictu collisus sanguis expressus & putrescens os corrumpti, foris integro apparens, sed exudans sanies ab interiore tabula cerebrum ipsum corrumpti ac putrefacit. Externam laminam igitur lues Venerea eredit, & utramque interduam vita lupescit, teste Palmerio Lde lue c. 4. Exemplum simile leges apud Renrenium lib. de Abduis c. 18. Et nos sæpius id observavimus. *Rotanus Encheirid. Anat. lib. 6. cap. 7.*

OBSERVATIO IV.

S. Epilepsia à Vitio duræ Meningis pustulis obfusa, & perforata, nigro sanguine per cerebri spiras sparsa, cum inflammatione, hinc ventriculorum constrictione, &c.

Anno 1788. obiit juvenis qui diu in carcere derentus, Epilepsia correptus erat cum aliis symptomatibus, diu enim languidus decubuerat, perpetuo *sopore* afflictus.

Secto capite, pustula: supra duram meningem apparuerunt, erosa ipsa & cerebro per foramina eminente pluribus in locis: *Omnes ejus spiræ nigro sanguine repleta: erant:* In ipsa etiam substantia copiosus latebat, unde inflammatio exorta erat, & hanc ob causam anteriores ventriculi vix in conspectum veniebant: Communis humore seroso plenus, Rete autem mirabile totum flaccidum apparebat: cerebelli substantia, præterquam quod solito esset

esset mollior, sanguine etiam pituitoso affluebat. Hinc ad pulmones devenit, qui costis & sterno adligati flaccidi omnino erant, mole tamen magni humore spumoso repleti, dextro lacte inflammari: Similiter & cordis ventriculus dexter sanguine plenus repertus est, sinister vacuus: hepatis unus quasi globus apparebat, stupendæ magnitudinis, laudabile alias & sanguine bono abundans: huius mole ut cedent renes, ipsi quasi venæ cavæ ad ipsam dorsum adalligati erant: *Rumicrus Observ. 53.*

S C H O L I A.

Epilepsiam credo per consensum ortam esse, cum postula illæ, quæ uisq; ad calvariam exerebantur, motu Gallici ioboles fuerint, cariem autem ex luce, etiam uisq; ad membranas progressam, si modo opportuno medicus accesserit, nunquam letalem fuisse experientia constat. *Idem ibidem.*

In ipsa etiam substantia copiosa latet, &c. Vnde Apoplexia extrinsecum colligit, in hanc enim sapienter Epilepsia observata. *Wissliu.*

Rote mirabile totam fluidum] Edulio scilicet sanguine in ipsam substantiam cerebri, ut fieri solet: Quæ vero de cerebello itidem opplero addatur, firmius de sententia G. H. Schmidt fecerit, quam per doctæ de tuniculari Hætophileo foveat, licet & reliquum cerebrum excludi non debeat. *Idem.*

Epilepsia correptis cum alia symptomatibus] Sic complicitatem videtur Phreniticam cum Epilepsia Saxonia in adolescentem, qui phrenitide capitis singulis diebus ac oedibus plurimam rigelies corripiebatur Epilepsia & 14. obit. Facultatis locum Idem animadvertit in pueris: Apoplexiam comitatur, ut mihi se exciperent, in Medico quodam, & in Marona quæ spatio 17. horarum obit, Epilepticos fieri melancholicos, & vicissim, afficit *Hypocritæ*. Eiusmodi, addit *Saxonia*, Epilepsia non potest fieri ex repletione partium infusa caput, nam functiones principes & sensitiue insigniter pauciores: Inque causa tunc temporis nulla est alia quam portio huius materie quæ replet partem lententem, quam dum natura sciat excutere, motum fuit convulsivum.

O B S E R V A T I O V.

§. 1. Epilepsia à Sero caput replente.

Epilepticos affectus à scto caput opplente, & præcipue posticam ejus partem, excitari ex Anatomia didici, Nam dissecto anno superiore cadavere, posticum caput universum aqua turgens repertum, ut non solum principium nervorum aquæ innataret, sed membrana ipsius aqua prægnantes & imbutæ, non secus atque papyrus aut tela aquæ diu immersa, conspicitur erant: At quamprimum cranium sectum, aqua ex ea parte distuluxit plurima, quin etiam sanguis in venis ea parte concretus inventus, a frigore scilicet aquæ stagnantis. *Carol. Piso De morbis à colluvie serosa selecta. part. 2. cap. 7.*

§. 2. Amorrhæi Consulidis pulsio quadrimestris terminibus vexabatur, ut colligere erat, Non longè post aphonos, oculos intorquebat, convellebatur, mirum hoc, repente facies murabatur, tanquam conantis aliquid excutere; deinde velut comprimebatur, tumque occurrebatur in os spuma, & spiritu velut compresso diu, quasi ad se rediens, magnam spirabat, eorum more qui contentione animi aliquid intuentes spiritum cohibuere. Per totam noctem convellebatur tantum brachio sinistro, & illud convulsorio modo agitabatur, deinde cessante hoc, idem brachium dextrum passum est: & ex intervallis occurrebatur spuma magna copia, & aphonos erat, & excreta spuma salivæque, magna spiratione, tunc restituebatur. Epileptici cum hoc fuit: Provisum ventri: aliquid sufficit. Duodecimo ætatis mense interit.

Aperto cadavere ingens aqua in cerebro reperta est: nervi quidam erant valde angustii, alii nervi erant ferè duplo majores. *Ballonius tuss. lib. ii. annot. 2.*

S C H O L I A.

Tormibus vexabatur] Ad ventris tormina sæpe subsequi Epilepsiam experientia ostendit, Tunc feces alvi infantium viridis & porraceæ sunt coloris, quibus exclusis & ad naturalem colorem redeuntibus cessat Epilepsia, quæ tunc per consensum ab intestinis oboritur. Ut in hoc Pussione verisimile sit per consensum, & per primariam cerebri affectionem genitum fuisse Epilepsiam, quæ à duplici causâ concursu gravissima fuit,

Oculos intorquebat, convellebatur, spuma magna copia, &c.] Si affectio sit primaria in cerebro, totum corpus & facies partes convelluntur. Piruitam cognoscetis ex ætate puerili, & spuma admodum copiosa: Spuma autem circa os, & involuntarius seminis, urinae & excrementorum alvi exitus, non sunt signa Epilepsie necessaria, sed tantum vehementis, propterea dicuntur

Rhasæ, Quod si Spuma superveniat, & semen, aut urina, aut alvi excrementa egerantur, tunc passivum esse gravitatem: Nam ut docuit *Gal. 2. aph. 43*. Spuma fixæ insigni agitatione & motu fucit piruitosi in cerebro existens. *Saxonia Præcl. Præf. parte 1. cap. 15.* Ex his indicibus constat Passivum affectum fuisse Epilepsia idiopathica, quia faciei partes convellebantur, & quia infantium cerebrum debile facile percellitur: Eandem à piruita fuisse genitam, ob spumæ copiam & ætatem posuit fetacem.

Arabum convulsorio modo agitabatur.] Epileptici quidam in terram prostrati prætoræ sua manibus gravissime tundunt & cohiberi se ægre tolerant, nam cum præcordia spasmo affecta & præpediunt, movere se solio more non possunt, sanguisque in illis stagnans non sine insigni cordis gravamine vitæ suffocationem minaret,

eminatur, tunc fit ut laborantes, cerebro licet infcio, mero naturæ instinctu thoracem percussant, nimirum ut præcordia concussa, & velut exagitata, motus suos redintegrant, adeoque sanguis à stagnatione, & eor à gravi oppressione vindicentur. Non abimili riu id heri videtur ac cum dormientes aut titillati aut palicum motu vellicati, illico locum affectum inciti fricant aut scalpunt.

Quarritur spuma magna capis] Epilepsie symptoma maxime pathognomonicum habetur, si affectis in terram prostratis, & convulsiones horrendas passis, Saliva spumosa ex ore effluit, quæ quidem à cerebro constituto in palatum exprimi putatur. Verum enim vero, ut concedatur hoc spumæ effluuium septennumero Caduci signum esse, tamen illud non ita huic motui appropriatur, quin idem in apoplexia, in caro, in affectibus hystericiis, aliisque convulsivis interdum accidat. Porro ejusmodi Spuma haudquam à cerebro descendit, nullus enim per quem transeat meatus patet: Verum à pulmonibus solatis ac usque

ad laryngem elevatis, unde velut cum effervescentia quadam & ebullitione saliva spumescit: Urgente enim Caduci paroxismo, cum plerique nervi in toto corpore contrahuntur, etiam qui pulmonum & diaphragmatis motibus inserviunt, ipsos immines passis, præcordia omnia sursum elewant, & aque in siccitate diutius a se immobilia continent, ita nimirum ut pulvis & respiratio vix ac ne vix perficiantur: Interea quia sanguis intra cordis sinus coercitus ipsius distendi admodum, ac se opprimit, Pulmones utriusque impediti ne mote solito & naturali moveantur, quod possunt tamen festinosa & spissa agitatione quoquomodo sanguinem à corde exalare satagunt, à quo ipsorum nil, ac humiditatem viscosam crebra respirazione succutens, ut agitarum ovi albumen in spumam attollit, mox sicut in oris cavitatem elevar, & illinc uterius foras propellit. Quare saliva spumosa etiam in aliis affectibus, ubi nervi pneumonici aut contrahuntur, aut a functione sua obrunda inhibentur non raro succedit. *Th. P. de Pathologia cerebri cap. 19.*

OBSERVATIO VI.

Epilepticorum cerebrum, ventriculi & sacra fistula plerumque limpida aqua imbuta sunt & repl. ta.

Purles invenimus in cerebri ventriculis sacræque fistula aquam limpida, tenuem & puram, quam flavam, vel bili colore similem, vel etiam alium humorem: Majorique itaque ex parte, si non semper, paralyfin excitat tenuis limpidaque aqua in cerebri ventriculis atque in spina dorsii collecta, quæ sensim à superiori parte nervos irrigat, quoad pervenerit ad eorum extremitatem: De Epilepsie causa, idem quasi asserendum opinor, nam similem aquam in *Epilepticis & apoplecticis multisies vidi, &c.* Nil in cerebri ventriculis pituitæ, nullam in his obstructionem, & non plus tenuis humoris aquosi & limpidi in medio ventriculo, atque in reliquis deprehendere quivi, cæterum totam cerebri substantiam inveni aquosa humiditate infarctam, ventriculofque omnes eadem aqua plenos. *V. Cæter lib. observat. Anatom. & Chirurg.*

S C H O L I A.

Aqua limpida] Lymphæ, Est hæc vasa lymphatica in cerebro conspicua non fuerint, credendum tamen id iis non carere, sed ob tenebrositatem & tenuitatem exhausta lymphæ, visum effugere: Ratio cogit multiplex ea admittere, & 1^o, negligias eadem quæ in cæteris partibus ubi reperimus, ad lucipiodam scilicet lympham cerebro inuilem & gra-

vem, peracta nutritione: 2^o, aquæ copia sæpe in capite reperta, à sero aliis vasis concepto, arteriis præsertim, omnino alienæ, quod est tenue, coloris tamen non est expers. 3^o, Vas illud excretorium in narium tunica, à Clar. Nicolao Siemone repertum, quod subtile esse eorum vasorum verisimile est, cum lympham puram effundat.

OBSERVATIO VII.

Epilepsus ab aqua cerebrum alluente, cum pustulis in ventriculi vitio, &c.

Puella unius anni diarrhoea corripitur, febre, capitis dolore, &c. tandem Epileptica obit. Ventriculus erat in sinistra parte nigricans, viridi humore repletus. Cerebrum librarum quinque copiosa aqua circumfusum, adstant ipsi pustulæ aqua plenæ. *Vide iis de Febribus.*

OBSERVATIO VIII.

Epilepsia à sero tenui cerebrum madefaciente & ventriculos implente.

Juvenis mulier, (de qua Tit. de Paralyfi) ad extremum delirio ac Epilepsia occubuit. Ex cerebri substantia inter dissecandum effluxit aqua tenuis & rubicunda, quod vasorum incisioni adscribendum; nam aqua, qua omnes ventriculi scatent, fuit tenuissima & limpidissima.

OBSERV.

OBSERVATIO IX.

Anatome Epileptici pueri, cujus cerebri ventriculi tres aquam limpida[m] continebant.

Elius Dom.N. decennis ex alto cecidit: Quum autem nec vulnus nec contusio aliqua externa appareret, nec febricitaret, morbus neglectus. Post menses quinque asthma-ticus factus est, gibbosus: Tandem accidit catarrhus, sinistri lateris resolutio & nonnulli paroxysmi Epileptici.

Capitè aperro lapis membrana inclusus in posteriore parte capitis, inter duram & pia-m matrem inventus: In tribus cerebri ventriculis, hoc est, in duobus anticis & medio, ultra duas libras aqua limpida repetimus. *Vide lib. 2. tit. de Gibbositate.*

OBSERVATIO X.

§. 1. Epilepsiam excitari à sero præcipue posticam capitis partem opplente, ostendit Anatome.

Epilepticos affectus à sero caput opplente, & præcipue posticam ejus partem excitari, partim ex anatome didici, Nam dissecto anno superiore cadavere Claudii juvenis, posticam caput universum aqua turgens repertum, ut non solum principium nervorum aqua innaret, sed membrana ipsa aqua prægnantes & imbutæ, non secut atque papyrus aut tela aqua diu immerfa conspicerentur: & quamprimum cranium sectum, aqua ex ea parte defluxit plurima, quin etiam sanguis in venis ea parte concretus inventus, à frigore scilicet aqua stagnantis. Partim idem colligere est ex analogia affinium morborum, scilicet Catalepticos. Narrat enim Hollerius in occipite cujusdam vi Carochi demortui, plurimum serum quasi rufum repertum in cerebro posteriore, una cum sanguine concreto in majore vena quæ medium caput perrepat. *Car. Pisto de morbis à sero sect. 2. p. 2. cap. 7.*

S C H O L I A.

A sero caput opplente) Cum seri in capite collectio foveatur à colluvie serolatorum, certe propagatio ejus seu contritio è toto in caput, vel sensim hinc sensu fieri potest, vel cum rapta quodam ac sensim quidem duplici nomine, scilicet vel trahitur, seu à parte, ratione nutritionis, vel sponte sua idem movetur ad caput, live quia sanguis, præcipue tenuis & aquosus, calore bilio in affusus, lapsum afficit à natura locum, live quia ratione obicit sequitur motum spiritus vitalis. Nam cum spiritus vitalis cuique parti laboranti succurrere solent, una cum spiritu vitali sanguis, præsertim uterius, ad caput movetur, ut pote cujus perpetua fere est actio, ac proinde serum ad caput abunde confluit. Iam consensum in caput idem serum caput quodammodo, à causa quacunque sanguini in vasis nervos accidit: tum enim cum in illa favore tenuem sanguinis partem utioli de depumare necesse sit, evenit serotam & biliotam partem sursum rapti de caput petere: Quod contingere vidimus in quibusdam febribus, à qua causa, affluxu scilicet, seri biliosi, oppletum cerebrum tenetur epileptici insulibus. *Idem videmus.*

Ex analogia affinium morborum (scilicet Cataleptici, &c.) Placet utriusque causam deducit ad effusione seu profusione spirituum animalium in nervos cerebro continuatos: quæ à duobus causis præsertim proveniunt, diversa nonnulla accidentia præterit, quarum prima est, aut nimia & vehemens periculisque sensuum internorum operatio, per quas ut in cordis magnis passionibus adeo spiritus vitales effertur, videmus, ut animi inde defectus sequatur, ita & si per velle mentis cogitationem & intentionem in rem aliquam,

spirituum animalium sit in externorum sensuum organa dissipatio, accidere potest ut velut attoni leviter stupescant, & vel mox itum remaneant illis, ad se rediant; vel si diutius perseverent diversæ catalepticos species excutiantur. In quibus si non penitus spiritibus effusis, positiones aliquæ illorum in cerebro remanescant, sensus quoque aliquos perirent, aliis cellantibus, de proat in nervos effunditur, motus quoque vel saltem permanere, aut cum rigidityate sese citra concussionem, exerceat posse, si nulla nervorum sit contractio: utique tam in quoque si per animi violentum affectum adeo spiritus effluant, ut aliquandiu se recolligere nequeant, Epilepticorum instar illos consilisse vidimus in quibusdam, qui cum in magna convulsionibus perorabant, ob nimiam animi & sensuum contentione[m], spiritibus agitantibus hoc passim: Unde forte quod idem ob eam causam in comitia aliquibus contingere solent, Epilepsia comitalis morbus dicitur hinc: Aliæ & frequentior profusione spirituum in nervos causa, unde gravior Epilepsia & Catalepticos sequuntur symptomata, cerebri in statu exitii, talis per quam facultas illius expulsa excitata, ad excutendum quod molestem est insulgit.

Concreta à frigore aqua stagnantis) Concrecionem sanguinis præterit illius à sero secretio, per coagulationem quandam: sic lactis pars caseosa quodam sero confusa est, liquida permanet, accedente vero causa coagulante, serumque ab ea sequestratur, & illico crassiem adipiscitur. Idem de sanguine est iudicium concreto aërem sanguinis potius partibus heterogenis, diversis facientibus, sero commixtis, quam illius frigiditati adhibenda est.

§. 2. Puella trium annorum post clamorem horrendum insultu correpta est Epileptica. Scissa mortuæ cerebri substantia, stagnantes aquæ clerinae, nervorum conjugationes inundantes, nobis patuerunt. Vide lib. 2. tit. de Tussi.

OBSERVATIO XI.

Epileptici insultus à seroso humore in cerebri substantia & ventriculis.

Filia D. N. septennis cum dolore capitis gravi paroxysmos quoque epilepticos passae, cum spuma in ore: Consilium innotuit nuntiatum eam novo paroxysmo Epileptica sublatam, ac post mortem puris aliquid per nares effluxisse, quod nobis abscessus latentis suspicionem fecit.

Sub cerebro aperto nihil repertum præter serosum humorem in cerebri substantiam & ventriculos effusum. *Laz. Riverius Observ. 37. sem. 1.*

OBSERVATIO XII.

§. 1. *Epilepsia ab aqua limpida in cerebro, ventriculis & Sacra Fistula*

Secul mulierem quæ post colicam paralytica facta est, ad extremum Epileptica occubuit. Ex mortæ cerebro effluxit aqua tenuissima ac pura, ut & de cerebro & ventriculis, & Sacra fistula eadem plena fuit. *Vide tit. de Paralyti.*

§. 2. Hippocrates cum morbum Epilepsia sublatarum cerebra, aquæ liquore plena repperit, eum morbum inde tradidit diffundi: Quidam puerulus levi Epilepsia arripiebatur, cuius mox in dies intumescere caput, ut tandem morbo, cui nomen est Hydrocephalus, diuteneretur. Huius jam defuncti cerebrum tenui sero perfusum erat, & hic semel tantum Epilepsia attentatus fuit. *C. P. Schneiderus l. de Catarrhis. special. p. 257.*

OBSERVATIO XIII.

Epilepsia in Apoplexiam desinens à sero acri in cerebro, inter meninges & in ventriculis stagnante, cum vermibus in intestinis.

Anno 1672. die 23. Maii, in Xenodochio, vir annorum circiter xxx. habitu carnoso, pills nigris, temperamento sanguineo melancholicus, dissectus est à DD. *Glafero* Qui occubuit tandem Epilepsia terminata in Apoplexiam, cum anno ante ægrotaret febre lenta, dein intermittente, ictero, quartana, hydrope, à quibus malis sibi videbatur convalescere ut nulla videretur aqua adesse, sed versa pagina è vivis excessit, in cuius corpore sequens anomalia inventa.

In infimo ventre 1. Hepar ingentis magnitudinis & ponderis, licet mollitie naturale, colore verò livido, duplo fere majus erat quam natura esse deberet. 2. Lien etiam duplam magnitudinem vel triplicem ad naturalem habebat, substantiam flaccidam, friabilem, colore ad lividum accedens; Scirrhus neque in hepate neque in liene reperiabatur. 3. Epiploon putridum, à quo mesenterium infectum inflammatione tentatum. 4. Intestina copiam magnam vermium continebant, ut aliquibus locis instar nodorum complicarentur: aqua panca, aut fere nulla reperiabatur: infimi ventris reliqua erant naturalia. 5. In thorace costæ flaccidæ, molles, ita ut substantia cordis tantum dimidium crassitatem contineret, quam habere deberet; Capsula cordis aqua repleta, uti & in toto thorace feri magna copia stagnavit. 6. Pulmo in sinistra parte adnatus, ceterum semi putridus. 7. In capite inter piaam & duram matrem, ubique, uti & in ventriculis, magna feri copia stagnavit, cuius sapor acris, subacidus & salsus & parum exodens repertus. Vena circa membranas valde turgens. In tertio ventriculo, inter anum & vulvam, ponticulos instar duorum nervorum complicarorum reperiabatur, colligans quasi crura cui innitebatur septum lucidum; Exteriori cutis color lividus erat, ob sanguinem per circulationem revertentem, circa cutem stagnantem. *Ex communicatione Clar. DD. Mangli Medici Basiliensis.*

S C H O L I A:

Epilepsia terminata in apoplexiam) Quia serum dum circa meninges inerat, acrimonia eas vellicans Epilepsiam induxit; Idem in cerebri medullam effusum, per ejus oppressionem Apoplexiam peperit. In apoplexia à sanguine oborta idem observavi. *Excell. Wepferi historia 2. Apoplecticorum p. 332. Cessante*

an, Epilepsia, fortissima apoplexia supervenit, sanguis ne largius inter cranium effuso, tum quia fluxibilior à violentissimo motu redditus fuerat, tum quia contragno cerebro fortius superne exprimebatur & inferne ascensui liberiore prohibebatur. Cui autem apoplexia munda (secundum Epilepsiam, id. hinc crassius est)

summa quia pituita in ventriculis cerebri conclusa, ebullitionem ibi patitur. Sed dum fit ebullitio status & vapor elevatur, hic replet membranas ventriculorum, quae statim concutuntur, unde fit convulsio Epileptica.

Servatum super acris Urinae liquor (qui serum est humorum) analysi spagiritica expostus in has partes, velut principia, potest resolvi inter destillandum; 1^o, ascendit quicquid inest spiritus vini cum aqua dilari, verum ea contra modum quantitate, ut uoo facile sit ipsum gustu percipere: 2. succedit latex aquosus in proportionem satis larga; cui salis, ac præcipue sulphuris particulae quaedam laxiores commiscuntur, 3^o, castillatur aqua valde penetrativa, quae vulgo spiritus vini fere, expert, maxima ex parte tantum phlegma est Sale insigniter aculeatum. 4^o, post humiditatem penitus cabalaram, in fundo coenobiz altera salis portio cum terra remanebit. & *Wallo Tract. de urinis cap. 1.* Hinc constat qua ratione serum Epilepticum parari, scilicet non obstruendo, sed qua continet in se partes acerrimas, quae easulicem irritant & vellicant: Ideo *Savonius prælib. prælib. cap. 15.* de materia quae reperitur in ventriculis cerebri verba faciens, ait aquas, nisi sit permixta succo bilioso, nec fit flava aut viridis, non facere Epilepsiam: atque inde esse quod in plurimis cerebri ventriculi reperi line aqua sim plici repleti sine Epilepsia, in alia inventa sit aqua biliosa in ventriculis, quos Epilepsia inest.

Epilepsia terminata in apoplexiam Non est inconveniens (ait *Marianus* comm. 3. in lib. Hippocr. de Glandulis, unum eundemque humorem modo apoplexiam modo epilepsiam inducere, quando quotidie observatur Epilepticorum plerisque à superveniente apoplexia è medio tolli: Imo quotiescunque humor, qui cerebrum infestat, acris est & mordax, quia facultatem inde nonderitatem non est possibile, ideo con-

vulsivans motus semper indicitur. Etiam Hippocr. in apoplexia l. c. cerebrum convelli ait, quod quidem non observant, si quidem convulsio apoplexiae penitus adversa videtur, quando haec motus privationem, illa vero motum infulsum & p. n. importat: Sed Hipp. acutissimus speculator, causam apoplexiae respiciens, quae acris & rodens materia castris, impossibile esse existimavit cerebrum non convelli, dum ab illa materia acris initatur, quando quidem ex 7^o. Epid. conlat omnes motus convulsiones à stimulatà facultate pendere: Quia igitur cerebrum ab acris materia roditur, facultatem irritari necesse est, quae ut quod molestar expellat, cerebrum motu convulsionis moveret, verum quia spiritus animales per nervos, ad motum prestandum, fortis prohiberetur, motus illi convulsivi ceteris partibus non communicantur, & ideo motus nullus ad sensum fit conspicuus: Si autem idem humor acris qualitate sanguinem in cerebri sinubus existentem corrumpat, ut ut solatur, & naturali motu priveret (in hoc enim essentiam apoplexiae Hippocr. reposuit) quia spiritus animales ad motum elicendum concutere non possunt, ideo convulsio, quae in motu p. n. consistit, in parvis altera cerebrum non percipitur: quamvis ipsum cerebrum irritatum inimus concuti convelli que rationabile videtur Hippocr. sed sensus & motus privatio tantummodo apparet, quae duo symptomata apoplexiae essentiam constituisse existimamus. Si vero ab humore prædicto non fiat corruptio & congelatio in sanguine, quae rationem impedit animalium spiritum, sed faciliorem tantummodo ipsius cerebri iteret, tunc spiritus importatio illo motu agitur, convulsionis motum faciens, iidem quod mox ista: expellere tentantibus, unde totius convulsio occidit, quae communiter Epilepsia dicitur.

OBSERVATIO XIV.

§. 1. Epilepsia ab obstructione ventriculorum cerebri non fit, eo quod in defunctis ejus nullum vestigium appareat.

IN sectione Epilepticorum defunctorum nullum obstructionis vestigium apparet, sed modo macula, modo humor ater & spumofus, modo nihil prorsus. *Henricus Petrus Nessel-Harman lib. 1. Dissert. v. 1.*

S C H O L I A.

Obstructionem à Galeno positam, falsam est. In more frigido, crasso & viscoso, ventriculos cerebri non inegre obstruente relictis *Vir. Clar. 1^o*. quia si fieret ab obstructione sequeretur privatio, aut saltem diminutio motus; si vero omnes partes praeier voluntatem ad motus violentos hic concitatur. 1. quia esset eadem cum apoplexia, vel tantum majoris & minoris ratione differret, nec tam diversa haberent symptomata, cum eadem utriusque statueretur causa, idem subiectum, idem lesioni modus, defineret etiam ficut illa in paralyfin. 3. quia in Caro sequenter symptomata Epileptica, quia talis adeest causa. 4. Sternutatio, singultus & vertigo, quae maximam cum Epilepsia similitudinem habent, à simili obstructione fierent. 5. Subita lassatio & lassatio non potest esse

ab humore crasso difficultiter mobili & dissipabili, nec locus est in quem tanta copia tam cito detradi queat. 6. Ob rationem intertextu allatam. 7. quia vacuatio post paroxysmum qualitas ad ipsum redarguit; oscitant enim, stertunt, spumam per os reddunt, pandiculantur. Probabilisiorum eorum fecerunt statuit, qui vaporosam & tenuem materiam, sive ut Pelops Galeni præceptor nominabat, *viscidum vel id est unguis albus*, Epilepsiae causam esse sentiunt, quae vel acrimonia & adstrictione, vel qualitate venenosa & maligna cerebrum nervosumque principium vellendo & molestando, constrictionem & angustiam mearum inducat, & sensibiles partes ad oculi expulsiorem stimulet. Vide *plura l. c.*

§. 2. Complurium Epilepticorum cerebrum dissectum nihil habuit ex quo obstructio colligi posset: Dissecti enim alii sunt in quibus ventriculi aequo humore, aliquando etiam crucero pleni apparuerunt, quamvis Epileptici nihil passi fuissent. *Erastus Parte 4. Dissert. contra Paracelsum.*

S C H O L I A.

Quamvis Epilepsia nihil. Quippe ex sententia *Fernelij* de his qualitas occulta & venenata, proxima huius mali causa. Eam impugnat *Saxonia* Pazzetion. Pract. p. 1. cap. 15. §. 6. quod non possit causam reddere cit in corporibus sanis per somnum tantum, crapulam & ebrietatem, per locum vehementem, terrorem aut mortorem, odorem gubani aut myricae statim excutitur epileptici: Sensui autem qualitatem istam quandoque esse manifestam, quandoque occul-

tam: priorem elevari ait ex pituitoso succo, falso, acido melancholico, ex parte, lingua, sive concreto sive adhuc in vase exsistente.

In quibus ventriculo. An possint esse in Epilepsia loci affectus, vide infra cap. 19. Illi ex Columbo & alibi, succiuguntur membrana tenui, ex pia ortum ducunt, sensu exquirito percipitur, ut ideo hac incitata, aut aliqua ex parte repleta, fiat Epilepsia.

OBSERVATIO XV.

Epilepsia causa saepe est humor limpidus calidus & acerrimus.

MOrbum comitalem ab humore limpidi, calido & falso, aquae fortis aurificum amputo nonnunquam ortum novimus.

S C H O L I A.

Fervorem & acrimoniam non vereor sero tribuere, quo aliquando saturata est pituita prope crystallina. Cogitent quæsto Naturæ consulti quam sit fallax calor vel frigoris à colore indicium: Novum id optime qui mineralia & metalla, ignis beneficio in varias partes distimmes, prostant liquores subtilissimos ac limpidissimos plene igneos, quibus nullum, quantumvis pusillissimum, resistit metallum. Eadem vero principia sunt omnium quæ terræ sibi conduntur, quæque eam velint ad mortalium nutrimentoem. Proinde nec mirum barmani corporis factos alibiles eorum representare naturam, quibus insigni acrimonia immoderata, & calore propemodum igneo præditis conficiuntur ac sustentantur. Cruda porro etiamnum excrescentia quandoque ex putredine localiscent, vel excedere qualitate ignea contrahunt acridinem, quæ non raro cutem ad eam carnem ipsam exedit: Hinc Galenus, non minus verè quam dilerte de casus symp. c. 6. lib. 5. pituitum plurius nitrosum adscripsit. *J. Rhodius observat. 29. anat. 1.*

Humor calidus & falsus. Hinc Paracelsus Salinus est hic morbus, quippe chironicus de sale, stabilioris principio, participare ipsum oportet. Item nitrosum, quia omnes virioli proprietates, sinceritas & symptomata secum circumferunt, quas cloduras exhalando temporis

intervallis, malignas, acres, acidas, adstringentes & corrosivas spiritibus vitalibus & animalibus, symbolum & conspirationem habentibus, nullo negotio committet. Fomes siquidem texti huius vaporis est mucilago tartarica seu impura, quam alias phlegma vocant, pituita acida, sanguis grumescens & putrescens, bilis porracea vel angustiosa, melancholia adusta, qui humor ob copiam salis viscosi, aluminosi & armoniaci, quandoque & arsenicis & arsenicis: phlegmate mercuriali & sulphure glutinoso exutus, iustis aqua fortis humorem acrimoniam, fermentationis, corrosionis, & penetrationis violentiam acquirit, adeoque omnium acerbissima, gravissima & exhalatissima corpori symptomata infert. Cùm enim pangentissima salia exquiratissimi sensus partes laci-naot ac vellicat, & tota substantia cerebrum infestant, aciditateque hypica ventriculos constant, vasque contingunt, & sulphurea fuligine spiritum obouibant, convulsionem, luctu, distortionem, sensum, cum exteriorum quàm interiorum interceptionem, aut inuentum etiam consequuntur, per diversam liquoris de vaporis mercurialis & talis copia, acrimonia, aciditate neque violentia. *Mura.*

Petrus Nephelias Harmon.

Disert. vi. lib. 1.

OBSERVATIO XVI.

Epilepsia obnoxia vix & cap. a. ob redunt. Item fatidam in cerebro humiditatem.

Cerebrum humidius quam pro natura existit, & pituita exundat, ita ut crebriores defluxiones contingant, neque amplius fieri possit ut pituita excutatur, neque ut cerebrum reficetur, sed irriguum & humidum esse necesse est: Id ipsum autem præcipue ex Ovibus hoc morbo correptis quis cognoscere queat, ac præsertim Capitis, quæ frequentissime hoc morbo prehendantur. Harum si caput secueris, cerebrum humidum & sudore redundans, & male olens deprehendes: Ex quo certe cognosces morbum non Deum corpus infestare, Sic etiam in homine se res habet, cum enim inveteraverit morbus, amplius curari non potest, cerebrum enim à pituita eroditur & colliquescit, quod colliquatum est in aquam vertitur, foris cerebrum ambit & circum circa alluit. *Hippocrates lib. de Morbo Sacro.*

OBSERVATIO XVII.

§. Epilepsia ab humore fatido in cerebri substantia.

Deprehendimus in altero, cerebri substantia humorem fatidissimum, eumque exiguum contineri: ventriculos tamen & meatus omnis humoris omnique obstructionis expertes. *Fernelius de Abditu lib. 2. cap. 15.*

S C H O L I A.

Humorem feridissimum, &c.) Præter inanitionem & repletionem, vulgares Epilepsie causas. Sarrasinus Prælect. Prælect. p. 1. c. 15. Irritamentum cum cæteris neotericis ponit, Quoniam nullus illorum, ait, exponat qual: sit hoc irritamentum: Id autem dupliciter fit, Aut repleta parte sentiente, cujus facultas expultricis sit valida, quæ propterea statim insurgit ad expulsionem rei nocentis: Hujus causæ, oculis tamen verbis, meminit Galeus 1. de loc. aff. c. 7. circa initium, nam postquam declaravit fieri Epilepsiam ex crasso humore ac pituitoso, subiungit convulsionem fieri concutiente se ipsum cerebro, ac moliente expulsiōem rei nocentis: Aliud irritamentum est tantum qualitatis sive actis & mordacis, sive venenæ. Primam irritamenti speciem non admittunt Erasim, neque Rondeletius aut Ferrius, aut Hall. qui pro-

pterea non possunt reddere causam, addit Sarrasinus, Cui in capite per essentiam repleto, aut melancholia, aut pituita, aut alii humoribus, vel alia materia extranea, ut in casu præsentis, Aut tumore oborto, ut in præcedentis, frequenter fiunt convulsiones Epilepticas, & illas quidem universales. Nec quoque causam reddere possunt cum aliquando nec eo le excipiant Epilepsia & Apoplexias, Epil. & Melancholia, item Faciæ & Pleuritidis: Ejusmodi Epilepsia non potest fieri ex repletionem patium infra caput, nam functiones principales & sensitivæ insigniter patiuntur: Itaque causa tunc temporis nulla est alia, quam positio hujus materie quæ replet partem sentientem, quam dum natura tentat excutere motum facit convulsivum.

OBSERVATIO XVIII.

5. Epilepsia orta à paucò humore putri inter calvariam & crassam meningem delitescente.

Aliquando observavimus è summo capitis vertice, in quo sub pericranio vitiatum venenatissimum humor coarcebatur, vaporem manifesto sensu intro subire, qui Epilepsiam concitaret, hancque postea caustico persanatum medicamento; Ita proculdubio existimari debet intus, vel circum meningem, vel circum cerebri substantiam, vitium contineri veneni æmulum, cujus ex intervallis impetu facto Epilepsia suscitetur: Aperto Epileptici Philosophi, qui decesserat, capite, qui vehementissimo dolore circa sinuipsum torquebatur,prehendimus fræssiorem meningem ea sede calvæ ossi adhærescere, pauculo humore putri interjecto. Ferrius Pathol. lib. 5. cap. 3. & lib. de Abditu 2. cap. 15.

OBSERVATIO XIX.

5. Epilepsia ab humore tenui & crasso in ventriculis cerebri.

Observarunt præstantissimi Anatomici plerisque dissectos, habuisse ventriculos cerebri aqua simpliciter repletos abique Epilepsia: Contra verò Epilepsia laborantes post mortem inventi fuisse habere in ventriculis aquam biliosam, Aut saltem succum crassum feridum. H. Saxonia prælect. prælect. cap. XV. n. IX.

S C H O L I A.

Ventriculus aqua simpliciter repletus.) A multis impugnatus Galeus, quod ab imperfecta ventriculorum cerebri obstructione Epilepsiam nasci dicat: Esti vero causa hæc sit infrequens, non omnino tamen impossibile esse quidam statuant, quod omnis irritatio fiat à materie quantitate aut qualitate: Quædam autem materia morbifera, naturæ gravis, ejus expultricem laessit, Si ergo humor ventriculos cerebri obstruens naturæ molestus sit, quidni cerebrum ad illius exclusionem instigetur? Rationes Ferrii sic evolvant. 1. Si, inquit, Epilepsia ab humoris copia fieret, in sopore ea maxime contingeret? 2. Si humorem soporis causam substantiam cerebri, sensu delinunt, obstruere, non ventriculos, hinc nulla expultricis irritatio, in ventriculis maxime relidentis: 3. Cum Epilepsia citò solvantur, cum eam paralyfis non excipit? 4. In apoplexia, cum debilis sit expultrix, ad viciniores partes derudi materiam, inscumbit enim ea præ humoris copia, in Epilepsia vegetiorem esse ac ad emundatoria excrementa pellendum saltem supponere Ferrius, ad Epilepsiam non sequi paralyfin, quod à multis id observatum sit, Imò non raro apoplexiæ præcursor est Epilepsia, quod anno 1657. Neocomi Helvetiorum in Caupone quodam vidimus, qui paroxysmos Epilepticos plures ante apoplexiam brevi lethalem sustinuit. Nec Galeus arguenti vim

expugnanti, qui illi objiciunt ut completa ventriculorum obstructio integram functionum abolitionem inferat, sic incompleta immolationem earum, non depravationem inferre apta est: Nam, in integra obstructione, natura mole obstruente onus excutere non tentat: In imperfecta autem facis superest roboris ad noxii exclusionem: Sic, si Pulmo totus carcinomae oplesatur, nulla sequitur tussis, quia scilicet impas est expultricis copię materie, ac ne tentat quidem succina se liberare, sequiturque tantum summa dyspnoea: Si minori copia humoris influat, ad expulsionem accingit pulmo. Ferrius cap. de Epilepsia.

In ventriculis) Cerebri ventriculos simili humore repletos, aut alio modo affectos, aperti defunctionum capibus advenere multi Medicorum, ut Smerius, Colter, Theravus, Salmuth, Riverius, Glandorpianus, Bontrius, Falcobergius, teste D. D. Bartholino, Borellus, Rhodius, Petrus Pauvius, Vis expultricis naturalis ab ejusmodi vitis cerebri & meningum, ac etiam à sero innatante æque laessit potest ac à dolore & à multis cæterarum partium, &c. C. V. Schneiderus l. de calvaria. p. 174.

Aquam biliosam, aut succum crassum feridum) Quædam vitia in variis latere possunt humoribus, in pleurosis succo salso, acido, melancholico, su pure, in sanguine, tum concreto, tum vasis conclusio: Ex Bile, quam

quam Hippoc. hoc negaverit lib. de morbo sacro, experientia tamen docuit in corporibus biliosis & ingrossissimis visis, quales fuit *Casus* & *Mahomet*, frequentes factas esse Epilepsias. Ideo *Galenus* 1^o, de locis p. referit historiam Grammatici, qui cum diuini a cibo abstinere, Epilepticus fiebat, non aliam ob causam quam bilem: Melancholicum succum parere posse Epilepsiam ait *Hippocrates* Epidem. 6. sect. 7. ubi ait Epilepticos fieri melancholicos, & vicissim. Ne autem pueris hoc fieri quod tota materia melancholica transmutata in substantia ad ventres pariat Epilepsiam, nam si hoc esset, sequeretur sublata accessione Epileptica, melancholicum aliquo saltem temporis spacio defecurum, quod tamen non est, immo vero cum primum definit Epilepsia, melancholia est in suo robore, itaque causa tunc temporis nulla est alia quam portio hujus materie quae repetit partem sentientem, quam dum natura tentat excutere, motum facit convulsivum. Aliquando etiam sanies & sanguis corrupti Epilepsiam faciunt, sic observavi in filia cuiusdam Nob. Prævini disruptum in capite abscessum vehementissimum peperisse Epilepsiam, quæ tamen est sublata, expurgante natura saniem per aures, per oculos & nares. Sic quoque in magnis cerebri corruptionibus & vulneribus, extravasato sanguine, neque exitum habente fit Epilepsia: Nonnamquam ex suppreffa urina, cuius rei biliosam habeo ego singularem curatam monialis, cui supervenit Epilepsia ob suppreffionem urina supra renes factam, renibus ipsis angustatis partim a calculis, partim ab inflammatione. Fit & Epilepsia cum repente aliquis curaneus affectus retrocedit: Sic scribit Trincavellius lib. 2. cap. 6. patrem & filium (scilicet laborantes & inundatos, recedente scabie Epilepsiam incurralle. *Saxonia Prælect. Prædict. part. 1. cap. 15.*

Ventriculus repletus) Hoc in casu duplex accedit causa angustia ventriculorum, materia obstruens, aut subsidencia ipsa: nam quadruplex est causa sublatæ functionis sensitivæ ac principis, sola obstructio, sola subsidencia, subsidencia cum obstruptione, & subsidencia cum compressione: Est sola obstructio, quando fit Epilepsia ex insigni copia humoris puerioli ventriculos obstruentis, atque universum cerebrum replentis, id quod fit quando Epilepsia morbo succedit Apoplexia: Est quandoque subsidencia, quando scilicet membrana ventriculorum cerebri irritamentum patiuntur a vapore aut flatu, aut qualitate mordaci aut venenata, non in ventriculis contenta, sed ex alio loco confluenta: contingit tertio ut aliqua reperiat

materia in ventricularis cerebri, quæ potest esse aquæ aut crassa, Si sit aquæ, dummodo non sit permixta cum succo biliolo, propterea non sit coloris flavi aut viridis, non facit Epilepsiam, *idem ibid.*

Aqua simplex) De ejusmodi materia aquæ pronuntiat *idem*, tam ut sit permixta succo biliolo, nec sit flava aut viridis, non facit Epilepsiam, quod desit irritamentum, necessarium ad illius morbi productionem. *Vide Observ. 17.*

Ventriculus repletus absque Epilepsia, &c.) Si materia Epilepsiam committens est quam continet *Galenus*, eum innumeri catatboli, & quibus multa pueritia plenum est cerebrum, Epileptici non sunt: An quia est dispositio aliqua, an non? Et si est dispositio, an præsinducta est, an simul cum materia inducitur? Si materia id facit, quare non omnes Epileptici finiantur quia materia aliam acquirit qualitatem? Qui tubiculi sunt ingenio, & delicato cerebro, si facile in Epilepsia cadunt, licet qui crasso & obeo sunt corpore, & obtuso ingenio: An id eadem ratione? Nequaquam, ex quibus sensus id facere potest: omnis pars delicata & exquisita sensu prædita, non facile fert commulsum humorum, & terra ad ea quæ anachymia prompte feciunt: Imo etiam solo jejuniis facile nervi laborant, & melancholicis, quia assidue agitur curis spiritus & sanguinem inflammant, cerebrum in sua mole facile obduunt. *Jac. Thuret Annus 4. in consil. 4. lib. 2. consil. Salerni.*

Aquam intusam) Hippoc. lib. de morbo sacro, hunc morbum sit pueriotos non autem biliosos invadere: Hujus tutelam suscipiens *Martianus*, ait hunc morbum ex sua natura biliosos non corripere, quia non est verisimile cum hoc temperamento tantum pueritia generari, ut corpus, & caput maxime, adhuc morbum producendum disponant: At quia ab erroribus in victu, per repetitas cruditates hujusmodi humores accumulati possunt, ideo non esse inconveniens Apoplexiam Latissimam, juvenem temperam. mo biliosum (s. Epid.) sacro morbo correptum invenisse, propter errores in victu commisos, quo tepidiores Hippoc. subjuncti in historia *Est valde rarus morbus iste*, Ex hoc inferens morbo incongruo correptum & loeremprum fuisse: Puerum autem sinceram via hunc morbum parere posse ex ipso Hippoc. constat, qui eodem libro Capras & Oves hunc morbo obnoxias pronuntiat, ob cerebrum humidum quidem & sudore redundans, sed male olente, accedente acripe humoris putredine: Ex paulo post subdit cerebrum à pueritia erodi & colliquefcere, quod simplex pueritia putrefacere nequit.

OBSERVATIO XX.

§. Epilepsia ab apostemate in cerebro, venis tenuis meningis sanguine nigro tingidis, &c.

Melancholicum Juvenis Paralyti & convulsione in febre labortas, Epilepsia frequenter paroxysmos patiebatur, &c. In latere dextro admodum turgebant venæ tenuis meningis multo sanguine nigro & concreto, Ea pars nigricabat & Apostema continebat in proxima cerebri parte. *Ex Observat. Job. Banhini.*

SCHOLIA.

Melancholicum Juvenis) Hippoc. 6. Epid. sect. 8. ait melancholicos plerumque fieri Epilepticos & vicissim. pro ut alteram partem morbus inclinaverit. Si quidem in corpus, Epilepticos fieri vult, Si autem in mentem, melancholicos. *Galenus* 3. de locis, converti in mentem dicit esse affectu secundum tem-

peramentum: Converti in corpus, affectu secundam compositionem: Epilepsiam ergo fieri ab humore obstruente, Melancholicum ab humore incompositum, inferente, mentisque sedi tenebras obducente. *Clavius* Willis (qui melancholicum distinet Animam, & qualitercorum in corpore, sive cerebro, affectu

Harui.

De Epilepsia.

stant, quatenus nimium spiritus animales (qui animæ corporis hypostasin constituant) à passionibus animi violentis inordinationes concipiunt, in quibus cum diu persistunt, totam animam imò & corpus à debita crasi & constitutione deflectunt, per mentem ipsam animam intelligit.

Atalan. hinc iuxta Paracelsi, &c. Quod hic morbus non raro in paralyfin, melancholiam aut maniam definit, ratio est, quia crebris spirituum animalium explosionibus cerebri tonus & conformatio depravatur, ejusque naturalis status tandem ita pervertitur, ut particula moribifica, etiam alius generis ignis admixtus, spiritus fugatur, nec amplius in explosiones julto procliviores sit; quin potius visio interdum contra-

rio superinducto, ipsorum virtus elastica nimium deficiat, ita ut supra modum hebetes & torpidi evadant non secus ac incensiora febres incensis sanguis in temperies julto frigidos sæpe excipit; atque hæc quidem spirituum depreSSIONES, partim propria ipsorum culpa contingunt, quippe particulis agilioribus nimium explosis, seigniores tantum superant & deinceps suppediuntur: partim vero cerebri vitio accedente, quod poti & mentis ejus à cerebri caduci paroxysmis usque adeo dilanetur & apertius, ut postea una cum suo nervoso, particulis quibuscumque heterogeneis, & diversimode moribificis ad-

itus pateat. *Willel. Pothol.*

cerebri cap. 3.

OBSERVATIO XXI.

§. 1. Epilepsia ab abscessu in cerebro excitata.

QUæ in cerebro fit Epilepsia, aperto eorum qui è vivis decesserunt capite, animadverti est sæpe aliunde suscitari quam ex ventriculorum infarctu: Causam interdum deprehendi Abscessum esse. *Fernelius Pathol. lib. 5. cap. 3.*

§. 2. Juvenis caput aperuimus qui punctim ensè tenuissimo in dextra frontis parte ante xvi. dies ictus fuerat. Calvaria cum utraque meningē perforata, in cerebrum ake penetrarat, Abscessumque fecerat, in quo puris albi uncie fere tres latebant. x. i. vulneris die cum Epilepsia febricitabat. *H. Smetsius Miscellan. lib. x.*

SCHOLIA.

Aliquando sanies & sanguis corruptus Epilepsiam facit, Sic observavi in filia Nob. Patavini disceptum in capite Abscessum vehementissimam peperisse Epilepsiam, quæ tamen est subtili expurgante natura sanem per aures, per oculos & nates: Hic causa Epilepsie non potest esse sola qualitas, nam

simplex qualitas cito dissipatur, neque alius remanet affectus, quod aliquando contingit, ut cum jungetur apoplexia, sanitas, phrenitis, melancholia; Sed repletio partis sentientis, cerebri & ventriculorum, quorum eapultrix valida insurgit adimpulsionem scintille. *Saxonia l.*

OBSERVATIO XXII.

Epilepsia à lesione substantiæ cerebri ab accepto vulnere, cum sanguinis effusione, &c.

Studiofus vulneratur in vertice, musculo masseteri sinistro, utroque calvæ penetrante; & in dextra frontis parte. Sexto die Epilepsiam patitur: Ipsa cerebri substantia divisionem passa erat: Os autem cranii fissuram habebat. Sub cute in occipite, in tempore dextro, & frontem versus, contusiones aderant cum sanguine coagulato interfuso. Et inter calvæ, circa verticem & lambdoidis initium, ex sanguine grumoso, macula ossi inherens, &c. *Vide l. 4. tit. de vulneribus.*

SCHOLIA.

Oscitanti ut Cranium osseum evadit, causa efficiens sunt particule salina in sanguine cerebrum irrigante, quæ interiori spirituum animalium operi iunctiles, adeoque extra amandæ, in peripheria ita concreverunt ac in duritiem saxeam & angelatam: Enimvero sanguis versus caput delatus, uti spiritus, ita sale

placitum abundat: hujus particule summe volatiles, spiritibus conjogata, cerebro impenduntur: fixerunt corpusculis salina, quæ fixationi occurrunt, à spiritibus indito de cerebro in circumferentiam protrusa, cranium lapideum, velut bollam flau incluso superinductam, constituunt. *Willel. Anat. cerebri cap. 6.*

OBSERVATIO XXIII.

§. 1. Epilepsia à cerebro Sphacelato post cranii vulnus.

Vulneratur quidam in cranio, qui visus est Cheirurgo sanitati restitutus, Egre ditur domo & finus quoddam procurat, altera vero die repente concidit & Epilepsia extinguitur.

Aperitur cranium & dimidium cerebrum Sphacelofum reperitur. *Philip. Salmon. Cent. 1. Observ. xxij.*

§. 2. Cerebrum Sphacelofum vidit *Glandorpium* Observat. 6. atque hinc ortam Epilepsiam.

OBSERVATIO XXIV.

In Epileptica mulieris Sinu meningis dura Polypus insignis repertus.

IN sinu meningis duræ longitudinali subiecti muliebris, publice in Theatro Amstelodamensi dissecti, materia continebatur alba, tenacissima, quæ sinum replebat & ad omnes sinus rivulos diffundebatur. Epilepsia laboraverat mulier jam ab aliquo tempore, quæ etiam extincta. *G. Blasius Observ. Med. 2. Parte 6.*

OBSERVATIO XXV.

§. Epilepsia à gladioli frustulo in ipsa cerebri substantia impacto.

Retulit Ioh. Dom. Sala, in ipsa cerebri substantia gladioli impacti frustulum perpetuo cuidam, reliquo curato vulnere, sine detrimento hæsisse, nisi quod Comitiali morbo frequentius convelleretur. *Th. Bartholinus hist. LXVII. Cent. 4.*

OBSERVATIO XXVI.

Epilepsia orta à carnosio tuberculo in cerebri ventriculo contento.

Nullo ingenio huic malo admodum gravi, quandoque medelam reperiri miteretur nemo, qui communis mali causas, ut plurimum inexpugnabiles consideraverit. Quidam singulari Ioh. Prævotii fama excitatus, recuperandæ voluntudinis spe Patavium venerat. Nullo effectu ad suos reversus, quum paulo post fato cessisset, in cerebri ventriculo Tumorem carnosus fuit inventus, qui cerebro compresso inanem huic morbo Medicinam docuit. *Ioh. Rhodius Centur. 1. Observ. lv.*

OBSERVATIO XXVII.

Epilepsia excitata ab offe acuto juxta falcem latente, cui successit gangrena dura meningis.

Capitaneus ex equo repente cecidit aphonus, ubi ad se rediit, invadit dolor capitis, post sextum annum, herculeus morbus lethalis. Aperto capite dura meninx à sutura coronali ad frontem fuit detenta, & in medio cerebro latuit sat magnum os, acutum, quod suo acumine membranæ inflammationi & corruptioni dedit ansam. (*Vide Tit. de Dolore cap.*)

OBSERVATIO XXVIII.

In Epileptici cadavere angustia nativa ventriculorum cerebri reperta est.

ANno 1649. adolescens quidam 18. annorum Epilepticus in nosodochio Leydensi, in ipso Epileptico insultu mortuus est, cujus dissectionem cum Clar. Falcoburgius aggressus esset, & inter cætera in causam mortis accuratè inquireret, Nullam invenire potuit manifestam, præterquam quod *ventriculi cerebri nimis erant angustii* quam alias naturaliter constituti esse solent: In Pectoris vero capacitate humoris sanguinei coclear unum inventum est. In imo ventris omnia optime constituta erant, Lien solido gravior, sed boni coloris & habitus: Præterea *membra generationi inservientia p. n. erant conformata*, nam vasa semen Deferentia vix conspiciebantur. Præparantia in uno latere decerant, Testiculi autem intus retracti fuerunt. *D. Simon Schenkens miscell. cur. anni 1671. Object. 62.*

S C H O L I A.

Adolescentis vasa generationi inservientia p. n. conformata) Epilepticum interdum sua sponte terminari, ac fere tantum circa pubertatem contingit, adeo ut qui ista periodo elapsi, h. e. ante 25. ætatis annum minime curantur, vix aliquam postea sanationem recuperent; Nimirum circa pubertatem corpori humano duplex alteratio, atque propterea morbi comitialis, aut aleticus conjunctis aliis indicari, non raro solutio contingit. Nam 1^o, hoc tempore humor genitilis in vasa spermatica congeri incipit, unde sequitur particulas spirituosas, quæque ipsis accreticæ solent nitrosas phlegmas, & morbosas non tantum in cerebrum, sed etiam in testes deponi, quare si heterogenea ista spirituum copula in novum hoc promprium ubi-

ritus inferatur, ex inde cerebrum immo minus degens, diathesin epilepticam, aut alias morbidam, non raro eruit. 2. Circa pubertatem, prout sanguis aliquid cerebro prius destinatum, per aëreas spermaticas genitalibus suffundit, sic etiam fermentum quoddam ab eisdem partibus per vias retributum accipit, sic particule quædam seminali tinctura imbutæ in massam sanguineam reverteretur, quæ ipsam vigorant, ac virescentem novam & vegetiorem inspirant: quare hoc temporis & corporis & animæ dotes se possimam existunt, palli erumpunt, vox sonora evadit, feminis catamenia fluunt, aliæque accidentia superveniunt: quibus liquidum constat & sanguinem & succum nervosum spirituum quidam recentis imprægnari, quam fecerit

menta, five feminis morbifera nisi ab hoc novo fermento naturali superantur, deinceps sapē usque in mortem indomica persistunt. *Willel. Paul. cerebri s. 3.*

In ipso Epilepsio infulus mortis est. Accedente forte casu, qui in vehemēti affectu fere accidit. Notandum autem monet Clar. Willis hoc morbo laborantes non tam cadere prout Apoplecticos, aut syncopen passos, sed potius cum impetu prostrati, inque terram, aliūve corpora fortuito obiecta, tanquam à spiritu quodam malefico dejectos aliūdi, ita ut sepulchre aliqua capitis aut faciei pars prae casu violente laedatur, affectūque huius lecus ac Dæmoniaco in Evangelio, non raro in ignem aut aquam precipitatur. Huc referte oportet Epilepticos ejusmodi malis obnoxios fieri, eo quod urgente paroxysmo iis nociva

omnis siue providentia adimitur, ac insuper nervis capiti vicinis valde contractis tota corporis moles in præcepis contripitur. Nimirum in syncope & Epilepsia corporis affecti casus videtur tanquam ædificii ruina, quæ ob fulcimentæ ejus subitacta contigit. At vero in caduco, non aliter res habet quam si domus à pulvere pyro exploso evetretur, quæ ut plurimum extra locum in quo steterat dimoveatur.

Ventriculi cerebri nimis angusti Ideoque, ex sententia Galeni, imperfectæ obstructions magis obnoxii; Si cum Neotericiæ tæcamentorum receptacula eo instantia, dic quandoquidem præ angustia eorum capacis non effere, ab illis oppressam fuisse cerebrum, intus obstrictos, &c.

OBSERVATIO XXIX.

§. Epilepsia à compressione ventriculorum cerebri, & sanguine concreto in substantia ejus.

Nonnunquam cerebri ventriculi ita collapsi sunt in Epileptici, ut spirituum non facilis sit transitus liber. *Adr. Falcoburgius* puerum xvi. annorum in ipso Epilepsie paroxysmo extinctum aperuit, nullamque aliam Epilepsie mortisque causam invenit, nisi quod cerebri ventriculi valde fuerint compressi, sibi que invicem superiacentes, sine ulla manifesta cavitate: In supremo verò cerebro, prope cranium, sanguinem concretum detexit. *Th. Bartholinus cent. 2. hislor. 92.*

SCHOLIA.

Ventriculi valde compressi Huc pertinet Epileptici juvenis historia à Ballonio Paradigm. 122. allata, Quidam ætæ annos natus epilepticus erat; nil tale passus erat antequam natus esset annos 2. At nono ætatis anno incidere in cranium, quæ decurrit corona hæc, effectum est cranium: Effectum ut quod intro pulsum erat relevaretur: Quia illud quod effectum

erat vitium anigerat, Ideo incrementis & nutritione prohibebatur: Sic reliquum cranium crescebat, & quæ parte læsum fuerat non nutiebat, secundum illam partem tamen cerebrum crecebat: Sic per oppressionem cerebri, quo præsertim tempore surgebat, vertigines & Epilepsia.

OBSERVATIO XXX.

§. Epilepsia à materia adipi simili inter cerebri ventriculos sita.

Fato functo Epileptico quodam, inter cerebri ventriculos magnâ materiæ adipis æmule copiam reperi. Hæc autem materia sine dubio, vel ventriculos comprimebat, vel vasa, adeo ut obstruerentur, nec spiritus animales facile ea permeare valerent. *Petr. Borellus Cent. 2. Observ. lxxviii.*

OBSERVATIO XXXI.

In Epileptica cerebro nihil secanti occurrit præter tenuia & exilia quædam corpuscula in ventriculis.

Mulier intra paucas horas extinctæ cum convolutionibus, in cerebro nil ferè alienum compertum est. In ventriculis aliqua erant corpuscula, sed a deo tenuia & exilia ut parvi essent momenti. Accipimus eam huic morbo alias obnoxiam fuisse. Erant hæc Epileptica. *G. Ballonius Epid. lib. 1. p. 69.*

OBSERVATIO XXXII.

§. Epilepsia ab incurvatione diplois interne excitata.

Viri cujusdam magni nominis filiolus septimestris, dum nutrici de nocte ad lactandum traderetur, somno, si non vino, obrutus (nam solebat per vetulam furtim vinum emendicare, matula depottatum) postquam denuo puellum in cunas reponeret, cecidit supra earum quandam prominentiam, unde post quatuordecim dies correptus Epilepsia ad plures abiit.

Ut ignota, & à perversis mulieribus suppreffa innotesceret causa, dissectum fuit caput, in quo paulo supra tempus sinistram inferiorem cranii lamina, seu tabula in notabilem tumorem elevata versus cerebrum, superiori omnino illata, viscebatur: unde facta eo loci membranarum compressione, humorum affluxu, ac cerebri notabili corruptela, Epilepticus exspiravit. *Antonius de Pozzis Observ. 35. muscul. curios. Anni iv.*

APPENDIX

Suturarum prava dispositio in tribus Epilepticis.

In figura deviabant Suturæ capitis fatui cuiusdam, quæ omnes uno quasi elivo exaltate eminebant. Quod in tribus Epilepticis pueris Neapoli vidimus, præsertim coronalis, ut novam Epilepticorum & causam & curationem suggesserit. *Bartholinus Anatom. Reformata libello IV. cap. V.*

SCHOLIA.

Considerandum) Ad casu fœtus, quæ musc instar extabant, deprimendas usione Arabica, per fila accentia, utebatur *Severinus* in Siphylide, hydrope, ulceribus, tumorbibusque, summo successu cum *Aegyptio* usitata: Ego in quodam ingenii acui, sed singularia, officula luteæ lambdoidem ita tumentia vidi, ut

digiris singula discernere valuerim, dubio omni procal cerebro huc amandante impervacuas humiditates, sicut in exaltati & siphylide in tumorem ossa elevari videmus: Ossa enim, quia per sanguinem nutriendur argenturæque, abscedere pui possunt & quovis Tumore, *Idem sent. g. hyler. xxx.*

OBSERVATIO XXXIII.

Epilepsia à vasis tenuis meningis sanguine nigro & concreto repletis, cum apostemate in proxima cerebri parte.

Melancholicus juvenis (de quo *Tir. de Paralyti*) laborabat paralyti & convulsione cum febre insigni; menre constabat extra paroxysmum Epilepsie: In latere dextro admodum turbabant venæ tenuis meningis multo sanguine nigro & concreto: Ea pars nigricabat, & apostema continebat in proxima cerebri parte.

SCHOLIA.

De Epilepsia à sanguine vide *Petrus Sahum Diversum de affectibus partiu. cap. 3.*

OBSERVATIO XXXIV.

g. Epileptici motus per consensum à Pulmone dextro adusto, nigerrimo, thoraci adherente, Cerebro & reliquis partibus salvis.

Adolefcens Basileensis territorii, annorum forte aliquor supra viginti, ingenti Parotidæ laborans, à Chirurgo nuper curatus fuerat: Certa die incalcens frigidæ haultum avidissime sumit & herbæ incubat, paucis diebus post de cephalalgia conqueritur, febricitat, delirat, ita ut in Xenodochio nostro detentus pauper vinciri juberetur: Inde omnibus fere horæ diei quadrantibus buccas extraordinarie moticans, Epilepticis Intultibus corripitur, sputum album bullis refertum plurimis exprimens, oculos intorquens, servato semper iudicio & sensibus, ut mihi interroganti in ipso vigore observare contigit, imo expedite satis post paroxysmos breviusculi temporis ad interrogata responsione. In collo dolere se compellatur respondebat, ubi ramen & nihil p. n. excretius deprehendebatur: urina citrina, crassa erat cum hypostasi: pulsus debilis, æqualis & parum febrilis, sudoribus facillime distillabat æger: Deliria quidem theriaca & syrupo de succo limonum cum aqua acetosæ pacari potuerunt, nunquam illis vel aliis curari morbus.

Aperto cadavere, fellis vesiculam externe & interne albam & vacuam plane reperimus: Pulmonem dextrum adustum, instar atramenti nigrum & thoraci firmiter adhaerentem, Unde per consensum cum cerebro morus epileptici & deliria accefferant: In cerebro & reliquo corpore nihil contra naturam invenimus *J. Nic. Binswageri Obser. xxxviij. cent. iij.*

OBSERVATIO XXXV.

In Epileptici cordis sinibus humor concretus repertus.

IN hominis cadavere per me secto, inventus uterque Sinus cordis humore oblitus concreto, instar vulgaris gelatinæ flavioris, quam ego putavi putrem pituitæ mucaginem, bilis aliqua portione tinctam. Hic primum Epilepticus & elinguis, demum occubuit cum sinistri brachii convulsione: Ejusmodi ad unguem concretum repertum est & in majoris venis quæ cordi inferuntur, atque etiam in hujus auriculis Religiosi. *Severinus de Abscessibus pag. 277.*

SCHOLIA.

In majori venis quæ cordi inferuntur) Hippocr. Repletionem Epilepsie causam pronuntiat, quæ ipsi præcipue est in venis illis duabus, quæ ab hepate & liene

cerebro communicantur, ut lib. de morbo Sacro loquitur, Facit enim ibi venosi non nervosi generis affectum, ut ostendant verba illa, quibus grandiores ab hoc

hæc affectu solvitur. Quia venæ carvæ pareties habent & magnas, in quibus sanguis calidus est mollior, Senes è contra, quibus vacuæ venæ, paucus sanguis, æquior & tenuis, facile interficit. Tumultus & sanguis turbatur etiam, in libro de Fluxibus ponit sanguinem conturbatum & tumultuæcem, cujus motus inæqualis & impeditus est: Libro autem de rat. vict. in Ac. §. 57. & 38. venarum earundem interceptionem acculat, & spirituum libitum per eas exitum impeditum. Quum dolares en, accesserint, a. x. bilis & acrim fluxionum afflatus sunt; Doleat autem patens sine tunc dum mordeatur, conversæ vero & valde sicca sicut venæ, inciduntur, & instantiam affluenti attrahunt, Unde corrupto sanguine, & spiritibus suis potentibus nartelles in ipso viâ perirent, per frigiditates sunt ex ilatione, & vestigines & vocis interceptio, & capitis gravitas, & convulsiones, si jam ad cor sit hepatis ad venam devenerint: Hinc morbi Comitialis sunt, aut Semisyldeat, si in ambicmes locos fluxiones incident, & à spiritibus pertransire non potentiibus, rescat & facit, Vide comment. *Valisii & Pr. Martini* in eum locum & P. *Salman* de Aff. & part. cap. 3.

Epilepsia concretum, &c. De hujusmodi concretione & fibrosis corporibus, in corde & vasculis illi vicinis reperit de Tit. de Apoplexia. Talem viscositatem, vasculis majoribus adhuc eorum deprehendit se in areis pulmonica, venola dicta, in infante, remanente subdito è vivis erepto. tradit *Reverus Theatri Tabl. Exim. 19.*

Varque sunt humores obfusi Hinc collige venæ sectionem ad Epilepsia curacionem conferre, restituta sic sanguini, alias flagranuro, commeatu liberare. *Naturæ enim unit. v. Observ. 38.* Poellam 12. minor. Epilepsia frequenter couipi fultant, irritis omnibus remediis, cum pleuride corpea fuisset, pluries ei factam venam, & ab eo tempore ab Epilepsia vixisse immumem. Et *Rodolm. cent. 1. Observ. 64.* ait omnem quorum, frustra omnibus tenuis, tandem sanguine è vena cubiti aliquoties in menie educio, convulsisse,

summa in corpore inducitur moratione ab hoc presidio; quam tamen non admitterendam inoner, præterquam in morbo per consensum cum genere venoso & sanguine plurimum fervido oborto. Quæ de causa & cum per arterias defruntur humores *Epilepsia insulsum causâ*, Arteriotomia impieat Severinus Chirurg. Efficac. p. 46. neque feliciter instituitur exempla profere.

Cordis Firmari videtur inde eorum sententia qui Epilepsiam per cordis consensum adstruunt, & eo quod plerique antequam afficiantur cerebrum, insignem in cordis regione lationem percipiunt. Refert M. *Donatus* H. M. lib. 2. c. 4. Canonicum quendam, antiquo & frequenti Epilepsia obnoxium, imminente paroxysmo de corde conquestum esse; cuius regionis, si à socio fieret fictio, multo levius evaderet malum, citio que hinc desinere paroxysmus. Non tamen hinc licet inferre Cor principaliter & primo affici, condecent enim vires si seculo esset idiopathica, antequam sympathica fieret; Cardialgia autem, paroxysmi prodromus, vapori venenato, ab infectioibus manant, ac eor in transitu læssenti adscribenda videtur, quod prius palpitat antequam lito cerebro sequatur Epilepsia: At quia interim dum cor afficitur mens permanet integra, hinc est quod ægri de sola cordis passione querelas edunt, non de corde, quo subinde affecto mens quoque aberrat.

Sunt cordis Cupas insignis cum cerebro consensum, tum in statu naturali tum præter naturam: A motus cordis cum cerebro, inquit *Cler. Laneri. Diss. de cordis cap. 2. p. 99.* & sibi invicem accommodata operationis sensus motusque ratio dependet. Dum scil. à cordis motu, sanguis continuo in cerebrum & cerebellum, pro extillantibus spiritibus transmittitur, Et spiritus vice versa per nervos in cor influentes, motum ejus perennem & constantem vicissim conservant, Adeo ut cordi debeatur quod spiritus in cerebro nunquam deficient: Quin & cerebrum hoc agit ut cordis motus nunquam cesset.

OBSERVATIO XXXVI.

§. Epilepsia illo cerebro ejusque ventriculis excitata.

Decembr. x. 1613. aperui corpus cujusdam decollatæ quæ Epileptica dicebatur. In ejus tantum ventriculis cerebri nullus omnino humor apparuit: Ipsa etiam cerebri substantia erat temperamenti siccioris: Unde conjecti ipsam aut Epilepsia non laborasse aut Epilepsiam fuisse per consensum. *Salzmanus Observ. Antem. pag. 48.*

SCHOLIA.

Cerebri substantia erat temperamenti siccioris Ant. ut Vertigo (Epilepsia prodromus & *millus aduati.*) aliquando oboritur cerebro nimium tepa: gero, idcirco exquisitione sensus reddito, ut in iis qui Trochiscis viperinis abutuntur, Sic Epilepsia similem habet generationem? Revera constat quosdam iagacil-

fimi ingenii, cerebrique ob id defecati, foni leuco morbo laborasse, quod de Machomete produnt & Juli Cesare: Atram autem, & vaporem subtilissimum ad eum affectum inducendum factu esse omnibus in confesso est, ut oculis obviam causam expolice re necesse sit.

OBSERVATIO XXXVII.

A Sero vel aqua limpida, qua talia sunt, Epilepsiam non posse produci, ostenditur ex eo quod in plurimis defunctorum capitibus cerebrum illis immersum, citra d affectum illum repertum est.

TAntæ ægritudini excitandæ colluvies serosa, alique minus efferri humores, licet in ipsis cerebri ventriculis, aut circa nervorum origines depositi non sufficiunt: Quippe in defunctorum capitibus non raro cerebri medullis, ipsaque nervorum principia aqua limpida

limpidæ prorsus immerfa vidi, quibus tamen dum vixerunt, nec Epilepsia nec motus convulsivi adfuerunt. *Willis lib. de morbis convuls. cap. 2.*

S C H O L I A.

Potius ad hos motus producendos requiruntur corporicula maxime activa, qualia sunt salia & sulphures, quæ cum spiritibus combinata, & dein subito cum peccatis, particulæ mineralium combinationes, violentiæque combinationes iminent. Quandoquidem enim in motu regulari & ordinato musculi impetu motuum & vim elasticam concipere

nequimus, nisi spirituum animalium explosio quædam supponatur, certe molio magis pro solutibus Epilepticis, aliisque convulsionibus adhibendis eligendis, eorundem spirituum cum aliis particulis valde essetis complicationes, eorumque ab invicem elutiones vehementes requiri asserere licebit. *Idem.* Vide plura de Convulsione in genere.

OBSERVATIO XXXVIII.

§. 1. *Anatome puellæ Epilepticæ cujus cerebrum vitio caruit, cum viscerum omnium integritate.*

A Nno 1676. mense Junio obiit puella annicula, Filia Illustr. Dom. Ezechielis Sparhemii, Serenissimis Electoribus Brandenburgico & Palatino à Consiliis, Coloniarum nomine Residentis, &c. Leviri mei; Quæ per tres hebdomadas gravissimis insultibus Epilepticis vexata, tandem irritis omnibus remediis interiit.

Dissecto mortuæ cadavere, viscera omnia sine labe reperta sunt, nec quicquam vitii præ se tulere, quod tam pertinacis affectus & lethalis causam proderet: Cerebrum omnino incolome.

S C H O L I A.

Meminisse hic debet Medicus præcepti à *Ballonio* traditi hist. lib. 2. consil. alibi adducti, Nescio qui fiat, ut morborum cerebrum non ita difficillima sit, quoniam multi convulsi sunt, paroxysmis convulsivis, phreneticis, apoplexiis, Epilepsia tabulari, lethargicis affectibus oppressi, Sideratque, in quibus nullum fere vestigium morbi, aperto cranio, inventum est, nec sanguis, nec aqua, nec ichor, quamquam Medici, qui historiam morbi vidisset, & testificia lymphatica

observarent, certo affirmarent, sibi quæ persuaderent se aut inter membranas, aut in cavitatibus, aut alia in parte, ut abscessum, aut sanguinem, aut aquam copiam deprehendunt: Ut tanto cautiorem prudentiorque Medicum esse oporteat, & in investigandis terum causis diligentior, quanto res sunt abditiore: Adeo est obscura morborum capitalium ratio & evolutio difficilis.

§. 2. Infantum Epilepsia extinctorum cerebrâ perspexi, sæpius nihil in iis unquam notavi: Quos tamen medentes concordî assensu confirmabant Essentiali, ut loquuntur, Epilepsia constitutos fuisse: multos hic morbus à teneris unguiculis exercuit, nec ulla nota offensi cerebri post mortem eorum in capitibus deprehendi poterat. Non vero is sum qui cerebrum nego vitari posse. Ipse in eo viscere malos humores relique alienas aliquando deprehendi; inde autem Epilepsia semper haud nata fuit: Ac si accesserit irritatio tantum in cerebri partibus sensibilibus facta, fuit commota hinc facultas naturalis expultrix, qua corpus tantopere concutitur, vis autem animalis illis debilior est, ut prior validior: Il vero convalescunt ætate procedente, qua Animalis se interdum corroborat. *S. P. Schneiderus lib. de cataractis specialiss. p. 257.*

OBSERVATIO XXXIX.

In muliere Epilepsia & convulsionibus obnoxia, solum Pancreas male affectum deprehensum est.

Licer sæpius contingat Epatis, Lienisve affectione prævas malam Pancreatis, constitutionem insequi, non raro tamen contrarium evenire experientia docet, Hoc in Nob. formina *Hagbornus* observasse se in disquisitionibus Anatom. scribit, quæ annos retro plurces convulsionibus, Epilepsia & passione hysterica laborabat, & tandem post dolores & cruciatu exquisitos obiit, Aperto corpore solum Pancreas male affectum & ulceratum inveniebatur. *Ger. Blasius ad cap. iv. Anat. Vesling.*

S C H O L I A.

Pancreas male affectum) Pancreatis affectus ad cerebrum pertinere palam faciente vigilæ pernixæ totos sex menses quendam saginantes, in quo omnia illa præter Pancreatis reperta sunt. Quomodo autem eo affecto Epilepsia induci queat, vide infra.

post dolores & cruciatu exquisitos, &c.) Accidit sæpe,

ait *Immertus pract. lib. 1. p. 2. & 31. ut* instantæ paroxysmi epileptico, dolor vel tensio in cruribus, aut alia parte exteriori percipiatur: imo inde etiam quasi aura quædam ad caput ascendere sentiatur, Cum tamen eo loci causa mali genita non sit, sed in utero; cujus expultrix causa morbifica simulata per vasa materiam venena-

tam excludere conatur, cui calor innatus, & vis partium principum occurrentes, tam per vasa in pedes, vel alia loca remotiora detruddi, ubi congesta vires tandem acquirit, & vel nervis communicata, vel per alias vias ad cerebrum tendentes, Epilepsiam excitat: In tali causa diligenter inquirendum an aucti affecti signa præquerent.

Hippus *Lienis affectiones*: Epilepsiam per consensum à variis partibus oriri constat: Cum melancholia conjunctum, à Lienis ortum vidit *Rasius* in *Juvene* l. i. Obf. 9. Lien in eo, ait, à turgido atque bilis fermento jam tumidus, diffundit illico ex se vapores cerebro tam inimicos, ut *Juvenis* proximus concideret in vehementissimos morbi comitialis insultus, excitatos non tantum à causa interna, sed subinde quoque ab externa: nam pressa vel solo digito regione Lienis, contraherentur illico omnes nervi, & sequebatur consensum miserabilem universi corporis distensio, ledens iteratis, suis circulis usque eo motem jam aliquoties labefactam, & comprimis vim ipsius imaginariorem, &c. Ortum quoque Epilepsia à Renibus & vesica ducit, Referebat nobis, *inquit* *Esul. Thomas Bartholinus* histor. 61. centur. 5.) *Bened. Silvaticus* vidisse se in Austria Principem Epilepsia laborantem ex Renum affectione cum vesicæ calculo: hocque ipsi malum fuisse hereditarium narravit, à matre calculosa contractum, quæ Epilepticis convulsionibus sæpe correpta tabida tandem obijt. *Galenus* l. de loc. aff. 7. ex pollice pedis suscitaram refert, quod & *Saxonia Præf. præd. cap. 15.* observare se refert, *Galenus* item 6. de loc. 5. ex utero natam vidit, quæ retentum semine & menses. Eandem à Testibus & vasis spermaticis suscitari quidam tradunt.

Tandem obijt Cum paroxysmi Epileptici crebro tenuerunt, & qualibet vice atrociores sunt, functio animalis brevi debilitatur; atque hinc labe in spicibus de nervosis præcordiis inferientem sensum tradita, functio vitalis paulatim enervatur, donec tandem languere toto corpore, pullique immemuro, ac demum cessante, postremo flamma vitalis extinguitur. *Wille Palæolog seribit cap. 5.*

Epilepsia, Dolens & cruentum, &c. Ventris scilicet Epileptique autem & ventris torminum causam in succo pancreatico quaerit *Cl. Rog. Graaf.* Tract. de eo succo c. 10. Epilepsia quidem, A succo Pancreatico *inquit* acidior puerorum inulturn Epilepticos provenire nemo non credit, qui accurare ad inulturn, & ipsos concomitantia symptomata, & caracodirationem attendit: nam præterquam quod acidum sæpissime per os exspirem, ventris tormina patiuntur, hæc concretum solum de deorsum excreant, alvi excrementa viridia sunt & acidum odorem à se fundant, etiam acidam temperantibus carantur, v. g. aqua fœniculi, illiisum convallium, spir. salis ammoniaci & similibus.

Ventris autem dolens causam sic statuit. Si succus Pancreaticus ærior cum Bile æriori concutatur, ingens statim in tenui intestino excitabitur effervescentia, qua intestina quandoque ita distendantur ut ruptio minentur, &c. Si præter dictos succos modo jam dicto peccantes, multa in intestinis hæreat pituita, eaque viscida sit, præter dicta incommoda statim accedent fluxus: Si succus Pancreaticus acidior cum Bile interiori concutatur, non quidem tam manifestam excitabile effervescentiam, sed acrimonia sua intestinorum tormina, erosiones, &c. excitabit.

OBSERVATIO XL

Infantis Epileptici cadavere aperto, vitium in intestinis & ventriculo repertum est.

Sæpius apud Nos infantes recens nati, vel etiam ad semelstre spatium accedentes, repente sine ulla manifesta causa, quandoque cum; quandoque sine magnis clamoribus Epilepsia corripitur, emotiuntur, ut suo merito hinc *voluptas* *impudens* ex Hipp. sententia audiat: vix enim denos inter centenos reperire licebit infantes mortuos, qui non convulsionibus, vel illis certe supervenientibus, mortui: Novi in III. familia aliquot successive Epilepticos obijisse infantes, omnes sex vel septem septimanis à partu, itaut desperandi parentes in proxime nascituro insultationem occipiti; more in Italia, imptimis Florentie receptissimum, Instituire decteverint, ad avertendum gravissimum hunc effectum: Alios notavi, qui à convulsionibus servati, ad primum tamen usque septennium statim tempore singulis annis semper recidivam passi, reliquo tempore bene & extra ullam molestiam, constituti. Varias & diversas vulgus promittit hujus mali causas: nec minus operosi sunt Prædici, nunc cœli constitutionem, nunc horam nativitatis, nunc cerebri imbecillitatem, nunc aliud incufantes.

Cum mense martio anno 1674. Viennæ essem; mercatoris cuiusdam, in vicinia, ubi divetteram, habitantis filiola 24. septimanarum, per aliquot dies alvi profluvium cum torminibus clamoribusque die ac nocte passa, hoc ipso die suavis adstantium foeminarum, licet satis de bilis purgata fuit syr. ros. mosch. circa vespertam: post unam vel alteram operationem extreme debilitata, in consilium vocor: Vidi statim fatalem instare terminum, & cum Epilepsia finem vix prædixi, id quod & factum, nam media nocte supervenere convulsiones Epileptice, per tres horas durantes, & altero die mane mors. Simili plane fato ante annum ejusdem ætatis obiit ipsi filiolus, Hinc avidus sciendi morbi causam parens, petiit ut interressem apertioni corpusculi.

Nihil autem in aperto cadavere invenimus, nisi intestina inflata, distenta, vacua, & pauco excremento bilioso, liquido, hinc inde fluctuante repleto: ventriculus inflatus continebat materiam pituitosam spumantem, & quasi adhuc fermentantis, quantum blinis cochlearibus excipi potuisset.

S C H O L I A.

IN hanc materiam Pater & Chirurgus causam funestae Epilepsiae conjiciebant, quos in sententia telliqui: Mihi vero verisimilius visum infantem hunc, & praecedentem matrem & paterque omnes multo meconio bilioso, quod omnibus recens natis solemne, & à me studiose expurgari solet, abundasse, quae subitua biliosa insequens nutrimentum fuisse corruptum, & lac coagulatum, unde tormina; & proptet exhalantes ad caput vapores malignos, Epilepsia: Observavi namque izpius, si excrementum hocce conoatum statim post partum, vel robore natum, vel medicamentis bene expurgeretur, infantes praeservatissimi minus morbo hoc vel vexati vel eocari penitus: unde suiauthor, ut si in posterum ipsi nasceretur infans, statim parum vel de fyr. ros. mosch. vel de elect. de manna exhiberetur. Id quod feliciter etiam suasi Ill. praesulis parentibus,

quippe binis infantibus quos postea habuere, nihil tale quid evenit, sed salvi & incolumes adhuc vivunt, *Carolus Reyer in miscell. cur. ann. 6. & 7. p. 696.*

Pauca excrementa solvo) Non paucos & videre mihi licuit infantes Epilepsia correptos, cum alvi torminibus & dejectione faecem viridiam. Platini simili in casu confingunt ad pulveres aut epilepticos, praesertim de Guiera *Menthastrum*, vel ad occipitis inustionem, sed inani effectum, cum morbi minera in primis visula lateat. Plerosque à morbo vindicavi usu mellis rosululae. cum fyr. de cichor. misti, additis guttis aliquot spir. vitrioli, cochlearum exhibendo, donec praedicta minera exhausta sit, & faeces naturalem colorem & consistentiam adipiscantur. Dolores mulceos exhibitione olei amygdalini cum pauco decocto flor. cham. Rom. & calendulae ac lactis. cantii pulvere,

OBSERVATIO XLI.

§. 1. Epileptici canis anatomicae ejus intestina vermibus erant obfita.

ADTIANUS Spigelius Catellum Milesium, quem in deliciis habebat, Epilepsia confectum aperuit, Intestina vermibus scatebant: Sed imprimis latus Lumbricus iis adhaesit capite bifido, qui veram candidi coloris fasciam referebat. *Ioh. Rhodius centur. 1. Observ. l. ix.*

S C H O L I A.

EPilepsiam à Lumbricis in intestinis oculi confirmant praetici sit sed hoc inter alia, exemplum ab Excell. T. Bartheolme *art. 6. hist. 20.* allatum, de juvene convulsionibus saepe tentato, cum inter cetera remedia *موسقى* fuissent praescripta, ac deturbati alacritati, melioris cursu curae processit. *Idem art. 14. hist. vi.* adducit historiam mulieris Epilepticae, in qua observavit mirandas plaeae vermium formas tertium, laetum, ovalis fecae formam, multipedum: Illi ut plurimum erant tubei, hi videri lanugine investiti, duas in capite prominencias habentes, quali essent cornui: Biberat subunda in itinere, veniens ex Italia cum marito, scapulae de obvia sibi aqua avidissime. Cum non procul à nostris finibus abesset, prehenisa fuit tam gravi Epilepsia, ut nec aquam nec ignem praeterire posset, quin statim gravissimo insulsum occiperetur, Totum corpus intumuerat tam retro colore infuso.

Quamvis similem hunc nunquam viderim, fuscus erat viridi diluore permixtus. Examinata à me paulo accuratius, statim morbi mineram cognovi: Exhibui itaque praemissis praemixtendis, ea aut epileptica quae specifice virtute ad insecta exterminanda valerent, referebat enim se statim post aquas improvide ingestas pejus habuisse, ventris continua tormina persequentia, colorem corporis lentim lentimque degenerasse, & aequam Epilepsia corripere, lentissime temper in sinistro latere motum viventis quidam animalis, movi dictis aliquid sed nihil promovi, donec tandem pilulas meas mercuriales propinarem, quarum uls aliquoties repetito, tantam multiformium vermium copiam deiecit, ut numerari haud posuerint: Quamprimam hi hospitio suo exarui fuerant, paroxysmi quoque Epileptici desiere sequuta sanitate, &c.

§. 2. Secui puellam quadrimam verminosam, quae post Epilepsiam ileosa facta, per os & vermes & alvina excrementa deposuit: Quarens causam, tandem in fine Ilei quinque intestini complicationes inveni, Hujus sine dubio putri vapori, atque à vermibus elevato originem suam debebat. *Heer Spadaerens Observ. xxiv.*

OBSERVATIO XLII.

Anatome Pueri Epileptici, cujus Lien induratus, scirrhusus & fere lapidosus repertus est.

SERINUS ac Celissimus Principis D. Ferdinandi Ducis Brunsvicensis, & Lunaburgensis Filiolus unius anni, Convulsionibus Epilepticis admodum erat obnoxius, Cum his ita graviter affligeretur ut tandem vitam eum morte commutaret, corpus ejus die 27. Jan. 1673. aperui, & Lienem colore lividum & nigrum, substantia admodum induratum, scirrhusum & fere lapidosum inveni. *Matthias Tilingius in miscell. curiosis ann. 1674. 1675. & 1676. p. 280.*

OBSERVATIO XLIII.

Anatome Epileptici, cujus viscera salva inventa, solus ventriculus repertus tenuissima membrana instar.

CHirurgus ex majori Polonia, at tunc bene peritus scripsit nuper Nobilem quendam anxietate cordis diu vexatum, infinitisque usum remediis, tandem Epilepsia correptum per duos dies mortuo similem jacuisse, tandem fati cessasse.

Aperto

Aperto cadavere reliqua viscera sálva inventa fuisse (ut ille ait) solum ventriculum repletum tenuissimæ membranæ instar. *Ioh. Paterfonsius Hain, in miscell. cur. ann. 6. & 7. p. 239.*

OBSERVATIO XLIII.

Epilepsia à suppresso semine.

NOb. quidam coitui addictissimas, tandem hujus scditatis pertæsus, castitatem sibi servandam ita rigidè proposuit, ut deinceps jejuniis, abstinentiæ & orationi solum esset intentus: Ecce post sex menses nausea correptus, vertigine concutitur, & post paucos dies Epilepsia sæva opprimitur: Medici à vitio ventriculi subortam rati ventriculo, sed frustra consulunt: nam malo ferocius infestante in plenilunio, præcedentibus inordinato linguæ motu, capitis rotatione, pallore faciei, caligine oculorum, Epilepsia cum valido dentium fragore correptus, post paucas horas velut sideratus enectus est.

Dissecto corpore, nullum vitium in stomacho, cerebro, reliquisque partibus inventum, præterquam in cavitate vasis semen in penem deferentis, quæ licet conspectum quodammodo Anatomicis fugiat, & coitus tempore solum aperiatur, tamen ea semine in virore mutato oppleta visa est, & ulceribus foetidis, ab hac virulenta substantia tetenta & corrupta fortè contractis conspurcata, est quibus ascendebat indelinenter aura noxia, quæ cerebrum lancinans, excitata Epilepsia, ægrem ad interitum deduxit. *Zacutus Prax. Admir. lib. y. Obs. cxix.*

S C H O L I A.

Notum vitium in stomacho, cerebro, &c.) Epilepsia fit idiopathica & sympathica distinguitur. Hanc Galenus oblièravit vel à partibus externalibus, vel internalibus procedere: Plura equidem Epilepticorum exempla occurrunt, in quibus parosismo ingruente, primo ipsissimus cum stupore in manu, aut pedis digito, aliove membro particulari sentitur, qui ita ita exinde, velut cum fornicationis sensu, velut caput protegit: quod cum arripit, illico æger in terrâ prostratus cadit, & alique pathognomonici caduci symptomata corrumpit: Nec minus uterque est istius morbi preventivum, & primam quasi velitationem à stomacho, liene, utero, in, testibus, genitalibus, aut aliis visceribus incipere: Imprimis nempe istum aliquo perturbatio quædam cœnæ, dein ab eo loco auræ velut frigida in caput ascensus percipitur: cui statim affectioni caduci accessio cum horrendo symptomatum apparatu succedit: hinc vulgo creditur Epilepsie causam in parte ita primario affecti visâ deliècere, & æque noxam suam in cerebrum, ex se ipsius propagare. Verum enimvero super hisce dicendum esse videtur, in quavis Epilepsia causam, non modo procatartica, sed & consuetam omnino in cerebro consistere: nempe spiritus hujus incolas ad explendam dispositos, ibidemque exploratos, caducum omnem insecte: Quoad præliminaria illæc in quibusdam Epilepticis symptomatica, ex interitum causæ evidenter, nonnunquam verò tantum ligni rationem habere: si quando enim diarrhæa epileptica mala consensum visceris, puta stomachi, lienis aut uteri dispositio accidet, quoties lavicere illo affecto perturbatio quæpiam cietur, facili contingit ob fermenti illinc iramissionem, aut ipsam in caput continuationem, in cerebro prædispositum accessivum Epilepticum excitari: Atramem ejusmodi caduci symptomatica, quæ exterius inscitata affectum cerebro propagare videntur, non raro ipsius cerebri consensu oriuntur, &

parosismi epileptici ingruentis, sive spirituum in cerebro explodi incipientium tantum signa exstant: cum enim spiritus animales in cerebri & cerebelli medullis, sumisque in medulla oblongata, præ nervorum originibus confluunt, copula heterogenes ita saturantur, ut ad ipsam elidendam, proindeque morbi insulsum accendendum parati sint, proutque illi una omnes conglobatis exploduntur: spiritus aliqui exterius in privatis quibusdam nervis casentes, si quidem assueti superiorum influxu delinuntur, inmodicam tunc quædam conscripiunt, proindeque ipsos lient, quæ ipsi (prout in ejusmodi affectibus sæpe mos est) nervorum extremis, huic vel illi membro aut visceri inferis incipiunt, unde sensum ad eorum principia processum, quo cum pervenit, illico spiritus per totum corpus, prius in explosionis dispositi, ab eo spatio commoti, proindeque tanquam humi igni correpti, subito eliduntur: adeo quæ Epilepsie parosismus per se prius incipientem, velut secundario & intuitu aliunde tradito excitare videntur: Ad hunc modum aliquando passiones hysterice, cum ab invenie incipientem, cerebro communicantur, à visceribus istis oriuntur, & eorum culpa iudicari creduntur, cum interim causa morifica circa nervorum originem potissimum subsistit: *Id. Viriæ pathol. cerebri cap. 5.*

In certis vasibus, &c.) Epilepsiam Testium consenti oriuntur *Dum. Levins. anat. med. 1. 4.* A Testibus autem, & vasibus spermaticis, quando in his spermæ coarumpitur infirigidaturque, & sibi indit naturam æterni, ejus vapor ascendens cerebrum lædit & Epilepsiam inducit: Assensum *Jacobum 9. ad Alm. 14.* Negotium quom se ad sanctitatem amoris formatæ pullæ expletur, nec deplect facultatem animæ semper percipit. Epilepsia corrumpit referent, *Hab. Hæ. Obs. 13.* Zacutus parvam Epilepsiam vocat *Articulatæ.*

OBSERVATIO XLIV.

Epilepsia leve palpebræ vulnus sequuta, lethalis, nullo alio vitio in corpore apparente.

Homo ad iram ptonus cum puero gladio obtuso contendit: ab hoc sub oculo sinistro leviter vulneratur: hinc fit *æpæ*, & post aliquot horas fortissima Epilepsia correptus obiit. Examinato post mortem vulnere, nulla læsio, præter eam quæ exterius videbatur apparuit. *Vide lib. 4. tit. de vulneribus.*

Epilepsia in Inguine dextro fontem habens, tandem lethalis.

Epilepsia per consensum originem præbere multas partes, etiam habitus corporis, fama est: Ab inguinibus suscitatur exemplum hætenus non prodit: Inde tamen ortam observavi ann. 1646. Neocomi Helvetiorum in Dom. Rösseler, vallis Locle Coactore, Vir etat quinquagenarius, rufi capillitii, festivus, veneris facris, sic audiebat, in juventute addictus: Ex intervallis illi Inguen sinistrum, bubonocles instar intumescere, hinc fornicationis sensus per totum crus lento gradu ad pedis plantam usque progrediebatur, quam ubi attingerat, vapor quidam, quavis aura citius illinc recurrebat, cerebrum invadens, ejusque sinistram solūmodo partem afficiens, quod ex contractionibus & levæ partis faciei manifestum erat, corrugationibus crebris deformatæ, salvo tamen judicio & loquela, attamen vitiata, vapore etiam nervos linguae feriente: hæc enim verba apud me, sed balbutiens, in paroxysmo proferebat, *vide, vide, inquit, quam male atrox iste morbus me habeat*, comitibus simul brachiorum & erurum jactationibus, intra duodecimam horæ partem desinentibus: Multa tum à Medicis tum ab Empiricis præscripta in usum duxit remedia: Cum meo quoque consilio uti veller, ferro & igne id malum oppugnandum esse dixi, caustico partem inurendam, viamque vi malignæ illi auræ, quo pateret exitus, faciendam: neque solum partem maleficiū suspectam attingendam, sed & in femore interno & tibia emissaria paranda, quæcunque scilicet pernicioso illi vaporī esset via: Renuit Patiens, supplicia reorum hæc esse dicens, non remedia; nec toleraturum ut sibi eorum cribro simile torpersionibus factis evaderet: Unicam, eamque lapide caustico faciendam admitteret suam, quam quoque renuit: Tandem ut ligatura, infra vel supra genu facta, excursum vaporis interciperet, author fui, cui consilio assensit: statim enim ac commotam auram, titillationemque cum extumescencia in inguine animadvertebat, periscelide, perpetuo spondæ lecti cum in usum appensa, tibiam arcte stringebat, unde remota paroxysmis semper injecta: Neglectis autem cæteris remediis, ecce dum coenat cum uxore & liberis, qui mensam lecto admovent, exsurgit vapor, nec satis cito remouentur impedimenta arripiendæ fasciæ, ea ferocia diu coercitus vapor mora deterior factus exurgit, ut in eo paroxysmo extinctus, sit vir ornatiſſimus.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMII

SECTIO XIII.

De Convulsione & motibus Convulsivis.

OBSERVATIO I.

Convulsio à sero cerebrum inundante & spinalem medullam, exinde extenuatam.

IN Illustr. parentibus proavisque, aut cerebri aut nervorum dispositioni alias morbidæ obnoxiiſſi oriundus, circa ætatis suæ ~~etate~~ ^{etate} seminis istius conceptus fructus luere cepit: primo enim artuum debilitate, *ſinore* & spasms levioribus teneri solebat; ejusmodi affectibus cum diu laborasset, demum curationis gratia Bathoniam adiens, *thermū calidioribus nimis crebro usus*, vice remedii tantam exasperationem sensit morbi, ut ab isto tempore prædicta symptomata non amplius per vices sed fere constanter urgerent: nimirum singulos artus, imò quamvis partem corporis, motus convulsivi & tensiones dolorificæ incessanter exercebant, ita ut musculi simul omnes subsultibus repetitis perpetuò convellerentur, idque non sine insigni cruciatus: *cujus unica sedandi ratio in hoc sua erat, ut corpus modo tetum, modo aliqua ejus membra motu locali perperim excercerentur*, quamdiu enim evigilabat, in lecto vel sedili agitari; aut in curru veluti, aut membra comprimi vel fricari necesse habuit, in quem finem illi parabantur caliedræ & lecti

de lecti cum basi arcuata, uti sunt puerorum incunabula, in quibus cum decumberet vel erectus sederet, huc illuc, motu versatili continuo ageretur: quod ni fieret inhumani doloris & musculorum tensionibus atrocioribus infestabatur. *Huiusmodi diurnam affectionem passimodica molestiam tempore nocturno, & statim à somno symptomata longe graviora exceperet:* nam recens expe-rgo factis, illico totum corpus horrescere, *musculi tensionibus deliriosis* plurimum exerceri, singuli artus, velut instante mortis agone, sudore squallido perfundi solebant, qui in tantum corruivus erat, ut instat aquæ fortis lintea, ni statim abluerentur, cito exederet & corrumperet: *Æger* durante hoc confictu, sudores inter & horrores per plures horas torquebatur, donec penitus defarigato somnus obrepens levamen aliquod afferret: quod si paroxysmo ingruente protinus è lecto excitaretur, melius habuit, adeoque solitam affectionem roriorum præcebat: idcirco quamprimum à somno expergisceretur, licet hoc intra horæ semissem contingeret, illico ut torturam evaderet, domesticis ascietis, statim lecto eximebatur: Quantum ad appetitum, satis valens absque nausea comedebar, neque à comestis stomachus turbabatur: sæpe tamen de cardialgia querebatur, ac *interdum spiritus molesta* cum fœtore oris, velut ab assumpto Mercurio per plures dies cum exercuit: cædiore quavis, tum pharmacatum alimenta constitutioni ejus minime congruebant: Vinum aut cerevisiam generosiorum ne pitillare audebat: Primis ægrotationis suæ annis ad conspectum ignis horrescebat, postea imbecillior factus, licet urgente bruma prope focum sedere renuebat: Urina semper fuit citrini coloris, quæ si in vase fictili supra prunas evaporaretur, fæculentæ salinæ supra dimidium liquoris in fundo residerebant: *Alvus* continuo *adstricta*, nisi à pharmacis aut enemate irritata, fæcinam nunquam deposuit: Quinimo præter motus convulsivos *Paralysis* spuria totius corporis membra quævis occupabat. Nec enim manus attollere, aut pedes gressui accingere potuit, *lingua vacillans* verba nonnisi imperfecta protulit: interdum verò cum ex occasione gaudio repentino gestiret animus, spiritibus & robore mire exsuscitatus, è cathedra subito surgere, & sine alterius ope recta incedere & salite valebat: quod tamen intervallum vix horæ minutum durabat, quin membra denuo vacillarent & solito languore & tremore afficerentur. Cum supra XII. annos ad hunc modum ægrotar, remedia quamplurima, ac ferè nullius non generis tentavit, verum nulla medendi methodo sanari potuit, Tandem ingravescente senio simul ac morbo, spasmodum paroxysmi atrociores, non uti prius somno peracto, sed quamprimum lecto incallescere, ipsum invaluerunt, ut necesse habuerit lecto suo omnino abstinere, acque vestimenta raro, nisi ut lintea mutarentur, exuere, hinc transpiratione impedita, recrementa serosa, aliæque evaporatio solita in pulmones defigebatur, quæ primo *respirationem crebram*, postea affectionem asthmaticam, ac denique Tabem lethalem inieclere.

Cum illustr. hujus viri à phthisi demum extincti cadaver aperuissim, pauca admodum ejusmodi gravissimorum pathematum vestigia detegere licebat, Hinc ut constat paralysis & spasmus non tam à crassa & copiosa materia, alicubi in mineris congesta, quam à mala spirituum animalium, qui subtilissimæ invisibiles sunt, affectione pendere: Abdomine aperto, Omentum (prout in plerisque à tæbe, aliisque morbis chronicis interemptis affollet) putridum erat & fere consumptum. Interim ventriculus, intestina, pancreas & mesenterium satis rectè habuerunt: scilicet membranæ erant firmæ, bene coloratæ, & abscissu quovis aut tumore scirrholo liberæ: Intestinis majoribus excrecentiæ quædam carnes, instar auricularum muris adnascabantur, huiusmodi cum plurimæ fuerint ex utroque intestinorum, Coli & Recti, latere, ad certa quasi stadia, instar ramorum arboris, gemellæ prodibant, Simile quiddam in rabido olim reperi. Hujus ratio videtur esse quod in phthisicis nutritio (licet circa partes solidiores & exteriores deficiat) aliquando tamen interius prope succi nutritii fontes plus debito perficitur, proinde ut epiphyset non naturales & superfluz excrecant. Lien, qui semper pessimè audierat, & à plerisque Medicis velut Scorburi & cæterorum omnium affectuum causâ principalis damnatus fuerat, prorsus insans, & quavis culpa immunis apparebat, nam provt in maximè sanis observamus, fuit subatri coloris, mollis, & superficiei æqualis, obstructione aut scirrholo quovis liber, sibi & vasis satis distinctis & firmis prædictis: è compage ejus dissecta sanguis nigricans effluxit. Hepar (quod equidem mirari subest) mediocriter se habuit: nec à tam gravi & diuturna ægrotatione solito durius aut scirrholum, aut tuberculis oblitum evaserat: erat tantum grandius & coloris nonnihil obfusci. Renes, licet calculo ac ulcere quovis immunes, tamen culpa non vacabant, nam in medio dextri renis cavitas ingens à pelvi distincta, eaque multo amplior, aqua limpida impleta conspiciebatur, Talem in hydropticis sæpe numero comperi: Atque hæc quidem fortasse ex ferro in renem istum depositum, quod haud facile per meatus & poros ejus percolaretur, orta est: quippe serum inibi subsistens, ab initio specum sibi exiguum procuderat, qui sensim postea dilatabatur, cumque

ob hanc rationem feri secretio, & per ureterem exitus aliquatenus præceditur, latex ejus in sanguinem restagnans, capiti noxam graviolem intulit, quod quidem eo magis suspicari fas erat, quia ren etiam sinistè valde extenuatus & absumptus, plures hydatidas & cavitates aqua limpida repleas continebat. Pulmones lthero, & costis: & diaphragmati undequaque adnati, sine ulla fere distinctione loborum, una tantum compages carnis spongiosæ, putridæ, & materia ichorosa per totum infardæ videbantur. Proculdubio æger hoc malum non ita pridem contraxerat, scilicet cum nullo corporis exercitio defungi, nec intra lectum, ut liberius perspiraret, commorari potuerit, sanguinis feculentie & recrementa, quæ per cutim evaporare solita sunt, in pulmones deposita, in causa erant quod hi & inter se & cum aliis partibus concreverent, eorumque tonum & conformationem prorsus vitiantes, ita ut phthisis dcmum exorta cæterorum affectuum, quibus diu ac misère affligebatur, effectus & productum, ac minimè causa fuerit. In utroque Cordis ventriculo sanguis in substantiam solidam, albidam & carnis coctæ æmulam concreverat: quæ juxta cordis & vasorum cavitates & processus effugiata, serpentis cum cauda multiplici & diversa, figuram nonnihil referebat: Quo quidem in multis, post longam invalitudinem defunctis, nihil usitatum occurrit. Cujus ratio est, quod sanguis à longa ægrotatione efficitur, atque hinc circa præcordia pigre circulator, in corde & vasis appendi stagnare incipit, proindeque in concreta ejusmodi carnea sensim congelatur. Dum cranio aperto præcipuam morbi causam inter contenta ejus perquirimus, primò occurrebat cerebri visum justo minorem & gyris paucioribus instructam fuisse, unde spiritus animales non, satis copiosè productos suspicari fuimus: Porro universa *in symplexu* compages justo humidior, latice aquoso madida & prorsus immerfa videbatur, ut integumenta ejus, seu meninges integrè divellerentur, atque anfractus & ventriculi omnes aqua limpida inundarentur. Probabile est hoc cerebri diluvium nuper accidisse, nempe qua ob *esse vultu* impeditam, & lotii secretionem parcius habitam, serositates in massa sanguinea aggestæ capiti tradentur: ideoque cerebri substantia, & imprimis corpora striata, uliginosa protius, & tam madida erant, ut discissa eorum substantia, vix compacta maneret, quin liquido tum in spissatorem more, aliquatenus dissolveret intra sinus cerebro ejusque appendici superstratos ac insertos, atque vasa ex iis prodeuntia, sanguis in glomeris duriusculos, ac velut carneos, non secus ac intra cordis ventriculos, & vasa iis appensa, concreverat, quod etiam nuperrime cum sanguis pigre circularetur, ob eandem rationem qua sanguis intra præcordia coagulabatur, ac cidi se putamus. *Spinalis medulle* truncus aquæ limpide immersus, valde extenuabatur, ut vix dimidium ossæ cavitatis impleverit: quod equidem à feri falli, cui velut incoquebatur, colluvie effectum censemus. *Thomas Willis Pathologia Cerebri cap. ix.*

S C H O L I A.

SI prædictorum affectuum rationes Inquiramus, obvium erit universa hæc mala à prava cerebri & nervoli generis constitutione, ac immediatius, succi istas partes insignitis dylectasia ac vitio deducere: Nam cum liquor iste, in quo spiritus animales secatuunt, quoad temperiem summè acti, & in illas aquæ stygiæ cortosivus esset, & quoad existionem particulis nam narcoticis tum explosivis referiebatur, haud mirum est propterea spiritus plurimam onus, proindeque à debita expansione cohibitus, ubique in minutas explosiones, ita velut crepitans irgeri, quin & corpora continencia, à debita tensitate & robore exoluta, etiam in contugationes dolorificas continuo irritati. Atque Ciones istæ ipsamodice mox à somno acris infestabant, quoniam calor lecti heterogeneus succi nervoli particulas exulscit, eiq; tædaciens velat in explosiones adigis, tum etiam quia pars nervola in somno succum suum ac cui eo simul allææ mæteie moribificæ penum uberiores imbibunt: quibus ad plenitudinem saturatæ, primo evigilationis instanti, priotinus quod molestem est excurrere nuntius. Propter hanc rationem observare est Scoticorum dolores, & asthmaicorum paroxysmos à lecti calore, atque à somno plurius in ingravescere: ideo statim lecto eximuntur his ita hule egro levamen conferre solent.

Quod autem molestia à continuo musculorum subtilibus & infansibus doloribus excitata, corporis aut membrorum motu

locali aliquatenus fletur, ratio est quia spiritus animales, dimmodo in actiones diversas ab extra conjunctis inordinationes quavis ad intra suscitatas remittant: Etenim ut in dolore & penitus, qui leviores sunt ipsam, partem affectam comprimere, hicare aut scalpere juvat: ita muscularum ac tendinum motus convulsivi à totius corporis aut membrorum agitatione inordinata aliquatenus placantur.

Quod spiritus ad caputem stationem cum saturo anhelitus, que incertis intervallis redire solita est, suspicari est eam fore à mercurio clanculum aliqūdaque exhibito processibus. Quanquam & multos videri in affectibus tam convulsivis tum febribus laborantes, quibus hujusmodi perpetuis ipsi ex ore deluxio, cina omnem mercurii suspitionem, molesta fuit. Nonnullos etiam quibus salivario super veniens (materia explosiva ad hunc modum crasse evacuat) morbum solvit: Porro verisimile est hunc affectum à meritis succi nervoli recrementis productum fuisse, ductuque salivæ, cum plures & satis patentes fortis, supercilioses à nervis seque ac arteriis in glandulis copiose depositas excipere & foras convertere.

Quod lucida intervalla quibus æger induci quædam licet breves, mitigata quasi morbi serocia, obtinere solebat ut quem modo ægriundo cathedra & alligabatur, desuper te exilire & circumcirca deambulare puerici, insperato tamen atque evasido hoc robore, mox iterum in pri-

linis languorem desinente. Dico ejusmodi motus, naturæ laborantia, & sub gravi onere prostrare, fortiores quoddam minus & ubi imbecilliora esse, quibus scilicet ad momentum temporis se recolligit. Quasi morbi jugum excutere tentat: verum quia huic certamini dissi-
cundo impar sit, de quo istum relabente & pristinae lucubris facine: Profecto mirum est quantum sus-
cepta naturæ vires sua ac timor, aliæque animi passiones quoddam nervosum genus invadant, atque impetus plane stupendos edere cogant: sunt verò caligine tan-
tum durationis hæc contrarium prodigia.

Designata ad hunc modum morbi prædicti causa conjuncta, & symptomatum præcipue urgentium rationibus ostensa, adhuc inquirendum restat circa causam *occasionalis*, nempe ob quas *occasionalis* succus nervosus ita degeneret factus, i. e. paralyticus, ac dein musculosorum omnium subsultus, sive spasmodicus intulerit. Porro explicare oportet quare morbi hæc fluctus paulatim accedentes, rheumatismum usitam citò ad maturitatem pervenerint, item quare aggrava-
do ista nullis remediis cedens incurabilis extiterit.

Quoad prius, dicendum esse videtur, quod æger parentibus, qui morbis cephalicis graviter obnoxii fuerint, oriundus, malam cerebri & nervosi generis constitutionem originaliter contraxerat, adeo & intra sextum ætatis suæ lustrum paralyti ipsius laborare inceperit: dein cum procreatus huic hæreditarie causæ edentes, sanguini & humoribus majorem in dies labem affigentes accederent (erant enim varii casus atque infirmitas que vix eximio morbum & melancholiam consensim intulere) propere quidem liquor nervosus, sale suo & scorbutico supra mo-

dum imbutus, instar æque fortis, aut flagrantis vitrioli, fumosæ acis & irritativæ evasit, providet que spiritus & corpora eos continentia, non secus ac prædicti liquores lumbriis infusii, in corrugationes & contractions spasmodicas continuo intrare verit.

Quod autem hic morbus primo sensum accitens, thermorum calidiorum usum statim longe deterorem sub rebo-
ret, ratio facile patet: Experimentum enim constat balnea calida & sulphurea in corpore humano, salina, aliisque morbidis, quæ intra viscera aut humores seculent particulas, plurimum exaltare, & citò ad *superveniens* perducere, eas scilicet exagitando effluvia reddere, & primis viis in sanguinem, & exinde in cerebri & nervosum genus urgetes, quantum prius fu-
erant & otiosas conjungere, ac in *superius* quoddam incitare: quare qui ausu arduo, aut calculo hære-
dicario obnoxii, istosque afflicti paroxysmos non-
dum perpessi fuerint, à rheumatismum uti lapsissime al-
terutiles morbi fructus in se statim maturati sentiant. Cum itaque in hoc ægro & sanguis & liquor cere-
bri nervosissime genus irigant, particulis tum narcoticis tum ipsam diem imbuerentur, quæ & à crudi dulci & balsamica, ille versus salum, atque hic in acetosum, itaque viniolici æmolium degenera-
rent, tantum adhuc aquatum calidi non mineralium usus ab auxilio ferendo contra hæc mala, ut propere istam omnia plurimum exacerbarentur, atque
morbis ab humoribus, quoad temperiem & mixtu-
ram ita depravatis procedens, nullis usquam reme-
dis curari potuerit, nihilò facilius iticem quæ ac-
tum in vinum reducatur. *Thomas Willis, ibidem.*

OBSERVATIO II.

A colluvie serosa convulsivos motus non curari, nisi aliud accedat, ostenditur eorum exemplo, in quorum cada veribus cerebrum sero immersum repertum est, estis spasmodicis affectibus obnoxii non fuerint.

TANTÆ ægritudini excitandæ colluvies serosæ, aliæque minus efficiunt humores, licet in ipsi cerebri ventriculis, aut circa nervorum origines depositi, nequaquam sufficiunt. Quippe in defunctorum capitibus non raro cerebri medullia, ipsæque nervorum prin-
cipia, atque limpida prorsus immersa vidi, quibus tamen dum vixerunt, nec Epilepsia, nec motus convulsivi adfuerunt. *Thomas Willis Pathologia cerebri, cap. 1.*

S C H O L I A.

TANTÆ ægritudini excitandæ. Cum inter numerosas humani corporis agilitates nulla eorum sit causa magis in ædibus sit quam Convulsio, adeo ut Averroës non dubitaret promovere, verba Medici in hoc accidente uni-
versaliter esse propinquiora verbi morbi, quam demon-
strativa: ipsi Galenus ingens sanctorum diversitas esse tradita causis ab quibus convulsantur partes corporis, acutissimum au-
tem Willis proxima sui attingit videret, integram caput ex
eius Pathologia Cerebri hic transferre opera præviam visum
esset, atque ex quo singularium convulsivorum specierum origi-
nem erueret licet.

Vi ipsius naturæ & causæ rectius imbecillior, verbo anacoreti spiritus animales esse proatimum motus regularis instrumentum; ipsorumque vim morticem in eo tantum consistere, quod denique agglomerari in parte motiva, ibidemque in ipsam amplius ex-
pansi eandem innumescant, que proinde quoad longitudinem contracta, illico ad se partem sibi ap-
penam attrahit. In Nervorum descriptione nostra in minimis huiusmodi morum esse duplicem, Spas-
mum, & meic Naturalem: huius instanciam à cere-
bello, & se ipsius a cerebro: utrumque autem per ner-

vorum ductus, eadem ad musculos, tam ad fibras, mem-
branas, parenchymatis, aliis que partibus motivis in-
tertratis: denique in hisce omnibus tam expeditè va-
rias peragi actiones ea solidam ratione, quod inter
spiritus animales, qui animæ sensitivæ hypostasii
constitunt, intra prædictas partes, continuas serie
dispositas, ubique eadem est communicatio officii
intima conjunctio & celestimum commercium.

At verò inter motum à musculo, eumque ab alijs
partibus editum, discrimen hoc occurrit, quod in
his actio sepius intra corporis motui terminos
circumscribitur, ita ut ejusdem tantum membranas,
aut visceris pars una aliam moveat, & deinceps hæc
à vicina moveatur: In genere autem musculoso, ple-
ræque pars movens in uno membro, & movendi
in alio proximè confusa est (quantum & inter par-
tes musculosas quoddam, ut cor & diaphragma pro-
prie seipsas fere tantum moveat) Hinc membranas
& viscera, motum quasi intestinum & vermicularem
habere dicuntur: quibus obicemque incipit, spiritus
istidem denique agglomerati & capiti, primo par-
tem ipsam, deinde ultra pergentes, aliam & mox
ulteriori.

ulteriorem innumefactionem, proindeque partem illam, quæ ætergo est, trahunt, adeoque innumefactionem & proprietatem motum à loco in locum transferunt, simili fere ritu ac lumbri alique reptilla progressus suos faciunt: Hic autem membrarum ac viscerum functioni motivæ, si frequenter aut indilcontinuas fuerit, spiritus copiofi requiruntur, qui tamen sine tumultu furis tranquillè penâ suis exequuntur.

Si quidem obfervare est spiritus animales in vilcera membranacea haud multo parcius quàm in mufculos influere, prout arguit licet ab illarum partium fenfui exquisitiori, & in illis multiplici nervorum infertione & diverfimoda per pleas & fibras divaricatione, licet interea mufculi uberiori fanguinis influxu irrigentur.

Quod motum verò in genere mufculofo peractum, fpirituum agglomeratione & rarefactione per totam partem motivæ compagem subito ac fimul explicari, tanto cum impetu ac robore peraguntur, ut attractio mufculi in nianu motivo vix trochlear aut vectis excedat, cumque vis illa tantum à fpirituum partu motivæ infurorum expansione five rarefactione dependeat, nihil minus concipere poffumus quàm fpiritus in expansis pulveris pyritu, veluti ignis explodi.

Enim vero fupponere licet fpirituum fibras mufculo intertextas incolentium particulis fpiritu falinis, alias diverfi generis particulis, à fanguine arteriofo inter easdem fibras ubique intermixto nitro fulphureas accedere, illisque intimè accrefcere, dein quoties particulæ utriusque generis, velut nitrum & fulphur combinantur, propter motus infurorum per nervos advehuntur, tanquam à fomine ignis, commoventur, protinus ab invicem elidit & velut exploret, mufculum fubito inflat, proindeque trationem validiffimam efficiunt: Enimverò in hunc finem ita conftitui videtur, ut mufculi multò uberior quàm vilcera membranacea fanguine arteriofo perfundantur, nihilum ut fpirituum copie elasticæ, per motus valde crebros, ac interdum continuos abtumpat, ac perpetim decidat, fubinde itatim nova à lacte fanguineo fubftruantur, interim ut ipfi fpiritus in minori copia per nervos cales fuppediatur, ufque in eadem itatione, tanquam veterani milites diutius perfiftant & fepe copulam multiplicem impendant. Ceterò ob hanc rationem & cordis & cæterorum mufculorū virtus motiva robuftior, & fupra organum quodvis mechanicum, elastica evadit, nempe in quantum fpiritus animales, ubique in mufculofo genere agentes, fubimer copulam explosivam adfciunt.

Apud antiquos inætebat opinio affectionem hanc tantum à Repletione & Inflatione produci. Et recentioribus plerique folummodo iritationem nervorum partium caufam flauertur, conftantem inde opinor petentes, quod *in vifca* patet ab ipfa vellicatione, foloque nervorum tactu nervorum fpafmos induci: verum enimvero, ut concedamus partium nervorum iritationes non raro caufæ evidentis rationem fubire, inupei aliquando hac caufa folitaria fpafmos leviores & cito tranfientes produci: nihilominus ut graviores hujus morbi paroxysmi, illic crebra vice repetentes debet explicentur, alias atque aliores caufas, fcilicet tum conjunctam tum procatarticum, intelligere oportebit.

Quandoquidem igitur fpiritus nequaquam accidunt nifi in corpore vivo, ubi partes nervosæ turgefcent fpiritu animalis, in promptu est conjicere ipfos fpiritus animales, ficut in motu regulati, ita in convulſivo eſſe proximam adionis influentiam: nihilum, illi quandoquid copula explosiva idonea & moderata

imbuatur, ac ad ipſam elidendam causam appetitum julia, aut natu & initio du procreantur, motus folummodo regulares pariunt: Sin verò iidem fpiritus fubimer copulam heterogeneam ac nimis elasticam adficiunt; vel ſi jultu impetuofius & vehementius in actus fuos rapiantur, utique inquam equi effimes ſtimulis agitati, inordinatè exiliant, & copulam fuam, licet genolim ac naturalem violentè explodant, proindeque partes continentes, velut citius appenſos, motu perverso efferoque ſecum una corripunt.

Cum itaque motus convulſivi ob duas poſſiſſimum cauſas exciteantur, hinc totidem illorum ſpecies conſtituuntur: nam 1°. interdum accidit convulſionem ſine procatartici, aut copula heterogenea priùs adſcitis, tanquam à cauſa evidenti ſolitaria induci, ut paſſioque animi, ſolutione continui in ætervo genere, ſi cerebrum & nervi debilitati ſint conſtitutionis: quippe ſpiritus animales, obſecto improportionato ipſos fanguine, partes continentes exagitant, quin & copulam fuam, licet idoneam, vehementer elidendo, eadem inflant, proinde alias hinc antea conſtituunt: Spasmi hoc ritu exciteantur, quoniam in iis fpirituum copula naturalis vehementius eliditur, quodammodo ſunt exploſivi, quoniam citò defluunt, & fupplente ſine vilcerum aut membrorum jactationibus, cum tremore tantum & horrore aliquo in fpirituum deliquia tranſeant: Verum 2°. Convulſiones quædam paroxysmali ſunt graviores, ufque diutius perſiſtunt, ut crebrius repetantur, omnino à cauſa procatartica, ſive diſpoſitione prævia pendere, & ab illa, præter irritationem, cauſa conjuncta exortiri videntur: Idcirco in hoc caſo *Partialis heterogenea & valde exploſiva ſpiritus in hac aut illa corporis regione appetitus accrefcere ſupponimus: deinde, ex mixtis hinc combinationibus, & æreque huiusmodi materia & ſpirituum elidione, crebras vehementesque exploſiones eductas paroxysmali rumpitque inducere.*

Enimvero partes convulſivas, quæ ſpiritus à fanguine ſpirituofulo accedit ubivis, & à cujus exploſione ordinis *Impetu motivæ* juxta appetitus itum aut initio dum natu in partibus quibufvis nervosis perficitur: etiam aliammodi interdum corporula nature effera, & pulveris nitrat magis æmula, ſpiribus adveniunt, illi que intimè adhaerent: cujus materiam à ſpirituum amplexibus cum frequenter & lubida divorcia contingant, à magnis particularum elidione corpora cœſeſcentia variè inflantur: adeoque in motus convulſivos aguntur: Reverti quoties Affectio Spasmodica habitualis evadit, ut paroxysmi convulſivi non raro ſua ipſo, & ſine cauſa evidenti, paſſum vero levi quavis occaſione oriantur, talis morbi procatartici in huiusmodi mala ſpirituum animalium diutius conſiſtit neque enim tanta ægitudine excitande colluvies ſecula, alique mixta enteri humores, licet in ipſis cerebri ventriculis, aut ceteris videretur originis depoliti, ſufficiant.

Quippe in deſanctorum capitibus non raro crebri medullæ, ipſaque nervorum principia æquæ limpide prius immerſa vidi, quibus tamen dum viæantur, nec Epileptici nec motus convulſivi adſcunt: Quin potius ad hos motus producentes requiruntur corporula maxime activa, qualiſi ſunt falina & fulphurea, quæ cum ſpiridibus combinantur, & deſa ſubito erumpentia, particularum mineralium combinationes violentæque exploſiones imitantur: Quandoquidem enim in motu regulari & ordinario mufculi impetum moriturum & vim elasticam concipere & nequimus, niſi ſpirituum animalium exploſio quædam ſupponatur: ceterò multò magis pro intulibus Epilepticis, aliisque convulſionibus adolendis excitandis,

dis, eorundem spirituum cum aliis particulis valde effectis complicationes, eorundemque ab invicem effluvia vehementer requirit, afficere licet.

Circa verò ejusmodi copulam spasmodicam, quia differt à naturali, quam in motu regulari adesse, & ubi via à sanguine suppediatur ubi offendimus, inquirere oportet Undenam illa provenit, & quo riu, quousve in locis spiritibus accretat.

Quoad prius, obviare licet explosiones spasmodicas non solum in muscularis, quibus solis quæ motum regulatorem efficiant, limitamus, sed etiam in membranis, scilicet ventriculo, intestinis, mesenterio, aliisque partibus ferè exsanguibus passim contingere. Porro explosiones ipsas in affectione convulsiva, licet contra appetitus naturæ & naturæ motem excedamus, longe vehementiores esse & diutius persistere quàm in motu regulari: Ea quibus constare videtur copulam explosivam spasmodicam aliunde quam motus regularis effectilem advenire: Et quidem probabile est illam, non neque hanc à sanguine arterioso, inter fibras musculosas ubique iocertum profuine, verum à cerebro cum liquore nervoso surgente descendere, & dein juxta horum origines, medios procellus, plexus, cæcinitates, quali in morbi convulsivi minorem congeri: profecto nihil evidentiùs liquet, quàm affectus spasmodicus, ob eorum imprimis cerebrum affixum, & exinde in varias systematis nervosi partes transmissam, impissime oriri: hinc enim accidit quod passio vehementi, spiritus in ipsius hospites afficiunt, ita cerebro parthenata dicta hysterica ac hypochondriaca ordiuntur: Porro, quid in malis febrium criticis, cum sanguinis recrementa adultæ in caput transferuntur, convulsiones passim succedant: Porro & hæc ratio est cur vertigo, capitis lussatio, mentis torpor & alia, spasmodum in visceribus, & non raro in toto corpore subsequenterium primum esse solent. Quapropter minime dubitandum est quin particule heterogeneæ & explosivæ à sanguine, una cum luto nervoso cerebro intubillantur, quæ postea in nervorum genus detrusæ iusti spiritibus accretent, itaque diathesin convulsivam insinuant: Reversæ affectus, *convulsivæ*, qui aut universales sunt, aut saltem plures simul corporis particulas occupant, hoc tantum seie utæ oriuntur: Interim tamen haud negamus quin ipsam particulares, quæ in inter quosdam locos, capite nullatenus affecto, continent, aliis interdum modis inducantur: Nam si quidem nervi ab utroque fine, scilicet radice & extremis ramis humorum suum imbibunt, (ut in *menyngæ* ostentum) profecto hinc quoque inferre licebit, etiam particulas spasmodicas non tantum à nervorum principis, sed aliquatenus per illorum extremitates inus aditari: Id quod forte laici aperit constat, quod ex liene malè affecto ipsam citæ illius regionem exortit hypochondria non raro insistant. Novi quibus à timore, vel alere in mesenterio, utroqueque visceribus casiente, convulsiones cum in parte affecta, tum circum citæ eam inerebescere solebant: quod non aliunde pender quàm à particulis heterogeneis in loco affecto uberius congestis, quæque simul in fibras nervas per totam viciniam cunctas itrepentes, lissimum convulsivum, velut pulveris pyri ignis riu sumum suppediunt: At verò ipsam ob tales *menyngæ* oriundi, haud seie solent longe lateque diffundere, neque semper ad caput ascendere.

Egritudo igitur convulsiva plerumque originem à capite habet: variis autem modis materies morbilica in caput admittitur, plures item quibus in hanc aut illam systematis nervosi regionem deductus à juxta

varias causæ morbilicæ translaiones, diverse motuum convulsivorum species continuantur.

Igitur quod particule heterogeneæ & spasmodicæ inter *hæpasmæ* admittuntur, & languoris mitentis, & cerebri tulciendi vitio impurandum est.

1. Cùm sanguis materiam morbilicam capiti suffundit, vel totæ ejus massa depravatur, ut in febribus malignis, in affectione febrilibus, cacochymica, ac impuritas originaliter morbilica: vel sanguis infors maligna coagulata aliunde accipit; quæ post cerebri affixi, sic in magnis viscerum impuritibus, ulceris abiectione, &c. affectis, particule noxiæ in sanguinem ebulliant, ejusque comitatu postea in cerebrum deponantur.

Autem 2^a, sanguis ut viscosus & seminato morbilico imprægnatus haud facile loquacemurum suum cerebro alinit, nisi etiam cerebri ejusque appendicis constitutio aliquatenus in vitio heret: quod si cerebri partes bene conformantur & vigore pollent, se suisque tuerent, foribus oculis, nil præter liquoris spirituosum usus dicam, purum purumque admittunt: Sin vero aut cerebri meatus & pori nimis laxantur aut spiritus oititit ab excubitis suis cessant vel avocantur, una cum luto nervoso, materia heterogenea & morbilica irrepit, ac in regimine animali malignitatem suam explicat: Quod ipse ad ipsam cerebri malum Dispositionem, ea aliquando hereditaria existit, quid aut ipsius intemperies juto est humidior, aut siccior, vel alterius qualitas excelsa aut defecta peccat: Interdum pori sunt laxiores; vel ejus consuetudo nimis dura aut mollis est; quod de partium *serbis* & *appendicæ* ejus *informatio* indebitum modo habere potest: At aliquando cerebri & Nervorum indoles originaliter sana, ex accidente vitatur ob morbos chronicos, &c.

Quod ipse ad spirituum animalium *informatio*, propter quas particule spasmodicæ cerebrum abique repelluntur, observare est eos quibulum à nativitate tenetiores & cûd dissipabiles existere, ita quidem ut nihil sensui aut imaginationi fortis oblatum tolerare possint quo itam in confusions adjuvantur quæ de causa formior præ vitio, atque his aliæ præ aliis affectibus hysterici dictis obnoxii sunt: Porro interdum passio violenta spiritibus, ut & medicis feris, ejusmodi profectionem ac inordinatorem impetum, ut postea nihil fortiter fuisse, nec cuius injuria resistere valeam: ita passio accidit subito timore, aut ingenti tristitia regimini animali impetiones morbilicas affigi, quæ postea via unquam delectur, sine mulieris *æpe* affectiones dictas uterinas, & viri hypochondriacas primò conerant, illicque postea ferè semper assuescunt.

Ex his conat quomodo materies spasmodica intra cerebrum admittatur, jam videndum quid de illa sit postea, si quidem affectus convulsivus aut non, semper, aut non eodem modo profus modo inducit.

1^a. Interdum accidit particulas explosivas in cerebro admitti, quæ tamen inde sine magna noxa, & priusquam genus nervosum tubant; riuus extenuantur; quippe venæ & lymphæ ductus lare quod superfluum reorbetur vel foras convehunt, vel in emunctaria deponunt: 2^a dam talis materia parumper cerebro agitatur, particule ejus spiritibus nonnullæ affixæ, in hisque demum elixæ, vetriginem & fecotomiam cient: at verò quis nervorum ductus haud lubent, affectiones spasmodicæ minime succedunt.

3^a. Quando materies morbilica iura *hæpasmæ* admittit non inde itam relegatur; septemum *noxa* suam, priusquam nervoso generi iofertur, haud prode, nam iura cerebrum ipsius animales admo-

& non raro membris exterioribus spasmos inferunt; Lictenus de morbis convulsivis habitualibus facit, & non gravissimos paroxysmos repetere solitis, Res altera (species) ubi paroxysmi à causa evidenti solentia, seu scilicet tantum ab irritatione, spiritibus nondum copula explosiva preoccupatis, dependent: super his in communi statuitur insulsius (spasmodicos), à mera irritatione productos, aut leviores esse & cito pertransientes; aut gravissimos, & non raro lethales: prout quando venenis assumptis aut venis à se ipsis supervenitur: Porro adnotetur, cum materies morbilica sive irritativa, ipsi nervorum caudicibus aut plexibus interfuerit, cum non raro etiam explosivam evadere, utcumque spasmos etiam à mera irritatione producat, explosione quidam ad idem ad rem propoliam.

Partium nervolarum Irritatio, quæ mutis convulsivos efficitur solet, variis in locis, variisque ex rebus, quæ spiritibus & fibris incongrue atque inimice sunt, contingit: Quoad res spirituum naturæ adversantes,

obervare est præter venenas, & qualicumque tangibilium excessus, qui ab extra indignantur, multa quæ in nobis gignuntur sc. varia sanguinis & succi nervosi recrementa, febrilia; humores præternaturales, salinos aut sulphureos, quinimò lumbicos, calculos, cum plurimis aliis nervoso generi infesta esse, & irritationes spasmodicas passim citere.

Quoad loca affecta, sive materies irritativa sedem, licet hæc in qualibet systematis nervosi parte noxam inferat, ut plurimum verò maxime infesta esse solet cum juxta systematis nervosi principia, vel extremitates, vel circa medios nervorum processus, ac præcipue in eorum plexibus designat: Porro talis materia, quæ spiritus irritans causæ evidentis loco esse solet, non raro, prout modo innuimus, etiam provocat: Hæc rationem habet, nimirum particule heterogeneæ ab illa emissæ fibras nervæ subeunt, & cum spiritibus combinantur, eas ad explodendum aptiores & procliviores reddunt.

OBSERVATIO III.

In capitibus eorum qui Spasms vehementibus, post malas febrium crises & cephalicos morbos graves affecti fuerint, postica medulla oblongata sero acris immersa reperta est, atque pellicula obvolvens aliquando disrupta.

1. **I**gitur interdum accidunt humores malignos & nervoso generi infestos, à sanguine in cerebri regionem suffusos, & exinde demum in posticam capitis regionem delatos; nervorum origini incumbere, ubi si disrupta pellicula quæ medullam oblongatam investit, in nervorum truncos nudos incidunt, eorumque fibras altius subeunt, propterea quidem motus convulsivi non modo in partibus capiti vicinis, verum aliquando in valde remotis, & non raro in toto systemate nervoso oriuntur: Hoc passim observare est in malis febrium crisis, materia morbilica in caput translata: item in affectibus cephalicis in statum pessimum ac lethalem evectis: Re vera cum plurimum hoc ritu defunctorum capita aperuerim, repertum omnibus posticæ medullæ oblongatæ regionem sero acris & fælingineo immerfam.

S C H O L I A.

2. **Q**uemadmodum systematis nervosi extremitas interior, sive oculo, ita non raro exterior, sive finis, à vellicatione illi infesta, motus convulsivos suscipit, eisdemque quædam versus transfert: hoc in membris exterioribus passim fieri testantur tendinum ac nervorum punctura: Nec minus à vellicatione in visceribus facta ipsam circumquæ excitari solet, si quando pharmaca aut humores acres, nec non lumbici in ventriculo aut intestinis fecerint partes membranasque vellicare, adeoque tensionem molestant primis sensibus imprimunt, eandem statim ob spirituum eandem secretionem, motus convulsivi modo in partes affectas, modo indifferenter in alias quascunque retorquentur: nam à graviore visceris cujusdam noxa, sæpe ipsi non tantum partes affectas & vicinas occupant, verum in facie ac oris musculis, necnon in membra exteriora transferuntur: Calculus uretici impæctus, haud tantum in situ ductus, verum in tota vicinia contractiones immanes accendit: Porro lymphomatæ quædam hysterica, aliæque hypochondriacæ, nonnunquam hac ratione insiduntur, quatenus nimium vellicatione in visceris cujusdam membranis facta, illico spasmus retorquetur.

3. Materies irritativa, quæ spasmodorum causa evidens esse solet, interdum medios nervorum processus occupat, & propterea partes, modum supra, modo illius sedem, ad motus convulsivos incitantur: Hoc de nervorum plexibus laris constat videri, cum enim succi nervosi recrementa acia in illis congeriuntur, non raro ipsi per totam viciniam protrahuntur, hac ratione affectio colica quæ hysterica, noxia vilcerum inferiorum culpa, tantum ab humore in nervorum plexi-

bus depositis non raro progigni atque excitari videntur: Pariter ob plexus ganglioformis humore acris & irritativo obfusus, præfatio in gutture, necnon variæ præcordiorum contractiones inferuntur: Porro affectiones spasmodicæ ab humore acris intra totos nervorum caudices & corporum nervosorum meatus faciente, non raro dependent: Vidimus quosdam convulsionibus admirandis ac perpetuis affectos, ut necesse habuerint membra bacillæ jactare & distorquere, saltare, discurre, humum manibus aut pedibus conungere, alique gettitionibus stupendas egerere, haud secus ac si ligam præstigiis luderentur: cuiusmodi passionum causa genuina in eo consistere videtur, quod succus nervosum genas irrigans, inflas aquæ stygiæ accerrimus, ac à debita crasi degener factus, spiritus infusos iustisque continuis irritet ac velut oculo quodam afflaret. Thomas Wilson Patologia anthrac. cap. 1. & seq. vide Gæssund Physic. 3. lib. 11. cap. 1.

Morbum convulsivum, propter originem Nervosam præcipue affectum oriturum, causæ & generatio explicantur.

Licet affectiones Convulsivæ quæ adultioribus accidunt, aliis nominibus insigniantur, etiam alius cuspiam protapeat vulgo reputantur, atque ad passiones dictas hystericas, hypochondriacas aut colicas, vel ad scorbutum referri soleant: attamen si res paulo attentius consideretur, facile præbit symptomata quædam ipsamodica, tum visis tum sensibus, crebro evenire, quæ convulsionis nomen libi propriè ac pure vindicant: Hoc autem pro multiplex causæ morbi-

fice sede, vario modo distingui possunt, præsertim in tres has species, sc. in *Spasmus* quoddam ob *Nervorum* *Origines* præcipue affectam excitatus, inque alioa qui propriè *Nervorum* *Extremitates* materia moribifica ubiellasi clement: ac deum in alios, quorum materies moribifica à capite descendens, *Nervorum* quorundam, vel simul omnium *Ductus*, aut totos aut quoad maximam partem occupat.

Quoad *Convulsiones* à *Nervorum* *origine* affecta ortas, imprimis notandum materiam moribificam *Nervorum* initia obidemem, quandoque in priora *nervorum* paria, quæ scilicet oculorum & faciei musculis prospiciunt, potissimum influere: proindeque modo nati, genarum aut labiorum contractions & tremores, modo oculorum aut oris distorsiones sequuntur: 2. Aliquando *per vagum* & *interstallat* particulas heterogeneas maxime imbibunt, & tunc *abdominis* & *hypochondriarum* *inflantibus* *contractiones*, quæ & *cordis* *Palpitatio*, *tremor*, *regitatio* *difficilis* ac *interrupta*, *pulsus* *intermittens*, aliæque mediæ aut infimæ ventris symptomata plurimum infestant: 3. Nonnumquam causa moribifica posterius consistit, *Spinalium medullarum* præcipue afficit, & propterea *membra exteriora* & *artus subalterni* & *contractura* *inordinata* obnoxia redduntur: Porro in pluribus huiusmodi casibus, quia spiritus animales circa *Nervorum* *origines* explosi, verius *hæmorrhæ* *inordinatè* refluunt, scilicet quibusvis ferè *spasmus* hoc ritu excitatis, *vertigo*, item *æpe* *Syncope*, *aurium* *innatus*, & nonnumquam *arandis* adiunguntur aut succedunt.

Cæterum, prout ex variis affectionibus *Convulsivæ* *typis* conficere licebit, videtur quod materies *spasmodica*, hos aut illos *Nervos*, aut simul eorum plures appellens, vel circa ipsorum principia, ferè tantum hospitem, ita ut spiritibus ibidem crebro explosis, *vertigo* frequens & valde molesta oriatur: Insuper circa *præcordia* *tremores*, ac breve deliquium & *leptomyia* metus: non raro in visceribus aut musculis *subulso* & *contractura* *læves* sentiantur: vel 2. particule explosivæ, ad *nervorum* *origines* delatæ, eorum processibus alius tubent, & non raro in plexus nerveos, ad *præcordia* aut viscera imi ventris, aut etiam *membra exteriora* pertinentes, delapsæ, illis affectionum *spasmodicarum* alios quasi nidos conciliant, ut quoties spiritus circa originem nervosam in explosiones adiguntur, statim in abdomine, thorace, aut artubus, *paroxysmi* velut *hysterici*, *asthmatici*, aut alius *convulsi* oriuntur: Interim materia *spasmodica* *nervorum* *ductus* influens, cum usque ad processibus & plexus eorum remotos transferatur, quando tamen præcipuam mineram adhuc circa originem nervosam habet, ad eo ut post graves *vixitum* aut *moderatum* *spasmus*, magna *ceretri* *pericula* cum *vertigine*, *aurium* *innatus*, & non raro *arandis* subsequatur: Interim verò materia moribifica, quoad maximam partem ad longinquos *Nervorum* fines transiit, deinceps circa eorundem principia immanius agere: Etenim plures observari, qui dum principio *vertigine*, *ceretrio* *leptomyia* metu, *cephalalgia* & occipitis gravitate infestantur, circa præcordia aut viscera leviores tantum

inflationes aut tremores premittit: postea tamen effectus has partes *spasmus* immaniter percellit, de prioribus capitis affectionibus minime conqueles fuit.

Quod si de *Materia* *Spasmodica* amplius inquiratur, andem illa suggeritur, & quibus viis versus *nervorum* *origines* defertur, & cuiusmodi ibidem *finis* & quasi *foies* obnoxi: dicendum videtur, quod licet huius ductus manifestos & vestigia detegere nequimus quantum tamen ex observationibus quibusdam & eorum analogia colligere datur, supponere licebit, *hæmorrhæ* *definitus* *transitus* *modis*, quibus particule *spasmodicæ* primum in sanguine in cerebrum & cerebellum suffulæ, exinde versus *nervorum* *principia* convehantur, sc. primo Interim materies illa à cerebro ac cerebello imbibitur, ac utriusque poros sensim penetrans, in medulla oblonga caudicem delabitur, casus item tractu quodam luperato, unâ cum succo nervoso, versus *nervorum* *origines* prolabitur, ac propè illorum capita, vel intra ipsum caudicem medullarem vel intra promittentias annulatas aggeritur, in quibus locis, aut diutius subsistens, crebras vertigines, ac in partibus remotis *spasmus* leviores, ut dictum, citius vel exinde in *nervorum* *ductus* alius delapsa *convulsiones* valde atrocium *paroxysmos* excitat: Talem causæ moribificæ progressum suspicamus, in quibus vertigo, icotomia, capitis gravado ac mentis totipot insulubus *convulsivos* præcedit: cuiusmodi quidam affectus præviis, materies *moribifica* adhuc in cerebrum, & appendice medullari fixata producit, quæ deinceps in *nervos* allapsa *convulsiones* infert.

Secundò, restat aliter modus quo liquide parit *materialem* effectus *spasmodici* causam in principio *nervorum* *transfert*, nempe cum eadem à colluvie ferofa intra cavitates, sive ventriculos *tr* *hæmorrhæ* *deposita*, in vicinis *nervorum* *radicibus* *insinuat*: Enimverò in morbis chronicis, cum ad insignè sanguinis & humorum dytcrasiam cerebri quoque malà dispositio accedit, *æpe* ingens feri actus, & nervoso generi infestis copia, è plexum choroidem valis exundans, in cerebri, ejusque appendicis, ventriculos delabitur: ferofos autem hic latex, postea in quantum ventriculorum, cerebello substratum, incumbens, læxata ibidem pellicula, qua medulla oblonga obregitur, junius aut plurium *nervorum* *origines* obidet, & eosque vel particula heterogeneis & explosivis imboendo, diathelin *spasmodicam* inducit: *atque* *has* *feri* *causa* *est*, quod *post* *feres* *dianon*, aut *male* *indicatus*, etiam *post* *morbus* *cephalici* *gravioris*, *aggrantes* *deum* *convulsi* *interueni*, prout ex *ceretrio* *cadaverum*, *certis* *defunctionum*, *notis* *deprehendi*: *Quis* *etiam* *ex* *observatione* *anatomica* *constat*, *ceretrium* *colluvie* *quodam* *fero* *inundari*, *absque* *dispositione* *spasmodica* *afflictis*: *Porro* & *numquam* *ab* *Epilepsia*, *aliquis* *morbo* *convulsi* *defunctis*, *nullum* *intra* *ceretrio* *ventriculos* *feri* *dilatatum* *effusum*: Ex quo datur intelligere, affectiones *spasmodicas*, hæud tantum ab aquola *tr* *hæmorrhæ* *illuvie* *profluente*: cæterum nec omnino à tali causâ orti, nisi latex ferofus cerebri ventriculos, ac impisum intra cerebello substratum inundans, particulas heterogeneis & explosivis imbutus,

OBSERVATIO IV.

Convulsi *motus* *excitati* à *fero* *intra* *omnes* *ventriculos* *fluctuante*.

MEmini olim periculum esse meum consilium pro adolescente phthisi laborante, & tunc temporis planè desperato: præter tussim & dyspnoeam, ille per plures dies, imò hebdomadas, graviter conquestus erat non potuisse se in lecto supinum decumbere, aut dum in cathedra federet, caput vel minimùm reclinare: quippe ab hoc illove corporis situ, illico cordis tremores & spirituum deliquia, quasi jamjam moribundus esset, pati solebat, quapropter necesse habuit caput semper proutum, sive antro-

sum

sum inclinatum tenere: post obitum cadavere dissecto, pulmones per totum fere scirrhusi & in quibusdam locis ulcerosi apparebant, dein cranio aperto, ingens feri falsi & flavi copia, intra omnes cerebri ventriculos fluctuabat: qui certe latex, dum capite reclinato in quantum ventriculum, supra medullæ oblongatæ caudicem prolaberetur, in nervorum *parvæ vagi & intercostalis* capita irruens, circa præcordia convulsiones prædictas ciebat: quamdiu autem capite antrosum inclinato, ista feri colluvies in anteriores cerebri ventriculos refluerebat, nervorum origines ab ista materia spasmodica immunes persistere.

S C H O L I A.

SCio plurimos pathemata hæc convulsiva præcordia graviter faugantia, vaporibus à liene elevatis adscribere, atramen ratio longe porius videtur eadem à materia spasmodica, intra cerebrum aggesta, & in nervorum principia trunente deducere; quia scilicet excrementi cuiusdam, à partibus aliis in caput metallicis præcessit.

Cerebrum quia illius materię portio quædam, à capite descendens, nervorum ductus sæpe alius subit, adeoque circa medios, ultimosque eorum processus & pleasus, *semper explosis*, quasi *pulvis pyris* formicem struit, ex se fore videtur huiusmodi calum exempla quædam subijcere.

Puella quædam procera & vincta, patenter sanis orta, ipsique constitutionis (pior videbatur) originaliter sane, postquam hero longa invaleidine detento, diu & fere continuo ministrasset, atque hinc stupor totas noctes evigilare, aliisque temporibus cerebro expurgili cogitur, ut nunquam iomius, nisi brevis & loxotopus, caperebatur, tandem de capitis hebetudine cum crebra vertigine queri cepit: intra breve exinde temporis spatium, affectu in dies ingravescente, tremores sensit in toto corpore, cum levi membrorum succulsa, quibusdam vicibus, licet vagis & incertis ingruerent: postea dein paroxysmos plantæ convulsivos, atque horrendos & cerebro insistentem percella erat: Paulò ante morbi insulium scotomia brevi afflictebatur: mox pectoris angustiam & oppressionem magnam, qua præcordia simul omnia strictim constrehebantur, præcedis; tum illico stridorem ingentem, cum forti ejularu edens, in terram concidere solebat; interim animo constabat: ac magna cordis oppressione laborans, donec illa pectus constitudo relaxaretur, se nullo modo relevare posuit: postea cum paroxysmus pettusierat, insigni *cordis palpitatio*, sensum torpore & functionis animalis debilitate magna adiac aliquid afflictebatur: Postquam hæc ægrotans per xiv circiter menses quomodoparoxysmi, crebra vice repetentibus, obnoxia degisset, demum epileptica evasit, ut quoties mali insultus rediret, interram prostrata *admanis*, cum spuma oris, aliisque pathognomonicis eaducti symptomatis conerperet: Neque hic affectus ille gradum sustinebat, quin, via elapso anni spatio, in maniam degenerabat, ut denique ægrotans amissio rationis ulto, modo cum furore insaniret, modo cum stupore plane desipere.

Ab initio materies morbilica iuxta nervorum prin-

cipia consistens, viscerum & membrorum leviores tanum ipsimos & succussiones cum vertigine intulit: postea ejus portio in nervos *parvos*, eorumque plexus delapsa, gravissimas, *præcordia diaphragmaticæ & ventralis* convulsiones produxit: quib & ejusdem materię portio alitra cerebrum ejusque medullaria invadens, *admanis*, ac delu caduci paroxysmos inferbat, atque demum spirituum textura in totam vitia, eorumque laice in liquorem acerrimum, ac veluti stygiam, de generi, *afflictus spasmodicus in maniam* transibant: Quod spectat ad particulares tum morbi tum symptomatum rationes, videtur quod ea virgo ex vita sedentaria, vigiliis nocturnis & somno frequenter interrupto, vitiosum sanguinis & humorum diathesim, simulque pravam & debilem cerebri & nervosi generis constitutionem contraxerit, atque quod forte ex hero misamata spasmodica hauserat: Ex primò quidem panice hæretogenez, una cum fusca nervolo in cerebrum & cerebellum suffusa, ibidemque spiritibus accrescentes, præliminari scotomia quasi velabantur: Dein manies ipsomodica nervorum parvæ vagi & intercostalis, atque ipsimalis medullæ principia obidentes, una cum vertigine viscerum & musculorum subaltus & succussiones leviores intulit: postea cum eadem *Nervorum ductus* altius subiens, in plexus *vertebrales, cardiacos*, & forsan intercostales, alioque deferretur, atque spiritus, respirationis & pulsus munia exequentes, copula explosiva imbueret, illi crebra vice ob plenitudinem, vel proper irritationem, una cum superioribus nervosis originis incolis, in explosiones adactipuntum respectivum ipsimos horrendos excubant: *Eximius* urgente paroxysmo, à *nervis parvis* constitutis, de repente thoracis systole inordinata ciebat: deinde statim diaphragmate subitò & vehementer retracto, ejulatus ille obstreperus succedebat: Porro cum ob istam thoracis systolen, diastola continetur, sanguis non moveri posset impeditus, omnino in præcordia stagnaret, idcirco durante paroxysmo, cordis oppressio magna cum *apnoia* & *admanis* laborantem urgebat: Interim verò cum adhuc cerebri regio à spirituum explosionibus libera ac immunis peritaret, ægrotans animo constabat: postea verò cum materies ipsomodica, in dies adacta, etiam in cerebri debilitati & præcordia medullaria expliceretur, prioribus circa præcordia pathematis, *admanis*, dein Epilepsia, ut ultimo mania, ob rationes dictas supervenerunt.

APPENDIX.

Affectus Convulsivus, quasi Hysterica, in viro, propter originem Nervosam affectum.

NOn tantum in sexu foemineo, ut pote debiliore & magis pacibili, spasmi ab origine nervosa principaliter affecta oriuntur, verum ejusmodi affectiones aliquando in viris à simili procatarxi excitatas, videre licuit: Ante annos aliquot festinanter accessit ad extraneum quandam, ipsam primo intuitu revera Dæmoniacum suspicabar, eique exorcismis, potius quam pharmacis opus fuisse rebar: Erat is quadragenarius, qui juxta

per tres annos, statim quibusdam temporibus moribus convulsivis tentari solitus est, huiusmodi ægritudinis, dum hic fortuito paucos dies hospitaretur, occasione ingentis inæstimationis, insultum solito maiorem perpessus erat: morbi accessionem per duos aut tres dies præsentificare solebat, nempe ex magna intra sinuiput commotione, continua ferè vertigine, & crebra oculorum obfuscatione: ingruente autem paroxysmo, primo oculi varie contorquebantur invertebantur: dein moles quardam instat vivi animalis, ab imo ventre sursum versus cor & thoracem, & exinde in caput obrepere videbatur: Eiusmodi motum egomet manu ventrem ejus comprimens, planè persensit: & quamdiu palmis, totis viribus obtentis, istius globi ascensum inhiberem, se mediocriter habuit: quamprimum verò intumescencia isthæc sensum superius obrepens ad caput pertigerit, illico membra totius corporis immaniter convellebantur, ut tanquam spiritu malo obsessus, se ad parietes & postes illideret: à quatuor robustis viris vix summa vi detineri & coerceri potuit quin exiliret, & brachia, & pedes, & caput motibus diversimodis huc illuc iactaret: quando ab exilitione cessaret, membra fuerunt robustissimè extenta, & musculi rigidi & velut tetano affecti: Talis paroxysmus circiter horæ quadrantem durabat; dein ad se rediens sobriè loquutus est, in cubiculo obambulavit, qualia passus erat, conscivisse & veniam ab adstantibus petiit, brevi postea oculis obvertere & occysimè volutare cepit; dein statim affectus spasmodici repetens, similem, uti prius, excitavit tragediam: atque isto ritu, intra tres horas, quinque aut sex paroxysmos ejusmodi convulsivos sustinuit: In medio quodam paroxysmo vena in brachio pertusa, factoque orificio satis largo, sanguis lentè effluebat & statim congelari visus est, ita quidem ut in pelvium exceptus, haud liquidiorum more, in superficie planam & æquabilem diffunderet, ad instar sevi liquefacti, & in vas frigidum instillati, gutta super guttam accumulata, in molem accresceret.

Si affectio hæc stupenda mulieri contigisset, obvium esset eam hysterica dicere, ejusque causam in uteri vitium conjicere: eo magis quia tanquam molis cuiusdam ab imo ventre ascensus paroxysmum inchoavit: attamen cum vulgaris ista solutio, quæ sæpissimè merum ignorantie subterfugium est, in hoc casu admitti nequit: rationi maxime congruum videretur, omnia isthæc symptomata in malas cerebri & nervosi generis affectiones referre: Enimverò morbi causam in ipso capite latere ex symptomatibus paroxysmum præcedentibus, quæ spirituum intra *ἐνκεφαλον* scilicet agitationem insignem denotabant, planè colligitur: Ista cerebri inflatio, graves scotomæ, quæque insultu jamjam ingruente constanter evenerunt, oculorum contorsiones, manifestò arguunt particulas heterogeneas & explosivas spiritibus intra *ἐνκεφαλον*, juxta nervorum principia degentibus accrevisse: adeo ut hic casus etiam ad Epilepsiam naturam prope accederet, excepto tamen quod intra cerebri medullium spiritus, nec copulam heterogeneam admitterent, nec alibi explosi illic tumultuariè percurrerent: durante enim paroxysmo ægrotaus usque animo constabat: ac verò materies morbifica, in capite uberius congesta, cum illinc in nervorum tum interiorum tum exteriorum ductus altius prolaberetur, in visceribus tum ini tum medii ventris, etiam in membris exterioribus, seminis explosivi muneris valde diffusos posuerit: adeo ut eum spiritus animales juxta nervorum origines explodi inciperent, illico statim alii plexus mesentericos, & deinceps alii alios plexus nervos, à meta extrema usque ad caput interjectos, incolentes, ordine explosi, spasmos à parte in partem usque continuabant, donec ad *ἐνκεφαλον* perveniretur: exinde verò explosione statim ad spiritus spinalis medullæ & nervorum appendicum hospites, translata, muscularum & membrorum totius corporis convulsiones validissimæ insequebantur: Quod autem iste velut molis ascensus, qui sæpenumero in imo ventre, circa convulsio-num initia percipitur, à spiritibus intra plexus mesentericos, in explosiones adactis, procedat, ubi de *passionibus hystericis* dicemus, declarabitur:

Paroxysmo Convulsivo juxta Nervorum origines incipiente, cum spiritus extimè degentes explosiones interdum primò incant.

Si inquiratur ob quam rationem paroxysmo convulsivo ubi à *ἐνκεφαλον*, juxta nervorum origines incipiente, illico spiritus extimè degentes, (quotquot in illud symptoma prædispositi sunt) explosiones incant, adeoque affectionem spasmodicam illic plenius exoriantur, sursum transferant (nam ita plexumque habet, sive morbi accessio in imo veniat, sive

circa medium abdomen, hypochondria aut præcordia incipit: quippe spiritus ab istis locis sensum versus caput protereere solet) Dico propter hujus solutionem hæc duo impemissimè consideranda offerri, scilicet primò advertimus quod, cum spirituum integra series quardam perturbatur, qui in extremo ambu resident, in istam originali primò destituuntur: quare isti ante alios tumultuari, & irregulariter habere incipiunt: hinc quando nervus cubiti aut femoris, ab incubitu, constringitur, ut solita spirituum insensientia impediatur, supor cum punctionis sensu in manus, aut

pedis digitis primò seniebat, unde sensum superius versus loca affecta perrepat: Secundo subest altera, etque prior illius affectus ratio, nempe quod spiritus in explosiones parati, cum intra ductus oervolos, unum aut plures, quasi eisdem distinctos tubulos, constrictur, spaciū satis amplum requirunt in quo plurimum, & quidem successest rarefieri de expandi queant; quod si quidem loca nervorum truncos, à principio verius finem haud facile conceditur, idcirco dum spiritus circa originem nervosam primò elisi, versus ipsam resiliunt, proindeque vertiginem client, spirituum explosio apertior, circa nervorum processus inferiores, aut extremitates, ubi nervicaudæ, aut in plexus ampliores dilantur, aut in plures fibras huc sparsas terminantur, pleniusque incipit: dein spiritibus istis explosis, statim aliis ordiatur succedentibus, quo pariter explodi possint, locos conceditur: Hinc observare est, dum spiritus exteriores exploduntur, si ligatura aut compressione strictius facta, aliorum in idem spaciū successio, aut verius exteriora progressus intercepti, spasmos ne sursum ascendat inhiberi solet: quare cum stupor (propt. historice medicæ testatur) ab extremo manus aut pedis digito exoritur, cum formationis sensu, aut instat auræ frigida ad superiora reptit, ac cerebrum demum petens, convulsiones horrendas infert, si mox ab initio infusus brachiam aut crurum fortiter ligetur, spasmus locum illum ligatum superare non valens, à capite descendendo impeditur: quinimo nstrum est feminis hysteris, quamprius cum venitis lotamefactio, five molis in abdomine ascendens primo sentitur, medium corporis truncum fasciis circumpositis valde constringere, adeoque latius præcavetur ne præcordia, & capitis regio eodem in paroxysmo convulsivo afficiatur.

Quod autem sanguis in affectibus convulsivis citò congelatur, id fit ob immodicam musculorum & viscerum contractions, unde sanguis interfluit, spiritus vero exhalantibus aliquantulum in mixtione solvit, & ideo aliquaenus coagulatur, sic lac in butyrum agitatione convertit.

Motuum convulsivorum generatio, quorum causa circa Nervorum extremitates, aut intra Plexus nervos subsistit.

Affectiones spasmodicas interdum abique capitis vitio, à spirituum circa nervorum extremitates scintillatione irritatione explosioneq; oriri, vel hinc constat, quia cum phænomena ventericuli aut intestinorum tunc actus vellicant, aut lumbici eas corroborant, non tantum in istis partibus succedunt spasmi, sed insuper motus convulsivi nonnuquam in membris & artus exteriores torquentur: Enimvero, cum partem aliquam gravioris molestie sensus excruciat, & ab illa primo sensu communicatur, exinde statim spiritibus ibidem irritatis, motus involuntarius & irregularis reflecti solet, idque non tantum per eisdem nervos, quibus dolor sensus efferebatur, sed interdum etiam per alios, aut affines aut potius extraneos spasmus recipiatur: Ita lapu venteris infixus, fibrasque ejus octaves plurimum irritans, motus convulsivos non tantum in vase affecto, sed in cunctis fere abdominis visceribus excitat: adeo ut otius suppressa tormina, huc illuc diffusa, & vomitiones horrendæ ut plurimum succedant: quapropter minime ambigendum est, etiam moribus & symptomata quedam spasmodica, propter oxiā externam, nervorum apicibus, intra membranas, musculos aut viscera re-

minis illarum sepe numero induci: quinimo in passibus hysteris, hypochondriacis de quibusdam aliis, si quando motus convulsivi, capite illato, iteri, lienis aut aliis visceris culpa excitantur: ne illi huc solum ratione, nempe reliquorum partium incommodis hac via per nervos, nullatenus autem per vapores ad cerebrum transiunt, oriuntur, ac quoque eadem in varias corporis regiones propagantur.

Hic autem adnotetur, quod licet causa evidens solitaria, si quidem casus ac vehementer fuerit, convulsiones interdum per se & abique dispositione prævia inducat, quatenus nimirum spiritus animales supra modum irritati, explosiones debitis majores & plerumque ordinarias ineant, prout in hypercathari, ac paroxysmis colicis de nephriticis passim evenire solet: tamen in plerisque aliis affectibus spasmodicis, quorum accessiones sunt crebra & habitualis, præter irritationem circa originem extremitates factam, quæ ut plurimum causæ evidenti loco est, etiam procacitas quedam adeit, cujus efficacie nonnihil intulius præcipiti debetur, nempe cum motus convulsivi lienis, uteri, aut aliis privæ partis vado excitantur, ac crebra vice repetere solent, suspicari licet quod spiritus animales fibrarum in parte affecta, & in vicinia ejus dispositum incolat, copulam heterogeneam & explosivam prius contraxerint, quæ ad plenitudinem saturi, levi occasione in explosiones spasmodicas cœnent: deinde circa nervorum carminibus primò incipit, eorumdem nervorum ducta sarsum perreptant, & non raro ad ipsam originem nervosam, ac interdum ulterius ad cerebri modulum traducuntur: à quo denno in nervosum genus reflexæ, etiam membrorum ac artuum spasmus secundario inferunt: postquam vero cerebrum, & superior systematis nervosi portio, spasmis infecta citatius sepius compari de eo alibi allueverunt, etiam spiritus illarum partium incolat, ipsi tandem aduterant, copulam heterogeneam & explosivam admittunt, adeoque in emula procacitate partem adifici incipiunt: hinc demum procacitas spasmodica usque caudicis cujusdam oervoli termino, communis ex adit, atque spiritus animales in nervi vias, aut plurimum, cum capite tum cauda, male dispositi, ab alteruto explosiones concipiunt, etique alteri statim tradunt.

Passiones quasdam spasmodicas contingere à materie morbifica, intra plexus nervos subsistente ostenditur.

Ex plexuum Nervosum descriptione, & usu vestigillum motuum convulsivorum paucissimos, graviore, intra hæc partes sepe numero incipientes, exinde quævis in viciniam, & non raro in longinquum propagari: saltem multo probabilius videtur, partiales heterogeneas & explosivas, postquam in hæc, & ejusque appendicis medullaris itatibus superueverint, inque nervorum canales, eorumque ductus, una cum sacis ipsos irrigante, alius prolapsum, intra plexus Nervos, velut compiam, sive diverticula, copias explicare, ibidemque aliquandiu fixa habere, donec tandem uberius aggestæ, quasi collectis viribus, affectiones spasmodicas iniquiores producant: hoc inquam longe probabilius apparet, quàm (quod vulgo fit) ex utro lienis, ventericuli, aliove visceris vapores elevatos imponere, in quos nemis culpa ex facili rejiciatur: Nam intra hæc plexum pro mineris moribificis spacia satis idonea concedantur, ut materies illæ sensim deponi possit & manere, donec ad plenitudinem congruat.

deinde vero quia spirituum copios ingentes, supra quoniam in aliis quibusque cellulis, illic hospitari credimus, copula heterogeneis illic accretis, in explosiones graviores quas fornacem struit, adeo ut spiritus intra haec corpora explosi, ea non modo laesent & dilarent, verum de lim elevent & autellant (velut cum additum à pulvere pyrio subvertitur) quare partes supraposcentes subito in tantum effertur, atque appensa huc illuc violenter contrahuntur: ad hunc motum associos circa pectoria & viscera convulsivum paroxysmos suspensum excitat, prout argumenta ex ratione petita, non ita pidesis *atrophia* comprobamus habui.

Cum enim femine illius, paulo ante obitum affectibus, quos vocant, hysterici gravissimè laborant, cederet aperire, utrum quidem prout insonentem reperi: verum juxta menterii plexus nervos (ut videbatur) in molem attolli & elevari solitos, viscera istius membranas ab invicem divulsas & solutas, ut circumquaque tumidas & laxas, quasi in bullas, sive vesiculas inflatis apparere.

Profecto plura sunt rationum solidiora momenta quibus adducimus ut credamus pathemata, dicta hysterica, fupilissimè à materia spasmodica, intra plexus menterii congesta, & per vias explosa oriri: credimus item dolores colicos à materia aciori & irritativa, istidem plexibus contenta non raro procedere: Paroxysmum convulsivum, qui à liene aut ventriculo incipere videtur, istidem continuus intra plexus nervos ad lienum aut ventriculum pertinentes: Eiusmodi materies intra plexus cardiacos gravissimos cordis tremores & passionis; intra plexus pneumonicos aut cervicales, terribiles asthmae insultus excitare videtur: Porro ab eadem causa intra plexus gangliiformes congesta, & per vias explosa, istum in genere profusionis scilicet in paroxysmum convulsivum tam crebro excitatum procedere, nec immerito, arbitramur.

Motuum Convulsivorum generatio, à liquore corpora nervosa irrigante, totiusque eorum processuum in spasmos irritante.

Affectiones convulsivas aliquando per totum Nervosum genus vagari, atque partes modò has modò illas, modò plurimas simul infestare, adeo nocum est ut nil magis; quippe advertere licet in his, musculorum tendines ubique subillire, spasmis contrahi: in aliis membra quavis exteriora, variis flexionibus, torsionibusque hoc illic multiformiter flecti aut extendi: Vidimus nonnullos spirituum efficiendi & indomitivi coactos, modo veluti cistron percuros, currere aut salire, modo pedibus aut pugnis terram vel objecta quovis validissimè contrudere: quod ni fecissent, illico in ischiorum & horrenda spirituum deliquia incidere: Nimirum esset tædi singulos casus spasmorum universalium, & per totum nervosum genus oberrantium enumerare, istiusmodi autem symptomata, licet varia & multiplicia fuerint, ad tria tamen capita præcipua quodammodo reduci possunt. Nimirum quæstio à tribus causarum generibus potissimum dependet: Quandoquidem enim in vagis istis spasmis supponere debemus totam liquorem nervosum vitari, atque spiritus animales in eodem ubique somnare adulterari, proindeque sitè perpetui explosi, advertere licet ejusmodi labem, & iuxta nervo, & spiritibus ubique infusis, uno aut altero ex tribus hinc modis, ut plurimum, imprimi, sc. 1.º. vel à venenis aut veneficiis: 2.º. vel à febre maligna, aut male judicata; in-

quibus sc. materies morbosica in cerebrum aut nervosum genus, longo temporis tractu, ob affectionem scorbuticam, aut aliam viciolam, à debita crasi in liquorem aerem, aut alio modo putrefactum degenere: *Patholog. contr. cap. 7.*

Spasmodum universalium qui propter succi Nervosi diathesin vitiosam excitari solent, ratio & generatio traditur.

Ostendendum quo tunc, & quibus de causis spasmis universalibus abique veneno, aut mixtate febili propter succi Nervosi dyscrasiam scorbuticam, aut alias viciolam inducuntur: Enimvero liquore tum nervos, tum partes nervas irrigans, interdum à crasi naturali ac idonea deficiente, particulis heterogeneis & explosivis in tantum refectur, ut spiritus animales copulam incongruam, sibi ubique accretiscentis, admixtos, in continuo veluti crepitus, sive explosiones convulsivas intrentur: Cujusmodi spirituum affectiones, aut sunt divite sive discrete, inter quas nulla communicatio aut dependencia intercedit, scilicet, quando multæ partes corporis, simul & eodem spasmis, sibi propriis, afficiuntur, quæ invicem successe non capiunt, sed in eodem musculo aut membro, ubi incipiunt, terminantur; quo ritu novi quodam ægrotantes, quibus musculi & tendines simul omnes, in toto corpore, eodem distinctis convulsionibus, perpend subillunt: Vel 2.º. Affectiones convulsivæ, quæ in toto nervoso genere & simul excitantur, sunt convulsioe sive connata, quæ perperum quodam vicissitudine inter se continuatur, invicem succedunt: in quarum membrorum seie omnium, motus inordinati seie mutuo recipientes, ab una parte exortit, mox in alias transeunt:

Quod spectat ad speciem priorem, facile occurrit ejusmodi affectus non simplices sed complicatos esse, nimirum ex spasma & paralyti: nam licet musculi & tendines motibus convulsivis perpetuo urgentur, tamen ægrotantes enervæ facti, membra quavis, aut totum corpus strenuè movere nequeunt: quinimò his pathematis dolores per singulos artus æque diffusè adjuvantur: Hinc infertur licet spiritus animales copula multiplici, scilicet particulis tam explosivis tum narcoticis, tum etiam aliquatenus irritativis imbuti: adeo ut quamvis semper onusti, explosiones intrent, tamen nec plures simul, ob particulas alias aliam generis interjectas, nec quidem ulli expedire ac vegetè explodantur: quare imperis motibus haud longè pergit, sed brevius usque & interruptus existit: Res scè simili modo habet ac cum pulvis nitratus humore limoso lubetque igitur; quippe non tota simul massa cum frigore rhidit, nec unus acervus illico aliam accendit, sed pauca tantum grana, atque successivè, scilicet alia aliquando post alia, cum exiguis crepitibus explodantur: pariter & liquor nervosus particulis spasmoticis, qui spiritibus usque accrescent, per totum refectur: in quantum verò quodam narcotico, alique doletificis illis admiscetur, priorum vis elastica, ut perennis & valde diffusa, tamen rutilum resingit, ac ubique intercidit.

Quod pertinet ad speciem, scilicet spasmos continuos, in huiusmodi casibus spiritus animales, non tantum infiri in privatis quasi focus & mineis, copulam explosivam subimit adificunt, & eam quatenus, vel tunc, vel initiari per vires quidam elidunt: sed cum tota liquoris nervosi massa particulis stultis abunde itata, hæc quidem spiculis ut in infusis, tum infusis ubique accretiscent; quor propter in spa-

in spasmos fere continuos ciet: in quantum vero spiritus non semel omnes, necque praedispofiti, explodi queant, (quia scilicet tantis illorum agitationibus intra ducta nervos spiritum satis amplum non concedit) ideoque imperus explosivus, in his aut illis partibus exoritur, inde mox in alias, & tubulide in alias transiunt, ac quoque instar pyroboli, aut ignis missilis e pulvere clementari conducti, sese hac illuc ocyssime propitricant, ac utrobis vis in illas, & de in statim ex omnibus, in praecordia, aut viscera, ac vice versa vagè transcurrunt.

De Convulsione musculorum vitio oriundis, ubi de subsistit spasmadico, de Tetano, aut spasma Cramp dicto.

Motuum à musculis obeundorum instinctus, les per nervos traditur, aut à cerebro, appetitu pubente, aut consilio, vel à cerebello missi, juxta naturae leges, nobis plerumque incitibus peraguntur: Verum insuper musculi nonnumquam praeter, vel contra appetitum aut naturae placita, in motus anomalos, scilicet violentos & convulsivos aguntur, idque variis modis & propter diversas causas accideri ostendimus: Verum praeter istas diversimodas Convulsionum species, quae propter vitium ipsius nervi alicubi inherens exoritur. *Myogicus* haec nostra quosdam alius generis spasmos, à *Myogicus* praecipue affectu oriundos detegit.

Enimvero advertere licet ipsius animales, intra ipsos musculos dispositos, propter labem aut à cerebro, aut à sanguine, & fortan non raro simul ab utroque derivant, particulis quibusdam heterogeneis insit, propter quas in loculis suis subsidere & requiescere nequeunt, quin inquieti semper & agitantur, id fibris tendinis in carnes sua sponte protrudunt, proindeque ipsos crebros & non raro immanes producant: Hoc autem duplici modo fieri observamus, scilicet 1. in quantum ipsius copula elastica onusta, intra tendines haud diu maneat, quin subinde in fibras carnesque protrudens, musculi spasmos frequentes, sed & breves, seu quasi subsistens inducant: Vel 2. Quod spiritus animales, etiam si intra tendines satis placide interduci queant, ex ipsis tamen in carnes inordinate conespici, ibidemque immanis explosi, haud statim reprimi, in ordinem cogi, aut in tendines redoci possunt, quin nobis, ut ait Iovius, dia expandi perculant, proinde musculi contractionem diuturnam & valde dolosificam patiunt: Coniungit modum spasmi saepe vulgo notus, *Cramp* appellari solet.

Prior affectio, *Subsistens spasmadico* dicta, tum in febribus malignis, tum in scorbuto familiaris existit. Quoad istas, passim advertimus, quando ciliis aut nuda aut mala obnervata, denum à sanguine & succo nervoso plurimum vitia, particulae heterogeneae non tantum in visceribus (quoque ciales & functiones pervertant) sed ubique fere in musculis deponi, ibidemque ipsi ibidem accrescentes, eos velut oestro quodam afficere, proinde ut simul pacare consistere, aut intra tendines consistere nequeant, quin divisi & ab invicem distrahi, manipulum subinde in carnes protrudant, ibidemque spasmos minores, sed & creberrimos ciet: Praeter ob ipsius musculorum incolas, copula elastica ipsi ibidem accrescente onustos, nonnulli *scorbuti* in veterato laborantes, membra eodem sit haud diu continere valent, quin necesse habent manus aut pedes suos extendere, modo huc illuc agitare, varie transire, ac interdum illorum oestia coram, saltem, ab ille duris laboribus subigere.

Olim de motibus convulsivis a genere, *spasmus per-*

momentis, sive *Tetani* ariologiam fere in totum omisimus, utpote quae à musculorum doctrina postea tradenda penderet: Tunc fere tantum immixtus quidem contractionem extorci in uno musculo, quoniam alter antagonista ejus solvitur: quod equidem in facie & quibusdam membris saepenumero accidit, in quibusdam partes unius lateris *Paralyti* afficiuntur, oppositae alterius, veluti *franco* solent, nientia contrahuntur: Attamen huiusmodi ipsas, ut plurimum sine dolore est: puto hic non statim aut facile, licet nec etiam paralyti, quae illius causa est, pertinet vel eatur.

Quod itaque ad ipsas, *Cramp* dicti, rationem forentem pertinet, unumquodque hoc affectu laborans, in seipso musculum unum aut plures, involuntarie ac validissime contrahi, coque aliquando ita summe distensus & quasi rigidus manere persentit, ac interea in quantum *fibra carnis* immanis contrahit, tendinem utramque, eum scilicet qui parti immoratur, totum haud minus quam alterum qui parti movende affigitur, violenter convellunt, dolorem molestissimum insensit. Quandoquidem autem hic ipsas, propter spiritus animales scilicet in fibris carnes impetuose propitricantes excitant, minime cessat donec idem spiritus in tendines regredi, carnes relaxari sinant, ideoque proxima ejus causa est eum spiritum animalium intra fibras carnes tum major impetuolitas, qua illuc in ipsi protrudunt, tum diuturnior moror, in quantum tendines & difficilius in tendines recedunt: Pro *scandura* causis, tum mala *spiritum animalium* dispositio, tum praeva tendinum conformatio, scilicet modo haec modo illa, & non ita o simul utraque haberi debent.

Quoad prius, hic affectus, prout ceteri spasmodici, ex utroque videtur in quantum spiritus animalis particulis heterogeneis, sive copula elastica onusta, deum inuita, ad ipsam elidendam incitantur: quae tamen si quidem crassa & vi cocta, proindeque renacior fuerit, non cito nec facile dissolvitur, quin spiritus eadem inque iterit, neque fibras intra carnes conclusi, diutius in expansione deinentur: Quod quidem non ab simili rito sustinere congerit, ac cum aqua & aeri conjuncta bullam constituunt, quae si ab aqua in qua aliquantulum sponis dissolutum sit, excutitur, renacior illa, multo amplius & permanentius evadit quam quae ex meris aquis producitur: Proinde observamus eos qui humoribus crassis & satureis abundant, huiusmodi ipsas obnoxios fieri, ipsosque insuper à cibis aut potu crassioribus, post crapulam, non impunitis si laudat tenet mox superdormiant, atrociores illius morbi insulsi pati: Verum & aliquando ipsi Tendines in culpa esse reperiuntur, quatenus *contracti* nimis, aut *absoluti*, ipsius in fibris carnes redituros non facile admittunt: *Tendines absoluti* in causa est quod *Arthritis* & *Sarcoma*, quorum necesse tendines humores tali & saturei facile incurant, & obstruunt, huiusmodi ipsas dolorificis immanis tentari solent: *Contracti* autem *Tendines* quandoque hunc morbum patere ex eo patet, quod femine quaedam gravide (ut saepius advertimus) nimis gestationis mensibus, propter abundantius musculis nimis extensos, ciliis ipsas, tantummodo in ventre excutiant, molestus solant. *Wille Tractatu de motu musculari, ab exemplo illustrat suum bene analogum*, Scilicet *Spasmus* hunc *staterium* vocat, quem à sua vi humore aliquo tenui ac seroso, in musculo aliquo collecto, ejusque fibras villicante fieri ceteri: De *spasmo abdomen* agit *Histhericum* observat. Decade 5. calt. *Historia* de morbis caput. cap. 5. Vide eundem *Wille Pharmac. Rat. sect. 6. cap. 1.*

OBSERVATIO VI.

§. *Motus convulsivi in pueris, causa est aliquando serum intra cavitatem cerebelli subje-*
ctum congestum, & membranam, qua medulla oblongata involuitur, distendens
ac nervorum originem inundans: Aliquando occulta est, nullo sui
reliquo vestigio, &c.

Quo certius atque ad sensum pateret ejusmodi in motibus convulsivis fit materies morbosica, plurium, quos hic morbos oppressit, defunctorum corpora aperui: causam intra collisionis viscera & primis viis semper frustra quaesivi: Mulorum capitibus late fetosus, intra cavitatem cerebelli subjectam congestus, & membranam quae medullam oblongata investit distendens, nervorum otigines inundabat: *In quibusdam nulla hujus morbi vestigia* apparebant: adeo quod spiritibus accrescens, eos ad explosiones irritat, interdum impetribili prorsus constat mole, & originem tam occultam habet, ut vel perspicacissimum visum scrutinium omnino lareat. Olim in hac utbe ejusdam mulieris nati plures ex hoc morbo interierunt: tandem sextus quartus, intra mensem, uti priores intempti, caput dissecuimus, nulla hic fetosa colluvies ventriculos inundabat, sed cerebri tantum, ejusque appendicis substantia erat justo humidior & laxior: Quod potissimum observari dignum erat, in cavitate quae cerebello subjicitur, supra medullam oblongatam caudicem, sanguinis grumosi & velut concteti copiam insignem reperiebamus: *At vero incertum est* utrum materies isthac ibidem ab initio deposita, spasmos primario intulerat; an potius sanguis iste à partium circumcirca conficarum contractione expressus & extravasatus, convulsionum effectus & productum, ac minime istarum causa fuerit: Nam & in apoplecticis ejusmodi phenomenon passim occurrit, quod tamen morbi effectum potius quam causam esse ostendemus. *Thom. Willis Patholog. cerebri cap. 4.*

SCHOLIA

Infanter & pueros aff. cibus spasmoticis tenet, passim & tam frequenter accidit, ut hanc principalem esse unica convulsionum speciem statuatur, nam quædam symptomata in adultis aliis insigniantur nominibus, atque ad Epilepsiam, passionem hysterica[m] &c. referuntur; in pueris vero *aff. spæd.* motus convulsivi appellantur; Cæca duo autem potissimum temporis maxime obnoxii reperitur, scilicet intra primam à partu mentem: Et cæca densam eruptionem: Primo igitur (æpe accidit recens aëris, aut talem nondum bimelles, crebra vice spasmus in diversis partibus excitatis affici; cunctando affectum etiam præcordia nonnquam afficere hinc liquet, quod dum spalmi artus & membra exteriora occupant, etiam à sanguine in corde & pulmonibus una contracta flagrant, facies modo pallorem modo livorem contrahit: Cum itaque in pueris spalmi tates corporis regiones infiltrare soleant, nempe capitis & faciei partes, membra à parte exteriores, atque præcordia & viscera, observamus modo luteo, modo illas, modo bilias aut simul omnes regiones à causa moribica occupari, nempe prout eadem aut circa nervorum origines aut extremitates desigunt, & cum prius horum accidit, prout medullæ oblongæ pars superior, mediæ aut infimæ spinalis, scilicet unica aut plures simul à causa moribica impetuntur: Quod spectat ad causas huius affectus præcaras & cæcæ evadentes, quæ prioris generis sunt, in his duobus præcipue consistunt, primo quod infimibiles *morbi* & *hypæstæ* valde sunt inbecillæ & viscosa humiditate & calente, nempe cerebrum tuinus firmum, atque nervorum totus valde laxus, ne leviores quidem cupulvis materie impetus sustineant possint, quia spiritus eorum incolæ, etiam à proprio, quo illæ partes inhiantur, liquore, paululum modo immoderate influant, aut saltem copiosius quàm prout tantilli roboris modulo, facile in motus irregulares sive spasmos incitantur: Atque secundò, quoniam observatio

conflit puerulos, nec solos nec omnes qui tenuioris
sunt constitutionis, in hunc morbum proclives repe-
riunt, idcirco per porione procrazeos morbide ra-
tione haberi debet, quod infimibus quibuidam, pro-
pter mala ab utero contracta, & sanguis & lucus
nervosus originaliter vitiosi exsunt: quippe recen-
tatis massa sanguinea per placenti tunc mentis venti-
latione carens, inspurio evadit: quare plerique infan-
tibus brevi à partu efflorescentia laxa & rubicunda,
mobilliorum iustar per totam eum et erumpunt: cu-
jusmodi *ictus* si impediatur non reprimitur, sepe-
mero aphae periculosae elica orbi partes succedunt:
hinc, merito iustiparum tales languinis impuritates
quandoque in cerebrum & nervolum genus, ipsos
debiliora suffundi, & propterea spasmodicas affec-
tiones oriri: nempe dum sanguis ab utero vitiosus ex-
sistens, deputare (sanguis, faeculentia sua, efflorescen-
tia in cuius facta, exterminari solitas, in capiti trans-
fert: quare laetes modo tenues & fetulos, modo cras-
ses ac viciosis, ac uterque salum & sulphurum par-
tem naturalium participo, in his aut illos cerebri
cerebelli, atque medullae oblongae recessus & cavi-
tates deponitur: cuiusmodi secreta cum nervi
hujus aut illius, ac inserunt una plurium origines aut
canalices obstruunt, ipsiusque eorum incolis particu-
las heterogeneas, atque in explosiones spasmodicas
apae adigunt: quampium cum nervi tales particu-
las alius imbibuerunt: ipsius eorum copula onus-
sunt, aut sponte sua, aut à causis evidentibus inclinat,
eam elidit & ecurrere sagittas, proindeque explosio-
nes spasmodicas inest: Perfecto quod particulae
heterogeneae, quae sanguini ab utero innatae, in ple-
tusque pueris per *ictus* in toto corpore curaneam
amandari solent, in aliis capiti iustis, affectionis
spasmodicae causa materiali exsunt, praeter rationes
alias, etiam à maxime iuvantibus inferre licet, quippe
in puerulis haec deario huic morbo obnoxia, in-
sultus convulsivi optime praecavimus, si exor à partu
fopuall

fontanella in nocha excidetur, & sanguis huiusmodi suavia jugularibus venis detrahatur: illa namque succi nervosi corruptela subducuntur, atq; hoc cruoris efflorescentie impuræ à capite avocantur: Hinc administrationum modis cum prius duo aut tres ejusdem parentis nati, brevi post partum convulsu interissent, feceris omnes alii ab eodem malo liberabantur. Circa Dentitionis quoque tempora pueri spasmi obnoxii evadunt, quippe nervorum quoripars una aut altera insignis propagat, ad cuiusque dentis radicem perstringit, que cum à sanguinis alio sumve humorum particulis acrioribus illic congestis vellicatur, conturbatione sua acerrimum molestitæ sensum sive dolorem infert: istiusmodi autem huius nervi vellicatio in pueris dentitionibus ideo concipitur, quia dentibus jam in maiorem molem crescentibus, & adhuc intra gingivæ viam dum cavatas incluis, membranz & fibræ quaquaversi disceduntur: hinc sanguis in circuitu prædixit tumorem infert, adeoque nervos comprimit, quin & aciores scilicet particulas illi suffundit, quibus illi insigniter vellicati conturbationibus & spasmi doloribus torquentur. *Idem ibidem.*

In quavis ætate huius morbi visiva.] Experientia confirmat cerebro sapies integro, nec quicquam p.n. affecto, quod persistentes ejus operationes cessantur, nihilominus gravissimas convulsiones jam hanc, jam

illam partem torquere posse, sicut non tantum in morbo convulsivo, Halitz olim Epidemico insipiam, sed & io illustri quadam puella, ob imperfectam variolarum expulsiorem, diversarum partium miserabiles convulsiones patiente vidi &c. *Gregorius Haysius hysteric lib. 2. obs. 45.*

Ac vero morbus est &c.] Caidam convulsionibus gravissimis tentato, in medio quodam paroxysmo vena in brachio petraia est, factoque crinico scis largog, sanguis leote affluebat & statim coagulati vilus est, quod quidem lia fieri io affectibus convulsivis & apoplecticis passim assolet: Autamen quod nonnulli hinc contendunt convulsiones omnino à sanguinis crassitie, motu impedito & stagnatione prodire, minime concedendum est, quippe sanguis ab illa qui spasmi obnoxii tam paulo ante paroxysmum detrahatur, sero dilutus atque scis fluidus exillit: quapropter opinari liceat congelationem illam ab ipso paroxysmo induci, quia scilicet in moribus convulsivis, ab lemodicis musculorum & viscerum contractionibus, sanguis interfluit, spiritus & sero ejus exhalantibus, aliquantulum io mixtionem solvitur, & propterea aliquatenus coagulatur, non aliter quam cum lac propter nimiam agitationem, & partium ab invicem separationem, iribusyrum concrevit: quare huiusmodi sanguinis coagulatio videtur convulsionem potius esse effectus quam causa: *Videtur ibidem.*

OBSERVATIO VI.

§. Convulsiones febribus diuturnis, aliisque morbis chronicis, ante obitum accidentis, causa est serum nervos in exortu afficiens.

IN morbis chronicis, cum ad insignem sanguinis & humorum dyscrasiam cerebri quoræque prava dispositio accedit, sæpe ingens scilicet acris & nervoso generi infesti copia è pleurochoro de convulsis exudans, in cerebri ejusque appendicis ventriculos dilabitur: serosus autem hic latex postea in quartum ventriculum, cerebello substarum irumpens, luxata bidem pellicula, qua medulla oblongata obtegitur, unius aut plurium nervorum origines obsidet, eosque vel irritando, vel particulis heterogeneis & explosivis imbuendo diaphesin spasmodicam inducit: Atque hæc fere causa est, quod post febres diuturnas, aut male judicatas, etiam post morbos cephalicos graviores, ægri denum convulsi intereunt, prout ex crebra cadaverum eo ritu defunctorum anatome deprehendi: *Th. Willis Patholog. cerebri cap. 5.*

OBSERVATIO VII.

§. Convulsivi motus totius corporis, hysterici crediti, à serosa illarvie cerebri omnes recessus occupante.

DOmnia illustris per multos annos affectibus spasmodicis obnoxia, potissimum verò quoties utero conceperat pathematis convulsivis, quasi hysterici supra modum tentari solebat: quippe statim à mensibus cohibitis particule heterogeneæ ad cerebrum & nervosum genus translata, atrocissimi affectus paroxysmos intulere: postquam novissime conceperat, primis mensibus, juxta pristinum morem, affectibus convulsivis subinde molestabatur: Circa nonam gravidationis hebdomadam, à frigore suscepro in febrem periculosam incidit, in qua dolores valde acuti per plures dies, in lumbis & juxta hypogastrium gravissimè urgentes, abortum minari videbantur: atamen dolores isti, prout ab eventu confisit, potius colici censendi, ab humore acri per nervorum ductus à cerebro in istas partes decumbente procedebant, nam circa febris declinationem materia istac alibi translata, diarrhoea, pedum dolores & dispositio velut ulcerosa succederant. Quamprimum hæc Domina à febre & doloribus istis convaleuit, affectus convulsivi redibant, nam quolibet mane è somno evigilans, circa oris & faciei partes, necnon in brachiis & cruribus, spasmos & contracturas immanes pati solebat: quæ symptomata proculdubio à serosa colluvie in capite circa nervorum origines aggesta, ab iisque una cum succo irriquo, in somnis alijs imbibira oriebantur: & cum postea eadem materies nervorum

interiorum ductu iterum in mesenterii plexus ac lumbos ferebatur, istarum partium dolores atrocissimi, ac insuper paroxysmi quasi hysterici eam graviter infestabant: Enimvero isti faciei & membrorum motus convulsivi brevi tempore cessabant, usque tamen imbecilla ac euervis cum vultu pallido, gressu infirmo ac tremulo, atque alimentis tantum incongrui & liquorum calidorum appetens petebat; sub finem tertii mensis, quo tempore constanter abortire solebat, menstrua eruperunt, quibus per duos aut tres dies, una cum membranarum laceratarum frustulis descendentes, abortum expectabat: attamen fluxu isto cessante, dolores, velut parturientis, in abdomine & lumbis exorti sunt, eamque hebdomadae spatio, die & nocte miserrime torquebant, tandem balneo herbarum emollientium usa, & exinde lecto ad sudandum commissa, uteri sarcinam deposuit: conceptus ita cum ingenti cruciatus decedens, galli Indici ovum & magnitudine & figura aequabat; huius tunica exterior fuit lacera & disrumpa, interior integra manens, aquae limpidae circiter $\text{℥} \text{ss}$. & nihil praeterea continebat: nulla quidem fixus aut formati aut usquam futuri rudimenta apparebant: postea per 4. aut 5. dies lochia eum aliquibus membranarum frustis effluebant: interim dolores cum solita atrocitate urgebant, cumque elapso hebdomadae spatio haud sponte desinerent, demum his sedandis remedia expetuntur: Propter hunc finem imprimis linimenta, foras, balnea & clysteres crebro adhibentur, etiam medicamina uteri sordes expurgantia, in quas totius mali causa rejicitur, intus sumuntur: Priorum usum torminum breves intermissiones sequuta sunt; subinde vero afflicta cum insigni molestia redibat; quinimo intra tres hebdomadas morbus plurimum ingravescent, multa alia horrenda symptomata aciebat: nam praeter dolores in abdomine & lumbis, qui in dies atrociores fiebant, insuper in dorso, cervice, scapulis, necnon in brachiis & cruribus magno cruciatus mox afflicebatur, idque acerbius quoties lecto incalefcebat: Ceterum crebra vertigine, vomitu & nausea, atque saepius in die paroxysmis convulsivis gravissimis affligebatur, scilicet primo moles in hypogastrio ascendere visa, illico totum ventrem cum impetu attollebat, mox respiratione cohibita $\alpha\iota\alpha\delta\eta\pi\alpha$ cum vultu cadaveroso successit: postquam ita velut demortua per tria aut quatuor horas minuta iacebat, subinde exillire solebat, ut altantibus vix comprimi aut contineri posset: dein contractiones immanes & distortionem in cunctis oris & faciei partibus, necnon in omnibus corporis membris sequuta sunt: symptomata haec tevera hysterica iudicabantur, quoniam Domina illustre, nuper ita abortierat. Attamen haec singula perpendens, in ea demum sententia fuit utriusque paroxysmi, tum $\alpha\lambda\gamma\kappa\epsilon\lambda\alpha\delta\eta\pi\alpha$, tum spasmodici causam omnino à mala cerebri & nervoli generis affectione, etiam absque uteri culpa, pendere: nempe quod humor acris intra $\epsilon\upsilon\kappa\alpha\sigma\tau\alpha\lambda\alpha\sigma$ congestus, exinde per nervorum ductus in partes longe distitas descenderet, qui membranarum & fibrarum insidens, cumque humore à massa sanguinea influo fermentescens, eas plurimum irritaret, adeoque dolores atroces ciebat: postea dein cum pariculae heterogeneae & explosivae, cum humore isto intra $\epsilon\upsilon\kappa\alpha\sigma\tau\alpha\lambda\alpha\sigma$ admixtae, atque ductus nervos subeuntes, spiritibus accrescerent, propterea diathesis spasmodica subinde in graves paroxysmos erumpens inducebatur: Juxta huiusmodi aetiologiam intentiones curativas instituens D. aegrotanti, quo tempore gravius laborabat sanguinem à vena saphena mitti, intra bidduum leni cathartico exhiberi, idque semel aut bis in hebdomada iterandum praecepi: Aliis diebus, vespere & mane spir. c. c. aliisque horis, bis aut ter in die pulveris à margaritis & oculis caneri cum dosi seq. julapii propinabam \mathcal{Z} . aq. limacum, lumbric. magistral. an. \mathcal{Z} iij. saxifrag. cerasor. nigr. an. \mathcal{Z} iv. hystericae \mathcal{Z} ij. syr. è corall. \mathcal{Z} id. tinct. castorei \mathcal{Z} id. m. Balneo herbarum dulcium frequenter usâ fuit cum necessitas urgeret, opitata semper cum bono successu assumpsit, vesicatoria internae parti utriusque femoris, etiam cervici applicabantur: porro foras, linimenta, clysteres, cucurbitae, sternutatoria &c., juxta symptomatum exigentias administrabantur: Ab hac medendi methodo per 14. circiter dies adhibita D. illustr. plurimum alleviata, paroxysmis convulsivis omnino caruit: Quinimo viscerum & membrorum tormina, aliaque symptomata valde mitigata citae convalescentiae spem optimam fovebant: Posthac verò, partim ob malum vivendi rationem, cui aegrotans vel paululum refecta semper indulgit, praecipue tamen ob subitam terroris, vel tristitiae passionem, quam funestum acciden. excitaret, recidivam passa, mox morbus in multo deteriorem statum evehctus, nam & spasmi & dolores atrociores infestabant, quin & ventriculus vomitu fere continuo laceratus, nec alimenta nec medicamenta retinebat: haec a finium per aliquot dies cum fructu quodam fovebat: quod tamen squidem in ventriculo bilefens, el molestiam pareret, brevi omittebat, tandem invidis omnibus remediis Nobilissima patiens magis in dies magisque elanguescebat, atque sensum morti appropinquabat: Bidduo ante obitum ventris & lumborum tormina plurimum remittebant, ipsaque solito alacrior facta convalescentiae spem quandam concepit,

cepit, interea tamen conquesta erat de capitis dolore & gravitate insigni: cumque circa initium noctis alitè dormiverat, expergefata in paroxysmum convulsivum valde horrendum incidit, qui statim in apoplexiam cito lethalem transit, namque insensibilis & *depressa* facta, intra 12. horas è vita migravit.

Cum circa ægritudinis causam varia judicia ferebantur, plerisque nimirum mala omnia in affectionibus uterinis, aliis in abscessum aut apostema, quod alicubi circa abdominis viscera latitans suspicari sunt, referentibus, placuit ut cadaver apertendum sedulo inspiceretur, adeoque genuinæ morbi & mortis causæ investigarentur: Itaque primo circa habitum corporis observatu dignum erat, quod membra & partes inferiores, juxta ac ultra dolorum causas confixæ, plurimum contabuerant, ut crura prorsus emaciata, instar scelerati apparuerint: interim facies, cervix & brachia satis plena & rosea manebant, unde constabat liquorem nervosum operi nutritio non minus quam facultatum animalium exercitio conferre: quare cum liquor iste, in lumbis & abdomine à transitu multum impeditus, & spasmus continuus absumpsum haud debito influxu ad partes inferiores descenderet, istæ propterea statim tum enervæ, tum emaciatæ evaserunt: Hujusmodi atrophia ab hoc differt ab altera hectica quæ sanguinis vicio contingit, quoniam in hac facies Hippocratica præcipuum morbi signum est; in illa vultus aspectusque parum aut nihil mali producit.

Cadaver, ut valde emaciatum, & viscera omnia inanita fuerint, tamen illud cinisime comprebatur: nam intra 40. horas cutis per totum discolor; in hac parte livida, in ista viridis, inque alia subnigra apparebat, & corpus tam cito putrescens odore non summe tetrum exspirabat, cujus ratio præcudubio erat, quod ob musculôs perpetuis spasmis exercitos, mixtionis principia in tantum laxarentur, ut illa in dissolutionem prompta, post obitum mox ab invicem decederent: pari certe ritu uti observamus de carne ferarum, quæ aut cursu diurno fatigatæ, aut fustibus contusæ occiduntur, hæc enim multo citius putrefcit, quam illarum quæ statu tranquillo & sedato manantur,

Abdomine aperto, intestina & ventriculus satis sana, integra enim & bene colorata apparebantur: erant tamen inanita & quasi inflata, utpote quæ in perpetuas fere evacuationes: scilicet supra aut infra habitas, sollicitata fuerint: In tota cavitate hac nullus abscessus aut apostematis vestigia cernebantur: Dum morbi causam perquirentes viscera hæc illuc devolvimus, in mesenterio aliquid notatu dignum occurrebat, nempe circa medium ejus, ubi dorso affigitur, atque majores nervorum plexus continet, substantia laxior, & quasi pluribus vesiculis inflata manus latitudinem exæquans videbatur; eo scil. ritu ac quando in artuo vitulino interstitia musculorum à laniis insuflantur, ut pars ea plenior & quasi pinguior facta exumescat: hoc mesenterii loco, quia tumidior & tactu mollior fuit, humorem aliquem doloris causam hospitari putaveram: aperiens verò deprehendi tantum membranas fuisse ab invicem solutas, & interstitiis suis nihil præter statum inclusisse: qualis membranarum separatio, & ab invicem divulsio, præcudubio inducta fuerat à crebris spasmis, sive spirituum explosionibus, quæ intra plexus & fibras nerveas illic densissime confatas fere continuo ciebantur: atque spasmis isti ob particulas heterogeneas & explosivas, illuc nervorum ductu à capite derivatas contingebant: Enimverò quod spectat ad ista ventris tormina, & in affectibus convulsivis velut molis ascensum & abdominis inflationem, non dubitandum est quin causæ morbificæ sedes in illa mesenterii parte delituit: Atramen quoniam uteri principaliter affecti tanta suspicio ferebatur, quantum hoc viscus metuerat, proxime inquirebam: itaque pelvim intra ossa pubis consistam diligenter scrutatus, uterum in debito situ, & quoad omnia sanum & sartum rectum repari: corpus ejus ad justam molem, licet tantum septimanæ quinque post abortum præterierant, contrahebatur, scil. pyrum minus & magnitudine & figura reserere: Glandula ex utroque fundi latere, quæ Testes dicuntur, perexiguæ & flaccidæ, sine quovis humore superfluo aut viscido in iis contento, apparebant: Uteri corpus ubilibet dissectum, crassitie sua pollicem latum æquabat, ejusque interiori cavitati haud major fuerat quam ut sabam contineret: intra hunc specum, sicut in aliorum viscerum cavitatis æqualitatem, quosdam quiddam in perexigua quantitate includebatur: revera circa uterum, aut appendicem ejus, nihil extabat, cui tanquam causæ morbificæ symptomata modo dicta imputari potuerint: Quare hinc, quod prius opinatus sum, *nonnulli* concludere liceat, *Passiones* dictas *uterinas*, sæpiissime ab aliâ causa quam uteri vicio excitari.

In intestinis amoris, etiam *Renes* satis sanos reperimus: alter tamen eorum inusitatæ erat figuræ, scil. in plures lobos instar renis vitulini sindebatur: *Lien, Pancreas & Omentum* sine culpa, *ventriculus* valde inflatus erat, ejusque tunica interior absque plicis aut rugis plana evaserat, quod certe acciderat ob crebros vomitus, viscere hoc spasmus continuis fere affecto: Porro ob hanc rationem, scil. stomachi tono præfracto, alimenta nec

bene appetere nec concoquere solebat : *Hepar* à sana constitutione plurimum desciverat, fuit namque tumidum & subdum, pallidi colotis arque insitit ligni putridi exangue proflus & exsuecum : hoc proculdubio effecerat liquorum cardiacorum & impense calidiorum crebrior usus : *Pulmones* erant lividi coloris & per totum obstructi, utpote ichore spumoso & fœtido infarcti : certe hoc viscus & *Hepar* a longo tempore vitiosa existerant, propterea ut sanguis diutius à crasi recta degeneret & valde depravatus, ægritudinis prima semina, ejusque deinceps fomitem constantem suggererit.

At vero præcipuam & quasi originalem morbi causam in capite, idque haud frustra quaesivimus ; itaque calvaria exempta, vasa meninges & cerebrum perreptantia, sanguine plena & distenta apparebant, cum in reliquo corpore inter dissecandum vix quicquam sanguinis effluerat : meninge crassiori amota, per alteram tenuem & pellucidam, aqua limpida *cerebri* plicas & anfractus implens, ejusque totam compagem quasi inundans cernebatur : Revera omnes cerebri cavitates & recessus colluvies serosa impleverat ; plexus choroideus aqua diu immerfus, & velut elixus discolor & semicorruptus evaserat : Juxta nervorum splanchnicorum origines aqua se plurimum insinans, piam materiem à medulla oblongata caudice, per duos digitos latos separaverat : proculdubio horum nervorum ductu materies morbifica à capite in mesenterii plexus descendens, & dolorum & spasmodorum causa existerat : Porro eadem materies etiam aliorum nervorum capita afficiens, eorumque ductus pervadens, postea in aliis partibus, scilicet quibusvis fere totius corporis, atrocissimas hæc affectiones produxit. *Thom. Willis Pathol. cerebri cap. 10.*

OBSERVATIO VIII.

5. Convulsio à sero inter cranium & meninges diffusa, circa principium spinalis medulle, quantum ventriculorum & substantiam cerebri.

Claudius juvenis fractus tandem partim acerbitate dolorum abdominis 40. dies totos acriter urgentium nec ullam quietem concedentium : partim vehementia motuum convulsivorum, qui in languescensibus succedere, post paralytici obit.

Corpore dissecto deprehendimus iustissima, quanquam cruciata per tot dies acerbissimo fuissent afflicta, atque immedicabili fete segnatè laborassent, tamen integra & inculpata fuisse, nullamque causam tot dolorum fomitem in iis repperit : Sed ubi ad caput ventum, cum primum seta caput posticum divideretur, tum aqua pura liquidaque sponte diffuere cepit non paucas : avulso autem crano, meninx occipiti & cerebello inserta tota madida decolorque apparuit : ad insitit papyri aut telæ in aqua diu demersæ : Et vero totum principium spinalis medullæ, nervique hinc inde in vertebrae propagati, in aqua plurima innatare, vasque ipsa per membranas dispersa concreto sanguine livescere, congelato quippe à frigore aquæ circumstantis, comperta : Aperto demum cerebello, non solum ventriculus quartus aqua scatens, sed & substantia ipsa eadem prægnans, totaque imbuta conspecta : cerebrum autem reliquum sicum proflus & candoris nativum, cæteræque constitutionis retinens, repperit. *Carolus Piso l. de morbis à sero sect. 4. cap. 11.*

S C H O L I A.

A Cerebrum dolorum abdominis] Invenit duos Renes, ad basin mesenterii, persequendus est Plexus ille nervorum Fallopiæ, conatus ex stomachico & coeliacali, utriusque concurrente ad formationem istius plexus, à quo derivantur omnes nervi qui distribuuntur pacibus alvine regionis : Eo plexu incubrato prævis humoribus, Convulsiones acidiæ in duobus colicis, illæso cerebro, in viris ut in mulieribus : *Ruelens Embry. Anatom. lib. 1. cap. 17.*

Post paralytici obit] Affinis est Convulsioni Paralytici tam materis ratione quam nervorum affectionum, unde sibi invicem succedant, subinde quoque se pressio pede comitantur : Viro Clarissimo circa vespertinam ex lingua paralytici subitus loquendi potestas : postero die sinistram lacus resolutum, & os adeo humiter constructum fuit ut nulla vi aperiri posset, dextrum vero lacus convellitur : Nempe materia maligna, cujus indicia preterea apparentes pro-

diderant, spinalis principii partem sinistram proflus obstruens, sensum motumque illius partis abolivit : In dextram vero partem non ita copiose invadens, membranas vellendo, quia nervum totum replere non potuit, ad convulsiones irritavit : Honesta matrona, durante pulmo dextri cruris & pedis in eadem parte Paralytici tenebatur per ætatis decursum, ita tamen ut sensus in pede remaneret, motu soluto. *Thom. Bartholinus Hist. 1. art. 4.* Sic primo Epidem. Aet. 13. Mulier, quæ decumbebat in litore, cito lingua privata est voce ; Dextra manus languit cum convulsione, Apoplectico modo & quanto lingua privata est voce, convulsio eorundem &c. Sed quid est (sic Vallesius in comment.) quod dicit, tertio manum languisse cum convulsione, Apoplectico modo : certe resoluta est, si autem resoluta, non videtur cum convulsione languisse, nam Resolutio longe differt à Convulsione ; Verum quod

congruit, hoc est quod etiam congruit quarto die lingue, pars resoluta est, tamen antequam resoluta omnino caderet, motus habuit convulsivos, ut scilicet

et fieri solet sacco ingrediente nervos, & facultate repugnante ut membrum in figura continetur.

OBSERVATIO IX.

Convulsio à sero omnes cerebri ventriculi replente & initium nervorum irrigante.

A Nnò 1624. in femina omnes cerebri ventriculi, etiam quartus, humore limpidò, sero nempe bilioso referti: *Quo è quarto ventriculo in spinalis medullæ cavitatem perfluente, quum irrigato nervorum principio stimularetur facultas obscuri motus in nervis, convulsio invaluit.* *Ioh. Rhodam cent. 1. observ. 49.*

S C H O L I A.

E *Quarto ventriculo in spinali medulla cavitatem* Quem ventriculum medullæ Nobilem vocat Excellent. Bartholinus, quod sit locus generationis & elaborationis animalium spirituum; eo quod 1°. sit purissimus & subtilissimus 2. cavitatem ad id sufficiens obtineat, 3. eo in loco situs sit ut undique citra se in omnes nervos spiritum animale effundere possit: Ceteros ventriculos esse excrementorum conceptacula statuit 1. ex structura, nam foramen abir à cavitatibus ad glandulam pituitariam, 2. Eorum superficies semper aequo humore oblitur. 3. Saepe toti repleti puriora & aqua humiditate reperiuntur.

fundere possit: Ceteros ventriculos esse excrementorum conceptacula statuit 1. ex structura, nam foramen abir à cavitatibus ad glandulam pituitariam, 2. Eorum superficies semper aequo humore oblitur. 3. Saepe toti repleti puriora & aqua humiditate reperiuntur.

OBSERVATIO X.

Convulsivi motus ab humore inter cranium & capitis cutim collecto.

M Ihi perspectæ fuerunt dux collectiones humoris inter cranii os & capitis cutim, unde in altero ægro extitere motus convulsivi. *C. V. Schneideri libr. de Affectib. Soporosis pag. 241.*

OBSERVATIO XI.

Convulsio à sanguine vitioso replente vasa meningum, abscessu intra cerebellum, cum exulceratione dura meningis.

Q Uidam per biennium conquestus fuerat de dolore in occipite, tandem Phrenitide ac Convulsivis motibus correptus subito interiit: Huic crassa cerebri membrana aliquot locis exesa erat variis foraminibus, idque potissimum in bregmate sub sagittali futura, ubi & cum coronali jungitur: Ex iis foraminulis effluebat, & per membranarum dictam effusus erat sanguis ferme concretus, ater ac adustus, admodum fortens: Tali quoque sanguine distenta erant vasa per exteriorem crassæ meningis superficiem discurrentia, quin & ea quæ numerosa per tenuem disseminata sunt: Huic intra cerebellum abscessus humore non naturali scatens, repertus fuit: Erat is humor colore ex citrino ad pallorem vergens, pallida bilis nimirum: Ipsa cerebelli substantia flaccida omnino, molliorque multo quam cerebri substantia. *P. Pavium observ. 8.*

S C H O L I A.

C *Cerebelli substantia flaccida &c.* Id quoque à Riolo in Antheopogr. lib. 6. cap. 1. annotatum, his quibus continuus capitis fuit dolor in occipicio, cerebellum mollius ipso cerebro fuisse repertum; in aliis aridum & friabile.

Intra cerebellum abscessus Quibus disruptis & pure excludo sanitas aliquando consequitur: *Horatius Augustinus l. 1. Epist. 1.* homini quem exspiratorum perdidit, maximo naturæ impetu facto, per nares auresque affatim libras quatuor, plus minus, puris albi vacuare confecerit, unde vitæ restitutus fuit: Ex-

cellens. *Th. Bartholinus cent. 6. hist. 13.* narrat de Genetolo Rozarantio, cum quocumque veniret, & se videret, fastorem naribus occurramem sentisse, alibi nihil sanidi animadvertentibus: Tandem per nares sensim octo dierum spatio fluxisse fortidam flavamque materiam, ruptis abscessus certum indicium, cum tumore ægri levamine. Sanitatis spes est in iis quibus abscessus ad cerchii emundatoria vergunt, quæ nulla cum partes ejus posticas occupant, iis enim disruptis proclivis est saniei influxus in spinam, cui non conceditur exitus.

OBSERVATIO XII.

Juvenis motibus convulsivis affectus, in cujus capite vasa meningum sanguine turgida reperta sunt, Cum tumore eandem phlegmonode; Aqua plurima cerebri anfractus implente.

Juvenis cum per duas septimanas de gravissimo capitis dolore conqueustus esset, Tandem febris aucta, vigilis, *motus convulsivi*: Calvaria aperta, vasa meningas perreptantia erant sanguine repleta, Ipsæ tumore phlegmonode per totum affectæ apparebant: Cerebri anfractus omnes, ejusque ventriculi aqua limpida erant repleti. *Vide scilicet. 1. lib. I.*

OBSERVATIO XIII.

Convulsio cervicis, & convulsivi motus à sanie & muco in sinistro ventriculo cerebri etc.

Juvenis (*de quo Tit. de melancholia*) Caput præter morem in sinistram latum inclinavit. Mensis spatio elapso, resolutum quasi collo, membrisque omnibus tremulis, & velut saltu subfiliantibus &c. 12. post diebus à mane ad vespèram *acerbo agone confusatum*, supervenientibusque haud obscuris convulsionibus, expiravit.

Cerebrum post remotionem duræ meningis, quæ venulas apparuit nigricans & lividum, In sinistro ventriculo copiosa erat sanies *cum muco* &c. Cui adscribendum quod spasmus ejusce lateris affligeretur.

SCHOLIA.

A *Maturino tempore ad vespèram acerbo agone confusatum etc.* Quomodo in agone seu luctu mortis, spiritus virales ad tempus, si non plene, refocillari debeant, neglectum fere hæcenus est, quia videntes Medici juxta Hippocratem, signa lethalia, deserunt agros, ne se, artem & medicamentis prostituant; Sed non deferendi æget, quin omnia adhibenda quibus vita prolongari potest: Novi namque plures lemi-motus à Medicis derelictos, per cæcilia remedia restitutos: Dicam hic ingenue quod lentio: In corde, quod est ultimum moriens, extinguuntur spiritus virales variis modis 1. Nihil ætatis sanguinis, live ex maligna venenata qualitate, live ex nimia quantitate, cum vehementi motu corporis, vel affectibus animi commotus in ferream linguam, cor obstruit: hos juvat V. S. potiones refrigerantes, acque epithemata pectoris. 2. Alii moriuntur dum ad cor non affluit pro circulatione continuanda, t. vel novus Chylus, idque vel ex defectu ciborum, aut eorum expulsionem per dysenteriam aut vomitum, aut visio valvulam mesentericam, aut si chylus per ductum debitos non transmittatur ad cor, nam si ubique novo chylis prior sanguis solus sepe circuletur, absumitur: His prodester transfusio sanguinis humani vel virulini in venas, novum illud invenimus: nam de liquoribus alimentosis infundendis, parum in agone spero. 3. Si Sanguis qui per venas reveli debet, grumescit & coagulatur, idque varie ex variis moribus, In Tube, marasmo, febrilibus præfervida, lymphæ seu serum utile deficit in sanguine, unde incaluitur & nimis acris fit: Hos in agone (nil de morbi causa dico) sublevari ad tempus balneum calidum, quod coagulationem diluit & humectat: In aliis morbis qui Tartari dicuntur, ut Scorbutus &c. Viscidos fit sanguis, carens spirituosus tenuibus partibus, unde incaluit vel putrescit: Tales ægri incipiunt mori ab eadem membris, pedibus, manibus, imo & capite, & paulatim deficiente pulsa & circulatione membræ frigescunt: Hi sublevantur quoque per balnea

calida, & per potiones spirituosas coagulationem impediunt: In talibus moribus atteritur tunc flaccida, sed venæ turgente: Laudatur à Chymicis spiritus ardens ex Saccharo, ut insignis solatium morientium (cum quo celebre nunc portabile fecit Fr. Antonius Anglus, teste Schrodero in Pharmacop.) sed cetera experimenta nondum novi: 3. Multis coidis moras obnitur per caranhus suffocarios, quatenus Pulmones (per quos sanguinis circulatio ex uno cordis ventriculo in alium peragitur) & vasa respiratoria per visciditatem frigidam obstruuntur, idque fit vel 1. vitio excrementorum cerebri, 2. vel Salivæ mæcæ, vel 3. vitio æsiophagi: 4. cerebrum mucosum excrementum, præsertim in morbis frigidis copiosius generat, idque glutinosius seu crassius fit ubi spiritus animales debilitantur; idque si ægri supinedecumbant, live in dorso (quod adstantes vehementer errare permittunt, & causam mortis, vel duræ mæcæ luctu præbent) ad laryngem & pulmones nit: Facile remedium aliquoties videtur ita in latus ponatur ægri, ut pituita per os effluat, præsertim si collo calidum pulmentum, & capiti acque cervicis calida arena imponatur: Quia apoplectici ex tali pituita ventriculos cerebri oppleunt moriuntur, uti aeni t. miscellan. observat. 74. dicitur, & dudum ad Highmoreo prodicium est: parum profant cocumbere ad cranium, & vesicæ moris ad cervicem adhibita: Si erithina & apoplethematismi non sufficiunt, modeste opinor profusum si famulus per nates enligat & extrahat viscidam mæcæ, de tubinde elevatum caput ægri levè manu concutiat, ad promovendum materiam defluentem: 2. Salivæ materia à natura destituta est ad homœostationem arteriæ & pulmonum, ne per atraculum aërem accendant, necnon ad os humectandum, ut fiat deglutio ciborum, prout hodie ductus dexteri Clariss. Senno alique: Quando saliva hæc, quæ regius esse debet, vitio chylis (uti in icterico de obstruccionibus mesenterii,) vel ob morbos pectoris, uti in pleuritide,

præ-

peripneumonia, asthma, refrigeratione ab extra, &c. livida, taceat, ut vocant, & subinde acris, tunc larynx & pulmones obstruuntur, sicut per catarrhos: Sed quia hoc non adeo repente fit, remedium perendum erit ex potionibus diureticis validioribus: In agone, ubi cum sibilo jam exilis erat via respiratoris, ideo viro profuisse sepius agnatio, perito alius Chymico, calida pulmenta & arenam, collo & pectori admota, & haustulum spiritus vini repidi cum oleo amygdalino: 3. Interdum ex ventriculo humores vel vapores per oesophagum ascendunt, vel exhalant per tracheam, ut larynx & lingua incrassentur crasso glutine, quod talivam inficit & impedit respirationem: Hic proiunt liquores nictosi & absterfiones manu Chirurgi: Nihil hic dico de morte, quando sanguis vitalis effunditur per vulneta externa vel

corrosione valorum interna, &c. *Observ. Anonymi apud Mysel. an. anni 1671. Observat. 159.*

Cammaro.) Qui causae antecedentis vicem gerit & mediat, proxima enim videtur esse flatus ex simili humore exurgens: Hoc enim inter convulsionem prope dictam, & Paralytin à multis statuitur discrimen, quod haec ab humore pituitoso, puto, & impermixto generetur, qui tensionem non efficit in partibus, sed eas potius relaxat, ut in ordemate videre est; Convulsio verò ab eodem humore fiat, non quidem siocero sed plurimis flatibus permixto: à flatibus praeterea tenduntur nervi ac musculi, & vetus suam originem contrahuntur; Spiritum flatusum agnovit *Galenus* 2. de sympt. caus. cap. 1. Adde quod convulsiones gravissimi dolores sunt comites, quos à flatibus distendentibus fieri credibile est.

OBSERVATIO XIV.

Convulsiones vulnus occipitis sequutae, ob sanguinem in basin cerebri effusum, unde cerebelli syderatum, &c.

I. B. Ictus à sclopeto in Occipite, foris vix latus, sed intus tam vehementer offensus, ut graves convulsiones, &c. sequutae sint. Post obitum, calvaria apparuit illata foris, ostendit tamen intus varias fissuras: Prope plagae locum, extrema cerebri membrana flaccida, atro et more foedata; cerebellum plane syderatum; circa basin cerebri sanguis concretus. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XV.

Opisthotonus à materia viscida, lutea, ventriculos cerebri replente & initium nervorum premente.

Miles quidam cum per integram noctem ebrius in solo decubisset, evigilans tam repente spasmo correptus est, flexo in posteriorem partem corpore; ut omnino rigidus ac incurvus permaneret, ipse nostrae curae mandatus est: nihil deglutire poterat, & turbide loquebatur, tanquam ex loco subterraneo vocem emittens, truculenter nos intuebatur: at erit omnia adhibita, intra quatuor dies interit.

Cadavere aperto Vitalia & naturalia integra invenimus: cerebrum autem ad ventriculos usque disticimus, quos repletos invenimus materia quadam viscida ac glutinosa, colore luteo, vitello ovorum perquam simili, sed fetida admodum: haec incumbens principio nervorum, tam sevas symptomata in subiectis partibus excitat: Venae intercurrentes utramque cerebri meningem, admodum turgidae erant bilioso sanguine.

Eodem modo paucos post tempore affectus fuit signifer: Sed hic praeter praedicta symptomata spasmo cynico in dextra maxilla torquebatur, ita ut loqui plane durante isto paroxysmo non posset, & intra 24. horas è vivis excessit. *Iacobus Bontius Medicina Indor. Observ. 1.*

SCHOLIA.

Qui in Hollandia rarus est Spasmi, in India tam familiaris est affectus, ut merito inter endemias numeretur: Tam repentinus ac subitius est aliquando epus imperus, ut dicto citius homines rigidi non secus ac statim permaneant, dum vel in anteriorem vel posteriorem corporis partem musculi, involuntario motu versus suum principium trahuntur: crudele me Hercules malum, quod tantis partibus vitalibus ac naturalibus, cum summo cruciatu miseris mortales iura brevissimae temporis spatium è vivis ad mortem rapit; dum nihil nec esculentis vel porulentis per oesophagum in ventriculum deducere queunt: Porro hoc malo affecti truculenter admodum adstantes intuentur, perterriti (quod laepe fit) in-

terveniente spasmo cynico, cum utraque maxilla aures versus trahitur: Ruber ac viridis color ex oculis & facie oritur, dentibus strident, ac murmur incohibendum edunt, tanquam si qui à cella subterranea loquantur, ita ut imperitis vere Daemoniaci appareant: Causa in hoc affectu à copiosa sanguinis missione inchoanda est; fricationes valide ac ligaturae adhibendae, Inunctiones ex oleis macis, caryophyll. cum oleo aneth. anisofac. cum oleo terebinth. ac spicae indicae: Valent cuncta bitulae amples, cum multa flamma, sine scarificatione adligendae cervici, lumbis, humeris ac mammillis: ita enim serotius iste ac biliosus humor commode à nervis & musculis revellitur: Si remedia istis paroxysmus paulo mi-

lo minor evaserit, ac ager jam aliquomodo deglutit incipiat, ariditate adversus hanc pestem in forma liquida exhibenda sunt, quae venenosam hanc ut plurimum materiam impugnando, per sudores ac urinas celeriter ejiciant: Talia sunt lapis Bezoar, salura cornu Rhinocerotis cum Theriaca ac Mithridatio mixta, &c. Tum vomitoria ex infusione guttae Cambodia, vel croco metallorum, danda sunt: In hoc affectu nihil procrastinandum, quod sit morbus acutissimus, qui, si quis alius, vehementer, cito & cum periculo movetur: si autem malum invaluerit, & ager deglutire non valeat, per acerrimos chylitres alvus eluenda est: Dein ager à capite ad calcem inungatur oleis supradictis: Balnea

quoque acutos fiant ex herba Lagundi, frutice in hoc malo specifico: Sal pumelle per os lumpium perulace hic est remedium, ac materiam biliosam peritius copiose excernit, & si febribus addit, cor ac arterias refrigerat benigne: Ratione levisissimi symptomatis, doloris, tantisper omnia causa ad laudandam Quercetani, Extracum croci, &c. recurrendum, Et quanquam Narcotica quibuscumque videntur suspecta, sciendum tamen quod calidissima climatis temperies ea requiratur, & sine his argum evadere non posse: Certe si optata hic nobis deciderent in morbis calidis grassantibus, frustra remedia adhiberemus, &c. Item idem.

OBSERVATIO XVI.

Contractio Dorsi & incurvatio, affectus nervis spinæ ab acrimonia urine, effusa è vesica lacera.

Juvenis duos insignes in vesica habuit calculos, à quibus vesica adeo fuit attrita, ut Jessu ex ea urina fluctuaret libere per universa intestina, quæ acrius ab ea vellecata, malum nervis à spinali medulla oriundis communicarunt, & illi vicissim ipsi cerebro, cujus p.n. contractio incurvavit non semel tam vehementer hujus juvenis dorsi spinam, ut universum corpus videretur instar globi retrorsum conglomerari. *Tulpius lib. 3. cap. 2. vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

OBSERVATIO XVII.

Contractio digitorum sinistræ manus, à siccitate & gracilitate nervorum originis.

Clivis Leodiensis à melancholia in Furorem transit, hinc in fatuitatem, Dein sinistræ manus digitos ita lunavit, ut nulla arte extendi possent; Purgato capite, applicitis medullæ spinali oleis calefacientibus & humectantibus, digitorum usum recuperavit, sed paulo post omnes digitus ejusdem manus incurvati riguerunt, &c. Illi post obitum cerebrum in summa parte siccissimum repertum: Nervorum origines sicce solitoque graciliores. *Vide tit. de Catalepsi.*

OBSERVATIO XVIII.

Spasmodes dextra partis corporis rigor, à siccitate medullæ cerebri & membranarum, sero multo in ventriculo medio.

A Dolefcenti (*de quo tit. de Phrenitide.*) comate vigili affecto, catoche, &c. sub finem dextrarum partium rigor accidit, revera *convulsivus*: Aperto capite, venæ quasi varicosæ, tabo & sanguine nigro turgentes videntur: In medio ventriculo serum multum: medulla cerebri sicca, membranæ siccissimæ: Pulmonis partes dextræ vomice plenæ, lateri adhærebant, &c.

OBSERVATIO XIX.

§. 1. Varia nervorum distensiones à cerebro suppurato orta.

Puero effractum os frontis & laceri cerebri adempta portio, hinc fungus ingens, pululavit, manente firmo animi & corporis robore, licet biduo post vivendi finem fecerit, sub sudore frigido ac crebris nervorum distensionibus, conversa in pus maxima laceri cerebri parte. *Vide lib. 4. tit. de Pulveribus.*

§. 2. Quid majori admirationi esse poterit, quam videre, quod una mecum vidisti, in milite isto hasta læso in ipsa cerebri substantia, qui cicatrice obducto vulnere, & extrahendis quamplurimis ossium fragmentis, septem & ultra septimanas sanus aliis inserviebat xgris.

In octava verò Convulsus cum moriebatur, causam subitanæ mortis intueor, unam cerebri partem corruptam, putridam, visu admirandam, imo consumptam & in putredinem conversam vidi? *Samuel Cofferus in Respons. & curat. Nic. Fontani, libro primo, pagina 13.*

§. 3. Juvenis saucius oculo dextro: primo statim die convellitur brachio dextro à femore; xi, moritur, cerebrum dextrum totum fuit purulentum, sinistrum plenum seroso humore. *Vide lib. 4. tit. de Pulver.*

§. 4. Miles hasta læsus in ipsa cerebri substantia, cicatrice obducto vulnere, octavus convulsus moritur: Una cerebri pars corrupta erat putrida, &c. *Ibidem.*

OBSERVATIO XX.

*Capitis involuntarius subsultus à phlegmone postica
partis cerebri, &c.*

Juvenis sub cane in gravem incidit capitis dolorem, Appositis ad fronem manuum una, ad sinistram altera, cerebrum intus concursu ac convelli sentiebatur; caput universum involuntarie subsilliebat, &c. Tota fere basis cerebri, cerebellum & spinalis medullæ initium sphacelo correpta erant, &c. *Vide tit. de dolore capitis.*

OBSERVATIO XXI.

§. 1. *Convulsiones ab abscessibus in cerebro latentibus excitatae.*

Quidam ex diuturno capitis dolore ac vigiliis levi Convulsione correptus perit. Inventus fuit abscessus cum pure admodum fortente & corrupto. *Seb. Nasim meth. med. part. 2. quæst. 16.*

§. 2. Melancholicus juvenis (de quo tit. de Paralyti.) laborabat Paralyti lateris sinistri, & convulsione dextri violenta. In latere dextro admodum turgebat vena tenuis meningis, Ea pars nigricabat & apostema continebat in proxima cerebri parte.

OBSERVATIO XXII.

§. 1. *Spasmi à colluvie serosa cerebri varias partes occupante.*

Domina III. diu affectibus spasmodicis obnoxia, in apoplexiam lethalem incidit: Mortuæ meninge crassiore amota, per alteram tenuem & pellucidam aqua limpida cerebri plicis & anfractus omnes ad implebat, &c. *Vide tit. de cap. dolore.*

§. 2. Virgo cephalæa diu afflicta, tandem in convulsiones atroces cum stupore incidebat, &c. Latex flavus cerebri anfractus profundiores & ventriculos inundabat. (Tit. de cap. dolore.)

§. 3. Virginem febris *πυρετική* infestabat; die 14. convulsa interit, omnes corporis partes convellebantur: Aperto capite cerebrum erat humidius quam è natura foret. (Vide tit. de cap. dolore.)

§. 4. Jurispr. studiosus ab amico exceptus, domum redux, post capitis dolorem, vomitum, &c. convulsiones subsequuntur, &c. Illius visceta principalia penitus corrupta erant, &c. vermes in intestinis: cerebrum serosa colluvie usque ad principium nervorum erat repletum. *Ibidem.*

§. 5. Puella *Tussī infestata* fuit quæ plane convulsiva evasit: successit febris, hinc motus convulsivi, primo in artubus, mox in facie & subinde in toto corpore: dum paroxysmi convulsivi urgerent, pulsus erat plurimum inordinatus ac sæpe inermittens, &c. Vasa meningas perreptantia sanguine turgebant, &c. Integumentis ablatis, cerebri substantia prorsus erat madida, ventriculi omnes aqua limpida repleti, &c. *Vide lib. 4. tit. de Febris.*

§. 6. Gallus quidam dolore capitis correptus est, post mensem cæcus evasit, sequentis Convulsionibus quæ illum per vices affligebant: Post mortem invenimus cerebrum a quo copioso humore irriguum, &c. *Vide tit. de Oculorum aff.*

§. 7. Dom. Octav. Albertus dolore capitis ac tenui destillatione vexabatur, cum exiguâ Convulsione cervicis ad posteriora: Hunc defunctum comperi aquæ cochlearis

tria collegisse inter duram meningem ac cerebelli posticam sedem. *Schepkens ex Nereto Nereto Medico Florent.*

SCHOLIA.

T*aliis infusata.*) Hylhymorus lib. de affectione Hypochondriaca, à pulmonibus sanguine infarctis, aut morbo impeditis, affectiones ipsamodicas in aliis partibus. aut in toto corpore excruciat deducit: quod incongruum videtur. Quippe adveniens passiones illas solimmodo à spirituum animalium, ioc cerebro aut nervolo genere scaccutum iritatione procedere, atque ut plucium aut à materia morbifica iocra partes illas aggerita, aut à vellicatione insigni lisside infusita pendere, quorum nullius pulmones infarcti & immobiles facti causa esse possunt: Quotcumque enim pars per concolum partes alias in morbo convulsivos rapit, necesse est ut ipsa primo convellatur: Quod autem interit, *Naturam, ut præcedit approprio fulgore faciliatem animalem ad motum convulsivos instaret:* id quidem à constanti ejus ritu ac consuetudine abhorret: quæ sibi insulso morbo, aut molestia premittit, intinzu quoddam quasi divino edocet, angustis sese expedit et non majoribus implicare solet: Si forsan tegetas ipsos interendum *Quippe Naturam, et immensis harmoniis superveioit, et non tacet moribundis accidere?* Dico hoc eon esse naturæ iritatione, sed ex nimia tum ipsius, tum facultatis animalis protrusione fieri: Quippe in magnis languoribus

bus spiritalis animales plurimum diffracti, aut abfor-
peti, totumque in nervo genere reseruari, live iteradion-
tis lumen, sive fluxu ac continuatu cum sustineat nequeat,
quare ab invicem divisi, ac quasi in manipulos
facti; dum curas adunat quætor, nixus motibus
ubique divitor, & quasi per labulum incunt: at vero
oæque membrorum, oæ abotum vitærum spafmos,
æ molestia præcordia illata facile cedit, præter dictas
raziones, intusper observaciones pathologica clarissi-
me evincunt: Qui affinitate, peripneumonia, angina,
pleuritis horrenda laborant, inter ditos pa-
roxysmos cruciatur, aliarum parium motus
convulsivos hæud facile incurrit: In adolescentula po-
pulum cordis, post morbillos accretum, & io artia-
tis pulmonalis inflatum, cui fæse io totum obtulit
se memini, ut hinc sanguis iora dextrum cordis li-
num ægellus, & ultra progredi non valens, maxi-
mum illic gravamen & oppellionem, cum respira-
tione difficillima & maxime laboriosa intulerit: At-
tamen observare eit in hujusmodi casibus Naru-
tam citra præcordia, gravissime licet afficim, non
propterea functionem animalem ad motus convulsi-
vos invallit. *Willa, Traité de aff. du hypochondria &
inférie.*

OBSERVATIO XXIII.

*Sive exempla convulsionum, vulnera capitis sequentium ob sanietem, pur,
vel abscessus incerebrogenita.*

§. 1. **R** Viticus vulneratus est in capite, 16. die à vulnere accidentibus convulsionibus & distortionibus moritur : Sanies inventa & purulencia in cerebri substantia, *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§ 2. Iuvenis facius dextro oculo, fracta orbita, fit *apop.*, convulsus dextro brachio & femore : Cerebrum dextra parte fuit purulentum : sinistrum plenum serosa pituita. *Vide ibidem.*

§. 3. Quidam punctim vulneratur circa os temporis, ita ut dura membrana simul laderetur: Sequitur Convulsio partis laesae. Inter membranas & substantiam cerebri ingens copia puris reperitur. *Ibidem.*

§. 4. Nobilis ad sinistram partem fururæ coronalis punctum percutitur: die 3. supervenit Epilepsia fortis & convulsiones lethales: Valde profundum vulnus utramque meninges, ipsôsq; cerebri ventriculos penetrans repertum est. *Ibidem.*

§. 5. Juvenis vulnus in regione bregmatis accipit: Sequuntur sopor, dextri lateris Convulsivi motus Epileptici: Tota regio bregmatis linistri confusa deprehendebatur, unde sua sponte osso ossa abscesserunt; de quibus unum acutius in ipsam substantiam cerebri impressum erat per meninges. *Videlib. 4. tit. de Fulneribus.*

§. 6. Adolescens ac cepto contemptibili, ut videbatur, in capite vulnere, oborto 6. die in eo inflammatione, frequente convulsione & paralyfi in crute dextro & brachio, ii. moritur: E regione partis vulneratae, inter cranium & duram meningem, pus inventum est, non copiosum fed lividum & fixum. Vide *ist.* de Paralyfi.

§. 7. MILES acinae sauciatus fuit in posteriore capitis parte, cum lésione ossis sincipitis. Die 22. brachium dextrum moribus Convulsivis fuit agitatum, &c. Aperto cranium, interna ossis fissi superficies in tantum fuit corrupta, ut totum occipitis os usque ad futuram lambdoidem tenuius esset quam os petrosum: mox Abfcessum deprehendi magnum in sinistro cerebri latere latitantem, proprio folliculo circumscriptum, ex quo pus foetidum magna quantitate effluxit. Ventriculus cerebri sinister, aliquantulum compressus; dexter aequalimpide distensus: In sinistro plexus choroides pallidus, in dextro rubicundissimus apparuit. *Vide tit. de Parafisi.*

Adolescents

§. 8. Adolescens fuste lignea è salice, levi quidem illa, sed ex alio dimissa, accepto contemptibili vulnere in capite, absque cranii fractura scissurave, oborta sexto die inflammatione, sequente Convulsione & paralyti in crure dextro & brachio sinistro 11. die moritur. Dissecto cranio, e regione parvis vulneratæ, inter cranium & duram meningem pus inventum est, &c. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§. 9. Puer ex alio baculus in sinistram capitis partem perpendiculariter decidit, unde fractum cranium: partim Convulsus est in opposito latere, obiit 15. die, Exhausto ad corpus callosum usque cerebro, *lib. 1. tit. de Paralyti.*

§. 10. Mulieri, non satis perspecta rima, (à projecto in caput poculo vino pleno) secundum frontem vulneratæ, mortis causam attulit: 3. die adfuit febris, delirium, convulsio: 5. mors: Ingens phlegmone intra calvariam inventa; dura meningæ tumens, livida, ingenti puris copia suffusa. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§. 11. Studiosus circa os frontis vulneratur, primis diebus leviter laborabat, sed post ingens æstus sequitur, in primis capitis, & spasmus cynicus in parte opposita; post mortem particula de lamina interiori, per meningem in cerebri substantiam transfusa reperta est. *Ibidem.*

§. 12. Nobilis in capite læsus circa fururam lambdoideam, cum rima & depressione solius laminæ internæ, quæ cerebrum continuo compressit, hinc ortus est abscessus sub calvaria, qui prægressa febre, à phrenitide Convulsiones induxit. *Ibidem.*

§. 13. Ruricola ex arbore deciduus os temporum & frontis perfregit: vulnus spatium quinque septimanarum consolidatum: Quia vero locis duobus distinctis ac æque latentibus, sectione demum patefactis, mediocres cranii particulæ in ambas cerebri meningem depresso fuerant fortiter, ex compressione dolores, ab his humorum affluxus, ab hoc Apoplexia subortum, quod postea Convulsionibus ansam præbuit. *Ibidem.*

§. 14. Vinitor à iacto lapide confusum habuit in bregmate sinistro vulnus: post 7. augetur febris, contrahuntur manus digiti: 14. obiit: Inter cranium & meningem copia puris inventa est; hæc prætumida & decolor. *Ibidem.*

OBSERVATIO XXIV.

Convulsivi motus ab affecto Diaphragmate ulcerato, &c.

Virgo doloribus cruciatur, qui regionem sub ala sinistra lateris & costas mendosas occupant, & interdum ad thoracis vertebrae & ad imum ventrem ex porriguntur, sæpe motibus convulsivis tentatur, vixit usque ad 44. diem, Secto cadavere inventum est septum Transversum in interiori parte suppuratum, ulcusculis refectum, &c. *Vide historiam lib. 2. Titulo de Laterii dolore.*

S C H O L I A.

Motibus convulsivis tentatur) Affecto Diaphragmate, parti proximæ membranois adscribendis, nervos per totam substantiam sparsos obtinenti, delatos ex spinali medulla colli, inter quartam & quintam vertebrae: quibus à puris acrimonia vellicatis, occasio data est ejusmodi motibus convulsivis.

OBSERVATIO XXV.

Convulsivi motus post sumptum venenum ventriculorum afficiens.

D. N. Inquietudinibus, motibus convulsivis, &c. afficitur: Reperta ventriculi interna tunica, omni ex parte livida & syderata, maculis conspecta. *Vide lib. 3. tit. de Vomitu.*

OBSERVATIO XXVI.

Convulsiones à vertebrae lumborum duabus ad spinalem medullam usque corrosis.

Pvellæ Excrescentia erat supra vertebrae Lumborum, convulsionibus correpta obiit: Spinalis medullam denudatam reperi, ita ut duæ vertebrae lumborum desiderarentur. *Vide lib. 4. tit. de Tumor.*

OBSERVATIO XXVII.

Motus convulsivi à verme intestinum duodenum perforante.

Nobiliss. puerulus bimulus, Generos. D. Dive, Equitis aurati, filiolus, formosus atque optimo corporis habitu præditus, cum per duos tresve dies minus bene haberet, & tussi sicca laboraret, cum inquietudine, nocturno præsertim tempore, & crebris ejulatibus, nutritrix cum dentibus laborare putabar, donec tandem in gravissimos & continuos motus convulsivos incideret: quibus pacandis duo mecum Medici in consilium adhibiti; Varia ad eos sedandos exhibita sunt, sed frustra omnia, Nobili puerulo tertio convulsionum die naturæ debitum solvente.

Aperto corpore, diligenti scrutinio nihil invenimus quod lethum accelerare potuisset, donec ad intestina devenimus, quibus examinatis, duodenum à rerete lumbrico perforatum & exesum invenimus, quem adhuc vivum inde extraximus, *Frid. Loësi lib. 3. Obser. 33.*

S C H O L I A.

Mira sunt quæ ab authoribus de Lumbricis proponuntur indicia; mirabilia quæ quotidie in iis, qui ab ipso infestantur, visuntur symptomata, inaudita & retrocis plena, quæ ægros misere torquent, & quæ adeo obscura, & cum aliis morbis communia, ut doctissimorum, & lyncæ oculis prædictorum dixeris

quandoque eladant: imprimis vero Teretes, omnium frequentissimi, graviora inducunt symptomata, qui cum natura sua semper sint pessimi, & toto genere p. n. acumen minores majoribus, pauci multis, viuentes mortuis, sunt moliores, &c. *Mem.*

OBSERVATIO XXVIII.

In mulieris cerebro, intra sex horas à spasms extincta, nihil repertum est.

Mulier subito æquæ jacet, convellitur, sex horis post moritur. In ventriculo nil fere alienum compertum, In ventriculis aliqua erant corpuscula, sed tenuia & exilia. *Vide Tit. de catarrho.*

OBSERVATIO XXIX.

Manuum & pedum contractio & convulsio in quodam, nullo vitio in visceribus apparente.

Pætor laudabili constitutione præditus, manuum digitos graviore solito ægritudine; mobiles percipiens, paucis post diebus contrahi illos convellique sensit, atque sensim in dies magis ac magis aucta affectio est, dum incurvi illi, pene inflexibiles manerent; Quin & brachia & carpum pervasis affectio, nec multo post idem virium pedes sensere: In dissecto cadavere, Jecur, Lienem, Ventriculū & Renes naturalem constitutionem præ se ferre vidimus, nihil in ulla parte notari potuit quod tantorum foret malorum causa. Sed cum imprudens penicillum ore exfugeret, verisimile est ut è manuum digitis, partium continuatione cerebro, totique generi nervoso, communicatam fuisset cinnabarin, &c. *Vide lib. 3. Tit. de Ventrū doloribus ex Fernelio.*

OBSERVATIO XXX.

Convulsio terribilis, cui cujus ossa femoris, humeri, &c. fracta in cadavere reperta sunt.

Iuvenis ann. x. jam tertio ætatis anno Epileptici insultibus vexari cœpit, liquè annis labentibus adeo in dies increverunt, ut aliquot ante obitum mensibus brachia cum pedibus illis convulsionibus penitus in gyrum agerentur, ipsique ossa tam humeri quam tibiæ sinistræ partis confringerentur, quibus ejus loci Chirurgus restituendis, & aptè devinciendis sedulam quidem navavit operam, humerūque juxta cum tibia, splenis & ferulis ritè colligavit, sed reversus convulsivus ille Impetus, nihil conferentibus qualibuscunque ligaturis, extrorsum denovo ita emovit, circumrotavit & effregit modo vix dum commissa ista ossa, ut nullo amplius ingenio composita servari porgeret: Hic missellus sufferendo morbo impar, viribus paulatim exhaustis, vehementissima tandem convulsione, & quæ os humeri fractum, ea parte qua cubitum attingit, per cutem transiebat, mortuus sit: In tanta tamque miseria de nullo dolore conquestus æger, nec vel minimum vociferatus est, adeo ut sensu quasi omni orbatus, ac mente sibi non satis constare visus sit, præsertim cum toto morbi decursu nihil cibi petierit, oblatum tamen sumperit.

Defuncti cadaver dissectum fuit, omnia viscera inculpata apparuerunt, & magna bilis vesica viridi suo colore vicina stomacho intestina infecit. Aperito brachio sinistro, conspectum idos humeri fuit effractum & sinistrorsum ex cure prominens. Os femoris ejusdem regionis extrorsum violenter à suo capite divulsam trochanterem acutum, suoque cuspidem cutem

citem pet forantem habuit: Appendix inferior femoris sinistri, atque interior, qua genu efformat, vasto se satis tubere manifestavit: Tibia tandem introrsum reflexa & curvata eum fibula sua, in medio violentè fracta visa fuit, atque illius ossis cavitas omnino ita oblitterata, ut nec medullæ, alias in ea contineri solitæ, vestigium animadverteretur. *Ioh. Geor- gius Valsamer in Miscellan. curiosis anni 1671. Observat. 225.*

OBSERVATIO XXXI.

Convulsivi motus Calculos in ureteribus & Renibus subsistentes sequuti.

Comes quædam, itemque Monialis, ingenti dolore dicam clausere suum: utraque velut unicum, uno trianguli acumine in renes: altero vero intra ureterem desinente exhibebat, atque spasmo crudeli obierunt ambæ. *Helmont lib. de Lithiâ cap. 7.*

S C H O L I A.

Non quidem moriuntur præ urinx suppressione, ubi alter renem lorio laudat, atroci sed solo spasmo oppellunt, qui spasmi iterum circa motum laesat, quapropter dissecti, præter lapillum unisorem, exhibuit nihil quod motum attulerit, idem videtur. Atque cap. 5. & 6. fetus & humectantia laudat, hæc, inquit, ut alia, malva, amygdalorum & cætera juvant, non quatenus amplificent ureteres, sed in quantum ipsam in crispationis demulcent, idem cap. 6. Sub paroxysmo cum toto abdomine turbatur, præfensque in ordine atque metu, instantem præcælam non minus quam eandem comparitur, rolet atque præfens: præfens enim videtur alienam nondum visam: at læne est tum in utero suo, dumque præfens, & tunc adest contrahitur illius exordium: Volens itaque Archæus hostem eluere, & excutere instantem paroxysmum, accersit undecumque omnem laicem & ad elucendum renes demittit: Contrahuntur ergo venæ in calculosis renibus, contentiōneque intestina, atque dolorem colicam ideo mentiuntur ob consensum: Quæ de causa Nephriticos dolor à colico nondum per scholas satis distinguitur. Nec mirum ad spasmodum venarum ipsa intestina quoque convelli, cum contrahitur atque sequantur propter consensum consanguinitatem tam dolores immanes colicos

quam nephriticos. *Hæc Helmontius.* Si in una parte irritatur vis expultrix naturalis, surgit aliquando in alia, nec semper proxima, sed etiam in distita & procul contraria, ut cunctum corpus tandem concutitur, tublata pletumque ad tempus vi animali. Quod mali nuncupatur Epilepsia, item motus Convulsivus, quo perperæ, teste *Valerius*, sæpe corripit solent. Nuper juvenula puerpera primipara hac moris via interibat: si nitebarus illo motu convulsivo nunc eas totum corpus, nunc dextræ vel sinistram lætem partes semper vexabantur. Hystericam Epilepsiam in vulgus pueri celebant. Nimia comitencia acutæ uig. ut homines quoque convelluntur: *Dei spiritibus* cum usquam tamdiu reddere non possent, atque ad motum illis moribus convulsivis varie ptemebatur: Simul vermes stomachum mordicant, ingruit Epilepsia: Atque ea vix expultrix, ex equimodi membro surgens, & illarum animalium motu gaudendum partium facultatem expultricem naturalem concitare potest, ut totum corpus tandem convellatur: Vis illa naturalis ex stomacho, ex matrice, ex renibus concitata est similis bestie quæ hominem subito invadit: hic scitit quoque viti quasi inferri: quare in membrum queritur sibi remittit invadit agitant, quod facultate animalis antea fuit motum. *Schneider lib. de catarrhis spec. 234.*

OBSERVATIO XXXII.

Anatome Equi, cui os subito obrigitur & clausum est, ob contractas maxillas à sero musculorum earum imbuente, & glandulas vicinas tumefaciente.

In stabulo Regio dissectus fuit à Chirurgis Regiis equus generosus, cujus affectus fuerat quod subito os obrigerit clausumque fuerit, ut pabulo vix ne quiverit, unde sensum contabuit: In huius affectus causam inquirunt, sequentia in sectione strangulati animalis invenerunt, quæ annotavit D. Simon Paulli.

1. Statim jugulari equo, musculi colli & dorsi (qui vivente animali tensi & duri erant) facili evaserunt. 2. In apertione abdominis, inrer peritonæum & musculos abdominis, ichor quidam flavescens observatus, ad os pubis ubique procrensus. 3. Inrer intestina & peritonæum multi vermiculi candidi, longitudine digiti, crassitie Alii medioeris, partim mortui, partim videntes reperti. 4. Omentum pravi coloris, exile & contractum. 5. Lien colore p. n. in limbis contusus, quasi ut friari potuerit, colore quam reliquum lienis colore rubicundiori. 6. Epar valde magnum, concava parte plumbeo colore, convexa sanius, sine vesicula fellis, sanguine, qui in vasis erat, nigro & adusto. 7. In ventriculo satis parvo, magna copia vermes singulares repræbant, rotundi, crassi, nigri, grisei: aliquot cochlearia plena quoque aquosæ, flavæ & nigrescentis humiditatis. 8. Pylorus fere cartilagineus: 9. Cor insolite magnitudinis, in sinistro latere durum quidem tactu, sed secari tamen aprum: In ventriculis Polypus 1. quadrantes longus, pollicem crassus, 10. Pulmones exiles, duri, colore p. n. præditi, nempe pallidiores præter morem aliorum animalium, immisso siphone immobiles. 11. Musculis colli digito separatis, utrinque ad latus asperæ arteriæ, præsertim ad latus sinistrum, pellucida, flavescens

lymphæ inter musculos adhuc membrana sua involutos reperta: 12. Glandulæ pone aures & infra maxillam inferiorem, solito copiosiores, magnæ pariter & exiguæ, quarum minores digitis facillime, majores minime friabiles erant, 13. Caput à vertebra colli prima resectum nihil insoliti monstravit. 14. Separatis musculis maxillam inferiorem moventibus, penitusque abscissis, & carne ossis palati resecta, maxilla ramen immobilis manfit in articulatione cum superiori, ut manibus fortissimis separari aut aperiri non potuerit. 15. In cerebro nihil p. n. notatum, licet solito fuerit siccius. In cranio eo singulare, inter ceterum & cerebellum observatum, quale in canibus solet. *Observatio Simonis Pauli Regii Danici Archiatri.*

S C H O L I A.

Questionem sibi in aula propositam, quæ causâ fuerit *Quod Equo nobili subitis & inferius maxilla resecta fuerit, ut eum capere nequimus, & sine dorsi abriguerit*, eruditè solvit D. Simon Pauli, & publico scripto lingua Germanica edidit Hafniæ: Neque ea cura insi dignitatem ejus æstimanda, A Medicina enim, si credimus Vegetio, præfat. artis veterinariæ, non adeo in multis discrepat veterinaria: Imo Iob. Philippus Ingrassias, Quest. de Veter. cap. 13. veterinarios Proto medicorum examini subijcendos voluit: Hic per compendium repetam libelli laudari præcepta momenta, rationes purgantes & observationes Medicas notari dignas. Responderet igitur Anatomicus expertus.

1. Sanguinem omnem torâ substantiâ corruptum, unde polypo cordis nata occasio, quem ante cum Chirurgo in humano corde, repentina morte extincto, cum venenati oblati suspitione Hafniæ viderat. 2. Notandum inter musculos abdominis ichorem insolisum, uti & inter musculos colli ad latus utrumque arteriæ asperæ collectum fuisse: 3. In quodam cum Hafniæ ex gangræna os humeri resectum esset, succedisse post paulo maxillæ inferioris immobilitatem, ut liquida per dentium rimas hauriret & per easdem verba proferret. 4. Eidem 24. horis antequam exspiraret postmortem, præter convulsionem colli prædictam, etiam Tetano universum corpus, brachia, pedes & dorsum obtingisse, ut integro intellectu, neque ipse, neque aliorum auxilio se membrisque sua movere potuerit, sed trunci instar ad farsalem usque horam decubuerit. 5. Viduum N. post cholera morbum, simili Tetano comprehensum ex elu limoni, quod febricitans alia ægra diu manibus versaverat. 6. Ex suppreffo igitur sudore in his exemplis, & in equo regio Tetani orripisse, In cujus rei confirmationem duo exempla recenseat, Primum de puero 14. annos, cui ex suppreffo sudore in paroxysmo febili tertio,

spasmus levis 14. post diem, successit oris, colli & aliarum partium, moxque tetanus eorundem partium, & nonnullarum paralyti, ut integris sensibus internis, non tantum manus curset, sed oculis solis manu aumi sui sensum exprimere poterit: hæc symptoma superveniens febribus maligna curavit, qua curam ex methodo extincta, paronychiæ digitorum excreverunt: Alieum, Nobilis quidam in choriis velata facie, larva inus argenteo solatio obducta subministrat, qui cum sudorem extra larvam collectum abstergere non posset, musculus oris convulsus, spasmum cynicum passus est. Ex his observationibus & hypothësis de circulatione & valis lymphaticis, ad Equi regii morbum devolvitur. Auctor, sanguinemque corruptum velle casse musculos, & lympham extra vasa sua magis quam sanguis malignam inspicari, Ex intemperata vero habentis, nimique æstis, circa collum compressus glandulis, & cutis exercitilve exalefacto, & maturius ad aquæ potum adducto, fortan sudorem repressum, Tetano aliisque equorum mala induisset: In rusticorum Equis affectum illum Capitis vulgo *Pistol*, Gallis, *les Anvers*, provenire partim ex crassioribus habentis caput confringentibus, partim quod in præis humidis frigidis que gramen mordicantes, insigidentur pedes: magnum autem consensum pedum & cordis esse, circulationis beneficio, experimentis duobus demonstrat. 1. Juris quidam Doctores Hafniæ, ex iphæterilio revertis in hospitium, pedes frigide immergeris, post paulo in isopchymiam & cordis palpatationes locidit, ut fere obmutuerit pulsus deperdito: Evocavi illum ab oculi faucibus calido vini spiritu, quo lavit pedes, & vino Gallico albo, cui calidissimo immerxit pedes. 2. Similia passam feminam, mensium tempore inordinate viventem, curavit immisso brachio cubium tenus, in amphora vino Gallico calido repletam. *Thom. Bartheolius Obserr. xi. & xii. Aldeum Medic. ann. 1674. & 1672.*

OBSERVATIO XXXIII.

§. Capitis in sinistram partem convulsio, & motus convulsivi, à sanie & muco in sinistro ventriculo.

Juvenis xxx. ann. melancholicus, caput pæter morem sinistram in latus contorquebat: Tandem supervenientibus haud obscuris convulsionibus exspiravit circa septimam. In sinistro ventriculo morbi contumacis mortisque causa exibat, copiosa scilicet sanies cum muco ac mæteria putrescente inibi contenta, cui adscribendum quod spasmus ejusque lateris initio affligeretur. *Vide Tit. de melancholia.*

S C H O L I A.

Caput in sinistram latus) Exemplum contorsionis colli affert *Aldrovandus Paradigm. §. 2. Nob. au.* vir in bello civili perfluga multa tulit incommoda: In tot tantisque discrimibus corporis laborare destillatione à capite postico, præsertim in humeros & cervicem, hinc colli ac cervicis contorsio quædam: Et cum

tempore occursum non fuisset remediis, ita malum increvit, ut facies in postemora deroterqueretur, & non nisi magno conatu in anteriora reflecteretur: At live bibere, live edere, live loqui veller, funiculo in eam rem comparato retinebatur caput aliudum inclinatum: Laborandum fuit in specie morbi inquærenda & reme-

& remediis accommodatis: Videbatur nonnullis unius partis esse resolutio, quæ alteri convulsionem acutissimam, quod non erat credibile, nam in eodem stato pars perpetuo permanisset: at reducta facies in suum locum, nili magno donatu & magno cum dolore si- steretur, convulsivo quodam modo statim revellaba- tur in posticam, magna omnium qui aderant admira- tione: Convulsio erat reuera, & omnes musculi erant affecti & viscoso frigidoque humore imbuti, qui dif-

fusus usum rerum calidarum affectum soluit. Hæc Bal- lanius. De co affectu agit Arnoldus Boerius libello de affectibus omissis cap. 5. proferente exemplum à se notatum: Et nos vidimus Neocomi Helvetiorum ob- stetricem septuagenariam, cui invicem in sinistram par- tem caput semper retorquebatur: Id mali ante annos 20. contraxerat, ideoque incurabile, quod ma- teria alius foret impacta.

OBSERVATIO XXXIV.

Colli rigida durities ob ejus musculos corruptos.

Petrus Balen conquestus est de rigida colli duritie, cui successit ejus intumescencia. Musculi colli omnes corrupti reperti sunt, ut & œsophagus luridus, lividus: Plurimum quoque erat materie crassæ circa musculos & œsophagum. *Vide lib. 3. tit. de Deglutitione laesa.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO XIV.

De Stupore, Torpore, Tremore, Horrore, Rigore, Anxietate,
seu Inquietudine

OBSERVATIO I.

Stupor à cerebelli substantia molliore, sanguine pituitoso diffuente.

Juvenis diu in carcere detentus, languidus decubuerat, perpetuo Stupore affectus, Cere- belli substantia præterquam quod solito esset mollior, sanguine etiam pituitoso affuebat. *Vide supra Tit. de Epilepsia.*

S C H O L I A.

De Stupore, Torpore Inter Stuporem & Torporem distinguere vult. Fortis, illum diminuto sensui, hoc motui assignans; quoniam in casibus conveniant. *Vide consulti. 62. & 66. sentent. 11.*

Cerebelli substantia solita mollior) Quæ durioscula est & firmior, etiam eadem cum cerebri substantia.

Cerebelli) Ex quatuor truncis, binis cerebri, binif- que cerebelli inter se coeuntibus & in unum corpus compactis, omnes omnino oervum intra tum extra eorum oriuntur. Io ista autem omnis fere stuporis veri, ait Mater Prætor lib. 1. cap. 5. causa latet: quæ si omni nervo esse possit, cum omnis oervus sentia tactus præditus sit, rursusque parti, cui insertitur, cum insula spiritus animalis, propriæque substan- tiæ communicatione communicet: Quo ita affecto ut ipsa communicatio intercepta, vel omnino vel ex parte impedita sit, si hoc fiat io nervo, qui in musculum insertus simul cum sentia tactus illi mo- tum confert, & resolutionem & stuporem simul ac- cidere necesse est. Quod quando in generali pluri- busque partibus communicato nervo affecto sit, generalitatem quoque lesionem multis musculis, oc- cidit solum illis, sed & curi & membranis, cum à musculorum nervis ad has quoque partes propaga- nesclatæ, illis sensum tactus conficiant, commu-

nem sequi oportet: Si vero in privato aliquo nervo ad unam tantum partem delato accidat, cum tunc saltem lædi necesse est: Sed & ex ejusdem nervi, sive generalis sive particularis existat, emisso affectu, accidere potest ut motus vel languet vel cesset, re- manente nihilominus sensu tactus vel integro, vel obtuso saltem, cum ad motum edendam major vis spirituum quam ad sensum requiratur. Fieri tamen quoque potest, ut & nervo affecto Stupor tantum, remanente motu in parte, fiat, si nimium nervus sensorius solum, hoc est, qui non in musculos sed eorum aut membranas, aut alia viscera immobilis tantum desinit, afficiatur. Quales insignes cutaneos nervos, in oervorum majorum divisionibus dan- taxat eorum membranasque implicare, atque ad partes naturales deductos, oervos vi. & vii. conjuga- tiois, multis illis quæ ooo moveantur partibus, sensum Tactus saltem communicare ostendimus. Alio quoque nervos sensorios à nervis motoris muscu- lis interitis, ad illas quoque quæ non moventur partes ferri. Quibus sensorio nervis, vel etiam mo- toris, sed extra musculum ductis, latus, par- tem tunc dantur eam quibus insertuntur, vel omnino vel ex parte, prout læsio magna est, stu- pere contingit. Quorum tamen omnium causa eadem

demque resolutionis, diversa tamen sede differens, esse potest.

Languida, perpetua stupor effectus) Ob spirituum animalium lentit & motui delinicatorum defectum, quæ mali continens causa est: Hi autem deficiunt,

quia non transmittuntur, vel quia transmissi non admittuntur, vel licet influant, cum ipsa pars male disposita non uniuntur. Non transmittuntur, ubi vitium est in cerebro, ut in casu præsentis & sequentibus.

OBSERVATIO II.

§. Stupor à sero flavo per anfractus cerebri oberrante & in ventriculis.

Virgo cephala diu torquebatur, & capite deterius habere in convulsiones cum stupore incidebat, &c. Latex flavus cerebri anfractus profundiores & ventriculos inundabat. *Vide Tit. de cap. dolor.*

OBSERVATIO III.

Stupor à sero cerebrum inundante & spinalem medullam.

Vir Ill. proavis cerebri aut nervorum dispositioni morbidæ obnoxius oriundus circa ætatis suæ *ἡλικίαν* artuum debilitare, Stupore & spasmin tentari solebat. Huic universa *τῷ ὅλῳ* compages iusto humidior, latice aquoso madida & prorsus immersa videbatur, &c. Spinalis medullæ truncus aquæ limpide immersus, &c. *Vide Tit. de convulsione.*

SCHOLIA.

Stupor & spasmus) Sicut paralyticus & spasmodicus morus aliquando concurrunt, cum vel materia utramque affectum committens heterogenea est, particulis narcoticis & irritabilis simul coeans: vel idem humor simul vellicat, lacessitque nervos, atque aditum spiritibus, obstructione aut compressione nervorum, intercludit, ita & de stupore idem censendum est: Stupor autem hic universalis fuit, quia universa cerebri moles, spinaleque medullæ truncus totus aquæ madebat diluvio: Circa stuporem particulatam, notandum quod movet *Sennertus* Pract. lib. 1. p. 3. sect. 1.

cap. 1. neminem recte stuporis, & paralyticis alteriusque parvis causas omnes recte investigare posse, qui anatomiz gravis non est, & cognitum non habet unde quilibet pars nervos suos habet: cum sepe accidat ut non in ipsa parte affecta, sed loco remotiore, in nervi principio, vel ejus ductu, causa mali hæreat.

Artem delictat, stupore) Illust. Fortis in Consult. Med. distinguit inter Stuporem & Torporem, illum diminuto lenit, hunc motui assignans: *Vide Cœlius, l. 1. infest. 62. & 66.*

OBSERVATIO IV.

Stupor digitorum gangranam præcedens, à denegato spirituum influxu, ob cor extenuatum.

Vxor N. morbo intricato detenta, paulatim stupore & frigore circa extremitates digitorum sinistrae manus correpta est: Illi cor sanguine plane exhaustum repertum est. Arteria venosa mire extensa, sero impleta, &c. *Vide lib. 2. Tit. de Phibisi.*

SCHOLIA.

Stupor & frigore, &c.) A negata simul *ἡλικίᾳ* pituitus & caloris vitalis: Sed stupori fornicationis ejusdem sensus sepe adtingitur, tunc animam quando spiritus animalis aliquando derentus in stupido vel resolato membro, viam vi sibi facit obstatulumque pertumpit: Tunc enim ad membra extrema, ut digitos, ad quos spiritus primo impetu defertur, punctionis sensus excutitur, spiritus ubique membrum veluti trillante & pungente, atque tandem donec

eo sufficienti copia delato, pars pristinum tactus sensum recopet: quod nonnunquam valide percutulo nervo sensorio accidit, uti eo qui circumflexus in cubiti gibbo ad annularem & minimum digitum excurrit: quo violenter casu impulsio, duo hi digiti fornicationis sensum aliquandiu, donec nervus compressus ab ictu rursus dilaretur, spiritusque sufficienter transmittatur, patiuntur. *Placemus.*

OBSERVATIO V.

Sensus Tactus stupor in Matrona Lepra infecta, ob scirrhosam muscularum habitus constitutionem.

Illi Matrona Lepra infecta interiit. In illa sensus Tactus obtusus, vellicationem & punctionem vix percipiens: Præter varia viscerum vitia, Musculi habitus corporis, præsertim artuum inferiorum, scirrhosi reperti sunt. *Vide lib. 4. Tit. de Habitu corporis affectibus.*

SCHOLIA.

S C H O L I A.

Vellicamentum & punctum vix percipiens) Facultas sensitiva nonnunquam per se, & motu adhuc salvo laeditur: Hoc de organo quorum nervi sunt tantum sensiles, uti nimirum de visu auditu, gustu & olfactu satis obvium est, & ratio facile patet: At vero quod in extremo corporis habitu, aut membra intercedum Tactus percutit, potentia Locomotiva illaesa, uti passim cernitur in Leprosis, Elephanticis, & maniacis quibusdam, nuda lucere, & homi discumbere solitis, qui in cute & carnibus musculosis adeo obstupescunt, ut scorpelli incisiones, aut aculeos alicubi adactus minime sentiant, hoc inquam explicare perquam difficile videtur. Vetus tamen super his dicendum erit, eosdem forsan Nervos motuum instinctus & sensibilibus impressiones prout & retrosum conducere, sed non eadem fibra, quae sunt *inveniente*, prout sunt *positivum* sensibiles esse: Potentiam illam *fibras musculas* & tendinosas cœqui alibi ostendimus, verum species sensibiles, à *fibris membranaceis* fere tantum recipitur: quare cutis externa primarium tactus organum est, post hanc mem-

brana muscularum integrentes, ac denique viscera constituentes ab ob aceto tangibili quodammodo afficiuntur. Quapropter tactus laesio aut amissio, propter noxam membranis exterioribus illarum eorum, nempe cum hacum fibrae à materia vitiosa obstruantur, aut à frigoris excessu valide constipantur: proinde spiritus animales, qui impressiones suas excipere debent, ab organo suis excluduntur: Et quidem has membranas exteriorum incolae tantum affici inde constat, quia membra *fina* non sicut *motu* privata exarcescunt, sed plena & torola perstant: quod indicio est spiritus animales, *nervi & fibræ carneæ* usque subeantes, nutritionis muneri virtutem suam (quali modo pridem ostendimus) contribuere: ac cum *motu* abollito, spiritus paribus illis fere in totum exulans, carnes, quia materies nutritia, per artenas licet advenire non assimilaretur, contrahuntur: *Id est Tract. de anim. tract. part. 2. c. 9.* De Fibrarum natura, officio, differentia, vide cap. 19. Cerebri Anatomicæ, Ubi & de Nutritionis diversitate.

OBSERVATIO VI.

Stupor totius corporis, cum pedum tremore & palpitatione continua, in viro cujus Lien quadratus erat, cartilaginea substantia incrustatus.

Vidi in Abbate Nobilissimo familiae d'Antragues, mirabilem splenis formam, huc quum tremulos ac continue palpitantes habuisset pedes per duos menses, tandem superveniente Stupore totius corporis, interit.

Aperto cadavere, observavi Lienem exacte quadratum, trium palmorum latitudine; crassitie quatuor digitos æquantem, & undique *cartilaginea substantia* incrustatum. *Rotamus Anthropogr. lib. 2. cap. 23.*

S C H O L I A.

Stupor à Galeno 1. de sympt. caus. modo levis Paralysis vocatur, modo Disposicio quædam inter valitudinem & absolutum Paralytism, quæ causæ omnes, quæ in Paralyti recensitæ sunt parere possunt, licet hic majores sint & graviores. Continens est spirituum animalium sensui & motui in parte aliqua destitutorum, defectus: Communissima ea antecedentibus est materia catarrhalis, non in affectibus paribus genita, sed à cerebro suppeditata, hinc in nervosam substantiam influens, liberum spirituum animalium influxum impediens, obstructione vel compressione: Huic materiei catarrhalis ferocias quoque acide æque melancholicæ, quales gignit Lien male consti-

tutus, nervosæ & dense substantiæ penetrationi non parum consensit: Adde quod si Paralytism inducere potest humor melancholicus, cujus Lien parens perhibetur, potiori jure Stuporem inducet.

Stupor totius corporis) Qui rarissimus est, plerumque enim una pars vel plures stupore afficiuntur: videlicet tamen *Brasilensis* aph. 9. lib. 7. hæmorrhagiæ narium succedens, tandem lethalis irritis omnibus remediis *Et feruhs* lib. 5. par. cap. 3. cœcem solam obdormens illatio motu, post crupalem: Matthiolo item, in rustico, qui cum halita prægangdem serpentem confodisset, duobus annis postea universi fere corporis stupore laboravit.

OBSERVATIO VII.

Tremor à Sero subvirescentis coloris substantiam cerebri alluente, cujus portio in Spinalem medullam influxerat.

Scripsit ad me *Guido Patinur* Medicus Parisiensis celeberrimus, Campanum quandam Nobilem, præter febrem & alia symptomata Tremore insolito fuisse correptum, qui efficacia remedium liberatus sit, Taudem quum vino multo eoque meraciore usus esset, cum *anxia* & fugaci delirio extinctum esse:

In ejus cranio dissecto substantiæ cerebri Serum multum, instar feri laetis subvirescens innatabat, cujus portio in spinalem dorsii medullam decidua, Tremorem illam initio morbi concitaverat. *Th. Bartholinus Spicilg. 1. de vasis Lymph. cap. 3. & Observ. Anat. 39. cœnt. 2.*

S C H O L I A.

Tremorem initio morbi) Sic Pythion, hist. 1. sect. 1. lib. 3. Epid. primo die Tremor à manibus, scabris aqua, &c. Ejusmodi Tremorem plenitudinis proge-

nem esse credit *Galenus*, quod primo die incidit in ægrum, qui non debet à purgando & vacuando deterrere, ut cum à spirituum & humorum dispositione dependet.

OBSERVATIO X.

Tremor à verme in cerebro latente.

ANno 1571. in Marca Anconitana grassabatur morbus epidemicus, quo Nobilis quidam affectus, asserēbar aliquid in cerebro esse vivens, cranium ipsi & cerebrum quasi tērebello perforari videbatur, mox maximæ concussiones & Tremores &c. Aperitis defuncti dextro & sinistro cerebri ventriculis, repertus est lumbricus totus rubeus, indice digito longior &c. *Vide Tit. de capit. dolore.*

OBSERVATIO XI.

Morbus Tremulus Equæ, à Glandulis maxillaribus, & totius corporis, humore flavescēte & acri imbutis.

QUatuor abhinc annis in Equā, morbo Tremulo quem Angli *The Steggers* vocant, laborante, abscisso capite à Clar. D. Henrico Sampsonio, Cantabrig. Aulæ Pembrochianæ Socio, Notavimus ductus Salivales superiores, qui viam suam per marginem maxillæ inferioris affestabant, uti sit in bobus &c. neque directe ad proprias glandulas, maffterem musculum supergrediendo, tendebant, ut sit in hominibus, canibus &c. Glandulas has flavo colore valde tinctas, sicut & totius corporis omnes cæteras, humore quodam acri imbutas fuisse, Unde conjicio Mariem equæ, morbumque à genere nervoso, quod glandulas occupat, ortum habuisse. *Ioh. de Muraltio Exercit. med. 2. §. 10.*

OBSERVATIO XII.

Horror perpetuus ab impuro sanguine venarum, totoque purulento.

DOMINA à Chalmontio per totum morbi decursum perpetuos habuit horrores (quod forte nunquam visum est) & sanguis omnis in massa contentus putruerat & extabuerat.

Aperito corpore, quicunque è venis effluebat sanguis merum pus erat; Ballonius l. 1. conf. 110.

S C H O L I A.

MERUM PUS ERAT] Quod ob dominarum caloris cœtera narum omnis corruptiois contigerat, necdum corporis interioris inestina cacoehymia, toti sanguinis massæ ita communicata, ut iode totius corporis corruptio insequuta fuerit. *Idem ibidem.*

Perpetuus habuit horrores] Multis modis videmus in febribus, etiam dum ætus adeit, horrores leves incidere, ac si novi paroxysmi nova foret occasio: Item & magis videmus alias moderato calore persulas, alias veluti incendio conflagrare: quæ duo aliquando simul incidunt, aliquando seorsum videntur: Visuntur simul in ingenti cacoehymia, cum non modo in mesenterio, quod est totius corporis femina, verum etiam in genere venoso corruptio est humorum & sanguinis, & qui detrahatur sanguis purulentus est: Hinc & vulgares dicunt se malum sanguinis cursum sentire, Quod non abs re dictum, etenim secta illis bis aut ter vena, eductoque sanioso sanguine & subversidi, seorsum punctionis quem habebant, & horrores illos parvos amplius non habent: Domina à Chalmontio hoc satis docuit: Item vicarius S. Gervasis, in qua sensus deambulationis formicarum, quem in brachiis & metaphere percipiebat, & quædam inæqualitatis sensio, non aliunde erat quam à sanguinis corruptela per venas fusi: decharavi curatio, nam ita cessavit missio ter aut quater sanguine satis emulaculæ. Horum demonstratio peti potest ex lib. 6. Epid. ubi Galenus scribit omnes cacoehymos, cum repente incalescant, inhorrescere: Testatur & quotidiana experientia, nam si quis pravus scatus excrementis in Sole versetur, statim inde redibit inhorrescentia: sic calor febrilis dum agitat humores potes,

idem præstat quod & Solis calor: inducit enim rigores & horrores, nam humores corrupti incalescunt seipsi sunt actiores, moventur & ita laniantur atque ferunt membranas: Item & ichor excitatur à calore agitante, qui sensum horrores, morsus, & inæqualitatem invehit: Atque eorum quilibet sibi ex facili horrescunt, multa reperio genera à variis causis nata, ut non sit temere pronuntiandum de hac aut illa causa si quis inæqualiter horreat: Nam quidam cum vident istos horrores & inæqualitates sæpe incidentes, de suppurato veniunt, ac sæpe eo recedunt, at falsi: Inter cætera videmus istos rigores & horrores initio paroxysmorum contingere, de illis non loquimur: aliquando per totam sibi hrem adiunt, quod de semitritiana intelligi Galen. in qua horrores per omne tempus, & particulare & generale febris percipiuntur, sive intensio faciat reduplicationem, sive ascensus fiat inæqualis, ideo *peritæ* dicitur *ut & cetera*: hoc efficitur materię diversitas in qua febris accenditur: Etenim ex duobus humoribus contrariis simul mixtus fit, billosus & pituitosus, & cum dum billosus incanduit, calist pituitosus, & sic ascensus inæqualis fit; idemque contingit quod & initio paroxysmorum, quo præsertim tempore urgent horrores: quia enim inæqualiter & calist & movetur humor unus, ideo inæqualitas contingit & horror: cum totus humor æqualiter affectus est, desinunt horrores, & tum inetementum & vigor adeit: Quod si in uno humore, totopotam febre committente fit, molis magis in duobus consilia fieri potestur in febribus

Titæophyza & hemitritæ &c.

Idem ibidem.

OBSERVATIO XIII.

Horror à diffusione feri è cerebro in spinalem medullam & partes membraneas.

Viro Illust. (de quo supra observ. 1.) musculorum tensionibus dolorificis obnoxio, recens expurgato, illico totum corpus horrescere incipiebat: Illi universa cerebelli compages, & spinalis medullæ truncus latice aquoso madefcebant. *Vide Titul. de Convulsione.*

OBSERVATIO XIV.

Horror à colluvie materiei purulentæ inter duas mesenterii tunicas latentis.

Quidam intemperantissimus in affectionem hypochondriacæ similem incidit; cui supervenit horror. Inventa est colluvies materiei purulentæ inter duas mesenterii tunicas, &c. *Vide Tit. de de Melancholia.*

OBSERVATIO XV.

Rigor citra recalescentiam, à putredine inducta dimidia parti cerebri.

Quidam ab equo vehementer percussus in capite. 2^a. die sequitur *Rigor febrilis*: xix. accessit Rigor frequens inordinatus, absq; calore concomitante, cum mandibulæ resupinæ, delirio &c. Inventa putredo dimidiæ partis cerebri: In ventriculo tertio plurimum puris & aque. *Vide lib. 4. tit. de Fulværibus.*

S C H O L I A.

Rigor febrilis] Eius hæc est generatio juxta *Methodum* lib. de Febris. Cum succi nutritii particule à cruditate itau versus maturariæ pergunt, ipsam vero non attingunt, insignem acorem contrahunt, quo partes nervosæ valde pungunt & vellunt, atque frigoris sensum incuriunt (non lecus ac cerevisia, quæ utribus inclusa à dulci in acidum & nitrosum saporem transit, ut præ acore & frigiditate via deglutiri possit) cum itaque massa sanguinis hujusmodi crudi succi particule, nitroso acore pendentes, ad turgescitiam implerunt, & cum densius agglomeratæ in fluore esse incipiunt, spiritus vitales acore suo primum obrundunt, & calorem nonnulli obstrunt, quare sanguis frigidior existit, & tardius circulator; quin & ob calorem defectum sensus frigoris in toto corpore percipitur, & pallus admodum rarus existit. Porro, cum hujusmodi fluore acetoso partes nervosæ & solidæ pro ultimo suo alimento irrigantur, hujus fluore, qui simul contingit cum sanguinis turgescencia, partes illæ sensiles vellicantur, & in tremores ac spasmos irritantur: Atque hæc proculdubio est vera & genuina causa frigoris & Rigoris quæ in paroxysmo febriis intermittens excitantur: nimirum succi in materiam nitrosam degeneris fluoris & turgescencia, quo spiritus & calor suffusi obrunduntur, & corpora nervosa irritata in tremores cidentur: Postea vero cum particulæ hujus nitrosæ, aliqua ex parte in superficiem corporis protrusa, eorum gravamine & opprestione sanguis nonnulli liberatur, spiritus vitales sic recolligunt & emicare incipiunt: deinde autem calor intensissimus succedit, quoniam de cruoris massa, propter effervescentiam cum materia febrili laxata, ejusque mixtione soluta, particule subleventur uberior in corde accenduntur: & quia (potius cutis ab eadem materia versus circumferentiam corporis protrusa) effluvia vaporosa in eis colubescunt, quæ sanguinem magis exarant & effervescent, calor iste in sanguine ulique perculsit donec materia ista fermentativa prorsus combusta, ac una cum recrementis solutis à destagratione residuis plene sub-

da & subtiliata, setoque involuta, sudore aut transpiratione insensibili evaporet.

Rigor absque calore remanente] Tunc temporis non est subsequens calor, quia cerebri pars in necrosin abiit, post abscissam illius: Quomodo à catarrho è cerebro elevari Rigor, Et cui hunc non semper recalescentia sequatur, explicat *Balsamus* conf. 114. lib. 1. Cum cerebrum aut, peculiari morbo laborans non capiat eum fructum ex alimento quem capere debet, illud corrumpit, unde pars aliqua jam sequestrata est quæ continens dolores, aut parum intermittens committit, pars alia à cerebro valente pellitur foras: Si nitrosum quid salumque habet, & per putredinem, sensum caloris & acrimoniam infert, & sic putant sibi partes dari: Si quæ pars mixta frigidior & crassior, dum confunditur massæ sanguinæ, dum nervorum genus ferit & imbut, sensum quoque frigoris infert: sic parit & surgit ea inæqualis frigoris & caloris quæ sæpe percipitur: Immo si initio paroxysmi cum minimis appulis externi aeris frigidi, aut sparsis humoris etiam calidi & biliosi sensum horrois & rigoris infert, quanto magis id præstabit humor à capite habens, qui tamen & falsedinem & nitrositatem habens, caliditatem insolentem habet, tamen quia omne excrementum retinet aliquid de ea parte cujus est excrementum, cum cerebrum sit natura frigidum, non mirum si in isto humore sit aliquid *imperfectum*: Hinc non mirum si catarrhosi sæpe horreant aut rigent, & in febribus & extra febres, ut non necesse sit ad istas horripilationes febrem sequi, quod temporibus Hippocr. eveniebat: nam horrorem rigoremque proxime febri sequebatur: Præter autem alias rationes hæc forte probabilis est, Quod si primus horrois & rigoris impetus, & in incensum paribus & ab interioribus sit; perierit si materia præparata est, maxima ea parte febri suscitatur: Sin autem potius de foris est, & ab externa causa, & manifesta occasio, non est ita necesse accensio calore & humoribus febrem consequi.

OBSERVATIO XVI.

Rigor anem. Noua. a corruptione uteri ortus.

D Omina N. febre Tertianæ typum referente laboravit, cum dolore ad hypogastrium: Rigor tertii paroxyfmi fuit tantus ut ab eo non recaluerit: Uterus erat corruptus & quasi gangræna affectus, plenus tabo & sanie. *Vide cit. de Febris lib. 4.*

SCHOLIA

Qui Rigor erat à suppurato, cujus indicium fuit
ianies & tabes quibus scatebat uterus. Vide
Scholia ad obf. seq. Rigorem sine febre contingen-
tem c. 6. lib. 2. de diff. Epid. ab acida aut vitrea

pituita deducit Galen. cum sensibiles corporis partes petreant, tunc, ait, inferitur Rigor sine febre, quod apud antiquos nunquam evenisse testatur, quia moderato victu coluque urantur.

OBSERVATIO XVII.

Rigor Pleuritidis in suppuratione absenti succedens.

Quanquam Hippocr. dicat pleurit in non ante 14. diem ad suppurationem tendere; observavi tamen 7°. vel etiam 4°. id evenire: Sic in adolescente cui Rigor febrisque 4. 5. 6. & 7°. repebant, intra secundum septenarium, morbi mortuo, universus thorax pure prægnans repertus est: *Vide lib. 2. tit. de Expositioe purulenta.*

SCHOLIA

Thorax, pars praegrandi] Omnis Rigor aut est sin. 30
 affricio aut sin. 30 tuncio : sin. 30 affricio, affecto
 partium partemque canato : sin. 30 tuncio, à tunc-
 puaro : Doen. N. ad membr. Myrm. rosmia, abun-
 dante & humore bilioso & cetero : utriqueque humo-
 ris mores inaequales, motus inaequales : dolor ad
 iugum ventrum inclinans, ad partem potius dextram :
 Turgere adeo humores ut huc overeffus facit.

toto aqualculo in tumorem elato: febris succellit
parim periodica parim non; Tandem excrevit puris
maiestas, facto in meienteris paucis, aut insectis
aliquo abscissa: Post longum tempus, & longas
adeo purgationes convalescit: Huiusmodi aliquando
rigebar, qui rigor erat à suppurato, *Sallustius Epistola lib.*
2. ad fratrem. De Rigore Erysipelatis liberius scribit Galemus
prooemio lib. 2. canon. (3.)

Observatio XVIII.

Rigor vehemens citra febrem, à bile circum jecoris causa coercita.

V Ir quidam (*de quo tit. de Paralyſi*) quotidianè bilis vomitioni obnoxius, hæc repente ſuppreſſa capitis corpus citra febrem vehementi rigore, tanquam invadente ex quilita tertiana, ex intervallis quotidie ſupra vicies concutitur. Deprehенſa eſt poſt obitum, bilis ſincera, & aque praſina, circum jecoris cava, libræ pondo membranæ coëſcita.

SCHOLIA

Rigor *Duratio serena. in conc.* t. est confusio totius compaginis, maxime autem partium pollicarum quae adiacent Lumbis, metaphere, cervici ac capiti: dum scilicet protrahatur appullus cacochymiae, illuc & vasis capillae & viam ad exitum affectantur. P^{ro} autem aut facie sumere, pro omni rigore quod coniungitur sic cum confusione corporis, & hoc fit tam ab externis quam ab internis causis: aut prellis, pro eo tantum quod ab internis & sponte, non praegressa causa externa: Atque ab Horore distinguitur vulgo causae tantum magnitudine, Hofmannus verb. Init. medic. lib. 3. cap. 15. Rigorem omnem convulsionem quandam esse censet, quae non fiat nisi transaliam ad cerebrum, praecipue quia nervorum principium est, vaporibus acerbis copiosis, quibus in nervos receptis, & ad musculos diffusis, fiat id quod videmus: Hoc petiualet, ait vir Excell. ipsa rei natura, cum enim Rigor tam valida fit muscularis totius corporis confusio, in musculis autem alia via non fit quam quae per nervum, cuius visio mihi vetat si hoc divertam? Apud Hippoc. autem & Galenum Horror & Rigor quadruplex reperitur, Plethoricus, Periodicus, Criticus & Symptomaticus: Primus fit in hamine sano, qui sepe multis effusis, & frigidis cibis, op-pleverit: elux, ceteris Rigoris speciebus minor, qui

frigidae materiam motus magnus esse non potestur. notat Galen, cap. 5. de Rigore, et hunc antiqui Hippocritae ad hibern. 5. sect. 3. lib. 1. Catezæ tres Rigoris species in homine febri laborante considerantur: Criticus colligitur ex aphor. 8. lib. 4. Qui ab ardente febre corrumpit, superueniens rigore liberatur: Periodicus ex aph. 63. lib. 4. Quibus utroqueque duobus rigores fiunt, utroqueque duobus febres solvantur: Symptomatis colligitur ex aph. 46. lib. 4. Quibus Rigor sentitur febre non desinente, si rigor jam esse desit, lethale: Et ex Progn. 38. lib. 2. quo ait, signum suppuratiouis esse eo aph. du quo Rigor incipit. Dum enim ex ruptione et erosioue vasorum pulmonis fit portio sanguinis in pus mutatio, tunc partis acrimonia partes sanæ lancinantur, unde Rigoris sentias, calore ad inuertia, ut fapperias ferant, et vocantur: Ied notatu dignum est omnem Rigorem fieri à materia calida, vel per se, ut in Rigore decretorio, et periodico febri certant: vel per putredinem, ut in rigore symptomatiko à materia putulenta: Distinguntur autem inter se, quod periodicus et criticus incipit à lumbis peraph. 69. 4. symptomatikus autem à parte inflammata: À lumbis autem originem ducunt periodicus et criticus, quia in lumborum regione, fit confluxus succi pancreatici, bilis et pituitæ, ita tenet intestino, à quibus humoresque eleuantur

haleus acres, qui gradibus acrimoniae differentes alias horrorem producant, alias rigorem, quoties nempe fucci pancreatici aciditatem majorem, indecumq; ortam, suppressere nefcit acrimonia bilis remissior, quin

quodammodo, saltem per sigulculum, partiumve membranas, cum solitionem, hancq; subsequens pancreatici caruoli concussionem leuem, illa seie manifestet. *Vide Syntum de la Sac. pract. lib. 1. cap. 30. §. 7. 9. & cap. 31. §. 3.*

OBSERVATIO XIX.

Anxietas excitata à ventriculo inflammato postsumptum venenum.

D. N. Inquietudine ingenti vexabatur, cum vomitu &c. Reperta ventriculi tunica interna omni ex parte livida & syderata, maculis confersa. *Vide lib. 3. tit. de vomitu.*

S C H O L I A.

D Vplex est Inquietudo, vel critica, quae in perturbatione fit, criticum humorum motum antecedente: solemque cum aegi se erigere, jactare & variè movere; Altera, quae citra crisin est, & symptomatica nominatur, accide in genere cum quacunque dolor & quaecunque molestia hominem angit, Estque duplex, una cum os ventriculi à pravis humoribus vellicatur, de qua *Galenus 7. aph. 36. scribit à vomitu, seu anxietatem & inquietudinem istam, iis maxi-*

me evenire, quibus in ore ventriculi propria quaedam humoris mollii qualitas continetur, oeq; multi neq; innotantis in ventriculi capacitate, sed alius in ipsis tunicis imbibiti: Nonnunquam causa istius inquietudinis est cibis ineptissime exhibitus: Altera est, quae oritur à materia maligna & acri libere exhalante, quaeque circa viscera molestat, vel ab inflammatione aliojuz visceris provenit, unde ex febri, à vomitu nominatur. *Seminarum Pract. lib. 1. p. 1. cap. 23.*

OBSERVATIO XX.

Anxietas à pure è pleura in ventriculum illabente.

E Mpyematicus paracentesis recusavit: huic pus ab apostemate in pleura diaphragma corripit, hinc totum ductum ventriculi & intestinorum tunicas exteriores: Hic febricula, siti, Inquietudine &c. tenebatur. *Vide tit. de Febrilibus.*

OBSERVATIO XXI.

Anxietas orta à lumbrico ori ventriculi affixo.

Filius N. Cardialgia prehenditur, nausea &c. Jectigatio erat insignis: In ventriculi fundo deprehensi duo lumbrici: In ejus orificio macula purpurea, unguis minimi digiti magnitudine, in cujus medio vestigium apparebat sedis cui affixus fuerat illorum alter. *Vide lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

S C H O L I A.

Nausea] Jactatio Graece *ἀναψις* dicitur à *ἀνα* apud Galenum part. 4. l. 1. Prohibet. duplex est unus *ἀναψις*, alter *ἀναψις*. Ita enim scribit: Bifarium aegi lux *ἀναψις*, uno modo cum vitru à corpore gravatur, nullamque figuram retinent aegi, alio modo cum os ventriculi à pravis mordetur humoribus: Priores perniciose afficiuntur, posteriores sunt nascebundi: Et plenius in Prognosi. parte 19. lib. 1. *ἀναψις* à vomitu & *ἀναψις* à vomitu, i. e. jactant sese & peiorem corporis figuram non retinent, sed subinde immutant, aut ob ventriculi *ἀναψις*, affectionem significati, aut ob vitium imbecillitatem, ut corpus ipsum aegro & natura sit oneri: Quod est intelligendum nisi aeger mollior & delicatior sit, ut qui minima te offendatur & doloris insolens jactetur: ideoque in fine dixi, vide an aeger sit numerandus inter homines leves, qui facile remittant ac concedunt, &

vinci se patiuntur, etiam re levi: Ad duas illas causas, aut signa *ἀναψις*, nempe oris ventriculi ab acri humore demorli (aut alia te irritante, ut lumbrico) & *ἀναψις* malignam qualitatem accensibilis: Imo vitium infirmum istius *ἀναψις* non videtur causa, cum saepe post magnas evacuationes malis os videas valde imbecillos, qui quicquid, nec subinde muerant: Itaque aliqua latens causa, ut venenata qualitas, esse videtur, quae homines jactati & consilienti (quod Graeci *ἀναψις* dicitur) faciat, & proinde infirmam afferat, unde major occasio inquietudinis: Sed assignare jactationis causam infirmam vitium (pace Hippocrati dicam) non est æquum: In pestilentibus febribus, & in grumo sanguinis *ἀναψις* videamus, à maligna qualitate vires labefaciente & spiritus dissipante: *Ballonius* *enst. lib. 1. p. 147.*

OBSERVATIO XXII.

5. Anxietas à sanguine copiose intra thoracem effuso & collecta.

Illustr. Comes de Reitravv (vide histor. tit. de Apoplexia lib. 1.) mane e lecto surrecturus Anxietatem quandam percepit, quam vomitus sequutus est: Inter secundum cavaver Chirurgus diaphragma laxit, unde ex thorace magna sanguinis quantitas defluebat &c. *I. Jacob. Wepferus Exerc. de Apoplexia p. 351.*

S C H O L I A.

Causam anxietatis, cum vitium prostratione ita cum ab invasione junctae, non in ventriculi cavitate delinisse casuismo, quamvis vomitu, cibos

abhoruerit & poeytema rejecerit; nam nec vomitu nec purgandis Anxietas rostebarit, insuper non sitit: Nec ascribenda videtur fermento itque achi, bili & succo

de succo pancreatico in duodenum confluentibus & inter se conflantibus, nam coquina fuit, & neque purgantibus neque victu tenui emendabatur, nec credibile videtur huic triumviratui moram ad quantum ulque diem concessam fuisse à duodeno exquilito sensu prædito, & continuo suo vermiculari motu adversa vel suavia vel deorsum propellente: Nec principium nervorum læcessum in prima invasione arbitror, quævis post obtinuit sanguis ferotus in spatio meningibus interjecto repertus fuisse, posteaque inquietas traduxerit; nam de molla cephalalgia nullaque vertigine conquestus est: Sed sanguinem sub æthero copiose effusum & collectum præcipue culpandam puto, nam suacito incompessive in cadaveris apertione diaphragmate, circiter dimidia libra cruoris efflavit, & remoto sterno, libra cum dimidia sanguinis reperta fuit, ut præ copia, secedente quoque mediastino, nec cor nec pulmones videri possent, mediastino hæc viscera opescente, unde nec in

pericardio, nec cavitate reliqua pectoris sanguis stagnavit, & pulmones à vitio immunes inventi fuerunt: Sanguis enim etiam in his sedibus copiose cumulari potest, quia etiam illas vasa sanguifera transeunt, & mediastinum facile à sterno secedit, ut quidam spatium quoddam vacuum inter sternum & mediastinum naturale, quamvis falso crediderint: deinde jam die secundo facies & extrema pallebant & frigeabant, & die tertio facies varie immurabatur, quod in simplici anxietate ab humore acris officina stomachi & duodeni affligente citra levissimam cardialgiam, quæ nulla fuit, nunquam evenit: Denique anxietas die primo post pilulas melleo quas pinguant, & ab infuso Rheo die tertio exacerbabatur, quæ potius abstergendo, & eliminando contenta ventriculi, opem ferre debuissent: Foras Medicas præsens alia indicia animadvertisse, scilicet dolorem tensivum & gravissimum cum

difficiliæ respirations
idem ibidem.

APPENDIX.

Anxietas orta à pure intra thoracem conclusa, desinens illi exitu parato.

Rusticum senem novi qui multis annis sub sterno Empyema sustinuit, quod juxta cartilaginem ensiformem in sinistro latere sibi exitum paraverat: quoties fistula occludebatur, aut à pure concreto obstruebatur, à pure stagnante valde angebatur circa præcordia; difficulter respirabat ex dolore aggravantem & tensivum patiebatur; quamprimum vero fistula turundis æ radice gentianæ dilatata pus copiose profunderat, statim melius habuit & aliquot annis satis commode vixit. *Wesperus ibidem.*

OBSERVATIO XXIII.

Anxietas orta à concrecente in vasis sanguine.

Puella cum per diem vertiginem, Anxietatem &c. esset passa, die sequenti exstinguitur: In arteria magna & vena cava totus sanguis coalescerat: &c. *Vide lib. 2. tit. de Syncope.*

S C H O L I A.

In Schollis ad observ. 21. adnotatum à grumo sanguinis anxietatem oboriri: Si grumus eam inducere valeat, posteriori jure sanguinis omnismodi in vasis concreto, vel potius causa maligna eam pariens: qui effectus est venenorum quorundam sanguinem congelantium, ejusque mixtionem destrucendo corruptionem, scilicet melle sanguineæ, aut erodit, *Wesperus cap.*

12. de Febribus, primo congelationem, deinde putredinem inducunt: Cum enim spiritus cruoris à venæ contagio profligari dissipantur, liquoris maris æquabilis solvitur: quæ particule crassiores se mutuo implicant, & (instar lactis ab infuso coagulato, aut ipontanea acclerentia) invicem coagulantur: hinc cruor in vasis grumescit, ut minus prompte in illos circuletur:

OBSERVATIO XXIV.

Anxietas excitata à Pericardii inflammatione.

Quidam acuta febre prehensus est cum siti, Anxietate, respiratione frequenti &c. Scitatio palam fecit fuisse Pericardii inflammationem. *Vide lib. 2. tit. de Pectoris dolore.*

OBSERVATIO XXV.

Anxietas à mediastini inflammatione nata.

Nobilis cum febre acuta inquietudine magna detinebatur: Inventus est in membranis interfepientibus tumor inflammatorius. *vide lib. 2. tit. de Pectoris dolore.*

S C H O L I A.

Distinctionem causarum anxietatem patientium vide in schollis ad observ. 19. ex Sennerto: Ex Hippocr. plurimorum morborum comes est, *Doloris capitis inflammationis* 1. de morbis 3. *Suppressionis venarum in cerebro*, ibidem. *Cerebri ex inflammatione tumore* 3. de morbis. *Cynanchus ibidem*. *Pulmonis inflammationis*, lib. de diebus judicis. *Pulmonis suppurationis* CORACI 18. *Erysipelas Pulmonis* 3. de morbis & lib. de ioc. affect. *Adriani Radiaxi* 2. de morbis. *Crassi moris ex pueris putridis*, lib. de ioc. affect. *Rapierum in uno venæ* 2. Epid.

sect. 1. *Erysipelas uteri*. lib. de nat. milie. *Infectionis uteri*, ibid. & 2. de morbis. *Astensa uteri ad stomachum* 1. de morbis. *Ad cer.* 2. de morbis. *Suppressionis mensium feminæ* 1. de m. m. *Mensium copiosorum & crassorum*, ibidem. *Eoloforum*, ibidem. *Putrefactionis & metamorphosis*: ibidem: *Lothiarum immutatum*, ibidem: *Ata sola in utero* 2. de m. m. *Ruor mulieris sub palato & gingivis* ibid. *Atium & eruginosum humorem in corpore turgentium*, lib. de Præca med. *Cura præ morbi* 2. de morbis. *Bala fœcra ab alio extrinseca* 1. de victu

As 3. deot.

acut. Cibi intempestive *agere exhibiti* ibidem. *Finis* à re qualiter partes sensiles afficiunt & naturam ad *finiri* Proth. 62. Tandem censenda ortum ducere excretionem sollicitante.

OBSERVATIO XXVI.

Anxietas orta à polyipis in cordis sinibus & Pulmonibus sanguine infarctis.

Filiolus N. 10. mensium, cum tussi febricula, dyspnœa, magna Inquietudine & rotius corporis jactatione afficiebatur. Pulmones sanguine stagnante infarcti reperti: In sinibus cordis polyipi ingentes: *Vide Tit. de Dyspnœa. lib. 2.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO XV.

DE PARALYSI.

OBSERVATIO I.

Paralysis gravis ortum ducit à dissolutione Corporum striatorum cerebri.



CORPORA striata & *æque adhibita* munera exequi, præter illorum fabricam & usum analogum, exinde colligendum, ex observationibus quibusdam circa ea, quo ritu in morbis Paralyticis afficiuntur adhuc certius constare videtur: Cum enim aliquoties cadavera quorundam à longa Paralyti & gravissima nervorum resolutione defunctorum aperuerim, deprehendi semper hæc corpora præ aliis in cerebro minus firma, instar amuræ discolorata, & striis multum oblitteratis: Porro in carulis recens natis, qui visu carent, aliasque motus aut sensus facultates ægre perficiunt, hæc striæ vix integre formatae, tantummodo rudes apparent. *Willis cerebri Anat. cap. 13.*

S C H O L I A.

Vbi corpus callosum desinere putatur, medulla oblongata incipit, cum nimirum cerebri tubstantia medullaris, juxta utriusque hæmilphæzii umbones crassissima existit, utrobique medullis illi corpus subalbidi coloris, ac nonnihil obfuscum, ac instar eborei striatum apparet. Bina hæc corpora sunt cravam medullæ oblongæ extremitates, sive apices, inter quos & cerebrum proxima & maxime immediata commercia habentur: utrumque horum videtur quasi cylindrus in orbem convolutus, qui tamen utriusque cruris summum hæad sphericam, sed ovalem, & ad posterora nonnihil declivem consistit; Superficiæ illius portio amplior cerebri substantiæ medullari conjungitur, pars tamen aliquanta à cerebri cohesione libera, scilicet eminet, & protuberantiam istam in utroque laterali ventriculo eminentem facit: Hæc corpora si per longum in medio dissecetur, striis medullaribus, & velut radios insignita apparent, cujusmodi striæ duplicem aspectum, sive tendentiam habent; quæ aliæ à corporis hujus summitate descendunt, quasi tractus sunt à cerebro in medullam oblongam: atque aliæ à parte inferiori ascendunt, & prædictis obvium sunt, quasi spirituum orbitæ sint à medulla oblonga in cerebrum; Et observari dignum est quod in toto *hæmiplegia* nulla præterea pars simili cum striata reperitur.

Horum usus si inquiratur, hoc statim occurrit quod

hæc corpora inter cerebrum & appendicem ejus collocata, utriusque magna & communia divertoria existunt; quæ nempe spirituum animalium impulsus ac impetus quoscunque ab altero emissos suscipiant, ac statim alteri communicent; sive ut planius dicam, hæc pars Communis Sensuum est, nempe Aristotelis verbis, *in æquæ adhibita*, quod sensibile omnium ictus à nerva cujusque organi delatos accipit, adeoque omnis sensationis perceptionem efficit: cujusmodi sensibile ictus, cum hinc in cerebrum ulterius transjiciuntur, Sensui statim imaginatio succedit: Atque insuper hæc corpora, nil sentium omnium impetus, ita motuum omnium localium spontaneorum primos instinctus suscipiunt; quociens nimirum Appetitus aliquid agendum decernit, statim recipit spirituum animalium tendentia, h. e. à cerebro in has partes motuum à quavis parte aut membro incandentem conceptus hic loci in actus disponuntur: Hic enim velut in foro celeberrimo, spiritus animales rei volitæ executionem molientes, in nervos appropriatos diriguntur: Rem ita habere constat, quoniam à cerebro in nervosum genus, & è contra ex hoc in illud omnis influentia, & mutua spirituum animalium commercia hæc corpora pertransire necesse habent: Quapropter omnes nervi, etiam qui ad sensum organa interiora spectant, pone hæc corpora striata oriuntur; Quippe nervi apices & olfactorii, longo ductu

ducta & ambagibus cerebri superficiem perreptant, ut infra hanc partem medullæ oblongatæ inferantur: Enimvero sensibilium species per istos nervos susceperæ immediatius cerebri medullæ inferri poterant, nisi quod plus huic sensorio sibi debuerint: Porro has partes prædicto officio fungi consicere licebit ex striis & quasi radiis illorum contextura: Cum enim istæ striæ, quibus hæc corpora insigniuntur, duplicis sint generis, nempe aliz descendentes, quæ à cerebro versus medullam oblongatam spectant: alizque ascendentes, quæ ab hoc versus illud distincte feruntur, concludere licebit quod in his sursum laeis, sensibilium impressiones percipiuntur: atque in illis deorsum tendentibus, motuum instinctus peraguntur. *Idem ibidem.*

Deprehendi sæpè hac corpora nimis firma] Paralyfis est panium nervosarum à debita tenuitate resolutio, sive relaxatio, cuius ratione motus & sensus, nempe aut alter taneum, aut simul uterque, in toto corpore, vel in quibundam partibus debito more exerceri nequit: *Partes* nervorum resolvuntur, quia spiritus animales eas non satis irradiant, insistant & vigore refluunt: Cujus defectus causa est aut *vasorum obstructio*, qua illorum transitus free trajectory impeditur, aut *spirituum animalium* impotentia, quatenus si vel vasculi affecti, vel copis minores, se non vegere satis explicant: Quoad prius, spirituum ob meatus obstructus à partibus, resolutis interceptio, supra eas semper existens, variis in locis, & propter diversas causas fieri solet, præcipue tamen vel in *primis sensorio*, scil. in *corporibus striatis*, aut alicubi circa Canadices medullares, aut denique in Nervis ipsis, & sic, ut in eorum initiis, aut mediis processibus, aut in extremis finibus, scil. fibris nervi constringit: Quando noxa *corporibus striatis*, aut medullæ oblongatæ, aut Spinali inferitur, vel obstructum totum finem medullarem, unde Paralyfis infra locum affectum universalis oritur: vel unam medietatem, unde hemiplegia, vel in latere uno, aut

simul utroque quorundam nervorum capitella afficit, unde in hoc aut illo membro læsionem ab aliis resolutiones insidantur:

Plures sunt modi quibus spirituum animalium viæ, sive meatus, in prædictis corporibus obstruuntur: 1^o, nempe aut ductus eorum implentur à materia extranea in eadem impacta: Aut 2^o, comprimuntur à sanguine extravasato, Colluvie serosa, aut Tumore quodam in incumbens: Aut denique 3^o, contusitas solvitur, ut à vulnere, plaga, concussionem; etiam à frigoris aut caloris excessu; propter noxam autem Seniorio communi illam, scil. corporibus striatis, non sive comprobatur novi Paralyfin oriri, atque ex observatione capitis sequentis demonstratur: Porro quoties Paralyfis universalis, aut hemiplegia, (ut cerebro affolet) lethargo, caeco vel apoplexiæ succedit, unicuique obvium est conspiciere talem morbi mutationem ab materia morbificæ metallis accideret, quatenus nempe hæc est *Corporis calidi* potis & mestibus (quos prius occupant) tandem evadent, & paulo inferius decedent, *Corporis striati* unius, vel fortis utriusque, tractus medullares incurrit: Cumque adeo spiritus animales à solito effluu, sive translatione in nervorum genus præpediuntur, hæc sunt motiva tantum, aut (si obstructio immensior fuerit) hæc una cum sentitiva inhibetur: Corporis striati non tantum obstructio, sed etiam compressio, ut ex observatione capitis 2. declarabitur, nonnunquam Paralyfin inducit, nempe cum intra cerebri cavitatem inferiorem sanguis extravasatus & grumescens (forsitan & ferrosa colluvies ibidem aggregata) corpori striato graviter incumbit, ipsumque comprimit, propter ea ut tractus medullares consil. isti, spiritibus affluum denegent. *Mem. Tract. de Anima Brut. Part. 2. c. 9.*

Ti. æterni auditoris] Hoffmanni Initia, lib. 2. cap. ult. nullum aliud præter cerebrum, sensum communem agnovit, Galenorum sequutus lib. 1. de symptom. causis cap. 8.

OBSERVATIO II.

Paralyfis à sero inter cranium & meningem diffuso, spinæ initium rigante & cerebellum, quartum ventriculum replente.

Iuvenis fractus acerbitate dolorum abdominis, motibus convulsivis, post Paralyticus oblit: Cum serra caput divideretur, statim aqua pura sponte effluxit non paucæ, meninx occipiti & cerebello interjecta papyri instar madida & decolor: Totum principium spinalis medullæ & nervi in aqua plurima innatabant: Ventriculus quartus aqua scatebat, ac substantia cerebelli eadem erat prægnans. *Vide Tit. de Convulsionibus.*

S C H O L I A.

Ratiis acerbitate dolorum] De Paralyfi hoc imprimis distinguendum, eam scil. vel Accidentalem vel Habitalem esse: Prior à causa evidenti, solitaria, cujusmodi sunt plaga, vulnus, concussio, frigoris aut caloris excessus; & une prævia diathesi quibuscumque accidit; & præter hanc causam & conjunctam, quæ plerumque est compressio, aut unitatis solutio, alias non habet: *Paralyfis habitualis* à causa præcæritica dependet, quæ semper est materies extranea & quasi viridica, alieni prius genita & aggregata, quæ deinde in sensus ac motus organa iussu, quatenus tractus medullares, aut nervos obstruat, vel spiritus interdum mero contactu profigat, vel simul utrumque efficit, in partibus respectivè, ob influum spirituum illis denegatum, Resolutiones parit: Huiusmodi præcæritica à duplici causa antecedenti dependet: una scilicet Remota, quæ est sanguis vitiosus materiem

morbificam, aut in se genitam, aut à visceribus, aut aliunde luescentem & ipsa ipsa ingerens, atque ab altera propinquam, quæ est cerebrum indispotum, nempe debile aut nimis laxum, vel alias male confirmatum, proindeque partibus heterogeneas & morge facile admittens: Materies morbificæ cerebro illa Paralyfin quandoque primario, sæpius tamen secundario, & nonnulli post alios affectus prius excitatos inducit: Prioris ratio (nempe ut Paralyfis habitualis primarius & per se morbus sit) hæc duo requirit, videlicet ut particula heterogenea ad Paralyfin potissimum accedendum sint disposita: deinde ut sensum, & in copis nonnulli manibus admittantur: Nam si plene agmine intraverint, Cierum aut apoplexiæ impetum, & si indolis non plane viridioris fuerint, quando cerebro trajecto sentis & motus organa subeunt, in illis affectionibus sæpe convulsivas, aut dolorificas, imo

interdum colicam, Arthriticam aut Scorbuticam patas, & tandem è postliminio Paralyfin accerunt. a. Paralyfis secundaria affectibus plerisque chronicis, post functiones naturales & vitales ab illa plurimum laesa, non raro succedit: Febris lenta ac diuturna, viribus tandem attritis, saepe totius corporis, aut quorundam nervorum enervationes aut resolutiones infert: Tristitia longa & immodica, Tabes, Atrophia scorbutica, diuturna lecto affixo, Senectus valerdinaria, quin & alia multa pathemata, post labem insignem cerebro & nervolo generi prius allatam, Paralyfin demum accerunt: At vero hic morbus frequentius quibuidam aliis affectibus, aut cerebri, uti imprimis Caro & Apoplexia: aut Nervosi generis, quales praecipui sunt Scorbutus, Convulsio, Colica, & Arthritis supervenit: Quod ad Paralyseos habitusalia causas evidentes spectat, neque ob quas *sempiternae*, five occasiones, in hunc morbum dispositi, etiam citius conestabant, aut jamjam eo correpit, adhuc gravius plecti solent, dico hac facere quatenus languinem plus viliant: Item quae cerebrum & appendicem ejus nervum opplent, aut materiem morbilicam in ea suffusiones concitant, quae insuper spiritibus narcolini insiliunt, aut eorum copias minuunt: In hoc censu primo occurrunt insiduationes in sex non naturalibus &c.

Attaque dolorem Abdominis] Affectiōi Colicæ cerebro & gravius obnoxii, demum Paralytici evadunt: talis adeo frequens apud Anglos ut morbi hujus successio inter illius prognostica habetur: nam qui

continuum in ventre, aut paroxysmos atrociores per intervalla redeuntes pati solent, aut doloribus circa abdominis viscera paulò atrocioribus fere continue molestantur, tandem in habitum corporis ac membris dolores vagos, & deinde postea stupores, & demique non raro *anæsthesia* five resolutiones inbeunt: Hujusmodi effectus, causa, tam à morbi sede, cum à materiei morbilicae immutatis procedit: Hæc nimirum quæ periculis, sed acris & irritativa, nervos tantum splanchnicos incurbar, proindeque ob viscerum fibrarum vellicatas in iis spasmos & dolores ciebat, postea copiosior, simulque hebetior & narcotica evadens, per spinalem medullam depluit, atque nervos his aut illis membris, aut muscularum destitutos subiens, in partibus respectivis resolutiones parit. *Willel. cap. de Paralyfi.*

Materie universalis post Paralyfi] Quia materies morbilica intra cerebri & appendicis ejus tractus, tum medullares tum nervos continue admittit, & cerebro explota, tandem eos ita debilitat & dilatat, ut aliismodi particulis, five narcoticis, five virtutibus, aditus pateat. Sed præterea adnotandum affectiōni Arthriticæ non raro Paralyfin supervenire, ejusque tacto pari: Nam si quidem in agitudine ista materiem morbilicam binam esse, nique particulas salias & quasi laxivales per arterias deponi, nisi acetosâ aliâ per nervos accedere supponimus, nihil mirum est si demum aliismodi particula per vias adeo sitas se committat addam, & tandem per angustos spirituum mentis aut implendo aut comprimendo obstruant. *Id. ib.*

OBSERVATIO III.

§. *Motus impotentia à fero in fistulam sacram illapso, totum cerebrum & cerebellum occupante.*

Jacobus Spoerlein septuagenarius, staturæ proceræ, pallidus, gracilis, robustus; Victor; in laboribus assiduus, industria eeleritateque in opera & dexteritate nulli secundus, nec facile cuiquam jam senex cedens: Mercaturam aliquandiu exercuit, spiritum vini aliaque in castris divendit, & hujus causa pericula crebro subit, variasque rempessatum injurias in itineribus frequentissimis passus est: Ante plures annos ad carceres perpetuos condemnatus fuit; in quibus tenebris & squallore terrificis ultra 12. annos vixit, tandem libertati restitutus in Nosodochium receptus fuit: Huc perveniens totus Cachecticus erat, facies & labia pallebant, pedes œdemate tumeabant, omnes artus languebant: Tibia dextra ulcere dysepuloto afficiebatur, quod ichorem flavum acerrimum copiosumque continuo cum summo dolore stillavit, ut plures noctes insomnes duxerit: quandoque etiam sanguinem sincerum profuderat: quamprimum emplastri sine morfu siccantis usum intermiserat, serpebat ac profundius reddebatur: Fonticulus in tibie parte externa interepronis causa excitatus, ad ulceris consolidationem non exiguum opem tulit, sed non fidam, nam sepe recruduit: Postquam liberiore aëre cibis salubrioribus & medicamentis congruis fruebatur, sensum Cachexia & pedum œdema evanuerunt, ac strenue pristinos labores adit: Paulò post adventum ipsius in Nosodochium, scilicet mense Augusto 1696. Ischuria omnimoda cum alvi oclusionione per integrum octiduum ægrotavit, utrumque symptomata, inprimis alvi constipationem occultans: Postquam elystrum emollientem injiciendum curaveram, pluribus scybals, summopere induratis excretis, protinus urina effluxit copiose, atque in posterum nihil amplius hujus generis passus est: Urina clara erat, nihil fabulosa, vel arenosa, vel mucosa subsidit, nec memini ipsum unquam calculum excrevisse, quamvis de dolore saepe circa regionem renum & lumborum conquestus fuerit, qui non raro alterutram coarum pertingebant: Quandiu in Nosodochio vixit, et bis salubrioribus frui poterat, cum talis effretis suppeditetur, & à nocuis Vir prudens & longævitas studiosus abstineret; Saepe omnem cibum, in primis carnes fastidivit; saepe etiam nec vinum sapuit, non raro amarore quodam omnia imbuta videbantur quæ assumpserat; crebro mane jejuno stomacho aquea, quandoque meram bilem non sine violentia evomit: Alvo suppressa protinus colica torquebatur, quam bis intra novem circiter

circiter annos *Parefis brachiorum sequuta est* : eandem quoque antequam huc pervenerat aliquoties post colicam expertus est, ob quam minimi & auriculares *digiti in manibus incurvi* permanferunt, ut quamvis flectere, tamen extendere nequiebat : *A Parefi* ab Excel. D. D. Hardero, cum à me, non magno medicamentorum apparatu vindicatus fuit : Diarrhoeam biliofam iteratis vicibus non incommode sustinuit : Fere perpetuo de dolore quodam compressivo & tenfivo præcordium conquerebatur : Assidue quoque *caput doluit*, comite nonnunquam vertigine : Hemorrhagiæ narium frequenter obnoxius fuit, quæ non raro profusissima erat : Anno vitæ ultimo, mane inprimis, tussire cœpit & purulenta expuit : Paucis septimanis ante obitum conquestus est de cararrho *mane* imperuose ad pectus ruente & suffocationem intentante : Ultimis mensibus sevisimum dolorem perpeffus est in utroque interfemineo, ut attactum minime perfere potuerit : Incipiebat ab osse pubis ac definebat in medio femoris, ductum musculi tricipitis sequens : In loco dolente nullus tumor, præter paucos quosdam & exiguos ac concolores cutis nodos, nullus rubor videbatur : Paulò ante obitum loquebatur, & *corpus præ languore & impotentia immobile*, verti petierat, quamvis nondum omnis motus animalis perierat.

Die 10. Maji 1677. cadaver cum Excel. D. D. Hardero apertui. Dissectis integumentis lmi ventris, ventriculus & intestina sanis similia apparuerunt : Pancreas & mesenterii glandulæ duriusculæ, sed non tumidiore crant : Ductus Pancreatis vacuus : Hepar fuit legitime magnitudinis, debito mollius, pallidum, & tantum non cruoris expers, si venæ majores excipiantur : Bilis in ductibus choledochis vitellina redundavit, pressioque parenchymate copiose profluxit : Vesicula foris albicans simili bile flava implebatur, simulque continuit calculum magnitudine nucis moscharæ : Lien fuit lividus, major debito, mollis & divitiis, naturali similis : Rens crant pallidi : unius carunculæ papillaris extremo apici exiguum lapilli frustulum immerfum fuerat ; cætera nec vestigium arenularum ullibi apparuit : Vesica nihil p. n. continuit : Pectore recluso, pulmonum lobos superiores utrinque, maxime sinistru, acerosos invenimus : ambo subduri & compacti erant, nondum tamen ad illam duritiem pervenerant quam alias in plurihifcis observavi : In cordis ventriculis corpora pituitosa parva, nec longe pet quatuor fontes propagata, ac firmiter suis radicibus thalamorum anfractibus immerfa & connata invenimus : In Pericardio plurimum feri flavi continebatur : In cavo pectoris serum subcreuentum copiose redundavit : Remota cranii ossa, ac disciffa dura meninge, plurimum feri subpallidi effluxit, quod in spatio inter utramque meningem continebatur, sed non in tanta copia quanta apud Jacobum Reutingerum videram (*Obs. 47. f. 2.*) nam interstitium angustius erat : Tota anfractuum superficies quasi gelatina operta fuit, qua cultello sauciata aqua exstillavit : Huius feri quoque plurimum in omnibus ventriculis repertum à nobis fuit : Plexus choroideus palluit, ac exsanguis propemodum erat : In illo manifeste glandulas, sed luridas cænosasque vidimus ac duriusculas tetigimus : Cerebri consentientia mollis quidem & flaccida fuit ; minus tamen quam apud prædictum Reutingerum, nec collapsam aut coarctatam & compressam observaveram : *Multum* quoque *feri* reclinato pectore *ex offio magno occipitis* ptomanavit.

S C H O L I A.

DUm in vivis erat Victor, plurima symptomata experiebatur quæ principium nervorum graviter ætlicum sæpe fuisse significabant, inter quæ præcipua sunt *Parefis* colicam bis sequens, nb quam duo auriculares *digiti ad extremam vitæ immobiles* & incurvi persistebant : *Cephalæ* continuo assilgens, quam nonnunquam vertigo comitabatur, unde per plures annos impetibus apoplexiæ subitum insulsum luminepete timuit : Impotentia corpus versandi circa ultimos vitæ articulos : In cadavere vero nò pauca occurrerant quæ ad causam Apopl. proximam illustrandam plurimum faciunt : nam apertam evadat ad apoplexiæ productionem serum in spatio inter meninges, in ventriculis, inter anfractus sub tenui meninge, atque io situla sacra, non parva quantitate stagnans, suisque incumbens ocutumque sufficere, nisi ad illam copiam perveniat quæ cerebrum comprimat, atque ita coarctet ut spiritibus animalibus nimis exitus præcludatur. Antequam autem carceri mancipatus fuisset, nunquam, vel certe non periculose egrotavit, semper robur & industriam suam nobis depradicans,

nb quæ omnia tædia facile superaverit : Postquam carceri inclusus, & eo pluitibus annis detentus fuit, tormacim ipsum morbi invaserunt, quorum causam præcipue morori & exercitiorum consuetum intermissum adtribebatur, nam laute alebatur, nec unquam vinum subtraherebatur : Plerique affectus quos dum nobiscum vivebat, à sero seu lymphæ redundante pendebant : Primum enim postquam libertate donatus fuit Cachexia, vel principio potius hydrops afflictebatur, cum ulcere tibie dextræ dyspnoico : Sero superfluo, nb ulcus perpetuo manans, maximam partem exhausto ; illu intuper paucis medicamentis propinatis amplius evacuat, cachexia imminuebatur, hydrops periculum evasit, & cum labores, ad quos semper anhelavit, soliti more suscipere & perficere ad lubrum valuit, reliquos penitus iussit.

Tibie ulcere dyspnoia afflictebatur : Ulcus dyspnoion diu perillu, & quamvis subinde occluderetur, brevi tamen aliquoties recrudescerebatur, non nb pinguedinem sub cuti consumptam, quam teclidivantium ulcerum causam quidam reputant, cum non

raro cum pinguedine flectione, ambofione, aut gangrena penitus lobulata, ulcus simillima circatrice nihilominus obducentur; verum ob continuam feni abundantioris affusum ex vasis, five sanguiferis, five lymphaticis crosis: nam postquam fero per fonticulum in tibia alibi exiens paratus fuit, ad extremum vitæ consolidari manfit. Forte tamen quia non fufficeret per fonticulum ejus copia exhauriebatur, alibi postea ferum flagnavit: nam non raro observatum fuit ulcerum hujusmodi, si impetris annus fuerit, intemptive oculorum damna in caput & pedes redundasse: Serum, hujus ulceris causa & fomes, accensum fuit, nam serua dolores dia nocturnos excitavit, & nisi edulcorabatur sine moria siccatibus, carnem in fundo & cutim vicinam inflat ceterosive depalcebat.

De dolore circa regionem Lumborum &c. Oito à fero in fillula dorsali stagnante, nam ferum malum ex otio magno offis occipitis promanavit.

Affidua caput dolus amine nonnunquam vertigine Cephalæ illa onum duxit à fero meningibus laigius affuso, *Vide Tract. 1. de capite dolere.*

Cerebra aqua eromunt &c. Vomitus matutinus aqueus soboles fuit feri redundantis in massa sanguinea: *Vide de hoc vomitu lib. 3. Tract. de vomitu.*

Prævi in plethorâ phibitus &c. Phibitus que victorem tandem prostravit, fero xxi & moridaci etiam suam originem aliquomodo debere videtur. *Vide lib. 2. Tract. de Phibitu.*

Conquefus est de catarrho &c. Catarrhus suffocativus quandoque mortem intenuit, quoque fero aut lymphæ tabuendas, five fois nervos diaphragmatis & pulmonum paralyti quadam affecerit; five impetuose, quod æger sibi persuadbat, catarrhus in pulmonem intravit, utriusque enim invasionis rationes apparuerunt: Influxum se ferre æger dicebat: Genus nervosum undique fero perfusum sectio manifestum fecit.

Servissimum dolorem in utroque interfemine Latex spinæ inclitus aliofium defcebat, atque ultimo anno dolores in interfemine cum nodis concoloribus peperit: Accius autem letum apud senem illum evasis, non ob errores in vita, nam neque valde fastidia, neque aromacibus impetie delictabat, sed ob particularum salinum excretionem cum iero impeditam, non tam tenum, qui ambo tant etiam, quam aliarum glandularum excretio la, un culpa, que induræ nullas vel exiguas suppetias in sanguine deputando remittens consulunt.

Bile induratum cholelithi &c. Porti cholelithi tam per universum hepatis dispersi Bile vitellina referti erant, que pressio fois Epate ex ductu bilario emanavit: Eadem vesicula bilaria impleta erat, nam illam ex pori bilarii ramulis bilem accipere quidam solent indagare invennerunt: Ipsemet casu non ita peidem ramulum poricum istorum prope collum vesicæ bilariæ oblique intenuit, veterem vesicæ quinarie mote implantatum repetit, qua ratione ingressus facilitatur, tegiculus vero penitus impeditur: Dum enim h. par bubulum persequabatur, in omnibus ramis pori bilarii vermium, quos hirudines vocant, quamvis vulgo nodis proteris dissimiles sunt, congeries occurrunt: nullis proteris in vena portæ & cave ramis apparentibus: Vesica bilaria secundum longiitudinem incisa, plures quoque bili insistentes vidi: Evacuata bile prope collum vesiculæ, ubi epaci accretum est, caput vermiculi prominuit, quem dum blande extraxi, integrum foramen satis parvum perficit, ac stylo indito in cavitatem manifestam perveni: Cae-

te remoto hepatis parenchymate, deprehendi cavitatem hanc esse ianum pori bilarii, cuiusdam à vicino poro majore: traducto stylo utique ad majorem ramum, rursusque venas collum adactas, manifeste vidi intensionem proteris uterum in vesicam similem esse, que forsan causa est quomobrem hæcenus de bilis in vesicula generatione & collectione scriptor ex sententiis diversis & ambigui fuerint: Bili apud Viotorem copiosior & flavior producta fuit, ex sanguine per ramos portæ melecercicos, gallicos & splenicis allato, & ob febrem letam magis adulto.

Vesicula fons albus &c. Albicans apparuit quamvis bili vitellina pleoa esset, quia ejus viscidæ crassior debito erat, ut bili color transperere nequirit, quod alias fit si li-gissima consistens prædita sit: crassius autem dedit calculus nocio multatam magnitudine, cum lecus ac a calculo vesica animatus, ob continuam attritum sæpe quadruplo crassior evadit: Idem calculus causa erat doloris à longo tempore circa præcordia gravantis, & tenivi, cum in venterulo circa pylorum, & in duodeno nullum vicium animadversum fuerit: Idertum oco effecit, quia ex poro bilario ad ductum in duodenum hianteram, nullum obitaculum invenimus, nec forte calculus globosus majusculus, & levis penitus, haud contine collum vesiculæ obtinavit.

Hepar pallidum &c. Pallidius erat ob sanguinis paupertatem in vasis sanguiferis, nam fibris multum depalcebat, & ob inappetentiam consumptus non restituebatur: imò plurius mensibus tota jussula vitam tolerabat.

In Cordis ventriculis corpora pumosa Ea corpora non erant mocus, demum post obitum concitius, qualis in superficie sanguinis V. S. emissi apud cachecticos & feblicantes, pulsum resigit, alias videtur, qui sæpe crassus & foie membranae instat tenuissimus est: non enim sanguinis superficiem corpora hæc optinebant, Generata fuerunt ob cordis debilitatem &c. *Vide lib. 3. Tit. de Cachexia.*

In Pericardio plurimum feri &c. Secus ac apud hæcticos hic colligi posse vulgo paratur: mareriam aqæ præbuit abunde ferolis colluvies massæ sanguinæ. Cumulabatur procladibus ob glandulas induratas, æquolum non amplius relobentes: vix enim pancreatis, mesenterii, plexusque choroidæ glandulis durisculis, pericardii glandule ab hoc vicio immunes esse poterunt: quod eo lubentius credo, quia caloi hæcticus aquam non consumpit, neque etiam valeat, quamvis enim in aortam tempore dilulvisset, non tamen corrumpit, quia densitas pericardii obstitit: Non memini unquam Viotorem de cordis palpiatione conqueffum fuisse, quam tamen corpora pumosa, & aqua in pericardio redundans excitare solent, quod forte ideo factum fuit, quia longo tempore decubit, & ob quierem placidius sanguis cor tranlit: Sicuti quotidie observamus cachecticis cor, si tranquilli maneat, raro palpiare: à motu veto, maxime in acclivium alcentio, fortiter subsultare.

Æstus utrimoda A solis cybalis dotis incestinum rectum, intestinum rectum implemibus, & collum vesicæ in publica parte prementibus.

Cerebrum tenui parat &c. Cerebri motum sensum magis magisque elangit, tandem plane subitit, spiritibus animalibus ad onum hunc necessariis deficietibus, propter spirituum vitalium & sanguinis penuriam, & principio nervorum, scil. cerebro ac cerebello, ab ingenti ferri intra cavitatem illuvie non impune diu afflicto:

Paralyſis brachiorum ſequens eſt] Paralyſis colicæ ſuper-
veniens genus nervorum valde affligit indigubas
Equidem bile Vitor abundabat, verum quoque hu-
moribus ſerofis acribus ſcætebat, qui plenus nervoſos
meſenterii aluentes, proſtridiusque ſe inſinuant,
vellicando ſpaſmo interſtina affecerunt: ex alvo perti-
naciter oculoſo, retenta flacibus & bile, atrociffima
ſortina excitatur; quomiam quoque ob dolores
die noctuque excruciantes, vigilique continuis,
ſimul adius ſquolo lartici ad medullam ſubtan-
tiam, in cervice inprimis, paratus fuit.

Quamvis nondum omnis motus animalis perierat] Im-
potentia, ob quam corpus de latere in lucus vertitur
nequit, non imputanda videtur ſoli ſpirituum vita-
lium defectui, quamvis febris lenta, phthiſis comes,
plurimum eorum conſumpſerit; nam quia in toto
habitu æqualiter aut eæterum vias fere celebat, ad-
huc inſufficit; Forſan inſuper ſpiritus animales
muſculis non debita quantitate, & ad hunc motum
requiſita, ſuppediabantur, ob principium nervo-
rum undique à tero inundatum, quæ irradiatio-
nem immittit, non tamen ſatellit, nam adhuc mo-
tus aliquis cum ſenſu in artubus ſupererat & loque-
batur.

Paralyſis brachiorum ſequens eſt &c.] Varii affectus
quos ſubſequitur Paralyſis in hoc efforæ ſene, vero
ſimilem ſcedunt Exctil. Willigii ſenectiam, Eam
non minus à ſpirituum inopia aut vitio, quam Ner-
vorum ortum daviſe; Cacoehymia enim multiplex,
tam ætaris decarſa, quam externarum cauſarum effi-
cacia congeſta, inepiam ſpirituum animalium genera-
tioni maritiam, & quæ paucam ſubſtantiam
fuiſſe oſtendit: De Paralyſi à ſimili cauſa producta
hæc tradit Vit Excellent. cap. de Paralyſi. Quod ſu-
perius in Apoplexia, ita modo in Paralyſi, aut
ſtatueri vſum eſt, particula hæc hæud tantum op-
pilativa, ſed interdum narcotica ſpirituum velut
extinctas eſſe, cuſuſmodi afficiendi ratio, ſi poten-
tior fuerit, nonnquam ſine magna viarum obſtru-
ctione ſymptoma paralytica accipit: Halitus An-
timoni, Mercurii & Anipigmenti, quibaruſ inter
Chymicarum & metallorum fornaces diu verſatis,
membris debilitatis, tremores & ſæpe reſolu-
tiones inducunt: Pariet opinari ſubſt in quibus-
dam Scorbuticis & valde cacoehymicis particulas he-
terogeneas, ac, ut vident, indolis vinolice (cere-
bro & appendice medullari ſuperatis) ductus ner-
veos una cum ſucco eorum inſipio ſubire, in liſque
ſpirituum manipulos quosdam deſicere, aut à motu
ſupprimere; Hinc ſuſpores aut reſolutiones in
membris aut muſculis, modo his, modo illis ſubito
oriuntur, & brevi poſtea in uno loco evaneſcentes,
ſubinde repullant in alio: Tandem veto cum
ejuſmodi particula copia ingenti in nervo ſuffula,
& accrevit aggeſta, hic illic varie deſignant, ſpi-
rituum inſuper vias præcludunt, adeoque Paralyſim
fixam & permanentem inducunt: Eſt & Paralyſis
ſpecies à ſpirituum inopia & paucitate dependens, in
qua eſt motus nulli parti aut membro proſus d. ſi-
clic, à quibusque tamen nonnulli debilitati tantum,
aut depravate prægriat: Nimium affligi, æſt
licet immanes, membra tamen forſit movere, aut
pondus aliquod ſuſſerre nequeunt: Inſuper in ſinu
quovis motivo artuum tremore laborant, qui tan-
tum debilitatis, & roboris præſtiti in potentia mo-
tiva effectus eſt: Cum enim deſiciunt vires pro
membro quopiam firmiores & uo molimine atol-
tendo, natura vacillans conatu ſæpius repetito agit,
proindeque paſ in motu exiſtens velut conſorti &

trepidare cogitur: Cui accedit quod cum ſubire ner-
veæ ſtaccolentes nixum tonicum, ſeu tenſitatem in
regimine animali ſuſtinere nequeunt, iſte ulſimum
ſuum potentiam exerceo annicines, motus quali ſpa-
ſmodicos ineant eoſque perpoſuo iterant; Quæro
in nonnullis Paralyticis artuum omnium tremores
& conſulſiones ſemper perſiſtunt: Qui ad hunc
modum & ſpirituum animalium paucitate, ſive inop-
ia, proindeque ab illorum in ſyſtema nervorum
diſpenſatione parciore & diminuta Paſtyelici evadunt,
tali affectui propter varias cauſas & occaſiones ob-
noſi ſunt.

Primo Senectus extrema; ſeu valitudinaria; inem
ſanguinis aut humoris genitalia impendia immittit,
diatheſis ejuſmodi paralyticam plerique hominibus
inducunt; quætuſ nimirum & ſanguine efficit &
pene vaſpido, ſpirituum animalium penus nonnulli
perexiguus in cerebrum caſtallatur.

Secundo, ob eandem ſere rationem Scorbuticis
valde & cacoehymicis facultas motiva plurimum
vacillat: namque tales exercitio cuſvis imparis ſor-
tiori, inſieme ac imbecille gradiuntur; à deambulatio-
ne longiori aut citiori paulo plurimum delaſ-
ſantur; Porro à nixu quovis graviſſe ſæpe ſuſpo-
tem in artubus cum movendi impotentia paſiuntur.
Quandoquidem enim his maſſa ſanguinea valde
æquola & impuritatibus reſecta caſtit, cumque cere-
brum debilius & quoad poros ſarum ſaculentia
quavſ in ſe facile admittit, propterea ſpiritus anima-
les procioreſ tantum procreari, illique hæud ſinceri
& ſubiles, verum hebetes & craſſiores materie ad-
haſione impediti (quamvis non ſemper adſe viarum
obſtructioni aut diatheſi narcotica) ſe in nixus moti-
vos explicari nequeunt.

Tertio, non tantum Scorbuticis, ſed & plerique
alii à morbo chronico ægre ac tarde convaleſcentibus,
artuum languore & membris à debito vigore aut ro-
bore plurimum reſoluſis, aſſiſiuntur, ut cum ſtoma-
cho valeant, eorumque pulſus & urina laudabiliter
habeant, ipſi tamen quali nervos & clumbeſ, motus
locales viæ ac ne viæ ſtare audeant, ac inſitos hæud di-
perſigunt: Quinimo nonnulli abſque ægotatio-
ne notabili, longo tempore prope diem quali mori-
bundi lecto aſſiguntur: dum imperturbati recom-
bunt, cum amicis colloquuntur & ſalaces degunt,
exiſtenti autem vel incedere nec volunt nec ſolent;
imo motum quovis quali horrendum quiddam
quali averſant: Proculdubio in his, eſt ſpiritus
animales totum genus nervorum quodammodo
aduant & iradunt, aumen eorum copie in tenes
& minus conferre caſiunt, ut cum plures ſpiritus
alicubi ad motum in ipſam agglomerari debeant;
magnum ſit periculum ne ſtatim in vicinis combuſ-
torum abruptum, proinde in partibus nervoſis
tenſuras ſolvatur, quapropter cum ſpiritus cerebri
eolce aliorum, in membris diſpoſitorum, debilo aut
conſil ſunt, ipſi motum localem, ſiquidem difficile
nimis perſum, locis ſuis impoſere regulare: quæ-
obrem affecti viæ uſſa perſeſione ducuntur experit
utrum incedere poſſunt necne; Verum tamen qui
ſpirituum inopia laborantes, eos quoad poſſunt in
motus locales urgebant, mane pſimum enaciati ſi-
miser gradi, brachia hæc illic jactare, aut pondus at-
tollere valent: ante meridiem vero ſpirituum qui in
muſculos inſuſtinent peno ſere abſumpto, viæ ma-
num aut pedem movere poſſunt: Caro jam ſemi-
uſſa, quæ per plures annos hujusmodi ſpacia paraly-
ſim, non tantum in membris, ſed & in lingua ſuit ob-
noſia; hæc per tempus quoddam expreſſa loqui-
tur;

tur, post sectiones tamen longos illico obmutescens, amplius ne quid proloqui potest; porro nec citi post horam unam aut alteram vocis usum ullam recuperat: In huiusmodi *Paralyfi*, à spirituum animalium defectu & debilitate potius quam obstructione oriunda, suspicari licet non modo ipsos spiritus, quoad ipsorum primas copias & particulas originales, in vicio esse, sed insuper aliquando motus localis imbecillitatem & impotentiam, aliquatenus etiam à copula explosiva, ubique in fibras motrices è sanguine suffusa, vicio pendere: Enimvero è sanguine valde cacochymico, proinde rapido & effuso, sicut spiritus animales nonnulli pauciores cerebro suffillantur, ita probabile est ipsos è cerebro in nervos derivari, & demum intra fibras musculosas dispositis, particulas alias nitrofoliiferas (quas ad motum muscularem requirit alibi ostendimus) è sanguine ita viscido nonnulli hebetes, & à potentia elastica degeneres accedere, propterea quidem ut à spiritibus itera muculos ita perperam concretis, non secus ac à pulvere pyro faculentis crassioribus repleto, explosionem ædas & rarius & debilius exerantur *Idem cap. de Paralyfi*.

Multum fieri ex officio magno cupit promaneri] Post corpora istia, proxima causæ morbificæ sedes sunt medulla oblongata & spinalis: Etiam in his quandoque, licet rarius, obstructio, sæpius tamen compressio, aut unitatis solutio Paralytin excitare:

Quoad prius, hæc probabile est marciæ morbificæ copiam, simul & confertim in hac illarum partem à cerebro dimitti: talis namque iogene & lubitus affluxus, vix ultra corpus striatum peringit: Attamen suspicari fas est particulas narcoticas, aut alias infusas, continenter in cerebrum suffulas, & exinde in appendicem ejus proterulas, intra caudicis medullaris sparium angustius primo hædere, & dein sensum coarctatas obstructionem Paralyticam inserere: Particulæ illæ dum sparium in cerebro, corpore calloso, aut striato feruntur, gybras vertigines & scotomias, ac in panibus molivis breves interdum spasmos cient, verum illæ sensum intra medullæ oblongatæ, aut spinalis caudicem in unam aggestæ, quatenus ductum ejus totum aut partem occupant, & proinde spirituum poros simul omnes, vel eorum series quidam obstruunt, aut hemiplegiam, sive membrorum quorundam, scilicet, modo superiorum, modo inferiorum Resolutiones patiunt: In utraque autem medulla, ac præsertim spinali, spirituum interceptio, sive inhibito paralytin creans, sæpius propter compressionem, aut contritum solutionem evenit: Sanguis extravasatus, aut sanies abcessu disrupto emanans, forsan & serosa colluvies intra cavitatem spinæ deposita, Quin & Tumor scirrhosus alicubi in ea excitatus, sanem medullarem comprimendo, spirituum vias occludit: *Idem*.

OBSERVATIO IV.

Hemiplegia à mollitie & flacciditate cerebelli, sero plurimo in sacra fistula, quam medulla non adimplebat &c.

VRsula Aberling, virgo 23. annorum plethorica, staturæ mediocris, carnosa, robusta, sumula, ætate 1667. semel magnam graminum farragine ac pondere gravem capite gestatam ex agro domum deportavit: Sub hoc onere sensit manifeste aliquid intra cranium ruptum fuisse: Paulò post cibaria, cum suppellectili capiti imposita, ad messorum in loca montana vicina detulit: cum ab hoc onere summo per gravabatur ut sibi sub illo occumbendum putaverit, nemoque præsto esset qui ipsam hoc onere levasset, magna contentione etiam per accliviam ad locum destinatum properavit, unde denuo fragorem intra cranium editum animadvertit, Ab illo tempore minus urinam detinere valuit: nihilominus officia servilia solito more præstitit, strenua alias nec ob patrem duriorum labores fugiens, nec unquam de ullo alio symptomate conquirens: Menses semper rite fluxerunt: die 22. Decembr. 1667. nihil mali præsentiens ad templum ita cucurrit ut inde incaluerit: in templo perfrigeratur, mox animadvertit se pedi sinistro non posse firmiter insistere, unde in genua decubuit, vix inclinato corpore, nisi à vicina sustentata fuisset: Totum sinistrum latus motu & sensu privabatur; labia torquebantur, ac *maxilla inferior dextrorsum abripiebatur*: primum loquebatur ut intelligi puerit, paulo post vero zgerime: Altantes leipothymiam morbum ratæ, quamvis vividum faciei colorem non amiserit, ipsam frigida large conspergunt: Hemiplegica domum deportata per dies 14. deliravit: Conqueriebatur de *scinipiti dolore* (sevisimo, quasi summa vi sursum capilli ibidem raperentur continue: Oculis quoque *dexter intensissime doluit*, ac videbatur ipsi ac si exorbita evelleretur: In sinistro latere toto hemiplegico, neque in capite neque alibi, præter motus ablationem, nec vel minimam molestiam experiebatur: Primis diebus creberrime & copiose mingere cogebatur, nunquam tamen lectum perminxit: Cephalalgia diu continue afflixit atque hanc unice causabatur; Medicamenta nulla præter aquas quoddam cephalicas pauperculæ exhibita fuerant: Die 18. Febr. ad ipsam vocabatur, scilicet post octavam septimanam ab insultu hemiplegico: Tunc temporis carnosa & bene colorata fuit: Os non amplius distorquebatur, loquebatur sana & expedite, non multum de capitis dolore conqueriebatur: brachium sinistrum movere sua sponte nequit, at uno alterove digito incurvo fortius à me compresso brachium aliquantulum

attraxerat:

attractat. Pedi sinistro aliquandiu insisteret, verum antrosum ipsum promovere nequii: Tum brachium tum pes sinister sæpe motu quodam convulsivo succutiebantur: Appetit & cætera satis bene habuit: menses quoque statò tempore ceu sanæ huc usque legitime manarunt: Suasi tunc temporis decoctum rorismarini aliatumque herbarum cephalicarum; purgantia pes vices fumenda & linimentum nervinum, imperata simul congrua victus ratione: His aliquandiu sed non satis sollicitè continuatis, sensim viribus pedi sinistro redeuntibus, scipione suffulta in publicum prodiit tota æstate, templum quoque frequentavit, Subinde tamen cephalalgia recrudit, quæ à vini potu exacerbabatur, tota itaque æstate aquam aut serum lactis caprini bibit: Frigida præ calefactis unice appetebat, unde tota æstate acetariis, frustibus crudis & lacticiis profuse vescabatur. Sæpe toto die nonnisi mane iusculum comedit: Mense Aug. 1668. mane è lectò surrectura sensit motum animalem denuo languescere, simulque querebatur de dolore in planta pedis dextri alias sani, ob quem nunquam diù posthæc nudo, & non prius lintheaminibus probe involuto pedi insisteret audebat, doloris rationem ipsamet effari nequibat: Rediit quoque tum ante, tum post novum hunc insulsum Cephalalgia, præcipue dextram capitii partem occupans, & nunc occiput, nunc Synciput, nunc tempus, nunc frontem misere ex cruciavit; quandoque præ dolore exclamavit abscessum intus sub syncipite latere, imò jam exitum parare; unde quoque non raro ut ille opè Chirurgica maturaretur expetit. Tunc quoque de verigine querebatur, ob quam pronam se casuram videbatur: huiusque scdém dextram potius partem dicebat, cum cerebrum præcipue turbari ibidem sentiret. Incedebat nihilominus subinde, ac brachium sinistram paralyticum tam ponderosum aiebat sæpius fieri ut casum timeret, pondere corpus antrosum trahente: Hymne adventante, tum ob frigidorum abusum, tum ob vitam sedentariam, tum denique ob medicamentorum neglectum, sensim pedes cedematosis facti fuerunt ac intumuit abdomen. Mense Janvar. 1669. primum menses substituerunt: Subinde catarrhi ad pectus ruebant, respirationem difficilem reddebant & tussim excitabant, qua aliquoties sanguinem concretum fabæ magnitudine excrevit, alias cessante catarrho libere respiravit, commodèque decubuit, humilior certe quam cæteri hydro-pici: Hydrops in dies incrementa sumpsit, abdomine prætumido & cedemate etiam lumbos occupante: Doluit summo opere pes dexter: Die 23. Mart. 1669. ipsam moribundam conveni; præter pedes, abdomen, lumbos, brachium quoque sinistram admodum intumuerat: Facies erat Hippocratica, extema frigida, lingua arida, pulsus summe debilis, In pedibus maculæ rubræ appaebant; in dextra tibia gangræna in procinctu erat: delirabat per aliquot dies, ante obitum ad mentem rediit: Semper & ad ultimum usque halitum accurate vidit & acute audivit: Die 24. Martii 1669. mortua est.

XXV. Martii cadaveris apertionem prece & pretio obtinui. Ante apertionem in cadavere observavi maculas in tibis latiores & lividas evasisse: alicubi vesicas amplas sero turgidas emersisse, quibusdam in locis ex poris serum exsudasse, abdomen subsidisse, ex ore humorem viscidum subflavum copiose emanasse: Cuti capillata discussam incisam, tum ex vasis capillaribus sancus, tum ex cranio ipso denudato exstillavit sanguis ichorosus, fluidus, omnibus fibris destitutus, nec in grumos concrevens: Olla ablata, integra dura meninge copiosius serum occurrit: Corpore falciformi à crista galli resecto ac retrorsum flexo, superficies cerebri ubique ceu gelatina flava transparente tegebatur, illaque alias anfractuosa, plena & lævis conspicebatur. Sauciata tenui meninge exstillavit copiose serum flavum, tenue, admodum fluxile: Cerebri portione ad ventriculū dextrum usque ablata, protinus ex illo exiliit aqua turbida, dilatato amplius hoc ventriculo occutit abscessus ovi gallinacei magnitudine, peculiari tunica, crassitie pennæ columbinæ vestitus, cujus oppositum latus versus tempus dextrum exporrigebatur, Inciso hoc folliculo, aqua turbida subfusca effudit, qua evacuata cerebri superficies in fundo & ad latera inæqualis, & quasi excisa & exulcerata apparuit: nam deterio in fundo muco subsidente, manifeste cerebri portunculæ promulæ & lacertæ videbantur, In folliculo hoc nullibi foramen nec premedando ante incisionem, nec postea reperiri potui. In sinistro ventriculo, ut & tertio quoque aquam, sed pauciorē & limpidam inveni, unde conieci dextrum duos folliculos recondidisse, quorum primus incaute incisus fuerat: Plexus choroideus utrinque glandulis plurimis, minutissimis, albescentibus & pellucidis testetur erat: In toto reliquo cerebro nullum vitium animadverti: In basi quidem sinistra pars mollior primum videbatur, verum posteaquam ipsam cum dextra contuli, discrimen admodum exiguum deprehendi. Cerebellum mollius & flaccidius cerebro fuit. Cerebro & cerebello à Calvaria exemptis, recisa medulla spinali, ex orificio calvarie amplo plurimum feri subcruenti effluxit, simulque observavi ostii istius spatium multo amplius fuisse quam ut à medulla impleteretur: Vidi medullam hinc inde manantibus quibusdam fibris alligatam

Bb

quidem,

quidem, sed nihilominus humoribus descensum concedere: Ex medullæ incisæ superficie guttulæ sanguineæ exsudabant, quæ alias firma & nitida erat, sinistra tamen pars dextra minor videbatur. Quicquid sanguinis intra cranium stagnaverat, fluidum mansit nec in grumos concrevit: Imo ventre aperto aqua citrina effluxit, sed præter expectationem quantitate minor: Ventriculus & intestina, tum tenuia tum crassa, flatibus turgidissima erant: crassa ab excrementis vacua: Hepatis superficies livida, inæqualis, ceu corpus ex plurimis glandulis conglomeratis apparuit, mole vastum: Lien non erat naturali major, mollis, lividus, Glandulæ mesenterii & Pancreatis admodum duras compertii: videbatur Pancreas esse corpus ex multis glandulis conglomeratum; ejus Ductus vacuus erat. Uterus ejusque testiculi minores quam alias in hac ætate inveneram: Nullibi sanguis concrevit: Pectus, quia alio vocabatur, nec multum de Pectoris morbis conquerebatur, non aperui.

S C H O L I A.

Sensit aliquid intra cranium ruptum fuisse) Onerum graviorem gestatio in capite Abicellibus, seu Tumoribus cum folliculo in ventriculo dextro sensim præbuisse videtur, nam prima vice aliquid rumpi, altera fragorem sensim manifeste, quæ indicio sunt ob maximum nitum tenuem meningem iura ventriculum dextrum, à medulla quam obcecerat, jam tum avulsam fuisse: Aurium enim instrumenta quidpiam passa fuisse neutiquam credibile est, quia ad extremum viræ acutè audit, neque in reliquo toto cerebro quidpiam visum fuit, cui fragor & sensus ruptionis adscribi potuisset, præterquam in hoc ventriculo: & omnino medullam cerebri tunc temporis afflictam fuisse testatur utinam detento aliquomodo lesa, ob quam urina non diu in vesica detinere valuit, debilitato sphinctere, quamvis oandem lectum pertransierit.

Totum sinistram latum vultu & sensu privabatur) Hemiplegia septimum circiter mensem post percipit ruptionem & fragorem sub onere gravissimo, evocit, quem Tumoribus dextri ventriculi primario tribuere nequeo, quamvis alter qui ininger permandit, ovam gallinaceam superatis: alter, quem imprudenter lauciavi, non multo minor fuerit, ut ex aquæ turbide assuevis copia divitiar ponit, quamvis etiam in fundo & ad latera corpora strata, & portio corporis callosi, exulcerata, inæqualia & quasi lacera apparuerit; nam à xlii. Decemb. 1667. ad xlii. Martii 1669. nullum insulsum hemiplegicum primo similem experta est, licet proculdubio in tanto temporis intervallo tumorum moles augmenta simpliciter, & superficies medullosa à liquore acti in ventriculo hoc amplius erosa fuerit: Imo Tumoribus, ut pote folliculo inclusis, integris permanentibus, potissimum naturæ beneficio & usu aquarum cephalicarum primum pedi sinistro insisteret, pedis digitis movere brachium, labia rite conformare, & verba ad intelligentiam comparata effari potuit. Adhibitis postea medicamentis efficacioribus, scipione sustulsa obambulare, in publicum prodire & templum frequentare, aliisque actiones animales postliminio reparatas edere valuit: Perstitit quidem brachii sinistri impotentia ad motum, in eo sensu, à primo insolito ad vitæ extremum, non tam ob tumores, quam ob labem aliquam particularem nervorum ailiarium, qui gracilliores & teneriores sunt nervis ex osse sacro ad femora & pedes descendentibus; nam multis tumoribus, impotentia brachii post sumpta medicamenta minor erat quam lo primo post insulsum dextrum. Nec Hemiplegiam illam ferè iusta craciam & dorum meningem, aut illi qui intra meningem, & in sinistro & tertio ventriculo stagnaverat, aut illi quod subilavum capitis sub pia matre collectum transpiraverat, nam in necro quæ late pauci copia, forte ob hydrocephalum, redandavit, neque quicquam apoplecticum

passa est, nec apoplexia mortua est: quemadmodum quoque Victor, de quo supra, à magna levi intra cranium colluvie ab insulsum apoplecticis, post parcin suspensam, aliquot annis ad vacuum diem immunis fuit: Non equidem nego tumores istos ventriculi dextri ad Hemiplegiam sinistri lateris symbolum suum comasile, nam ipsemet cum plurimis aliis observavi uoo laete affecto, oppositum paralyti correptum fuisse: verum sociam, & forsan primariam causam Hemiplegiæ, serum castille arbitrio: accidit enim postquam curia contentiore sanguis incaluit, & in templo subito per habitum corpus in perfignis, seu inque in massa sanguinea desumpsum aut segregatum, cum impetud interiora etiam capitis ruit, aique te poralis cerebri in dextro latere insinuat, una porulos jam ante à tumoribus compressos facilius oblituit, apiliumque meatus ocululit, aique hemiplegiam effecit: forte etiam sanguis aternuat portunculæ secum ad profundiora traxit, delinavit enim xiv. diebus post insulsum: sero namque extra medullarem cerebri substantiam & medullam spinalem fluctuanti, sue tumoribus solis Hemiplegiam adscribi non posse jam dictum est: Serum vero potè anapetitalit & insulsum istum segregatum fuisse, cerebra & copiosa mictio primis diebus sufficere probat, & profundius cerebrum subissile evincit curatio, quæ peragebatur serum discutientibus, abstergeatibus & evacuantibus: Medulla cerebri in sinistra basia parte mollit, quia dextræ plane non dissimilis, neque locum affectum neque causam proximam demonstrat: Neque malum ad hujus rei demonstrationem confert medulla spinalis sinistra minor dextra, si enim præternaturalis quidpiam fuisset, aique pes ac brachium ad motum impotens permanisset.

Conqueritur de synipia dolere, &c.) Cujus causa partim tumores, intra dextrum ventriculum, partim lymphæ seu setum meningem distendens.

Brachium & pes motu convulsivo fluctuabant) Succulio brachii & pedis sinistri mense Febr. à me adhuc animadverta, erat vere motus convulsivus, nam inopinatio & præter voluntatem artus illi agitantur: Quamvis in Hemiplegiæ principio artus sinistri lateris elanguerint, atque aliquandiu paralytici persistit, non tamen ita omnis sensus & motus nervis hanc lateri dicaris perierat, quin ad molestiam quodam excutendam adhuc insurgere valerent, prout omnino oculis patuit, & à me in alia etiam fortissima Apoplexia decobitis non raro observatum fuit: Quoniam autem uoo momento simul artus illi succutiebantur, necesse est molestiam hanc in medullæ spinalis parte quadam extitisse, ubi nervi brachii & pedis adhuc unii erant, nam intra cerebrum conclusam fuisse neutiquam credibile est, cum sensibus integris

sebat; molestiam hanc non arbitror irritationem quandam dici posse, nam succosus breviter tempore durabat, & postquam cerebrum, cerebellum ac spinalis medulla sero largissime etiam actiore perfundebantur, non amplius eveniebat; potius cum Eac. D. Willis explosionem hic admitteret, eam omnino spatiole suae inter medullae nervorum substantiam & membranam illam ambientem, quae manifeste in funiculis, in quibus plures nervi colligantur, dextra manu invenimus; atque hanc succosissimam solum. Agram afflicti, cum adhuc humoribus nitrosulphureis abundavit; postquam vero illos viscu refrigerante quasi suffocavit, potius cessavit.

Quaeratur de dolore in planta pedis dextri Dolor plantae pedis dextri, alias (sani, ob quem nudo, & non prius lineis probe obvoluto insillire non astra est, quemque verbis exprimere nequit, non videtur à sero inter curam & mediculos, aut intra musculorum interstitia fluctuante, quod in eodem frequenter sine dolore fieri solet, sed ab humore intra membranas valde nervos, seu nervos in membranis capantos, in planta pedis coercito originem duxisse, atque propterea afflicti tam aliquam cum arthritico habuisse: An vero hac ex ista sacra derivatus, ante vero ex arteriarum capillamentis effusus fuerit, incertum est, nullum enim in partibus intermedias, ab osse sacro ad pedis plantam dolorem passa est.

Brachium sinistrum admodum intumescit Brachium sinistrum intumuit, sive ob lympham ad venam axillarem cessantem in motu impeditam & stagnantem, sive ob serum fistulae faciae inclinum huc vergens: Alias

hemiplecticos novi, quibus brachium paralyticum permansens prorsus contabuerat, quod ob iuccum oetvolum denegatum fieri credebatur.

Mortuus est, &c. Non mortuus est apoplexia, nam ad extremum ulque peti dexter summopere doluit, accutere audire & acute vidit, sed sensum cordis motus subtilis, quoniam sanguis ob pedis dextri gangliam eorumpebatur, spiritibus orbabatur nec instaurabatur, unde paulo ante obitum delirabat, facies Hippocratica, extrema frigida & pulsus summe debilis aderant: Post obitum laevis ubique ichorosis nec grumescens ex vasis sanguiferis faucibus emanavit: Quomodo vero parvis alicujus Ganglii aut Sphaeculi, Item cancer & ulcus cum ossa carie totam massam sanguineam corrompere, eandem labem alii parti imprimere, aut ipsam mortem imprimere possit, peculiarem dissertationem postulat. *J. Jacobus Wiffertus Exercit. de Apoplexia, hifm. xlv.*

Manilla inferior dexterum atropisatur Cur ut plurimum maneat mobilis in corpus Striatum prolapsa, oculi, nec non ovis & faciei musculi adhuc motus suos retinent, proinde ut nonnulli circa initium spinalis medullae, infra nervos omnes à medulla oblongata oriundos, obstructionis locum statuunt? Dico rem istam ita habere, quia nervi praedictis musculis (quorum scilicet motus per instinctus natu ales clement) detinuit, & à quibus & tacto paulo profecti, non levis ac nervi praecordii & venteribus intervenientes, ipsam animalium intelligentiam possitimum à cerebello derivant, ejus regimen, alii &c. licet corpore strato, saepe illatum peribat: *Wiffert cap. de Paralyfi.*

OBSERVATIO V.

§. Paralyfis ab excremento cerebri aqueo, seroso, frigido, humido, cerebrum irrigante, vel Nervorum omnium principium premente, uti Apoplexiam, quae totius corporis est Resolutio, generari, sic si hoc in nervis accidat Paralyfim fieri censemus: Talis enim humor à cerebro in Apoplexia, quam prius procrearat, excussus, vel sine ea defensus, non per Dorſalem medullam aut nervorum substantiam, sed vel per cavitatem Dorſi vertebrarum, dorſalem medullam continentem descendens, illicque vel circa principium aut progressum illius subsistens; vel ulterius per ductus, quos nervorum paria à dorſali medulla progressa, circa omnem connexum undique in corpore permeant, delabens, aut etiam à capite nervorum conjugationum similes ductus sequens, alicubi que circa nervos haerens, quocunque loco, sive hoc circa dorſalem medullam, sive nervorum paria aut conjugationes accidat, ea comprimendo, vel irrigando, ut si hoc in cerebro fiat, Apoplexiam, sic si hoc in jam dictis locis accidat, Paralyfin plurium paucorumve partium, prout generalis particularisve nervus afficitur, procreat, cum si copiosius humor eo affluat, angustis, illis in locis ponderis sui nervos comprimendo spiritus animalis viam interciperi possit: eoque diutius si crassior & mucosus longiore mora detentus evadat: Praecipue vero quod humiditate sua nervorum substantiam continuo irrigans & adimplens refrigeransque, eo in loco propriam ipsorum temperiem destruat, & quo minus spiritu animali impleri eoque perfrui possint, impediat: unde & propter inutilem hanc interpositam nervi affecti portionem, reliquo qui ad partes deducitur nervi ductu ad functionem edendam simul inepto facto, resolutionem perfectam, si magna sit laesio, partium quibus hi communicantur sequi necesse est, eamque eo diuturniorem & pertinaciorum quo major Nervi offensa existit: Quam veram Paralyfem pituitosa causam esse, intumescere ex aqueo humore dorſali medulla, Sectione deprehendimus: Ut non opus sit obstructionem quandam in nervis, hic, qui solidi sunt, aut ex filamentis confisi, nec cavitatem ullam, quae humorem illum crassum, uti quidam scribunt, admittere possit, excogitare: vel si nervorum hanc humiditatem quidem concedant, id ramen hac ratione, quod nervi longiores laxioresque facti, ad motum edendum inepti fiant, cum Nervi partem minime attrahant, fieri asserere. *Platerum Prael. lib. 1. cap. 2. part. 2.*

Nervi qui *fideles sunt*) Nervorum ductus non, uti Arteriae & venae, perforati sunt, nam illorum compages non modo stylo cuiusvis impervia est, sed & microscopii applicatio cavitatem nullam his adesse confirmat. Quod ad tubulos olfactuarios attinet, isti ita conditi videntur, non pro spirituum animalium commixtu, verum ut lectiones quaedam hac via elaborantur. Ipse autem spiritus in lateribus, ac minime in cavitatibus utriusque tubuli feruntur, Caeteri autem Nervi substantia compacta & plane firma constant, ut humoris subtilis, qui spirituum vehiculum est, illorum compages, non sicut ac spiritus vini extensus fidum chorae tantummodo sensum perreperando, trajiciat: Hinc arguere licet, quod si quidem spiritus animales pro expansione suam nullam intra Nervos cavitatem manifestam requirunt, neque tali iisdem opus esse intra cerebri compagem: quin ventriculos, ita vulgo dictos, in aliud quam hoc munus deputare oporteat. *Ubi Anatom. cerebri cap. xix.*

Ex filamentis confusi) Nervi ipsi (propterea microscopii ope detegere licebit) per totum poris & membranis, quascunque alveolis densissime excavatis, & invicem contiguis instruantur; ita & *ovary* & *ovis* eorum substantia, instar canis indicat, ubique porosa ac pervia est. *Idem ibidem.*

Nervos comprimens spiritui animali viam interperat) Praeter spiritus animales intra Nervos conceptos, Liqueorem quendam *idem* L. c. statuit: Intra haec spatiosa, aut, spiritus animales, sive corpuscula valde subtilia, & ex natura sua semper in motum prompta, blande scaturiunt, quibus cum pro *vehiculo*, tum etiam pro *retinaculo*, latex aquosus, & ipse pactum subtilium valde, adjungitur. Humor iste fluiditate sua spiritus per eorum systema nervosum diffundit, item viscositate sua eosdem, ne protinus dissipentur, velut in systali quadam ac ferie coniuncta requirit: Videtur enim quod sine tali humore spiritus intra nervorum genus consistere nequeant, quin tenues evanescant in auras.

A P P E N D I X.

Nervi, quantumvis se immergi, Paralyin non incurrunt nisi ab eo premantur, aut corrodamur, &c.

IN dicti Spoerlin (*Vide Observ. 1.*) aperto capite, colluvies feri ingens inter meninges & in ipsis cerebri ventriculis reperta, vix non quemlibet persuasisset quin graviores noxae actionibus animalibus, imo ipsam apoplexiam attulisset, nisi diligenti observatione contrarium animadvertum fuisset, nam ad ultimas usque horas omnibus sensibus valuit, sanè loquutus est, manuum & pedum digitos ipsosque artus aliquantulum movit: atque manifeste docuit nervos medias intra undas natantes nunquam ita emolliiri, aut structuram ipsorum eoque destitui, quin spiritus integre conservent, liberumque transitum concedant, nisi premantur, aut à circumfluo humore corrodamur & sphacelo enecentur. Idem antidhae in hydropicis annotaveram: plures patiebantur ventris tormina, imprimis post propinata purgantia, mediocriter appetebant, sitiebant, ac quandoque severissimos dolores tolerabant, in primis si funesto plerisque erysipellate rubebant, quamvis in abdomine nervi & plexus nervosi non solum sero copioso inundati fuerint, sed etiam illos ipsos aqua tenui membrana coercita, veluti gelatina incrustarit, ut sectione inveni: In pedibus vero, à planta ad coxam ipsosque lumbos, oedematosis, viderim cutim, pinguedinem, membranas, imo ipsos musculos instar spongiae aqua turgidissimae maduisse, quae largissime vulnere facto exstillavit: Imo ne lethargum quidem peperit, licet ob pulmonum ulcus febricitaret dictus *Spoerlin*, & cerebrum aquae immersum fuerit, quod forte propterea factum, quia cerebri ventriculos & corticem infra anfractus vestiens, tenuis meninx ab omni aquae irruptione medullarem substantiam immunem praestitit: Nullos insultus Epilepticos, aut alios motus convulsivos serum cranio inclusum peperit, quod vellicando alias efficere valet, quia proculdubio multa lymphae dilutum, minusque acre, salinis aculeis in percolatione non transeuntibus, fuit quam illud quod ulceris, dyspeptici & depascens (quo laboravit) causa fuerat: Forsetiam meninges longa assuetudine, veluti callo obducto, aquam facilius tolerarunt. *1. Lac. Wepferi Dissert. de Apoplexia p. 370. & sequ.*

O B S E R V A T I O VI.

Paralyis colicos dolores sequens, à Sero cerebrum & spinalem medullam inundante ortum ducens.

IN Germania, & praecipue in Franconia ac in Norimbergico tractu frequentissimum hoc malum est. Quo verò modo & quibus de causis haec contingat, ex subsequenti historia intelliges: Secui *juvenem mulierem*, quae primo ex epatis & vesicae bilis obstructione in Tertianam notham, deinde in *colicam passionem incidit, paulo post Paralytica reddita* intergrum annum vixit: quae tamen usu thermarum aliqua ex parte sublevata, ad extremum delirio ac Epilepsia correpta occubuit: Paralyis à principio occupavit brachiorum superiores

riores partes, sensim ad extremitates manuum, ultimo ad crura descendit: *agra atrophica contabescibat*, de ventriculi ardore, Siti, appetitus edendi prostratione, alvi difficultate, & dolore Illi sinistri tenisivo gravique (sentire enim sese inquebat in illo loco pondus aliquod grave, tanquam plumbi massam) conquerebatur.

Hanc mulierem aperui, & reperi jecur pro corporis ratione nimis magnum obstruktionēque minimē vacans: Vesicam bilis bile crassa ac nigra turgidam: Ventrículum humore plenum viridi, atque extensum: Ulterius descendens, inveni Colon male atque p. n. conformatum, Si quidem ubi sacculus, sive monoculus situs est, & ubi colon ventriculo annexum est, colon fuit valde laxum, flatibusque expansum, reliquis in locis, ad crassum intestinum usque angustum, facibus crassis durisque in globulos concretis infarctum: Eodem modo conformatum vidi Colon in multis foeminis: Reliqua viscera, tam naturalia quam spiritualia, erant illaesa ac integra. Ex cerebri substantia inter dissecandum effluxit aqua tenuis & colore subricundo, quod venarum arteriarumque incisioni adscribendum est: nam aqua, qua omnes ventriculi scatebant, fuit tum tenuissima, tum limpidissima ac pura, nihil vero praeiit in ventriculis cerebri vidi: Totum spatium, quod in sacra fistula, inter tenuem ac duram membranam est, & ubi nervorum funiculi nervos contracturi à spinali medulla recedunt, simili aqua plenum exitit. *V. Coiter lib. observat. Anat. & Chirurg.*

S C H O L I A.

EX hac historia & symptomatibus quae praecedunt, consilio malorum scaturiginem ab epatis & cystis obstruktionē prodissē, indeque sctorem consequam: Postquam vero bilis non expurgabatur per convenientes vias, scilicet intestina, oec eorum expultricem stimulavit, hinc debilia stupidaque redidit, multa superflua, quae in fluxum soluta colicam dolorem excitant perniciatissimum, collegerunt. Hi flatus cum liberum exitum, ob coli in quibusdam locis angustiam habere nequeunt, in laxa parte, ut pote paulo supra inguen sinistram collecti, huic parti vicinioribus locis, quibus coloni beneficio ligamentorum fuisse alligatus, magni ponderis & tensionis sensum excitavit, in aliis locis non atque, nam non ita laxa erant. In his affectibus bilem tenuiorem regurgitate in ventriculum, tum quotidiana experientia docet, tum Galen. ad Aphorism. 50. 6. In huius foeminae ventriculo humor contentus undequaque erat viridis & satis tenuis; unde non mirum si ventriculi actiones disturbatae fuerint, ac atra omnem cibum nausearet, sitimque ad docemque ingentem cum mortificatione perceptorit: Ad Paralyfin capiti alios affectus quod attinet, notissimum est nullas partes consensionis vim majorem atque cerebrum & ventriculi orificiam invicem obnitere: quare in hoc casu cerebrum per ventriculi consensum affectum esse minimē dubitandum existimo: multo minus plurimos vapores ad caput elatos, atque in tenuem illam humiditatem, quae forsan acrimonia non caruit, convertos, atque totum cerebrum irrigasse: à cerebro undequaque hanc humiditatem per sacram fistulam ad nervorum originem deluxisse: ad extremam fistula humoris a quoque ebullitione, auctoque accedente, sequutam delirium ac Epilepsiam opinor. Haec ita sese habere omnes quos similibus affectibus correptos, & tandem simili modo interemptos vidi (vidi autem plurimos) manifeste attestant, praecederunt hanc majori ex parte, 1. febris tertiana notha; faciei color subflavos, Ictericis non admodum dissimilis, vel color pallidus, nonnunquam pallor, interim faciei tumor, appetitus edendi defectio: totius corporis emacatio & languor: plerique incurant in colicis passionibus difficillimas, colica cessante subsequitur paralyfis 1. brachiorum, 2. manuum, ultimo crurum: paralyfin comitator nonnunquam delirium, interm lethargus, interim apoplexia, interm epilepsia &

mors ipsa: Foeminae non recte purgantur, habentque mensium purgationes pravae atque inordinatae. Juvenes multi ab hac paralyfi liberantur usu convenientium remedium, abinentia vini venterque & ita Senio confecti vix evadunt. *Idem ibidem.*

In Colicam passionem insidit, paulo post Paralytica (Plurimi in ea sunt sententia cum ipsam materiam quam doloris Colici causa est, ab intestinis ad membra exteriora non transmitti, sed aliam materiam aliunde ad membra exteriora fluere; ita G. Hoffmannus in consiliis scholae cons. 173. affectit. Tum demum hanc Paralyfin fieri, ubi jam maxima pars materia pituitosa in intestina effusa per alvum excreta, ac per paroxysmos assumpta est, ut jam quodammodo misere & rari invadere Colica videatur, tum enim reliquos humores pituitosos, & praeter eos qui sunt in capite, ob dolores, inedia, rigidos, calidum & incensum medicamentis usu attentos, reliqua priore consuetudine via ad propriam destinare, ac ita frangere nervos ad musculos, & sic ad manus & pedes tendere, unde arum laxantur: Atque hinc non in omni colica refertur arum, sed tantum in ea quae magna ex parte pendet ex lapsu pituitosi humoris ex capite per vena, in intestina. Paulus Aegineta lib. 3. cap. 4. meminit Epilepsiae & Patetis quae hinc critica quadam ex profundo transpositione, eo modo quo abscessus fieri solent, vel morborum permutationes, per vias quas sibi parat natura, cum corpus undique transfluxit sit: Ad. Symples Anax. 1. 6. c. 4. ita ait ex colo per malaricas humores morbosum in tenuissima eorum ora se insinuantem, in aorta truncum regressum ad lumbares pervenire, has turgentescens vicinos comprimere nervos, unde curum oriatur paralyfis, Eundem ob causam succedere nonnunquam Colicæ Epilepsiam censet, si humores viscosi in lumbares arterias influxi ad spinalis medullae latera usque ad cerebrum ascendunt. Raskius Differt. Anat. 1. 6. c. 59. mutatione hanc doloris colici in vaporem per vertebrae, cuique speciem quod à bonis ad prava vocatur fieri censet, non quod materia colicos dolores inducens ab intestinis convertatur ad spinalem medullam, locum nobiliorum, relicto priori foco, sed quod nova affluens materia non amplius perat intestinum aut ejus viciniam, sed eam praeternaviget & spinalem medullam perat. Lemnius Praef. lib. 3. lect. 1. c. 4. ait novam vim per quam materia ad spinalem medullam deferretur, & Patetis efficere possit, à rectoribus Anatomicis demonstratam esse, namque Ramum quendam

ab Aorta, non longe à melenicoræ portædam, se-
penter in spinam epulæ veteres: Demum ostendit
ad motum cerebrum non sufficere, sed nervos &
musculos etiam requiri, quorum integritatem viola-
tam motus depravatio consequitur alio cerebro.
Revera experientia testatur in hac Parte fore princi-
pium nervorum non ladi, & caput ab omni dolore
absque affectu esse vacuum, quod certe accidere non
posset si eadem materia que colorem afficit caput etiam
num obideret: Adde his ejusmodi Partem vera ci-
tius curabilem esse, quod caput & nervorum oculo
extra culpam sint: in altera musculorum ac nervorum
solummodo partes afficiuntur. *Laurentius Anat.* l. 4. c.
20. qu. 8. Metastasin à nervis in venas & intestina, & à
venis in nervos facile fieri posse asserit, nixus Hippoc.
authoritate, *Conversio*, ait, in Cordis pæli, *solusum*
affert, & c. 2. aph. 26. *Conversum sibi rem advenit*, occi-
dunt isostem, cum materia febrilis in valis sedem ha-
beat, Convulsio nervorum affectus huius necesse est,
si febris convulsio sedat, materiam è venis in ge-
nus nervosum transferri, Et è contra, cum febris con-
vulsio sedat: *Talium lib. 2.* Observe. cap. 22. Colli-
cum dolorem Convulsionis speciem censet, *Raro con-
trahitur*, inquit, *humani abdominis nervi*, *atque* fre-
quentius *quam animalium* Medici nomen, *conspici* nescio
qua impudentia quicunque ventris dolorem, vel fieri
à sole acri, vel ab spiritum interdentem instigatum Calorem
Verum magis veris distinxit & addidit, rigorem
muscularum contrahit, arguunt sicut peripneumonia
magis quam in illa pati: Alia non contrahitur ventris tam
incommodatur, neque tanta apparetur tam obliqua; vel mus-
culi vel pides velia interitum incurrent, non luce elarius
videte est in hac, de qua loquuntur, *Convulsione*: Ita
etiam opinatur Excell. *Apffer* in Ephemer. Germani-
cis anni 1671, *Causa* quoque *Pigo* sect. 4. cap. 2. de
morbis à Scio, Colicum dolorem sequi divulsionem
seu convulsionem quandam intellinorum, secundum
entium longitudinem statuit; Novissime *Exc. Fr. Iga.*
Thierman consil. lib. 2. c. 4. Colicum dolorem aliquando
Nervorum affectum probabiliter esse censet, *Quod si*
igitur, inquit, *nervorum affectus sit aliquando colicum dolor*,
atque pars nervi tunc abdominis tunc intellinorum præterea
aliqua, tum pedum & manuum, statim sint ex eadem stir-
pe (sive medulla) præterea, quoniam obstat quoniam materia pericula,
quod est partem humor tenuis, uberosus, vaporosus, ac fassus
particulari præterea nervi immixti, ab intestini cal, & ab
demonio dolentibus membranis nervisque, in nervos tunc pe-
dum tunc manuum partes, eo quo dictum est modo, continuo
propellatur, atque crisp, sed imperfecta, ad extremos corporis
arum ab intestinis emanant, Dicit, qualis est partem
humor tenuis, ichorosis, &c. Esi enim nullo modo ne-
gram adeo in calidum plerumque humorem præterea crudum,
intestinarum tunc inderentem, tamen necesse facile dextera
abesse humorem tenuem, bitiosum, uberosum, arem simul
mixtum: iste enim est qui humorem radiatorem in calidum deli-
quens, fermentando, sicut dolentibus tunc fassus, iste
enim siccitatem & sicut creat: iste tempore paroxysmi solus
& thalidus, utrum multo sulphure tingit, iste dicitur
quoniam tenuis est & vaporosus, facillime ad arum per sicut
dorsu fissilem præterea penetrat: Hinc Partes, de qua loqui-
mur, non est semper & necessario nervorum obstructio vel
morbificatio, ut in Paralyti vera plerumque contingit, sed sub-
inde aliqua alia particulari animi irritatio, pendens ab
humore vel vapore, nervorum robori peculiariter infusa.

Ægra atrophie constituitur Atrophie in Paraly-
tici causam ad interceptum sanguinis circulationem
refert *Rafinys* Ephorose cogn. & curandi, & c. lib. 1.
p. 1, cap. 10. & Dissert. Anat. l. 4. c. 19. Nervi & spi-
nalis medulla & *conspiciuntur* tunc à *conspiciuntur*: Venæ

& Arterie & *conspiciuntur* afficiuntur, circulatorie of-
ficium laud faciente: hinc pulvis tardum, arum, debi-
lis, frequens, membri frigidus & tæta: Id ex Hæ-
vejanis principiis optime declarare licet: motum tan-
guinis per arterias è corde facilitat calor & attractio,
carnium: motum ex venis capillaribus, & repressio-
nem in ramos majores, motus membrorum & com-
pessio musculorum qui circulant vas circulationem
cum hæc, motus nempe & compellit, desunt, desti-
tuit enim contractio & excitatio in membris paralyticis,
non est minum si circulatorio sanguinis non rite peraga-
tur: hinc sanguis, novis non refectus & illustratus spen-
dibus, corpibus relictus, frigidus, pulvisque tardus apparet
cum tæta: *Glyss* Anat. *Apian* c. 45. à Nervorum ubiq-
ue tione fieri centes, & inopia tunc eorum nuxia, in
Paralyti, aut, paræta solentur ob fibrarum laxitatem,
facileque tanguinis affluxum initio subitum appa-
ret: Constat tamen id à genuino partium nutritium
incremento minime fieri: quippe eadem polles, est
sanguis tique copiose afflatus, paulum mavectum,
ut jam præter olla & pellem vis quicquam impet-
Argumento hæad ubiq-ue vas, per quoniam nutritium,
obstructa esse, Nervos scilicet: quippe venæ & arte-
rie morbi huius immunes sunt, nervique soli officio
lino male funguntur.

Post Paralytica reddita Quomodo ex uno affectu
alius fieri possit, præcipue post colicam, cum nulla
ibi sit affinitas: *Estim* lib. 4. diaphoræ *Perat*, inquit,
Cum materia que ex colica Paralytium facit sit duplex,
aut calida & tenuis, aut frigida & crassa, de pte
non est in linguis dubitatio quomodo hoc fieri possit.
Et revera Paulus novit huius Paralytis causam nullam
aliam quam humorem biliosum. Et ego quoque, qui
semel vidi ea colica paralytium scilicet esse ex humore
bilioso certe scio, in Episcopo quondam paraly-
tico introque biachio, Sub cura fuit *Captivus* &
mea, & fidus huius ea oleorum refrigerantium &
fructuum usu: Sed quando fit ex humore pituitoso,
certè res est difficilior: Quod autem fiat, docet
Estim l. 1. c. ubi inquit frequenter est, in tractu Fran-
conie hanc peruramionem: Modi quibus materia
ex intellinis deferatur in nervos multo tunc, 1. Ut
ex intellinis feratur in metastases, inde in jecur, hinc
in venas torus, per has in ambitum, inde in mus-
culos & nervos, quem tamen modum improbat
Estim, inquit enim difficile esse materiam pitui-
tiosam & crassam, que po- st excedit per amplissimum
ductus in venterium & intellinum, fieri in ejus-
modi longis vias: Sed est difficile, non tamen im-
possibile, Omnium enim una consilio: Quod mi-
rabilius, in peripneumonia posse fieri abiectionem in
articulus crurum: Omnis enim, dicia, locus est
amplior. Si patens alvus, potius excedet tunc, sed alvus
imprimatur, nade nuda: alio defert. 2. Ut materia
recipitur in tunicas intellinorum, ex his in perion-
ium; ea hoc in veteribus, sive post ascendat in nu-
cham, sive ibi paralytium efficiat. 3. Ut huiusmodi ma-
teria, cum non potest transire, convertatur in vapores
æquos, repleat cerebrum, ventur in aquam & hæ pa-
ralytis, quod testatur quidam ex ipsa æra *4ia* (*Cover* in
alio exemplo). Quando Colica fit ex humore dilen-
dente à cerebro in intellina, tunc enim possit per-
mutari à loco ad locum: quod mittit hæ natura ad
intellina, micti jam ad nervos: 4. Quando humor
contractur in venis, dum transmutatur ad intellina, scilicet
colicam, dum ad nervos, paralytium. Hi duo ultimi mo-
di mihi non probantur, cum hoc non est fieri ea colica
paralytismo loquimus de illa que fit præterea libus dolori-
bus colicis cessantibus. *H. Savane* *Fagius* lib. 1. cap. 2.

Præcipue in Francia. Vt & Moravia, Austria aliis- que quibusdam locis, ubi vina fortia, sulphurea & tuncare in usum sunt, quod in sola terra calcarea, vel lapide calcario, vel simili materia minerali abundante creantur: De hac Paresi post colicam sic distulit. *J. Tac.* *Recessum* in milicell. curiosus anni 1671. Observat. 39. *Agr. an.* colica biliosa affecti, subsequente nonnunquam Paresi, mihi plurimum negotii ab aliquot annis facesserunt: Nostros enim plerumque vinum rubrum bene matum cum syrtuosumque bibunt; Si qui sunt in agro Schaffusiano colica excruciantur, nullus tamen quod sciam Pareticus sit, nec id à centum annis factum fuisse unquam ex annalibus Medicis colligere potui: Rari etiam apud nos Scaphia- nos sunt podagrici & calculosi, nec convulsi motus frequentes sunt: potissimum id vino rubello salubri hæc nos adscripsi: E contra ubi vina alba bibuntur, quæ ut conveniunt inhienda sunt sulphure, nec apeto vase, ut tabella deserviant, sed in dolis, osculo vis palmarum amplexuque paulo, unde sulphur vini narcoticum caliditate nequit, ac cum vino permixtum permaneat, colica hæc frequentissima est, scilicet in Altiaria ad Lacum Acromium, in Ducatu Wirtembergico, &c. Frequentiores quoque observant Podagrici & Nephritici, plures quoque utriusque sexus, maxime tegularis, convulsionibus exagitati vidi: Non ita pridem aliqui Monachi Dominiciani potu vini Altiarici colica affecti, supervenientibus convulsionibus enecti fuerunt, quibus ob negotia ad illos nequeveram, Vinum nimium sulphure inhiotum aiebant: Ego id sulphurata tanta, quam dulcem vocant, & semina, anisi, coriandi, cinnamomi, Bismuthi aliisque conspiciunt, prælium sospicabant: Bismuthum Th. Jordanus in pestis pluvionensis, jam olim damnavit, hujusque morbi paratium in Moravia exultavit, Quid enim plumbum in pollinem redactum atque intra corpus admixtum valeat, ea *Fennel & Palmario* constat: Insuper Monasterium nobis vicinum est, ubi Patres vinum austriacum bibunt, viz

ubis licet eos esse qui hanc pestem effugiat: Superstitiose maliciose quidam occultæ morbum, signis suis, notissimè adscribunt: Colicam hanc ab aliquot annis jam credidi omni nullo modo ab obstructione quadam, sed constrictione & convulsionem quadam fibrarum intestinis oritur, ob quam strictissime alicubi coeloducuntur, ac flatus ascensum ac descensum denegant, unde leviores dolores: Hujus constrictionis causam existimo humorem tenuem, acrem, nervorum ductum sequentem, ac in plexu aliquo nervoso meienteril stagnantem, unde bis lumbi impense dolent, & abdomen instat cæcinæ quasi excavatur umbilicūque interortum trahitur: Homo ob doloris gravitatem & vigilias continuas accumulatur, Paresi rigore videtur: quamvis observari in brachiotum Paresin aliquando colicam præcessisse, scilicet humore circa eam vicem hæsitante & nervos, antequam plexus nervosus meienteril affligatur, emolliente: In curatione notavi Purgantia dolores exasperare, paresin, immo mortem accelerare: Plus beneficii consulerant julepsa refrigerantibus alterata & acidula: Clysters refrigerantes & emollientes, itemunctiones & epithemata, e. g. è succo lactuæ, senecionis, &c. Hæc morbum breviter effecerunt & plerique Paresin effugerunt: Venæ sectio, quam *Chylinus* commendat, aliquibus Paresin accrevit: Clariss. *apud de Hermiti* hæc, meienteril inflammationem in cadaveribus reperit, quam à præposita sepe curandi methodo excitari nullus dubio: Cadaver ejusdem colica enecti seci, totum abdomen pure impleverat, toto mesenterio abhæso quasi existente: Culpani mali adscripti fontem emollientibus & calefacientibus, purgantibusque fortioribus: Clariora omnia evaderent si per superstitionem cadavera secare crebris liceret: Unice me argit qua ratione constructio hæc specifice aliquo antiepileptico mutare solvi possit, Hæc morbum refrigerantibus, humectantibus, & anodynis expugnari.

OBSERVATIO VII.

Paralyfis ab aqua limpida in cerebri ventriculis & sacra fistula contenta.

Singularis inspectio hac in parte scriptorum authoritati est præponenda, nostra sententia magis ad *Rondeletii* quam ad *Fernelii* opinionem inclinabit: Pluries enim invenimus in cerebri ventriculis, sacraque fistula, aquam limpida tenuem & puram, quam flavam vel bili suo colore similem, vel etiam alium humorem: Majori itaque ex parte, si non semper, Paral. excitat tenuis limpidaque hæc aqua, in cerebri ventriculis atque in spina dorsu collecta, quæ sensim à superiore parte nervos irrigat, quoad pervenerit ad eorum extremitatem. *Cæter libello Observ. Anat. & Chirurg.*

S C H O L I A.

Paralyfin à pluvia crassa nervo tenaciter inhaerente fieri, omnium Medicorum est sententia, Ego veto à tenuis multaque à cerebro defluit, & ob tenuitatem totam nervi substantiam itrigat mollioremque efficit, in quo idem nervis quod in apople-

xia cerebro accidit: Quare non est audiendus *Fennel* qui flavam bilem Paralyfin excitare posse scribit, &c. *Rondeletius* cap. 13. *Prædica. Vnde isti rationes quibus opinor Fennel expugnat.*

OBSERVATIO VIII.

Paralyfis à sero totum cerebrum madefaciente, & paucitate spirituum ob hujus molem exiguum.

Vir Ill. proavis cerebri & nervorum dispositioni morbidæ obnoxius oriundus spas- mis levioribus tenari solebat; præterea Paralyfis spuria totius corporis membra quævis occupabat, nec enim manus attollere, aut pedes gressui accingere potuit, &c.

Primo occurtebat cerebri moles iusto minor & gyris paucioribus instructa, unde spiritus animales non satis copiose productos suspicati fuimus: Porro universa *vis sympathica* compages iusto humidior, latice aquoso madida & prorsus immersa videbatur, &c. *Vide tit. de Convulsione.*

OBSERVATIO IX.

Paralysis, aliisque animalis facultatis symptomata, ob anteriorem cerebri cavitatem sanguine & sero plenam, corpus unum striatum comprimentibus.

Juvenis temperamenti sanguinei, ingenuus & plerumque satis sanus, post lautiores cenam & vini potum immoderatiorem in cathedra, sedens, stupiditate in manu dextra ita afficiebatur, ut cheirotheca, quam forte manu tenebat, involuntarie exciderit; deinde se erigens & ambulare natus, in femore & crure ejusdem lateris resolutionem sentit: sine apoplexia tamen, incidens, nam animo semper constabat, interrogatis satis apte, tarde licet ac impeditè respondens, & quæ jussa erant faciens, Medico peritissimo statim accersito, phlebotomia, vomitio, purgatio, ordine celebrata fuere: cucurbitulæ, scarificatio, linimenta, frictions, aliæque administrationes idoneæ sedulo adhibebantur: nihilominus *Paralysis* accrevit, ut præter motum membris dextri lateris fere ademptum, etiam istius oculi visum amitteret; usque tamen, etiamsi torpidus & somnolentus, mentis compos amicos dignoscebat, & infirmitatis suæ conscius, & pro sanitate recuperanda sollicitus, remedia quæque oblata sumebat: verum his non obstantibus, functiones animales magisque in dies, eorumque consensu demum vitalis fatisciebat, ira ut circa diem 7. aut 8. modo in convulsiones, aliisque spirituum animalium distractiones subinde incidens, tandem viribus exolutis, morti succumberet.

Capite aperto, anterior cerebri cavitas sanguine partim ichoroso, partim concreto & grumoso, cum feti copia implebatur.

S C H O L I A.

Hinc ut facile esset concipere ab illuvie ista corpus unum striatum comprimente, ejusque poros & meatus contingente, spirituum affluxus in appendicem istius lateris nervosam impediti, & propterea in membris respectivis resolutionem excitatam: Arque ob istalium opticum, ubi corpori striato inseritur, etiam compressum, istius lateris oculum visum privatum fuisse: Porro quatenus corpus callosum, istud antrum concamerans, à materia aggesta nonnihil premeretur, inde functionum Animæ principum habetudo & torpor, sine ulla tamen earum subversione aut inordinatione excitabatur: cuiusmodi illarum affectiones propter noxam subiacentis cerebri, ejusque spiritibus incolis affixam, ac mini-

me à ventriculorum impletione procedere satis liquere videtur. *Vide tit. I.*

In mentis debilitatem, &c.) Observavi in pluribus, quodcum cerebro primum indisposito, mentis hebetudine & oblivione, & deinde stupiditate & *paralyti* afficerentur, postea in *paralyti* incidere; & si illa materia morbifica sensum delapsa, & demum alicubi intra caudicem medullarem (ubi trachus medullares plures in corpore striato ardeant) ad plenitudinem oppilativam aggesta: propterea enim, prout loca obstructa magis aut minus ampla fuerant, aut *paralyti* universales, aut hemiplegia, aut membrorum resolutiones quædam partiales accidebant. *Idem.*

OBSERVATIO X.

Paraplegia in Phrenitico, ob serum multum in ventriculo medio deprehensum, cum siccitate medullæ cerebri & membranarum.

Adolescenti Phrenitico, sub finem dextrarum partium tigor revera *paraplegia* & deinde *Paraplegia*, &c. Observatum in ventriculo medio serum multum: medulla cerebri sicciore, membranæ siccissimæ, &c. *Vide tit. de Phrenitide ex Ballonio.*

S C H O L I A.

Spasmus & deinde Paraplegia.) Spasmi *paralyti* interdum accidere adnotavi, nempe cum è musculis aeragomitis unus resolvitur alter convellitur: Porro asitum est paucis convulsis dudum obnoxios, tandem in membris debilitates, ac demum resolutiones sive *paraplegia* pati: Novi plures epilepticos, & alios spasmodicos, ob functionem morivam in hac aut illa parte modo inhibitam, modo abolitam, primo claudos, & dein clinicos evasisse; cujus ratio videtur esse, quod materies morbifica intra cerebri,

& appendicis ejus trachus tum medullares, tum nervos continue admittit, & cerebro explosa, tandem eos ita debilitat ac dilatat, proinde in aliismodi insuper particulis, sive narcoticis sive vitriolicis (propter quas ipsa *paralyti* supervenit) aditus patecat: Porro impius observavi ob diversimoda hæc materies morbosæ miscellaneæ (veluti cum mixta plura simul contingunt) una morbosæ convulsivæ & *paralyti* laborantem infestari: Hujus notabile exemplum in Tract. de Morbis Convulsivis cap. 9. p. 113. *ut videtur*

ambiguus : *Utrūq. cap. de Paralyfi.*

Serum multum, medulla cerebri ficiat.) In omni paralyfi per obstruktionem facta, materia morbifica non crassa & frigida pituita est (prout *Galenus* & plures Medici assentunt) talis enim cerebrum ductūque nervos pervadit, sed ex particulis valde subtilibus & activis, regimini licet animali infectis, constare videtur : Enimvero Paralyfis hominibus, non lecus ac syriasis, sive ueddo, arboribus accidit ; quippe venti nonnulli, halitibus plūsquam frigidis, scilicet ipsius nitroso aut viriolicis perditis, cum videntes tenerosque arborum frutices sufflant, eos repente emacescere faciunt ; in quantum scilicet flamma tenella, nervorum incant, foliis & fructu passim intertexa, maligni aeris afflatus ita penitus confinguntur, ut succum & tran-

co aut radice suppeditarum non amplius suscipiant, riu, ob cuius defectum exarecant. Non ablimili particula extraneæ & quasi viriolicæ, intra sensus & motus organa admittit, quatenus una poros contigant, & ipsius animales deiciunt, vel à motu supprimunt, partibus respectivis quasi uretinem inducunt. Hanc autem non à mera pituita, nec colluvie serosa excitari plane arguitur, quoniam qui cerebro frigido & humido predestinati, nates de oculis mucici, aut humores aquosi stillicidio fere semper midentes habent, imo qui hydrocephalo laborant, in quibus cerebrum, & summi as utriusque medullæ hypophyse velut innascent, non propterea in Paralyfim, nisi per medullæ compressionem dispanantur. *Thom. Utrūq. id. de Paralyfi.*

OBSERVATIO XI.

Paralyfis ab aqua limpida cerebri anfractus alluente.

Mulier post diuturnum & gravem capitis dolorem, tandem in lethargum cum partiali membrorum resolutione incidit : Cranio mortuæ appetit, cerebri anfractus tum exteriores, tum cavitas interna fuit aqua limpida repleta. *Vide tit. de dolore capitis.*

OBSERVATIO XII.

*Paralyfis à sero inter utramque meningem incluso, inter piam ac cerebri
& cerebellum, adore substantia cerebri ; repletionem ventriculorum
& effluxu illius in spinam.*

J Reutinger, crudelissima cephalalgia tactus, post cæcus exasit : 14. diebus ante obitum lectum permingebat ; paucis diebus post paralyfis pedis dextri successit, quam sequuta paulo post & sinistra, hinc lethalis apoplexia : Aperto capite cerebrum & cerebellum molle & flaccidum deprehensum, cum sero plurimo in locis memoratis. *Vide tit. de Apoplexia.*

S C H O L I A.

Paralyfis pedis dextri, quam sequuta post & sinistra, &c. Fortasse diviso, iuxta os lacrimæ, Truncus aortæ descendens, intervehit innumeras arterias iolas quas ipsa medullæ & musculis lumbalibus suppleat : Inde

difficili materiam se. osam influere posse ad hos locos, ad excitandam Paralyim partium inferiorum. *Notandum autem propter.*
lib. 2. cap. 15.

OBSERVATIO XIII.

*Paralyfis spuria à cerebro humidior, sero immerso, necnon spinali
medulla, quæ valde extenuata.*

Viri Illustris, præter motus Convulsivos, Paralyfis spuria totius corporis membra quævis occupabat, Nec enim manus attollere aut pedes gressui accingere potuit : Illi cerebri moles iusto minor & gyris paucioribus instructa fuit, unde spiritus animales non satis copiose producebantur : Univerſa tamen *ἡ γαστήρ* compages iusto humidior, latice aquoso madida & prorsus immetta videbatur : Spinalis medullæ truncus aquæ limpidæ immersus, valde extenuabatur, ut vix dimidium ollex cavitatis impleverit, quod à feri saltu, cui velut incoquebatur, colluvie effectum. *Vide tit. de Convulsionibus.*

OBSERVATIO XIV.

*Paralyfis à feri insigni copia, inter cranium & duram meningem collecti ; circa
falceam & illius reduplicationem, ac in omnibus cranii cavitatibus.*

Materia (de qua tit. de Soporosis affectibus) apoplexia prehensâ, efficacia medicamento- rum liberatur, superfluitate ramen Paralyfi brachii sinistri, recurrente septimo die apoplexia lethali : Aperto capite, inter duram materiem & cranium : item in huius cavitatibus tam anterioribus quam posterioribus, tum & in falce ac duræ matris reduplicatione, inventæ aquæ flavescens librarum medicinalis circiter quinque.

OBSERV.

OBSERVATIO XV.

Paralysis inducta ab aqua ventriculos omnes cerebri replente, hinc ad corpus unum striatum diffulente.

PArvulus cerebri humidi, qui lethargicus obiit (*vide tit. de Soporosis affect.*) plane stupidus factus est, atque intra diem unam vel alteram toto dextro latere paralyticus factus est. Calvariae olla exempta, anterior *τὸ ἐμπροσθεν* regio, aqua limpida obtesa intumescere; cerebro assulatum abscisso, & foramine in cavitatem anteriorem, à lymphâ distentam facto, aqua limpida exillit, cuius ingens copia ventriculos omnes ad summum impleverat, atque corpus unum striatum, aut poros ejus tuncendo, aut comprimendo, Paralytici intulit.

OBSERVATIO XVI.

Paralysis à cerebri ventriculis sanguine concreto repletis, ex rupto plexu choroide.

ANNO 1644. apertum cadaver mulieris ex apoplexia, illique succedente paralyti tandem defunctæ &c. omnes cerebri ventriculi concreto sanguine turgabant, ut ne guttulam amplius exciperent: Sanguis iste ex rupto plexu choroideis vasculis expressus concretusque liberum spirituum animalium commercium impediendo, apoplexiam excitavit, quam deinde paralytis sinistri lateris pertinax insequuta est. *Bartholinus cent. 2. hist. 60.*

OBSERVATIO XVII.

Paralysis à bile ad Spina nervos detruſa.

VIr quidam ætate florenter, epulans liberaliter, quotidianæ vomitioni biliosæ jam dudum fuerat obnoxius: hac repente suppressa ventriculi vehemens dolor petendit cum nausea & tussi inani: Huic mox cœpit corpus citra febrem vehementi rigore, tanquam invadente exquisita tertiana, ex intervallis quotidie supra vices concuti: Exactis diebus circiter xv. putrescente jam bile, tertiana febre corripitur; qua multis post diebus soluta, Resolutio insequitur omnium partium quæ sunt sub capite, nec multo post interitus.

Corpore dissecto, tam multorum affectuum causam deprehendimus bilem sinceram, eamque prasinam, circum jecoris cava, libraz pondo membranis coërcitam, Et cujus jam portio in spinæ nervos obreperat. *Fernelius de Febribus lib. 4. cap. 10.*

SCHOLIA.

DE Bile an Paralytici inducere queat? est aliqua controversia, Nam *Galen.* 1. Proth. 13. causam febricitis & Paralytis refert in solos crassos, viscidos & pituitosos humores, Bilem minime posse hos affectus inferre censet, quam sententiam *Rondelinius* accipit, ideo in *Fernelium* invehitur dicentem s. path. 3. dicit Paralytici ex materia biliosa sub finem febrium biliosorum ad nervos transmissa: Cæterum non hæc sanum est *Fernelii* sententia, sed etiam *Almyra* s. c. 45. Ego quoque vidi Episcopum ill. qui cum ex colica in Paralytici brachiorum incidisset, frustra diu curatus

medicamentis calidis, tandem cum Religionis ergo diutius uretur oleis si igitur, aqua potu, &c. sponte à Paralyti est curatus. *Obj. 1.* Biliosam materiam Convulsionem potius quam Paralytici facere in nervis impactam? Respondet distinguere Paralytici & Convulsionem, non ratione materię sed loci affecti; Etenim eadem materies si biliosa, sive pituitosa, sive melancholica, Paralytici & Convulsionem inducit: Nam in Paralyti substantia medullaris præcipue afficitur, In Convulsionem autem membranosâ & fibrosa: *H. Saxonia Pract. Pract. part. 1. cap. 12.*

OBSERVATIO XVIII.

Paralysis lateris sinistri ex apostemate nata cerebri, turgentibus venis tenuis meningis.

MELANCHOLICUS juvenis laborabat Paralyti lateris sinistri & convulsione lateris dextri violenta, cum febre insigni: Paroxysmi erant admodum frequentes, ita ut multoties quæteretur: mente constabat extra paroxysmum Epilepsia.

Eo mortuo aperuimus cadaver: in latere dextro admodum turgabant venæ tenuis meningis, multo sanguine nigro & concreto: Ea pars nigricabat, & apostema continebat in proxima cerebri parte. *Schenichius ex commun. Joh. Bauhini.*

SCHOLIA.

S C H O L I A.

Multo sanguine nigro.) Si datur apoplezia sanguinea, ex Galieno l. de curandi rar. per s. m. caput 5. Ergo Paralyfis quæ sequitur hanc Apopleziam erit ex sanguine: Valleriola lib. 2. Observ. 8. scribit in quodam Paralytico, qui ichus fuerat in capite, post mortem inventam esse lanicem Paralyfis causam: Et Galeus 4. de l. 4. ex Peripneumonia inquit fieri Paralyti. H. Saxonia Præf. p. 12. l. 13. Ideo sanguis audacter est evacuandus: Venetis ovi mulierem, cui cum secta fuisset vena ad 3vj. sanguinis, non sanabatur, sed missus ad libras est sanatus: de qua tanta sanguinis copia alii Medici timebant: Ex aliis duos novi quibus sanguine misso in multa quantitate, & pro pluribus vicibus sanitati sunt restituti: Itaque in Paralyfi sanguinea audacter est sanguis mittendus, neque semel tantum sed pluries; non ex uno loco, sed pluribus: *Idem ibidem* §. 10. A sanguine autem, id nervorum cavita-

tes illapso recentiorque diutius, Paralyfin fieri negat Clar. Platerus, cum ille mox portetac & inflammationem patiat, unde alia potius quam resolutionis accidentia sequantur: Io valis verò, si ex plethora, vel situ membri non naturali (ut si brachium diu in altum elevatum teocatur) sanguine delato in unum locum copiosius, quia tunc oervum vicium) cum venarum ductum temper nervi sequi solent) praemendo, id efficere credendum est, ostenditque curatio per sanguinis missionem.

Melancholicus Juvencus, &c. Quamvis magna ex parte obstractio fiat ex crasso ac pumoloso humoribus, potest etiam fieri ex melancholicis: Nam si Paralyfis sequitur Apopleziam, & hæc fit ex humore melancholico, Ex hoc quoque fiet Paralyfis: Fiet autem præcipue ob humorem scotolum quo diluitur melancholicus, aut quia serum hujus vehiculum est.

OBSERVATIO XIX.

Paralyfis sequuta cerebri supurationem & Effractionem ossis Frontis.

PUERO octo annorum ob effractionem frontis os, procul à futura coronali, adeo depressa fuit subiecta cerebri medulla, ut adempta libertate, destitueretur quasi omni motu, qui ramen paulo post iterum rediit, ad aperta per exemptum fragmentum via, per quam exitum ubi invenit lacerum cerebrum, extulit scipsum longè lateque supra os fractum extimamque calvarie superficiem, incremento tam uberi, ut necesse fuerit tantum huic parti nobilissimæ demere quantum recipiendo fuisset vacua ovi gallinæ testa. Ex qua præcisi cerebri dilaceratione protinus expullulare ingens fungus, primùm quidem mollis ac albus, ac mox durior callo, ac cinerea crusta obductus: quo luxuriante tumore in dies, magis magisque incrementum, ac in majorem molem elevaro, resolvebant tandem die xi. nervi lateris oppositi: manente adhuc firmo ac illibato tam animi quam corporis robore, licet biduo post vivendi finem fecerit, sub sudore frigido ac crebris nervorum distensionibus; conversa jam tum in pus maxima laceri parte: cujus corruptio cò majorem admirationem excitavit in Medicis quò minore viderant virium jacturam biduo ante mortem; quæ morbo proculdubio diutius reluctabatur, tum ob uberem humidis radicalis copiam, tum ob solida incrementis corporis fundamenta. *Tulpius lib. 4. Observ. 1.*

OBSERVATIO XX.

Paralyfis à pure inter cranium & duram meningem.

§. 1. **A**DOLESCENS annorum xiii. fuisse lignea è salice, levi quidem illa, sed ex alto demissa; accepto contemptibili, ut videbatur, vulnere in capite, absque cranii fissura fracturæ, oborta 6. die inflammatione in vulnere, sequente *Convulsione & Paralyfi* in crure dextro & brachio sinistro, cum febre & delirio xi. die tandem moritur.

Detecta & abscessa primùm capitis cute, pericranioque amoto, vulnus sedem penitus perspeximus: vidimus qua parte telum impactum fuerat, os livens, contuso utique à ligno pericranio atque etiam ipso cratio: Dissecto rursus cranio, è regione partis vulneratæ, inrer cranium & duram meningem, pus inventum est, quod mox dissecto osse effluere cepit; non copiosum tamen, sed lividum & fixens: membrana ipsa leviter intenta inventa fuit, non tamen colore demutata, &c. *Franc. Valleriola Obs. 1. lib. 3.*

§. 2. Vinitor accepto vulnere in bregmate paralyticus factus, &c. post mortem reperta sanies Inter cranium & duram meningem sat copiosa; &c. *Idem lib. 3. Obs. 8. Vide historiam integram lib. 4. tit. de Puls.*

S C H O L I A.

Consensus & paralyfi, &c.) Quare illi qui vulnerantur e.g. in parte dextra aut sinistra, incurunt Paralyfin partis oppositæ? Quidam imaginantur causam esse defectum spirituum, quia spiritus animales non confluunt ad illam partem, ob magnitudinem inflammationis quæ fit in parte affecta, & sic locus oppositus destituitur spiritu: Hæc sententia, si sermo sit de paralyfi quæ statim post ictum accidit, vera est:

nam si simpliciter hoc esset verum omnes phrenitici essent paralytici: Nolo negare fieri etiam ex inflammatione, ubi hæc desinit ad gangrenam; videtur exemplum apud *Dodmannum* Observatione secunda. Vera causa est consensus seu impetus spirituum & humorum, qui cecidit in partem oppositam propter vehementiam ictus: hinc plerumque fit ut pars contraria non dissumpatur, sed fiat raptura

topertura cranii in parte opposita: nam omnes Medici, præter Celsum, invenerunt propria experientia oppositam dissonantiam. H. Saxonia Pomer. lib. 1. cap. 10. Astruc lib. 1. de signis chron. cap. 7. causam refert in *genuis iniquitate*, permutationes nervorum decussatum factas: consensu Dion. Cæsius Iacrosophista publ. 41. Adquir Cæsius in question. Hofmann, in instit. lib.

2. cap. 81. videtur Martium comm. in v. 377 scilicet 1. lib. 1. Epidem. &c. Van Der Linden in Medicina Physiologica, Multa de hac materia superius adducta. Reperta ianæ, &c. A sanie in vertebra decumbente, præcedente abscisso, se oriam vidisse Paralyin in Bernarde Thersiane, locoto suo, tradit Saxonia Pract. Præf. part. 1. c. 13.

OBSERVATIO XXI.

Paralysis ab abscessu Cerebri, & aqua limpida in sinistro ejus ventriculo.

Miles 27. annor. temperamenti calidi & sicci die 9. Aug. 1638. acinace sauciatus fuit in posteriore capitis parte, cum læsione ossis occipitis: Hoc vulnus ab initio tractatum quasi simplex, usque in diem 31. Januar. 1639. quo æger fuit receptus in nosodochium, ubi Balnearior vulnus, partim cicatrice & partim excresecientia carnis obductum, specillo obtuso & tenoi exploraturus, illud ad tertiam longitudinis partem, recto tramite, non tantum in fissuram cranii & ambas cerebri membranas, verum etiam in ipsissimam cerebri substantiam (ex qua multum puris effluxit) immisit: Die 1. & 2. Februar. patiens de oculorum gravitate conquestus; die 3. vocatus, inspecto vulnere & consideratis circumstantiis, ob profundam imprimis specilli intromissionem, anguem in herba latitare suspicatus sum: unde cutim & pericranium scalpello statim incidi, &c. Die 4. inspecto vulnere rimam cranii longam & satis latam inveni, &c. Die 6. æger conquestus est de vertigine & dextri oculi dolore; iterumque die 8. &c. Die 15. fungi majores visi, &c. die 19. magna puris copia per fungorum interititium effluxit, &c. Die 20. dextrum latus omnino fuit *Paralyticum*, &c. Die 6. patiens loquelam amisit, cerebrum Caro fuit correptum, & brachium dextrum motibus convulsivis agitarum, &c. Die 23. obiit.

Aperto per serram cranio, interna ossis fissi superficies in tantum fuit corrupta, ut torum occipitis os usque ad futuram lambdoidam tenuius esset quam os petrosum: Mox specillo obruto intra fungos posito, abscessum deprehendi magnum, qui in sinistro cerebri latere latitavit, proprio folliculo circumseptum: Remotis proximis cerebri integumentis, cerebrum ipsum cum abscessu tunicato monstravi, Er processum duræ matris falcatum elevavi, ut spatium quod est inter dextram & sinistram cerebri partem, cum suis vasis & spiritus inspicere posset: Cerebro transversim inciso, & magna ejus portione, citra læsionem ventriculi sinistri ablata, abscessus in conspectum venit, ex quo pus steridum magna quantitate effluxit: detergo per gossypium abscessu, in circumferentia apparuit crassa aliqua membrana quæ materiam purulentam continuit: In vicinis autem partibus nullum adfuit vel inflammationis vel corruptionis signum: his consideratis, ventriculum cerebri sinistram aliquantulum compressum, dextrum verò minime depressum, sed aqua limpida distentum ostendi: In sinistro plexus choroides pallidus, in dextro rubicundissimus apparuit: Ex dictis causam Paralyseos dextri latetis, vertiginis, doloris dextri oculi & hesternæ convulsionis dextri brachii habemus: Ideoque ubi læsum & fissum cranium, & fungosa caro subcrevit, ibi certissimum signum est, si non substantiam, saltem cerebri membranas vel confusas vel laceratas esse. *Scaltes Observat. Chirurgicæ. 19.*

OBSERVATIO XXII.

Pueri Paralytici, post cerebri vulnus, repertum est cerebrum ex parte exhaustum.

Puero sexenni ex alto baculus in sinistram capitis partem perpendiculariter decidebat, unde fractum ad mensuram crassitudinis baculi cranium: E parvo tamen primum ossisincipitis foramine, cerebrum paulatim prodiit instar fungi, donec tandem sponte decideret: Statim ab illato vulnere convulsus est in opposito latere, mox in eodem, quo latus, *Resolutus*, deinde iterum convulsus, donec vitam 15. à vulnere accepti die cum morte commutaret, exhausto usque ad corpus callosum cerebro. *Ioh. Beverovicium Epist. ad Th. Bartholinum, in hujus Epist. cent. 1. Ep. 93.*

OBSERVATIO XXIII.

In Paralytico adultæ ætatis laxæ & hiulcæ cranii sutura reperta.

Quidam laxas & hiulcas suturas, ut pueri, & nonnulli etiam homines habent, quod in Govino 45. annos nato Pictavi observavi, qui universali nervorum resolutione perierat, calvariaque tenuissima erat. *Vernunianus comm. ad lib. Hipp. de vulner. capitis.*

OBSERVATIO XXIV.

Paralyſis ab ichore ex carie cranii exudante.

IN cranio juvenis qui Paralyſi extinctus, undique tempora verſus à lue venerea caries, utraque membrana ei tenaciſſime adhærente. *Vide lib. 4. tit. de Lue venerea.*

OBSERVATIO XXV.

Paralyſis dextri lateris à cerebri apoſtemati.

Puer lethargicus, dum profundiffimo ſomno detineretur, videbatur hemiplegia laborare, nam tota pars dextra neque movebatur neque ſentiebat: Mortui cerebrum & cerebellum in parte dextra, vergens ad poſterioriorem partem, omnino ſanioſum, putridum, &c. *Vide Tit. de Soporoſis aſſectibus.*

OBSERVATIO XXVI.

Paralyſis crurum ab affectu ſpinali medulla è regione renis ſiniſtri affecti.

IL. N. corripitur febre lenta aſſidua, poſt ſenſum & motum utriuſque cruris amittit: Ren ſiniſter repertus niger, & ab eodem latere ſpinalis medulla affecta. *Vide tit. de Febribus lib. 4.*

SCHOLIA.

A *Ab eodem latere ſpinalis medulla.* Maligna in Renibus inflammatio producta, ſpinali medullæ communicata, potuit ſpiritum ac vitæ animalis inſuſionem accreſcere, quæ per propagines nervorum ſexti paris: velicæ imperitius veſicæ etiam ex medulla ſpine, quæ partes inferiores lumborum trajicit, excurrit, ut vegetioris ſenſus compoſ effecta, ea quæ ex naturæ legibus ſibi moleſta ſunt perſentienti, excutiat: atque depellat, nec etiam præcludit ſpiritibus,

ne fluant per nervos qui ad coxas & crura, ex infimis lumborum vertebriſ, atque oſſis ſacri quatuor foraminibus emerſerunt, omnes ſerè in unum funiculum conſecti, parte poſteriore qua coxa ampliffimum gerit, in crura protrudunt, ſmo & hamo:is repulſi malignitate ſenſendum eſt copiam ſpirituum diſſipari, qui ad ſpinalem medullam & partes inferiores delegantur. *Lalou à Fontenay, 19.*

OBSERVATIO XXVI.

Sive Exempla varia Paralyſeos vulnus cerebri ſequente, ob variam cerebri leſionem.

§. 1. Juvenis læditur in regione bregmatis ſiniſtri, poſtridie dextri lateris convulſivi motus, ſiniſtri Paralyſis obſervatur, &c. Tota regio bregmatis ſiniſtri contuſa deprehendebatur, ut ſua ſponte viij. oſſa ſepararentur, de quibus unum acutius in ipſam ſubſtantiam cerebri per utramque meningem depreſſum inveniebatur. *Lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§. 2. Patavi 1644. Procurator nationis Germanicæ, ex levi capitis contuſione, neglectis per imprudentiam remediſorum præſidiis; primo pedum brachiorumque Paralyſi, mox maiori inde fato oppreſſus.

Inelevati cerebri compage nullum alicujus momenti vicium præter abſceſſum in oppoſito latere comparuit. *Th. Bartholinus cent. 2. hiſt. 34.*

§. 3. Puer ex vulnere in oſſe frontis ſiniſtra parte; xl. die in reſolutionem acrius lateris incidit, tertioque poſt moritur: Alienarum & cancro affectum cerebrum inventum eſt; ſanguis enim ex tenui omento erumpens cerebro vitium fecerat & inflammationem excitarat, à qua abſceſſu factò & aperto pus in ſpinalis medullæ nervos dextros decubuerat, *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§. 4. Nobilis circa tempus dextrum læſus eſt, Species Pareſeos in parte eadem ſequitur: Aperto cranio ſanies exigua apparuit: In cerebri penetralibus Abſceſſus erat. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§. 5. Henrico II. Galliarum Regi, ex venæ tenuis meningis in occipite ruptæ ſanguis erumpens abſceſſum fecit, quo rupto pus in ſpinalis medullæ nervos dextros decubuit & reſolutionem dextram creavit. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§. 6. Studioſus vulneratur in occipite: die 9. febris obotitur, quam Paralyſis partis dextræ (vergebat vulnus ad latus ſiniſtrum) excipit: Siniftra pars cerebri multo laxior apparebat, duræque mater circa tertium ſinum proſus livida, *Ibidem.*

§. 7. Miles vulnus in capite accēperat; sanguis impetuose ex arteria effluebat, ut vix fisti posset; Empiricus purum aluminis ossi inspersit, hinc subito partis affecta, quæ erat dextra, Paralytis; Sanguis plurimus intra meningem duram & calvariam collectus extra venas erat. *Ibidem.*

§. 8. Quidam venabulo supra tempus sinistram inflicto prostratus, brachio dextro resolutus fuit: Multum cruoris intra cranium effusum erat. *Ibidem.*

§. 9. Vulneratur quidam punctum circa os temporis, post aliquot septimanas extinguitur convulsione partis dextræ & Paralyti oppositæ, symptomatis consuetis: Inter membranas & substantiam cerebri ingens copia puris deprehenditur. *Ibidem.*

§. 10. Cuidam vulnus illatum in superiore capitis sinistra parte, cum instrumento re-tuso, &c. Ingravescente malo universum dextrum lacus resolutum est, &c. Reperta est dura meninx sinistra parte livens, cum sublatra cerebri parte sphacelo correpta, &c. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§. 11. Arelatæ gravissima visa est Paralytis ex levi vulnere illæso cranio, sed sanie per meatus suturæ sagittalis ingressa sensum ad tenuem meningem, quæ cerebri substantiam obvolvitur, nervos, venas & arterias sustentat, unde primum ejusdem partis Resolutio, ex qua mors sequuta est: Secto cranio pus inventum, *Scutigraphum ad cap. 10. lib. 1. Hollerii de morbis int.*

OBSERVATIO XXVII.

Paralytici, lue venerea inquinati, membranae cerebri cranio carioso tenacissime adhaerebant.

IN cranio Juvenis qui Paralyti extinctus, undique tempora versus, à lue venerea caries, utraque membrana ei tenacissime adhærente. *Rhodus observ. 34. cent. 1.*

SCHOLIA.

DEBilitato nempe calore naturali credibile est nervos ita fuisse relaxatos, ut gravissimus inde subortus fuerit affectus. *idem.* Nec enim in ichorem à carie exsternam causam reicienda; quod hinc potius ipsi & epileptici oris debuissent, vellicibus ab ejus acrimonia nervi.

OBSERVATIO XXIII.

Paralytis corporis inferioris ob contusam Spinalem medullam à globo sclopeti.

Puella nubilis è pago vicino anno 1611. Basileam revertens, & à tergo cuidam in equo assidens, exploso sclopeto à quodam, statim resoluta, inferiore corporis parte à media lumborum sede, penitus facta est, adeo ut nec pedes nec illorum digitos ullo pacto movere posset, nec sensum ullum perciperet, sicque domum devecta est: Chirurgus vulnus in dorsi media fere sede deprehendit, cui curam adhibuit, quod à casu ab equo factum putabant: Vetum cum in superioribus partibus nullum alium sentiret defectum, arque inferiores omnino resolutæ & stupidae manerent, hisce curandis & Chirurgus & mulierculæ consilia varia dantes, inter cætera stuphas pedibus adhibuerunt, à quibus vapo- adeo fervens suscitabatur, ut cum ob stuporem ardorem non sentiret, pedes ab imo ad coxam usque, ac si ab aqua fervidissima combusta esset cutis, adusti nigricantesque apparenter admodumque tumerent: Vocatus adeam cum de principio & causa hujus casus rogarem, narravit mihi se cum bombum bombardæ, quam comes itineris equitans dispoſerat, audisset, eodem momento ac si tergum suum tactum esset, dolorem sensitse, subitoque animo defecisse, nec an ceciderit, an à comitibus retenta fuerit & ab equo relevata, se scire, donec recepto animo se vulneratam & resolutam senserit: Cum vulnus inspicerem, erat illud in latere dextro dorsi, juxta 8. vel 9. illius vertebra, & ad spinam vertebrarum illius obliquè intrinsecus declinabat: Erat autem vulnus exactè in cute rotundum, in sinum profundum desinens, & cum in ambitu contusionis nullum signum appareret, ex ictu glandis accidisse suspicans, jussi vestes afferri, quæ similiter rotundo foramine, uti & indusium perforata, meam sententiam globulo sclopeti hoc vulnus factum & spinalem medullam læsam fuisse confirmabant, uti & Chirurgi alii, postea vocati, idem indicabant, & præsertim cum stylo immisso vertebræ portionem abruptam deprehenderent: Quia verò jam exactis à læsione decem diebus, quibus de superiorum partium affectu aliquo non admodum conquerebatur, tunc vero pejus habere inciperet,

vom-

vomitūque gravari, & de ardore superioris partis spūsæ, capitis dolore ac spasmo circa cervicem conqueri, hisce emendandis remedia, uti & vulnere fuisse præscripta, prognostico interim præmissio incurabilem hunc fore affectum, uti mox apparuit, nam xx. post eum quo hoc accidit, die expiravit.

Et cum adhuc dubium apud authorem facti, uti alios aliquos esset, à sclopeto vel casu ab equo hoc evenisset, licet constaret eam non ab equo cecidisse, sed post sclopetum explosum, animoque mox deficientem, ne ab equo caderet, & ab eo cui à tergo assidebat, retentam fuisse, ut globus adhuc in corpore detineretur, si ab ictu illius factum fuit, cum nullus alius pateret ipsius exitus, necesse erat: Itaque cum in vulnere per sectionem post mortem dilatato nihil inveniretur, illudque vertebram subiret, exempta spinæ dorsii aliqua portione, eaque juxta vulne-^{ris} ingressum dissecta, globus plumbeus spinalem medullam disruptisse, atque in corpore vertebræ subtilissime tandem deprehendimus: globus is appendicem habebat, cui chartam, quæ pulverem tormentarium recipit, adligare solebat, eratque globus ex parte illa, qua os retigerat nonnihil dilatatus, uti sæpe hoc, si globus os in corpore tangat, nec illud penetret, accidere observavi. *F. Platerum.*

S C H O L I A.

NEx *sensum adum periperet.* Gravis est Paralyseos species in qua *scutulas* etiam sensitiva afficiuntur cum motiva: Talis utriusque simul noxa fere tantum accidit, in quantum spirituum ductus & motus firmius occlusi, ipsorum, sive proutum sive retorsum tendunt, irradiationem omnem interceptam: Quod inieciunt, licet rarius à materia morbilica è cerebro in medullam oblongatam delapsa, sæpius vero propter graviores spinæ lationem, uti plaga, casu ab alto, ac ut vulnere eidem inflicto contingit: Nam ob tales occasiones sunt medullæ compressæ, aut distenso nimis, aut intorto, *(autem distrupte, ut in præfati casu)* spirituum tractus omnes delinunt. Quod si inquirimus cur non sensus æque ac motus in Paralyti semper inhibetur, si quidem uterque perficitur ab eisdem nervis & fibris, ac, uti videtur, intra eosdem tractus medullares, ita neminem ut altera fa-

cultas sit tantum alterius inversio? Dicendum, quod sicut lux per vitium radiat ubi ventus excluditur, ita & sensui adhuc salvo motus sæpe aboletur: Præterea sensus est tantum passio atque impetussio sensibilis, quæ continuatur processibus nervosis ab organo ad sensorium commune sine quovis spirituum viarum molimine propagatur: quod fieri possit etsi commune sensorium aliquatenus obstruatur, equique incolat spiritus obtorpescunt, aramen motus est actio difficilis & laboriosa, ad quam requiritur ut spiritus se vegete expandant, & non tantum organis motivis, sed præcipue circa partes, ubi motus principium, equique primus impetus est, exinde totum per partes nervas commearum, nixus quasi explosivos edant: Quare cum spiritus pauci & ligati pro sensu sufficiant, ad motum plures, & quoad expansiones facis liberi & expediti requiruntur. *Widm.*

OBSERVATIO XXX.

Imbecillitas totius corporis & Anæmia, pendens à liene & hepate semipetridis.

JAgers diu conquestus est de Imbecillitate totius corporis, &c. Hepatis color erat omnino mutatus, substantia laxa & putrida, lien similis hepati. *Vide lib. 3. tit. de Hypochondriarum dolore.*

S C H O L I A.

Præter Paralytū, in quo ob spirituum vias obstructas, ipsorumque narcosi quidam affectus, in toto aut partibus respectivis, facultas loco motiva aboletur, aut plurimum impeditur, datur alia hujus morbi species, à spirituum inopia & paucitate dependens, in qua etsi motus nulli parti aut membro procius deficit, à quibusque tamen nonnulli debilitantur tantum aut depravate peraguntur: Nimirum affecti *anæmia* licet immunes, membra tamen fortiter movere, aut pondus aliquod sustinere nequeunt: Insuper in actu quovis motivo astutum tremore laborant, qui tantum debilitatis & tobocis præfati in potentia motiva effectus est: Cum enim deficient vires pro membro quopiam firmiter & omo molimine attolendo, consui sæpius repetito natura vacillans agit, proindeque pars in motu exiens velut concussa & trepidare cogitur: Cui accedit quod cum fibræ nervæ hæcrescentes nimium tonicum, seu sensum in regimine animalis sustinere nequeunt, illæ ultimam suam potentiam exercere auferentes, motus quasi spasmodicos incurrunt, eoque perpetuo iterant: Qui ad hunc modum à spirituum animalium paucitate, sive

inopia, proindeque ab illorum in systema nervosum dispensatione pauciori & diminuta Paralytici evadunt, tali affectioni propter varias causas & occasiones obnoxii sunt: primo *Senectus extrema*, seu valetudinis, item sanguinis aut humoris genialis impendia immodica, diathesis ejusmodi paralyticam plerisque hominibus inducunt: carens nimium & sanguine effuso & pene vapidum, spirituum animalium penus oculis peretrigens in cerebrum extillat: Secundo, ob eandem fere rationem *Arthritidis* valde & *Cachymia* facultas locomotiva plurimum vacillat: nimirum tales exercitio cuius fortiores impares, infirmæ ac imbecille gradiuntur, à demutatione longiori, aut paulo citius plucium delatantur, porro à nimio quovis gravioli sæpe stuporem in acibus, cum movendi impotencia patiuntur: quodquidem enim his massa sanguinea valde aquosa, & impuritate repleta existit, cumque cerebrum debilius, & quoad poros laum feculentias quavis ita se facile admittit, propterea spiritus animales pauciores tantum procreant, illique haud sinceri & subtilis, verum hebetes, & crassioris materie adhesionem

Ce a impediet

impediti (quavis non semper adix viarum ob-
structione, aut diathesi narcotica) sese in natus mo-
tivos explicare nequeunt: Tertio, non tantum *Ser-
tani* sed & plerique alii à morbo chaotico egre ac
tarde convalescentes artuum languore, & membris
à debito vigore ac robore plurimum relinquitur, affi-
ciuntur; ut cum stomacho valeant, eorumque pul-
sus & urina laudabiliter habeant, ipsi tamen quasi
entres & elumbes, motus locales via ac ne vix inire
audeant, ac inios haud diu perficiant: Quinimo
nonnulli, absque ægrotatione notabili, longo tempo-
re quasi propediem moribundi lecto affiguntur; dum
imperturbati recumbunt, cum amicis colloquan-
tur & alacres degunt: Externi autem vel incedere
nec volunt nec audent, imò motum quemvis, quasi
horrendum quiddam averitantur: Proculdubio in
his, etsi spiritus animales totum genus nervosum
quodammodo actuant & itadant, tamen eorum
copiæ ita tenues & minus confectæ cassius, ut
cum plures spiritibus alibi ad motum in ipsum ag-
glomerari debeant, magnum est periculum ut fla-
tium in vicinia continuas eorum absumptur, proinde
in paribus nervosis tenditas solvantur: Quare cum
spiritus cerebri incolæ, alioquin in membris disposi-
torem debilitatis comiti sint, ipsi motum localem, si
quidem difficile nimis pensum, facili suis imponere
recusant: quomobrem affecti vix ulla perturbatione
ducuntur expectari utrum incedere possint, necne:

Verumtamen qui spirituum inopia laborantes, eos
quoad possunt in motus locales urgebunt, maxime
primum excitati sumiter graditi, brachia hac illuc pa-
tulare, aut pondus auollere valent; ante meridiem
vero, spirituum qui multuculos inflexerant peno sese
absumpti, vix inani aut pedem movere possunt:
In huiusmodi *Ignia Paralyti* à spirituum animalium
defectis, & debilitate potius quam obstructione
oriunda, suspicari licet non modo ipsos spiritus,
quoad primas eorum copias, & particulas origina-
les, in vizio esse, sed insuper aliquando motus localis
imbecillitatem & impositum, aliquatenus etiam
à copulæ explosivæ, ubique in fibras munitæ è
sanguine iustitæ, vizio pendere: Etenimvero è sangui-
ne valde cacoehymico, proindeque vappido & effice-
to (*qualem signant viscera à quatuordecim infervientibus male
confectis*) licet spiritus animales nonnulli pauciores
cerebro insilliantur, ita probabile est ipsi è cere-
bro in nervos derivatis, ac demum intra fibras mul-
tuculos dispositis, particulas alias nitrolinque
(quas ad motum muscularem necessario requirit alibi
ostendimus) è sanguine ita visioso non nisi hebetes,
& à potentia elastica di generes accedere: propte-
rea quidem ut à ipsiisibus intra multuculos ita perpe-
ram concretis, non tenus ac à pulvere pyro læcu-
litatis crassissimis retero, explosivum actus &
tarius & debilius excutiantur. *W. H.*

cap. de Paralyti.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMII

SECTIO XVI.

De Hydrocephalo, five Hydrope capitis.

OBSERVATIO I.

Hydrocephalus ab aqua inter cranium & pericranium collecta productus.

BOGISLAA Nicolai, &c. Sexto mense gravida abortum rejecit, cætera non
intelligentem, sed à temporibus & fronte nucham versustumore ingenti de-
formem, qui mixtæ Turcicæ similitudinem gerebat: Mox tamen sponte aper-
ta prope sinistram aurem cute, evacuatæque inde aqua loturæ carnium simi-
li, concidit & flaccida cute quasi disparuit, nisi quod immisso flatu eandem figuram tur-
binatam & ovalem nancisceretur.

Refecta ista in particulas membrana crassiore, calvaria ostendebatur naturali forma,
sicut in puerulis solet: E jugularibus autem veis, intra processum ossis jugalis tempo-
rum, ambiens & situras mendasas, ad os frontis usque sese ostendebat, proximæque
cum pericranio copulatus cernebatur, qui crassitie stilum ferreum intortum referebat:
Icoem non addo, illi hydrocephalo similem, quam dedit M. A. Severinus, de Abscess.
cap. 9. ut ovum ovo similis non sit. *Th. Bartholinus Tract. de Coma, p. 97. ex communica-
tione Friderici Hammerici Medici Helsingensij.*

SCHOLIA.

DE hoc abortu dubitæ *Hammericus* an pro mon-
struoso vel morbofo sit habendus: de illo cer-
tum esse vulgus, de hoc te judicare Hydrocephali esse

miram nec vulgarem speciem, quum ab omni s. vel
6. mensium tantæ magnitudinis efici peritum sit:
Pulle vero per vaia lymphatica venas jugulares comi-
tantiæ

tancia aquam deponi in istam cisternam : quamquam actio sympathetica excludi non debeat, huius enim hinc mulier in sua memoria infirmiorum, quod pridem ejus culpa infanti Chirurgo acciderat, qui in leberem ferventis aquae demissus post paulo exspiraverat. Ego iudicium Medici magis laudo quam vulgi superstitionem : Re enim accuratius examinata, Hydrope capitis iste abortus laboravit, nec adeo raro nec periculoso si extra uterum definito tempore processisset, ideoque non tam monstruoso quam vulgo creditum : Inter omnes enim hydrocephali species, ista & frequentissima est & maxime indolens, quae pericranium inter leui cranium & cutem pilosum oritur, alibi nobis visa & observata, reliquis intra cranium periculo magno non contentibus, nec curationem admittentibus : Nobles enim hic cerebri partes premuntur, vel potius supprimuntur : Ibi exterior afficiuntur, quae per incisionem curantur, ea cautione quam Aquapendens affert in oper. Chirurg. ut per canaliculum immixtum sensum aqua evacuetur, vel diffundentibus immineatur, sicut naturali evaporatione per poros & pilos quotidie caput depleri videmus : De internis consensum habemus veterum Medicorum, esse perniciosissimos & inaniabiles, in quibus, ut Arabes loquuntur, non sit ingenium carationis : De utroque tamen tam externo quam interno veteres vel falsos credo vel munitos : Falsos quidem, quod aquam inter cranium & pericranium colligi dicunt, adeoque hanc hydrocephali speciem distinguunt ab illa quae inter pericranium & cutem latet : quem errorem, vel subtilem verius quam veram distinctionem ab Aegineta, Aëtio, aliisque traditam sequuntur longo agmine omnes Medici : Ego vero pro una specie habendas iudico, fieri quippe non potest ut pericranium ita distendi possit quin ruptum, adeoque ex duplici unam speciem faciat : Vix novacula separata in dissectionibus possunt, magnoque labore abeundum cerebationibus, ingentemque dolorem sensum hydrocephalicis excitat, quem raro advertimus : Ex duritie quidem & dolore exiguo pericranium distensionem suspicantur Chirurgi, sed vel compuncti pericranii id est signum ab incumbente tero acii, vel interioris hydrocephali in eadem degenerantis, & cum ossibus cranii membranam quoque hanc distumpentis.

Talis Hydrocephalus effecit quem *Panorini* vidit Pentecoste 5. Observat. quadagesima septima, in puella, cui sunt alicubi erant tejunctae, alicubi vero uniae, sed in ipsa cranium erat perforatum, etenim multis in locis aderant cavitates rotundae, aliae majores, aliae minores, per quas humor exiret, distendens cutem, magnitudinem capitis augebat : Hinc una incisione utrumque tumorem externum curavit Albucasis, & uniusque signa conjunxit Aëtius retr. 2. l. 2. c. 2. quae distinguat Aegineta, contra Hipp. & Celsum qui lib. 4. c. 1. coris tantum meminit, quae humore infusa, ne arrem per se difficilem tubuloribus magis quam necessariis distinctionibus oneraret. Manca quoque est Veterum distinctio, quia aquarum collectionem neglexerunt, quoniam inter ventriculos cerebri posteriorum diligentia observavit Galenus liagogen cap. 12. Inter iv. hydrocephali species ventriculos excludit, forsitan quia raro ventriculi aqua replentur quin ad exteriora exundatur, vel tell-

quae sub cransio & extra cranium partes afficiuntur, quoniam una cerebri substantia eamque ventriculi compunguntur.

Hac compositione ad eas angustias compellitur cerebrum, ut in hydrocephalo quodam polam palmariam non excedens videtur *Paracelsus* lib. 7. cap. 1. Ventriculi ipsi non tantum aqua capta ad idram & ultra replentur, quod observavit *Christianus Observ. 6.* Sed adeo extendunt cerebrum secum ut gyri oblietentur, quod observavit *Hildanus. Vide Observ. xvi.* Vel in vertice membranae inflat tenae apparetur, quod vidit *Valsalva (vide Obs. vi.)* vel amissa figura globosa sequatur forma convexi fornici, apud *Isauro*, (vide *Observat. ix.*) Imo quandoque cerebrum universum distendit, juxta *Zanoni*, Aut ea cerebro latus aqua tumens dissolvat, ea *Fontenei, Præli. lib. 1. cap. 3. Vide Observ. x.* Helsingiensis vero Hydrocephalus, inter cranium, quod illatum, & cutem aquae iugum congester, potius periculi expers, nisi lava viam denegassent & corporali perfectione.

Per quas vero vias consistat aquarum in caput tumidum fiat, difficile non est divinare, nec veterum commenta in eam rem advocabo : Lymphatica quidem via huc pertingere nec dum observatum : Igitur ea arteria deponitur aqua in eadem locum : In interiori vero hydrocephalo diversa ratione glandulae plexus choroidei in his attentibus lapsus inuoluit advenit. Exc. *Widius*, unde hanc viam lymphaticorum indicat, quod recipiat ea sanguine circulo leum abundans, remittitque si copiosius sit quam ut venae istam reducant, in ventriculos cerebri : Hydrocephali hinc origo potenda, quando nempe major terti copiae arteria infunditur glandulae choroideae, quam per venas forsan vel calles, vel nonnulli obstruatas reveli queat, in cerebro resistit, vel in eadem ventriculis haeret tanquam in cisterna, & aucto in dies affluu universum caput inundat extenditque : Hec causa est quod fere tantum in aegris glandulae istius plexus obviatur, experientia *Franc. Syrus* dilput. 4. §. 12. quia scilicet a tero augentur, Et inde quoque ortus repetendus hydarum parvularum illi plexui adnatarum, glandulae ipsae manifeste turgidulae & duris, quales in cadavere *Walthei* annosar Doctoris *Wesseri* de Apoplexia, huius 3. quae si supervixisset, vel hydrope cerebri, vel apoplexia periret.

Atque hydrocephali nostri renella nos terret non debet, quicquid obsterices veteranae garriant : Nulla fere aetas eximenda, quanquam puerorum ossa mollia, & cerebra humidiora huic malo magis sint opportuna : In decenni puero vidit *Zacutus*, in puella 6. annorum *Fallopianus* : Puerosum 5. annorum vidi cent. 1. histor. 25. Quibus annoamendans puer bimulus apud *Ingrassiam* de Tum. cui per hydrocephalum sospetores omnes & legitime uxor, praeter unam lambdoideam, quae parum habuit, ita erant diductae, ut aqua incumbens cerebro per diaphanam cutem transiret.

Simile Hydrocephalicis abomus, ab aqua inter cutem & pericranium consistente, vide apud *Ephraim Ferdinandum*, historia xxi.

OBSERVATIO II.

Hydrocephalus ab aqua collecta in anfractibus cerebri.

IN Cadaverulo sexannorum vidimus hydrocephaleam, scilicet aquam in capite, quæ collecta erat inter cerebrum & piam matrem, in anfractibus illis, eratque limpidissima aqua, satis copiosa respectu loci patientis. *Fallopini in Observationibus à Franc. Machino editis.*

OBSERVATIO III.

Ab Hydrocephalo interno processus mammillares saepe corrumpuntur.

Proecessus mammillares ob plures causas corrumpi queunt: Si Hydrocephalicorum capita recludimus, plerumque in iis, si cerebrum ista aqua perfusum est, hi proecessus viciose se habent. *Schneiderus lib. de oss. cribriformi p. 306. & lib. 2. de catarr. c. 2.*

OBSERVATIO IV.

In Hydrocephalo plexus choroides collabitur, laxata à nimio madore glandula Pinealis.

Non levis momenti res est quod glandula Pinealis plexum choroidem, alioquin laxependentem, atque in se concidere, aut saltem extra propriam sedem dilabi aptum sultenter, & in debita expansione contineat: Quare sæpius adverti in Hydrope cerebri, quod hæc glandula, radicibus à nimio madore laxatis, & non raro abruptis, loco suo dimota, plexum choroidem ab expansione propria colatbi, ac inferius subsidere, &c. non vasa ejus inordinate complicari linat. *Willis Anat. cerebri cap. xiv. Vide Scholia ad Obs. 1.*

S C H O L I A.

Observare est quod plexus Choroides glandulis quamplurimis minutibus stipatur, & ubi vis intertextitur, quæ ferunt à sanguine in vasis minoribus secretum imbibant; idcirco propter idem hoc officium, ubi vasa omnia concurrunt, Pinealis glandula, majori mole prædita collocatur, ut ferocitates illæ uberius deponas recipere & continere valeat. Observare demum est in omnibus ejusdemque speciei aut formæ animalibus, quod hæc glandula, juxta foraminos aut ductus ad infundibulum parentes, semper poline, plexus choroides continuo adjungitur: quoniam hic plexus (de glandula pineali proceßum ejus

medium sustentante, tanquam de fibula aut clavo suspendi vilius exinde) in binas alas hac, illuc, super medulle oblongæ circa expositus, dividitur: Quare plexus hujus gratia glandulam istam præcipue conditam esse, suspicamus, episcopus minus non aliud omnino esse quam aliarum glandularum, quæ juxta vasorum sanguiferorum concitus disponuntur; nempe ut humores ferocis, à sanguine arterioso dispositos, excipiant & in se retineant, donec aut venæ depletiones factæ eisdem resorbant, aut lymphæ ductus (si qui adferunt) eos citra convehant. *Idem, ibidem.*

OBSERVATIO V.

In Hydrocephalo glandula cerebri intumescunt & in conspectum veniunt.

Glandulae plexus choroidis, & per alios plexus vasorum interfertæ, in cerebro Hydroptico aut humidiori, quæ alias perexiguæ, ut fere visum fugiant, à madore intumescunt facile percipiuntur. *Th. Willis cerebri Anatomies cap. 7.*

S C H O L I A.

Observatis vasis Lymphaticis jugularibus humorem aquosum, aut inter cutem & pericranium, aut inter ipsum cranium collectum effundi, à quo

idcirco, morbus infantibus maxime familiaris excutitur, inde totum caput intumescit, censet, *Jac. New. Pauli in Anat. Belfiana cap. 8.*

OBSERVATIO VI.

Hydrocephalus ab aqua cerebri ventriculos replente.

Augusta Vindelicorum puellæ bienni caput in mensibus plus minus septem ita increverat, ut nullum viri unquam viderim quod non mole illi cederet: fuitque is affectus quem veteres Hydrocephalum vocarunt, ab aqua quæ in capite aservatur, sensimque colligitur: Quanquam ea non inter calvariam & exterius ipsam succingentem membranam, aut cutem, ubi alias aquam reponi Medicorum libri docent) huic puellæ fuerit collecta, verum in ipsius cerebri cavitate, adeoque in dextro sinistroque illius ventriculis, quorum cavitas amplitudine ita increverat, ut novem fere aquæ libras, aut tres Augustanas vini mensuras continuerint: Adhæc, ut cerebrum in capitis vertice,

tice, membranae quasi modo erat tenue & quodammodo continuum cum tenui sua membrana corpus, ita quoque calvaria fuit prorsus membrana, tantæque ductaxat sede ossa, quanta calvaria puellæ erat amplitudo, priusquam caput extra modum in cresceret: ea fere ratione qua in super natis pueris frontis os & verticis ossa constare cernimus, ubi illa alioquin mutuo sunt contermina, & in admodum pueris insigni intervallo amplitudinæque videntur membrana: Cerebellum interim, cerebrique universa basis secundum naturam habebant, uri & nervorum productiones: dein nullis prorsus sedibus quam in cerebri ventriculis, adeo atque dixi adauctis, aquam reperi, & puella ad mortem usque sensibus omnibus integræ est usa: Et quoties caput, quum illam paucis ante mortem diebus conspexi, ad adstantibus movebatur, & nonnihil, quantumvis etiam leviter, erigebatur, gravis illico tussis puellæ molesta fuit, cum difficili respiratione & totius faciei miro rubore, singulisque suffusione & lacrymarum proventu: Reliquo corpore mediocriter habuit, etsi laxis infirmisque, sed non resolutis tamen fuerit articulis, neque præsentem etiam insigni macie, aut etiam seroso in membris tumore, aut morbo comitiali, aut tremoris alicujus moris: Jecur, cum paulo post mortem spectaretur, subpallidum, & nonnihil naturali alias jecore contractius duriusque occurrit: Liene interim maximo & molli conspicuo, perinde ac si jecoris vices aliquandiu obivisset: Adeo ut cum præsentibus Medicis nihil æque admiratus fuero ac tantam aquæ vim in cerebri ventriculis, absque majoribus symptomatibus tamdiu collectam fuisse. *Vesalius Fabr. corp. hum. lib. 1. cap. V.*

S C H O L I A.

IN dextro sinistroque ventriculo) Quandoquidem experientia testatur serum & humores extraneos non sepe numero intra hos specus reperiri, etiam illorum aditum extrinsecus diligentius inquirendum: Eo magis quia de specuum horum usu à nonnullis valde ambigitur, nec desunt in superio hoc seculo qui opinio nem antiquam de ipsius hinc loci genibus, exercitiisque, licet dudum explosam, redintegrare satagent, spiritus hic minime progigni, neque exciteri, oblationes super altaris, extra dubium censeo: nec minus certum fecit experientia Serotum colluvium hic tapies colligi. Itaque hoc tantum restat ut videamus unde illa, ac quomodo hoc constet. Et dein quibus excretionum viis eadem foras amandetur: Quoad prius, summuè probabile est laticem serotum, qui ipsitum recens productionem vchiculum est, ac una cum illis in cerebri poros introductionis, postea exoluum, ac in vaporem attenuatum, in hanc cavernam exudare, ibidemque de novo in humorem aquatum concretæ: Secus enim quid sit de humore isto, aut in quod aliud receptaculum derivari poterit? Præter hanc ordinariam, & puro assiduam, colluviei serotæ intra cerebri ventriculos congregationem, pro certo haberi debet quod à glandulis plexui choroidæo infernis, nimium repletis, ejusmodi serotus humor in ventriculos ita dictos exstillent.

Sapienter vero in hydrope cerebri glandulas istas innumuisse, & veluti heredes grana, à nimis madore crepantia, flaccidas evadisse, adeo ut serositates altius minime retinerent, verum eas in cavernam subiectam continuo deperierint. Profecto in hydrope cerebri in ventriculis semper aqua repleta consistunt, consensu effectus causa est sanguis aquosus factus, qui majorem sibi colluviem inter car. ulandum deponit, quam vena statim reducere, aut glandula sua exsuperare & revertere valeat.

Enimvero, quod serum usquequaque è vasu redundans in cerebri ventriculos melius dilabatur, ita comparatur est ut majores vasorum plexus, cum glandulis intermixtis, prope singulos in ipsorum ventriculos dispositi fuerint: quippe non modo plexus choroidæos juxta tristem ventriculorum in cerebro concursus, at plexus aliter, & non minus insignis (quem supra descripsi) cum glandulis majoribus, (pone

cerebellum, juxta quartum ventriculum collocatur. In omnibus eo ut videtur sine ulla cautum est, ut à sanguine qui aut cerebro, aut cerebello destinatur, pars aquosior, si quidem spiritibus procreandis minus idonea fuerit, hos vasorum plexus incurat: atam et si major sibi copia illis deponitur quam in lisdem contineri, aut extra amandari queat, quicquid ejus superfluum est, in cavernam subiectam delabitur. Hinc constat unde, & quo rita serotæ colluvies intra cerebri ventriculos congeritur, *Thomas W. de Cerebri Anat. cap. xii.*

Cerebrum in capitis verticis membrana quasi modo tenue, &c.) Cum in infantibus ac teetione ætate, crani suturae non tam arcte combinentur, ac in adultis, haud difficulter intelligitur quare minus comprimitur cerebrum ab aqua: In proventus enim ætate, ac senibus, suturae non tantum acutissime juncturæ, verum etiam non raro cranii planæ coalescit, ut vestigia tantum suturarum supersint. Hinc poris aqua, priusquam cerebrum premat, ventriculos dilendit, hac augescens, etiam suturas non argè cedentes develit, tandem etiam membranas expandit, imo & ipsum cerebrum, membranarum in modum ductile; unde caput ad eam molem, quæ in hydrocephalis conspicitur, excrescit: hinc aqua capaci spatio conclusa, minus premit & dilendit: In senibus autem quorum cranium durum ac compactum, si aqua quotidie incrementa dumat, defectu spatii, obvia quoque comprimere, atque coque donec ætatis omnibus spirituum animalium vis, apoplexia illos abstripiat.

Quantumvis leniter erigebatur, &c.) Tussis succedens, dyspnoea, faciei rubor, sanguinis suffusio, lacrymarum proventus, contrigerunt quod erecto capite atque pondere premeretur cerebrum; unde effluxu spirituum animalium prohibito, respiratio laesa fuit; & influxum viralem impedit, facies rubore suffundebatur: nullam enim viam in pulmonibus à Physico deprehensim.

Ad mortem usque sensibus integris) Hinc colligitur Modum, & aliis argumentis confirmat Physiolog. med. cap. 6. §. 11. cerebrum spiritus animales non conficeret quemadmodum enim, aut, læso hepate vel Liene in hydrope nullus laudabilis sanguis generatur, ita & in

hydrocephalo spirituum animalium elaboratio, adeoque motus & sensus debebat periclitari, contrarium tamen testatur experientia: Sic refert *Walsum*, &c., Sed

cerebr. si spiritus animalis in cerebro peculiaris ad motum & sensum elaboraretur, in hoc afflicta cessare illarum actiones debebant, vel ad minimum turbari.

OBSERVATIO VII.

Hydrocephalus ab aqua cerebri spatium occupante, idque ad angustias redigente.

Diffecabatur Lugduni Batavorum anno 1666. Infans unius anni, à puero hydrocephalus: Ex huius capite D. Van Horne extrahebat uncias 36. aquæ limpidæ subfalsæ: quibus extractis adeo apparebant cuncta vacua, ut quis exstimate potuisset cerebrum hic plane deficere: sed oculi acie eo penitus directâ, apparebat cerebrum nequaquam deesse, sed amissa saltem figura globosa, induisse formam convexi fornicis, & ab exuperante aqua sequacem ejus medullam adeo fuisse distentam, ut instar alicujus crassioris membranz, adhæresceret undique arcuatæ ossium circumferentiæ, ita tamen ut tam exterior cinereus cortex, quam interior albicans medulla optime discerneretur. Præterea 1°. sub cute nulla conspiciebatur pinguedo. 2. In thorace notabilis aquæ quantitas, illi quæ in capite continebatur similis. 3. tenes adhuc inæquales. 4. glandulæ pituitariæ & pinealis nullum vestigium, in pavimento tamen cerebri notabantur aliqua filamenta nervorum, materia quadam mucilaginosâ oblecta; quæ credita sunt esse filamenta seu propagines nervorum sexti paris. Ex *observationibus Alardi Hermannii Cunnii, Archiatri Brunsvicensis in Miscell. curijs. anni 1670.*

OBSERVATIO VIII.

Sectio infantis octimestris Hydrocephalo affecti, cujus ventriculi cerebri laterales aqua repleti &c. à Clar. Hornio administrata.

Capitis perimenter erat 1½. unæ: Tumor digito prementi cedebat non remanente vestigio; Cranii ossa, quamvis hiabant ab invicem, eo quo pueris solent loco, solito tamen ampliora erant, magis tenuia, ita ut cultro commode secari possent; nou multum ab similia cornubus ex quibus lucernæ fiunt. Dura meninx cranio arctissime annexa, Aqua, nec inter cutem & pericranium, nec inter pericranium & cranium, nec inter hoc & duram meningem, nec, quantum observari poterat, inter meninges, sed intra ventriculos cerebri laterales continebatur, Ejus quantitas octo pintas Leidenses, sive 160. uncias medicinales, h. e. tredecim libras excedebat: Aqua erat limpidissima, nullo notabili sapore prædita, nisi quod aliquantulum ore detenta, fælugine quadam linguam feriret: Cerebrum amplum, & pueri cerebro densius duriusque. Ejus anfractus omnes penitus oblitterati, contra cerebri laminæ egregie distinguebantur, Cerebellum totum cerebro minus affectum, Vasa quædam per superficiem cerebri serpentina sanguine turgida; Sinus falcis superior plane sanguine vacuus: Cerebri sinus laterales, quibus aqua continebatur, pro quantitate, æque distenti, adeo ut totum cerebrum nonnisi sacculus videretur. Glandula pituitaria flaccida & satis magna. Glandula pinealis nulla inventa, nescio an errore dissecta ablata: In plexu choriocide glandulæ nullæ observatæ: Radix spinalis medullæ quasi in filamenta filia, quod memini in cerebris ovium aliquando observasse. Omnes fere corporis glandulæ solito majores, mesenterium totum plurimis glandulis rubentibus, lentèque parvas æquantibus confutum. *Matthias Passemus in miscell. cur. annor. 4. & 5. Observ. 197.*

OBSERVATIO IX.

Hydrocephalus ab humore medium tantum capitis partem obfidente.

Humor capitis hydropem inducturus inflat & extendit interdum tam late nobile hoc mentis palatium, ut in ætate teucula nonnunquam excedat magnitudinem virilem. Desiccante aqua non minus extra quam intra calvariam, & utrobique modo supra, modo infra membranas, obvolventes vel cerebrum vel calvariam ipsi circumpositam: atque ut plerumque totum caput protuberat, sic aliquando duntaxat media ipsius pars, hærente liquore vel in dextro vel sinistro cerebri ventriculo: In quorum alterutro memini me bis vidisse ultra duas aquæ libras, inclusas tam stricte uni isti parti, ut altera foret plane illæsa ac integra: *Tulpium cap. xxv. lib. 1. Observationum.*

S C H O L I A.

I Naffecit quidem hifce capitis ulcera Chirurgus, & difficeret non uno loco cutem, fed utrumque æque improptere, exilliance humore magis guttatum quam tam effufæ ut levaret cerebrum, & exhauriret fontem pyritalem calorem alias cito exstingueretur, Idem idem.

O B S E R V A T I O X.

Hydrocephalo effecti diffecto capite (cujus suturæ iv. fere digitis distabant) ingens copia feri effluxit.

S Olutio continui contingit aliquando in cerebro à causis internis, &c. Vera autem tanta est aliquando ut capitis juncturæ solvantur magno spatio: quod vidimus anno 1593. in filio Dom. Merindoli Aquefis, E cujus capite diffecto effluxit ingens copia ferofi humoris, qui in ventriculis & tota cerebri substantia inclusus manebat: Distabant autem suturæ 4. fere digitis à se invicem. *Iacobus Fontanus præf. lib. 1. cap. 3.*

S C H O L I A.

H Ie inquit cur illa aqua, quæ in cerebro hydrocephalico coarctetur, non per os Eubomoides in quo Natura focamina fecit cribello similis, interdum defluit? Aqua, ut est proverbium, haret. *Schneiderus L. de aff. videretur. Vide tit. de Catacibus.*

O B S E R V A T I O X I.

Cerebri absentia in Hydrocephalo laborante puero.

P Uterum ex hydrocephalia mortuum accepi, medio circiter & quinque mensibus vixerat: Sutura capitis magno hiabant spatio, intus autem non cerebrum, sed cerebri loco aquam reperi mucosam: quod ideo commemoro, quod non meminerim simile quid à tor diligentissimis Anatomicis observatum. Quam affert Tulpus historiam, quamvis stupenda admodum sit, non est tamen eadem cum hac ubi nihil cerebri repertum fuit. *Th. Kerckringius Observ. Anatom. 46.*

O B S E R V A T I O X I I.

Hydrocephalo laborantis pueri Cerebrum, pile palmarie molem non excedens.

V Idi quatuor infantes hoc capitis affectu laborantes, è quo numero unum mortuum dissecui: Et sanctè testor cerebrum me reperisse pilam palmariam vix mole æquans: Neque sanatum vidi cui aquosus humor partibus internis conclusus est magna copia: Si verò partes exteriores obsidet, sanationem non respuit: Si ergo humor inter cutem musculosam & pericranium, aut inter hoc & cranium, si pauca insit quantitate, resolventibus tentanda ejus discussio. Si non succedat, ad incisionem transitus fiat, vitato musculo temporali, expressio inde humore loturæ carniū simili: ater aliquando sanguis concluditur: Si confutionis soboles sit sanguinis grumi humor permixti aderunt: Humore vacuato, linteis discerptis inflicum vulnus oppleatur, factaque idonea ligatura, eaque arcta ad cicatricem deducatur. *Pareus Operum lib. 8. cap. 1.*

O B S E R V A T I O X I I I.

Hydrocephalus ab aqua intra duplicatam duram meningem contenta, absente cerebro.

D Eoennis puer percussus est cum ense in parte posteriore capitis, hic passus est vulnus litis magnum, cum incisione ossis, velaminum, & deperditione substantiæ cerebri, nam hæc exivit quantitate nuclei juglandis: curatus convaluit citra noxam. Hic post tres annos, confluentibus fucis ad partem debilem, hydrocephalo correptus emoritur.

Apertum caput sine cerebro est inventum: dura meninx in conspectum apparuit duplicata, habebat tamen in se aquam limpidissimam, bonique odoris, quæ ab adstantibus gustata, insipida videbatur: at in præsentia putrilaginis tantæ jucundum odorem perentis monstruosum est, cum ingens corruptio graveolentiam ex se prodar manifestam. *Zacutus præf. adm. lib. 1.*

S C H O L I A.

C APUT sine cerebro) Refert quoque Fontanus in Epitome Vesalii Anatomicæ, se vidiſſe puerum in quo cerebrum defectum fuerit, qui aliquomodo rationis manſerit particeps: cerebri vicem ſupplente membrana callosiſſa natuta provida ipſi conſeſſa:

O B S E R V.

Hydrocephalus ab aqua totum caput replente, ut cerebrum ab ea compressum deesse videretur.

Puer quinquennis dissectus congesterat in capite tantum liquoris, ut vitata naturalis figura, tantopere inter se desciscerent dissoluta ossa, ut dilatata ipsorum compages haud parum discreparet à virili magnitudine, sed finem miserè imposuit mors, qua defunctus ostendit in capite suo detineri quinque aquæ libras: quibus effusis, fuisse adeo omnia vacua ac inania, ut plerique presentium judicaverint hic conspici caput sine cerebro: At oculi acie penitus directâ, vidimus cerebrum non defuisse, sed amissa figura globosa, induisse formam convexi fornici, & ab exuperante aqua, sequacem ipsius medullam adeo fuisse distentam, ut instar alicujus crassioris membranæ adhæresceret undique arcuatæ dissolutorum ossium circumferentiæ: *Mirabantur* qui sectioni interfuerant Medici, qui ex tam deformi cerebro, & medulla adeo extenta ac irrigua, prodierint integra mentis munia. *Nicol. Tulpius obs. lib. I. cap. xxi v.*

S C H O L I A.

Mirantur, &c.) Nec abs re, cum in aliis vel solius figuræ vitium inducat sive morbum atrocem, sive lethargum, vel fatuitatem vel insanabilem aliquam amendam: Aliis suggestis consilia hæc iustitiam cerebri congeries, irrepugnabile argumentum adversus distincta illa loca quæ nonnulli assignant cuiuslibet animæ facultati. Alii vicissim credebant hic confirmari dogma Arist. afferentis Cerebrum non mentis ergo, sed refrigerandi cordis causa constru-

ctam. Ex prout quisque vel amore vel studio fuit in hanc illamve partem, pro eo etiam extulit rejecitve vel huius vel illius sententiam Sed exercitatioribus confugiebant ad ingenium illud, *Quantum est quid nascitur.* Velut anamque in aliis, sic certe credibile est potissimum nos cæcitate in genuino cerebri regimine: cujus opera multo fortassis sunt diviniore quam quipiam hæcenus suo comprehendit capto. *idem ibidem.*

OBSERVATIO XV.

§. 1. *In iis qui Hydrope cerebri laborant, tenuis meninx à cerebri substantia & anfractibus facile avellitur.*

Quò mirabilis tenuis membranæ cerebri in omnes cerebri anfractus diffusio, adeoque vasorum per intimos quosque recessus distributio melius conspiciantur, hominis aut eriam bruti animalis Hydrope defuncti caput aperiatur: quibus enim cerebrum multa humiditate searet, retinacula quibus hæc meninx cerebri substantiæ affigitur, laxantur, adeo ut membrana cum vasorum plexibus facile abstrahi ac fere integra avelli poterit: qua quidem avulsâ, cerebri plicæ nudæ apparebunt: etiam vasorum ubique in penitiorem cerebri substantiam insertiones percipientur: Cerebro autem sano & sicco pia mater ita arctè coheret, ut vix in vlla parte distrahi aut cultello separari queat. *Willis cerebri Anatom. cap. vii.*

S C H O L I A.

Meninx facile abstrahi) Imo, notante Exc. *Lorræo* Traët. de cordis motu, feram inter anfractus cerebri accumulatum piam matrem eoque distendit donec tandem vel acrimonia sua eam erodit, vel copia

sua corrumpit, unde in basin cerebri defluens, medullam oblongatam, æque nervos ex ea orios, stagnatione sua corampt, aut accedente sua continuo lædit, unde hydrops cerebri, convulsiones, &c.

§. 2. In adolescente semitatuò (*scilicet 10. Observ. 5.*) substantia cerebri omnino erat flaccida: Pia mater, (quod in Hydrocephalus fieri amat) ita laxè cerebro erat circumjecta, ut nullo negotio posset ab eo separari. *Idem.*

OBSERVATIO XVI.

Hydrocephalus ab aqua anteriores duos ventriculos opplente, substantiamque cerebri adeo premente, ut anfractus conspici non essent.

Coloniz multoties invisi puerum *robustissimè parentibus natum*, cui caput in incredibilem molem increverat, ita ut ipsius rotunditas ulnam & quarram partem ulnæ Colonienfis, ejusdemque altitudo, ab una aure ad alteram, ulnam cum quarta parte excederet, Non autem hic natus erat, sed cum septimum mensem ætatis vix attigisset, experat ei caput monströse excrescere: nullus præcesserat morbus, reliquum tamen corpus vitiosè nutrebat: verum caput intra menses xxx. paulatim in illam magnitudinem accrevit, ac tandem puer in *soporem lethargicum* incidit, nec ita multo post obiit.

Cranio dissecto, invenimus in duobus anterioribus cerebri ventriculis *aquam crystallæ clariorem*, ad libras Colonienfes XVIII.: illa autem non solum ventriculos, sed & substantiam cerebri distendebat, ita ut totum cerebrum (cetebrum excipio) in sacculum exrenderetur:

hiuc

hinc fiebat, ut circinvolutiones & gyri cerebri non confisterent, sedurgerent omnia, *Dura & pia matres integra erant*, atque ita dilatatae ut totum cerebrum operirent, *cranium* similiter dilatatum erat, sed passim membransum potius quam osseum; *Tertius ventriculus* anterioribus confusus non apparebat: in *Quarto*, viscidam quandam materiam, parvam tamen quantitate invenimus, reliqua in cerebri basi secundum naturam crassi, nec reperiebantur meatus per quos serotus ille humor ad caput dehaus fuerat, quantumvis accurate dispicimus, omnia Partes vitales & naturales perquam sanae erant, unde earum functiones parum laedebantur, ita ut vix febre unquam laboraverit, quivim edebat, bibebat, exercebat, & dormiebat ut sanus, ipsa tantum deerat nutritio: totum enim corpus (excepto capite) perexiguam & extenuatum remansit: actionibus autem animalibus, quae ex cerebro prodeunt, puta ingenio, loquela, visu, &c. destitutus fuit: *brachia autem & tibiae*, labia, palpebras, oculos voluntarie vix movebat, at involuntarie saepius hae contrahabantur & convellebantur continuo, absque tamen dolore. *Fabritius Hildanus Centur. 1. Observ. x.*

SCHOLIA ex Marco Aurelio Severino lib. de Abscessibus p. 185.

Rolustissimi parentibus natum) Quod et robustissimi parentibus ortus puer hic languido capite, torpidum: eo est quod duris homines corpore, & hac ipsa in membris fiducia, abisurata & prompto qualicunque victu, & potu quanto eumquevis, vim superfluitum insolentem congerunt: Sic observatum est mihi plerumque ex talibus & praestitis parentibus morbosos ac tenues obortos fuisse filios.

Nus sic natus erat) Sed quod non profectus natus hydrocephalus, verum jam septemenni puero in illa malum, eam causam puta, quod sub matris claustris foetum vegeti pueri calor, noxam praeterfugit: repositus erat: inde elapsus, eam vim amittet, & causae se submittit morbovis jam paratis lente te assuevit.

Septimum mensem attigisset) Quod iudicationibus aptum est tempus et prope fatale.

Nihil praeterfugit morbo) Nullo id praeterfugit morbo factum admittit, quinimo livorole & morbilli, exanthemata denique alia praecessissent, praecurset utique malum, & hoc mihi non inveniisse puer.

In septem hebdomadam inciderit) Non incongrue, sopientibus nimirum aquis, quae stagnantes tetelimo jam mentis, subleuant anachymas & narcosis inducere debuerunt.

Nus multo post alui) Quod & veteris minatus videtur potuit, lethaliter jam pressis omnibus cerebri receptaculis.

Aquam crystalli clariorem) Partem videlicet consonam, sale cerebri resoluta, ut Chymistae volunt & ex his max. Joh. Petrus Faber in Chirurgia spagyrica, ubi de aetheriatis.

Substantiam cerebri distendebat) Cerebri corpus distendebatur aquola colluvie, propterea quod spongiosissime & glanduliforme videtur ut & osae substantia, non ita parencephalo, quod siccus, durus, densius, solidus, i.e. minus cavum, atque adeo crebris aut laxis sursum hauribus, ut ossium tunicae aut iuncturae parvulum, hinc plexus cerebri, ut parencephalum atque dicitur me auctore, quare & auctore Hippocri. partem anticam plus continere cerebri distendit, quare ipsa vere continet cerebrum, non ita vere postica.

Gyrus cerebri non confisterent) Quippe qui omniopere ob distendentem copia humorem explicari: quo referri potest ipsorum istarum causam haud solo ut esse venarum & arteriarum commodum applicandum, ut omnes anatomici voluerit, verum causas adhuc restare materiam, effluorem & formam: materiam inquam dissimilem sibi ipsi, quanto tepidius lucidi, callosi corporis & intercollosum densior, pressior & compa-

rior, rarior vero, laxior & solutior spirales cerebri circumductae: in quas binas materias & formas adaptare bisuliam effluorem, ita plicatis in abscessus distendit est, facile expellente hydro cerebro.

Dura & pia matres integrae erant) Propterea quod incumbens aqua intermixta, & talia nonnulla parte, ut salia sunt omnia extrema hominis, & fuit praefectum novelli, utpote quae salis porcosorum denudum ammoniacum eliquit ac secum abstraxerunt.

Crassum membransum potius quam osseum) Quippe quod humore multo circumfuso acquirat addens aut siccari in pueris liquorem omnibus calvariae cartilagineae magis quam ossis videntur.

Tertius ventriculus confusus non apparebat) scilicet eadem distentus vi & insolentia.

In Quarto viscidam quandam materiam) In quarto signi concementum viscidum & parvis, eadem quae dixi parvis postice natus existeret.

Deerat nutritio) Quod integris jam visceribus reliquum corpus non alevatur, non mirandum fortasse, propterea, quod similes noxae non apparent, bene se habentibus aliisquin organicis.

Totum corpus perexiguam, &c.) Corpus inferum fragile ac puerum videbatur, nulla existente habet viscerum interiorum, absumptio scilicet, & rapto a superioribus alimento, vel quemadmodum abunde distento splene carentia membra contraherent: Ea scilicet est economiae corporis communitas, ut uno laeso vivere praecipuo, brevis valere nequeat ceterum corpus.

Brachia, &c. contrahabantur) Brachia & mox, crura, etiam elicta mobilia, postvelli suavia, difficile sit id, quod cerebrum illud & postica pars cerebri bene se habuerat, verum tamen & sine labefacta secundum suam hinc hanc, nihilominus quia necesse fiebat ut comprimeretur haec, unde convulsionis autem capiebant.

Vix fere unquam laboravit) Febris & dolor nullus, hebetudine & longinquo reductu cerebri, *Hydrope Severino.*

Aquam crystalli clariorem) Qualem sola continent vasa lymphatica, quae quamvis in cerebro, non dum comperta, adesse tamen evincit talis liquor. Adde hydrocephalum familiarem esse fieri aegre in locum exant, ubi vis ab obsterice illata, quae renellus vix vim facit: A duriori aere statione capitis in partu, ex tertia vasa sanguinem continentia, lepe diu supra hunc fidem factum, & ecchymoses reliquas & sanguis concretus per os & nates aliquandiu excrevit, quod hinc meae Elisabethae per bimelitre contigit, quae frequenter thrombos nigri sanguinis excrevit, quod durioribus vasis accidit, in interioribus, qualia lymphatica, potest fieri.

pore in cerebrum Particulares cerebri vacuaciones per cephala, stercutoria, masticatoria, hoc habemus decemata laudibus, vires suas in spongiosis oculis, palati, faucium, nasi carnes dum spargunt, eadem mundi, eaque venarum & arteriarum extremitatibus piculosis, mucosis, villosis & salivales catantium humiditates, adeoque per accidens cerebrum emundando inserviant, dum sanguinem deplegant a fecibus & scoriis, antequam ad cerebrum devehant, liberant. Exultantur antiqui bonum indicium valetudinis esse sternutamentum, cerebrumque inde purgati. Nos quamvis nihil in cerebro esse dignum vacuari, aut cerebrum inde sublevati centemus per se, prodesse tamen iudicamus per accidens, vagari, ex arteriis carotidibus, ad nates & ostendentes humores, Quae atque ex euphorbia & convallium liliorum floribus concinnata pulvere, in subtilissima, vel infuso maribus immixta, ore ligneo bacillo dentibus applicito, aperto servato, educimus tenacia, villosa lenta, mucosa excrementa, non educuntur ex cerebro per cibum aut cunem, sed ex spongiosis caribus oculis & naribus, sumitum suppedite arteriam & venarum extremitatibus: Galenus Art. med. cap. 11. bene temperati cerebri signa esse ait, & decentem capitis figuram, & quando excrementa que per palatum, vel aures, vel nates, vel oculos expugantur, hae quoque moderatè se habent: Ad nostrum institutum accommodari possunt ea quae optime: Si ex arteriis excrementa hae ordinari deponantur in emunctoria narium, oculis & faucium, bene habet salus cerebri: Sin minus, excrementa eadem cum arterioso sanguine suum alacritatem ad cerebrum, eos temperes ad iustitiam mutantur: Glandula pituitaria recipit quidem ex ventriculo tercio per infundibulum superfluum, sed ea paucissima: abluuntur illa in glandula sentim & sentim: *Deposuit glandula in intestino, ait Celsus lib. de Glandulis, dum exprimitur, modicam, abluuntur reliqua uterque abundantiam:* Idem etiam facit haec glandula in cerebro: Abertur à Janua Galenus eum 9. de usu part. cap. 3. percolare potat cerebri excrementa: imbibit glandula excrementa, humectat, & refrigerat vicinas nates mirabiles partes, sentimque superfluitas abluunt:

Interrogat, Quas ergo per vias excrementa mucosa in nates & palatum deveniunt? quomodo colligantur tanta in copia, si ex cerebro, antiquis cognitis non derivantur per vias, os cerebrosum vel cuneiforme? Respondemus dari alias vias, publicas vel privatas, privatas nullae sunt hisce excrementis eveniendis dicuntur: munus illi exequuntur publice: Inepti sunt nervi, spiritum enim animale vehunt: Inidoneae videntur venae: hae enim ad cor revehant sanguinem ex arteriis: Punctum ferunt arteriae carotides omnes: Arteriae sanguinem ex chylo natum, adolescentem & via juvenem ex cordis sinistro haurientes ventriculo, & deorum venentes, in lienem deponunt in *utroque* melancholiam: In pecor biliosa, in renes aqua & torosa, suum vero pituitosa: Debit omnino alimentarius singulas in partes devehendas, sanguis spoliatus suis scoriis, imprimis vetere cerebro cessatur in alimentum: Porus hic esse debet *ut dicitur*: Ideo in vestibulo mundari debet, scorum potius inquinamenta & recrementis, abluuntur ergo illa per carotidis foramen rannum anteriorem, ad spongiosam narium, palati, faucium, oculis partes omnes, glandula maxilla, ipsam etiam linguam. Hoc recrementum secus eam essentiam consideratur, est Salivale in tonsillis & ore: Mucosum, *ut dicitur*, in maribus & faucibus, pituita utramque indigitur *ut dicitur*: Pitui-

ta haec, dum ad naturae se componit leges, in arteriis ferè est aquosa & sero perfamilia: leuocem adipiscitur à spongiosis caribus: decide autem calore partium, portione ejus tenui dissipata, crassior: Male se habet recrementum hoc si per extremam motum evacuatione hae per arterias: recedere autem potest à naturali situ si biliositas, melancholia, pituitositas se permisceant aeterni: Cum Venetis media hyeme iet facerem Paraviu noctu, manè post levem fomulit allos advertimus catarchos ore reiectos: Salivam autem hoc arteriolum se recrementum nonnullum ob duas à Galeno 2. de diff. febr. cap. 6. assignatas causas, putredinem & serosa humiditatis admissionem: Chymici ad salivam, quae à reliquis principis in officio non continetur suo, acta in arteriis sanguine per dominantium *ut dicitur* congestur: male se etiam habet recrementum hoc, Effertur huius materiae modum si consideremus, tum quantitas, tum qualitas primae & secundae, tum excedit modis, temporis, & loci ratione: Si itaque copia; si qualitatis prima vel secunda, *ut dicitur*, fuligine vel violentia peccet, sanioris limites egreditur, contrahit vitium hoc caritius ex toto corpore, per venas ad cor delatis, nec per emillaria ordinaria rite evacuatis creditibus: Nullum dubium etiam est quin ex cerebro, à nutritione relictis cum sanguine, multae humiditates excrementitiae per sinus crassae meningis ad venas jugulares revehantur, & ad partes has circa nates & os, cum emunctoria ordinaria deponantur: Non omne excrementum solas affertur per arterias, ut nutrimentum; venae non omne quod vehunt, vehunt & inferunt in cor, sed quiddam etiam vehunt ex corporis emillariis: ha haemorrhagiae contumaces, per nates, pulmones, anum, uterum, non solam sunt per arterias, sed & vicinis venarum apices.

Interrogat, Anne nullis omnino transiis humiditatis quibuldam aqueis per cibus & cuneiformis ossis foramina concedendus? Respondemus, fieri posse quod turbato naturae ordine, arteriarum ad nates & os evenitum expulsiore vitata, arteriorum etiam crasse & tenosis meningis, & sinuum circulatione citabante, non omne quod à nutritione superfluum expellitur, sed in ventriculis copia abundet liberaliori: Id si coelegant, necessitate argente, qua data porro cum rursus omnia, superflua hae ad cerebrum & glandulam cuneiformis ossis caudate & per foramina vasorum emanare queunt: Obidentibus in faucibus & naribus deesse locum in quo morcos omnia, qui excreantur, moram necesse valeant, morci natura preluipponit moram extra arterias, sed quod commoditas in faucibus? respondemus diverticula in narium spongiosis manifesta sunt anfractibus: imbibuntur à cane fungo à faucium superfluitates, retinentur & condentanur, adhuc resunt parte politica & sepe circa uvam haerent: in narium tamen anfractibus imprimis mucosa receptae millia: cum emundatio non responderet voto, quia firmius adhuc mucosus aut à narium tubulis exitus ejus impeditur, spiritus per nates copiosius attrahit, eandem retrahimus in fauces & exipimus: Rogat sententiam de modo quo arteriae imprimis, ex parte etiam venae, deponant haec excrementitiae humiditates in spongiosas narium & faucium carnes? Respondemus vasa haec, in narium & faucium caribus, araneum tale istas divitacul & rotis in modum transfundere, eo modo quo, Philosopho auctore 2. de gener. animal. cap. 7. transfundat alimentum per rariorem vasorum texturam: transfundat autem illud non aliter quam aqua per sibles ollas, crudas adhuc, & nondum incrustatas: ut Ni-

tem & Anomolium fit aqua solutum per ellas co-
quinnas transudar, floribusque candida exterius
coronat superficiem, etiam *apertis* *obstruuntur* huc
transit per *alios* membrane nasum & palati *adipem*,
sensum & sentium collecta in scalia seu gradibus nar-
um tunc narium indit, inque illis moram ne-
ctens, condensat, & ad scalam figuram varias in-
dit formas, quas cum nares defecamus, ac collectio,
& contrahis thoracis musculis impulsio spiritum, con-
densatum inferimus, expellimus motum, quod
emungere vocant, apparet; videntur lacinus & la-
ceras vellum ariatum prae se ferre particulas, eae-
que quae cavum respiciunt narium, siccæ ut plurimum
sunt, quæ membrane narium adhærent, humidæ:
continuo scaturit fons harum humiditatum proventus,
animali bene habente. Sed quædoquidem hoc arte-
riarum officium à natura civitate est donatum, qui sic
quod multi repetitur quæ parum vel nihil emun-
guat? Respondemus paucos reperiri ea tempera-
menti moderatione beatos, ut sicut *apertis*, sicci-
tas huc narium & palati, non tam signum est cerebri
temperati, sed potius optimæ ad justitiam totius cor-
poris temperaturæ: Qui vero impuro corpore sen-
tent, hujusque vacuositatis, per nares aut palatum, de-
stinantur beneficio, illi certe id impune haud ferunt,
sed multis (subjecti sunt æmulis aliis: Franciscus
Galliarum Rex *apertis*, aurium ulceribus vitæ ob-
noctas: Alii emunctæ naris, arthriticis, podagri &
de capitis doloribus infestantur: nonnulli ruficulosi
sunt, conversi ea toto per venas in dextrum ventricu-
lum, & ex eo in arteriolam venam, cum nutritio Pul-
monis, & sinistro cordis sinu destinant sanguine, ea-
crementis materia: hæc cum totis modo per sen-
sus feret impervios meatus in alperæ arteriæ transadit
bronchia, interna irritata membrana, jussuque se tho-
racis contrahere musculis, fit effusio illa vebemen-
tissima quæ appellatur Tussis: Novimus matronas
quibus gravior hoc arterisim ad nares puerum
eventum, destitit beneficio, continua à patribus
hymeneo facies dependet flitæ, albumque melleum
est profluvium. *Guerinus Rosticinus Dissert. Anatom.*
lib. 1. cap. 16. & 17.

Cerebrum non est fons Catarrhum, expers est
culpe in omnibus deffilationibus, 1°. Paucissima in
cerebro generantur excrementa à nutritione cerebri
residua: 2. nulla in eodem idcircoprehenduntur
excrementorum receptacula: Ventriculi extra me-
dullam, ea accubitu partium medullæ per accidens
nati, quamvis ob capacitatem & humorem accusari
possent, tamen si quis accuratiori inspicit oculo,
videbit horum foramina, ad expellendam in tanta co-
pia puitrosam hanc crassam materiam, non sufficere;
Processus papillares, glandula pinealis & puitracia,
vulgò excrementorum cerebri judicantur receptacula,
verum & hæc contrarium inundationibus reci-
piendis vel transmittendis sunt impares. 3. Vix à ve-
teribus excogitatur, à neotericis pro genuinis non ha-
bentur. 4. Nec cerebri omnia & membrane evo-
hentium doctum vicem sustinere possunt: Et quis
cerebrum, divine mentis sedem, omniumque huma-
narum actionum, totiusque corporis nobilissimam
partem talibus profunderet injuriis; ut hinc impu-
licitatibus live generandis live recipiendis destinatum
diceret? Totum potius corpus & cor motus catar-
chi principium à quo dicendum, sanguis enim plo-

ribus humoribus permixtus, per arterias cruciatis
lumina preens, ad spongiosas narium carnes impu-
tatas daret, ut ibidem emungantur: causa proxima
sunt humores excrementarii, tali, melancholici, bi-
lofi, feroli, &c. facultatem capultricem ad expellen-
dum stimulant, quæ communiter uno Puitrix verbo
insignitur: Generantur hi humores, non per ef-
fensum ob facultatem lafam, à nativæ membranæ
bujus debilitate, quæ impedit, quò minus alimen-
tum rite coquatur, & sic multa excrementa produ-
cantur. Sed per consensum à toto corpore cacochy-
mico fomes membranæ glandulosæ puitricis *apertis*
capit. 17. Quæ communiter: Via per quas materia hæc
ad membranam deferretur, sunt illæ per quas sanctoria
tempore eadem fluit: Inter illas, quæ aliunde veni-
unt, prima est excrementicis meatibus effusus, post
cartilagineis redditis, & concha auris tendens in pa-
larem, per quem nonnunquam clauso ore cretus
spiritus irruit in concham & tubilam excitat: sed pa-
rum hic conferte poterit: Altera via est meatus in-
ter utramque palpebræ membranam, ad orbitæ angu-
lum excurrent, non tamen ibidem desinens, sed ulterius
eatenus, & in nares per amplum foramen lacry-
malis glandulæ, cujus punctis est continuus,
tendens, eo humiditas ferocis deponit: Quævis
autem angusta sit hæc via, & vix verisimile videatur
tantam copiam, quæ emungitur, inde suppeditari
possibilem tamen persuadet continuatio transla-
tionis: In ipsa narium tunica exorta via, quæ
hujus materiam deferentia, duo sunt: breviora alia,
exilia, & nonnisi per capressum humorem conspicua,
alia longiora: conferunt & magnis portuibus
non sit alia via, sed sensum: implet nares naturali in-
sensu, non vi, sed sæpe & continuo tractu cadentem
Rivi fomitent perennem suppeditant (sunt *arteriæ*
& *lymphaticæ vasa*): Via de vasa, quæ in glandulosæ
membranæ adhaerent humorem (non, ut nonnulli
loqui amant, Puitricem, inde etiam Puitricem ipsam
vocant membranam, sed in mucum convertent,
cùm munere humectationis naturali perfundit; vel
in majori præternaturali copia collecta est) exci-
piunt & excrementum, sunt binæ in utraque parte una.
Idem consilium lib. 3. cap. 1.

Quidam non recipiunt membranam narium esse
partem emissariam, aut in quam arterie suam depo-
nere possint subitum, aptum locum, cum ea sit odo-
raria organum: Forent *apertis*, membranæ regentes
communiter distingere de hinc soli vacare officio:
verum *ad apertis*, membranas continentes, quæ
appellatur tunica, aliis etiam vacare officio: Sic
intestinarum tunice recipiunt excrementa totius cor-
poris in fluxibus alvi: cuius membranas totæ, puer-
quam quod regæ, similis est nix plicatior, quæ
totius corporis excrementa recipit: Ita etiam narium
in crassa meningæ propagata membrana, pluribus de-
stinata officia, singulis vacat natura jussu, odoratio-
rium est sensorium, & excrementorum est diversio-
rium: Pius officium ut encephalus, nervis intra-
ductis est odoratorium; ut posterior, carneo interstati
est timentum: ut verè ea ea in insana narium spatia
puitria exillare queat, facta est porocis & spongiosa,
Idem Dissert. Anatom. lib. 2. cap. 10.

NB. Scholia sequentia pertinent ad statum pag. 312.
exterioris Typothetarum collocatum.

S C H O L I A.

Quandoquidem experientia testatur serum & humores excrementicios saepe intra cerebri ventriculos reperiri, videndum unde illi, ac quomodo hac confluant, & dein, Quibus excretionum vis idem foras amandentur:

Quoad prius, summe probabilis est latere ferolum, qui spirituum recentis productionum vehiculum est, ac una cum illis in poros cerebri introducitur, postea exolutum ac in vaporem attenuatum, in hanc cavernam exsudare, ibidemque denuo in humorem aequum concretere, factis enim quid sit de humore isto, aut in quod aliud receptaculum derivari possit? Preter hanc ordinariam, & puto assiduam, colluvies ferolæ intra cerebri ventriculos coagulationem, pro certo haberi debet, quod à glandulis plexui choroideo insertis, nimium repletis, ejusmodi serosus humor in ventriculos ita dictos exillere: Sæpius vidi in hydrope cerebri glandulas istas intumuisse, & veluti hordei grana, à nimio madore crepantis, flaccidæ evasisse, adeo ut serosiores albas minime retinerent, verum eas in cavitate subiectam continuo deposituræ: Profectò in hydrope cerebri, hi ventriculi semper aqua repleri conspiciuntur: Enimvero quo serum usque quoque & vasis redundans in cerebri ventriculos melius dilabatur, ita comparatum est, ut majores vasorum plexus, cum glandulis insertis, prope singulos *§ hyaridas* ventriculos, dispositi fuerint: quippe non modò plexus choroidei, juxta trium ventriculorum in cerebro concursus; ac plexus alter, & non minus insignis, cum glandulis majoribus, ponè cerebellum, juxta quartum ventriculum collocatur: in omnibus eo, ut viderur, sine ita cauto est, ut è sanguine qui aut cerebro aut cerebello destituitur, pars aquosior, siquidem spiritibus protecreandis minus idonea fuerit, hos vasorum plexus incurat: aramen, si major feri copia illic deponitur quam in istam coarctari, aut eam amandari queat, quicquid ejus superfluum est, in cavitate subiectam dilabatur.

Hinc constat unde, & quo ritu serosa colluvies intra cerebri ventriculos colligitur: certe huic exitum denegare, nihil aliud est quàm cupique cerebrum vipersa gravidum afferere, cui quidem partus, nisi per exitum patens vitæ minime concedatur: Qui partes juxta ventriculos existentes, earumque fabricas primò tantùm inuista leviter considerat, cum antiqua facile juraret quod cerebri excrementa, tum insensita per infundibulum in palatum: tum antèius per processus mammillares in naves deponuntur: aramen si in partium harum structuram paulò accuratius inquiretur, statim è contra nemo est qui non facile putaverit nequa harum via cojuvis humotis excretionem fieri: neque enim à glandula pituitaria per os euneiforme: nec à processibus mammillaribus, per foramina ossis cribiformis apertura quevis manifesta percipitur: Verumtamen vero ut per bina hæc emunctoria cerebrum aliquatenus purgari existimemus, objectioni illi referte licebit, quod in viventibus humorum translationes, per loca que videntur impervia, facile perficiuntur: dum enim potiò & marcos, in quibusvis corporis animalis partibus existentes, à spiritu & calore dilatantur, illi velut per raram panni lanei texturam feri depluvium transmittunt: hoc pia ne consistat ex affectibus arthriticis, in quibus latex serosus corpora nervosa sensim percrepat, & spartula perinde minima trajiciens, in partes modò hæc, & deinde alias, humorum decubitus facit, adeoque obvium est quod membranae processus nervosi, insitæ

spongiz, humores serosos imbibunt, & dein à levi compressione, eos confertim reddunt; qui liquet in odunahia, quoties stylo cavo denti immisso, aqua limpida copiosè excrepuit: Revera in corpore animali vivente, humorum transitus, non modo per ductus & canales apertos sunt; verum latex aquosior & tenuior, solida & teretia nervorum corpora, necnon fibras & membranas, tanquam filicilicis, perrepat, adeoque per angustias imperceptibiles, de loco in locum transferretur: Quidni ergo supponamus humores serosos è ventriculis cerebri, in glandulas pituitarias ac processus mammillares decumbentes, per membranas aut nervos, hic aut illic pertransiunt amandari?

Circa *infundibulum*, res satis probabilis existit, quippe hujus posito & structura indicare videntur, quod humor aliquis è cerebri ventriculis versus glandulam pituitariam deferatur: etenim hæc pars ita constituitur, ut in aperturam ejus, è quovis cerebri lateris, ejusque appendicis, adeoque de cæcis, humorum decubitus fiat: cumque in variis animalibus ventriculorum figura & situs plurimum varietur, tamen in quibusvis illorum oritur *§ hyaridas* ventriculi, qualescunque fuerint, aperturas varias in fundibulum dehiscences habent: cæterum quod hæc glandula, cui infundibuli ductus insertus, humores serosos suscipiat & foras amandet, etiam hinc collata videntur, quoniam illos non tantùm à cerebro delapsos, aut etiam à sanguine in cerebrum acentisuros secretos, intra poros suos admittit, quippe in quadrupedibus pleisquis, vasa quædam ab utraque artèria carotide huic glandulæ inseruntur, que substantiam ejus intine subeant: cujus indicium est, quod aramentum alterutri artèrie trunco injectum, recte mirabile (si modò advenit) & seorsim interlorem hujus glandulæ compagem, ac colore iohicet: unde licebit arguere quod hujus glandulæ munus sit serosiores superfluos excipere, quos non tantum à cerebro dimittas puillimino accipit: aut interdum eas præoccupat, & à sanguine priusquam cerebro inferatur, derivare solet: Ideoque hæc glandula, si feri superfluitates ei tantum à cerebro deriventur, perexigis: sua insuper à sanguine accedat, grandior existit, proptèr nempe uno aut duplici officio defungitur.

Quod vero ad trajectionis viam spectat, qua nempe homines in hac glandulâ deposui, foras amandentur: Vulgaris opinio est eisdem per fusamina ossis subiecti in palatum decidere: quare in ejusmodi animalibus, quibus recte mirabile adest, ejusque molex propagines hanc glandulam subeunt: plura foramina in osse subiecto excavantur: *Potè si ossis uniusformis forent, sive glandula istius sit aut, cranio abijcto, extrahi, ejusque foraminibus, membranae deinde, aquam desuper effundat, illa totum ossis compagem cùm pertransiens, per alia foramina, in lacertum ossis patetis, subit excidat: Aramen experimentum hoc pro sententia propostâ minime concludit, quippe foramina ista in quibusdam animalibus, ac ut plurimum in cranio humano, omnino desunt: Quibus verò adijcet, ut vult, imprimis observare est, quod eadem à vasis quibusdam curvis implentur; quibus si liquor attritus per stringam injecatur, iste ossis compagem trajiciunt, plerumque alia vasa ossis subijcto, ac denum vasa jugularia trancum perveniunt: quod certo indicium est, humores exinde in palatum minime deferri: quoad vasa autem qua ossis foramina deducunt, quæque numerosa eisdem subijciuntur, aut vasa, aut lymphaductus ossi videntur.*

Atque ex his præcipuum excretionis modum, quod humores

humores serosi, in glandula pituitaria depositi, foras ablegantur, conficere licebit, nempe quod isti ab ea, sicut ab aliis plerisque glandulis, in sanguinis massam remanentur: In vitulo res autem patet, nec dubium est de ceteris animalibus quibusque tete mirabile adest: quippe sicut rami arteriosi, ita etiam venosi ad hanc glandulam pertingunt, qui humores, non tantum ab arteriis depositos, aut insuper à cerebri ventriculis delapsos, absorbeant: Quinimo item homini, equo, aliisque animalibus, quibus rete mirabile deest, opinari licet, nam lymphæ ductus, nam ejusmodi vasa quedam qualis in capite vitulino prostant, & ab glandula humores certissime exportant, subesse: Illocum vestigia non ita facile detegere licebit, quis priusquam hæc claustra pertumpantur, lymphæ ductum, si qui aduerint, tractus evanescentes: nec enim vasa isthæcin omnibus, sicut in vitulo, per injectionem deprehendere possumus: quoniam usus foramina quibus, tanquam fili ductu, injectio ad vasa, aliis desiderantia pertingit, in plerisque desiderantur: Haud dubio quin longior dies, humorum è glandula pituitaria reductiones in cunctis animalibus satis manifestas reddet: interim ex eo quod in aliquibus serositates illinc in massam sanguineam remanentur, suspicari licet, quod eodem usu simili ritu etiam in quibusvis fiat, licet comatus via non satis pateat: Quoad alitem cerebri emunctorium, quo nempe humores serosi è cerebri ventriculis in processum mammillares deponi, indeque per foramina ossis cribiformis amandari solentur, prescilo circa hanc excretionis viam multo magis ambigunt, quoniam in defunctis foramina isthæc, dura meningis infarctibus & fibris nervosis, utique à processu mammillari dimissa, obdusa & pleni infarcti, nequaquam humor, uti longidissimi, transmittunt. Porro nihil certius est quam quod humores serosi, è glandulis & vasorum extremitatibus intra nares delinquentem, in ipsorum cavernas exprimentur: ita ut, præterquam quod vix possibile sit humores illos à cerebro descendere, non opus omnino videtur ejusmodi excretionis viam supponere: Verumamen super his, ut paulò abius ratiocinemur, si à partium apparatu & ab affectu agnere liceat, non est quin probabile existimemus humiditates quidam etiam à cerebro in nares deplere: Supposito enim quod humor serosus, non modo apertos canales, sed strictiones etiam nervorum poros & meatus trajicit, atque fibras & membranas, tanquam filici lacinis percrepans, de loco in locum transferatur (quod equidem facile erit demonstrare) quid obstat quominus ejusmodi latex, per fibras ossis colatorum foraminibus impactis, de-

scendat? Nam licet in defunctis istæ partes impervie esse videntur, tamen durante animalis viâ corporum nervosorum meatus ac canaliculi, à spiritu & calore dilatati, humorem copiosum, quo irrigantur, facillime transmittunt. Os cribiforme in diversis animalibus, pro multiplici odoratas exigentia & discriminatione, varie perforatur: per singula ejus foramina processus à dura matre, & fibrae non vix multiplices, transeunt, & interiora narium illinent: sicut autem per corporum horum ductus, ab organo verius sensorum protentos, sensibilibus impressiones, live species sensibiles, continuatur spirituum animalium velut dulcatione ascendunt, ita per easdem vias, humiditates eorumdem corporum irrigue, siquidem aliquando solito magis superflue sint, in nares distillare possunt: enim verò tales humores, uti à cerebro perpetim amandari, ita quidem olfactus organa copiose perfundere debent: Interera talem excretionis viam, in nares delinquentem, exant observationes quedam circa ægrotares, à morbis cephalicis habere uliorius suadent: Novi aliquos Scoticos obnoxios quibus sub finem paroxysmi aque limpide ingens copia exillatit & ejusmodi vacuatione, velut crisiæ, paroxysmus terminari solebat: (Vide exemplum de mening. & cephalalgia) Possem hic plures alias rationes proferre, quæ suadere videtur cerebri ventriculos, live cavitatem à limbi ejus complicatura factam, esse meram humoris excrementis cloacam; quodque humores illic congesti per nates & palatum expurgentur &c. (Item *W. de cerebri*) *Anatom. cap. 12.* Hic magnam nobis relinquunt dubium, cum caput excrementa pituitosa à venis & arteriis hinc delata recipiat. Quæritur per quas vias illa excrementa expurget? Cum Veterum vias, utpote os cribiforme, canieforme, &c. nos pro veris viis non agnoscamus? Respondet *Abundant. 3.* de Car. loc. 1. c. 3. *Membranam quandam, quæ additamentum ossis nicipis in alio palato involvit, præstat sibi materiam catarrhosam, condere, continere & emittere.* Modum autem & quomodo hæc emissio fiat paulò post exprimit, pag. 500. *Si verum volumus, catarrhus sudavit potius sit quam distillatione: nam humor in sudamentum sibi membranam confusus, & nunc pendet, mox in extrinsecus precipitatur: Interdum quidem tenuior humor & cephalicæ caloris videtur, Ceterum Natura eam membranam ad sentiam humoris imbediendam, & in eandem sedem emittendam perquam calido artificio figuravit: vena illius mox utram circa facit, unde quoque tanta vis ejus possit subinde abardere affluere. Schrodæus*

Disquisition. de pleuripneumonia
cap. 1. §. 11.

5. 7. *Cerebrum frigore non corrugari, adeo ut phlegma, eo compresso, in pelvium defluat, Ostendit anatome infantis frigore extincti, cujus cerebrum frigore induratum repertum est, cum pauculo humore in ventriculis, Infundibulo & glandula pituitaria vacuis existentibus.*

Superioribus annis, cum exercitus circa urbem Magdeburgensem consistens, tandem castra moveret, hyems illa fuit, credo, fevior ea cujus meminit C. Tacitus lib. 2. *Annaliumque*, inquit, miles, qui fascem lignorum gestabat, ita præariguisse manum, ut oneri adda-
rentes trunci brachia deciderent: Illo magno itinere uxor militis gregarii, infantem puerum collo bajulavit: de illa corbe autem emicuit ejus caput, tantis aëris injuriis maxime obiectum: Infans non tam fortuito soporatus, quam frigore exanimatus, publica laraque via reperiebatur: Judicis jussu corpusculum considerabatur: violationis notæ nullæ ex-
tabant: Mox superveniebat nuntius, illius caput ista frigoris inclementia obriguiffe.

Ac Cerebrum gelu induratum, insecto cranio, maxime inveniebatur: paululumque hu-
mori, in gelu concteti ventriculis cerebri anterioribus continebatur, qui manu calore

contre-

contractando jam liquefcebat : hoc in paucas guttas aquæ tandem abibat : nihil autem humoris five tabefcentis jam, five frigore durati in infundibulo, ac in illa glandula pituitaria reperiebat. *Schneiderus lib. 4. de Catarrhis cap. 5.*

S C H O L I A.

Vllus fluit, homine iter asperimo hyemis faciente, cerebrum ita frigore contrigit, ut tabefcentis intus phlegma in Pelvem coaduat, unde catarrhi in os & fauces delabatur : Cerebrum gelatit eo modo quo fignis concipit caro musculorum brachii aut femoris : hæc se non in iugas coarabit, ne cum humorem quem continet naturaliter, exprimat, ac deorsum vel in manus, vel in extremos pedes manare patitur : Sed primum sanguis ab arteriis importatur, quo omnia corporis membra rigantur, si is non tam vehementer refrigeratus, iterum in ve-

nas reduciatur : ille vero frigoris vi urgente, tandem gelu adstringitur : Sic quoque tempestate perfrigida non bene opertum cerebrum affligitur, ac sanguis ille refrigeratur, venis recipitur : Tandem illud tæviore hyeme ac gelu indurecit : Si vero sanguis ille gelidus veolis tantum reducitur, Natura ab eo afficitur, ut humoris moveat, & tandem faciat catarrhos : minime vero cerebrum se contringat, instar spongie uide, in ventriculos, in pelvem & in glandulam pituitariam effundit humores, de quibus lubico catarrhi nascuntur & facium nascuntur. *Idem.*

OBSERVATIO II.

Catarrhi Pectus obsidentes, à cerebro originem non ducentes.

Fluxio quæ multa est & mala, *fluit aut ad pectus, aut ad venas* : quæ ad venas, facit morbos laterales, & pulmonias, & præfocationes quæ cito interimunt; dicebat Gal. cum Hipp. 3. aphor. Et hoc dicit, accidit maxime senibus : unde plures senes quasi repente intereunt, Et in hoc plerique Medici aberravere, eas fluxiones existimantes esse ex earum genete quæ possunt per tussim expurgari, & laborabant cum becchicis medicamentis, frustra vexantes naturam & non parum nocentes.

Ex simili morbo quum periisset Nob. *Casus Brissini* Mediolani, dissecurimus illum, Inventa est sanies multa in vinculo quo jecur annectitur costis : Et non erat pus bonum sed liquidum, & supervixerat plus 40. diebus cum hoc morbo. Et similiter dissecurimus *P. Cajatum*, puerum 14. annorum : & quoniam erat dives valde, suspicabantur de veneno, & inveni in pulmone saniem tenuem è latere dextro, quæ ejus partem exederat : & pronuntiavi quod non perierat ex veneno, sed ex fluxione sicut primus : Dicam etiam quod accidit *Comiti Aluisio Confagha*, ad quem cum vocatus essem quarta die, prædixi non supervicturum ultra septimam : Itaque mortuus est sexta die vespere, Et nos dissecurimus illum, invenimusque non esse abscessum, sed omnia vasa pulmonis ex triplici genere, magis tamen asperæ arteriæ rami erant pleni sanie simili lacti, adeo ut nullus adesset prorsus sanguis. Quid plura ? Fluxio illa non erat ut dux priores, sed Pulmonia mendosa.

Hac etiam ætate dissecuri puellam 13. annorum, quæ cum esset prædixes & unica, suspicantes de veneno ob magnitudinem patrimonii, cum non potuissent adesse ægrotanti, advocatis à me in re tanti momenti octo aliis Medicis, cognovi illam ex defluxione repentina obuisse, non ex veneno, atque ita omnes Medici ad unum consenserunt : Etat enim puellæ morbus jamdud in capite, & suppressa purgatione per ulcera, nec adventantibus mensibus, correpta febri, cum alioqui non videretur graviter ægrotare, imò contenti fuissent duobus familiaribus Medicis, ropente tanquam siderata interiit : quo casu percutuli suspicabantur de veneno : Omnes autem hujusmodi fluxiones necessario adducunt febrem æstuosam, non tamen ardentem, nec valde siticulosam, quoniam, ut dixi, materia putret prope cor, & implet vacuum pectoris, & est humida & cruditaibus permista; demittit autem cerebrum in pectus, propterea quod guttur non est contextum, & est è regione. *Hippocr. lib. de loc. in hom. Cardanus de providentia ex anni constitut. p. m. 1052.*

S C H O L I A.

Sed omnia vasa Pulmonis &c.] Ex his exemplis è Cardano & Biononio adductis deprehendere est, quam male plerique medici quancunque materiam in Pulmone illatam, vel ex eis exeliam, à capite manasse censent, cum ab ejus vasibus insignibus procedat : Sensu enim liquet eos universi caloris & spiritus fontem esse : hoc pulmonem, molle & taram viscus, suo loco excipere, infinitis vasibus refertum : ibi hæmaron perfici constat, atque ulteriores sanguinem excoqui & elaborari ; unde necesse est haud modicum

excrementi redundare : Cum enim duo maxima vasa, cava & aorta, ex sinibus cordis oriunda, subito pulmonem ad jugulum ascendunt, dum plurimo sanguine & spiritu surgente, necesse est intra thoracis cavitatem ab his plurimos ichores exsudare, ideoque per sudorem sui unionis excerni : Ita ex duobus aliis insignibus vasibus, vena scilicet arteriosa & arteria venosa, verisimile est in anteriorem & posteriorem pulmonis regionem, si multa disfluunt materia, in totam ejus substantiam quicquid superfluit & exundat, *Idem.*

Ed j excolati;

excolari, & postea pulmonis excussione in bronchia & asperum arteriam rejici ac per anacatharum excludi: Quae autem materia excrimentitia, dum è vasis in pulmones delata, vel sua mole aut cruditate, aut lentore & crassitie exclusionem non assequitur, hæc angustiora vasa ita replet & obstruit, ut Peripneumonia aut alia Pulmonum vitia accersat, in laxiorem horum substantiam transiit. Vide Schmidtum lib. 5. de catarrhis cap. 4.

Fluit aut ad pectus aut ad venas] Ejusmodi defluxiones à vasis Lymphaticis colli deducit Jac. Hott. Pauli *Anatomies Anatomie Dilecti cap. 8.* Quis inquit, spondebit Catarrhorum materiam quam per Juxtyngis vasa & tunicam sudare Celeb. & Schneiderus, multorum authorum unanimi consensu probabit, magnam partem per hos ductus non descendere: quæ postmodum in jugulari & axillari vena sanguini permixta, & ad cordis dextrum ventriculum per ascendentem cavam deducta, indeque ad pulmones translata, quum pro alimento apponi nequeat, & copiosior quam quod satis est assuxerit, multorum morborum in thorace fomentum fit: unde vehementissima sæpe concitatur Tussis, ac plerumque Tabes, Phthisin & Peripneumonia præcedit ejusmodi defluxio, quæ si tenuis atque acris fuerit, ulcerat & exedit Pulmonis parenchyma, quod juxta *Alphagium*. Est aggregatum quid ex levisimis & tenuissimis membranis, quæ extensæ & linitæ pene infinitas vesiculas orbiculares & sinuosas efformant, veluti in apertis foveis ab extensa cera in parietes conspicimus: Sin viscida sit & crassior, diuque retineatur in bronchiis, secretum, rauterem, asthma & orthopneam inducit, nec raro

in calculos & grandinem concrevit: Si in latera thoracis & costas succingentem membranam, exterius vel interius destitit, utramque pleuritidem generare, ac si magno cum impetu ruit, catarrhum suffocarium immittere creditur, ut nonnunquam plene obmurescamus, & propter vicinos recurrentes nervos, quorum actio in locis hæc pro te nus impeditur, voce privemur: Potest hinc ratio reddi, quare de improvviso suppelletis sudore, aut collo à frigore non defenso, statim catarrhus sublequatur: Cui pariter in favis & achoribus puerorum, in quibus perpetuo promanat ichor, glandulæ colli insigniter intumescant & doleant. Et præcipuis eus itumæ quæ hic contingunt, modo crescant modo diminuantur, modo à parte ad partem transferantur, tandemque evanescant; Tubercula ad aures, scribit *Hippoc.* *Coccar.* *Prænot.* 104. sect. 2. emollunt, five æquant, nussiculæ cum pyralino procedentes: Cujus memorabile exemplum in quodam adolescente annoavit C. Pilo l. de morbis ab illyie ferota p. 54. Tumor namque non tantum partes in ambitu sinuicæ obideat, sed per cervicem jugularem in homoplasas & pectus medianum usque descendens, in prodigiosam excrescere molem, qui tamen brevi tubedit atque delinuit: Causam vero interrogari, haud facilius nos expediemus, quam si horum accidentium & generatio & solutio ad Lymphaticas jugulares referatur: Sed adscribi etiam his vasis potest, quod iis obstrictis humor aquosus, aut inter cutem & pericranium, aut inter ipsum cranium collectus effundatur, à quo hydrocephalus, infantibus maxime familiaris morbus exciter, & totum caput intumescat.

OBSERVATIO III.

Seri à cerebro in pulmones defluxum per tracheæ ductus, Phthiseos causam non esse, ex observationibus Anatomicis coustat.

Complures Catarrhum, five seri à cerebro per tracheæ ductus in pulmones defluxum, præcipuam phthiseos causam statuunt: Quam opinionem ab antiquis erronee traditam, miror quempiam à modernis aut medicis aut Philosophis admississe: Siquidem ex observatiõne Anatomica manifestò constat nihil à cerebro per glandulam pituitariam, (quæ unicus exinde transitus videtur) in palatum aut pectus decidere, sed serum ibi depositum per ductus appropriatos ad venas jugulares deferri & sanguini amandari: Porro *Aristoteles* etiam constat quicquid reliquum seri in glandulis aurium, oris, nasi aut faciei deponitur, ex iis omnibus per ductus item peculiare foras convehi, proinde ut nullus omnino humor, aut à cerebro aut à palato in Pulmones depluat.

S C H O L I A.

Veteres Hippocr. sequenti, fere tantum duas hujus morbi causas assignant, scilicet *catarrhum & venæ rupturam*, quibus nonnulli satis rectè Empyema addunt, alique interitum ab hoc censu catarrhum excludunt, nam quod vulgo asseritur pituitam à capite in pulmones deciduam, (sæpius phthiseos causam exister, necnon ab illa, si quando intra pulmones diutius commorata putrescit, crebro insens, propterea erroneum esse ostendit lumus: Interitum ut constat quæ sit materies phthisin generans, quoties ea sine empyemate aut hæmoptoe pravè gignitur, considerate oportet quot modis, & quibus viis aliquid incongruum aut heterogeneum pulmones subeat, quæ indagine facta, facile apparebit quidvis pulmomi inimicum interire ac intus admitti præcipue, aut per tracheam, aut per atectias pneumonicas, etiam aliquatenus forsitan per nervos, nihil autem per venas aut lymphaductus, quorum munus est sanguinem

vel lympham solummodo referre five expostare, atque nihil prorsus ingerere. Quod *Tracheam* satis constat eam in hunc finem constitui, ut per ductus five tubos ejus aer constanter reciprocatione ingret & modo regredi possit: Insuper an quæpiam alia materies præcordis infesta, aut tabifica, per eandem viam admittatur, modo inquirendum est: Et quidem hoc adiu pulmones sæpe labem exitalem concipere inde liquet, quæ regionum quatuorundam aer humidus fumosus, aut vaporibus malignis scatur, & besin phthisicum sæpenumero inducit: Cujusmodi tamen affectio per particulas tantum aëreas & minutas, five aeros (quibus nempe aut sanguinis crasis, aut pulmonum conformatio, vel uraque similes) hæditur) communicari solet: Venum an præterea materies terrosa, vel humor aliquis pulmonum corruptivus per hanc commearum eos subeat, merito ambigitur: etiam complures catarrhum, five seri à cerebro per tracheæ ductus

ductus in pulmones deplaviam præcipuam prohibitos causam statuit &c. (vide textum) At vero licet materies tussim excitans non à capite per tracheam in pulmones deplaret, quandoque tamen ex tracheæ lateribus in ipsorum cavitates decidens, affectum catarrhi nomine vulgo insignitum producit: Enimvero, Aspera arteria, pariter ac arteria sanguifera, uti toticam nervosæ & musculosæ pro seculi & momentis occasionaliter habendis, sic etiam *Fasciculosa* & *Glandulosa*, pro calore vitali & nutritivo sustinendis obstant: Posteriores hæc tunice interstitia cartilaginea coæstuant, quinimo ipsæ cartilagines quodammodo obducunt: Porro in tunica glandulosa ferossitas à sanguine totam tracheam irrigante, superflua deponitur, quæ statim magna ex parte in tracheæ cavitates exundans, ipsi lubricandis & humectandis præcipue inserviat: Si quando autem massa sanguinea nimis funditur, ac in terotritates præcipitator (ut à frigore susceperit, acidis epoleis, & ob mules alias occationes cerebro affollet, propterea statim materię asquæ ingens copia è tracheæ glandulis & arteriolarum osculis in cavitates ejus exudet, quæ cito tussim valde molestant, & non raro spumum multum (quod & postea fit tabificum) infert: At vero hæc spuma, ac tussis quodammodo catarrhali causa, petrarum sollicita exilit: quia dum sanguis tracheam irrigans fluorem passus, terotritates suas glandulis (unde mos lo cavitates ejus exundet) ingerit, isomul & reliqua massa sanguinea pariter fusa, serum intra arterias pneumonicas secretum, parim in sinus tracheales, partimque in lymphæ ductus insinuat, cujus diluvio pulmones quasi inundati, & valde irritati, in Tussim & expectorationem sese continuant clement: Cujusmodi Tussis & Expiratio, dummodo moderate habent, & tantum terotritates sanguinis superfluas excruciant, sæpe in commodum potius quam nocuum cedere: quoniam massa sanguinea, ipsique pulmonibus hoc ritu expurgatis, sympcomata illa ut plurimum sponte cessant, & valetudo integrior exinde sequitur: Sio vero affectibus istis diu protractis, terotritates humor utrobique in ductus tracheales depositas, & in dies uberius aggregatas, tandem velius putredinem alterari incipiunt, propterea tum libera aeris reciprocio præcluditur, tum sanguis & motus & cessat pervertitur: hinc tussis immittitur & respiratio fit difficilior: quinimo tota massa sanguinea, quatenus à tabo (quod venæ à pulmionibus excipiunt) polluitur, ab iodole sua benigna paulatim delitescens & depravata, non modo serum superfluum, sed succum nutritivum (quem assimilare oequi) ex arteriis pneumonicis in tracheales ductus continue profundit, adeoque materię tabificæ moles in dies augetur, donec pulmionibus magis uique & magis oppletis & obstructis, atque sanguine plus inquinato, & ad quæque munia sua pensanda inhabili facta, tussis & spumum ingravescunt, & cito mali mortis evadunt: insuper respiratio impedita, totius corporis laequis & marcor, functionum omnium debilitas, & demum

febris hectica, & scilicet ad mortem declinatio succedunt: Quando tussis ac spumo diu continuatur & sensum aëris humor copiosus è massa sanguinea in pulmionibus deponitur, iste imprimis vesiculas tracheales subit ac tandem implet, & nonnulli distendit, è quibus cum quolibet mane, per expectorationem tunc uberius habuit, hæc totum ejiciunt, exinde pro brevi tempore thorax gravamine immundus, & respiratio magis libera videtur: paulo tamen postea sanguis sero aut succo nutritivo refarcitur, novam materiem pulmionibus suffundit, proindeque rursus è cibo aut somno vesiculæ replentur, atque humores affluus indies admodum magis distenduntur amplianturque, tandemque laceribus duarum forsan aut plurium distruptis, multæ hic illæ vesiculæ in unum quasi lacum efformantur, intra quem materies tabifica copiosius aggregata, ibi (siquidem tota hanc statim ejicitur) putrescit, proindeque pulmionis cui insidet substantiam corrumpit, & sanguini petrantia tunc inquinamentum portidum insinuat: Fovea ita in pulmionibus facta indies augetur, & saepe numero plates simul ac diversis locis cudiuntur, atque ob magnum humoris in iis aggregati & putrescentis copiam peccoris gravitas, velut onus ingens sentitur, respiratio magis impeditur, insuper à Tabo uberius in sanguineam massam suffuso crebret hujus effervescencie, succi outitii deperditioni, porro sitis ac alvus, inappetentia, sudores nocturni, & totius corporis inabescencia oriuntur: Ceterum cruor à pulmionibus inquinatus, hanc actionem reciproca, videt à proprio tabo magis plecti facit: quippe sanguis venosus unoquoque circuitu materiem istam purulentam excipiens, eam mox arteriole tradit: unde cum neque per diaphoretin aut diuresin satis amandari queat, tandem per arterias pneumonicas ad pulmiones refertur ubi rursus à sanguine seccata, ubique in tracheæ tum vesiculas tum ductus minores insinuat, ita demum ut tota pulmionum compage impleta, & foveæ, sive ulcera deinceps in pluribus locis efformentur, & sinus reliqui omnes ichore spumoso infarciantur: At vero interdum accidit ejusmodi lacum, sive foveam unicam, aut forsan binas in pulmionibus efformari, easque circumcinctas parietes callosas obinere, ita ut materies ibi collecta lo massam languineam minime transeat, sed quotidie rota, copia licet ingenti expectoretur: Taliter affecti, quasi tanquammodo foveatellam in pulmione habentes, spumum etiam multum & crassum, imo flavum & quasi purulentum omni mane, & aliquando tum in toto die respiciant, tamen alias satis sani degunt, bene respirant, comedunt & dormiunt: *Emperum*, aut talem in modico corporis habitu persistant, & non raro perescent: Hinc nonnulli dicuntur phthisin per 30. aut 40. annos habuisse, & morbum eum usque ad ultimum vitæ terminum (hanc proinde abbreviatam) protraxisse: atque interea alii cum minus tussissent aut expant, & citra paucos menses lo febrem incidant hecticam, ac brevi in sepulchrum præcipitentur. *Id. W. lib. Pharm. vol. 2. fol. 1. cap. 6.*

OBSERVATIO IV.

§. 1. Anatomie Equi *Coryza laborantis*, ob vitium *massæ sanguineæ*, *salvo cerebro*.

Coryza Equi arripuntur, tam fixa ea est quam lethifera: quare desperata salute Patientis familias eos sæpius tolli jubet: Nuper eo morbo æger Equus incisis venis profusaque sanguine necabatur, quo caput cerebrumque involutum iterum inspicere liceret: In assiduum examen explorata quoque expediri sæpius revocare, Eandem namque rem ego similiter capere de *Coryza* testatus fui: Nunc cunctum caput, cerebrumque æque salvum rursus reperiebatur: Illæsum quoque erat Os cribriforme: naturaliter se habebant

D d 4

processus

processus mammillares mundi erant & sui coloris : fibras de dura meninge tractas receperant foramina illa tam minima : Quid multa : nullum vestigium ullius viti intra cerebrum deprehendi poterat : Os spongiosum quoque non erat adsum : At illæ hoc os obtendentes membræ erant aliquo modo vitiatæ : nimio illo mucos adeo perfundebantur, eoque sinus inibi obvii vehementer scatebant : Attamen plus istiusmodi muci in sinistris naribus adveniebatur : medii & infimi ventris visceribus haud vitiose affectis : In aliis cadaveribus Equorum venæ valde livecebant, ut plures sanguinem credentem semper in vitio esse : Illa sanguinis vascula, quæ ad anteriorem narium tunicam pertinent, in hoc Equi corpore nimium intumescabant, quate plus muci etiam exudarunt. Membrana Pituitaria posterior haud laborabat, pressa solennem reddebat liquorem : Ast narium ille mucus redundans infestante ista Coryza est spissior, albidus quidem, attamen fœdus aspectu ac nescio quo modo movet nauseam & prope vomitionem : Est nequam morbus : huius contagium in equos tam mire vulgarur : præsepium, pabulum, levis contactus ac aër adversus etiam ex longinquo virus in alios transfert, & ut credunt, in eos maxime qui sunt illius coloris cuius est ipse qui hac maligna ægritudine laborat : Veterinarii varios liquores in nares infundere consueverunt, cerebrum imprimis ægrum esse rati, sunt & imitatores vetustiorum medicorum.

S C H O L I A.

Iuniorum ex triba multi, urgente Coryza, humorem credunt, si non ex cerebro, ex cerebri tamen membranis in nares confluere posse : atque superioribus experimentis nihil moti sunt cerebri membranas madere, quæ ad os & ad nares protrahuntur : Itaque humores ex illis cerebri membranis eo sensum ferri, idque in humano atque ac in belluino corpore fieri : Membranam cerebri fibras manifeste per foramina ossis cribiformis ad nares, & per foramina ossis cribiformis, una cum nervis transiuntibus ad palatum & ad alias partes proximæ trahi : Glandulam pituitariam habere multa sanguinis receptacula, unde liquor pituitæ sensim manare possit : Sed operam dabo ut discentes ad meam mentem, respondendo, tandem perducam : Glandulæ pituitariæ sunt venæ haud paucæ : Madens quoque cerebri membrana, harumque porcionem & fibræ ad palatum & ad parentes nares trahantur : Sed quis vel leviter rei physicæ, medicæve peritus crediderit constantior illam, viscidiusque liquorem muci per istas excurrentes membranaceas partes, in palatum & in nares ita viam facere, ut nec minimum vestigium tam levis humoris in cerebro, aut ejus in membranis unquam deprehendi possit ? Si nervorum membranae pituitam cerebri possint, ea ferret etiam in alia membra, in genas, in tempora, in colla, brachiorum,

& pedum musculos, quos intraos uestri de cerebro proficiscentes : Nuoc circa Glandulam Pituitariam, maxime circa occipitis foramen, crassiores sunt, magisque distant cerebri membranae : Si per eas ita deductas foris ius ille tardius pituitæ, omnis catarrhus fieret in spinalem medullam quæ proximè abest : Nulla membra ex se fundunt reliquias alimenti redundantes : quare ex nec in cerebro unquam deprehendi queunt : ut namque aliarum partium, ita & cerebri venæ, quod est alimentum residuum in massam sanguineam reducant : huius quoque purgamenta jugiter exhalant pusti cutis & spiracula : Nec cerebrum aliis humoribus dat viam transiuntque, nam hi in eo patefacto tandem deprehendi possunt : Si utina ita decurrerit ut sui vestigia reliquat in renibus, cur non pariter in cerebro sub oculis venit ac cadit sub tactum pituita, quæ æque prompta ad decurrendum haud est : hæc spissa est, lenta & viscida, ita ut si contingat manu filarim ducatur : Talis humor in cerebro nunquam compici potest, nisi homo careat cararhis, sive ut arguant : Qui humor, in ventriculis cerebri deprehenditur, non est mucus, non est pituita : Quæ cum ita sint, intelligendum est omnino pituitam nec naturali initio, nec vultuinis vitio cerebrum, principem illam partem corporis, transire. *Schneiderus lib. 3. de catarrhis p. 127.*

§. 2. Gallinarum cerebrum Coryza laborantium saluum reperitur.

Villani eo morbi genere cerebrum Gallinarum vitari arbitrantur : Ast si ejusmodi capita patefuerint, illud omni ex parte saluum est, integrum & naturaliter coloratum : nares interiores tantum ex illa multitudine muci laborant : Externa rostri foramina forde pleturnque opplent pulveræ, quare ut recipiatur anhelitus, os semper paritulum tenetur : quo sit ut lingux tunica vehementer arefeat : Sic malum curant, rostri foramina gracili teretique penna clementius trajiciunt, butyrumque pipere leviter aspersum datur devorandum, detracta lingux tunica sicciore. *Idem ibidem.*

O B S E R V A T I O V.

Coryza laborantium capita dissecta exhibuerunt vasa per membranam oris, Pituitariam dictam, disseminata, distensiora.

Diffectis Gravedinorum hominum capitibus, vasa per membranam oris dispersa, distensiora & confusa apparuerunt, gelato illo sanguine magis exuberante, in quo candens pituita latebat, ut ea oculis signari posset : cerebri ventriculi, pelvis, glandula & processus in mammillares erant sine spurcicie. *Schneiderus lib. 3. de catarrhis p. 103.*

S C H O L I A.

Hinc colligit missam sanguineam esse fontem pituitæ quæ à cerebro desistere creditur, in quo tamen tanta copia continetur, ut in illud citra perniciem homini non possit; Cujus sententiam, contrariam in compendio, ex Rolsinkio adduximus; De his membranarum oris pituitarii ipsi dictis, sequentia exceptimus. Hoc integumentum aut, quam optime potes oculis manibusque contrahere, si in veris caput, maxillam inferiorem amovendo, & mox perstringas avellanas quatuor ut maxillæ superiores: quo facto Nares incidias utrinque ac diducas: Extrema hæc membrana est fungosa, sublivida, ac extra intrasque venosa, ut facile credas esse hic officium cujusdam humoris digerendi: Quæ os Vomere cognominatum ad gulam & laryngem spectat, illa tunica nonnihil distat: Cum inasitas illa sit divisa intercedente disto Vomere, pluvia vergit vel in nares vel in fauces: ac illa quoque modo huc, modo illuc spiritu impelli potest: Tenuior non aere decidit, hujus vero ipsioris guttur parvis orbibus globatæ se figunt, ut sæpe vomitus illo nix, quem excretionem vocas, concitetur: Perliquidus humor plerumque & copiosior est & acrior, nonnunquam moderatior: ungue talis sine fraude & offensione tunicaque derivatur, hæc idem cunctis sponte subtiliter cunctaverit: acriorem vero sequitur inflammatio, hanc ulcus: Hæc denique membrana materiam coxyæ fulscenti posse videtur: ea namque est sic ampla & laxa, cum ipsius iter sit oblongum spatioquinque ac quoque geminum: hoc si pituita delupet præcludit, spiratio est impedita, sonantior, ac vocalis ipsius etiam efficitur vitiosa: Sæpius quoque coxyæ superveniens hæc tunica quadam inflammatione inter dicta afficitur, hinc illæ narium æthantium verminationes, hinc illæ pruriginis, hinc illæ emunctiones, quæ non sunt sine sensu doloris, sine cunctis, sine steruatione: Nam vapor, quo tinger sanguis hoc affluens, præterea hanc viam & aperit oscula vasorum; quo huius tunica narium tam mollior vellicata, frequens sæpe sternutamentum provocetur: ac ille dolor non circa regionem Proccellorum mamillarum, sed in interioribus naribus ac in ipso animæ canali esse consuevit: Hujus membranae vasa quoque sunt nargidula, de quibus quasi jam exiit sanguis, non crassus est tam pendulus: unde mucos occurrere eliquatur, coit interdum & cadit: *Diffinitio Gravissimum Oris.* Quidam ergo quemulum Glandulae cerebri pituitarie dictæ, deestimus eam hanc membrana ex parte attribuerim? quidam eandem appellaverim Pituitariam, & quidem à sua, Anteriores? Hoc loco alius rivulus Pituitæ juxta fluit, quæ prius non adeo dissimilis, excreando exspuitur: ejus penito cibo immiscetur ac deglutitur: naturalis est modicus, si præternaturaliter ferat, morbos est; Illa membrana quæ additamentum oculis occipitis in ultimo palato involvit, illa inquam pituitam condit, continet & emittit: origo illa ab extremo illo aëris mucoso quem *Os Fœtus* dicitur dividit, & prope usque ad foramen magnum oculis occipitis fertur; Facile se dat in conspectum, colore enim est exalbida, vicinæ membranae sunt sanguineæ, h. e. subflesæ: præterea est plenior & quasi præpinguis, hæc semper vasa est & mucos quodam glutinoso fudit: In hac membrana tam multa vasa discurrentia non notantur, in vicinia autem sunt venosæ varices: quare nunc quivis captoceum erit vasa sanguinis hæc definitia illius mucici materiam subministrare, quæ tandem hac membrana concipitur, digeritur ac in modum sudoris subinde

emittitur. Eam vocamus *Pituitariam posteriorem*. Notandum autem hanc nec reliquo animalium generi esse negatam. &c.

Celebs. Schneider in eo adimpleri nequit Clariss. *Stra*: dum membranae minus illud totum adducit, nulla glandularum facta mentione, cum tamen sub ipsa membrana vasorum, quæ copiosa ibi reperitur, extremis affusæ sint glandulae portiones, in parte narium anteriore minores, quo vero posteriora versus magis recesseris, majores, unde exiguæ quædam excretoria oriunda secretum ex arterioso sanguine humorem emittunt.

Idem *Stra* Ductus novos Oculorum & Narium compellit; De ocularibus & lacrymarum origine vide *Tit. de Oculis affert*. De Nasalibus, per quos materia Coxyæ defertur videtur agi in observat. anatomicis; Nares, aut, succiogens tunica cum non modo in motu, tam hominibus tum brutis, humida reperitur, sed & in vivis perpetuo quodam odore percipitur irrigata, nec tamen perpetua est naribus aquosi humoris profusus rivus, necesse est viam dari tum in nares humorem illum deponentes, tum eo in loco depositum alia inde via abducendum &c. Dubius autem hæc habere ulque dum præter Aqueductum jam ante cognitum, & præter glandulas carnes tunicae *Schneider* Pituitarie dictæ, etiam punctum lacrymalium in nares tunc continuationem, aliumque Naribus peculiarem Ductum, omnia nares humectantia vasa, & simul angustum quasi fœnum, per quod coarctatus in naribus humor in palatum transmittatur, observarem: De primo Nares irrigante canali, humorem quo aurium cavernæ maduerat, eo deficiente, cum à variis fuisset descriptus, non agam, ad cæteros pergens; Secundum, per quem ab oculis in Nares derivatur humor cum jam fuisset descriptus, prætermittam, quem in nares olque pertingere, non id brutis modo, sed & in homine jam secundo observavi: Tercio loco quæ in ipsa narium tunica oriuntur vasa examinanda, quæ dum generum sunt, breviora alia, & nisi vix per expellunt humorem, cuius guttur sensum prodromus vasorum ostia producit, conspicua: Alia longiora, quæ vest canalæ nomen merentur: Breviora illam effundunt humorem quem in membrana pituitaria anteriore observavit Schneiderus: Longiora vero in homine quidem nondum vidi, in ovibus tamen canibusque non raro, sunt autem bina, in uravis narium cavitate nonnubi & originem agnoscit & finem: In illis enim, quæ sub narium tunica in ovibus dispersæ latent, glandulis radicibus plurimæ supra molarium regionem observantur, eleganti ordine dispositæ, & quibus unum in truncum euenientibus ductus exurgit, qui ubi sub nervoso canali dorsum versus ascendit, in anteriora inde reflexus, dorsum inæci & continuum pontis lacrymalibus vasculum progreditur, donec citra extrema fere narium, quo loco supra reliquam planitiem cartilago exurgit, in sinum inara cartilagineam aliam protuberantiam conspicuum se exonerat. Non difficulter in aspectum produciuntur &c. Ex dictis patet quam studiose id egerit animalium Conditor, quæ sedes tegiam sedem, caput pua, inquisierent: Hæc medendi erant cum aurium cavitate oculi, irrigandæ nares, os, faucesque unctuosus humor oblinendæ, nihilominus nec oculi, nec nares, nec fauces, si variæ coovenienter vixeris, quicquam excreant: Quid enim lacrymæ nisi commoti animi signa? quid mucos narium, quid oris spumæ, nisi vix & sanitatis

legibus

legibus deficientis symbola *negat* *si* *in* *alia* *ut* *min* :
 Ubi motus suum implevit ille humor, ex auribus per
 aquæ ductum, ex oculis per collicia in nares derivatur,
 unde partem per ingentes hiatus in fauces, partem
 per angulum fretum in oris cavitatem dimittitur, &

hinc per œsophagum in ventriculum descendens &
 in vasa sanguinea per chyli lymphæque ductus viam
 affertans, peculiarem suo modo circuitum
 absolvit. *Vide plura apud*
mundum.

OBSERVATIO VI.

Muci, Spati carentia, Urina paucitas obserum in cerebro suppressum.

ANno 1630. aperiti cutavi Fontenacii, prope Vicennam sylvam, puellam 14. mensum, cujus corpus & caput optima & iusta conformatione prædita erant, Post decubrum aliquot dierum, gemitus, faciei pallorem, & capitis in humores inclinationem morientem.

Serra diviso osse capitis, cultro dura mater cranio adhærens divellenda fuit, unde illico ad minimum aquæ limpidissimæ, liquidæ, quasi ex fonte, libræ duæ profuierunt: Aliquot ante obitum diebus hilaris erat, saltans & discurrens sed neque mukum, neque salivam excernebat, cum pauca mictione. *David Laigean lib. de Sanguinis missione p.m. 263.*

SCHOLIA.

NEque macram neque Salivam] Pleurica & scrofolus humor in capite si congruantur, aut detineantur, cephalicos morbos inducunt; aut à natura in subditas partes amandantur, ubi varios morbos pro-

creant pro osota excipientium membrorum: Observatum mulieres emundæ naria fluori uterino infecti: *Franciscum Galliarum Rcx, à p. 264.*, aurium ulceribus vizir obnoxius.

OBSERVATIO VII.

Colluvies serosa sive Lympha, catarrhi materia, colligitur in Glandulis plexui choroideo adfixis, unde in ventriculos exstillatur.

PRæter ordinariam colluviei serosæ intra cerebri ventriculos congestionem, ortam ex latice seroso, qui spirituum recens productorum vehiculum est, ac una cum illis in cerebri poros introducit; in vaporem attenuatum, denuoque in humorem aqueum concrefcentem, pro certo haberi debet, quod à glandulis plexui choroideo insertis, nimium repletis, ejusmodi serofus humor in ventriculos exstillatur: Sæpius vidi in Hydrope cerebri Glandulas istas intumuisse, & veluti hordei grana à nimio madore crepantis, flaccidas evasisse, adeo ut serositates allatas minime retinuerint, verum eas in cavitatem subiectam continuo deposuerint. *Thom. Willis cerebri Anat. cap. 12.*

SCHOLIA.

QUoties ab externo frigore affectæ sum male Glandule conglobatæ circa Choroidem Plexum, in cerebri ventriculis lateralibus & alibi observabiles, toties consequi solet Gravedo, qua urgente producta Lympha exillit Salsoacida, talisque gustatur in Coryza; Vnde probabiliter licebit concludere, quocumque demum modo tunc lædatur osæ Glandule, Lympham desistere à suo itatu & qualitate naturali, generatque Salsoacidam: cum ab ipsa non tantum per nares effluente corrodatur luterna ipsorum superficies, ut & faciei cutis, verum quaqu-

verum intra corpus delas, vel distillante, dolores producantur mox leviores, nunc graviores, prout nimium ejusdem vitium exillit levius graviove: Hi dolores sicut adscribuntur vulgo catarrhis, non satis explicatis, ins verius deducuntur à vitia, sicut dictum, Lympha ex valis suis effusa & in partes vicinas, quia aliquando remotas quoque, viam repente, aut acrimonia sua sibi faciente. Ab eadem Lympha vitia de actioe in asperam pulmonum ateriā per fauces delabente, ortum habet ut plurius Plithivis &c. *Franc. de la Boi Symp. Pract. med. lib. 1. cap. 43.*

OBSERVATIO VIII.

In catarrhosi cerebri libra & amplius tenuioris feri inter duram & tenuem meningem reperta est.

EMinentiss. *Cardinalis Camillus Mellius*, non simplices catarrhi, quamvis levioris, molestias aliquoties perpesus, aliquam capitis debilitatem advertit; quibus *febris faciem* se superaddens, 14. ab invasione die septuagenarius moritur.

Cranio ejus aperto plusquam libra feri tenuioris inter duram & tenuem meningem diffusam videbatur, quo turgida pia mater solitam crassitiem quater superabat: Eodem sero, sed rubicundiore, ventriculi cerebri erant repleti. *Henr. à Meinichen in Epist. Th. Bartholini, Ep. 97. cent. 2.*

SCHOLIA.

Febri faciem se superaddens] A sanguine effervescente, nec satis per atatem ventilato: Hinc in ple-

risque tenuioris cruoris parte exalefacta, ac reliquo liquore solummodo in confusionem acto, synochus simplex,

Supplex, seu ploriorum dierum inducitur: In nonnullis variola linguas diathesis si accedit, aut malus adit corporis habitus, febris in putridam periculosam abire & non raro lethalem.

OBSERVATIO IX.

A continuo Catarrhi influxu foramina in basi calvariae exesa & ampliata reperta sunt.

FOramina in basi calvariae soporales artitias transfutientia, necnon alia ad palatum oculorumque cavitates pertinentia, in multis adeo exesa & ampliata reperi, ut non jam vasorum, quæ deducebant, amplitudini responderent, sed duplo quoque vel triplo majora existerent, quod à continuo humorum à cerebro defluxu, uti gutta cava lapidem, profectum licebat colligere. *Felix Platerus. Vide Scholia ad observ. 1. §. 5.*

OBSERVATIO X.

Coryza à tumore globoso in cerebro & aqua plurima in ventriculis.

NOb. per biennium mente alienari cepit; stillabat interim è naribus pituita aquæ copiosa frequenterque: Supra callosum cerebri corpus tumor globosus repertus, quo exemplo fovea relicta, aquæ humore mox repleta, quo & ventriculi admodum dilatati &c. *Vide tit. de mentis stupore.*

APPENDIX I.

Coryza singularis, seu vesicula sero plena, extra nares quandoque propendens, serum stillatim fundens.

Continua Coryza affligit nares Integ. D. *Pauli Moshi* Archiatri Regii, ætatis ingra-vescentis, ut per nares impedita via difficilis sit illi & somnus & spiratio: Obstructionis narium peculiaris causa & ratio est, Quotiescunque molestior est affectus per narium cavitatem prolabitur vesicula oblonga, rotunda, candida, sero plena, quod exsudat: Ea vero vesica membranosa sæpe in medio narium subsistit, sæpe extra nares propendit, levi digitorum impulsu sursum ad caput retruditur naresque deserit; sed circa os ethmoides & olfactum & spitationem impedit: Evacuatur subinde exitillante sero; & liberior reddit olfactus, Ex pulvere sternutatorio sæpe amicorum hortatu hujus Coryzæ quævisit levamen, sed quia majores in naribus obstructions nimia rractione catarrhi oriuntur, ab illo destitit, unumque dormienti remedium est, in opposito latere obstructæ naris *decubitus*: Facillimum foret vesicam pendulam forcice amputare, si de membranae natura & origine constaret.

Ad varias conjecturas mentem toris: An processus mammillares? Per epilepsiam ad nares præterusos author est *Erasmus*, & recipiendis excrementis cerebri destinantur à *Warthone* in Adenogr. Sed quomodo ossis ethmoidæ foraminula permeabunt, nisi p. n. cribrum hoc dilaretur amplius? At quid de olfactu dicendum? ut in quavis Coryza, ita & hic propendentibus vesiculis cessat odoratus, qui illis evacuatis redit: Taceo processus facile rumpi posse nimis sero distentos: Polypi principium quo minus credamus, facit substantiæ diversitas & mobilitas: An duræ matris productio vel laxatio? Id sine insigni doloris sensu haud fieret, quo ramen caret vir optimus: An vasorum lymphaticorum progenies? Nec color abludit, nec contentus liquor, nisi alia subsit causa: Forsan idem cum Polypo generationis modus, Observante enim *Riolano* 4. Anthropogr. c. 6. In cellulis ossis spongiosis carunculae exiles continentur, quas vidit prolongatas & ad imas nares prolapsas, sponte vero adstringentibus medicamentis superne revelli: Vesiculas membranosas sine dubio, loco caruncularum in hoc corpore natura efformavit, quæ sero ex catarrho cerebro defluente intumescant: *Th. Bartholinus hist. 37. cent. 6.*

APPENDIX II.

Phlegmorrhagia.

§. 1. **Q**uemadmodum aliis nares sanguine stillant, ita semel vidi illas pituita tenui cul-dam stillare integrum triduum, per intervalla tamen: Vacuato autem cerebro cessavit: *Qua de causa hyeme nares stillent* notum est, *per compressionem scil. cerebri*, qua causa itidem per ætatem, scil. per fusionem humorum: Hoc loco autem quomodo separatio illa humoris pituitosi à reliqua massa sanguinea contrigerit, merito dubitatur, in cerebro enim tanta copia *latere non potest absque gravitate*:

§. 2. Id plane sibi evenisse assererat conjux N. quod nempe cum virgo adhuc, in egrum triduum absque ullo prorius somno choreis consumpsisset per quattiduum integrum dormierit, Evigilanti vero corperint nares pituita siucera per dies aliquot stillare; cessavit autem iste fluxus usu pilularum cephalicarum. *Salmuth observ. 37. cent. 1.*

S C H O L I A.

Per compressionem cerebri] Vide Scholia ad §. 4. observat. 1.

OBSERVATIO XI.

Catarrhus suffocativus in muliere, cujus cerebrum illa sum fuit, Soli Pulmones vitiosi.

Mulier dies 40. sextum gerens, dum forte sororem est nata, eamque complectitur, paulo post *tenebricosum quid ob oculos observatur*, nec amplius potest consistere; hinc aphonos jacet, ac *primum sterit* ac si suffocante catarrho premeretur, *convellitur*, nulla ratione restitui potuit, omnia tentata sunt, convulsiones perseverant, sex horis post moritur:

Aperto cadavere, Pulmones inveniuntur corrupti, ac sanie saturati & olida repleti, sed hoc non fuit causa tanti morbi, quanquam juvare potuit. In cerebro nihil fere alienum compertum est: In venticulis aliqua erant corpuscula, Sed adeo tenuia & exilia ut parvi essent momenti: Accepimus eam huic morbo alias obnoxiam fuisse: Erant hæc Epileptica, Et non intercesserit nisi convulsiones assidue fuissent, nihil enim est quod tam vires frangat: Vitium illud pulmonum ad subitam istam moriendi occasionem aliquid forte attulit. *G. Ballonius Epid. & Ephem. l. 2. p. 69.*

S C H O L I A.

Mihi potius persuadeo fuisse catarrhum suffocativum per quandam *stygem*, quod his qui multum se exercere event, & in his malis multum ægros agitare malum est. *Jac. Thevenin Notis ad eum locum pag. 74.*

As. primum sterit &c.] Apoplexia, Syncope & Catarrhus suffocativus sunt inter se passiones similes, sed tamen differunt aliquid: Qui catarrho suffocativo oppressus est, ægre spirat: anima certe cum splitu fertur: Qui autem graviore apoplexia aut syncope corripitur, vix vita manifesta est, nec explorandi difficultate vexatur: Pulvis quoque est diversus: Dein humor influens variat hunc catarrhum

suffocet. Nonnunquam intima lingua tantum, confluenta per aures sanguine, intumescit, ut vox sit valde impedita, vulgus latio vocat Catarrhum suffocativum, Nonnunquam musculi laryngis gulæve solvuntur, ut homo maxime presentaneo viæ periculo non vacet: Diagnostica, ut vocant, signa catarrhi suffoc. sunt Grævo doloreque peccosis, difficultas respirandi, vox fere amputata, periculum suffocationis, anxietas, interdum nulli, pulvis tardior ac rarior, Nonnunquam ille oculi utrumque membranas, anteriore & posteriore, pituita, & plus humoris reddunt, quo os scateat, iterum tamen conciccat.

Schneiderus de Catarrh. l. 3. c. 4.

OBSERVATIO XII.

Romani fluxionibus maxime obnoxii, ac in plerisque post obitum pulmonum varia lesio deprehenditur.

A Et Romanus inconstans infalubris est & mutationi valde obnoxius, quare pulmonibus summopere nocet, uti partibus spongiosis, aptis ad recipiendum fluxiones morbosas, quod & observatum à Galeno suo tempore, ut testatur lib. 5. meth. medendi: Sane novimus in urbe Roma, loco profecto fluxionibus valde obnoxio, Et sic multi qui aliis morbis occupati petunt, tamen semper plus minusve in illis pulmones læsi reperiuntur: Nos inter centum cadavera vix quinque invenimus in quibus pulmones non essent aut variegati, aut nigricantes, aut dealbati, aut exsiccati, aut purulenti, aut aquosi, aut costis inhaerentes, aut in totum ex una parte carentes, aut his similia, quod nullo modo oriri potest nisi ab aëre Romano, sed non omni, nam qui summities inhabitant meliori sanitate fruuntur: *Domin. Panarolus Pentecoste 3. observat. 15.*

S C H O L I A.

Caelum Romanum destillationum esse feracissimum testatur quoque Zecchius, consultationibus 20. 25. 35. 41. 45. & 39. Hippocrates lib. de Fla-

tibus tit. 6. morbos ab aëre sojam oculi existimat, qui locus consuetudus.

OBSERVATIO XIII.

§. 1. *Catarrhus vitio cerebri humidioris generis.*

D. De Abbeibroux (*lib. 2. Tra. de Phthisi.*) Catarrhus erat obnoxius: Aperto mortui cerebro, albißimum illud inveni, humidum tamen, ut prædixeram.

§. 2. Uxor

§. 2. Uxor Nobil. N. per hyemes Coryza & ruffi vexabatur; manifesta erant capipleni & catarrhi indicia, &c. Illius cerebrum univcrfum aqua perfufum repertum. *Vide lib. 2. Tit. de Dyfſinea.*

§. 3. Ictericus (de quo lib. 3. tit. de Ictero) Gravedine & ruffi afficiebatur. In ventriculis cerebri liquor facis copioſus, limpideus, falſus.

S C H O L I A.

Commuſis fert opinio Cerebrum Catarrhis plerumque privatum laborare, & interdum etiam propter inferiora, unde vapores effeſantur. Cerebrum nunquam per ſe ita afficitur, nam credunt, ſive illud ſit calidius natura, vel vitio valetudinis, ſive frigidiuſ, corrumpere ſua alimenta & plura gignere excrementa, quae ſe conferant in ventriculos cerebri, & hinc in infundibulum, aut rectam viam aſſeſſent ad proceſſus mammillares, & ad foramina oſſis cribroſae. Cerebrum de ſanguine per arterias allato haurit tantum quantum ſatis eſt, ejus reliquum per venas reduci patitur, quae ratione ad unum omnia corporis membra aluntur: Si vero de vaſis cerebri ſanguis aut humor tenuior exit, non illi leves

morbi, quos catarrhos vocant, ſed graviores & leſiſſimi ſuboriantur, ut ſeiſargus, apoplexia, paralyſis, hydrocephalus: Nec humores, ut vocant, extravafati de cerebello vel ad nares vel ad fauces pervenire queant: Quare illi ſepe in diſſimulatum cerebrum fluunt inveniuntur. Ergo ibi conſtant potius quam deſſunt: Si cranium illata plaga fraſtum eſt, Cerebrum etiam laeſum, ut ulcus ibi remaneat, multi humores deorſum ad infundibulum decurrunt: Si vero de tali ulcere halitus quidam gravis venis in maſſam ſanguineam revehatur, authores ab eo, ut à noxio humore, fluxionem concitari poſſe arbitrantur. *Schneiderus lib. 3. de Catarrho cap. 5.*

OBSERVATIO XIV.

Catarrhus ſuffocans à cerebro molliore & flaccido, Copia ſeri inter utramque meningem. Anfractuam ſuperficie gelatina quodam abſuelta, &c.

I. Spœrlin (de quo Tit. de Paralyſi) Paucis ſeptimanis ante obitum conqueſtus eſt de catarrho mane impetuoſe ad peſtus ruente & ſuffocationem interitante: Diſſiſſa mortui dura meningē plurimum ſeri effluxit, quod inter utramque meningem continebatur: Tota anfractuam ſuperficie quaſi gelatina operata fuit, qua cultello ſauciata, aqua exſtillavit: Hujus ſeri quoque plurimum in omnibus ventriculis repertum. Cerebri conſiſtentia mollis & flaccida.

S C H O L I A.

Catarrho ad peſtus ruente) Catarrhi ſuffocativi, uti & tuſſis cum ſputo copioſo, minime oriuntur eo quod humor aquoſus (prout vulgo perhibetur) à capite in gattur & pulmones depluit, ſed quia latex ſeroſus, modo è vaſis Pneumonicis immediatè in pulmones ſuſſunditur, modo arteriis in laryngem deſiſcentibus exſudans in peſtus decumbit: Si

pororum conſtrictio accedat, & hinc tranſpiratione impedita, propter effluvia retenta ſanguis efferveſcens, ſi ſimul ſeroſo latice nimis ſcatur, plurimum ejus ex arteriis in laryngem terminatio, quaſi evomitur. *Wſſus de Febribus cap. 21.* In dicto Spœrlin plurimum ſeri inter utramque meningem reperiebatur, quia vaſa in toto eo ſcatebant,

OBSERVATIO XV.

§. 1. *Catarrhus Suffocativus à cerebri laxitate & mollietie pendens.*

G. Ener. N. hypochondriacus, nephriticus & aſciticus à catarrho ſuffocativo interitit, &c. Cerebrum ſeroſis humoribus, à juſta conſiſtentia deſſeſcens, diſſuebat: *Vide l. 3. Tit. de Lumborum doloribus.*

§. 2. Obſervarunt medici multos catarrhis obnoxios eſſe, quod medullam ipſius cerebri delicatam & mollem habeant: Propterea ea confirmanda eſt, vitanda cruditas, vitandus rerum valde liquidarum frequens uſus. *Ballonius Epid. & Ephem. lib. 2. pag. 218.*

OBSERVATIO XVI.

In Cordē aut cerebro, aut in utriſque, eorum qui à Catarrho ſuffocativo extincti ſunt, Polypi aut concretiones repertae ſunt.

§. 1. D. Kirſtenius plures obſervavit cordis Polypos, in quibus Catarrhos ſuffocativos ideo oriri imprimis credidit, quia omnes illi in quibus Polypos hos obſervavit catarrho hocce extincti ſint: Credidit ſcil. huiusmodi excreſcentias inhibere aut plane ſiſtere fluxum purpura alimentaris. *G. Sægerus ad Th. Bartholinum Epistol. 85. cent. 2.*

E c

§. 2. Quo-

§. 2. Quotquot *Apoplexia* aut *Catartho Suffocativo mortuus* aperui, in omnibus corpora illa callosa, viscida ac glutinosa, aut in corde aut in cerebro, aut in ambobus aliquando reperi, de quibus scribit Excell. Wepferus Exercit. de Apoplexia. Ex *Johan. Georgio Grisefilii Observat.*

S C H O L I A.

Polypus *cardis*) Exemplum singulare offert *Clar. Tulpus* Observat. libr. 1. cap. 16, de *Mumma Bazio*, quem à morbo attonico extinctum ait, ob thetorem cum catarrho suffocativo affinitate junctum: Dubitari vero potest de ejusmodi Polypis, causa sint an productum ejusmodi affectuum: quandoquidem ab intrinseco affixum per venas jugulares destillatione, sistitur motus sanguinis, qui ob stationem illis in locis concrescere potest, ac formam polypii, &c. inducere: momentaneam enim eorum esse generationem existimat *Kerkringius* & alii. Vide de his alibi.

Apoplexia aut Catartho Suffocativo mortuus &c) Quomodo idem humor Apoplexiam & Catarthum Suffoc. pariat ostendit *Abneiderus* de Catarthis lib. 5. cap. 4. Hippocr. ait, 12. aphor. 5. Si australis hyems & pluviosa, & clementis fuerit, Ver autem siccum & agilonium, Seribus sunt catarrhi perniciem brevi alterari: quo aphorismo Hippocr. & apoplexiam & catarrhum suffocativum indicasse videntur: Sanguis hyeme austrius & pluviosus, vere autem siccior sit aquae aërisque plenior, ac inde multo turbatior, præcipue si corpus cæli ingruis obijciat: hinc catarrhi letiales, qui non per os, fauces & asperam arteriam, sed per venas feruntur, quarum cavius fenili corpori major est, major quoque eam inmensio: Sanguinem ingravescere citate misui ostendit, quare consequens est ut venæ tunc temporis sint magis inanes, utque iis sanguis tanto majore vi, vel tendat ad cerebrum, unde Apoplexia; vel ad pulmones se proruat, unde catarrhus hic suffocativus oritur: Quomodo sanguis in cerebrum aperiis tractus apoplexiam seu itam sanguinis faciat D. D. Wepferus & J. Rhodius ostendunt. Catarrhus suffoc. est ille catarrhus, quo sanguis peritumque puerulus, cum de venæ cavæ trunco ascendente, ut vocant, tum maxime de ejusdem venæ cavæ trunco descendente in cor, & hinc in pulmones confertum celeriterque finit, necnon & interdum in musculos thoracis: Quemadmodum Apoplexia ingruente Sanguis arteriarum in cerebrum: ita oriente Catarrho Suffoc. venarum sanguis in Pulmones, qua superne qua inferne tanto vehementius movetur: Nec *Bocallus* & *Baronius*, qui Catarrhum negant venis deorsum fieri, in hoc audiendi sunt: Tam nota nunc est sanguinis itio in circulum ac quoque reditio: Illam maxime venarum valvule testantur. Eorum quidem rationem *Tulpus* Observ. l. 1. c. 7. longe secus exponit, Ne juvenis inquit, iterum subjiceretur, monitus fuit quolibet vere sanguinem sibi detrachere, sed monitis hinc floccifacis dedit post biennium negligentie poenas, si cui namque dissipatis ageribus submergantur para, sic obruitur quoque facile cerebrum à sanguine, præsertim si vel effingatur vel enervetur membraneum illud otiosum, quod ad coarctandum sanguinis impetum, internis jugali venis incomprehensibili artificio à provida natura inditum: Habent quidem & alie venæ similia repagula, sed ut in illis impeditur sanguinis descensus, ita hic contra ejusdem ascensus:

obruerentur alias facillime à concitati sanguinis copia, repleta athletarum corpora, *Hadriani Tulpus*. Si valvule venarum jugularium, ut videtur *Tulpius*, convelluntur, sanguis tanto vehementius deorsum rucna Catarrhum suffoc. potius concitabit quam Apoplexiam: Quis vero dubitare potest quin illæ valvule in senum corporibus vitari possint? Quod vero mentum *Bocallus* & *Baronius*, ne venæ jugulares refluente sanguine, interdum puerulo crassoque, stringantur, metus inanis est; Nec hanc recursum vel inhabebit furtim fluens de jecore sanguis, vel cerebri pituita, quæ per os cribiforme & cuneiforme se foras edere fingitur: Eo sanguine autem per venas jugulares recutitur, Cor interdum premi posse oon est dubium: Cuiusmodi vero sanguis in cerebrum per arterias jugulares, ejusmodi per venas jugulares recutitur; sanguinis mucus non in cerebri sinus evomitur.

Diserte fluxum purpurea alimentum) Mucritiam Catarrhum Suffocativum efficientem *Vincenzus Baronius* in Pulmones defert per cavæ truncum descendente statuit; *Zacharius* consil. 18. quamvis non neget à capite in asperas arterias & pulmones materiam destillare, censet tamen à toro, & à valvæ ad pulmones peringentibus exactementa delegari: consil. quoque experientia, quibus inferiorum partium, ut hæmorrhoidum, uteri, &c. consuetæ purgationes sunt supprelle, asthma, phthisis, tussis, & copiosior puerulus proveniunt succedere, quæ à capite accedere absurdum est: His, & aliis, nonnulli adducunt ut humores, non solum è venæ cavæ trunco descendente, sed & simili trunco Aortæ in cor, & mox in Pulmones capi opinentur, vocantque Catarrhum Suffocativum & Cordislem, seu catarrhum *fit sub puerulo*, Cujus quoque Hippocr. lib. de morbo Sacro memioisse videtur, Si delusio, ait, ad cor viam affectavit, cordis palpiatio & anhelationes prebuntur, pectus contumpe, quidam etiam incunantur: ubi enim pituita ad pulmonem & cor devenit, refrigerat sanguis, venæque per vim refrigeratæ ad pulmonem & cor resiliunt, corque palpitat, indeque necessarii anhelatio & spiratio, quæ erecta cervice trahitur, iacit. Neque enim spiritum suscipere potest, donec quod influxit à puerula superum & calefactum per venas diffusum fuerit: deinde palpiatio & anhelatio cessant, idque prout ejus copia se habuerit: Si enim magna copia defluxerit, tardius, si pauciori citius: Et si quidem crebriores destillationes fuerint, frequentior morbi insulsi sit, in minus rariot: atque hoc modo afficiantur cum pulmonem & cor delusio perierit *Galenus* neque à destillatione, neque à pueruloneonia, neque à pulmonum tuberculo, neque à suppuratione quæquam repente strangulati posse existimavit, sed à sola angina in qua neque in fluctibus neque in cervice quicquam apparet: At vero (inquit *Fernelius* pathol. lib. 5. cap. 10.) quibus jamdiu & multum pulmones infarcti erant, ut in veteri asthma, multam repentinamque destillationem pleorotique jugulasse restatur.

APPENDIX.

De Catarrho externo, extra calviam à summo capitis vertice in externas & subditas partes delabente, contra Fernelium.

Fernelio, viro acutissimo, Destillatio alia Interna est, quæ è cerebri ventriculis, & è partibus quæ sub calviam sunt, in interiores cerebri sedes prolabitur: alia Externa, quæ extra Calviam, à summo capitis vertice in externas partes corporis fertur, in oculos, maxillas, coxendicem, in crura, omnes denique articulos, quæ tum omnis arthritidis, tum omnis externi doloris causa existat. Ego quidem non negaverim venarum, per faciem & tempora in caput irrepentium, ubi turgeant affluantque sanguinis copia, reliquias alimenti, & supervacua sub cutem effundere, cum sic fieri verisimile sit, idque tum humor, qui sæpe cutis contactu deprehenditur; tum dolor capitis externus, qui sc. ad cutem, præcipue vero ad cervicem percipitur manifeste attestantur: quemadmodum etiam verisimile est vapores & fuligines per futuras extra calviam emissas, cutis crassitie & densitate foras omnes evaporare non posse, sed eorum partem tenuiorem pilos gignere, crassiorum vero una cum dictis excrementis sub cute detineri, misceri, simulque coagmentari, quorum deinde copia & pondere gravatur natura, & ad infernas partes per scapulas transmittitur; eos morbos pariens quos *Fernelius* refert. Sed ea in re fallitur meo iudicio, quod omnem arthritidem, chiram, ischiadem & podagram ab ejusmodi externa destillatione deducit, & ab excrementis duntaxat extra calviam sub vertice capitis genitis fieri censeat. Cum certissimum sit ab internis corporis partibus, scil. intra calviam positæ, septennumero copiam sanguinis biliosi, pituitosi aut melancholici, per venas & arterias ad eas partes amandari, qui ibi decumbens eorum omnium morbotum origo & causa existat: Venio in hanc sententiam, non modo quia ejusmodi morbi sunt nullo præcedente externo capitis dolore; scapularumque gravitate, quæ præire deberent ejusmodi humorum fluxiones ad eas externas partes, affirmante *Hippocr. lib. de Nat. hum.* Omnem partem transmittentem excipientemque, in omni humorum decubitu laborare, atque suis se symptomatis prodere, sed etiam quia ex *Hippocr.* & Galeni decretis, humorum impetus ab uno in alium locum fit & convertitur, ut tum à cerebri Sinibus atque venis, tum ab hepate, lienæ, cæterisque partibus humores à natura ad externas partes transmitti possint, præcipue vero ad articulos: Unde illud *Hipp. 6. Epid. 4.3.* Cui intestinum à dextra parte articulo morbo laboraverat, erat quietior, postquam vero id curatum fuerat, erat dolentior; ubi Galenus in comm. exponit, humorum impetum factum ab intestino colo in articulos: Et sæpe vidimus à diarrhœa intempestive cohibita sequutam arthritidem: In febribus quoque diuturnis scimus interdum articulo dolores consequutos, cum ægrotum alleviatione, materia foveat febre ad articulos à natura detrusa: Ut verum quidem sit à vertice capitis in cervicem, in scapulas, brachia, atque in articulos infernarum partium materiam tenuem atque serosam decurrere, eamque plerumque pituitosam à prædominio; quæ dolores, tumores, abscessus aliquando, multiplicemque morbos pariat, Verum illud etiam exploratissimum est à venis & arteriis membranarum cerebri, ejusque sinibus, materiam vel copia vel qualitate peccantem, per venas & arterias, per spinalem medullam; & per interna spatia ad infernas partes demitti, quæ illos efficiat morbos ante citatos: Si opinio *Fernelii* de Externa destillatione veritatem aliqua ex parte continet, verumtamen omnem arthritidem, &c. ab ea duntaxat prodire affirmat, mordicusque tener ejus destillationis materiam perpetuo esse pituitam, seu pituitosum excrementum, cum Galeno, auctoritati, rationi & experientia ipse repugnet, à nobis venit prorsus rejicienda. *Paschettus l.2. de Catarrhis.*

Negamus externum catarrhum eo modo fieri, & humores de vasis emissos, sub cute per internam, ut vocant, & inania spatia libere vagari, & sine ullo obstaculo usque ad scitæ, ad manus & ad pedes migrare, ut Ischiagra, Podagra, Chiragra suboriantur. Arteriarum nunquam in extimas & internas partium tunicas humores effundunt, aut jamjam effundendo videntur, ut levis horror illa membra percurrat: Hos vero humores excipiunt venæ & revehant. Perite *Paschettus* ait coryza nonnunquam faciei vasa intumesce, ut curis rubeat & sanguine quasi suffusa videatur, Metum autem non facit dum sit etiam de cerebri sinibus materiam harum fluxionum manare. Qua via, quo modo ille humor de cerebri ventriculis usque ad extremos pedum articulos per inania spatia venire potest? Si quis dolore cervicis scapularumque urgeatur, arteriæ ad illos cervicis & scapularum musculorum humores ferunt, ut dolor quidam suboriarur: hæcque ratione arteriarum quasi inflatæ turgent; membranas distendunt & offendunt: venæ autem illum humorem recipiant ac revehant, si corpus eo loci elementer fricetur aut foveatur ut insudare incipiat: Quam multi, & quam mul-

tarum partium Tumores fomentis, linimentis & emplastris ad id apertis discutiuntur: Tumores qui sub cute capitis nonnunquam existunt, quam difficulter sua sede emoveantur, etiamsi illi sunt molles, ut illæ collectiones ex humore fluido & tenui constare videantur. Ergo ex eo effici non potest humores de vasis sub cute capitis facile exire, & sub ea ad quasvis inferiores partes posse decurrere. *Schneiderus lib. 4. de catarrh. cap. 5.*

§. 3. Siquidem pluribus experimentis certo mihi constat nihil Catarrhi à cerebro in partes inferiores ullas descendere, oportet primum erit ostendere qua via atque ductu aqua omnis è plexu chorocide, & glandulis pone cerebellum in ventriculos cerebri, & per infundibulum in glandulam pituitariam deposita & percolata extra calvarie limites deferatur: Atque in crano vitulino olim expertus sum aquam, aut lac ipsum in foramina, in osse calvarie pro foro à glandula excipiendo excavata, injectum, statim omne in venas jugulares utrinque exilire & effundi, adeo ut humor omnis à cerebro secretus in hoc animali in sanguinem denuo redundet atque exoneretur: Quod ipsum in crano humano nuper etiam expertus sum, quanquam enim in osse calvarie humanæ, glandulæ huic subjectæ, foramina occurrant nunquam, at aqua ab hac glandula destillans à vasis ex utroque felle Turcicæ latere, ubi arterie carotides juxta ascendunt, hiantibus quasi osculis excipitur, & in venas jugulares paulo infra suum tortuosum effunditur, quorum ductus facile parebunt, si aqua aut lac e siphone in venam jugularem utramvis, paulo infra tortuosum sinum vi injiciatur, mox enim conspicitur prope glandulam pituitariam diversis in locis erumpere atque scaturire, certo utique indicio quicquid feri à cerebro seceratur in sanguinem denuo refundi eique commisceri. *Richardus Larver Tract. de cordo pag. 159.*

§. 4. Tracheæ arteriæ tunica interior musculosa, binas alias etiam quasi adnatas habet, scilicet Glandulosam & Vasculosam; nam fistula tracheæ interior textura vasorum omnis generis, ac præcipue sanguiferorum, densissima & quasi retiformi obducitur: Quod spectat ad usum horum proculdubio arteriæ & venæ tracheæ tubum tivo sanguineo, propter nutrimentum ejus, perluunt: atque Nervi spirituum copias, & motuum obeundorum instinctus, ad fibras musculares deferunt: Dein quicquid humiditatis superflui, ab arteriis depositæ, Venæ reducere nequeunt, Glandulæ excipiunt & retinent, donec maxie sanguineæ per Lymphæ ductus remandari possit. Si quando ob Lympham copiosius depositam, nimis implentur illæ, humor tum è glandulis, tum ab arteriis in Tracheæ cavitatem extillans. *Catarrhum* insert: Potro ex iisdem Glandulis, & vasorum reticulo, ubique fere intra intimos quosque Pulmonum recessus continuatis, *Humor Catarrhalis* depluit. *Willi oper. posth. sect. 1. cap. 1.*

§. 5. In multis cadaveribus quæ ad usum Anatomicum dissecui, ex quibus quædam poterant esse mucosa & pituitosa, nunquam inveni processus mamillares ampliores: At oporteret per eos ductus pituitam ad os Ethmoides derivari; vel ad basin cerebri fluitantem sponte ad eum locum (sinum sphænoideum) confluere, quoniam ventriculi anteriores cerebri raro sunt anteriorum perforati & in nates pervii. Propterea existimo, omnem nasi pituitam, non per os Ethmoides percolari, sed per ductus, sive canales quatuor choanæ in palatum defluere, vel in cavitatibus ossis sphænoidei collectam, si trahatur per foraminula rabulæ ossis sphænoidei, in ossa narium spongiosa derivari. *Ioh. Ripplum Emcheir. Anatom. & Pathol. lib. VI. cap. VII.*

§. 6. Vulgaris opinio est humores in glandula Pituitaria depositos, per foramina ossis subjecti in palatum decidere: at hæc ut plurimum in crano humano omnino desunt, &c. *Vide plura in Scholiis.* Quoad alterum cerebri Emunctorium, quo humores feroci è cerebri ventriculis in Processus mamillares deponi, indeque per foramina ossis cribriformis amandari putantur, profecto circa hanc excretionis viam ambigitur, quoniam in *Defunctis* foramina isthæc nequiquam humoris, ut ut limpidissimi, transmittunt, &c. *Willi Anatom. cerebri cap. 12.*

ANAT.

Scholia huc pertinentia, Typothetarum incuria transposita pagina 335. Sic. habentur.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO XVIII.

De Oculorum Affectibus.

OBSERVATIO I.

§. II. *Amaurosis à tumore globofo in cerebro nervos opticos premente.*

CALLVS quidam annos natus 24. dolore capitis correptus est, mox sequuta febris, qua cessante, cephalalgia reliquæ nihilominus remanserunt cum vigiliis & capitis imbecillitate: Tandem in oculo sinistro Visio obscurari cœpit, & post mensem etiam in dextro, sequutæque est paulo post in utroque omnimoda cœcitas, nullo vitio in oculo apparente: Postmodum etiam cœcus ille *convulsionibus laboravit*, quæ illum per vices tota hyeme affligebant: Quibus initio veris cessantibus supervenit tussis, febris hectica, exputio purulenta & tabes, qua diu molestatus & consumptus tandem expiravit.

Corpore aperto pulmonum vitium deprehendimus: Verum cum causam Cœcitatæ, aperta calvaria in cerebro perquireremus, invenimus cerebri aqueo copioso humore irriguum, pattémque illius anteriorem, Sinistra præsertim in sede, tumidiorem, à qua cum portio adimeretur, inventus est tumor seu globus quidam, glandulæ seu strumæ instar, inclusus in cerebri substantia, ab ea tamen separatus, propriæque membrana dura contentus, per quam venæ aliquæ capillares dispersæ erant, ovi gallinacii magnitudinem superans, inæqualis & formam pinæ nuci exprimens, cujus interior substantia, alba & æqualis, ovi albumen coctione induratum referebat, sed durior illo erat: Hic cono obtusior nonnihil sursum prominebat, basi vero latiore, ventriculo cerebri, anteriore sede innitebatur, & pondere suo, quod erat drachmarum xlv. *Nervorum opticorum exortui* in cerebro incumbabat, *eisque comprimebat*. Quam causam fuisse cœcitatæ, quod cum spiritus animalis transitus ad oculos fuerit impeditus, conclusimus: cum alioquin in nervis opticis nulla obstructio, aut aliud vitium, uti nec in oculo apparuerit. *Fel. Platerus Observ. lib. 1. pag. 108.*

S C H O L I A.

Hinc colligere licet, (*addit Viri Experientissimus*) graves & diuturnos cerebri vitio accidentales, & incurabiles morbos, ab ejusmodi oculis in cerebro latentibus tumoribus aut vitis frequenter accidere, Et cum ratio hæc sectione indagetur, qui causam cerebri intemperiei aut humoribus tribuant, atque hinc remediis accommodando, operam & oleum perdant, latere.

Convulsionibus laborant) Non infrequens egestas post convulsiones graves & frequentes, sed à nemine quod sciam, rectè descripta causa: Hanc non ab humoris affluu deduco, ut voluerunt, sed quia in magnis illis per paroxysmos convulsionum, parvum omnium, & oculorum simul, convulsionibus, in quibus sæpe quoque convulsi, admodumque exteri & inflexi apparent, attritio sic nimum & sensu nervo optico, illis adnato, illoque simul contorto & lasso, spiritusque visorii transitus impedito, oculos visione privari contingit, atque inde provenit diligenter examinate & consideratione invenimus. *Platerus Pract. lib. 1. c. 7.*

Nervorum opticorum exortui) *Barth. Cætrallius* Observ. 1. v. falli ait & fallere eos qui originem nervorum opticorum ab anteriori cerebri parte deducunt: atque à posteriori, prope cerebellum, prodire asserit, quod

instituta sectione, inverso prius cerebro, manifestum esse ait. Non ergo Tumor ille globosus cœcitatem induxit nervos in exortu comprimendo, sed in progressu & prope intentionem.

Eisque comprimebat) Et si obstructio Gaiæ Særenæ causa communissima statuatur, cum humor pituitosus à cerebro nervos opticos subiens, spirituum animalium commotum impedit, non secus ac in paralyti exteri nervi obstruantur, Ex historia tamen allata certum esse debet adstrictionem & compressionem illorum nervorum, hæc autem occasiorem dare posse, live sit pleura ambliem, sive sanguis, sive pus, alive materia: Sic phrenitidi & cerebri inflammationi, in maligis febribus, uno die cœcitatem successisse, aut alterius oculi vius privationem, fidem facit experientia. Ab hac autem causa oborta Amaurosis, facilis curationem suscipit quamque ob obliuiscione est, quod testatur historia à *Fabrizio Nod.* allata Cent. 5. Observ. 19. cum materia complens promptius remediis cedat quam quæ nervis impacta est.

Nulla obstructio) Opticos nervos perforatos esse scribit *Galenus* lib. 10. de V.P. ad spiritus animalis delationem. Qui coram caviliem defendunt, in simili manifestam esse dicunt, quantum in homine modo

Et 3

nervus

nervus ab exorta non statim transversum secernat, sed paulo ante insertionem: *Galenus* autem 7°. de Placitis c. 4. & libello de oculis, tres conditiones requirit ad pervidendum optici nervi foramen, ut animal sit magnum, nuper maciatum & lucido acie conspiciatur: præterea si nervi non essent perforati, quomodo fieret amarofo? Nulla tamen cavitas sagacissimo *Vesalio* animadverta, qui deprehendit nervum opticum solidum esse, ex variis fibrillis conitarum, interveniente passim substantia medullari: Si fides *Riolani*, eos

transversum dissectos perforatos vidit, & ante conformationem lucem apparere dicit. In ipsa compositione solidiores esse, ut per eorum substantiam spiritus traductus subtilior reddatur, & ne affatim ad oculos illuens cito dissipetur. *J. Ant. Salicmann* Observ. Anat. pag. 71. allecit se in theatro Anatomico, presentibus aliquot Medicis studiosis, manifestum mentum, qui stylum satis caute admisit, in nervo optico oculi bovini animadvertisse & deprehendisse. Vide *Parag* Epistolam ad *Astrucium*.

§. 2. Non admodum abfimile globum glandulosum, cum etiam in cerebri substantia in Nob. Equite, obstupefcentia gravi laborante invenerimus, satis conicere licet graves & diuturnos cerebri vitio accidentres & incurabiles morbos, ab ejusmodi occultis in cerebro latentibus tumoribus aut vitis frequententer accidere: Et cum rarissime hæc sectione indagentur, Medicos, qui causam cerebri intemperiei aut humoribus attribuunt, atque hinc remedia accommodando, oleum & operam perdunt, latere. *Platerus ibidem.*

OBSERVATIO II.

Amarofo ob vesicam nervos opticos circa crucifixionem prementem.

ANno 1590. dissecui filiam Præsidis Hollandiæ, 18. annorum: hæc aliquot ante obitum annis Diabete laborarat, paucis ante obitum diebus cœcitate hæc correpta fuit, qua uterque oculus clarius quidem existerat, nec aut in membranis, aut humoribus vitii aliquid apparebat, ipsa tamen nec lumen quidem candelæ oculis admodum percipiebat.

Huic aperto cranioreperi insignem vesicam, quæ nervos opticos occuparat circa crucifixionem: Hæc novacula perussa, circiter libra semis aqueæ materię limpidissimæ effluxit, utpote materia potius, præ rerum imbecillitate attrahi amplius cum non posset, *adap-juræ* facta, ad caput regurgitarat, eumque locum occuparat. *Petrus Parvus Observat. g.*

APPENDIX.

Gutta Serena illico exorta à sanguinis è vena frontis educatione.

Anno 1676. rusticus capitis dolore ingenti afflictus, adit Chirurgum in vicino commorantem pago, dicto *Ville la grand*, horum Geneva dissito, qui venæ frontis sectionem suadet: Annuente rustico, tunditur vas; sed statim ab eruptione sanguinis, iste de visus titubatione conqueri coepit & obtenebratione oculorum. Pergente nihilominus venifeca in sanguinis emissionem, cœcitas integra succedit, hætenus insanibilis.

SCHOLIA.

Verisimile est capitis dolorem ortum debuisse sanguinis copię in toto & cerebro; quæ prius per vasa communia exhauci debuit: secta autem vena frontis, ad proxima nervis opticis vasa sanguis attractus fuit, quæ turpida eorum compressionem pepererunt. Alias felici eventu *Opelus* in *Gutta Serena* mediam frontis venam percutere solebat, sanguinemque tamdiu evacuabat, donec sponte sistereur. Et nuperis annis insignis *Garcia de Lapsi*, Boedegale

Medicus Hebræus, simili præsidio, præmissis multis vacationibus, cœco visum restituit: Referuntque Practici quidam ob frontis vulnera cœcitate aliquos aliquando liberatos. In quibus sine cœcitate causam verisimile est fuisse compressionem nervorum opticorum à contractis valis, ventis loquam atque arteriis sanguine tumidis, quæ dicta vulnera nonnihil evacuatur, unde compressio subleata reddita est visio.

OBSERVATIO III.

Cœcitas ab extenuatione nervorum opticorum.

NOs licet fateamur nervorum opticorum conjunctionem adeo arctam & inelam esse, ut medulla & pori confundantur quasi, Et in viventibus non possint ab invicem separari, Nihilominus tamen negare non possumus naturam quandam distinctionem in illis observare: Apparet hæc si extenuentur, Sic observavimus in femina quadam cœca *Nervum utrumque extenuatum*, quilibet ad sui lateris oculum migrabar. Inde recte colligere licet in illa conjunctione arcta, naturam tamen unius ab altero distinctionem non negligere. *Gu. Rolsinkius Dissert. Anat. lib. iv. cap. xxxi.*

SCHOLIA

SCHOLIA.

Nervum utrumque extenuatum) Ex Veterum Practicorum mente, qui rectum quam verbum magis erant aucupes, obstructio alia est Oppressiva, ab humore vas inscipienti, alia Attenuativa, per colapsam vasorum & viarum, quæ accidia nervi opicis.

OBSERVATIO IV.

Visus privatio in quodam, cui abscessus in processibus mammillaribus enati sunt:

Ioh. Hualdus annos natus xxi. de dolore capitis quætitus, humiditate cerebri effusa in nervos opticos occæcatur: Adversus id omni præsidiorum genere oppugnatur, nihil proficitur: Audio tandem visum aliquatenus recuperasse: dolores perseverant capitis intolerabiles; omnium remedium vim malum superavit: Præ mali diuturnitate & vehementia interit:

Aperto cadavere, abscessus reperti sunt in processibus, (quibus vires & munia certa à natura tribuuntur) mammillaribus. Illos abscessus melicerides vocare possis, quamquam ad scitrum proximè accedant: Os frontis erosum erat, & perforatum vi humoris acrimonique: foramen erat intus quadrantis qui tres denarios pendet, &c. Paulo antequam interisset nec videbat nec odorabatur: Convulsus interit: Uno antequam interisset anno pedes incurvos retractosque habebat, &c. Tanta fundi calamitas non aliunde orta erat, peritiorum consilio & opinione, quam à latente huius veneræ veneno, *Gulielm. Ballonius Paradigmatæ VII.*

SCHOLIA.

Humiditate effusa in nervos opticos) Vel potius à compressione eorum per illos abscessus: Cum enim in proximi sunt processibus mammillaribus, quod primum par à Neotericis constituitur, verisimile est lege vicinæ vim passam esse secundum nervorum conjugationem.

OBSERVATIO V.

Amaurosis à Subsidentia ventriculorum cerebri, & marcore nervorum opticorum.

Patavii anno 1620. Cadaver pauperculæ cujusdam (quæ per xx. annos Amaurosi pedetentim invadente laboravit, & tandem cancro mammillæ sinistræ occulto, & medicamentis non convenientibus ad thoracis cavitatem detruso, miserrime obiit) delatum fuit in theatrum anatomicum, ubi in causam hujus cæcitatis legitimam inquisivi: Aperto igitur per scissam cranio, inveni duos anteriores cerebri ventriculos subsidentiam passos & conglutinatos, per quos spiritus animalis ad oculos deferri non potuit. Unde nervi optici sensum marcescentibus (apparebant enim hic duplo minores quam in aliis reperiuntur) Amaurosis, seu Gutta Serena, illæis undique oculis indulta fuit: bene enim adhuc nutriebantur, venis & arteriis ritè constitutis, nisi quod arteria ad alterius oculi radicem ingressa turgēbat, adeoque inflammatioem quandam, mensuris nempe regurgitantibus innuabat.

SCHOLIA.

Addebat Excell. *Adrianus Spigelius* in lectione anatomica, quam super pauperculæ caput habuit, vitio huius morbi occurrere potuisse, licet *Paulinias* aliquando ex vulnere frontis talem Guttam Serenam sublatam fuisse assermet, imo rarissime ex obstructione Nervorum opticorum exoriri, sed plerumque ejusmodi dispositionem supponere. Hinc etiam mirum non est quando ejusmodi affectus omnem & multis experiam medendi operam eludant, *Salvator Armen. Observ. xxi. Hæsius Observat. vii. libr. ix. cæ. Structure.*

OBSERVATIO VI.

Cæcitas à putredine vitrei humoris & vermiculo in eo reperto.

Vitreum oculi humorem non inflammari tantum, sed etiam putrescere argumento est anno 1622. ab *Adriano Spigelio* repertus in Vitreo humore oculi equini vermiculus qui C. Gesnero Vitulus aquaticus appellatur. (*Rhodius cent. i. Observ. lxxxiii.*)

OBSERVATIO VII.

Amaurosis à Sero copioso inter utramque meningem, cerebrum deprimente, quod & plurimum imbiberat.

JAc. Rentinger (de quo Tit. de Soporosis affectibus) tribus septimanis ante mortem cæcus omnino evasit, nullo vitio extrinsecus in utroque oculo apparente, vera scilicet Gutta serena excæcatus. Huic serum magna copia collectum erat in spatio quod inter duram & piam matrem est, unde cerebrum cerebellumque deprimebatur: Imo ipsorum substantiam plurimum seri imbibisse cognoscere potui, quia utrumque summopere erat flaccidum & molle, &c. *Wepferus Exerc. de Apoplexia, hist. 4.*

S C H O L I A.

Nullo vitio in utroque Oculo.) Certo indicio nervos affectos fuisse: Illud vero quod certissimum existimant quidam, si compresso oculo ægro pupilla non dilatetur, nervi vitio hoc fieri, quod influxus spiritus in oculum cohibeatur, Verum non competere, cum spiritus animalis non flatus instat oculum distendat eumque adimpleat, quod in retinendo nervo petiatur.

OBSERVATIO VIII.

Amaurosis à contorsione nervorum opticorum producta.

Illuстрissimus Comes Raposwillensis sexagenario minor, à pueritia cæcus evasit: Pupillæ utraq; clarissimæ, erant, & Gutta Serena laborare judicabatur ab obstructione opticorum vel insigni compressione.

Aperto cadavere à Clar. D. D. Paulo Scheibano Medico Aulico, inventi sunt (ut illi paulo post obitum mihi retulit, die scilicet 15. Augusti 1673. Raposvillæ) ambo optici non obstructi vel angustati, sed intorti, ita ut ideo spirituum Visualium commercium manifestè impediretur, excitationis causa. *Ex amica communicatione Clar. D. D. I. Nicolai Binningeri Medici Aulici Montisbelgard.*

OBSERVATIO IX.

Amaurosis inducenda ab aqua cerebri correm madefaciente.

Parvulus, cerebri humidi, ophthalmii obnoxius, soporosus factus est, &c. Postridie stupidus factus est, oculos actius vellicatus aperiens, eos huc illuc obvolvens, nihil tamen videbat, Calvariæ olla exempta, anterior & insynapsidis regio, aqua limpida, per membranas translucente, obiecta intumescere: Cerebri assulatim dissecti portiones nimis madidæ: Cujus aquæ ingens copia, ventriculos omnes ad summum implendo, thalamos opticos comprimebat. *Vide tit. de Soporosis Affectibus.*

OBSERVATIO X.

Cæcitas inducenda à tumore steatomatrico inter cerebrum & cerebellum.

Vidit Clar. D. Prof. Drelincurtius Tumorem steatomatrico consistentia, pugni magnitudine, cerebrum & cerebellum inter, qui cæcitatem primo, mox & necem intulit. *Vide tit. de Soporosis Affectibus.*

OBSERVATIO XI.

Visus amissio in uno oculo, ob cavitatem cerebri anteriorem sanguine cum seri copia plenam.

Juvenis (de quo tit. de Paralyti) Præter motum membræ dextri lateris fere ademptum etiam istius Oculi visum amisit. Capite mortui aperto, anterior cerebri cavitas sanguine cum seri copia implebatur.

OBSERVATIO XII.

Cæcitas ab aqua cerebrum inundante.

Coloniz vldi puerum cui caput in incredibilem molem increverat, Quando vix actionibus animalibus, quæ ex cerebro prodeunt, visum, loquela, &c. destitutum

fuit Inveni in duobus anterioribus cerebri ventriculis aquam ad libras Colonienſes xvij. à qua ejus ſubſtantia adeo diſtendebatur ut gyri non conſpicerentur. Vide tit. de Hydrocephalo.

OBSERVATIO XIII.

Infans hydrocephalicus ante mortem fit cæcus, ob nervos opticos vi aque corruptos.

Hydrocephalicorum cerebrum ſi aqua perſuſum, proceſſus mammillares vicioſe ſe habent; Quid, ipſi nervi optici etiam vi influentis aque nonnunquam conſumuntur, ut ii diſrupti eſſe videantur: Infans paulo ante mortem lumen oculorum amittebat, ſed eos (qui inos hydrocephalicis neſcio quomodo ſolenus eſt) indefinenter motibat. *Schneiderus l. de oſſe cribriformi, p. 306.*

OBSERVATIO XIV.

Viſus diminuitur in vetula, cui pars cerebri ſanguine ſuſſa & mollior reperta eſt, cum ingeni grumo ſanguinis peculiari caviſitate concluſo.

Barbara Zuberin (de qua tit. de Apoplexia) ſeptuagenaria; ab aliquot annis de viſus diminutione cepit couqteri, aliquando recrudefcente malo, nunquam autem cæca omniſino evaſit: Capite aperto, apparuit pars dextra cerebri, ſuperior ac poſterior, inferior, nou tamen ad baſin uſque, & anterior frontem verſus, tota ſanguine ſuſſa: Cerebrum ibidem molle erat, & humor quidam in eo fluctuans manifeſte attactu deprehendi poterat: Inventi & caviſitas ampla, ad frontem fere antrorſum, grumum ſanguinis ovi gallinacei magnitudine continens.

OBSERVATIO XV.

Amblyopia ab excedente in ventriculis anterioribus cerebri humiditate, &c.

Ill. Marcelli Sachetti, (de quo lib. 2. tit. de Phthiſi.) cerebrum in ventriculis anterioribus excedentem humorem tenuem ac pellucidum continuit, qui Amblyopiæ cenſendus eſt opifex, &c.

APPENDIX.

Gutta Serena, viſuſque abolitio aut diminutio, aliquando oritur ab obſtructione aut conſtrictione filamentorum nervorum, corpora ſtriata advenitum.

Prominentiſ quæ Nates ac Teſtes dicuntur, ſuccedunt Thalami nervorum optico- rum, qui etiam ſupra caudicem medullarem epiphyſes, quædam muneri privato, ſc. functioni tantum vitæ ſerviunt: Enimvero viſus nobiliſſima facultas, prout oculi organum maxime concinnum, ita petampum & maxime auguſtum, ad ſenſorium commune, ſcil. corpora ſtriata, apparatus ſive porticum obtinet: quippe nervi optici, ſub caudicem medullæ oblongatæ coeunt, & denuo mox diſjuncti, latera ejus ſcandunt, ubi protuberantiæ appropriatæ ſubeunt, in filamenta medullaria numeroſiſſima, quæ ſubſtantia corticali ubique intertextuntur, abeunt: ita ſtrictura medullares, ſive nervæ, quæ proculdubio ſpecies viſibiles etajiciunt, ſunt omnes parallelæ, quæ recta protenſæ, corpora ſtriata ubique per toros ipſorum ambitus adpellunt: Hinc probabile eſt *Gutta ſerena*, quin & viſus alias *depravari*, aut aboliri, non ſolum in oculo nervoque oprico, ſed interdum in hiſ partibus latere, in quantum ſcil. filamentis illis nerveis obſtructis aut conſtrictis, ſpecies viſibiles uſque ad corpora ſtriata irradiare nequeunt: Nou quendam imaginatione & memoria graviter læſis affectum, demum morbis illis evaneſcentibus in cæcitatem incidiſſe, cujus accidentis ratio videtur eſſe, quod materies morbiſica primo cerebri ſuperiorem compagem occupans, illinc inferius per corticem delapſa, thalamos opticos ſubierat. *Willis de Anima Praſt. part. 1. cap. 4.*

OBSERVATIO XVI.

Cataractæ nigra cauſam in nervo optico obſtructio non ſemper conſiſtere oſtendit Anatome; ſed in vitreo humore & cryſtallini abſentia.

Quis nigra Cataractæ hæcenus non credidit cauſam *Obſtructionem nervi Optici*? Attamen in aliquibus cadaveribus nullam in eo noxam, ſed totum vitreum humorem in aquam reſolutum, & cryſtallini nulla veſtigia deprehendi. *Robinsonius Diſſertat. Anat. l. 1. c. 13.*

SCHOLIA,

SCHOLIA.

Observationem nervi optici.) Notati vult Vesalii Neurologiae cap. 11. quod sicut in Olfactu, ita & in visu Sensio haud tam Nervi quam fibrarum, quae organa intertextae sunt, ope peragitur; scilicet fibrillae oculorum membranis, ac imprimis tunicae sceleratae infestae; ac ad reticuli modum dispositorum, speciei visibilis impressionem suscipiunt, atque rei simula-

crum, quale extra objectum est, representando visionem efficiunt: ipsas autem Nervi movens esse simulacrum illud, sive speciem sensibilem, velut nihil optici ductu transmittit ac communi sensui infert.

Vitrem in aquam resolutum.) Quem & putrescere cenlet Rhodum, Vide supra Observat. 6.

OBSERVATIO XVII.

Visus debilitas in uno oculo ab extenuatione nervi illius visorii.

Celsipinus notat in Anatomie publica Pisis celebrata anno 1590. repertum fuisse alterum ex nervis visorios attenuatum alterum, plenum: Visus autem erat imbecillis in oculo ad quem nervus extenuatus ferebatur: habuebat enim vulnus in capite circa eandem partem: Nervus autem extenuatus non ad oppositam partem procedebat, sed ad eandem fledebatur: Unde omnes spectatores argumentum id certum existimant, nervos visorios nequaquam se interfecare, sed coire & regredi ad eandem partem. *Riolanus Anthropograp. lib. 4. cap. 2.*

SCHOLIA.

Non ad oppositam partem procedebat, &c.) Vesalius Anar. lib. 4. cap. 4. recenset historiam juvenis cupus nervi visorii nulla in parte, nullo congressu in vicem coequebantur, nec se contingebant, sed dexter nonnihil ea sede, qua calvariam fuerat egressus, sinistram, & sinistram dextrorsum nonnihil replebantur, quasi non coalitos occasione nervi congregentur, verum ut commode per suum foramen & calvaria pro-

cederent: Se autem, cum, sedulo & sollicito à familiaribus hujus viri percontatum fuisse, an illi omnia gemina perpetuo oculis obversarentur, ac nihil aliud resciscere potuisset quam illum de visu nunquam conquestum fuisse: Hinc ille putat nervos opticos coeungi potius, ut commode queant per foramina exire: negans unionem hanc quicquam facere ad unionem speciei visibilium.

OBSERVATIO XVIII.

Suffusionis causa plerumque est crystallini humoris incrassatio.

Suffusionis & cataraetæ in Oculis, causa non est concretio humoris albuginei; aut membranae arachnoideae, quae tenuissima propagine parte antica crystallinum, obvelat, sed ipsius crystallini humoris incrassationem Parisius in publicum propalavit Franc. Quarens Med. & Chir. eminentissimus: Confirmavit binis vicibus mea in oculis defunctorum apertis autopsia, qua sine duce ab antiquitatis auctoritate sedere piaculum foret. *Rolfingius Dissert. Anat. lib. 1. cap. 13.*

OBSERVATIO XIX.

Cecitatis in brutis causa multiplex & varia sectione deprehensa.

Hoc tamen perpetuo ita evenire pronuntiare non aulam: nam in bobus, vaccis, equis, ovibus, canibus, oculorum usu privatis, praeter naturalis diathesis tam varia à me observata, ut mirari satis non potuerim: modo nulli humores, sed carne quadam callosa interstitium inter corneam & crystallinum oppictum: modo crystallinum plane cum cornea connexus: modo albugineus induratus apparuit. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO XX.

Hypochyma non oritur ab humore in Oculos influente, sed potius ab humoris Aquei crassitie.

Hypochyma, seu cataraetam, non ab humore in Oculos defluente, cum nulla sit via per quam eo humor ferri possit, sed ab Aqueo humore adeo exsiccatò à causis externis, vel morbis, ut tenacitatem acquirat aliquam, pupillaeque adhaereat eamque obfuscet, & tandem albuminis ovi excocti instar diuturnitate albescat & induretur, pupillamque penitus occultat, proficisci, ut multis rationibus probare possum, sic ex ipsa sectione deprehendi. *Felix Platerus prax. lib. 1. cap. 7.*

S C H O L I A.

Ratiocinibus probare possum. Quas refellit Plenum Ophthalmogr. lib. 5. cap. 9. Ligant, aut, Medici quo loco consistit suffusus humor, & simulacra oculis obversantia, imagines dicta; In Galenico tribonali locum illum definitum interiori facie corneæ & exteriori crystallini: Nos non dubitamus asserere in crystallino quoque, & post crystallinum in vitreo humore posse consistere materiam suffusam, tam enim transmittunt species crystallinum & vitream quam aqueum; itaque si eorum transmissio ab crassa atque opaca materia in vitreo stagnante prohibeatur, suffusione, seu morbo in via, oculus dici debet laborare, tam æquo jure quam si in aqueo humore naect materia: Ceterum id statendum est rariis suffusam materiam in vitreo, rarissime in crystallino hærere, ac fere semper in aqueo observari: Ratio est, quia illi humores propius habent à suis iunctis circumscriptionem, hic fluidus est & alienis terminis continetur; adeoque facile extranea recrementa suscipere aptus.

Causam suffusionis recte statuunt pragmatici omnes humoris alci influxum, vel ipsum humorem innatum crassifacium: Solus Platerus, nullo dūce aliorum desecit à via regia, contendens ab aqueo humore tenacitate aliquam adipiscere causam suffusionis proficisci: fieri vero ab humoris influxu nec ratione ulla probari, nec demonstratione ostendi posse: Desfectionis vero suæ has rationes adducit: 1°. Si ab aqua, vel humore in oculi globum fuerit affluxa, non hac exigua tantum, & vix lentis instar ampla nasceretur materia, sed oculi globus totum distenderet & velut hydropem tumeret. 2°. quamvis suffusionem cataractæ nomine donantur incultioris sæculi Medici non tamen adeo fore rudes iidem ut in eo affectu copiosum humorem uberrim, quàm per amplas cataractas, opinarentur in oculos incurrere; Satis visum ipsis fuit si incumpe-teret iterumpit vico, non copiosius humor; sed paucissimus, quia exigui culi & pene iuvibiles sum ductus, ac proinde oculi globum distendi ac tumere non est necesse: 2°. Nilum statum mare in oculi invenitur quod aquam hanc possit admittere, immo totum undique propriu hu-

moribus ab extra in eonath adeo replem & distensum sit, ut ne guttula quidem aliena locum superet, aut cornea nlla ratione amplius distendi distendere queat. Vereur hic fortassis penerationem dimensionum, ac non est periculum, est enim, aut sit locus extenuo allabenti humori, addensaco nonnulli aqueo, & subterfugientibus aliquibus spiritibus humori forsan aqueo intermixtis: quippe à mero aqueo non distendi corneæ, significant motuorum animalium oculi subidentes & coarctari: itaque spiritus hi leviores cedunt locum extraneæ intruendi materie graviori: 5°. Petit per quam viam hæc aqua in oculum defluit? Non enim per venas & arterias, cum hæ oculi interiora minime subeant: Non per nervum opticum; indignum est partem tam nobilem extremitatibus deferenda aptam statuere; per quam præter aliorum illam spiritum animale transire nobis possit: consurgere veru ad corpus transfigurabilem, ignorantia asium est petere. Nos nihilominus omnes illos modos visusque commodas existimamus: quod enim ad venas arterias que spectat, opinamur oculi interiora omnino eas subire Nervis vero opticis etu utatur natura ad devehendum animale spiritum, abari tamentidem aliquando potest ad deficiendas super fluire; id quod in aliis multis paribus fieri consuevit; sic thoracis pus per sinus cordis transit: Denique quando ad ignorantie asylum, corporis nempe periclitabilitatem nos confagere exprobat, calumniatur magno Hippocrati, qui dixit corporis confluxum esse unum, consipatationem tuam & contemperentia omnia: detrahit Galeno, qui id ipsum confirmavit; experientie, quæ auctora. Sane si quorumcumque defluxionem in arte nobis obvenientium manifestas vias invenire adlaboret Platerus, magnum sibi imposuit opus, magnum laborem fuisse: Possent enim multorum exemplorum congrui inutilitatem ejus sagacientiam demonstrare: Ad extremum porro, suffusionem non semper ob humorem aqueum crassifacium gigni, sed etiam ob alieni humoris influxum hoc arguere quæ, quod incassatio aquei non nisi sensim & pederentim longiori tempore absolvaat: ac crassam & consummatam suffusionem uno die congeri interdum vidit Fernsium,

OBSERVATIO XXI.

Suffusio aliquando nascitur inter corneam & uvæam tunicam.

Anno 1624. in theatro Anatomico, Franc. Plazani ductu, Suffusionem vidimus inter corneam & uvæam, humori crystallino oppositam: cujus materia non erat pellucule similis, ut vulgo creditur, sed dura & mediocriter crassa, squamæ corneæ in modum, candelæ tamen admota aliquantulum pellucida. *tab. Rhodum centur. 1. Obs. lxxxi.*

OBSERVATIO XXII.

Suffusio aliquando gignitur muco tenaci circa foramen uvæ sensim concrecente; illiusque margini interiori adherente.

§. 1. **M**uco tenaci in ambitu foraminis uvæ membranæ seu Pupillæ margini adherente illique prætenso, sensimque concrecente. In uno fere tantum oculo, licet & alter nonnunquam mox simili ratione affici incipiat, visio frequentissime labem patitur, diciturque quod Pupillæ suffundatur, suffusio, Hypochyma. *Platerus Prax. lib. 1. cap. 7.*

§. 2. Ab ea causa Suffusionem oriri didici tum ex erutis & dissectis capratum oculis, illi affectui obnoxii, tum ex sequentibus duobus exemplis: Vidi anno 1663. Burdegala, Vasconie Metropoli, mense Martio, in Suburbio S. Crucis, uxorem Piscatoris, cui nomen erat Simon Sequéus, Suffusione in utroque oculo laborantem: Chirurgus Pardius

vocalist,

vocatus, Leytourienſis Vaſco, quæ oculum ſiniſtrum obſidebat, feliciffime (viſus enim illi oculo reſtitutus) deſcuſſit, eandem operationem autumnæ proximo in altero oculo ſuſcepturus: deſtinatum vero tempus mors occupavit, fuſte enim à vicina in capite percuffa, unde fractura & depreſſio cranii, Junio ſequente interit: Ego veto cupidus cataraſtæ cauſam cognoscendi, annuente marito, oculum dextrum orbis exemptum diſſecui, ac præſente magiſtro meo D. Balano, ad amuſſum examini ſubjecti: A nobis autem deprehenſum, vix tunicæ foramen à materia denſiore obſtruſtum, muco è naribus educto perquam ſimili, totum ſpatium implente, mediantibus fibrillis capillaribus undique margini foraminis adhærere: Eam acus cuspide, Oculiſtis uſitatur, non parvo labore removimus: Eodémque tempore obſervare nobis fuit conceſſum, obteſam cryſtallino humori pelliculam, candicantem & lucidam, à mutua dictarum fibrillarum co hæſione effictam fuiſſe: Humor porro cryſtallinus, tum Aqueus & Vitreus integri & puriſſimi erant. Adſtiterunt mihi Dom. D. Mingelozeau, Burdegala Medicinæ Profeſſor, & Mag. Balanus & Depleſſius Filius, Chirurgi. *Obſervatio Magiſtri Bailly Chirurgi Genevenſis perſiſſimi.*

§. 3. Anno 1668. Vidi in Noſodochio Sancti Bernardi Avenionenſi, quendam nomine Marcum Fornetum, panni bombycini tenuis Textorem, cui, ab Empirico cataraſtæ depoſitionem tentanti, pertuſa tunica Cornea, dilatataque Wua, eadem ipſa die, elapſis humoribus Aqueo & Cryſtallino, perfectæ induſta fuit cœcitas, Exactoque trimetri enata eſt Excreſcentia carnea, pugno major, ſanguinis copiam ex intervallis ædè effundens, ſi præſertim illius ſuſciperetur extirpatio: Unica donatum erat id ſarcoma baſi ſeu pedunculo, pollicis craſſitie æquali, aſperum & tuberculis inæquale, exquisitiſſimo ſenſu præditum, naſum colatere operiens, atque ad buccas uſque protenſum, qua de cauſa os niſico remoto obice aperire non valebat: Miſelus autem poſt annum languorem fatiſceſſit: Alter vero oculus ſuſſuſione etiam affectus, à me orbita exemptus exploratus fuit, adſtitibus Dom. D. Sudra, Ferrara, Guiſone, Honorato Medicis, & Magiſtris Morello, Provanco, ab Horto, Chirurgis: Cunctis autem in prædicto vixæ foraminis obſervare licuit materiam, ſive humorem concretum, marginis circuitui aſſixum, porrigini, ſive ſurfuri, quod è capite pecten decutit, omnino ſimilem, nulla vi exemptum: Nihil autem vitii dicti oculi humores præ ſe ferebant. *Ex ejuſdem communicatione.*

S C H O L I A.

Hoc à me perſape, dum propria manu in quamplurimis utriuſque ſexus, operationem nominam perſicini obſervatum, tam nunquam ex voto ſuccceſſiſſe, niſi crebro acus acie circa dicti foraminis marginem circumdocta, ad tranſiſſionem obſtruentis humoris, non deorſum modo, quod vulgo præcipiunt, ſed etiamnum ſurſum & ad latera, ſcil. oculorum angulis, cum infra ſemper non liceret, ſenſus tamen ſuccceſſu: Idem faciet poſtrema à me petacta depoſitio, in Petro Dunantio, vico ſexagenario, cuius rei teſtes adduco, viros Clariff. Dom. D. Alexandrum Deodati, Facultatis Decanum, Joh. Iacobum Rillierum, Pompeium Deodati, & Le Clero. Medicos Genevenſes: D. Dentandum Patrem, De Mombou & Noel Chirurgus: Prædictus Dunantius, vicenniali oculi dextri ſuſſuſione laborans, ſiniſtro autem orbis, adeo ut duce perpetuo indigeret, à me operationem cægæ, quam quia macuritatem adepta erat non invicis luſcepi: Petacta ergo non membrana, & ad decentemſque locum induſta, atque promore ſapius circumdocta, materia ſuſſuſionem pariens in multipliciſſe particulis diſſiſa eſt, qua ſuccceſſive modo verſus inferiora depreſſi, modo ad ſuperiora impulſi, relique oculonum canchos verſus adducens, donec oculus inæget & nictibus omnibus apparuerit, cuius beneficio nunc ſolus obambulat: Alterius autem oculi ſuſſuſio maturitatis notas exhibet: Operatio anno 1673. menſe Septembri acta eſt. Idem.

Foramen à materia denſiore obſtruſtum.) A me nunquam obſervatum materiam, affectus cauſam, ante vel pone pupillam collocatam eſſe; quandoquidem acm acies, ſi modo obſtruſtionis cauſam remove

intendimus, perpetuo intra foraminis ambitum duſcenda eſt, poſtmodum deprimenda: Quamdiu vero obverſantur culices & acm, cenſeo id contingere ab ea materia adhuc diviſa, necdum ſibiſ, ex quibus, coactis invicem coherentibus: Id quoque obſervabile eſt, à quo tempore illi operationi incumbi, (quam pluries & ſelici ſemper cum ſuccceſſu exercui) me nunquam ſictam illam diſſiſam & ſoliditatem materiz obſtruentis animadverſiſſe, quandoquidem acus intruſa nullam reſiſtentiam inveniriſſe. Idem.

Mucus tenax, &c.) Humoris ſuſſuſionem parientis varium itarum tradit laudatus Platerus: Suffuſio, ſit, ab initio, cum ſit adhuc mucus pellucidus, & locum tranſiſſatur, ob craſſiſſiem tamen viſionem, ac ſi nube obranſa obſcuſcetur, & variis acm volitantibus res viderentur, impedimentum ac hallucinationem parit, unde tunc Imaginatio & Nubecula appellatur: Atque hæc in oculis oondum bene conſpicua eſt, niſi quod illius nigrum, quod ſtellam vocant, non exacte nigrum, ſicut penitus nigrum eſſe debet, ſed turbidum nonnihil apparet; quo etiam, ſi in uno tantum oculo hoc videatur, altero adhuc puro exiſtente, ab illa imaginatione & nubeculis, quæ vaporum cauſa ſimili ſere modo oculo ſe offerunt, niſi quod utrumque æqualiter afficiant, diſtinguitur: Tandem vero ſenſim magis magiſque mucus ille increaſſatur, perſpicuaturæque amittens, ſiciliſque innata cognoscitur, glaucæque ſere, vel cinereo, ut Oculiſta vocant, colore ſe manifeſtat, ac nigrum oculi nonnihil deſens, viſus tunc quoque magis officiit, quem immaturam ſuſſuſionem & aqueam, cum mollior adhuc ſit & aquea, acu deprimi adhuc non poſſit, vocant:

vocat: Postremo vero dicto mucro penitus incrassato dealbaroque, sicuti exiccatione res lucidas dealbari, & perspicuitatem omnem amittere consuevit, ita & hic accidit, visionemque penitus tunc ablata cæcitas omnimoda sequitur: Nisi forte, qui sæpius vidi, loquere aliqui illius, vel in ambulo, tunc illud nigrum adhuc, punctum vel circulum apparet, per quod exiguæ splendoris scintillæ, oculum adhuc luce obscura,

ex qua tamen nihil recte iudicare possit, illustrant: Estque hæc confirmata suffusio dicta, quam maturam appellare solent, ovi albumini coctione obdusæ pelliculæ, & colore & tenuitate non dissimilis.

Enata est exasperata cæcitas. De simili excrescentia carnes, seu fungosa, languioem quoque fuodente, vide Observationem 1. cent. 1. Operum Fabricii Hild.

OBSERVATIO XXIII.

Cæcitas à corruptione cerebri & nervorum Opticorum.

Quidam gravi capitis dolore circa sinciput & tempora ob venereum morbum laborabat, &c. neglectis remediis plane lumine orbis evasit: Oculi tamen nil extraneum pati videbantur. ix. post die oblit. Huic cranium ad coronalis & sagittalis commissuræ regionem splacelatum, &c. corruptum & cerebrum & nervi optici. *Vide iii. de cap. dolore.*

OBSERVATIO XXIV.

Cæcitas à nervis opticis crassifacilis & fragilibus.

Pler novennis in caput ceciderat, hinc capitis dolor, febris continua, cæcitas, &c. Nervi optici maxime labefacti inventi sunt, debitoque crassiore induerant spissitudinem, & ita fragiles ut ad manuum contactum dissolverentur. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XXV.

Oculi ob cæcitatem extirpatio & anatome, cujus humores in sebaceam materiam erant contraversi.

Pler rustico oculus dexter sua orbita prominebat, & inversa utraque palpebra; veluti per *λειτουργία* faciem deturpabat; Aderat dolor capitis cum tensione superioris palpebræ, præcipue noctu: alii similem casum dicebam ei qui à *Platero* l. 3. Observ. p. 766. notatur: alii scirrhum cancrum, qualem *Trincavellius* de aff. part. c. 6. notavit supponebant, Ego *cæcitatem* *Althausii* l. 2. meth. med. vocabam à conferta crassaque fluxione, & distinguebam à *cæcitatem* *Celsi* l. 6. c. 6. quod oculum non penitus orbita sua excluderetur: colluviem ex toto cathartici exhaurendam institui prius tamen correctam, Setaeum trajeci; collyrium hoc ter die applicatum & vitri. 3. rutæ rosæ extinctæ 3i. & pteridæ cimoliz in pollinem redactæ q. s. cuncta cum aq. ros. & euphrag. an 3iij. m. 3. ab usu die per corneam tunicam ad imam palpebram sebacea materia apparuit, Ex hoc deprehendi oculum esse extirpandum, ne vitium per nervos ad cerebrum transfiret: Aegro ergo apte collocato lithotomum filum per oculum læsum iussu traducere, confestim separato oculo ab adnata in angulo utroque, cultello Fabricii cent. 1. obs. 1. artepro orbitam profunde circumaret, & oculum extemplo cochleari ad id conformato eradicaret: Gratia sit Deo, omne negotium absolvimus octo fere minutis: hæmorrhagiam in his, uti convenit largiorem concessi, & tandem insperso pulvere ex stypticis, & collo epithematis injectis, cum dixta decenti lecto concredimus & quieti: biduo post digestio Fabricii nostri utimur, desuper Empl. Basiliconis: facies inrumuit tertio post die, sed sacculus ex emollientibus & carmin. eam depressiorem reddidi, ita cum aliis remediis restitutus est.

In oculo à me dissecto, omnes humores in sebaceam materiam conversos ostendi, tunicas sui juris, uti & musculos, & pinguedinem interfusam. *Martinus Bogdanus observat. med. 1.*

S C H O L I A.

Quo pacto extra orbitam oculus non rupto nervo optico potest procidere? Respondeo nervos admodum extendi secundum longitudinem posse; Nam ergo humiditatis plurimum hic sicipiti in inflammationibus oculorum, facile fit ut laxetur: Ipsi

sorem musculi plurimum inermescentes, cum stipulis in orbita coacti nequeant, extra profluant: plenumque enim ab inflammationibus oritur oculorum procidentia: *Spigelius Anat. lib. 7. c. 2.*

Oculus procidens ob tumorem pone eum delitescens.

EX suppressis menstribus inciderat filia cuiusdam Vittatii in immodicum narium profluvium, quo intempeste ab itacuodia suppresso, convettebatur protinus omnis impediti sanguinis impetus in oculum dextrum, qui inde usque adeo intrumuit, ut sede sua propulsus, deformaverit mirum in modum totam faciem: cujus vitium uti auferret, nihil non nobiscum molitus fuit vir jure magni nominis *F. F. Plempius*, sed successu minus prospero: Induerat quippe jam tum naturam carcinomatis, cum cute livida, tubete inæquali & pure tam acri, ut vitata forent inde narium ossa, & vires præterea adeo fractæ ut nihil profuerint etiam salubertima consilia, nisi fortasse libuisset oculum excidere; quod tamen crudele auxilium, licet succedat nonnunquam feliciter, equidem haud facile suaserim nisi constent vires.

At enim sublata è vivis ægra, vidimus evidentem procidentiam hanc originem traxisse ex tumore pone oculum delitescente: quo adaperto, occurrebant passim venæ laceræ, membranæ distentæ, ossa carie infecta, & tantum sanguinis cum extra tum intra cerebrum effusi, ut nulli mirum videretur petiisse virginem tot hostibus circumventum. *Nic. Tulpus Observat. lib. 1. cap. xxvii.*

SCHOLIA.

Quo intempeste suppresso. Inconsiderate agit quisquis itaque coacere qualescumque singulis profluvium; diligentiæ sunt causæ loca, & vitanda obviæ quæ hic signantur breviter. Satis enim naturam liberare quam onerare; & præter interdum sanguinem aliquando fluere quam indilucidum iohibere.

Usque adeo intrumuit. Male vocant nonnulli quamlibet oculi procidentiam sive *exprolutionem*, sive *exprolutionem* *Æginetæ* l. 3. cap. 22. & lib. 6. c. 19. Loquitur quippe illuc de illa procidentia specie quam produxit vel rupta, vel elevata oculi tunica; cujus etiam meminit *Celsus* l. 7. c. 7. In ipso, inquit, oculo, atque ita notumquam summationis, sive capiti utroqueque membranis, sive laxatis, & similibus signa sunt, unde id *Cæsius* *Græci* vocant: At longe aliud procidentia genus in exemplo allatis cui simile *F. Eustachius* & *Fabritius* *Milæni* memorie consecraverunt, Protruberantiam videlicet, non utraque tunica, elevata, vel instat acini, vel capitis muficæ, sed tumor in totum oculi, effundentem tam late se ex sede sua, ut deorsum faciem universam: Quem defossum excidentis oculi prolapsum, si quidem lubet redacere ad nomen aliquod antiquitati glitacur, videbis cum *Paulo* *Imperialis* vocat. l. 3. c. 22. *Exprimamus*, inquit, oculi & extra perma-

las & ipsa supercilia, lib. 7 cap. 24. *Tulpus* l. 1. c. 1. Oculi immergit, à causa externa induci, & ita uterque locus propulsi, redoluit in obitum exemplum vidi anno 1657. mense Julio, Severinus Dux Longavillanus, Principum Neocomensem, Dilectum suum, post quinque subtrahitimo petulavit, Comitiarum Principem Nobiliss. juvenis, cujus nomen subiceo, qui ubi vale dicturus, post laus epulas, merique liberaliorum haustum, nec sine mentis, equum bis ad ascensum calcaribus, bis ad descensum per præcipuum incitavit vicum: Impudentem Domini periculis equus impellenti & argenti resistit, ac desilire cogit: crebris ille instare verberibus pergit, donec eorum impatiens equus calcibus impetret ac faciem Domini feriet; unde protinus oculus dexteri extra orbitam propulsum, maximo crepante & carnis metu; in diversorium proximum Nobili delato, imminens maxime in toto vultu inflammationis signa deprehendo, oculus ausem, quamquam exorbitans, ac solis musculis colubius, illatus apparuit: Phlegmonem v. a. præterea itaque, obstitit vero crapula & ventriculus cibo po. à que recens ingestis iurgibus, quem iudicia in os penna, oleo madida despo: Eo subito exonerato, sanguis è brachio *maris* illico missus, cujus vacationis tanta fuit efficacia ut illico insubderet vultum & ruborem manui conigerit: Admotum carapula ex pomo acido in aq. rosar. & plantag. cocto, additis flor. rosar. rub. chamom. Rom. hordei farina, &c. Exhibita potio sanguinis fervorem temperans; admodum occipio cucurbitula, à qua ita illam pristinam sedem oculi repetit: Quinta post die iter instituit Nobilis, Principem præviam assequutus.

OBSERVATIO XXVI.

§. 1. Oculi dextri macror & extenuatio ab ætate inennte, ob nervum dextrum tenuiorem sinistro, ultra conjunctionem.

Paululum progressi nervi Optici (quinon ex anteriore parte basis cerebri oriuntur, ut communis est opinio, nam ulterius occipit versus quærendum eorum initium) in media fere via ununtur, supra sellam ossis sphenoidis, non per simplicem contactum vel intersectionem in homine, sed totalem substantiæ confusionem, ut medio vix longioris tractu ob molliorem minus patiantur: *Fesalius*, *Aquapendens*, *Valverde*, aliquando observant toto ductu divisos mansisse: Contactu in quadam conjunctos observavit *Fesalius* quoque, cui dexter oculus ab inennte ætate emarcuerat, quia nervus dexter tenuior erat sinistro ultra conjunctionem.

conjunctionem : Sed in plerisque ordinariè confunditur interior substantia, ut accurata inquisitione deprehendi. *Bartholinus Anatom. Reform. libello 3. cap. 2.*

S C H O L I A.

In media fere via anisetur.) Coalescent nervorum Opticorum ideo a natura institutus, sive ne sensibile utroque haultum oculo gemitur, sive ut spiritus visus altero oculo, si opus sit, rocus conferatur, quæ Galeni sunt conjecturæ : sive denique ob robur & fulcrum hic necessarium, ne in cerebri concus-

sionibus discumpantur, distorqueanturve, oëve ob cerebri optico-umque molliam & humectationem, quod Plenum placet, à dellillarionibus & excrementis aliis flaccidiotus redditi, à tramite suo depellantur. *Iidem ibidem. Vids Plenum Opticobug. libro primo, cap. 19.*

§. 2. Mulicri supplicio affectæ dexter oculus ab ineunte ætate emarcuerat, sinistro interim integerrimo, Huic dexter nervus toto progressu longe tenuior sinistro viscebarur, non solum extra calvaria cavitatem, verum in exortu quoque, & in dextra congressus nervorum sede. *Vesalius lib. 4. cap. 4. de Humani corpor. Fabr.*

OBSERVATIO XXVII.

Oculi Procidencia ob Tumorem inter cranium & duram matrem delitescentem.

Anno 1597. Puerulo trienni aperui caput : Hic aliquot mensibus ingenti laborarat tumore ex oculo sinistro, adeo quidem ut integer bulbus ocularis cum musculis omnibus foras protuberaret, in tantamque accrevisset molem ut duos pugnos protuberantia æquaret : Huic duabus ante mortem septimanis alius tumor ortus fuerat prope musciculum temporalem sinistram, quem ablata cute vidimus peculiari, (eæque crassa fati) membrana obductum intra cutem craniumque hæere : Cranium exiguum habebat foraminulum per quod materiam eicerat natura : Ablato cranio vidimus ocularis tumoris materiam intra cranium & duram matrem collectam universam, integro plane & illæso cerebro : Aperto utroque tumore, vidimus eos substantia cerebro plane simili repletos, permixto sanguine concreto, haud aliter ac si molæ substantiam vidisses. *Petrus Pavvius Observ. Anat. xxlii.*

S C H O L I A.

Prominentia oculi extra orbitam singularem causam dexteri Fabricius Hild. *capit. 3. Observat. 1.* scilicet in cavitatibus illis, sive sinibus exculpis in supercilionam regione, inter utramque tabulam exemplo allato juvenis stylero ad sinistram superciliū vulnerati, nec ære curati, nam exorta tandem inflammatione, sequensque dolore vehementissimo, oculus in tantam molem creverit, ut ad ovi

gallinacæ magnitudinem extra orbitam propenderet : Arbitratur autem pugione prima perforata tabula, sanguinem in cavitatem hanc delapsum esse, ibidem putrefactum, adnatam primo, deind. per consensum totum oculum infusse : maximam enim inter has cavitates & oculi conforium esse, si dem facit foramina ex cavitatibus illis ad oculos penetrantia.

OBSERVATIO XXVIII.

Strabismus unius oculi, & Resolutio superioris palpebræ, ab humore multo cerebrum, nervumque oculi motorium alluente.

Illustr. Marcellus Sacchetti (de quo lib. 2. tit. de Phthisi) inter varios affectus p. n. strabismo quoque unius oculi & resolutione superioris palpebræ affectus fuit ; Qui admiratur, minime Nervos oculorum motores, ab alluente cerebrum humore multo, quem diximus, imbutos, & secundum longitudinem, dum crassitudo cedit, contractos, in alterutram partem contorqueri & convelli facile potuisse, sic ad utriusque partis vitium ; & sui situs emotionem efficiendam uni se comparant hi nervi. *M. A. Severianus de Abscessibus p. m. 275.*

S C H O L I A.

Strabismi, Geminæ visionis & ad latera causam crederet *Heracles Saxena Præfati. Præf. part. 1. cap. 20. §. 8.* io crystallini humoris vitiosam figuram, quam an ex Acasome deprehenderit, an conjecturis allocutus sit, non constat. Depravata, aut, vitio sit ex mala situatione vel totius oculi, vel pupillæ, vel crystallini : Hæc mala situatio si fuerit vel ad superiora vel ad inferiora, facit apparere res geminas : Si sit ad latera, res non apparent geminas : Si queraris causam, Ego veteram proponam quam alibi non inveniri : Iltis crystallinus habet cubam figuram, in anteriori parte est planus, ob id extenuatus terminatur

linea & angulis : Si vertatur oculus ad angulum non mutatur planities : Si venatur ad superiora vel inferiora, mutatur planities, nam angulus necessario se porrigit in oculo straboso ante planitiem alterius oculi sani : angulus crystallini strabosi est altior & eminentior quam crystallini sani : ubi igitur unus humor suam habet planitiem, aliter porrigit angulum, species visibilibus primo recipitur in illo oculo cupus crystallinus porrigit angulum qui recipitur in planitie alterius : ubi autem species bis recipitur, obiectum apparet geminatum.

OBSERVATIO XXIX.

Oculi dextri dolor ab abscessu in cerebro nato ventriculum sinistrum compressum.

Miles acinace faucibus fuit in posteriore capitis parte: die 6. conquestus est de dextri oculi dolore, &c. Deprehendi abscessum magnum, qui in sinistro cerebri latere latitavit proprio folliculo circumscriptus, ex quo pus sœcidum magna quantitate effluxit. Ventriculus cerebri sinister aliquid tantulum compressus; dexter minime, sed aqua distensus, &c. *Vide tit. de Paralyfi.*

OBSERVATIO XXX.

Oculus attollendi impotentia ab ingenti feri copia inter cerebrum & meningas, anteriori parte collecta.

Puer septennis (*de quo tit. de capitis dolore*) de capitis dolore perpetuo afflictebatur, cum oculos attollendi impotentia, quos humum versus semper defixos habebat. Illi in anteriore capitis parte, inter cerebrum & meningas, ingens feri copia cohibita apparuit.

OBSERVATIO XXXI.

Lacrymarum proventus ab aquæ copia insigni in anterioribus cerebri ventriculis, crano membranæ.

Puellæ bienni caput mirum in modum intumuerat, ab aquæ copia in dextro sinistroque cerebri ventriculis contenta ad novem fere libras: Cerebrum in capitis vertice membranæ quasi modo erat tenue, Calvaria fuit prorsus membranæ, &c. Paucis ante mortem diebus, si caput illi vel leviter movebatur, sequutus est mirus totius faciei rubor cum Lacrymarum proventu, &c. *Vide tit. de Hydrocephalo.*

OBSERVATIO XXXII.

Lacrymarum ubertas ab aquæ copia sub pia meninge, & in ventriculis cerebri.

Elizabetha N. per 25. annos intenso capitis dolore cruciabatur, quo dum primo alimenta masticare inciperet, vel aura tempestuosa adveniret, ita exacerbabatur ut Lacrymæ fontium ad instar ex oculis erumperent. Aperto mortuæ cranio, inveni sub pia meninge magnam quantitatem aquæ limpidæ, ac ventriculos cerebri simili liquore repletos. *Vide tit. de capitis dolore.*

OBSERVATIO XXXIII.

Humiditatis ab oculis ad nares deferendæ interceptio, ob calculum in glandula lacrymali contentum.

Otob. x. adfui examini defuncti rustici: præter alia leviora consideratione dignus erat calculus in glandula lacrymali, ad oculi angulum internum sita, occurrens inæqualis valde erat, totam glandulam receptioni humiditatis ad nares deferendæ ineptam reddens: *G. Blasium Observ. Med. 16. Parte 6.*

APPENDIX. I.

De Lacrymarum origine.

Ad palpebrarum interiorem conjunctionem, seu in cantho utriusque oculi majori, caruncula spongiosa ac mollis, meatui ossis subiecti ad nares pertingenti (qui punctum lacrymale nonnullis vocatur) apposita, vel intrusa potius, est Glandula Lacrymalis dicta, quæ humorem lacrymalem non ad oculos, sed ex oculis susceptum, ad nares transmittit, ne foras identidem profluens, obtutus officiat: In angulo minori eadem glandula occurrit, priori plane dissimilis, plana nimirum candidaque, & aliis glandulis non dissimilis: In limbis palpebrarum cartilagineis, juxta majorem angulum, colliculo leviter prominente, observantur duo exigua foraminula, quæ puncta lacrymalia dicuntur, immixtam feram intra membranas palpebrarum transmittentia: Ex hisce glandulis, eorumque vasis, quæ palpebras intrer oculique globum observantur, humor procedens per lacrymales puncta in nares defluit, qui modo parcius accedens, à paucis observatur, modo impetuosius profluens Lacrymarum nomine venit. Quarum materiam quidam à parcius allabente humore distinguentes, diversam utrique originem assignarunt, sic è venis oculo-

rum hunc exfundare, illas à cerebro provenire Platerus statuit: Nec qui à cerebro lacrymas derivant, inter se conveniunt: alii solo cerebro contenti, de viis dissentiunt, dum hi anteriores choanæ canales, illi nervos, isti venas, & nescio quas non alias vias excogitant: Quidam vero præter cerebrum, alias in auxilium vocant partes: sic eas partim à cerebro, per secundum ossis cuneiformis foramen: partim à vertice capitis & lateribus, ad punctum lacrymalium ductum confluere Vesslingius putat: Qui cerebro excluso alia putarunt afferenda, nec hi inter se consentiunt, quidam enim ab oculorum nutrimento, aliis à crystallini humoris, vitreique excrementis deducunt: Schneidetius proxime ex arteriis, *Cartesius* ex vaporibus qui ex oculis quam ulla alia parte, ob nervorum opticorum magnitudinem & multitudinem parvarum arteriarum copiosiores egrediuntur: Sed licet hæc opinioniones probabilitate nitri videantur, Experientia tamen alias vias demonstrat, ordinario naturæ modo magis convenientes, ut enim quæ omnibus partibus communia universalibus organis peraguntur, istæ quæ singulis debentur peculiaria, peculiaribus locis præparantur, & per vasa peculiaria excernuntur: Existimo itaque manifestum satis esse, illum saltem humorem qui motui palpebrarum inservit, ex arterioso sanguine in glandulis secretum per descripta modo vasa adferri: Lacrymas vero nihil esse, nisi humorem qui oculo irrigando destinatus, majori copia affluentem, ideoque cum vasa in Glandulis oculorum observata, manifestas & propinquas ostendant vias, ex oculis aliis & remotis non deducendæ: *Vide plura apud Nicol. Stenonem de Ductibus novis oculorum & narium.*

APPENDIX II.

DE CAUSIS MYOPIÆ ET NYCTALOPIÆ.

Ostenditur ex Opticæ fundamentis Myopiam à spirituum vitio non procedere; sed ab humoris Crystallini situ diverso.

IN Myopia (Latinis Luseiositas dicitur) objecta nonnisi propinqua & fere oculis admodum cernuntur, distita vero minime, vel saltem imperfecte, ut ita affecti notos & amicos prætereuntes non agnoscant, sitque secundum Galeni & omnium fere recentiorum doctrinam, à paucitate & tenuitate spiritus visorii, qui non eget mediis illuminari copia ad perfecte visionem efficiendam, sed ab ea dissipatur: contra vero qui spiritus habent crassos remota melius vident, quia spiritus ille crassus majori indiget illustratione, quæ in majori mediis illuminati copia reperitur: Verum hæc doctrina falsissima ex Opticæ ignorantia oriunda, cujus theorematibus aperte demonstratur ex humoris Crystallini situ diverso has visionum diversitates emergere: Cum enim species objectorum per pyramidem recipiantur in crystallino humore, ad quem conus pyramidis protenditur, si crystallinus ad anteriora & versus pupillam magis vergat, objecta remotiora melius videntur, quia ut conus pyramidis ad crystallinum perveniat, & in eo terminetur, objecta remotiora esse necesse est: Si enim ad oculum magis accedant, conus pyramidis crystallinum transgreditur, & objecta magis confusa percipiuntur: Contra vero si crystallinus in profundo oculi magis situs sit, & ab Uvea tunica magis remotus, objecta debent esse viciniora, ut conus pyramidis ad eum accedere valeat: Unde patet Myopiam non aliter fieri quam ex situ crystallini profundiori, atque ita affectum hunc esse connaturalem neque remediis superabilem: Affectus vero Myopix contrarius, in quo nimirum objecta remotiora melius videntur, senibus plerumque solet contingere, in quibus humoris aquei portio consumpta est, ut Crystallinus ad Pupillam accedat: Adde quod à longa capitis inclinatione, quæ vitæ decursu fit, vel in legendo, scribendo, vel alia negotia tractando, humor crystallinus sensim ad anteriora vergit: Hæc demonstrantur usum specillorum, si quidem Myopia laborantes juvantur specillis concavis, à quibus radii specierum visibilibus disperguntur, sicque efficiunt ut conus pyramidis longius protendatur, atque adeo res, quæ ob distantiam majorem à myopis percipi non poterat, postmodum percipiatur, protenso nimirum pyramidis cono usque ad crystallinum, qui antea in pupilla vel humore aqueo seu albugineo desinebat: Senes contra juvantur specillis convexis, quibus radii uniuntur, & conus pyramidis abbreviatur, atque ita res propinquæ melius cernuntur, quarum conus antea crystallinum pupillæ propiorem transgrediebatur: Vide *Platerum* de Sensuum Læsionibus cap. vii.

OBSERVATIO XXXIV.

Oculi dolor à pure inter cerebrum & membranas delotefcente.

Vulneratur quidam punctum circa os Temporis, hinc gravitas intolerabilis circa oculum partis affectæ. Inter membras & substantiam cerebri ingens copia puris reperita. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

Oculorum dolor ab abscessu tunicato in cerebro Sinistro ventriculo compresso, Dextera aqua distento.

NOb. acinace faucibus fuit in posteriore capitis parte: Sexto post mense de Oculorum gravitate conquestus est, & aliquot post diebus obiit: In cerebro abscessus tunicatus inventus: finister cerebri ventriculus compressus, dexter aqua limpida distentus. *Vide tit. de Paralyti.*



ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO XIX.

De Aurium Affectionibus.

OBSERVATIO I.

Aures purulenta ab abscessu cerebri.

ILLIA Dom. de Masseparault manantem aurem habebat; id quod effluebat erat *hydrops*, suppressum id est, dolor inde capitis ejusdemque gravitas: caput videbatur non posse sustinere: Febris, Nullis malum capitis cessit remediis, moris, Inventus est gravis in cerebro abscessus. *Gul. Ballonius Epid. & Ephem. lib. 2. pag. 270.*

SCHOLIA.

Suppressionem materiei virulentæ mortiferam esse hoc exemplo fit manifestum & eo quod asserit Mar. *Sanctus Barolinus* comm. ad text. *Avicenna* de signis. Exitus internus: Quidam, inquit, Venetia ulcus fistulosum in aure sinistra cum pareretur, ex quo sanies plucima fluere, Medici illius fluxum retioere voluerunt, contra meam opinionem: nam ego a cerebro defluere dicebam, cum quidam Physicorum

ellet me percontatus unda nota sanies defluere, cum sinus ille, non fuisset tantæ capacitatis quo quidem tento, quasi repente mortuus est, adeo præsto mors fuit: Et post mortem, ne vitis essem mentis, plucima sanies ab auribus & naribus effluit, ut ostenderet materiam retentam fuisse in cerebro, quam si foras eduxissent, talis casus minime contingeret.

OBSERVATIO II.

Surditas à tumore Steatomatice inter cerebrum & cerebellum.

Vidit D. Drelincurtius Tumorem Steatomaticum inter cerebrum & cerebellum, à quo surditas & mors inducta, &c. *Vide tit. de Apoplexi a.*

OBSERVATIO III.

Surditas cum Tinnitu, à redundantia aquei humoris & Bdella in cerebro.

Illuſtr. Marcellus Sachetti (vide histor. I. 2. tit. de Phthia) sinistra valetudine ditus quassatus fuit: Surditas & annis perpetui quidem sed nunc se remittentes, nunc ingravescentes soni: Causa fuit tum *Bdella* incrementa ac decrementa, sub Lunæ præsertim recessibus & Synodis: (Nempe se obrulit nobis ex infima calvaria, basin cerebri residuam eximentibus, qua Nervus auditorius in excusculpi ossis auriculæ forulum excurrit, quantus minoris hirsutinis, aut millepedæ ductus est, hinc atque hinc, sed dextera major, fibra sanguinea, aut sanguinis concrementum, quod cum auditorio nervo oblique pergens, ad antedictum foramen finiebat.) Tum aquei in cerebro redundantes ichores: qui quidem & *Amblyopia* censeſſi sunt opifices; quæ res fit hacatione probabilior, quod Generosus vir à Romano cælo, quæ humidior est habitatio, ad nostrum Neapolitanum & potissimum ad maritimam plagam translatus, tum Audiendi tum videndi functionibus omnino melius habuit: quam autem longe optime cum ad sulphurea Puteolorum loca, & ad assas, quæ sunt in myrtetis sudationes curandum se recepit. *M. Aur. Severinus de Abscessibus p. m. 275.*

SCHOLIA.

Tum a uei in cerebro redundantes ichores. Qui si per di. etiam cartilaginofum, ex aure in palatum

defluunt, exitum na si effere, surditas forte minus gravis fuit: Ad radicem apophyseos pterygoideis,

dis, foramen cartilagine cinctum apparet, cuius beneficio muti aperto ore audiunt, siquidem in os loquuntur: Ideo maliciorum auris facillime expurgatur: Hinc in febribus quibuldam conqueruntur acri de gravi auditu, qui tamen non adeo pravam est signum, praesertim si acri prius de purius aut stillatione ad palati latera ac gargarionis radices, mox de depravato gustu conquerantur: quippe plerumque hos lervati observantur, materiam peccantem per dictum meatum ex aere in palatum natura excurrente, ac moliente citius excitato pyralismo.

Soni perperat auris, sed nunc si remittentes, &c.) A varia inaequali illius humoris in cerebro agitatione & Bellæ incremento & decremento: Huc refer quod de Hermopolemi uxore dicit Hippocr. 7. Epidem. eam audisse inaequaliter, ita ut quidam quidem prompte, percepit, etiam summissa quid diceretur: quidam vero alioqui voce pronuntiari oportuisse: Quod accidisse cecesse est, inquit *Paulus* in eodem. organo eodem modo habente aut mutato, mutati quidem adeo crebro, ut nunc videretur audire nimis, nunc non satis, fieri non poterat nisi ob fluxum & tenuem sublimam quae observaretur, velut iis qui ob vermiculum aut partem aliam laborant suffusione: quidam enim vident expedire, tunc forte nullo vapore opposito: quidam mox obscure, vapore intertente: Eodem modo habente organo, fieri potest, ut ob mentis alienationem: quibus enim mens non satis constans, solent eorum quae adiunt, neque audire, neque videre, & rursum quidam facile sentire: Praecipue vero hoc accidere solet melancholicis & ex eo succo insaniuntibus: (sunt enim sicca & ex-carni aere, neque ob id, si adit animus, nimium audire; sin autem absit, non audiunt.

Aura.) Sonituum aurium variat pendet, 1.^o à vitium latitudine vel angustia: Ex consentientia materiae plus minusve crassioris 32. Ex illius abundantia vel paucitate. 4. Ex ipsius cursu continuo vel intercapto. 5. ex ejusdem celeri vel leni alissione, sive ob majorem vel minorem expulsiuae facultatis consensionem, sive etiam quod materiae proprio nullo potentius aut segnius ad elabendum insiliat: Igitur pituitosi humoris collisio sursum facit aquae molliore desludent, autique reddit, si ita loqui liceat, undisonas: crassiores fluxus spatiose loco convolvit, pleniisque irumpentes, bombum edunt graviusculum, sic dictum vel à consilia colloquutionum plurimorum hominum voce, vel à sono apum, vel à rauco cornuum mur-mure, unde foras illi galli vocant *Cornem d'ariller*: Tenuiores cum impetu duro autem longiore tinnitu,

insistat pollicae campanulae, aut crotali everberant: Tenuissimi leniter illabentes, clarum acutumque sibilum, serpentum vel locustarum vocis æmulum reddunt, quem *moysir* nuncupant, licet hac nomina plerumque confundantur: *Mercurius Different. de Sonitu Aurium.*

Bella in Cerebro.) Rem cum admiratione inquirentibus, quid aliud videretur quam Bellæ Hippocr. 2. Protrih. memorata, de qua *Marfilus Cognatus* lib. 11. Vac. Lect. 11. *Severinus* ibidem.

Aura perperat soni.) A vapore, flatu aut aere auris cernitiam subeunte potius quam humoris inflata: Vapores enim tenuis & subtilis, uti minutissimos meatus subire, sic & per angusta foramina (quorum sex interiore hanc cernitiam auditus desinentia, valaque transmittentia esse, in opere Anatomico ostendimus) interdum luculose penetrare sine dubio potest: Et sic quoque non tantum cerebrum afflicto deprimare, sed etiam propter dicta foramina, quorum aliqua è calvariae interioribus huc desinunt, alia extra calvariam occurrentia huc quoque pertinent, cum mulix sint viae, etiam ad auditus organum pervenire posse certum est: quod cum fit sibilum, tinnitum & strepitum auditui offerri necesse est: Flatus aut aër idem potest efficere: qui si in interiori hanc auditus cameram intrumpat, & per angustam viam velut coactus feratur, sibilum edit; si per aliud foramen, sic instructum ut in fistula formari solet, Tinnitum efficit: Si vero per ampliores ductus, & per anfractuosa illius loci cuniculos dissecat, alium aliquem strepitum facit: hoc saepe, si per vim eo propellatur, evenit, ut cum nautibus compressis, & ipsius aëre vehementer impulsio nasum emungeat volumus, interdum accidit ut illius portio per foramen è narium amplitudine auditus organi causalem geminum (ut in Anatomico opere ostensum) intrumpat, & sibilum vel tinnitum diu saepe perseveranter excitet, interdum mox, aëre eisdem viam erumpente, quod capitis deglutiendo citius fieri crebro expectus tum, cessantem: Ab interna etiam causa: Flatus hic in auditus cameram excitari potest, si excrementitia humiditibus, circa peritostia cranii collectis, inque flatus convertis illic colligantur, unde in cephalis acriquis, & capitis & circa oculi doloribus, in lue venerea, tinnitus aurium admodum est molestus: Spiritu quoque, si arteriola quae hanc sedem subit, copioso, vel calidiore impletur, vel in ea nimium agitetur, validiore tunc pulsu facto in auribus, pulsans in auribus fit sonus. *Placius Praef. lib. 1. §. 1. cap. 8.*

OBSERVATIO IV.

§. 1. Surdus quidam à nativitate ob defectum officii Incudis dicti.

Quare surdi à nativitate muti reddantur, plerique varia tradiderunt, usque ac Lute-tix magnus naturæ interpres, *Petrus Merfennus*, in surdo & muti à nativitate, post mortem deprehensum fuisse defectum officii Incudis manifeste invenit: Hic utriusque affectus causa censeretur potest illa maxima colligatio quae auribus est cum vocalibus nervis.

Casspar Galderal illustrat. Med. xxv. p. 192.

§. 2. Scriptum mihi est à Medico Turonensi se aperuisse cranium hominis, à nativitate surdi & muti, cui è tribus auris officulis Incus de erat. *Marinus Merfennus Epist. ad Beverovicium, in hujus Spicilegio de calculo.*

S C H O L I A.

Defectum Incudis.) Post meum Auditorium an-tropha Cavitas se pandit quae Tympanum vocatur, quod nervosa membrana orbiculari sit obrenta. In illa cavitate tria officula occurrunt, à figura quali-

cunque rudimento *Mallei*, *Incudis* & *Stapedis* nominibus indigita, quibus quantum Innominatum additur: Vltus eorum est, *impar*, *Excell.* *Articulatio*, *Not* quod invicem percussa strepitum edant, sed ut species

soni excepti ad inferiorem pertinet, & aurium excrementis via patet: Nam *super fenestram ovalem* (sen superiorem claudens, ab Incude movetur (unde aperitur fenestra, ut species soni in nervum trajiciatur, & locus à malleo, malleus à membranula, tympani aëris externi appulsu percussus (que de nimium introPELLANT, malleus propugnaculo est) quod dum fit, introPELLUNT hæc, & gibbare dicitur, unde aër congenitus adhuc, qui per cochleam erans efficit ut nervi auditivi propagine sonorum species per fenestellas delatas suscipiant, & cerebro submittant, atque ita

malleus tantum intro movetur: In recitatu vero extrorsum movetur cum membrana tympani, à musculo illo minimo à *Cassio* invento: Horum odium usum sic constituo, dic quod Incude deficiente, *Suspes fenestram ovalem claudens*, ab Incude absente moveri non potuit; ideoque clauda, in prædicto Surdo, manebat fenestra, sonorum species in nervum transmittens. De usu horum officulorum & Tympani vide *Eradicif.*

Willisium Tract. de Anima Bruti. part. 1. cap. 15.

Julium Cassium Placent. de Organo Auditus lib. 1. cap. 12.

§. 3. Officula tria Auditus sunt siccissima & durissima, æqualique magnitudinis in infantibus atque in adultis, ait *Riolanus Anthropog. lib. 6. cap. ult.* Illa ex pueri, tertium annum prætergressi, à nartivitate surdi & muti capite admodum exilia, ac tertia patte minora, exempta peritiss. Chirurgus L. Bailly Genevensis penes se asservat, ac nuperrime mihi communicavit.

SCHOLIA.

Dubitari tamen potest an eorum officulorum, ut & Tympani, aliquis sit usus ad Auditus, si verum quod assertit *Riolanus Encheir. Anat. lib. 4. c. 4.* In naturali, ait, sorditate, à conformationis vicio, An tentandum illud experimentum, quod *Isopiano* & feliciter successit cuidam, qui intus auri scalpio in au-

rem profundissime, dirupit tympanum, stregique officula & audivit? Præterea in Simia, acuti auditus animali, nulla intus in osse petroso officula reperiuntur, asserente *Julio Cassio Placennio de Organo Auditus lib. 1.*

cap. 12.

APPENDIX.

De usu membrane Tympani dicti, quod meliori acutiorique auditui tantum conferat.

Tympanum non audit, sed meliori tutiorique Auditionique confert: Si hæc pars destruat, sensus adhuc aliquandiu, rudi licet modo, peragi potest: quippe experimento olim in cane factum constabat, quod perforato utriusque auris tympano, auditio adhuc ad tempus perstaret quæ tamen post tres circiter menses penitus cessabat; scilicet postquam sensorii ad externas injurias patefactis crasis everteretur. Videtur ergo quod Tympanum auditionis instrumentum præliminare & quasi præparatorium fuerit, quod soni impressionem, siue species sensibiles primo suscipiens, eas in debita proportione & apta conformitate, versus Sensorium, quod adhuc interius constitutum est, dirigat. Simili officio fungitur respectu Auditus, ac tunica oculi pupillam constituentes, respectu visus: ut æque membrana species sensibiles refringunt & quasi emolliunt, easque sensorio non nisi proportionatas tradunt, cui nudo si adveniant, tenetorem ejus crasin facile lædant aut obruant. *Willis de Anima Bruti. p. 1. c. 14.*

OBSERVATIO V.

Auditus læso à Sordibus aurium lapidescentibus.

Dubium videtur an in Aurium meatu ex sordibus possit generari calculus, quia ex antiquis Medicis, solertissimis investigatoribus affectuum humani corporis, aliquem non inveno, qui meminerit calculi Aurium: Recentiores noverunt, nec mirum, quia artes per additamentum fiunt: At certo statuendum rarissime id confluere, ac solum in iis qui negligentia magna ducti expurgationi harum sordium operum dare noluerunt: Si ex flavo bile in cysti fellis crassifaccta calculi generantur, cur ab eadem materia non fiat in auribus. *Iul. Cassertus Placentinus De Auditus organo lib. 1. cap. 20. p. 90.*

OBSERVATIO VI.

Aurium dolor à cerebro humidior.

Mulier acerbissimi capitis dolores & Aurium: Sine intermissione admittebat summum cephalicorum per infundibulum: Aperto capite aquæ magna copia reperitur: causam medici retulerunt ad vapores ita frequenter suscepos. *Ballanius Paradygm. 143.*

SCHOLIA.

In basi cerebri sum vel sanguis effunditur in summis doloribus capitis inflammatoris, quæ dum exitum querunt per cavitates Aurium, dolores acutissimos excitant, qui ad dementia & mortem præcipitant.

An in ista desperatione liceret terebra perforare occipitalem alterutrum latus, ut deat exitus humoris superflui, puri & cerebrum consumpente? *Riolanus Encheir. lib. 4. cap. 2.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMII

SECTIO XX.

De Narium affectibus, Odoratus læsione, Polypo, Excretionibus
p. n. Hæmorrhagia, Sternutatione.

OBSERVATIO I.

Odoratus anisio ob abscessus in processibus mammillaribus genitos.

L O. H. Hualdus annos natus xlii. de dolore capitis querit: humilitate cerebri effusa in opticos nervos occurrat. Adversus id omni præsidiorum genere oppugnatur: nihil proficitur, imo & Empiricorum præsidia advocantur. Aperto cadavere abscessus reperti sunt in processibus mammillaribus, illos abscessus Melicerides vocare possis, quamquam ad scirrhum proxime accedant: Os frontis erodum erat & perforatum vi humoris acrimonisq. Circum foramen obsita erat caries multa, quæ tempore exedisset: Ossa autem ethmoidea parte interna magis cariem contraxerant, & paulo antequam interisset nec videbat nec Odorabatur. Convallus interit: Tanta fundi calamitas non aliunde orta erat quam à latente luis. Venereæ vèpene. *Gul. Ballonius Paradigm. §. 7.*

SCHOLIA.

E X Schneidei sententia, Papillares processus non sunt organa Odoratus Nervus autem tum à crassa membrana, tam à processibus papillaribus propagati, spiritum animale ad usum membranam dederunt: membrana vera ipsa est verum Odoratus instrumentum: Nova hæc sententia *Rossvigii* aridet, negant propagationem inferius accumbentis medullæ corporis, medullæ albicantis canalibus, processibus illis, nervi odoratorii nomine dignam, Eo quod utraque pars tota productiones cerebri continet, cinerei, & medullæ albi, primi sensui iudolè & vicem sustinentes, invicem tandem ex ampliori initio, capite & radice in unum coalescentes finem, caputem extremum, quæ in foramina cribri se insinuant, & cæssa meningæ invellit nervorum odoratorum vicem sustinentes, sentientes odores specialem vim membranae narium impertit: Neque superius adducta exempla contrarium evincunt, Non à Ballonio allatum memoranti abscessus repertus in processibus mammillaribus, quod momento genitus non fuit, com tamen odorandi via tantum paulo ante interitum, facultatibus omnibus jam labascentibus, extincta sit: Neque secundum ex *Rubei*, & tertium ex *Abundens*, cum hi odorato privi sim, quod interior narium tunica, genuinum olfactus organum, male simul habuerit. Quia *Abundens* sententia nova est, optime stabilita, eam hac adducere, ex ejus libro de ossæ cubiformi, oportet prætere. *Membrana*

munes esse videantur, tamen in naribus & exquisito sensu tactus donata est, ita ut injuria sterocornu fiat: Hæc tam privata tunica, tamque sensibus intima narium, sinus, cavitates & tubulos mure invellit. In humanis naribus in corpus spongiosum cavernulis plenum, quod certe ingens est, & satis speciosa quoque sunt cæteræ cavitates: In bubulum, bovis, ovæ, capreoli, porci naribus, etiam aliquot tubuli conspiciuntur, qui affabre ficti sunt, & perquam callido artificio caveri: hi vero in bestis variè differunt: cæterum cavitates illorum munde sunt, inane & ære admodum plene: cave enim pures tales tubulos à natura in eam rem fabricati, ut hi de cerebro destillantem pituitam cuncipiant, retardent & tandem de se egeri pariantur, Quid? cuius raro aut nunquam pituitam naribus rejici: Ego si quidem canum nates incidentes cutavim profero in his meilice tortos & in te revolutos tubos, quos ego ita vocito, adveni, qui interveniente membrana tenui & pellucida colligati erant: hos si evolvebam & jam extendebam, illi oppido quam longi erant, sunt eorum quasi glomerati, quare eos deduci necesse est: mox Leporarii, & etiam vulgari canis interiores tubulos inspicis, sed eos multo minores teperiebam: Dein hos tubulos qui in bovis, ovæ, &c. naribus invenimus, non ad excrementa recipienda daos esse, illud sibi argumentum est, quod non aperti sunt, sed utraque ex parte, qua superne, qua inferne cæci: qui ergo tam crassus humor huius vel colligi poterit, vel ita in reddi? Suntque illi, non semiolei, non cartilaginei, sed membranei, quos tubularas vesicas vocare licebit: Hæc sunt vapidæ ære plene, aliqui junones & perquam munde, nec in his pituitosus humor reperitur: Hæc autem superne, & anteriori & acuminato cerebro, tendunt duo nervi, quorum

membrana ex membranis cerebri, medulla ex ipso cerebro, in majorebus avibus trahi videtur, hi vero sunt exiles, teretes & oblongi, nam sunt expositi nique in principium ostii, quod eo loci plenius latiusque est. Hi canales, aut si vis filamenta, erunt vel ipsa organa olfactus, vel natura & officio nervi. Non possunt esse primarium Olfactus organum, quia odorandi sensus ac ratio in tam angustis latus contineri nullo modo potest. Sunt ergo nervi, qui more nervi optici, aut auricularis nervi spiritum animalem impetunt: Si ergo nervi sunt, non possunt esse primarium Odoratus organum: Jam illud avium in naribus nulla alia pars esse potest quam hæc cochleæ cavatæ & quasi tubulæ vesicæ, quæ pectorei membrana sunt involtæ, ut etiam tuicæ in avibus, generis omni olfactus organum, illorum nervorum ope esse possit: In hominis quidem & humani cranii, os cribroforme multis foraminibus insignis est, quibus non duo, ut in volucribus, sed plures & admodum exiles nervi, (ita enim vocamus illa filamenta) feruntur, qui intunicam nasium intima operientem inferuntur: quare illa nasium membrana admodum sensilis, & ad odores percipiendos vehementer apta evadit, quamvis ejus ad sensum etiam plurimum conferant nervi qui, diversis tramite à restio passim proficiuntur: & quamvis hæc nasium tunica, etiam propter illorum nervorum multitudinem maxime exquisito sensu gaudeat, tamen verisimilimum est eundem magis magisque intendi à filamentis illis, quæ de dura cerebri meningē tracta, ad hanc tunicam per foramina ossis cribroformis meant, ac in eam quoque verum inferuntur: Hæc filamenta, aut has fibras, nos in anatomis nervos vocare consuevimus: nam quamvis quædam foramina ossis cribroformis, in hominis & quorundam animalium cranii sunt adeo angusta, ut ejusmodi quid quod nervus digne vacari possit, vix transire queat, tamen quædam sunt spatiosa, ut illa trajectory filamenta hoc cognomine mereri posse videantur. Nam cum in majusculis illis filamentis quædam medulla intus inclusa esse videatur, certe illa impone nervos vocabimus: Sunt enim illæ majores fibræ quæ tibi aut quali caligine citius, quam membranae, ex quibus consistant, de dura priusque meningē, & intus in eis deserviens me-

dulla, de anterioris cerebri medulla trahuntur: amque rem reclusio bovis cranio ad faciliorem contemplationem poteris. Anque quam multi sunt nervi qui tam exiles sunt ut vix sub oculo videantur? Siquæ illas fibras nervi nomine dignari dubitas, ideo quod non de interiori cerebro, ut plerique nervi nascuntur, potius tamen nervos minus proprie vocari, nec organis has nervosas fibras nasium tunicam, quæ maxime sensilis est, multo magis sensibilem reddere. Pericranium acd est ischia, ideo quod à dura illa meningē originem ducit, quam sensibilibus itaque est hæc tunica, interiorum nasium, tum ob has nervosas fibras tum maxime ob tertii paris nervos, hinc Lindius, Nasium tunicam tam exacte nervus quidam annectitur, ut *Vesalius* crediderit ipsam ab hoc constitui: hæc pectet sensus ille exactissimus, qui cum sicior aer & asperior sternutationis sicut accenimam & frequentissimam: Si ergo aeris hincitatem tam exquisitè sentit hæc tunica, etiam illam percipit quæ odoriferæ insitione sit major. Quare eadem tunica & siccatas & odoris, qui aeris sicco insensum habere videtur, cum illa aere sicco vehementer, vehementius autem eo sicco, jura & odoro laceat, satur, &c. Præterea illi procellus manilla: es ob plures causas contumpi quæunt: Si Hydræcephalorum capica recludimus, licet in illis cerebrum illa aqua perfusum est, hi procellus vinois se habent. Nec tamen Olfactus læso animadvertitur, nisi simul insensum nasium tunica assiduam. Vide plura eodem libro per *Hydrom*, ubi de *Amplexu Odoratus*, & *Vesalius* de *Anatom. Pract. part. 1. cap. 13.*

Nec odoratus? Olfactus læditur dum ad spongiosas membranas nasium, os, palati & faucium, cum sanguine nutritio in corde, impuriore adhuc per mixtam chylo, inest nasum carotidum tami deferunt substantiam, neque eadem per venas cum sanguine se vehunt; hinc membranae utrimque temperantur viciatur & organica in mensibus similitudine membranae essentialiter propria constituitur. Nec solum tunc odoratus actio læditur, sed & *visus* & *plura* oriuntur, consumages & chonacæ, multarum inter eundem durantes spatio septimanarum, arteriis ex corde & venis per eor, ex toto semper somitem suppeditantibus corpore. *Ga. Ralsinus Dissert. Anat. lib. VI. cap. XVIII.*

OBSERVATIO II.

Odoratus privatio in quodam, quia Nasium tunica non obtinebat nervos qui ipsi debentur.

Quemadmodum apud Columbum juvenis, nomine Lazarus, cibaria gustare non poterat, quod hi hujus paris nervi in occiput derivati essent: Ita juvenis (de quo *Englischius Rudius*, qui à nativitate Olfactu carebat, nasum valde retinuum habebat, cui vox omnino illæsa, facilis respiratio, necnon copiosa (præsertim post sternutationem per nares expurgatio) aderant, non Odorabatur, quod tunica nasium ejusdem paris nervos, qui ipsi debentur, non nata fuisset. *Victor Schneiderus lib. de Osse cribroformi, pag. 118.*

OBSERVATIO III.

Odoratus privatio ob papillarium processum & odoratoriorum nervorum partis defectum.

FAlcoburgius testatur est in quodam Tabaccobibulo famosissimo post mortem dissecto, papillares cerebri processus cum quadam nervorum odoratoriorum parte defuisse. *Ralsinus Anat. lib. II. cap. XX.*

Odoratus amisso ob lapidem circa cerebri basim inclusum.

CLAR. D. Nic. S. Michel, dum per aliquot menses quendam Patritium Venetum xlv. annos natum curasset, qui à pueritia fragrantissimis odoribus vehementer delectabatur, in maximam tandem Olfactus organorum obstructionem incidit, ita ut nihil plangere, etiam fetidissima olfacere poterat, cum dolore capitis obtuso, & maxime gravativo, adeo ut caput semper in prorsum & pendulum habere cogeretur: Adhibitis autem multis calidis & omnis generis medicamentis, in febrem continuam incidit quæ intra nonam jugulavit hominem.

Detracto cranio & exemptis membranulis, alteram per medium cerebri mollis sum sectionem, nihilque in ventriculis cerebri reperimus: At dum magis cerebrum excavavimus, tandem prope basim lapidem compressum, talem nummi instar, sed non omnino rotundum, cineritii coloris reperimus, qui oscuneiforme & olfactus meatus plane impediebat, adeo ut nec olfacere nec expuere poterat. Quo reperto & expurgato, quod mortis causam non faceret, abdomen aperui, atque membra omnia naturalia examinantes, ultimo jecur valde obstructum, durum, & quasi lapideum, nigri coloris, carbonum instar: sanguis que in eo contentus perinde erat atque atramentum, valde ater & corruptus, quem mortis causam fuisse affirmabat dictus Dom. quod vel illo tacente constabat. *Observ. D. Garatti Medici Ausfriaci.*

S C H O L I A.

Notandum Hippocr. lib. de canibus, Odoratus organi sinceritatem requirit ad ejus perfectionem, Nares tamen succingens tunica, *albuginea*, veram olfactus organum, non modo in demortuis tum hominibus tum brutis humida reperitur, sed & in vivis per, petuo quodam madore percipitur instigata à Duobus quibusdam in menses tam illam insensit, de quibus videtur, de Cataris c. de Coryza: Unde constat humiditatem illam Olfactui non omnino obesse, cum & illi in canibus, quibus odoravis eximia, reperitur.

OBSERVATIO V.

Odoratus amisso ob sædorem illarvium; è qua duo vermes geniti, circa olfactus organa cohibitam.

Odoratus perit aut imminuitur impedito narium ethmoidisque ossis meatu, quo spiritus ac odor duci solet, idque vel sarcinate, vel polypo & phlegmone, vel gravedine: At si horum nulla signa comparent, offensionis causa vel ad priores cerebri ventriculos, vel ad eas propagines, in quibus est odorandi sensus, referri debet. In his vel intemperies, vel humorum copia, vel corruptela sensum ejusve spiritus contraminat: Circum eas sedes Abscessus interdum fiunt, nulla febre, minimo dolore, è quibus ruptis animadverti pus syncerum per nares affatim profusio, perinde atque è purulentis auribus, idque nullo incommodo valetudinis: Sed & in quodam milite, qui resimis erat naribus, ex foetidiore quadà eluvie diutius cohibita, vermes duo villosi instar digiti, illie geniti inventique sunt, qui tandem in furorem illum aegerunt febreque non admodum manifesta, de medio sustulerunt die circiter xx. *Fernelius Patholog. l. v. cap. vii.*

OBSERVATIO VI.

In Fumifugo deerant processus mamillares, unde Olfactus destructio.

Paucini patibularium fumifugum secuit, cui deerant omnino processus mamillares, unde suspicabatur à Tabacci abusu fuisse absumptos: Erat autem is omnium Tabacci amatorum facile princeps, deerantque non processus modo, verum & nervorum odorantium extrema. *Magnenus de Tabacco p. 135.*

S C H O L I A.

Sicuti heclicorum cutis exsiccat, & in ardentissimis febribus colliguntur partes, ita namque funi exsiccatissimus asupponit hoc organum labe factum, regestis scilicet naso funi halitibus. Hoc *Falkenburgus* concludit, Meatus autem negat morbosio conformatione posse unquam à ptaivo usu rerum p. n. oriri, Ex citat pro se *Columbum*: Læzaro enim virivoro deerat gustus, quod quarta nervorum conjugatio ad occiput reflecteretur: Facies multis aliquando multa desunt, & plura sunt monstra in interioribus quàm in exterioribus appareant: Dico tamen n. quicquid sit de illa *Purvi* dissectione,

olfactum ab usu Tabacci in multis aboleri: id phæsi mihi retulerunt, tum qui pulvere, tum qui fumo abouuntur: Ratio est, quia nimis exsiccatos processus mamillares, unde cum sicciiores quovis odore reddantur, non possunt ab his immutari: odor enim est è sicco superante humidum, sensuque ab objectis suis immutari opus est, et Arist. 3. de Anima: Dico n. Processus mamillares aboleri non posse à Tabacco, quia nullam habet vim etiolivam: Exsiccabuntur autem, sed ooo colligescunt, colligatio enim non est partium nervolarum affectio, *idem.*

Odorum, remotare odorata à naribus, pertinax mora in quibusdam, pendet ex eo quod os Frontis, supra supercilia insigni caverna præditum est.

IN osse Frontis cavernula observanda est, quam *Spigelius* ad odores hauriendos facere existimat, cum ibi aer odore prægnans excipitur paulumque conservetur, ne nares tam subito præterlabatur, unde odor per integrum diem in narium summitate persistitur.

S C H O L I A.

Ejusmodi diuturne pertransiōis odorum exemplum in ligno adducit *Schneiderus* l. de osse Cerebri formi p. 112. Quidam mercator aut, in angusto cubiculo lecto dormiens faciem quem quidam moribundo corpore iuxta cubans, ore, naribus & toto corpore exhalarat, tota nocte adeo naribus haurerat, ut exasperatus vehementer nauicaret & faciem naribus colligebat laboraret. Et quod mirum, x. die quam hunc faciem haurierat adhuc hoc malo continebatur. Nam cum vehementiori vento adversus iter, hunc faculentum odorem olfacere videbatur: Consulit *Hermonem* cienda curare, ut inima narium penitus purgarentur: Ipse veto hunc vaporem non in hac cavitate ossis frontis inclusum fuisse iudicat, nam ille assidue aëre & vento adverso magis forsum versus ad concavum ossis, quam aut retro deorsum ad processum mammillares, aut recta deorsum ad os spongiosum propulsus fuisset: Quare ille caverna antecioribus sinibus inhæret, ac aëris interni impulsu agitur, organum Olfactus demum afficere potuit: Porro, addit, in cranio hominis hæc ossis caverna semper inanis est, nec ullum humorem coeret. Sed est admodum tersa, splendida; Verum scite convenit hanc cavitatem, in qua inselle consuevit hæc membrana, scilicet plus cranio deesse, ut ejus rei testes sunt varii: Atque illi ipsi homines, qui tale cranium nacti fuerunt, bene Olfacere potuerunt: Ex quo intelligi datur hanc membranam, que siue illa cavitatem non potest existere, ad organum Olfactus minime spectare: Hoc eodem gladio etiam jugulat eos qui aëri in hac cavitate

incluso tam vim assignare non dubitant. Hanc cavitatem in anatomia corporis humani diligentissime periclitatus sum, ac frustra fui, nam os eo loci minime erat excavatum, sed plenum & fungosum, nec planum satis, sed sæpe extabat, at is, cujus fuit, bene loqui potuit, ex relatione eorum quibus oculus. Venit illud multis movet, quod iter de hac cavitate, si ficta est, semper ad nares feratur, Ex quo tamen minime effici potest illam aut ad sonum vocis, aut ad sensum odoris facere: nam supra nares & os cribrososum hæc multum erat caverna, quare ipsa harum partium fabrica tacita clamat, in eam rem à natura non fingi cavitatem, Nullus, inquit *Faradew*, est doctus sensilis per quem ejusmodi species ad sensum communem & cerebrum deferuntur: Et *Cardenius* hanc rationem premit, quod nullus nervus hanc cavitatem perat, Qui vim horum argumentorum video, hanc hoc utilitatis asserere volunt, ut odori halitus & vapor in ea diutius contineri & servari possit: Verum narium antrum est per se admodum capax, ut odor diutius inhæret possit: Quot enim io osse spongioso insunt sinus? quam varii? quam vacui? quam porosa est hæc membrana? aër inclusus quam vaporosus. Hæc ergo cavitatis nullo modo facit ad sensum odoris: interdum illa interjectu corporis fungosi obliquitur: Sed sæpius fingitur, ac intus semper pellicula tenui integitur, Cavitatem levius evadit cranium: dicta est difficile quam vehementer Natura ab inutili pendere abhorreat, &c.

OBSERVATIO VIII.

Polypus narium, ostionis pedibus donatus, à concreta pituita ortus.

Post frequentes destillationes occupavit uxorem N. insignis Polypus colore albus, substantia pituitosus, nares obturans utramque, cum continuo suffocationis metu. conspiciebatur, & in naribus & in gutture, cum duplici caruncula, altera livida ac dura, à carcinomatosis natura parum distante, Suadentibus itaque celerem remedium usum, hinc præcipit carcinomatosis metu, illinc vero æstuantium faucium fervore, & humoribus acris nares jam erodentibus, tentatum fuit impedimentum hoc inde extrahere: sed fractis magis quam eductis illinc carunculis, atrepta fuit deinde forcipe illa pars quam diximus carcinoma minati; qua potentius vellicata, sequebatur proinus integer Polypus, cum omnibus suis pediculis, tam in naribus quam gutture conspicuis.

Erant huic Polypo (cui vel à pisce marino, vel à pedum frequentia nomen) ostioni pedes, incipientes singuli, instar pyrorum à tenui pediculo, orto ab excrecentiæ hujus centro, unde quoque prodire vixit per ipsum disperse: Pedes autem, quos carunculas vocant Medici, plurimum inter se discrepabant qui enim in naribus erunt oblongi, illi ipsi fuerunt in faucibus rotundi, sed omnes erant recti membraneo velamento, sub quo continebatur concreta pituita, in plerisque mollis ac pellicuda instar pulpæ pruni albi: in aliis vero dura ac opaca, ad instar cornu adusti. *Tulpius Observ. 26. lib. 1.*

S C H O L I A.

Argumento hoc evidenti memendum non tantum de lividis ac melancholicis, sed etiam à polypis albis ac picuosis, præcipue si vel à fervido sanguine, vel ab æstu intus conclusio degeneret in carcinoma-

ta natura, uti hic evidenter factum. Errat itaque non leviter qui iudicant Polypum pituitosum carere omni periculo, quod

quod plerumque quidem verum, ſed nec promiſſue nec indiſtincte: Sed dicat quis, an non fortitum hocce tentamentum, & inopiniſta hæc Polypi per fauces eductique etiam in aliis idem liceat experiri? Quod ſi vero lubet medicamentis rem tentare, conſigilandum erit ad pulverem virioli calciniſti, colicorhar vocatæ Chymiſi, vel ad radicem hermodactyli ſibi, exceptam aut melle roſato, aut aqua ſabine, quibus remediis corrugatur magis quam aperitur Polypus nariæ: nec penetrat hic pulvis per anguliam propoli ſinem, ab excreſcentia obſcuram: Unde tamen

nifi eduxeris carunculas illic ſubſiſtentes, Intraſtibiſ conſiſtenter eadem hæc leges, Et ex affluuio novi humoris incomplectet affluo, quæ in caſſicæ tunica remanſerat pulpa: Nifi forte involutum ipſius ſit ad eo teſes ac molle, ut à pulvere hoc abluatur non minus pulpa quam tunica illam ſuccingens: quem ipſius luccellum ſilicibi aliqui experiri, credere properet, ſed ſatis recte, pulverem commemorat ubique locorum idem pollere & inſalubilitate fanare quemcunque Polypum.

Idem obſerv.

OBSERVATIO IX.

Polypus narium ex viſcerum imi ventris vitio ortum ducens, illaſo cerebro, foraminibus offis cribriſformis & proceſſibus mammillaribus.

A Pertuse caput defuncti hominis qui Polypum in vita ſæpe paſſus fuerat, omni ex parte quam diligentiffime conſideravimus: In hoc autem cerebrum ſalvum, nervoſa filamenta integra & foramina offis cribriſformis illaſa invenimus: contra imi ventris viſcera, hepæ & lien viſioſe affecta erant: ac proceſſus illi mammillares in cerebro erant incolumes & ſui coloris, qui certè vitium tandem duxiſſent, ſi de iis ille pernitioſus humor ad nares jugiter defluxiſſet. *C. F. Schneiderus lib. de offe cribriſformi pag. 436.*

S C H O L I A.

C Ave credas noxillum illud & redundancem humorum, ex quo hoc malum naſcitur, ſemper de cerebro, per foramina offis cribriſformis deprimi, ſed illa materia ex vaſculis, in infernas nares porrectis, eo concurre: Quare curationem ad viſcera, quæ ſanguinem conſiſcant commodius quam ad cerebrum dirigimus: *Idem.* Materia Polypi de cerebro non venit: Nunc fortiffime aſſertimus morbum illum ſemper de mala ſanguinea venire: deprehendimus & oculis contemplantur vaſa quæ intus tument: Erant, inquit Talpa, octoni pedes, incipientes ſinguli, inſtar Pyrorum, à tenui pediculo, oſto ab excreſcentiæ huius centro, unde quoque prodire vena per ipſam diſperſit: Et plerumque natum eſt hoc malum ſi ſolenne quoddam profluvium redundans humoris fuiſſet ſuppelleſtum, nam ortus eſt polypus cum ulcus pedum curaretur: Sæpe quoque aliis morbis paſſus: Rem ergo ſic habere, Si maſſa ſanguinea eſt impura, noxii humores modo hac, modo illuc ruunt, ac ſi iis inegreſſionis exitum conſtituentibus, narium vaſa vias præbent, facile fieri poſſit ut hinc tale malum oriatur: Et hoc eſt quod auſores tradunt Polypum, ut ſanguinem, cum Luna creſcere & decreſcere: *Idem lib. 3. de Catarrh cap. 6. p. 133.* Accedit ad hæc ſententiam

Rinellus Antheopogr. lib. 4. cap. 6. qui diſciſſa naſi cauſaginibus, intra cavitates narium, obſervandi habet carnes ſpongioſas, ſubeubias, quibus cella naſi ſpongioſa oppleta ſunt. Ex his tumefactis Polypum generari ait: Quæ tumefactio aliter conſingere nonquit, quàm ſi iis caribus narium ſpongioſis (quæ lubrubiæ eſſe ait, colore ſcil. à ſanguine iis trahentibus) impuſus ab arteriis ſlimenium deferatur, unde illæ excreſcunt.

Peruſuſus humor] Humores Polypi cauſam à Lymphaticis vaſis alii deducant, quorum loboles ſit vas in narium tunica recens à Nic. Steuone reperiunt, de quo Clar. Bartholinus cen. 3. Epit. 38. Excretorium vas in oarium tunica, à poſtica parte verſus anteriora procedens, novum eſt, &c. Lymphaticum eſſe facit, & lympham ea propter expurgare, ab arteriis cerebri accretam, quam etiam non pauci ex naribus ſtillantes expeririunt; reſeratis foras oſculis, præſertim in ſigidioribus, ſenioribus & hyemali tempore: Hinc quoque Polyporum fomena deduci poſſunt, ſucta lymphæ ex hoc vaſe, quos adſtrigendibus ea propter optime curant, ſuperne reſellentibus vel exſiccantibus.

Idem.

OBSERVATIO X.

Mucus graveolens è naribus prodians, à cerebri ſubſtantia copioſo humori innatante.

M atronæ è naribus graveolens mucus concretus ſubinde extrahebatur, virens aut omnino mali coloris, &c. Cerebri ſubſtantia integra: ſed copioſo admodum humori innatans, qui ſomes eſſe potuit muc, qui ſæpe in naribus concreverat. *Dodonæus obſerv. med. cap. 25.*

OBSERVATIO XI.

Pus per nares excretum à Pulmonibus inflammatione & abſceſſu affectis.

P rinceps Illuſtr. per 15. dies febre, ſopore &c. tentatus: acceſſit inſignis ſpirandi difficultas cum dolore thoracis ſuperioris &c. In ipſo agone è naribus per horas quatuor deſtillavit humor albidus, tenax & ſætidus & vere purulentus; qui in pulmonibus ebulliens ſua ſponte in nares deſpumaverat; cujus etiam reliquias repertum iri in diſſecto

Gg

pulmone

pulmone denuntiavi, & revera observavi, quanquam longe major portio ante mortem distillasset. *C. Pise de morbis à diluvio serosa sect. 6. p. m. 306.*

OBSERVATIO XII.

Excretio materie cruentæ, saniosa & naribus, ab apostemate cerebri.

Puer in lethargum gravissimum incidit: Ad hunc evocatus, thymum (cum nihil aliud esset ad manus) contritum cum aceto, glandis instar nari dextræ inopulimus, ut materia crassa, viscida dissolvi posset & ad nares derivari: hinc è nare materia quadam crassa, valde corrupta, cruenta, viscosa instar putridæ saniei prodit: Illi cerebrum & cerebellum, in parte dextra, omnino saniosum, putridum inventum est, apostemate ex lethargo in abscessum permutato. *Vide tit. de affect. Soporosis.*

OBSERVATIO XIII.

Excretio mucis fetidi è naribus, ob copiosum humorem cerebro infarctum.

Matronæ è naribus graveolens mucus concretus subinde extrahebatur: Illi cerebri substantia integra, sed copioso admodum humori velut innatabat, qui fomes esse potuit mucis illius. *Vide tit. de crisi affectibus.*

OBSERVATIO XIV.

Hæmorrhagia ab Hepatis & Lienis scirrho, Cordis vitio &c.

Filia N. antea frequenter Hæmorrhagiæ obnoxia, ac proinde cachexia fere consumpta &c. Lien & Hepar scirrhus laborabant, In capsula cordis humor putridus: circa valvulas dextri ventriculi Calculus &c. *Vide tit. de Synope lib. 2.*

S C H O L I A.

Sanguinis è naribus effluxus plerique propter magnas occasiones passim evenit, nam quoties sanguis, vel ob propriam vasorum laxitatem erupit, alicubi viam facere aut invenire apertus est, namque distinctu quodam sepiissime adnates, quasi partem facillime aperendam dirigitur: Vasa è quibus idem effluit, sunt propagationes rami arterialis à carotide postquam crasso luperato cerebri basin attingit, profecti: hæc enim juxta processus mammillares procedunt, plures lareculis quaquaversus à se dimittit, quorum aliqui notabiles, cum nervis olfactoriis, foramina ossis cribrosi transientes, per membranosam glandulosam, summe naris anfractus invadentes, distribuuntur: Arteriz hæc nasales à carotide trunco, intra cranium primo abscedentes, sanguinis partem maxime serosam à cerebro anticipant, atque serum ipsum & recrementa alia aggesta, in naris glandulas, velut proptia illius regionis emunctoria deponunt, unde in cavitatem ejus destillant: Quapropter siquidem arteriarum oscula ita sunt propter feri exudationem semper paululum debilitant, nihil mirum est si ipsæ sanguis frigidior factus, eadem, (quæ non raro ex se nimis laxa sunt) paulo amplius referant foras erumpant: Profecto hoc tum seritum sanguinis emissum, ordinariè, aut pro data occasione recludi aptum, cerebri aut præcordio: tum, imo nonnunquam totius corporis magnas incommoitates, aut præcaverit aut curat: Namque imprimis hæc via serum à capite derivat, cumque vasorum illorum ora à perniciæ nati immisso vellicantur ac irritantur, serum exinde copiosius elicitur, quod tamen non à cerebro descendit (ut vulgo putatur) sed ne ipsum petat, per arterias basiles nasales anticipant, è quibus cum ethinorum usû uberius expulsiunt, emulgerit, propterea cerebrum magis serenum & nebulis immune evadit: Dein 2^o. ne cerebrum à sanguine impetuosis inundante obstruatur, portio hujus per hæc vasa ab-

cedens, & foras erumpens facile impedit: At vero interdum accidit hujusmodi Hæmorrhagiam in morbum potius quam remedium cedere: Si quando enim sanguis è nare crebrius & copiosius quam par est effluet, si non vix illico ob nimiam ejus impendia periclitabitur, exinde tamen reliqua cruoris massa depauperata, & crasso suam amittens, diachelin cachecticam, & non raro hydropicam acquirere, quia vitium aut in sanguine, aut in valis, aut simul in utrisque consistit: 1. Sanguis per se hæmorrhagiam inducens, aut quantitate, aut qualitate peccat: proindeque dum occasionaliter effluerit, intra vasa contineri nequit, quin eorundem ora aut distendendo aperiens, aut acrimonia sua referant, foras exilit; quibus accedit quod sanguis interdum in compage solutus, & quasi venenatus, circulationis filo continuando impet evadit: quatenus nimium portiones ejus ab invicem decedentes, partim in carne aut cute defiguntur necrosin patiunt: partimque erumpentes hæmorrhagias immanes & non raro lethales citat, uti passim in febribus malignis, & aliquatenus nonnunquam in scorbutico censuit: Attamen sanguis mora quantitate, aut acrimonia peccans, nisi vasorum culpa etiam superveniens effluxum ejus prociat, aut facile nimis petimitur, raro in hæmorrhagiam immanem erumpit, 2. Itaque vasa sanguifera, quoties ad affectum illum producendum conspiciunt, in vitio esse solent, vel quatenus primo ob fibras nimis laxas & debiles, oscula illorum debilitent, sanguinem ex arteriis in venas non expedire transulant, quod vitium in scorbuticis & cachecticis, passim contingit: vel secundo, quatenus ob easdem fibras mortificas spasmodicè affectas & convulsas, sanguis hac illas, & imprimis versus caput impetuosè correptus, propter continuandum circulationis filum erumpere cogitur. *Wish Pharmec. rat. p. 1. sect. 3. cap. 2.*

Lien, Hepar scirrhus laborant] Juxta temorem veteris

teris doctrinæ: Symptomatica hæmorrhagia, mor-
bis chronicis præteritis familiaris, accidi: cum san-
guis vitioſus ab Hepate debili, & inſigni aliqua in-
temperie laborante gignitur: cum ſcilicet aut ſciolus
& æquus eſt, unde a retentice facultate non conti-
netur: aut ætior & nutritioni ineptus, ab eſteticæ
expellitur: Si Neutericorum decreta, qui ſanguini

vim ſanguinis genitricem attingunt, ſequi libet, dic
contingere ob craſſam maſſam eſſentiam & languidam,
que chymo adveſcenti ſanguinis craſin & craſiorem
inducere nequit: Si Hepat coloru muneſe ſangi-
nelis, dic vitioſe ab eo ſecretam bilem craſiori com-
miſcet, unde ad 3. 4. acrimonia fluxit &
ad exitum proclivior evadit.

APPENDIX I.

*Sive exemplum Hæmorrhagiæ ob fibræ motrices arteriarum ſpaſmodicæ
affectus contingentis.*

Nuper ad diſtans conſulebar pro Generoſo quodam ſanguinis eruptiones crebras &
nimianes, modo ex naribus, modo vaſis ſedalibus aliquandiu paſſo: huic phlebotom-
izæ ex amicorum ſuaſu crebro ſactæ nihil profuere, imo ſæpiſſime poſt V. S. in ſudores
frigidos ac leiſothymias incidens, atque ſanguinis eruptionibus nihilominus obnoxius
multo deterius liabere ſolebat: Huic ego nondum viſo ſulapia & decocta refrigerantia
& anodyna, item herbatum expreſſiones ſucculentas, aliæque ſanguinem refrigerantia
 præſcripi: Verum etiam his (quaſi omnia eſſent à ſcopo aliena) nihilo melior adfuit ſuc-
ceſſus: Tandem ruſ ad eum inviſendum accerſitus, reperi affectionem, qua laborabat
iſte, mere aut potiſſimum ſpaſmodicam eſſe, quippe cum ſanguis quotidie erumperet, pul-
ſus erat debilis, extrema frigeabant, & vaſa omnia quaſi nimis inanita conſiderant: Por-
ro Ager vertigine fere continua, ac cordis tremore, & ſubinde leiſothymia, aut metu
ejus afficiebatur: Profecto tantum aberat ut ſanguis ob plenitudinem aut turgescentiam
nimiam è vaſis erumperet, ut potiùs è contra rivus ejus admodum depreſſus & tenuis, vix
circulationis fluento ſuſtinendo par videretur: Attamen, quod res fuit, ſæpius in die per-
ſentiſcebat in corpore ſuo aliquid, modo ſurſum modo deorſum, ſub ſtatu ſpecie conſe-
ſſim obrepere, & plerumque motus iſtius tendentiam, ſanguinis è naribus aut hæmor-
rhoidibus effluſus ſequabatur: hinc ut facile concludere eſſet, vaſorum ſanguiferorum fi-
bras, quibus contrahuntur illa, motrices ſpaſmo affectas, ſanguinis fluvium, utut diſmiſſum,
tenuem, huc illuc inordinate corripuiſſe, & ſubinde in eruptiones compulſiſſe: quod item
facilius evenit, in quantum vaſorum ora laxa & dehiſcentia, cruorem ad ea compulſum
absque remora debita eſſuere ſinebant: Aetiologiam hanc medendi methodus inſtituta,
quatenus tali ſuppoſito innitens feliciter ſuceſſit, plane comprobat: nam S. m. & medica-
minum *hæmorrhagæ* uſu deinceps omiſſo, præſcriptiſſimum pulveris ſequenti cujus doſin ſexta
quaque hora cum ſulapia ſumebat idoneo.

℞. pulv. rad. præon. mar. corall. r. margar. ana ꝑj. eboris, ocul. cancri, lap. hæmat. ana
ꝑß. lap. prun. ꝑj. f. pulvis, doſis ꝑß.

℞. aq. cerat. nigr. ꝑviij. mcliff. cinnamomi hordeat. ana ꝑij. theriacalis ꝑj. ſyr. e corall. ꝑß.
Cæterum præcepti ut ligaturæ quibusdam locis ex ritu conſtanti, & ſubinde aliis pro
data octaſione, tum ad liſtendos, tum ad intercipiendos vaſorum ſpaſmos adhiberentur:
atque huiusmodi remediis ſine ulla morbi recidiva brevi convaluit: *Wilius Pharmacop. rat.*
p. 2. ſect. 3. cap. 3.

APPENDIX II.

De viis per quas ſanguis in Hæmorrhagiâ Narium erumpit.

Cum illa offis cribiformis parte, quæ contra medium interſtitium narium exorients,
intra cranium aſſurgit, ille *Canalis* qui dicitur *Falciformis ſinus*, committitur, quem
nonnulli inſtar venæ adaperiri arbitrantur. *Riolanus Encheir. Anat. l. 4. c. 6. In hæmorrhagiâ*
inquit, ſanguis vel è naribus ſcalptis & erofis ſluit, vel è ſinu illo longitudinali dura meningis qui pro-
reptis ad nare. Verum cum huius ſinus falciformis ſinis in *Criſtam galli* porteſtus, non meatus
cuiusdam formæ, ſed ligamenti naturam uſumque habeat, veri haudſimile eſt hunc ſinum
in noviffima ſui parte, qua ligamenti naturam induit, & offi, quod *Criſta galli* dicitur, inna-
ſciſci, inſtar canalis inſeri poſſe, ut de eo, tanquam de vaſculo, oris adaperiti ſanguis pro-
manare queat: Obijcies, Nonne vena umbilicalis, etiam in junioribus, eſt ligamentum, aſt
illud morbo relaxatum, inſtar canalis nunc ſanguinem, nunc aquam interdum reddit, ut
hiſtoriz medicorum eloquuntur: Sed diſpar ratio eſt, vena umbilicalis fuit quondam vena,
canalis & vas ſanguinem invehens: quare in iis, qui in ætatem adoleverunt, intumeſcente
per morbum ventre, facilius reſeratur, Et ea nonnunquam vitio valetudinis in infantibus

non clauditur : At extremus hic sinus falciformis nunquam instar venæ fuit excavatus, sed ab ipso vix exordio natum & officium ligamenti nactus est : Nam medius hic sinus quidem, instar venæ aut canalis sanguine distentus est, at is ad os cribiforme tendens, magis magisque fastigiatur, & in tam solidum ligamentum coarctatur, ut nullo modo referari possit videatur : *Instabis 1^a.* Hippocr. cervicem aqua calida perfundit, ut die critico major sit hæmorrhagia : Idem, ut illam stringat, aqua præfrigida cervicem tigit : Respondeo, & illum sanguinem qui de venis in intimas nares portectis per nares defluit, hoc remedium genere revocat : (*perfrigerato scilicet sanguine qui per arteriam carotides & vertebrales in cerebrum insuit.*) *Instabis 2^a.* Is cui nares jam incipiunt fluere capitis gravitate prius urgetur, Ergo sanguis de cerebri venis promanat, *Respondeo* eidem faciem, ejus & nasi venæ sunt communes, rubere & omne corpus sanguine distendi : Quinimo damus de cerebri membranis sanguinem interdum promi posse, cum præsto sit illa vena quam *Spigelius* ait ex narium amplitudine, per ossis cribiformis foramen in membranas cerebri dileminari, Sed negamus sinum falciformem sæpius adapcri : Quidam hanc opinionem sic exponunt, non ipsum sinum extremum patefcere, sed ab hoc profectas venas, & in dura & tenui meningē, ac in summo cerebro discurrentes ita apertiri, ut de his sanguis per hujus ossis foramina defluat, & de naribus tandem crumpat : Verum omnis talis hæmorrhagia multis nominibus crit mortifera : Quam facile sanguis confluet in illam fossam quam æqualis facit cerebri divisio ? Quam facile gelascet sanguis, ut nonnisi perterebro crano evacuari possit ? Ipsa foramina ossis cribiformis quam sunt angusta, & illa quam atque clausa : quare tam facilis haud erit transitus, Quid ? sanguis constabit potius quam defluet ? Quam facile hinc apoplexia, epilepsia, lethargus & similes morbi nasci poterunt ? Quam sæpe nos inspecis mortiferis capitis vulneribus intus sanguinem gelatum integro crano invenimus, qui compresset cerebrum : Avicennæ sententiam qui sanguinem de illis venis, ex quibus rete admirabile constat, in hæmorrhagia fluere censet, commode interpretatur *Jac. de Partibus* Retis cerebri, l. e. p. matris & duræ, quæ comprehendunt cerebrum sicut rete : *Fernelius* sanguis videtur per nares emanare aperta, tupta vel exesa vena eo deficiente : Hæ venæ, *inquis*, non ex intimis cerebri, sed ex oris palati-que sedibus excurrunt, satis quidem detectæ ac patulæ, ut quasi emissarium sint supervacui sanguinis expellendi, quemadmodum & hæmorrhoides, & quæ in uteri cervicem pertinent : Hic cum pluribus sequitur antiquos, Hippocratem, Galeum, Aretæum : Frustra opponis, sunt minutæ venæ, tantum sanguinis, quantum sæpe defluit, ex illis venis depromi non potest : Nam aliquando ex *Benedicto Veroneasi*, venula narium à tonsore levitet sauciata, sanguis adeo erupit, ut cum is sisti non posset, æget cito extingueretur : Id confirmant *Cellsius*, *Salmon*, Si solentis est abundantia mensium, & subito stringitur, plerumque formellis profluvium sanguinis fit è naribus, una vel altera &c. *Schneiderus lib. de ossis cribiformis pag. 411. &c.*

OBSERVATIO XV.

In iis qui ob Narium hæmorrhagiam mortui sunt, Sinus cerebri & Torcular, corrofa reperuntur.

Jugularibus venis in postrema parte coeuntibus, figura quædam Ypsilon Græcæ efformatur, quæ per longam calvariz percurrit internam substantiam membranarum separans cerebri, à quibus vas effingitur, quod Torcular nuncupatur, quo usque ad Nares descendit : Unde quando sunt qui sanguinis fluxu è naribus moriuntur, hoc fit quia corro-
duntur hæc vasa, quemadmodum observavi in Anatome. *Hippolitus Bosius de Facult. Anat. Lelione 9. pag. 50.*

SCHOLIA.

Corrodiuntur hæc vasa ? Diffinit C. V. *Schneiderus* lib. 2. de Catarrhis cap. 20. pag. 223. Sæpe sanguinem aut, in cerebro gravissime periculis, non procul à sine falciformis sinus reperimus, Nunquam in vivis ne gutta quidem perfluere potuit : Et quomodo sanguis, qui de vasis in basi cerebri extantibus

innas fluit, ad cavum narium venire potest : Adde, Sinus falciformis est vena, de ea sanguis deorsum versus ad cor, minime ad nares raptus : Quare hæc & ejusmodi alia nunc ob circulationem sanguinis, ut vocant, merito repudiantur.

OBSERVATIO XVI.

Hæmorrhagia ab Hepatis vel Lienis vitio inducſa.

§. 1. Juvenis anafarca laborans factus eſt ictericus, ſequitur Hæmorrhagia narium, morſ ſubita: Hepar fuit ſubalbidum, cum abſceſſu in parenchymate: Lien magnus, lapideuſiſſimus plenus. *Fantaniuſ Reſponſ. & curat. p. 90.*

§. 2. Ager per annum febre multiplici intermittente laboravit: Sæpius hæmorrhagiam narium patiebatur, plerumque è ſiniſtra: Totus Lien duruſ erat, plumbei coloris, magnuſ, craſſuſ, in quo materia ſimilis feci vini rubri continebatur. *Vide l. 3. tit. de Hyſt. tumore.*

§. 3. Virgo 35. ann. biennio ante mortem copioſiſſimam narium hæmorrhagiam, quæ ſola ſ. m. ſiſtebatur, habuit, unde hydropiſ initium: Vena umbilicalis ſanguiniſ copia turgida apparuit & varicoſa: Hepar erat album, tuberoſum, duruſ & exanguis. *Vide tit. de Febr. l. 4.*

OBSERVATIO XVII.

A ſternutamento ſæpiuſ concitato morſ, ob diſruptaſ arteriaſ & meningeſ cerebrum cingenteſ.

Sternutamento agitato caput violentiſ, diſruptiſ eo impetu meningibuſ, luxataque cerebri compaginatione, nonnulli interierunt: Piſtor Suburranuſ, cum vicesies quater ſternutaſſet continuè, ſuccedens proxime ſternutamentuſ 25. exitio fuit diſruptiſ arteriaſ & membraniſ cerebrum circumcingentibuſ. *Famianuſ Strada in Proſuſionibuſ Academicis.*

SCHOLIA.

Magna viſ eſt Sternutatioſ, quâ omne corpui luccit: caput enim tam illiſ muſculiſ movetur, quotum pluriſi thoraceſ contingunt, qui revo-
cariſ interioriſ ſpirituſ & mox eo reddito vellemuſſime conſequunt: Iplumque caput vertebraſ colli ſuſtinetur, quæ vertebraſ thoraciſ inſident; atque in ſuſima aurium detraſa, ea ore clauſo interdum ſternutatioſ elidantur, non quod cerebrum aut dura meningiſ aut tympanum tan copere moveantur, ſed quod aër per aquæ ductum ad antrum auris tunc quaſi impetu ſuſto prorumpat, & ea quæ inibi inhaerent, ſuo loco dimovere poſſit: Cæterum corpus etiam propter muſculoſ, illuſ ſuccuſſuſ ſternutatioſis pariat: nam thoraciſ muſculoſ pluriſi attingunt, ut nihil de diaphragmate & muſculiſ abdominiſ dicam: Muſcoli Glutei dicti, in extremo corpore ſiſi, ſternutando vehementiſ agitantur, ut id in offiſ ſaciſ ulceribuſ, ſi illa ingentiſ exituſ, ſæpiuſ animadvertunt Chirurgi: Hippocriſ 7. aphor. 52. naturam & proprieta-
tem ſternutatioſiſ ſic expoſit. Fit ex capite caleſc-
to cerebro, aut humectato ſparſo in capite inani: aër enim intuſ contentuſ ſoraſ effunditur; itrepiſ autem, quia per anguſtiuſ ipli eſt exituſ: Qui ejuſ ſententiaſ tueriſ, ſi & cerebrum & ejuſ meningeſ ſternutatioſe creditur ad id quod moleſtuſ eſt diſpellenduſ inſurgere, atque ob id maniſeſte intuſ morari. At qua ratione cerebrum, viſcuſ tam molle, per ſternutamentuſ tam vehementer morari queat, non intelligitur: Ac dura meningiſ quam firmiſer omni loco adhaereſcat cranio anatomeſ oſtendit: Atque ſi etiam cerebrum & ejuſ membranaſ aliſ lociſ morari poſſunt, tamen illud hic fieri non poſſet, nam proceſſuſ muſ-
millareſ in ſumum offiſ cribroſiſ penituſ abſtraſi ſunt, & nervi odoratuſ in homine quam tenueſ ſunt: quam facile quodam agitatoſ abumpeſcerent? Et dura meningiſ propter trajectuſ nervuloſ quam leviſſet adhaereſcit tunicaſ narium: Hiſ quoniam ſe adhael pariter ut credaſ membranaſ cerebri, & cerebrum ipſum intuſ ſub cranioſ privatiſ morari: Minime autem nego cunctum caput propter muſculoſ ſternutatioſe qualiſ: Nec humor quæſ ſternutatioſ per os

& naſeſ projeſcit, de cerebro veniſ, & per oſ cribelli modo tenuiſſet foratuſ deſtillat, ſed ut Cardano oſtendit perite, ex imiſ faecibuſ ad naſeſ & ſummuſ oſ propelliſ: Sed ſternutatioſ ſemper oſcit ut Tunicaſ narium, quæ vel ab extremiſ rebuſ proſicitur, vel ab inceniſ: De illiſ conſtat: Haſ voco quæ intra corpuiſ gignuntur, halituſ acreſ à cibis nondum in ventriculoſ digeſtiſ, qui inſiſtunt aëre ſubſtaci tunicaſ nariumſ laceſcunt; aut ſi ex vaſculiſ narium tranſiſſe liquor quidaſ acriſ & tenuiſ, tam ab internis cauſiſ ſternutatioſeſ evocari videntur: Vide Myſſum lib. 1. part. 1. obſerv. 49. Hoc ſiquæ certuſ ſit ſemper hanc interdoctuſ tunicaſ irritatiſ antequam ſternutamentuſ excitetur: mox inſurgit thorax, & eliden-
do ſonituſ ſaciſ maximuſ, ſi tunicaſ pulmoniſ & laryngiſ à re acriſ oſſenditur, Tuſſiſ exiſtit, qui motuſ & ſenſuſ ſolliſ eſt thoraciſ. In ſternutatioſe autem non ſolum thorax ſonituſ edit, ſed etiam ille hiſtoriſ nariumſ meatuſ quo aër cum ſtrepiuſ diſpellitur: Hinc aberrare videntur; qui ſi ſternutatioſ exiſtit, in cerebro ſtatim ſemper gigniſ cogique, & mox per offiſ cribroſiſ foraminaſ cum ſonituſ emitti, ac una cerebrumſ ejuſque membranaſ vehementiſſime intuſ moveri arbitrantur. Tunicaſ autem nariumſ pluriſimouſ nervoſ, & eoſ diverſoſ naſta eſt, ob quoſ ſenſuſ gaudet perexquiſito &c. *Schneideruſ lib. de offiſ cribroſiſ pag. 442. & ſeq.*

De ſternutatioſe hæc animum, Epilepſiaſ hanc ſimiliſſimam conſeſſi: atqui ut hæc à ſternutatioſe elaiſ interdum ſuſſiciat dictuſ, idem de ſternutatioſe credere eſt: Quidam à me quaſiit, cur inter veneſeſ amplexuſ, inſtanteſ aſſiduſ vel ter ſternutatioſeſ percipiſſet? Aëreſ ſeminaliſ à reſtibuſ & vaſiſ ſpermatichiſ ſuſcitata, ſuſſituſ repentiſ ſenſibiliſ nariumſ tunicaſ vellicabat atque ad ejuſmodi motuſ impellebat: Illuſ tuniceſ in eodem viroſ ſuſſiciat ſuſſiciat interioriſ nariumſ diſtillatioſ, cum conſuſſiciat niſ cuſtuduſ ſenſuſ, à vapoſeſ ventriculoſ exortoſ, in quo priuſ moleſtiſſimam & vellicatioſem percipiſ, quæſ per oſophaguſ obrepere percipiſ inque naſibuſ & emiſſiſ: cæteruſ inculpaſ valendiuſ ſuſſicit.

APPENDIX.

Hirudo naribus admodum, in cerebrum irrepere non potest.

A Notatum est per foramina ossis cribriformis Hirudinem ad cerebrum irrepisse. *Petrus Paulus Magnus* scriptum reliquit Chirurgum anno 1572. Rounæ cuidam hirudinem applicasse, quæ paulò post penetravit usque ad tunicas cerebri & hominem interfecit : Idem tradunt *Saxonia & Zaccutus* : Adversus hæc responderetur, Hirudo minime videtur ad cerebrum interius irrepisse, illa ad summa narium saltem hæsit : Qui hæc foramina satis perspecta habet, is constanter negabit per ea hirudinem se penetrare potuisse. Si vero illa foramina vi morbi vitata fuerint, sunt patentiora & facile dilatari possunt, quemadmodum illa etiam huc venerea corrumpuntur, ut redundantes humores per ea nonnunquam emittantur. Illa foramina in sceletro obvia sunt, conspicua, patula : In cruento recentrique cranio multo secus est : nulla ibi poteris invenire foramina, adeo ea obscura sunt ob vasa & membranarum fibras : Si vero cranium coquis, coctum expurgas, expurgatum aridumque oculis contemplaris, illa foramina tum demum erunt magis notabilia, quæ in succido cranio latent omnino : *C. F. Schneiderus lib. 2. de Catarrh. c. 20.*



ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMII

SECTIO XXI.

De Oris affectibus, Labiorum, Gingivarum, Dentium, Palati,
Gulæ, Linguae, Salivæ defectu.

OBSERVATIO I.

Gingivarum erosio incurabilis; à vermium abundantia in intestinis.

PUER quidam Dusseldorpiensis erosionem Gingivarum à longo tempore gravissime divexabatur, multa remedia frustra adhibita, tandem vitam cum morte commutavit.

Aperto corpore tanta inventa est abundantia vermium, ut aliquibus in locis intestina eroderent, multique in vacuo ventris reperi fuerint. *Fabricius Hildanus cent. 1. observat. 59.*

SCHOLIA.

Scorbuticam indolem respicuisse humores, è quibus vermes geniti, suspicari cogit parva potest : Scorbuticis autem tam familiaris est Gingivarum erosio ut lippi etiam scorbutorum inde possint conicere; parte materię acclere & subillidere ad eas partes translata, natura teneras, molles, flaccidas, quæ facile à talis & ferolis ejusmodi humoribus labem patiuntur. Partes mandantes sunt Cerebrum, Ventriculus, Lien aliæque partes : Lienosi præsertim ulceribus gingivarum maxime obnoxii, unde in scorbuto magna eorum partium exulceratio & corruptio contin-

gie : Interdum etiam ex lumbricis, aut corruptis humoribus ex quibus illi generantur, gingivarum erosiones solent contingere, ita ut ille diu perseverans lumbricorum lenis latentium indicia esse soleant, restis est historia ab *Hildano* allata, *Rivierus* cent. 2. observ. 68. meminit virginis quæ per duos annos gingivarum erosionem passa est, & ab eo affectu nonnulli magno labore liberata est, quia à Lienis intemperie calida & sicca, atque adeo atrabiliosa constitutione dependebat.

OBSERVATIO II.

Aphthosum os & Gurgulio à syderato intus thorace.

CUIDAM cum aphthosum os & Gurgulio fuisset, cum anhelitus insuavitate, excretio puris contigit : Aperto corpore totus inernus thorax syderatus apparuit : *Ballonius Paradigmate 108.*

SHOLIA.

S C H O L I A.

EX plurimorum sententia Aphthæ signis defluente & quasi stillante è capite humore: vel halitu calidiorè & vapore ab inferis misso per œsophagum, tracheam, vala coarctare meatus: *Schneiderus & H. Regius* volunt eas ex humoribus serosis & acutibus, in toto redundantibus, tanquam causâ antecedente orum docere: vel vaporibus fervidis, viscidis & acerbis ex quâpiam parte elatis per vala ori vicina: Si corpus huc venerea est infectum, Aphthæ sunt mali-

gne: quare verisimile est eas de massa corporis sanguinea venire, tanquam ejus desumpationem: Si redundat sanguis noster, ac mensura sistatur, is hic vel illic labitilla, ut oris variè hædetur: In proposito exemplo, eadem causâ, idemque humor qui aphtholium os & gurgulionem efficit, syderationem pulmonibus inducit: *Hydrocarum* causam à succo Pancreatico acidiorè deducit.

OBSERVATIO III.

Oris ariditas in quodam ejus jecoris summa pars apostemate obfessa erat.

Noribergensis quidam torus cholericus, de molesto quodam hypocondrii dextri dolore, edendi appetitus amissione, oris ariditate &c. conqueri cœpit: Aperto corpore invenimus vomica parti hepatis, ejus non parum putrefecerat, conatam, eamque satis magnam atque apertam. *Vide lib. 3. Tit. de Hypochondriarum dolore.*

OBSERVATIO IV.

Oris factor à Thymo glandula corruptis humoribus infarsita.

THymum novi, ex quorundam huc venerea infestatorum cadaverum sectionibus id doctus, tam certò instar spongiæ ab excrementitiis corruptis humoribus intumesce, quam ter tria sunt novem: unde quoque sonora non sunt voce, ægre cibum potumque deglutientes, sæpe per foramina nasi in nares ea excrementes; ægre spirantes insuper, compresso à tumore Thymi œsophago, renitente cartilaginosa aspera arteria, (hic illico ignarus Anatomæ crepabit occultam causam morbumque Formæ) Imo suspicior eosdem ob pravam hanc Thymi constitutionem fixitati esse anima, salvis adhuc Pulmonibus: (Id enim sita se non haberet; aut exulcerati pulmones essent, qui quæso fieri posset, ut spatio sex septimanarum huc venerea infectis mederi possemus?) non rursus, sed spuatatores ac fereatores; unde quis, si non facile halerit, ac sputo contagioso & osculo spissiori interveniente, inquinari perfacile potest: Quæ omnia de Thymo hic tradita, quoque huc venerea laborantium medela confirmat, facta per pyralisimum artificialem, quem collo circumdarum empl. de ranis Vigonis simplo vel duplo mercurii constans, promovet & accelerat: Licet vero Thymus in sanis & ætate provectioribus, ex Warthono, exigui sit ponderis vel magnitudinis, imbibit tamen plurimum feri, sæpe corrupti, ob situm quem habet inter divisiones arteriarum & venarum subclaviarum satis insignium. *S. Pauli Dispositione de Febr. malignis. §. 17.*

OBSERVATIO V.

§. 1. Oris factor à putredine intestinorum & omnium interiorum viscerum.

Virgini fœrens erat anima, purulenta extusiciens &c. Intestina omnia à pyloro ad rectum intestinum putrida erant, sphacelata: Testes corrupti, Jecur putridum; Pulmones putulenti & nigricantes. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 2. Clerici halitus fœrens fuit: Ileosus mortuus est: Colon erat velut nigrefactum, Epiploon putre, Ad regionem hepatis sanies purulenta; fœtebant adeo omnia ut viscera dimovere impossibile fuerit. Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.

OBSERVATIO VI.

Anatome Hæmaphysæ, cujus anima admodum fœrens, citra pulmonum ulcus.

Theologus ante 15. priusquam obiret annos, tussi pertinacissima, cum sputo cruento & gravi anhelitus fœtore tabidus interit: Cadavere dissecto nulla anhelitus fortissimi vestigia comparebant, quippe nulla fuit in pulmonibus, aut cavitas ab ulcere, aut solutio continui facta; nulla puris aut materis putidæ collectio, sed tantum visceris hujus lobus à tumore scirrhoso obriguerat. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*

OBSERVATIO VII.

Hæmoptysis à lobo Pulmonis sinistro scirrhuso reddito, trajectionem per os sanguinis liberam impediēte.

Inſignis Theologus ante 15. priusquam obiret annos, tussi pertinacissima, & subinde sputo cruento & falso, cum gravi anhelitus fectore coccyten propemodum amulante laborabat, unde maximo corporis marcere emaciatus, parum aberat quin plane tabidus extingueretur: Quoties hæmoptoe aliquandiu intermitteret, etiam sputi & anhelitus graveolentia cessabat, dein hujus reditus alterum istum affectum mox affore constanter pronuntiabat: In languido hoc statu cum Vir egregius, Regis partibus tunc temporis gravi tyrannide oppressis favisse deprehenderetur, ac in arctissimum carcerem conjectus loco potus ordinarii meram aquam biberet, præter omnium spem & expectationem revaluit, adeoque supra decennium mediocriter sanus persistit: Postea tamen nescio propter quam occasionem, nisi forsân ob hyemis rigidioris inclementiam, non solum prædicta mala, scil. Tussis cum sputo cruento, falso & graveolenti recrudescere, sed insuper superpondii loco ventriculi debilitas, inappetentia & febris nocturna accedebant: Deinde vero haud multum temporis præcedebat, quin symptomati hæc paululum remittentibus sudum denuo affulgere videretur, donec quodam die cæco derepente in frigidissimum mutato, sub noctem magna pectoris angustia, cum respiratione difficillima, pulsu celeri & imbecilli, cumque spirituum omnium (quasi jam moribundus fuisset) fatiscencia incesceretur: Attamen ex hoc discrimine, per diacrisis scil. 1. hæmoptoe copiosam, & mox diaphoresin saris uberem, cito evasit: verum ex eo tempore sputum ejus multum de solito fectore, & nonnihil de sanguine remittebat: cumque brevi postea ultimus & gravissimus immineret hæmopteos insultus, solum istum ab anhelitus graveolentia prælagium omnino deerat, subsequens vero sanguinis sputum valde copiosum vires adeo deprimebat, ut exinde sensim declinans, intra mensis spatium expiraret: cumque paulo ante obitum, propter acutum laceris dolorem vena tundcretur, cruor adeo deficere videbatur, ut fere nullus efflueret sanguis.

Potro in cadavero post obitum dissecto, sanguinis quantitas perquam minima reperiebatur, nec quidem ulla symptomatum aliorum maxime notabilem, vid. Hæmoptoes, atque sputi & anhelitus fœtidissimi vestigia comparebant, quippe nulla fuit in pulmonibus, aut cavitatis ab ulcere, aut solutione continui facta, nulla uspiam puris aut matricis putide vel fœtrentis collectio, sed tantum viscetis hujus lobus, ceu potius rorem latus sinister, & tumor scirrhuso adeo obriguerat, ut sanguis molem istam ita constrictam, & quasi lapideam, non facile aut minime pertransierit, quare non mirum est, si cruor rapidissime per pulmones traiciendus, alicubi è vasibus, quæ ob scirrhusitatem minime coharebant, aut circulationem sustinebant, subinde erumperet.

S C H O L I A.

Hic major difficultas oritur, nempe cum Pulmones necesse quovis, aut notabili solutione continui potius immunes reperirentur, undenam iste sputi & anhelitus odor reterimus, sputi cruenti semper præcurior & comes (exceptis tantum ultimis hujus morbi insalutibus) procederet: Super his alihi advertimus Philisico: cum ulcera pulmonaria, & sputa purulenta raro aut nunquam, matricem vero è Pulmonis vomica ejusdem lapsus fecerit: quod autem in ægrio Pulmones utroque affectu immunes anhelitus adeo tetrum expiraret, ratio optime constabit si inquirimus de causa & productionis modo Fœtoris in genere: Hanc autem excitari observamus, quando sulphur imparum à sale lixiviali aut acido, scil. alterutro dissolvitur, ac ab æthere præcipitatur, Sulphur commune, aut ancimonii ab oleo tartari, aut ab aqua Syegia dissolvitur: dein si huc solutioni salis fixi deliquimus, ac isti acetum infundamus, fœtor reterimus emanabit: Patet in casu proposito opinari subest, sanguinis valde impuri particulas sulphureas, è sale fixo, quo latex ejus abunde fœcet, corrodi: de-

inde quando humor acidus suorem passus, è partibus nervosis lo massam sanguineam redendus, sulphur solum præcipiat, proindeque è Pulmonibus fectorem istum exhalari solet, ac insimul dum sanguinem in tuncrescentiam adigit, paulo post hæmoptoe societati cogit: Novi quosdam pectore ita fixo prædicto, atque tussi omni ac distichi tabida liberos, anhelitum valde tetrum semper expirare, quod equidem à nulla alia causa, præter eam quam modo notavimus, procedere possit: Saogvis impotens, & sulphure à salibus dissoluta scaturit, si forsân dum intra Pulmones rarebit, ac in compage laxetur, humori acido occurret, inter expirandum effluvia putida & tetra exhalabit: Propter consimilem sanguinis alias dispositi rationem accidit, quod uti quocundam anhelitus valde potens, èa aliorum suaveolens exigit: Revera spiritus live aër per respirationem recipiatur, quatenus sanguinis interiora præcordia maxime rarefacti effluvia secum evehit foras, vaporem modo gratum modo summe ingratum dispegit. *Willi Pharm. rat. lib. 2. sect. 1. cap. 7.*

NB. Observatio hæc, ad idem sequentem, & Solitarium de Hæmoptoe pertinet, fere nescio quo in hæc missa.

OBSERVATIO VIII.

Oris Fætor ab ulcere ventriculi geminus.

Matrona annos 60. nata ex ore spiritum foetentem multis emiserat annis : E naribus graveolens quoque mucus concretus subinde extrahebatur, virens aut omnino varii coloris : *Deleg. circa ventriculi regionem assiduus, non tamen valde molestus; ut quem lenite poterat facculus in quo herbat, semina & aromata una cum gossypio confuta erant Mens & sensus ad extremum constiterunt, longo morbo confecta è vita discessit.*

Ventriculus hujus exterius ab omni parte, superficiei tenus, exulceratus extitit, & quæ ipsum contingebant universa, non tamen alia quam qua ventriculo contigua erant parte Cerebri substantia integra, sed copioso admodum humori velut innatans, qui fomes esse potuit muci qui sæpe in naribus concreverat : *Dodonæus cap. 25. observ. medic.*

S C H O L I A.

Graveolentia ex ore variis effectus de causis, quandoque in ore, faucibus, aut juxta nares, vel in ipsius vicium consistit : subinde in pulmone læset, quandoque vero ex ventriculo odor procedit : Triadum recentiores vicio ventriculi graveolentiam fieri, majoremque esse corpore jejuno, minorem vero ab assumpto cibo : verum hujus matronæ ex ore fætor semper similis fuit, neque unquam sive post cibum sive ante cibum remissior : Vlcera tamen ventriculi causam fuisse graveolentiae latius apparuit : *Idem in Schol. ad cap. cutan.*

OBSERVATIO IX.

§. 1. Oris Fætor à Pulmonibus oriundus.

Cuïdam cum aphthosum os & guttulo fuisset, cum Anhelitus insuavitare, excretio puris contigit : Appetito corpore rotus internus thorax syderatus apparuit : Er nos vidimus Dominam cuiusvis os est & velut purulentum, foetens : Dubitant Medici an à Pulmonibus à cerebro. *Ballonius Paradigmatæ 108.*

§. 2. Puella ab ipsis incunabilis morbis obnoxia fuit ; atque octavo ætatis anno obiit : Huic substantia Pulmonis materia purulenta erat imbuta, præcipue ex sinistra parte ; ubi ob spinæ incurvationem compressa, ideoque magis livida quam in dextro latere conspiciabatur, & principium sphaceli ibi fuisse color præ se ferebat : Hinc Anhelitus foetidus, hinc tussis gravissima, qua per dies aliquot ante obitum affecta fuerat : *Fabritius Hildanus cæti. 6. observ. 74. Vide historiam integram lib. 2. tit. de Phthisi.*

OBSERVATIO X.

Oris fætor à nimia Pylori laxitate.

Oris foetidus anhelitus ab intestinorum excrementis prodire solet, quando ob nimiam laxitatem & dilatationem ventriculi, illiusque præsertim oificiū, Pylori dictū, quo se in intestina aperitis nimium patet, vixque exactè amplius constringi occludique potest, sicuti naturaliter fieri debet, tunc foetida excrementorum exhalatio sursum per intestina expirans, per apertam hanc & laxas vias in ventriculum, indeque ad os usque delata, anhelitum foetore suo inficit : Quam nos præcipuam causam illius oris foetoris, qui stercoreosum odorem exprimit, esse diligenti inquisitione deprehendimus ; Ob id adeo perseverantem & pertinacem, cum ab organi vicio procedat, quod ægre reparari potest : Cui occasionem crapula diu continuata præbere solet, ex qua tandem ventriculus adeo laxus redditus, vel alia illius imbecillitas sequitur. *Platerus de funct. lason. lib. 3. cap. 3.*

OBSERVATIO XI.

Oris fætor ab Epiplois putredine, Coli & Hepatis vicio.

Aperto Clerici 22. annos nati cadavere, colon erat velut nigrescens, Epiploon totum putre, Ad regionem Epatis sanies purulenta : fixerant adeo omnia ut viscera dimovere impossibile fuerit : Audio halitum illi foetentem fuisse. *Vide lib. 3. Tit. de ventris dolore.*

OBSERVATIO XII.

Oris amaror ab infertione pori choledochi in fundum ventriculi.

Ventriculi dolore premebatur quidam cum continuo otis amarore, &c. Repertum vas choledochum ad ventriculi fundum implantatum. *Vide lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

OBSERV.

membrana ex membranis cerebri, medulla ex ipso cerebro, in majoribus avibus trahi videntur, hi vero sunt exiles, teretes & oblongi, nam sunt exporrecti usque in principium aëris, quod eo loci plenius latiusque est. Hi canales, aut si vis filamenta, erunt vel ipsa organa olfactus, vel natura & officio nervi. Non possunt esse primum olfactus organum, quia odorandi sensus ac ratio in tam angustis fistulis contineri nullo modo potest. Sunt ergo nervi, qui more nervi optici, aut auricularis nervi spiritum animalempetunt: Si ergo nervi sunt, non possunt esse primum Odoratus organum: Jam illud avium in oacibus nulla alia pars esse potest quam hæc instar cochleæ cavatæ & quasi tubularæ vesicæ, quæ pectus membrana sunt involvitur, ut etiam tunica in avibus, genus omni olfactus organum, illorum nervorum ope esse possit: In hominibus quidem & brutorum cranii, os cribroforme multis foraminibus insignitum est, quibus non duo, ut in valvulis, sed plures & ita admodum exiles nervi, (ita enim vocamus illa filamenta) feruntur, qui intunicam narium intima operientem inferuntur: quare illa narium membrana admodum sensilis, & ad odores percipiendos vehementer apta evadit, quoniam ejus ad sensum etiam plurimam conferant nervi qui, diversotramite à tertio pari proficiuntur: & quamvis hæc narium tunica, etiam propter illorum nervorum multitudinem maxime exquisito sensu gaudeat, tamen verisimillimum est eundem magis magisque intendi à filamentis illis, quæ de dura cerebri meninge tracta, ad hanc tunicam per foramina ossis cribroformis veniunt, ac loco eorumque etiam inferuntur: Hæc filamenta, aut has fibras, nos in anacombis nervos vocare consuevimus: nam quoniam quedam foramina ossis cribroformis, in hominibus & quondam animalium cranii sunt adeo angusta, ut ejusmodi quidquid nervus digne vocari possit, vix transire queat, tamen quedam sunt spaciola, ut illa recta filamenta hoc cognomen mereri posse videantur. Nam cum in majusculis illis filamentis quedam medulla tunc inclusa & esse videatur, certe illa impune nervos vocabimus: Sunt enim illæ majores fibres quasi tubi aut quasi cæcæ cæcæ, quarum membrana, ex quibus consistunt, de dura piaque meninge, & iucus in iis delineatus me-

dulla, de interioris cerebri medulla trahuntur, utique rem recluso bovis cranio ad lateralem contemplari poteris. Atque quam multi sunt nervi qui tam exiles sunt ut vix sub oculo veniant? Signe illas fibras nervi nomine dignari dubitas, ideo quod non de interiore cerebro, ut plerique nervi nascuntur, poteris tamen nervos minus proprie vocari, nec negabis has nervosas fibras narium tunicam, quæ maxime sensilis est, multo magis sensilem reddere. Peritaneum acri est sensu, idem quod à dura illa meninge originem ducit, quam sensibilis itaque erit hæc tunica, interiorum narium, cum ob has nervosas fibras cum maxime ob tertio pari nervos, hinc *Lindem*, Narium tunica tam exilis nervus quidam annectitur, ut *Vesalius* crediderit ipsam ab hoc constitui: hinc pendet sensus ille exquisitissimus, qui cum sicior aër de superior sternutatione, sicut acerrimus & frequentissimus: Si aëris siccitatem tam exquisitè sentit hæc tunica, etiam illam per cipit quæ odorifera insulsiore sit major. Quare eadem tunica & siccitatis & odoris, qui aëris ipsam insensum habere videtur, cum illa aëre sicco vehementer, vehementius aërem eo siccior, juxta & odorem lacessatur, &c. Præterea illi processus mammillares ob plures causas corum per quæritur: Si *Hyd* ocephalorum caput recludimus, plerumque in illis cerebrum sita aqua perfusum est, hi processus vixisse se habent: Nec tamen olfactus latius animadvertitur, nisi simul succum, ut narium tunica afficitur. Vide plura eodem libro per *Hyd* nem, ubi de *Amphibio* Odoratu, & de *Amphibio* de *Amphibio* part. 1. cap. 13.

Nec odorabatur olfactus leditur dum ad spongiosas membranas narium, otis, palati & faucium, cum sanguine nutritio ex corde, impuriore adhuc permixta chylo, ineratam caritidum tam defertur labutam, neque eadem per venas cum sanguine revolvitur: hinc membranae utrumque temperamentum vivitum & organica in mentibus similitudine membranae essentialiter propria constituntur: Nec solum nunc odoratus actio heditur, sed & *Amphibio* de *Amphibio* nutritio, nutritio & chronica, multarum interdam durantes spatio septimanarum, arteriis ex corde & venis per cor, ex toto semper summe suppeditantibus corpore. *Gu. Raskin* in *Disert. Anat. lib. 1. cap. 13. 131.*

OBSERVATIO II.

Odoratus privatio in quodam, quia Narium tunica non obtinebat nervos qui ipsi debentur.

Quemadmodum apud Columbum juvenis, nomine Lazarus, cibaria gustare non poterat, quod hi hujus paris nervi in occiput derivati essent: Ita juvenis (de quo *Enslachius Rudius*, qui à nativitate olfactu carebat, nasum valde resimul habebat, cui vox omnino illarsa, facilis respiratio, necnon copiosa (præsertim post sternutationem per nares expurgatio) aderant, non Odorabatur, quod tunica narium ejusdem paris nervos, qui ipsi debentur, non nata fuisset. *Victor Schneiderus lib. de Offe cribroformi, pag. 118.*

OBSERVATIO III.

Odoratus privatio ob papillarium processum & odoratoriorum nervorum partis defectum.

*F*Alcoburgius testatus est in quodam Tabaccobibulo famosissimo post mortem dissecto, papillares cerebri processus cum quadam nervorum odoratoriorum parte defuisse. *Raskin* in *Anatom. lib. 1. cap. 13.*

Odoratus amisso ob lapidem circa cerebri basim inclusum.

CLAR. D. Nic. S. Michel, dum per aliquot menses quendam Patritium Venerum xlvj. annos natum curasset, qui à pueritia fragrantissimis odoribus vehementer delectabatur, in maximam tandem Olfactus organorum obstructionem incidit, ita ut nihil plangere, etiam fetidissima olfacere poterat, cum dolore capitis obruto, & maxime gravativo, adeo ut caput semper in primum & pendulum habere cogeretur: Adhibitis autem multis calidis & omnis generis medicamentis, in febrem continuam incidit quæ intra nonam jugulavit hominem.

Detraeto cranio & exemptis membranulis, alteram per medium cerebri molitus sum sectionem, nihilque in ventriculis cerebri reperimus: At dum magis cerebrum excavaremus, tandem prope basim lapidem compressum, talis nutui inerat, sed non omnino rotandum, cinerelli coloris reperimus, qui oscunciforme & olfactus meatus plane impediebat, adeo ut nec olfacere nec expuere poterat. Quo repperito & expurgato, quod moris causam non faceret, abdomen aperui, atque membra omnia naturalia examinantes, ultimo jecur valde obstructum, durum, & quasi lapideum, nigri coloris, carbonum instar: sanguisque in eo contentus perinde erat atque atramentum, valde ater & corruptus, quem moris causam fuisse affirmabat dictus Dom. quod vel illo tacente constabat. *Observ. D. Garacci Medici Austriaci.*

S C H O L I A.

Notandum est Hippocr. lib. de carnibus, Odoratus organum siccitatem sequi, ita ad ejus perfectionem, Nares tamen succingens musica, & mellea, verum olfactus organum, non modo in demoritis tum hominibus tum bestis humida reperiunt, sed & in vivis per-

petuo quodam madore percipitur in igara à Ductibus quibusdam in membranam illam insertis, de quibus videtur, de Catapho c. de Coryza: Unde constat humiditatem illam Olfactui non omnino obesse, cum & illi in canibus, quibus odora vis eximia, reperiantur.

OBSERVATIO V.

Odoratus amisso ob fœdiorum illarum, è qua duo vermes geniti, circa olfactus organum cohibitam.

Odoratus perit aut imminuitur impedito narium ethmoidis ossis meatu, quo spiritus ac odor duci solet, idque vel sarcomate, vel polypo & phlegmone, vel gravedine: At si horum nulla signa comparent, offensionis causa vel ad priores cerebri ventriculos, vel ad eas propages, in quibus est odorandi sensus, referri debet. In his vel intemperies, vel humorum copia, vel corruptela sensum ejusve spiritus contaminat: Circum eas sedes Abscessus interdum fiunt, nulla febre, minimo dolore, è quibus ruptis animadverti pus syn-cerum per nares affatum profuere, perinde atque è purulentis auribus, idque nullo incommodo valetudinis: Sed & in quodam milite, qui resimis erat naribus, ex fœdiorum quadam eluvie diutius cohibita, vermes duo villosi instar digiti, illic geniti inventique sunt, qui tandem in furorem illum adegerunt febrèque non admodum manifesta, de medio sustulerunt die circiter xx'. *Fernelius Patholog. l. x. cap. vii.*

OBSERVATIO VI.

In Fumifugo deerant processus mammillares, unde Olfactus destructio.

Parvum patibularium fumifugum secuit, cui deerant omnino processus mammillares, unde suspicabatur à Tabacci abusu fuisse absumptos: Erat autem is omnium Tabacci amatores facili princeps, deerantque non processus modo, verum & nervorum odorantium extrema. *Magnenus de Tabacco p. 135.*

S C H O L I A.

Sicuti hæcæotum cuius exsiccat, & in ardentissimis febribus colliguntur partes, ita nimio fumi exsiccatissimus upopon: hoc organum labe factum lege illis scilicet naso fumi halitibus. Hinc *Falkenbergus* concludit, Meatus autem negat morbos in conformatione posse unquam à pravo uso rerum p. n. oriri, Et citat per se *Columbum*: Lazaro enim vivituro deerat gustus, quod quanta nervorum conformatio ad occiput reflecteretur: Facies multis aliquando multa delirant, & plura sunt monstra in interioribus quàm in exterioribus apparant: Dico tamen 1^o, quicquid sit de illa *Pavæ* dissectione,

olfactum ab usu Tabacci in multis aboleri: id plures mihi retulerunt, tum qui pulvere, tum qui fumo abutuntur: Ratio est, quia nimis exsiccantur processus mammillares, unde cum sicciiores quovis odore reddantur, non possunt ab us immutari: odor enim est è secco superante humidam, sensorique ab objectis suis immutari opus est, ex *Arist. 1. de Anima*: Dico 2^o. Processus mammillares aboleri non posse à Tabacco, quia nullam habet vim erosivam: Exsiccabuntur autem, sed non colliguescent, colligique enim non est partium nervosarum affectio, *Item.*

OBSERV.

Odorum, remotare odorata à naribus, pertinax mora in quibusdam, pendet ex eo quod os Frontis, supra supercilia insigni caverna præditum est.

IN osse Frontis cavernula observanda est, quam *Spigelius* ad odores hauriendos facere existimat, cum ibi aer odore prægnans excipiat paulumque conservetur, ne nares tam subito præterlabatur, unde odor per integrum diem in narium summitate perferitur.

S C H O L I A.

Ejusmodi duræne permansiois odorum exemplum insignitè addidit *Schneiderus* l. de osse Cerebri formi p. 112. Quidam mercator ait, in angusto cubitali lecto dormiens fastorem quem quidam moribundo corpore juxta me hians, ore, naribus & toto corpore cabalarat, tota nocte adeo naribus hauserat, ut exasperatus vehementer naufraget & fastorem naribus efflare laboraret. Et quod mirum, a. x. die quam hunc fastorem hauserat adhuc hoc malo constabat. Nam cum vehementiori vento adversus iret, hunc fastorem odorem efflere videbatur: Coosulibus sternomentera cieda curavit, ut intima narium penitus purgarentur: Ipse vero hunc vaporem non in hac cavitate ossis frontis inclusum fuisse judicat, nam ille afflante aere & vento adverso magis tarsum versus ad concavum ossis, quam aut retro deorsum ad processum mammillares, aut recta deorsum ad os spongiosum propulsus fuisset: Quare ille ceteris anterioribus sinibus inhæret, ac aëris interni impulsu agitur, organum Olfactus denique adficere potuit: Porro, addit, in cranio hominis hæc ossis caverna semper inanis est, nec ullum humorem coeet. Sed est admodum teris, splendida; Verum scire convenit hanc cavitationem, in qua inselle consuevit hæc membrana, scilicet cranio deesse, et ejus rei testes sunt varii: Atque illi ipsi homines, qui tale etiam nacti fuerunt, bene Olfacere potuerunt: Ex quo intelligi datur hæc membranam, quæ sine illa cavitate non posset existere, ad organum Olfactus minime spectare: Hoc eodem gladio etiam pugilat eos qui ac in hac cavitate

incluso eam vim assignare non dubitant. Hanc cavitationem in anatomia corporis humani diligentissime percuratus sum, at frustra fui, nam os eo loci minime erat excavatum, sed plenum & fungosum, nec plenum satis, sed sat erat, ut is, cujus fuit, bene loqui potuit, ex relatione eorum quibus notus. Verum illud multos movet, quod iter de hac cavitate, si ficta est, semper ad nares feratur, Ex quo tamen minime effici potest illam aut ad sonum vocis, aut ad sensum odoris facere: nam supra nares & os cribrosus hæc mûlum erat caverna, quare ipsa harum partium fabrica tacita clamat, in eam rem à natura non fingi cavitationem, Nullas, inquit *Varandus*, est doctus sensilis per quem ejusmodi species ad sensum communem & cerebrum deferantur: Et *Cardanus* hanc rationem premit, quod oculus nervus hæc cavitationem perat, Qui vim horum argumentorum videt, hanc hoc utilis afferre voluit, ut odor huius & vapor in ea diuulge contineri & servari possit: Verum narium intum est per se admodum capax, ut odor diutius inhære possit: Quoi enim in osse spongioso intum sinus? quam varii? quam vacui? quam porosa est hæc membrana? aer inclusus quam vapidus. Hæc ergo cavitas nullo modo facit ad sensum odoris: Interdum illa interjecta corporis fungosi obliteratur: Sed sæpius fingitur, ac intus semper pellicula tenui integitur, Cavitate levius evadit cranium: dicta est difficile quam vehementer Natura ab iniquis pendere abhorreat, &c.

OBSERVATIO VIII.

Polypus narium, ossis pedibus donatus, à concreta pituita ortus.

Post frequentes destillationes occupavit uxorem N. insignis Polypus colore albus, substantia pituitosus, nares obturans utramque, cum continuo suffocationis metu. conspiciebatur, & in naribus & in gutture, cum duplici caruncula, altera livida ac dura, à carcinomatis natura parum distante, Suadentibus itaque celerem remedium usum, hinc præcipiti carcinomatis metu, illinc vero æstuantium faucium fervore, & humoribus acris nares jam erodentibus, tentatum fuit impedimentum hoc inde extrahere: sed fractis magis quam educis illinc carunculis, arrepta fuit deinde forcipe illa pars quam diximus carcinoma minari; quæ potentius vellicata, sequebatur protinus integer Polypus, cum omnibus suis pediculis, tam in naribus quam gutture conspicuis.

Erant huic Polypo (cui vel à pisce marino, vel à pedum frequentia nomen) octoni pedes, incipientes singuli, instar pyrorum à tenui pediculo, orto ab excrescentia hujus centro, unde quoque prodire venæ per ipsum dispersæ: Pedes autem, quos carunculas vocant Medici, plurimum inter se discrepabant qui enim in naribus erunt oblongi, illi ipsi fuere in faucibus rotundi, sed omnes erant recti membraneo velamento, sub quo continebatur concreta pituita, in plerisque mollis ac pellucida instar pulpæ pruni albi: in aliis vero dura ac opaca, ad instar cornu adusti. *Tulpius Observ. 26. lib. 1.*

S C H O L I A.

Argumeto hoc evidenti metoendum no tantum de lividis ac melancholicis, sed etiam à polypis albis ac pituitosis, præcipue si vel à fervido sanguine, vel ab æstu sacro concluso degeneret in carcinomatis naturam, uti hic evidenter factum. Errat itaque non leviter qui judicant Polypum pituitosum careere omni periculo, quod

ne, vel ab æstu sacro concluso degeneret in carcinomatis naturam, uti hic evidenter factum. Errat itaque non leviter qui judicant Polypum pituitosum careere omni periculo, quod

quod plerumque quidem verum, ſed nec promiſſione nec indiſcretè: Sed dicat quis, an non ſoculatum hocce teamentum, & inopinatus hæc Polypi per fauces educio, ut etiam in aliis idem liceat experiri? Quod ſi vero lubet medicamentis rem tentare, conſigendum erit ad pulverem vitrioli calcinati, columbar vocatur Chymici, vel ad radicem hermodactyli albi, ex ceptam aut melle roſato, aut aqua ſabinæ, quibus re mediis contorquetur magis quam aperitur Polypus iunica: nec penetrat hic pulvis per anguſtiam prope naſi ſinem, ab excreſcentia obſcuratam: Unde tamen

nili educeris carunculas illæ turbulenter, turbari conſtenter eadem hæc leges. Et ex aſſuſu novi humoris inumeſcet aſſiduo, que in exſiccata moica remaneſcat pulpa: Nili forte involuacrum ipſius ſit adeo teres ac molle, ut à pulvere hoc abſorbeatur non minus pulpa quam tunica illam ſuccingens: quem ipſius luſcellum alicubi aliqui experti, credere propterea, ſed ſatis temere, pulverem commemorant ubique locorum idem polſere & inſalubiliter ſanare quæcumque Polypum.

Idem obtem.

OBSERVATIO IX.

Polypus narium ex viſcerum imi ventris vitio ortum ducens, illæſo cerebro, foraminibus oſſis cribriſiformis & proceſſibus mammillaribus.

A Pertum caput defuncti hominis qui Polypum in vita ſæpe paſſus fuerat, omni ex parte quam diligentiffime conſideravimus: In hoc autem cerebrum ſalvum, nervoſa filamenta integra & foramina oſſis cribriſiformis illæſa invenimus: contra imi ventris viſcera, hepar & lien viſioſe affecta erant: ac proceſſus illi mammillares in cerebro erant incolomes & ſui coloris, qui certè vitium tandem duxiſſent, ſi de iis ille pernicioſus humor ad nares jugiter deſluxiſſet. C. F. Schneiderus lib. de oſſe cribriſiformi pag. 436.

S C H O L I A.

Cave credas noxium illum & redudantem humorum, ex quo hoc malum naſcitur, ſemper de cerebro, per foramina oſſis cribriſiformis deprociſi, ſed illa materia ex vaſculis, in intimas nares porrectis, eo concurrit: Quare curationem ad viſcera, que ſanguinem conſiciunt commodius quam ad cerebrum dirigimus: *Idem.* Materia Polypi de cerebro ooo venit: Nunc fortiffime aſſertum morbum illum ſemper de maſſa ſanguinea venire: deprehendimus & oculis contemplantur vaſa que intus tument: Erant, inquit Taſpus, octoni pedes, incipientes ſinguli, inſtar Pyrorum, à tenui pediculo, ortu ab excreſcentia hujus cerebro, unde quoque prodire vena per ipſam diſperſæ: Ex plerumque natum eſt hoc malum ſi ſolenne quoddam profluviolum redundans humoris fuit ſuppreſſum, nam citius eſt polypus cum ulcus pedum curacitur: Sæpe quoque aliis morbis jungitur: Rem ergo ſic habeto. Si maſſa ſanguinea eſt impura, noxii humores modo hac, modo illic ruor: ac ſi iis loegellionis exitum conſtuentibus, narium vaſa vias præbent, facile fieri poſteſt ut bioc tale malum oriatur: Et hoc eſt quod auctores tradunt Polypum, ut ſanguinem, cum Luna creſcere & decreſcere: *Idem lib. 5. de Catarbis cap. 6. p. 188.* Accedit adhuc ſententia

tiam *Ripianus* Anthropogr. lib. 4. cap. 6. qui diſciſſa naſi cartilaginibus, intra caviates narium, obſervat ſubter carnes ſpongioſas, ſubrobas, quibus oſſa naſi ſpongioſa oppleta ſunt. Ex his tumefactis Polypum generalit: Que tumefactio aliter contingere nequit, quàm ſi iis caribus narium ſpongioſis (que lubricas eſſe aſi colore ſcil. à ſanguine iis trahentibus) impuſus ab arteriis alimentum deſeratur, unde illæ excreſcunt.

Pernicioſus humor] Humorẽ Polypi cauſam à Lymphaticis vaſis alii deducunt, quorum ſoboleſcit vas in naribus iunica recens à Nic. Stenone repertum, de quo Clar. Bartholinus cent. 3. Epit. 38. Excretorium vas in narium tunica, à poſtica parte verſus anteriorem procedens, novum eſt, &c. Lymphaticum eſſe ſeris, & lympham ea propter expuſare, ab arteriis cerebri excretam, quam etiam non pauci ex naribus illam rem experiri uti: teleris fortæ oſculis, præſertim in frigidiſſimis, ſeuſioribus & hyemalſi tempore: Hinc quoque Polypotum forma deduci poſſuit, aucta lymphæ ex hoc vaſe, quos adſtingentibus ea propter optime curant, ſuperne reſellentibus vel exſiccantibus.

Idem.

OBSERVATIO X.

Mucus graveolens è naribus prodians, à cerebri ſubſtantia copioſo humori innatante.

Matronæ è naribus graveolens mucus concretus ſubinde extrahebatur, virens aut omnino mali coloris, &c. Cerebri ſubſtantia integra: ſed copioſo admodum humori innatans, qui ſomes eſſe poſuit muci, qui ſæpe in naribus concreverat. *Dodonæus obſerv. med. cap. 25.*

OBSERVATIO XI.

Pus per nares excretum à Pulmonibus inflammatione & abſceſſu affectis.

Priniceps Illuſtr. per 15. dies febre, ſopore &c. tentatus: acceſſit inſignis ſpirandi difficultas cum dolore thoracis ſuperioris &c. In ipſo agone è naribus per horas quatuor deſtillavit humor albidus, tenax & ſteridus & vere purulentus, qui in pulmonibus ebulliens ſua ſponte in nares deſpumaverat: cujus etiam reliquias repertum iri in diſſecto pulmone

Gg

teris doctrina. Symptomata hæmorrhagiæ, morbis chronicis præteritis familiaris, accidit: cum sanguis vitiosus ab Hepate debili, & insigni aliqua intemperie laborante gignitur: cum scilicet aut fluxus & æquus est, unde a reterente facultate non continetur: aut actus & nutritionis læpsum, ab excretice expellitur: aut Nervosorum decreta, qui sanguini

vim sanguinis genericam assignant, sequi liber, dic contingere ob cunctis massam effusam & languidam, quæ chymo adveniens sanguinis crasin & tuiorem inducere nequit: Si Hepat coloratus manere fingi velis, dic vitiose ab eo secretæ bilem cruori commisceri, unde ad ipsa ærimoniam fluitior & ad exitum proclivior evadit.

APPENDIX I.

Sive exemplum Hæmorrhagiæ ob fibras motrices arteriarum spasmodice affectas contingentiæ.

Nuper ad distans consulebar pro Generoso quodam sanguinis eruptiones crebras & immanes, modo ex naribus, modo vasis sedalibus aliquandiu passio: huic phlebotomia ex amicum suavis crebro factæ nihil profuere, imo sæpissime post V. S. in sudores frigidos ac leipothymias incidens, atque sanguinis eruptionibus nihilominus obnoxius multo deterius habere solebat: Huic ego nondum vilo iulapia & decocta refrigerantia & anodyna, item herbarum expressiones succulentas, allaque sanguinem refrigerantia præscripsi: Verum etiam his (quasi omnia essent à leipo aliena) nihilo melior adfuit successus: Tandem rus ad eum inviscendum accersitus, repeti affectionem, qua laborabar iste, mere aut potissimum spasmodicam esse, quippe cum sanguis quotidie erumperet, pulsus erat debilis, extema frigebant, & vasa omnia quasi nimis inanita conciderant: Porro Ager vertigine fere continua, ac cordis tremore, & subinde leipothymia, aut metu ejus afficiebatur: Profecto tantum aberat ut sanguis ob plenitudinem aut turgescientiam nimiam è vasis erumperet, ut potius è contra rivus ejus admodum depressus & tenuis, vix circulationis fluente sustinendo par videretur: Attamen, quod res fuit, sæpius in die persentiscebatur in corpore suo aliquid, modo sursum modo deorsum, sub flatu specie confestim obrepere, & plerumque morus istius tendentiam, sanguinis è naribus aut hæmorrhoidibus effluxus sequabatur: hinc ut facile concludere esset, vasorum sanguiferorum fibras, quibus contrahuntur illæ, motrices spasmo affectas, sanguinis fluxum, utut dimissum, tenuem, huc illic inordinate corripuisse, & subinde in eruptiones compulisse: quod item facilius evenit, in quantum vasorum ora laxa & dehiscencia, cruorem ad ea compulsum absque remora debita effluere sinebant: Etiologiam hanc medendi methodus instituta, quatenus tali supposito inniteus feliciter successit, plane comprobat: nam S. m. & medicaminum *hæmolum* usu deinceps omissis, præscriptum pulveris sequenti cujus dosin sexta quaque hora cum iulapia sumebat idoneo.

℞. pulv. rad. præon. mar. corall. r. margar. ana ꝑj. eboris, ocul. cancri, lap. hæmar. ana ꝑss. lap. prun. ꝑj. f. pulvis, dozis ꝑb.

℞. aq. cerat. nigr. ꝑvlij. meliss. cinnamomi hordear. ana ꝑij. theriacalis ꝑj. syr. e corall. ꝑss. Cæterum præcepti ut ligaturæ quibusdam locis ex ritu constanti, & subinde aliis pro data occasione, tum ad sistendos, tum ad intercipiendos vasorum spasmos adhiberentur: atque hujusmodi remediis sine ulla morbi recidiva brevi convalevit: *Willi Pharmacop. rat. p. 2. sect. 3. cap. 3.*

APPENDIX II.

De viis per quas sanguis in Hæmorrhagiæ Narium erumpit.

Cum illa ossis cribiformis parte, quæ contra medium interstitium narium exoritur, intra cranium assurgit, ille *Canalis* qui dicitur *Falciformis* sinus, committitur, quem nonnulli instar venæ adaperiti arbitrantur. *Riolanus Encheir. Anat. L. 4. c. 6. In hæmorrhagiâ, inquit, sanguis vel è naribus scalpiti & erosus fluit, vel è sinu illo longitudoinali dura meningi qui præcepit ad naves.* Verum cum hujus sinus falciformis finis in *Cristam galli* porrectus, non meatus cujusdam formam, sed ligamenti naturam usumque habeat, veri haud simile est hunc sinum in novissima sui parte, qua ligamenti naturam induit, & ossi, quod *Crista galli* addit, innascitur, instar canalis inferri posse, ut de eo, tanquam de vasculo, oris adaperiti sanguis permanere queat: Objicies, Nonne vena umbilicalis, etiam in junioribus, est ligamentum, aut illud morbo relaxatum, instar canalis nunc sanguinem, nunc aquam interdum reddidit, ut historix medicorum eloquuntur? Sed dispar ratio est, vena umbilicalis fuit quondam vena, canalis & vas sanguinem invehens: quare in illis, qui in ætatem adoleverunt, intrinsecente per morbum ventre, facilius referatur, Et ea nonnunquam vitio valetudinis in infantibus

non clauditur : At extremus hic sinus falciformis nunquam instat vena fuit excavatus, sed ab ipso vite exordio naturam & officium ligamenti nactus est : Nam medius hic sinus quidem, instat vena aut canalis sanguine distentus est, at is ad os cribiforme tendens, magis magisque fastigiatur, & in tam solidum ligamentum coarctatur, ut nullo modo referari posse videatur : *Inflabit 1^a.* Hippocr. cervicem aqua calida perfundit, ut die critico major sit hæmorrhagia : Idem, ut illam stringat, aqua præfrigida cervicem rigat : Respondet, & illum sanguinem qui de venis in intimas nares porrectis per nares defluit, hoc remedium genere revocatur : (*perfrigerato scilicet sanguine qui per arteriam carotides & vertebrales in cerebrum insluit.*) *Instabit 2^a.* Is cui nares jam incipiunt fluere capitis gravitate prius urgetur, Ergo sanguis de cerebri venis promanat, *Respondet* eidem faciem, cuius & nasi venæ sunt communes, rubere & omne corpus sanguine distendi : Quinimo damus de cerebri membranæ sanguinem interdum promi posse, cum præfixo sit illa vena quam *Spigelius* ait ex narum amplitudine, per ossis cribiformis foramen in membranas cerebri distillari, Sed negamus sinum falciformem sæpius adaperiri : Quidam hanc opinionem sic exponunt, non ipsum sinum extremum patefcere, sed ab hoc profectas venas, & in dura & tenui meningæ, ac in sinu cerebro discurrentes ita aperiri, ut de his sanguis per huius ossis foramina defluat, & de naribus tandem etumpat : Vctum omnis talis hæmorrhagia multis nominibus erit mortifera : Quam facile sanguis confluet in illam fossam quam æqualis facit cerebri divisio ? Quam facile gelascet sanguis, ut non nisi per cerebrato cranio evacuari possit ? Ipsa foramina ossis cribiformis quam sunt angusta, & illa quam arcte clausa ? quare tam facilis haud erit transitus, Quid ? sanguis constabit potius quam defluat ? Quam facile hinc apoplexia, epilepsia, lethargus & similes morbi nasci poterunt ? Quam sæpe nos inspectis mortiferis capitis vulneribus intus sanguinem gelatum integro cranio invenimus, qui compresserit cerebrum : Avicennæ sententiam qui sanguinem de illis venis, ex quibus rete admirabile constat, in hæmorrhagia fluere censet, commode interpretatur *Iac. de Partibus Rectis cerebri*, l. e. pizæ matris & duræ, quæ comprehendunt cerebrum sicut rete : *Fernelio* sanguis videtur per nares emanare aperta, rupra vel exesa vena eo defluente : Hæ venæ, *inquirit*, non ex intimis cerebri, sed ex oris palati-que sedibus excurrunt, satis quidem directæ ac parvæ, ut quasi emissarium sinu supracui sanguinis expellendi, quemadmodum & hæmorrhoides, & quæ in urtri cervicem pertinent : Hic cum pluribus sequitur antiquos, Hippocratem, Galenum, Aræzum : Frustra opponis sunt minuz venæ, tantum sanguinis, quantum sæpe defluit, ex illis venis depromi non potest ? Nam aliquando ex *Benedicto Veronensi*, venula narum à tonsore leviter fauciata, sanguis adeo erupit, ut cum is sili non posset, æger cito exstingeretur : Id confirmant *Collado*, *Salmon*, Si solennis est abundantia mensium, & subito stringitur, plerumque formellis profluvium sanguinis fit è naribus, una vel altera &c. *Schneiderus lib. de ossis cribiformi pag. 411. &c.*

OBSERVATIO XV.

In iis qui ob Narium hæmorrhagiam mortui sunt, Sinus cerebri & Torcular, corrota reperiuntur.

Jugularibus venis in postrema parte coeuntibus, figura quædam Ypsilon Græcæ efformatur, quæ per longam calvaria percurrit internam substantiam membranarum separans cerebri, à quibus vas effingitur, quod Torcular nuncupatur, quo usque ad Nares descendit : Unde quando sunt qui sanguinis fluxu è naribus moriuntur, hoc fit quia corro-
duntur hæc vasa, quemadmodum observavi in Anatome. *Hippolitus Boschi de Facult. Anat. Lectione 5. pag. 50.*

S C H O L I A.

Corroderentur hæc vasa] Dissentit C. V. *Schneiderus* lib. 2. de Cataractis cap. 20. pag. 223. Sæpe sanguinem aut, in cerebro gravissime percussorum, non procul à sine falciformis sinus reperiimus, Nunquam in vivis ne gutta quidem perfluere potuit : Et quomodo sanguis, qui de vasis in basi cerebri extantibus

intus fluit, ad cavum narium venire potest : Adde, Sinus falciformis est vena, de ea sanguis deorsum versus ad cor, minime ad nares rapitur : Quare hæc & ejusmodi alia nunc ob circulationem sanguinis, ita vocant, merito repudiuntur.

OBSERVATIO XVI.

Hæmorrhagia ab Hepatis vel Lienis vitio inducitur.

§. 1. **J**ulvenis anasarca laborans factus est ictericus, sequitur Hæmorrhagia narium, mox subita: Hepar fuit subalbidum, cum abcessu in parenchymate: Lien magnus, lapidibus albidissimis plenus. *Fantanius Respons. & curat. p. 90.*

§. 2. Ager per annum febre multiplici intermittente laboravit: Sæpius hæmorrhagiam narium patiebatur, plerumque è sinistra: Totus Lien durus erat, plumbei coloris, magnus, crassus, in quo materia similis feci vini rubri continebatur. *Vide l. 3. tit. de Hyp. tumore.*

§. 3. Virgo 35. ann. biennio ante mortem copiosissimam narium hæmorrhagiam, quæ sola f. m. sistebatur, habuit, unde hydropis initium: Vena umbilicalis sanguinis copia turgida apparuit & varicosa: Hepar erat album, tuberosum, durum & exangue. *Vide tit. de Febr. l. 4.*

OBSERVATIO XVII.

A sternutamento sæpius concitato mors, ob disruptas arterias & meningis cerebrum cingentes.

Sternutamento agitarum caput violentius, disruptis eo impetu meningibus, luxataque cerebri compaginatione, nonnulli interierunt: Pistor Suburbanus, cum vicesies quater sternutasset continuè, succedens proxime sternutamentum 25. exitio fuit disruptis arteriis & membranis cerebrum circumcingentibus. *Fantanius Strada in Prolesionibus Academicis.*

SCHOLIA.

Magus vis est Sternutationis, qua omne corpus iuculetur, caput enim tum illis muscularibus movetur, quorum pluriimi thoracem contingunt, qui revocato tororibus spīto & mox eo reddito vehementissime conquiscentur: ipsūque caput vertebra collī sustineretur, quæ vertebra thoracis insident; atque in lacina aurium detrahit, ea ore clauso interdum sternutando eliduntur, non quod cerebrum aut duræ meningis, aut tympanum tantopere moveatur, sed quod aer per aquæ ductum ad antium antea tum quasi impetu facto prorumpat, & ea quæ inhi inhaerent, isto loco dimovere possit: Cæterum corpus etiam propter multos, illum fasciculum sternutationis pariter nam thoracis musculos pluriimi attingunt, ut nihil de diaphragmate & musculis abdominis dicam: Musculi Glutini dicti, in extremo corpore sui, sternutando vehementius agitantur, ut id in ossis sacri ulceribus, si illa iogenia exitum, sæpius animadvertunt Chirurgi: Hippocr. 7. aphor. 51. naturam & proprietatem sternutationis sic exposuit: Fit ex capite calefacto cerebro, aut humectato spatio in capite inani: aer enim intus contentus foras effunditur; itepleit autem, quia per angulum ipsi est exitus: Qui eius sententiam novitur, ut & cerebrum & ejus meningis sternutatione credunt ad id quod molestum est dispellendam insurgere, atque ob id manifeste intus motari, At qua ratione cerebrum, viscus tam molle, per sternutamenta tam vehementer motari queat, non intelligitur: Ac dura meningis quam firmiter omni loco adhaereat cranio anasome ostendit: Atque si etiam cerebrum & ejus membranas aliis locis motari possunt, tamen illud hic fieri non potest, cum processus mammillares in finem ossis cribiformis penitus abstrusi sunt, & nervi odoratorii in homine quam tenues sunt, quam facile quodam agitur ab eum pervenerunt? Et dux memina propter tractatus nervulos quam leviter adhaereat tunica narium: His nunquam te adhaerentibus ut credas membranas cerebri, & cerebrum ipsum itur sub cranio privari morari: Minime autem nego cunctum caput propter multos sternutatione qualini: Nec humor quem sternutans per os

& nares projicit, de cerebro venit, & per os cribelli modo tenuiter foratum destillat, sed ut *Cordanus* ostendit perire, ex imis fascibus ad nares & finem os propellitur: Sed sternutatio semper oritur à Tunica narium, quæ vel ab externis rebus proritatur, vel ab internis: De illis constat: Has voco quæ intra corpus gignantur, halitus acres à cibis noodum in ventriculo digestis, qui insitit aere subtili tunicam narium lacessunt; aut si ex vasculis narium transiunt liquor quidam acris & tenuis, tum ab internis causis sternutationes evocari videntur: Vide *Hysium* lib. 1. part. 1. obiev. 49. Hoc itaque certum fuit semper hanc interiorum narium tunicam irritari antequam sternutamentum exciteretur: mox insurgit thorax, & elidendo ioniam facit maximum, si tunica pulmonum & laryngis à te acris offenditur. Tullius existit, qui motus & sensus solius est thoracis, in sternutatione autem non solum thorax sonum edit, sed etiam ille baforis narium meas quo aer cum strepitu dispellitur: Hinc abesse videntur, qui si sternutatio existit, in cerebro statim semper signi cogique, & mox per ossis cribrosi foramina cum sonitu emitti, & una cerebrum ejusque membranas vehementissime inuam moveri arbitrantur. Tunica autem narium pluriimos nervos, & eos diversos nacta est, ob quos sensu gaudet perexquisito &c. *Schneiderus lib. de offe cribiformi pag. 442. & seq.*

De Sternutatione hæc annectam, Epilepsia hanc finitimam coeferit: atque ut hæc à vapore ab inferis elao interdum fulcari dicitur, idem de sternutatione credere est: Quidam à me quaſit, cur inter venereos amplexus, instante animæ bis vel ter sternutatione percellitur? Auta feminas à rebus & valis spermatibus fasciata, sensum repta sensibiles narium tunicas vellicabat atque ad ejusmodi motum impellebat: Illus tunice in eodem viro *Sanctus* fidem facit interiorum narium trillatio, cum constitit nix quidam sensu, à vapore è ventriculo exorto, in quo prius molestiam & vellicationem percipit, quem per oſophagum obrepere percipit inque naibus t. eminari: cæteri inculpara valitudine fruatur.

APPENDIX.

Hirudo naribus admoa, in cerebrum irrepere non potest.

A Dnotatum est per foramina ossis cribriformis Hirudinem ad cerebrum irrepsisse : *Petrus Paulus Magnus* scriptum reliquit Chirurgum anno 1572. Romæ cuidam hirudinem applicasse, quæ paulo post penetravit usque ad tunicas cerebri & hominem interfecit : Idem tradunt *Saxonia & Zachum* : Adversus hæc responderetur, Hirudo minime videtur ad cerebrum interius irrepsisse, illa ad summa narium saltem hæsit : Qui hæc foramina satis perspecta habet, is constanter negabit per ea hirudinem se penetrare potuisse. Si vero illa foramina vi morbi vitiosa fuerint, sunt patentiora & facile dilatari possunt, quemadmodum illa etiam luc venerea corrumpuntur, ut redundantes humores per ea nonnunquam emittantur. Illa foramina in scelto obvia sunt, conspicua, patula : In cruento recentique cranio multo secus est : nulla ibi poteris invenire foramina, adeo ea obscura sunt ob vasa & membranarum fibras : Si vero cranium coquis, coctum expurgas, expurgatum aridumque oculis contemplaris, illa foramina tum demum erunt magis notabilia, quæ in succido cranio latent omnino : *C. F. Schneiderus lib. 2. de Catarrh. c. 20.*



ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMII

SECTIO XXI.

De Oris affectibus, Labiorum, Gingivarum, Dentium, Palati, Gulæ, Linguae, Salivæ defectu.

OBSERVATIO I.

Gingivarum erosio incurabilis; à vermium abundantia in intestinis.

P UER quidam Dusseldorpiensis erosione Gingivarum à longo tempore gravissime divexabatur, multa remedia frustra adhibita, tandem vitam cum morte commutavit.

Aperto corpore tanta inventa est abundantia vermium, ut aliquibus in locis intestina crollerint, multique in vacuo ventris reperti fuerint. *Fabricius Hildanus cent. 1. observat. 39.*

SCHOLIA.

S Corbaticam indolem respuisse humores, è quibus vermes geniti, suspicari cogit patria pars : Sporadicis autem tam familiaris est Gingivarum erosio ut lippi etiam scorbutum inde possint consicere, parte materiae acione & subillide ad eas partes transita, natura teneras, molles, flaccidas, quæ facile à lassis & serosis ejusmodi humoribus labem patiuntur. Partes manducantes sunt Cerebrum, Ventriculus, Lien aliisque partes : Lienosi præsertim ulceribus gingivarum maxime obnoxii, unde in scorbuto magna eorum partium exulceratio & corruptio contin-

git; Interdum etiam ex lumbricis, aut corruptis humoribus ex quibus illi generantur, gingivarum erosiones solent contingere, ita ut ille dia perseverantes lumbricorum senu lacerantium indicia esse tolerant, nullis est histosia ab *Histia* allata, *Rivinus* cent. 2. observ. 66. meminit virginis quæ per duos annos gingivarum erosionem passa est, & ab eo affectu nonnulli magno labore liberata est, quia à Lienia intemperie calida & sicca, aique adeo atabiliaria constitutione dependebat.

OBSERVATIO II.

Aphthosum os & Gurgulio à syderato intus thorace.

C Uldam cum aphthosum os & Gurgulio fuisset, cum anhelitus insuavitate, excretio puris contigit : Aperto corpore totus internus thorax syderatus apparuit : *Ballonius Paradigmat. 108.*

SCHOLIA.

S C H O L I A.

EX plurimorum sententia Aphixæ sunt defluente & quasi stillante è capite humore: vel halitus calidior & vapor ab inferis misso per oesophagum, tracheam, vasa coarctosæ mentis: *Abundantia de H. Regim* volunt eas ex humoribus feridis & acerbis, in toto redundantibus, tanquam causa antecedente eorum duere: vel vaporibus fervidis, viscidis & acerbis ex quapiam parte elatis per vasa ori vicina: Si corpus lue venerea est infectum, Aphixæ sunt mali-

gne: quare verisimile est eas de massa corporis sanguinea venire, tanquam ejus despumationem: Si redundat sanguis noxius, ac mensura sistatur, is huc vel illic sublevis, ut oris variè foedetur: In proposito exemplo, eadem causa, idemque humor qui aphichosum os & gurgulionem efficit, syderationem pulmonibus induxit: *Sylvi* causam causam à succo Pancreatico acidiorie deducit.

OBSERVATIO III.

Oris ariditas in quodam cupus jecoris summa pars apostemate obfessa erat.

Noribergenensis quidam totus cholericus, de molesto quodam hypochondrii dextri dolore, edendi appetitus amissione, oris ariditate &c. conqueri coepit: Aperto corpore invenimus vomicae sumæ parti hepatis, cujus non parum putrefecerat, connatam, eamque satis magnam atque apertam. *Vide lib. 3. Tit. de Hypochondrii dolore.*

OBSERVATIO IV.

Oris fætor à Thymo glandula corruptis humoribus infarsita.

Thymum novi, ex quorundam lue venerea infestatorum cadaverum sectionibus id doctus, tam certò instar spongiæ ab excrementis corruptis humoribus intumescente, quam ter tria sunt novem: unde quoque sonora non sunt voce, ægre cibum potumque deglutientes, sæpe per foramina nasi in nares ea excrementis; ægre spirantes insuper, compresso à tumore Thymi oesophago, renitente cartilaginosa aspera arteria, (hic illic ignarus Anatomæ crepabit occultam causam morbumque Formæ) Imo suspicor eisdem ob pravam hanc Thymi constitutionem fixentis esse anima, salvis adhuc Pulmonibus: (Id enim si ita se non haberet; aut exulcerati pulmones essent, qui quæso fieri posset, ut spatio sex septimanarum lue venerea infectis mederi possemus?) non rullentes, sed spuatores ac fœtatores; unde quis, si non facile halitu, at spuro contagioso & osculo spissiori interveniente, inquinari per facile potest: Quæ omnia de Thymo hic tradita, quoque lue venerea laborantium medela confirmat, facta per pryalissimum artificialem, quem collo circumdatur empl. de ranis Vigonis simplo vel duplo mercurii constans, promovet & accelerat: Licet vero Thymus in sanis & ætate provecioribus, ex Warthono, exigui sit ponderis vel magnitudinis, imbibit tamen plurimum feri, sæpe corrupti, ob firmum quem habet inter divisiones arteriarum & venarum subclaviarum satis insignium. *S. Pauli Digressione de Febr. malignis. §. 17.*

OBSERVATIO V.

§. 1. Oris fætor à putredine intestinorum & omnium interiorum viscerum.

Virgini fœtens erat anima, purulenta extruens &c. Intestina omnia à pyloro ad rectum intestinum putrida erant, sphacelata: Testes corrupti, Jecur putridum; Pulmones purulenti & nigricantes, *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 2. Clerico halitus fœtens fuit: Ileus mortuus est: Colon erat velut nigrefactum, Epiploon putre, Ad regionem hepatis sanies purulenta; fœtebant adeo omnia ut viscera dimovere impossibile fuerit. Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.

OBSERVATIO VI.

Anatome Hemaptoici, cujus anima admodum fœtens, citra pulmonum ulcus.

Theologus ante 15. priusquam obiret annos, tussi pertinacissima, cum spuro cruento & gravi anhelitus fœtore tabidus inierit: Cadavere dissecto nulla anhelitus fortissimi vestigia comparebant, quippe nulla fuit in pulmonibus, aut cavitas aut ulcere, aut solutione continui facta; nulla puris aut mareris putidæ collectio, sed tantum visceris hujus lobus à tumore scirrhuso obriguerat. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*

Hæmoptysis à lobo Pulmonis sinistro scirrhuso reddito, trajectum per os sanguinis liberam impediente.

In signis Theologus ante 15. priusquam obiret annos, tussis pertinacissima, & subinde sputo cruento & salso, cum gravi anhelitus fœtore coccyten propemodum æmulante laborabat, unde maximo corporis marcote emaciatus, parum aberat quin plane tabidus extingueretur: Quoties hæmoptoe aliquandiu intermitteret, etiam sputi & anhelitus graveolentia cessabat, dein hujus reditus alterum istum affectum mox affore constanter pronuntiabat: In languido hoc statu cum Vir egregius, Regis partibus tunc temporis gravi tyrannide oppressis fuisse deprehenderetur, ac in arctissimum carcerem conjectus loco porus ordinarii meram aquam liberet, præter omnium spem & expectationem revaluit, adeoque supra decennium mediocriter sanus persistit: Postea tamen nescio propter quam occasionem, nisi forsan ob hyemis rigidioris inclementiam, non solum prædicta mala, scil. Tussis cum sputo cruento, salso & graveolenti recrudescere, sed insuper superpondii loco ventriculi debilitas, inappetentia & febris nocturna accedebant: Deinde vera haud multum temporis præcedebat, quin symptomatis hæc paululum remittentibus sudum denuo affulgeret videretur, donec quodam die cæco repente in frigidissimum mutato, sub noctem magna pectoris angustia, cum respiratione difficillima, pulsu celeri & imbecilli, cumque spirituum omnium (quasi jam moribundus fuisset) facientia incesceretur: Attamen ex hoc discrimine, per diacrices scil. 1. hæmoptoe copiosam, & mox diaphoresin satis ubertem, cito evasit: verum ex eo tempore sputum ejus multum de solito fœtore, & nonnihil de salugine remittebat: cumque brevi postea ultimus & gravissimus immineret hæmopteos insultus, solum istum ab anhelitus graveolentia præfagium omnino deerat, subsequens vero sanguinis sputum valde copiosum vires adeo deprimebat, ut exinde sensim declinans, intra mensis spatium exspiraret: cumque paulo ante obitum, propter acutum lateris dolorem vena tunderetur, cruor adeo deficere videbatur, ut fere nullus efflueret sanguis.

Potro in eadavero post obitum dissecto, sanguinis quantitas perquam minima reperiebatur, nec quidem ulla symptomatum aliorum maxime notabilium, vid. Hæmopteos, atque sputi & anhelitus fœtidissimi vestigia comparebant, usippe nulla fuit in pulmonibus, aut cavaris ab ulcere, aut solutione continui facta, nulla usquam puris aut materię putide vel fœtensis collectio, sed tantum visceris hujus lobus, cum potius torum latus sinistrum, à tumore scirrhuso adeo obriguerat, ut sanguis molem istam ita constrictam, & quasi lapideam, non facile aut minime pertransierit, quare non mirum est, si cruor rapidissime per pulmones trajectendus, alicubi è vasis, quæ ob scirrhusitatem minime coharebant, aut circulationem sustinebant, subinde erumperet.

S C H O L I A.

Hic major difficultas oritur, nempe cum Pulmones alioquin quavis, aut notabili solutione continuo prius immones reperiuntur, undenam iste sputi & anhelitus odos terretimus, sputi cruenti semper præcursor & comes (exceptis tantum ultimis hujus morbi insalutibus) procederet: Super his alibi advertimus Philisicorum ulcera pulmonaria, & sputa purulenta raro aut nunquam, materiem vero è Pulmonis vomica ejusdem (sæpius fœtere: quod autem in ægro Pulmones utroque affectu immones anhelitus adeo terrum exspirarent, ratio optime constabit si inquitimus de causis & productionis modo fœtoreis in genere: Hanc autem excelsi observamus, quando sulphur imparum à sale lixiviali aut acido, scil. alterutro dissolvitur, ac ab altero præcipitatur, Sulphur commune, aut antimonii ab oleo tartari, aut ab aqua Stygia dissolvitur: dein si huic solutioni salis fixi deliquium, ac isti acetum infundas, fœtor terretimus emanabit: Pariter in casu proposito opinari subest, sanguinis valde impuri particulas sulphureas, è sale fixo, quo latex ejus abunde fœtore coarcti: de-

inde quando humor acidus fluorem passus, è partibus nervis in massam sanguineam redundat, sulphur solum præcipiat, proindeque è Pulmonibus fœtorem istum exhalari facit, ac insimul dum sanguinem in turgesceniam adigit, paulo post hæmoptoe acciesi cogit: Novi quosdam pectore tæxi firmo præditos, atque nulli omni ac diuturni tabida liberos, anhelitum valde terrum semper expirare, quod equidem à nulla alia causa, præter eam quam modo notavimus, procedere possit: Sanguis impure, & sulphure à salibus dissolutus, si forsan dum intra Pulmones rarefit, ac in compage laxatur, humor acidus valde putres, in aliorum suavolens exigit: Recte spiritus five aer per respirationem recipitur, quatenus sanguis intra præcordia maxime rarefacti effluvia secum erebit foras, vaporem modo tractum modo lumine ingratum dispergit. *W. de Pharmac. rat. lib. 2. sect. 1. cap. 7.*

H. B. Observatio hæc, ad librum sequentem, & Solennem de Hæmoptysi pertinet, fuit usque quo in hunc usque.

OBSERVATIO VIII.

Oris Fætor ab ulcere ventriculi gentus.

Matrona annos 60. nata ex ore spiritum fetentem multis emiserat annis: E narius graveolens quoque mucus coneretus subinde extrahebatur, virens aut omnino varii coloris: *Delat circa ventriculi regionem assiduus, non tamen valde molestus; ut quem lenire potes at facculus in quo herbae, icmina & aroniaria una, cum gossypio confusa erant: Mens & sensus ad extremum constiterunt, longo morbo confecta è vita discessit.*

Ventriculus hujus exterius ab omni parte, superficie tenus, exulceratus extitit, & quæ ipsi contingebant universa, non tamen alia quam qua ventriculo contigua erant parte: Cerebri substantia integra, sed copioso admodum humori velut innata, qui fomes esse potuit muci qui sæpe in naribus conereverat: *Dodonæi cap. 25. observ. medicæ.*

S C H O L I A.

Graueolentia ex ore variis effectus de causis; quandoque in ore, faucibus, aut juxta nares, vel in ipsius viis consistit: subinde in pulmone laet, quandoque vero ex ventriculo odor procedit: Tradiunt recentiores visio ventriculi graueolentiam fieri, majoremque esse corpore sano, minorem vero ab

assumpto cibo: verum hujus matronæ ex ore fætor semper similis fuit, neque unquam live post cibum sive ante cibum remissior: Vlcera tamen ventriculi causam fuisse graueolentiae satis apparuit:

Idem in Schol. ad cap.

matronæ.

OBSERVATIO IX.

§. 1. Oris Fætor à Pulmonibus oriundus.

Cuidam cum aphthosum os & gurgulio fuisset, cum Anhelitus insuavitate, excretio puris contigit: Aperto corpore rotus internus thorax syderatus apparuit: Et nos vidimus Dominam cuiusianusum os est & velut purulentum, fortens: Dubitant Medici an à Pulmonibus à cerebro. *Ballonius Paradigmatæ 108.*

§. 2. Puella ab ipsis incurabilis morbis obnoxia fuit; atque octavo ætatis anno obiit: Huic substantia Pulmonis materia putulegra erat imbuta, præcipue ex sinistra parte; ubi ob spinæ incurvationem compressa, ideoque magis livida quam in dextro latere conspiciebatur, & principium sphaceli ibi fuisse color præ se ferebat: Hinc Anhelitus fortidus, hinc tussis gravissima, qua per dies aliquot ante obitum affecta fuerat: *Fabritius Hildanus ætæ. 6. observ. 74. Vide historiam integram lib. 2. tit. de Phibisi.*

OBSERVATIO X.

Oris fætor à nimia Pylori laxitate.

Oris fortidus anhelitus ab intestinorum excrementis prodire solet, quando ob nimiam laxitatem & dilatationem ventriculi, illiusque præsertim oisicæ, Pylori dictæ, quo se in intestina aperitis nimium patet, vixque exactè amplius constringi ocludique potest, sicuti naturaliter fieri debet, tunc foeda excrementorum exhalatio sursum per intestina expirans, per apertas hæc & laxas vias in ventriculum, indeque ad os usque delata, anhelitum fortore suo inficit: Quam nos præcipuam causam illius oris fortoris, qui stercorosum odorem exprimit, esse diligenti inquisitione deprehendimus; Ob id adeo perseverantem & pertinacem, cum ab organi vitio procedat, quod ægre reparari potest: Cui occasionem crapula diu continuata præbere solet, ex qua tandem ventriculus adeo laxus redditus, vel alia illius imbecillitas sequitur. *Platerus de funt. lesion. lib. 3. cap. 3.*

OBSERVATIO XI.

Oris fætor ab Epiploï putredine, Coli & Hepatis vitio.

Aperto Clerici 22. annos nati cadavere, colon erat velut nigrescens, Epiploon totum putre, Ad regionem Epatis fanies purulenta: fætebant adeo omnia ut viscera dimovere impossibile fuerit: Audio halitum illi fortentem fuisse. *Vide lib. 3. Tit. de ventriq. dolore.*

OBSERVATIO XII.

Oris amaror ob insertionem pori choledochi in fundum ventriculi.

Ventriculi dolore premebatur quidam cum continuo oris amarore, &c: Repertum vas choledochum ad ventriculi fundum implantatum. *Vide lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

OBSERV.

OBSERVATIO XIII.

Interiorum oris partium gangrana & corruptio, ab hydrargyro in cerebro post litum relicto.

Vicentius Boniventus, Patritius Clodiensis, à juventute omnibus carnis voluptatibus addicissimus, indeque quasi consumptus, postquam quinquies ligni s. falsæ parilla, mechaoæ decoctum assumpsisset, terque sed frustra inunctus fuisset, tandem cuidam meretriculæ se curandum tradidit, quæ quidem illum tali medica dignum ita tractavit, ut magna inflammatio in palato, ossæ cribroso, in columella & partibus omnibus illis adjacentibus, à mercurio male extincto, & aliis corrosivis facta, subito in gangrænam, & mox in cancrum verum affectus terminaverit, adeo ut quotidie aliquid ex partibus illis corruptis & putrefactis excrearet, & gurgulione partibusque vicinis primo ejectis, eoque progressum est, ut & demum cerebrum ipsum excreatu per os expueret maximo cum foetore: Tandem miserrime obiit.

Mortui caput ferra aperui, suisque membranulis liberavi, prout potui, erat enim rarus ibi foetor, etiam sub dio, ut nullus astare posset: Nililominus magna patientia, summoque videndi desiderio ductus, superiorem cerebri parrem cultello faris largo amputavi, & confusus omnibus cerebri ventriculis multum argenti vivi cum cochleari in eis collegi, & illud ipsum chare reservavi: arque intolerabili foetore victus & exturbatus, vespilloni cadaver sepeliendum reliqui. *Ex Observationibus D. Georgii Garneri. D. m.*

S C H O L I A.

Cerebrum ipsum excreatu &c.] Quod mirandum est, cum dixerit Hippocrates. 6. aphor. 18. Vesica distilla, aut cerebro, aut corde &c. lethale esse: Verum Galen. eo io comm. asserit se experientia vidisse in Smyrna cerebrum valde vulnsectum, sanatum tamen fuisse: Quod etiam multo melius testatur Ipsomet 1. de sympt. caus. c. 1. Ita ut cerebrum, licet reliqua membra, solutionem continui pati possit.

Idem. Vide apud Fernelium lib. de luc. vener. cap. 7. historiam Coudaci, cui post alipicam ex hydrargyro inunctionem, non modo principis ossa paulatim computruit, sed & urinaque meninx eadem putredine abiumpta, subiectaque cerebri substantia in abscessum convertita est, dum ventriculos cerebri putredo attingit, quo tempore mors repente hominem à medio sustulit.

OBSERVATIO XIV.

Fauces aphthis & albicante mucilagine obductæ, à pulmonibus aridis, mucagine illa obductis.

Puer septennis, febre affectus, fauces habuit aphthis & albicante mucilagine conspurcatus &c. Pulmones erant exusti, aridi & mucilagine illa obducti. *Fide L. 4. Tit. de Febris.*

S C H O L I A.

De generatione illius mucilaginis, Vide lib. 4. Tit. de Febris, ex *W. Bist. lib. de Febris cap. 10.*

OBSERVATIO XV.

Gula dolor ab inflammatis summis Pulmonibus.

Quidam subito expiravit: Vivus post cibum sumptum de dolore circa gulam conquebatur: Pulmones prope gulam inflammati reperti sunt. *Fide L. 2. tit. de morte subita.*

S C H O L I A.

Imo quorundam opinio est eam anginae speciem, quæ Cynanche dicitur, in qua nihil intus vel extra apparet, non ab inflammatione laryngis musculus interioribus pendere, sed à phlegmone summis pul-

mones obidente, quæ ad gulam eadem ratione pertingit quæ dolor extremi penis, ab affectu calculo vesica, vel retentis aut dolor podicia affectis interioribus intestinis.

OBSERVATIO XVI.

Saliva ex ore ubertim manans lafis Buccarum Glandulis earumque ductibus salivalibus.

In homine buccarum glandulas Salivæ dicatas superiori anno observavit. Clar. Sylvius, licet vasa nondum essent detecta: Cum enim haberet ægram Buccarum ulceribus laborantem, interdum limpidam inde aquam Salivæ æmulam manare videret, data in Nosocomio occasione, Buccas examinando Glandulosam illarum carnem nobis demonstravit: Sed & quæ apud Aquapendrem leguntur de humore aqueo per relictum à curaro Buccarum vulnere foramen quotidie stillante idem arguere videntur. *Ex observat. Anatom. Nicol. Stenonis.*

S C H O L I A.

S C H O L I A.

Saliva vulgo excrementum audit, ex ore tanquam inutile rejiciendum; cui materiam suppeditat partem coctio prima quæ fit in ventriculo, partem rerum quæ fit in cerebro; elaborationem tamen aliquam in Tonsillis suscipiens: Diligentissimus Nicol. Sieno Excell. Anatomicus & Clavus. Warthon Ductus varioparis in oris partibus de excretis, canales per quos Saliva vel Mucus propellitur: Hic Maxillares Glandulas in externas & internas dividit: Internarum (quæ immediate intra maxillam inferiorem suæ sunt) partem posteriorem & crassiorem habere ait arterias, venas & nervos, Item vas quoddam diverſi generis sibi proprium, hæstenas Anatomicis incogitavit, radices suas capillares in omnes hujus glandulæ partes æqualiter spargens: Glandulas has partes excretorias flacidi, munere publico fungentes, quia ubicunque vas Excretorium peculiariter reperitur, verisimile est id peculiari cuidam excretioni destinari: Cùmque excretio quolibet determinat excrementi humorum residuorum depurationi inserviat, quod in emolumentum totius credit, sequitur hoc ipsum esse officii publici: Humor autem quem hæc Glandula fecerit & externis ipsi est Saliva, per quam intelligit, non crassum illum viscidumque humorem qui in Tonsillis fixatus aut rursus (ipsum dicimus) exprimitur, sed illum tenuem & aquosum quem Græci *μυκίνη* & *μυκός* vocant: Ejusmodi vero humorem ex hæc Glandula per suam vas in os & ipsi oculi experientia testatur, quod in partibus oculi canali, tam in homine quam in bove humorem salivalem manifeste deprehenditur: Quod usum, Salivam non esse excrementum omnino inutile, nec indignum esse quæ in os ipsum deponatur testatur: quod 1^o, quali lymphæ peculiaris ad masticationem solidiorum & præsertim aridorum ciborum idonea sit, absque eo enim animalia, quæ fæno, avena &c. vescuntur, vix commode ea masticare possint aut deglutire: 2^o, valere ait ad gustum, quod & fecit tinctura lapida sine aliqua humiditate perfusione vix edui queat. 3^o, con-

ducere ad coctionem ventriculi promovendam: 4^o, sitim, alias perpetuo molestantiam, exstinguere, lingue motum lubrificare, ardorem oris squaloremque sua humiditate temperare.

Salivæ Ductus superioris inventionem sibi admittit *Blafus* commentatur, in synagmæ Anatome, *Volagii* p. m. 465. a glandula maxillari posteriori vicina, vasis radicibus initium sumentis, sub cute ab buccæ propeptatis ad dentium molatium anteriorum regionem, ubi manifesto foramine, papillari quadam prominentia munito, in oris cavitatem hinc:

Inter Glandulas quæ pluribus Excretoriis vas donatæ sunt, primo loco veniunt quæ in Buccis reperiuntur, à *M. Sieno* reperiæ, inter cæteras tum glandulæ tum valorum magnitudine maxime conspicuæ: Hæ autem totam Buccatum regionem occupantes, excretoriæ oris cavitatem undique ambiunt, & sursum deorsumque ad gingivas pertingentes, masculos inter & unicam oris fecerunt.

Sublinguales quod attinet, ab eodem *Sieno* observatas utriusque ad lingue latera sitas, ejusdem generis cum proximè præcedentibus facit, nisi quod vasa excretoria ibi minus int, non quidem breviora sed angustiora: orta intra ipsam exiguis rivalis, & hinc nihil invicem parallela, à lingua versus gingivas recedunt, ubi ad digitum fere distantiam a dentibus vix conspicuis, nisi prestantur, ostiis per tunicam hinc.

Ad Palatum quæ sunt, Glandulas Palatinas appellare illi visum est, cum revera tota Palati caro ut in bevis, sic & in homine, nisi nisi conglomerata glandula sit, Tonsillis condonata, unde innumeri exiles ductus prodant, qui ipsam membranam perforantes, quasi crebrum inde formant.

Epiglottidis cartilagineæ permanentes canaliculi, qui à carunculis epiglottidis incumbenſibus oritur, per cartilagineam transmissum humorem averſa ejus parte, quæ laryngi imminet, evadunt: De Salivæ Preparatione *Leja* in Glandula maxillari vide *Syrium Præf. lib. 1. cap. 52.*

OBSERVATIO XVII.

Salivæ defectus ab obstructione ductuum Salivæ alium è Glandulis ortorum.

Pueri scorbutici Lugduni dissecti, vix unquam salivam in hoc morbo ore spuebant: his mesenterium totum scrophulosum, omnesque glandulæ solito majores, duriores; portique chylum depurantes inibi obstructi erant, ut vel crassior chylus eo trajici, & Receptaculis infundi, vel aquosior & salior non cribrari potuerit. Pancreas *Virgungii* durum valde extiterat, ductusque ejusque obstructus, ut quæ à plexu nervorum mesenterico superiore insigni, pancreate contiguo, eo deferretur lymphæ, & in duodenum exerneretur, viam non habuerit liberam, sed regurgitavit, vel ob valvularum in proximis lymphæ ductibus impediendum, foras in abdomen effluere coacta fuerit: repetimus enim lympham copiosam in toto abdomine stagnantem, quæ sine dubio interstitiis muscularum cruris, rotiusque pedis communicata fuerat, & membranas valde feniles sua acrimonia, ob stagnationem contracta læserat: Præterea & glandulæ in inguinibus valde rutgebant: Aqua per thoracis cavitatem spargebatur: Thymus solito durior extiterat: Salivales ductus in ore obstructi & Parotides justo majores ac duriores erant. *Ioh. de Muraltis Exercitatione Anatom. 2. §. 10.*

S C H O L I A.

Glossii, Warthoni & aliorum doctrinam sequens, G. D. D. Muraltis, Nervos siccū certarum partium mutationis destinatum deferre statuit, atque ex eodem vitato multorum morborum originem deducit: A nervis (inquit) Lympham quandam profundè existimo, quia glandulæ conglomeratæ plurimis nervis

præfixæ sunt: & corpora tum humidiora tum sicciora, modo hypochondriaca, salivam copiosius expiant: Illa, quod eorum nervi superflua quoque humiditate madescant: Hæc, per consensum ventriculi nauseantis &c. Lympham vero deferant vasa Lymphatica dicta, quæ late disseminantur, & truncantur

com artibus suo ambitu involvunt: vel enim supra diaphragma, vel infra illud inferuntur: Infra septum enata pleraque sunt hepatica, quæ ab arteriæ coeliacæ hepaticæ ramis liquorem suum crystallinum ad mesenterium & commune receptaculum deducunt &c. Eadem hæc vasa & glandulis inguinum & testicularis pluribus ductibus in unum conjunguntur, vasa sanguinea, præcipue arteriæ hypogastricæ & iliacæ continendū item & venarum cavam vasis gyris annulisque committuntur; ad suistitum laus ramo arteriæ longiori hinc inde anastomosibus inter se junguntur, & per pinguedinem ad glandulas lacteas fectum feruntur: Per omentum quoque lymphatica ad superiores os ventriculi & glandulas circumjacentes spargi observavi: Plures valvulas in dictis vasis, sicut in aliis vidimus, hæc cum liquoze vasa cui gent, penitus nodosa facie externa apparent, impedimentum enim dom ad illi, lymphæ ad glandulas redire nequit, vi quasi lymphæ sursum propellitur, Ex quo indubitate colligitur lympham solbi à circumferentia moveri ad centrum, & non contra, quemadmodum à mikis, anæ & valvularum in iis vasis involutionem judicium fuit: idem motus lymphæ ex ligamentis evincitur: constitutis enim vasis lacteis in mesenterio, evanitas receptacula mox lymphæ purissima turgescunt, in primis si ligatura & evacuatione factis, canis ad hoc calens venter claudatur & aliquandiu relinquatur. Quod ad Pancreaticam lympham, ea per ductum proprium, nullis valvulis præditum, in intestinum duodenum evacuat: lymphæ hæc insipida est, nulliusque aciditatis in statu naturali particeps, quod sæpe gustu judicari colligitur hic liquor in conglomerata pancreatis glandula, à contiguo nervorum plezu mesenterico, qui excrementum suum spississimum platimis ramis in tam vile intestinum labulum amandū: Que vero supra septum transversum sunt aquosa vasa, ex artuum imprimis & colli conglobatis glandulis oriuntur in jugularem externam, seu axillaris concursum, ad latera tracheæ majoribus ramis descendendo, ingrediuntur 3 opposita videlicet ductibus thoracicis inferiorem 3 atque circa Thyroam gyros & anfractus splendidos & magnos efformant, qui liquorem ad ipsum cordis ventriculum dextram cum sanguine petducunt, & sine trunco per rivulos ad commune corpus octatum pleno gurgite exantant: hic notandum Ductum Thoracicum, infra sextam thoracis vertebrae plerumque semicircularem efformare, & vasa lymphatica undiqueque recipere: id quod videtur imprimis si venæ jugulares in cane vivente continguntur, ut arteriæ suum sanguinem non libere venis infundere possint, & feribujus nobilioris secre-

tio major fiat. Sane præterea supra diaphragma nolum vasa lymphatica numero plura, vel exteriora, vel interiora: illa exterius oculi angulo occurrunt, & à glandula conglomerata in eodem cancho flia oriuntur: hæc glandulam, vulgo lacrymalen dictam pro fonte agnoscunt & lacrymas ducunt: Considerandi sunt inter vasa lymphatica superiora, Ductus Salivales dicti, tam superiores quam inferiores, intra oris cavitatem interram conspicui, qui magnam Salivæ copiam continuo in os vel ventriculum deponunt, Salivarium inferiorum primus inventus Clar. Paribon & nervoso genere Salivam in glandulas profundius existimat, in magnis salivationibus aut, quales Meisum opera cernunt, nervi multum eductantur & à superfusa humiditate liberantur, quod vix continget si nervi ad pyralium nihil plane conferentes præterea haud facile dictū est io quem aliam usum tanta nervosū copia in hæc glandulas defertur: certe morbi nihil plane conducat, nec multum sentit, quoniam ab objectis sensibilibus longe abint: quare aliquid vel apponant vel auferunt; afferre autem non auferre ex eo constat quod hæc glandula sint conglomerata & excretoria; denique major est quantitas materie Salivales per hæc glandulas excreta quam facile credas ab exiguis illis arteriis & venis, quæ ad partes hæc distibuantur, afferri possent non negamus tamen quia forte arteriæ quoque aliquid ad hanc humocis illius accumulationem conferant: *Hæc sunt Paribon*: Liquor hic nervosus si per glandulam salivalem malam dispositionem per oculos regugiet, epilepsia, motus convulsivi, & scrophule oriri possunt: Ex hæc vera est causa cur quædam morbi hi gravissimi per salivationem carentur, sicut & lues venerea, cujus venenum malle sanguine commixtum, quovis nullis partibus parcat, suum præcipue vim glandulis infert, quia lymphæ facile cojuguntur: A compressione glandularum inguinalium liquorem inter nervos ad caput regugitant, & symptoma spastica cautiorem esse refert *Waldius* de morbis convulsivis hoc exemplo: Paella annorum 12, herniam contraxerat, hinc falsam male adaptatam, cum fibula duiuscula glandulas inguinales valde compriment, non sine magno cruciatu per binas septimanas gestabat: io 12 hoc spasmum, (cum prius integrè valebat,) de vertigine & gravi capitis corpore queri cepit, ac paulo post affectiones convulsivas & quasi hystericas cito ingruentes passa erat, simulque scrophule ingentes pone oculos ac inervice ejusdem lateris oriebantur, quibus auctor hæc io tota vita haud quaquam obnoxia fuerat.

OBSERVATIO XVIII.

Labiorum intumescencia à Glandularum copia sub cute delitescens.

Sæpius à Dom. D. Sylvio febricitans & Ictericus, cujus Labia, quod tumidiora viderentur, aperta magnam glandularum numerum statim sub cute ostendebant. *Olav. Berichius ad Tb. Baribolsium in hujus Epist. centur. 3. Ep. 97.*

S C H O L I A.

Febriens & Ictericus] Interdum tumores & vesiculae Labia occupant præsertim in febribus, eo de causa febrii seminario à venis & arteriis; quod febres ad exitum properantia, nec filio, scilicet esse Avicennas: Nonnunquam tamen tales tumores in morbis lethales observantur: Ita Pheniciæ & Andreæ Latrui, apud Hippoc. 5. Epid. sect. 4. mala alvea inermis, & Labium, quod ex anteriore parte malæ &

oculo respondet, neque quicquam initio spectanti comparetbat, neque finis ullam puris significationem edebat, sed arida putredine intumescens marcescebat, & morui sunt: Præterea color Labiorum labem in viceribus sæpe designat, præsertim Pulmonum: Obiit ante annos xv. famula quædam mea ex hydropo Pulmonis, cujus inter cætera signa præcursor fuit insignis Labiorum lividitas. Porro Labia sæpe ob hypochondriacum

aliorum affectus pari observavit *Palladius* Comment. in lib. IV. Epidem. quia ascendencia fufum eorum excreta- menta, tanquam in vis intercipiunt.

Labia tumida) De Labiorum tumore fingulatim agit *Arn. Boetius* Tract. de affectibus Omifis. sub titulo Labrofiliis seu Cheilomices, cap. 10. affectus in Anglia & Hibernia familiari, interdum Epidemio; in- fandibus perfectionis molefto: Sub quo admodum la- bia tumefcunt, tumore duro & nonnihil rubicundo, fed nequaquam fervido aut inflammatorio, qui cum- quam fuppuratur: ortum verifimiliter ducente à glan- dulis que naturaliter in funt labiis, minuxia in itata naturali, tumidis in morbofo, ab humorum confufu.

F. Boetius) *J. Lycino* Grammatico (apud Hippoc. 4. Epid.) febre biliofa ex fplene correpto, cum gravi- tate capitis, in utrifque labiis ulcufcula, intecus ro- tunda & parva eruperunt: Affectionem capitis fignifi- care, ait *Vallifius* in *com.* ulcufcula mali moris, in utrifque labiis interius orta: Nam quia caput exci- ptebatur à Liene multam & malam fuccum, multitu- do faciebat graventem dolorem, malignitas ulcera mali moris: nam talia effe indicabat forma eorum; quæ cum magna non effent, erant tamen rotunda & profunda, quæ duo in ulceribus magnopere vitupe- rantur.

OBSERVATIO XVIII.

Lingua in pelliculas craffas & glutinofas vi peffilentis febris refoluta, ob fiderationem vifcerum quorundam.

NOvi mulierem cui in pelliculas craffas & glutinofas, non folum lingua fed & cefo- phagus univerfus cum ventriculo, tandem & inreflinorum tunice putruerunt: Hæc inter initia fitiens magnopere, vinum austerum & rubrum fumpferat in uno die, prope ad quantitatem librarum fex, unde fic illi gurgur incanduit, ut nec liquidiores cibos trans- mittere, nedum medicamenta potuerit, Obiit illa miferissimo fato, damnans humana præfidia, multumque impatiens quod ne potui quidem accipiendo in acerbiffima fiti, viam aut instrumentis commodam reperirent: Urina huic alba femp, &c. Illi, & plerif- que, diffecto corpore univerfa vifcera, aut maior illorum portio, nunc nigra ut carbo quif- piam vifa eft, nunc fuppuratis pufculis plena: fit enim facillime ut per confenfus tunicarum pituita conerefcens jugiter adhærefcat. *Gemma lib. 2. cap. 4. Cofmocris.*

S C H O L I A.

IN ardentibus febribus quandoque Lingua adeo aëta & excocta redditur quam carbo eft, que vel no- va excrementitia pellicula obducitur. Sic memini me vidiffe Chirurgum M. Martium Sixtum à Monichen, Confili Malmogienfi, fpatio fex vel feptem horarum, aliquot dies hemericoze laboranti, exortiale omano- linguam, alia fubinde pellicula totidem horis inter- miffis obductam, quam cum à forma calcei, calcem calcem, fen futor, ille de lingua detactam repone- re pollet, ubivis locorum quo vellet, qui tamen alexipharmacis propioris ex morbo graviffimo clu- dentus eft: Sed horum & fimilium, feu morborum feu fymptomatum, lingue quali torrefactæ rationem ex *Adriani Symplici* de corp. hum. fabr. I. 6. cap. 2. pete- mus, quod loci demonftrat eue in acerbis febribus lin- gua nigrefcat, imo diffeultat ægri deglutiant. Euf verum eft (que caufa vulgo affertur) ex univerfo corpore vapores ad caput plurimum tranfmitti, non mirum tamem hujus ingrediti calumpnia errata viciniori libet adfcribere, que ac- cufata in inflammatione, afophago, & fi confequenter op- pletam linguam grava mala impertit: Quod li vero philofophica regula hic loci locum habet, unius pofitionem non effe exclusionem alterius, nec Thymus hic omni- culpa vacat, quem tum temporis ingenti ficca intem-

perie laborare talione optima me defendere poffo arbitror, maxime ob vala que ad hanc glandulam dif- tribuit *W. barthelem.* Adenographia cap. 16. docet: Ut ergo ad labia pellitui nature robore, in Syncho non putrida, fermentum febris, ita tale quid moliri eam, fed fpe fultatram in Syncho putrida verifimile eft, & ubi extundere è naribus fanguinem non poreft, per Thymum valaque falivalia, aut ductus falivales Wa- toni, falivatione interveniente, affirmandum videtur: quod li vero nec ea ex fcientia perficitur, fymptoma- ta ingravefcunt, & fpatum vel omano nullum, aut ægetime excreatur, lingas oppido adurunt: Tale ergo obcorruptum fanguinem tunc temporis lingua, quale quid ob artificiale caufticum curis brachii, pa- tiunt, i. e. Lingua experta falfa fenfus, imo quoque gultus eft, *Summ Pauli* Tract. de febribus malignis p. m. 27.

Urina alba femp) An quia bilis, vel fal lixivus, utrum tingens, totum in inflammata parte, poffit mo- dam fphacelo correpta, cohibentur? Non fecus, ac in febre Leipyria interiora ætu torrentur, algentibus extremis, à bile facienti caufa, omnino intus eorcia & diffundi prohibita ad fuperficiem.

OBSERVATIO XIX.

Lingua nigredo à pulmonibus retorridis, cum hydropo thoracis dextri.

VXORI N. dyfpnoea accidit cum febre levi, fed fiti perpetua, & Lingua nigra qui- dem non tamen arida. Thoracis dextri fpatium aque magnæ vi erat diftentum, Pulmones retorridi & multo purulento tabo prægnantes. *Vide l. 2. tit. de Dyfpnoea.*

Lingua nigra) Unica est, & ea quidem proxima Linguae colorum causa, nempe humorum color, aut vaporis: cujus varietas non uno modo colorum linguae varietatem parit; nam aut humor cum suo colore permixtus sanguinis, ob errorem assimilatricis singularum partium non redditur illi concolor, ut in leuce: pituita alba maculis albis inficit eum, quia sanguis pituitosus haud assimilari potuit, ut etiam in ictero flavo & nigro evenire solet, & hoc modo linguam verticalem fieri usu ipso novit: quoniam & hoc modo vasis colore tingi non est negandum: nam sicut cutis externa, dum auctur sanguine aut bilioso aut pituitoso, aut melancholico magis quam par est, nec plane muticulae parti assimilari potest à coctrice illius, - cut & in lingua quandoque id non accidit? praeterea cum id videatur innuere Aristoteles Probl. 34. cum quaerit, cur lingua tot coloribus evasiet quot cutis? num questio potissimum intelligi debet, ut lingua colore tingatur eodem modo quo cutis, si par ratio debet esse utrique partem. Alio modo adducitur lin-

gae color, cum per infusum humor à parte in partem impellitur, ut in linguae tamore phlegmonoso cum sanguine, qui partem praeter naturam tumeficit, apponitur etiam tior, & hoc modo linguam coloratam non raro videre licet: Frequenter, & tertio modo, colore imbuitur lingua, cum humor extrinsecus adveniens, vel à ventriculo, vel capite piceus illi, tanquam parieti calx allinitur, aut in vaporem resolutus eam tingit, ut fumus caelum. Denique aut à venis & arteriis linguae ipsius exsudet humor tenuis, qui suo colore linguam maculat, ut saepe sanguis à venis effluens cutim rubefacit: Nec quis facile alios colorationis curis & linguae modos asserere possit, nisi addat eos, qui vel cibo & potione, vel medicamentis efficiuntur. *Probus Casellus de ling. l. 4. c. 6.*

Nigra quidem non tamen arida) Nigra à Pulmonum incendiis non tamen arida, ob aquae copiam in cavo thoracis à vasis contentam, à cujus praesentia humectabatur: Denique ab aëre humore Lingua nigrificari potest citra ariditatem.

OBSERVATIO XX.

Lingua nigra ob corruptam in utero secundinam.

Mulier secundinae subsisterunt: febris nata, Lingua nigra: Inventa caro oblonga adnata utero, & membranarum pars quae computruerat. *Vide lib. 4. tit. de Febris.*

SCHOLIA.

Frequentissime in acutis febribus lingua nigrificam induit, id eo Galenus comm. in 6. Epid. ait, in viti phlegmone febres valde vehementer concitari & cadidas, ob quas lingua velut à fuligine nigrificat: Et Hippoc. lib. de Affection. Si vero externa partes circa praecaput non valde feride fuerint, verum interna, & lingua affera & nigra fit. Fit autem Lingua nigra non solum quia fuliginosum corpus eam tingat, vel aer humor candens à venis, sed etiam quia venae, quae sub ipsa sunt, crassae & nigrae evaserint, ut 2. de morbis Hippot. *Comentatur sepius lingua nigra quaecumque scribitur adusta: adhaere enim in me duo condisse solet, fluxum & nigredinem.* Epid. comm. 2. Galen. vel siccitatem quidem temper, nigredinem frequentissime: Fuliginosa etiam

idem notare solet ac nigra, nam omnino quod fuliginosum est nigrum intelligitur, licet non contra, quicquid nigrum est fuliginosum sit, nam lingua etiam ab aëre humore nigra fieri solet.

Lingua nigra) Aliquando lingua nigra fit & fuliginibus tingitur in aëre, hinc, cum tamen fauces & circumiacentes partes tantum rubescant, quia hae propinquiores sunt accenso vapori & ventriculo per gnam, & e pectore per tracheam expirante, Lingua autem remotior est, quae progressus fuligines & extrinsecus excipit: adde huius subtilitatem ratam esse & sanguis admixtis humoris vaporibus magis aptam: Sic in fornacibus pars remotior à fuligine nigrificat, proxima foco rubra est.

OBSERVATIO XXI.

Linguae & faucium nigredo, à nigro humore in arteria venosa & aorta conclusa.

In anatome Sereniff. Principis, arteria venosa & aorta nigro humore erant repleta, qualem in Lingua & faucibus per aliquod tempus magna cum difficultate habuerat. *Vide lib. 3. tit. de vomitu.*

SCHOLIA.

DE Linguae ampla est materies, praesertim quod pertinet ad iudicium de febribus faciendum: Fere cum Lingua alienam quid in se habet, tum aut febrem suspicamus, aut affectum aliquem partium internarum, Galenus enim 4. lib. 2. de locis, ait maxime linguam & totius corporis colorem alterari cum hepar laborat. Sed an necessario febrem adesse significat, ut aliquid p. n. in lingua coniungat, quasi vero caloris contra naturam proprium sit aut vaporem aut exhalationem excitare & segni latentem in corpore humore: Nunquid eorum qui pomeridiano somno indulgent, & os & lingua aliquod aut insulsum

aut amara habet, cum tamen nulla adsit febris? Nunquid & Hippoc. par. 17. lib. 6. Epid. sect. 5. ait *Salsa gustanti carnis superflua materia signum, id est, si saliculis gustus sit in ore, materiei superfluae & excretionem sui indicantis est argumentum*: Non meminit febris, Sic cum humor redundat in corpore potest sui speciem repraesentare in lingua absente febre, ut in *Serenissimo Principe*: Et tamen quia talem humoris excessum proxime aliquando sequitur febris, tribuitur alteratio linguae non tam humori quam febri, & id quidem male: Sic lingua tingitur, aut quia febris adest, aut huius illiusve humoris abundantia, ut in hypochondriacis, & nigrificat

& nigricat lingua, & aciditatis sensus in ore adest, aut quia in ventriculo continetur humor. Et Hippocr. par. 14. sect. 5. lib. 6. *Epid. Lingua laetum indicat*, id est, quia humor in corpore redundat id quod loquium, id est serum, cuiusque humoris recessit, tanquam facilius paranympus, & eo loco vasles species colorum in lingua describit: Sed omnino duo summa genera colligimus. Aut lingua affecta est per modum vaporis, aut per modum fuliginis & exhalationis: una species est humoralis, altera non tam est materialis quam immaterialis, per se ipsum tantum & effervescentiam, ita ut vel nulla sit materia, vel si sit, ea paucis est, aut jam exulta, ut vapor nullus existeret. Et revera aliud est altera linguam materialiter per modum vaporis, aliud est immaterialiter per modum fuliginis & exhalationis: Prius purgationem vacationemque postulat, posterius omnimodo alterationem: Qui locus fatis, rebus minime intellectis in summa ignorantia variabitur, Quae omnia Hippocrates quodammodo expli-

cavit, sed obliquit, Dum enim ait, *Lingua viridescens*, materiam significat, Cum ait, *Arida*, à fuliginosa exultione, posterius linguarum alterationum genus graphice describit: Maxime vero marcoris aliqua in lingua & dentibus apparet, cum à calore exancto excitatur vapor, Quod & Hippocr. aphor. 55. 4. scribit, dum ait *Quibus in febribus circa dentes humor quidam sunt, in fortes febres sunt*. Declaratur enim & caloris multitudo & pituitosioris humoris copia, à qua crassus vapor excitatur, qui resiccans febrilis calore circa dentes *in albuginem* facit: Tamen enim humor in praecordia redundat, via magna copia excitatur vapor, qui *in lingua* linguam inficit, nisi calor contra naturam adit qui materiam agnet: Unde plenitudo sanis, mane saepe à somno excitatus, aliquid *in lingua* apparet, sed id facile aliqua lectione eluitur, quia causa efficiens non manet. *Guilhelmus Rudolphi Epidem. & Epibemer. lib. 2. pag. 116.*

OBSERVATIO XXII.

Linguae siccitas & rubor à parte sinistra Pulmonum tabida, Purulenta materia in sinistra thoracis parte.

Vxor D. N. nata parte Pulmonico, tandem quæta est de Linguae rubore & siccitate; iuncta Sini insigni, &c. Pars sinistra Pulmonis magna sui parte tabuerat: Purulenta materia continebatur illa thoracis parte. *Vide lib. 2. tit. de Plethifi.*

SCHOLIA.

Linguae rubore & siccitate) *Præfatus Casellanus* libro de Lingua 3. cap. 11. Linguae ruborem & exsiccationem, juncam vocis obsecrati, notare ait anginam, sive inflammationem musculorum faucium internorum, cuius inflammationis rubor, aut pars ejus, (non est enim unquam sine rubore vera phlegmone)

linguae communicatur. Exsiccationem vero penderet à febre anginae conjuncta: Ejusmodi autem colorem, cum siccitate linguae, pulmones phlegmone, erysipelate præterit, tentatos (ut tunc lingua simul exerta est) indicare certum est.

OBSERVATIO XXIII.

Linguae siccitas in quodam cui Pulmones circa dorsum corrupti reperti sunt.

Vir Rever. Febre assidua affectus est, cui tussis accessit, difficilis respiratio, sinistri lateris dolor. Sequitur ariditas & siccitas linguae sine Sini, dolor Dorsi, &c. Hic spatio duorum dierum suffocatus obiit. Reperta est corruptio pulmonis in parte sinistra versus dorsum, vergente. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

SCHOLIA.

Siccitas linguae sine Sini) Si obicit delirium, cuius causa non percipitur molestus sensus Sitis, prædici potest motus infans, ob interitum facultatis appetentis, pendente à calore & siccitate febrili, unde destructio temperamenti in quo vis ponis appetentis sua est

Concurrere autem possunt simul delirium atque huius facultatis destructio, quod fortis incompensata calida & siccitas, & delirium patere, & ferendi vim interlunare valcat.

OBSERVATIO XXIV.

Linguae scabra & nigra in quodam cui Carbo pestilens in ventriculo repertus est.

Iuvenem febris continua prehendit, cum ariditate & scabritie linguae, quæ & nigra: In ventriculi fundo vestigium simile ab impresso cauterio actuali cum eschara reperimus. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

SCHOLIA.

Linguae constitutionis & colorum in febribus has causas tradit Excell. *Præfatus* libro de Febribus cap. 20. Linguae ac Fauces ardor ac scabrities, saepe etiam amarae cuiusdam albe, aut flave, aut nigrae accretio accidit, propter calorem & fuliginem & ventriculo & Pulmonibus æstu flagrantibus exhalatam: Lingua

vero *alutis*, quotiescunque humiditas illa (qua plurima naturaliter imbuta est) exsiccatur & decoquitur, adeoque exterior linguae cutis à torrido calore velut citatur. Hinc quoque *scabra* evadit, quod etiam in sanis cernitur, si quando linguam jussulo, aliove forbili preservando amburi contingit: Pariter cum

Hh 2 Lingua

lingue animalium ad mensuram usum elixantur, eorum cutis alba & aspera evadit: Sive enim saliva & glandulis maxillaribus, sive alius quispian humor à consillis aut aliunde proliciat, quia tamen ob calorem & siccitatem nimiam inaccessibilem & viscidus evadit, etiam tunc quoque lingue tunica exterior albicat nihilominus, sed & mucoso quodam lenore obducitur, nimirum quia humor iste per crassie linguam oblinere quidem potest, non tamen diluere & humectare: Si vero accidat linguam humore bilioso vel intortum suffundi, vel extrinsecus tingi, (ut in vomitibus picrocholici uluvenis, tum villi ejus, utpote spongiosi, statim rursus imbi-

bentes, colorem quoque similem calibent: Quod si denique calor adeo intensus fiat ut sanguinem adurat, ignemque solito ardentorem excitet, sequitur ut è cordis foco, per pulmonem spiracula, vix tanto incendio ventilando sufficientia fulgines suscitantur, quæ ad palati fornacem allisse, linguam quasi reverberio sciunt & nigrescere incipiunt. Istiusmodi autem nigredo (ut & reliqua lingue inquinamenta) in medianis ejus partibus magis conspicua est, quia scilicet exteriores ambicus, frequentiori ad gingivas & palatum attitu degerant.

OBSERVATIO XXV.

Lingue scabrities & nigredo in febre inducitur à vitio & intemperie calida & sicca ventriculi ac jecoris.

Quidam febre laborabat quasi amphimerina: Lingua erat omni fuliginis nigrior, aspera, arida. In mortuo apparuit Ventriculi imum quasi excoriatum, & jecoris superficies convexa nigerrima. Vide lib. 4. tit. de Febribus.

S C H O L I A.

Febre laborabat) Febrem putridam & acutam affectionem esse primario Cordis, hinc annexorum vasorum, apud omnes constat. Ab eo cordis extraneo calore, intemperie calida & sicca, primo arterie & venæ majores incallescunt & exsiccantur, dein mediocres & minime, denique illæ quæ ipsi Linguae intextæ sunt, quibus caliditas & exsiccitas, necesse est illam exsiccam & aridam fieri. Idcirco Hippocrates lib. de vict. rat. in acut. ait, *Morbi sui tam arteriarum tam venarum dignoscuntur Lingua siccitate, & ea, quæ totum corpus occupat, evidenter.* Et lib. de Præf. Medic. *Quæ in venis & arteriis contingunt ariditas, hæc tam lingua, tam externæ colore conspiciuntur.* Hoc est, Lingue & totius ariditates sunt effectus eorum siccitatum quæ prius venas & arterias attingunt, addæ & cor: nam affectiones partium à principibus deductarum, pendunt ab iis membris quæ principii rationem habent: præsertim si pars à membro principe non multum distita sit, ut lingua super laryngem, asperam arteriam, pulmonem & cor posita est. Sic quæ vixit in suis venit à radice humor.

Ventriculi & Jecoris) Propagata & diffusa hinc exalto ad oris partes & Linguam. Atque ut squalloris

illarum partium Lingua index est, sic & multæ humiditatis, quæ hæc abundat, causa exitus redundans ventriculi humor, ut docet Galenus 6. Aphor. 82. *Lingua admodum humida existente, & ventriculæm talem par est esse, ut alteram itaquam commotionem habeat ad linguam.* Et comm. 5. 6. Epid. *Sed cum in ventriculo ejusmodi aliquid continetur, aut multo calore fundente, atque in spiritus humores vertente, in salubrem habitum convertitur.* Ex quibus palam fit colorum Linguam insipientium, causam esse copiam humoris in ventriculo redundantis, sive is per se ascendat, sive huius specie à subigente calore excitatus, eo deferatur: Obstat videretur Arteriam, ex cujus sententia difficile est complexionem stomachi ex colore lingue cognoscere. Aliud enim est dicere causam colorum lingue contineri sæpe numero in ventriculo, ob humores quos aliunde suscipit: Aliud temperiem ventriculi nasci ex coloribus lingue: nam morbositas bilis flava, seu amara, ab hepate in ventriculum regurgitat in iis qui picrocholici sunt parte ejus superius: qui humor cum colore suo obi communicatur lingue, hepatis non ventriculi arguit vitium.

OBSERVATIO XXVI.

Lingua Sordida, Aspera Rubra, à Pulmonum inflammatione.

Anno 1601. in Ducatu Urbini vagabantur angina, pleuritides, peripneumonix, &c. Lingua erat excrementosa, humida, modo aspera & rubra: Aderant pulmonum abscessus, ex quibus materia foetens prodibat. Vide lib. 4. tit. de Febribus.

S C H O L I A.

Lingua excrementosa ab Hippocr. dicitur lingua qualis in peripneumonia laborantibus cerni solet: Relinquit enim tanquam verum fieri non posse quin in pulmone inflammatione fuliginis abundet copia, à qua lingua densetur, exasperetur & siccetur: Imo in ejusmodi affectionibus crassa quædam obducta lingua videtur, ob ingens conceptum in pulmone incendium, unde suis quæ nulla tere aere extinguere exple-

rique potest: Itaque ex particulari morbo signum lingue ariditatis desumit, ut *ἀρδὺν καὶ λευκὰν* dicunt ab eo Epid. 7. 1. *ἄρδὺν, λευκὰν, ἄρδὺν, ὅ ἐστιν*: quod verum quidem est in ea peripneumonia quæ in cytopelare consistit: nam reperio apud eundem Hippocr. Epidem. lib. 7. linguam peripneumonicam dici eam quæ cum pallore albicat: Nam materiam picrocholice, peripneumoniam committente, na-

turam insequitur: Lib. autem 1. de morbis, ait ex pleuritide facile in aidentem febrem transiunt fieri, non autem in peripneumoniam, quia, credo hæc à pleurita positus est. *Ballamus Definitum. Medicin. pagin. 16.*

Rubra) Rubescit lingua p. n. ab inflammatione, de qua Hippocr. 4. Epidem. narrans historiam mulieris quæ angioa laborabat, cui vox obsecuta erat & lingua rubens; De eadem lingua Idem 2. Epid. loquens de quadam specie anginae. *Lingua pesteris pars inflammatur*, l. e. linguae pars quæ ad columellam respicit, sed quod inflammatur necessario rubescit, cum inter signa pathognomonica phlegmonis sit rubor, ex Galeo. Rubor linguae non uniuersum est, alter enim incensius est, ad nigredinem quandam vergens, de quo audiendus Hippocr. 2. de morbis, cum ait, *Rubra tenet, & fit rubrum, & lingua aspera & nigra, & cum vixit pallida & sicca, & rubescit ter rubenda*, id est, eo rubore lingua qui in nigro rubescit. Et 7. Epidem. *Nali fito, cum ex morbo pectus steratiss, lingua de 6. febrilis*: qui alter ruboria modus, ad dilatum declinans, ideo sububrum dicit.

Lingua erat excrementosa humida; modo aspera & rubra, vagabatur peripneumonia.) Albor cum pallore linguae, ex sententia Hippocr. 7. Epid. denotat inflammationem Pulmonis, si lingua pathognomonica adiit; nam pallor & albedo nonnisi sunt

monstrum, quæ ab eo morbo separari possunt, in Coacis enim prælagia, ubi hujus morbi descriptio fit, alboris & palloris linguae nulla mentio quia sine his possit esse. Nec enim valet consequentia, Lingua excrementosa sciat, vel alba est & pallida, ergo adest peripneumonia, nam & talis in tertiana notha, ex commistione bilis & pituitæ deprehenditur: Quod si lingua Peripneumoniz pathognomonica, cum tali lingua aduenit, talis morbus esse certo pronuntiatur. Obijciat, 3. de morbis Hippocrates signa inflammationis pulmonum recensens, flauitatem & nigredinem pontis, non pallorem & alborem? Respondeo 1. per flauitatem intelligendum esse palliditatem flava enim & pallida bilis, utriusque coloris parces, interdum pro eodem sumuntur, pallor enim flauedinis æmulus est. Dico 2. distinguenda esse tempora morbi, initio enim albedo & pallor insunt, ut augmento & statim pallor & nigrities, seu flavedo & oigrities: Hinc Hippocr. 2. de morbis, *Primum lingua flava est, verum progressu temporis nigrescit*, hoc est, Principium morbi deprehenditur ex albedine linguae, augmentum ex ejusdem pallore, ut statim ex flauitate & nigredine. Nec res caret ratione, quæcunque enim res ab uberiori caloris actione nigra fit, subtilis scilicet,

fuliginibus ex itaque magis magisque adassuratur.

OBSERVATIO XXVII.

Lingua extra perpetuo exerta, ob Pulmonum incendium postulis per membranam obfitorum.

Iuveni, (de quo tit. de Phrenitide Observ. 9.) cui ex retrocessu erysipelatis accessit spirandi difficultas, & Sitis, Lingua perpetuo ex ore efferebatur; Pleuræ pars dextra postulis miliaribus obfesa deprehensa est, nec non Pulmonum membrana.

SCHOLIA.

Hippocr. 2. de morbis & 3. loquens de Pulmone p. calore tamente, ait Tullum tenere, & erexit cervicis spirationem & acervam respirare ægriam, & Linguae frequenter exere, quod indicium est magno cor tenet incendio; ob inflammationem aliquem pulmonum affectum, Ut enim canes & equi

à cunctiori & diuturno cursu æstuant, linguam exerunt, non ut lauiorem viam pandant aëri, quæque major ingreditur copia; tum ut facilius fuliginibus pareat exitus, sic & hominibus æstuoso quodam morbo correptis.

OBSERVATIO XXVIII.

A gingivarum crassitie eruptio Dentium impedita, unde mors.

Vocatus fui ab Illust. Duce Nivernensi quo dissecare cadaver filii octimestris, cui nullus adhuc dum dens eruperat: Explorata diligenter mortis causa, nulla alia à me deprehensa præter gingivarum extraordinariam duritiem & crassitiem, cum tumore earundem, quæ parte superna incisæ, dentes omnes eruptioni proximos ostenderunt, si auxilium per gingivarum levem apertionem allarum fuisset. Hæc mea fuit & medicorum assidentium sententia, mortis non aliam fuisse causam quam naturæ debilitatem, quæ perforandis gingivis impar fuisset, dentibusque extrudendis, qui pro ætate duriores erant, imò etiam provehior.

SCHOLIA.

Detritioris tempore nihil ori infantis actu frigidum indendum, ne eruptio tarda sit & difficilis, ac potius dulcia, & lenientia, diluanda gingivæ gratia & lenienti dolo. is, quam obrem matris crebro digitis, oleo amygdaloo insudatis, vel buyro recentis, mellis aut saccharo misto cõfricabis, vel etiam mucilaginis seminum psyllii, albeæ, cydoniorum, extractæ cum aqua

violarum, illinet, Exterius admovebitur cataplasma ex farina hordei, lacte, oleo rosaceo, vitellis ovorum paratum: necnon cerebro leporino tosto, vel elixo, ob relaxandi vim qua pollet, singularemque & abidiem dentes eliciendi vim, quam probat experientia: Valet & in id porcelli lactentis cerebrum: Vulgo exhibetur pueris liquiritiæ bacillum meli immeritum, vel dens

Hh 3 hpi

lupi crepandis inferens, quæ gingivis affricant, cum defecatione: erupunt enim dentes prout in gingivis illis molestus eo pacto mulcetur, gingivis sic rarioribus redditus & attenuatus: Ejusmodi vero præsidia, ob gingivæ duritiem sæpe inutilia sunt, idcircoque dentes moram trahunt, ejusque distensionem graves sequuntur dolores, febres aliæque accidentia & tandem mors.

Quomobrem insutor sum Chirurgo ut levem gingivæ incisionem teneret, supra ipsum ducit, cuiusque sic illi pacet faciliorem. Id in propriis meis liberis à me præstitum est, præsentibus Dominis le Fèvre, Medico Regis ordinario, Alton, Cœmæ, Facultatis Medicæ Parisiensis Doctoribus. *Joan. Guillelmus Chirurgo Regio, &c. Parisi Operum lib. xxv. cap. xiv.*

OBSERVATIO XXIX.

Dentium dolor & Caries ab humore à capite per meatum peculiarem in cavitate maxillæ superioris insculptam flillante.

Silencio præterire non possumus quod generosæ cuidam feminae sub nostra cura laboranti accidit. Cum subserina, eaq; continua salsi humoris destillatione per multos retro annos laborasset, omnēque pene dentes corrosos ac cariosos avulserrat, nec tamen à dolore liberata, tandem dente canino sinistri lateris effosso, simul squamosa illa distinctio inter cavitatem hanc & dentis foveam eripitur, adeo ut humorum per alveolum dicti dentis ab antro illo perennis successerit destillatio. Qua multum perterrita, stylo argenteo in alveolum immisso originem fontis hujus exploratura, usq; ad oculum per tunicas pene duas sursum adegit: magis adhuc metuens, pennam minorem plumis deceptis totam pene ad longitudinem palmæ unius immisit. Jam maxime confternata, ad cerebrum usque decurrere exultans me consuluit: Ubi autem singulas examinavi circumstantias, pennæ reductionem, illamque per cavitatem hanc designavimus: Atque sic ubi insurgura convenienti cavitatem hanc designavimus, illam vñ ac necessitate hujus satis instructam, perennisque illius fontis patientissimam habuimus, à timore & Medicina simul defixit.

Cavernula in maxilla superiore magna est, seu Antrum utrinque unum, sub oculi sede inferiori: ubi os ad oculi tutelam quodammodo protuberat, ad latera inferiora nasi situm: insigniter cavum, sphericum, aliquantulum vero oblongum, & ita amplum ut articulus pollicis majoris pedis ultimus in illa delitescat: osse artrenuato, seu squama ossis, ob: egitur: os enim quod illud includit, & quod à dentium alveolis extemis distinguit, crassitie chartam emporiticam non multum excedit: in basi hujus protuberantes quædam eminentiæ cernuntur, quibus Dentium apices tenuiores includuntur. Dentium alveoli margini hujus ossis inferiori insculpuntur, quibus dentes insiguntur: Antrum hoc frequentius vacuum, aliquando mucro repletum repetitur, in quod humores à capite per meatum quandam à cavitatem illa in osse frontis, & ab osse Ethmoide destillare poterunt. Levitatis ossium causa, quæ hic oculorum situs gratia crassa esse debueret, factum esse arbitramur. *Highmorus Disquis. Anatom. p. m. 227.*

OBSERVATIO XXX.

Dentium dolor à sero flavo circa corpus falciforme contento.

Barthol. Feer. (*de quo Tit. de Soporosis aff.*) qui Lethargicus obiit, Dum ceu sanus adhuc vivebat, Odontalgiae obnoxius erat, cujus causa funum Tabacci hauriebat. Remoto corpore falciformi, cerebrum ad ventriculum sinistram incidimus, unde protinus serum flavum satis copiose effluxit.

S C H O L I A.

Centrum) Dentium dolor iidem ab eo sanguine movetur quem advehant carotides externæ: At hæcenus traditum fuit eum de carotidis nasci, quamquam inventi sunt qui docuerunt eum ab inferioris corporis sanguine orti posse: *Semverus* qui V. de Tartaria ibi studiose sequitur, eam rem hîc verbis exponit, *Et consensu materia in superiorem maxillam per angulam oculi majorem, in inferiorem per venas temporales, & prociptum hujus fluxionis plerumque est à capite: nonnullam tamen ex inferiori corpore materiam affert ex hepate, luteæ & aere: Primum quo pacto materia caratibi in superiorem maxillam per angulam oculi majorem à capite fluere queat, non video. Jam vero D. D. N. Highmorus venas, quibus sanguis ad dentes sedibus, ita ex: pletur: Ubi exterior hic carotidum arteriarum ramus ad aurem pervenerit, circa radicem ejus bifurcatus dividitur, quorum alter furculus auri capitisque posteriora petiit, atque irrigat: reliquum furculum jugularis*

externæ, quibus uniuntur, transferat, & ab his in jugularem externam: A posteriore hac carotidis exterioris ramo, arteriæ binæ sub aore, maxillam inferiorem ingrediuntur, & secundum ejus longitudinem in omnium dentium inferiorum radices disseminantur, quibus sanguis ad dentium nutritionem distenditur: Quod restat sanguinis, venis quibus per anastomoses comminuntur, emendatur. Hæc in vasis humores acies una cum sanguine ad dentes perveniunt, quibus illos membrana, ex quibus sentiens, interiorum eorum medullam tingens, et odium & vellicat. Unde dolores illi Dentium exquisitissimi ortum perunt. Et ab hac arteriarum dentes perenniū origine, adstringentia, vel sub aore, meliore cum successu in Dentium dolore applicari, quam ad tempora, facile soderi poterit. Ex hîc etiam in Dentium dolore pulsatio quædam in illis percipitur, uti Galecus in seipso est expertus.

• OBSERV.

OBSERVATIO XXXI.

Dentium doloris pulsatorii causa pendet ab affluxu humorum per arterias, in vasis obstructions pariente, manifestis in dente Bubulo.

Vasa omnis generis ad Dentes feruntur, Arteriz, Venarum, Nervi: Arteriarum & Venarum ingressus in cadavere humano tam conspicuus quidem non est ac in bovino: qui dubio procul in vivente ob sanguinis impulsu manifestissimus: Dolor Pulsatorius sæpe in odontalgia, largioresque in extractionibus Dentium hæmorrhagiz sese offerentes, canalium sanguinem ducentium insertionem satis certam probabunt: *Galenus* Dentium dolore vexatus pulsatorium cruciatum in seipso diligentissime observavit, alias plurimis quoque notum: *Roussetus* lib. de hom. princip. & hyster. affect. refert feminæ cuidam mentes per loculum dentis excussis sæpius evacuatos fuisse: *Hæmorrhagiaz* à Dente extractio lethalem *Haller* comm. in aph. 18. 2. & *Platerus* in Fabro ferrario memorant: Talem desperationis rejectionem, candenti ferro non cedentem, *Zacutus* emplastro Galenico extracti dentis oculo injecto sanavit: Usus autem Arteriarum hic est nutrimentum & spirituum viralem adducere, Venæ superfluum spiritibusque exhaustum sanguinem ad fontem, ut in cæteris partibus reducant: Per arterias sæpe materia excrementitia, serosa & acris, simul cum sanguine ad Dentes demittitur, ibi obstructions in vasis parit, accumulatur, dolorisque excludit sævissimos: *Morbini fundament. Medic. cap. x. §. xij.*

OBSERVATIO XXXII.

A resecto Dente prominulo Convulsiones & mors, ob Nervum illi insertum simul abscessum, in semine conspicuum.

Monialis quædam Paravii Dentem, quem habebat præ aliis longissimum, quum ad deformitatem vitandam secari curasset, statim convulsa & epileptica concidit: In parte autem Dentis abscessa nervi vestigium apparebat. *Gasspar Bartholinus Instit. Anat. lib.*

S C H O L I A.

Nervi à quâto conjugatione in superiori maxilla: à tertia in inferiori ad dentes derivantur, qui dubio procul, in eorum cavitatibus expansi constitutos membranam à *Columbo*, *Fallopio*, & *Eustachio* descriptam: Sensum autem circa partem dentis quæ nervum recipit & membrana obducta est, acutissimum vigere concedit *Morbini Fundam. med. cap. x. §. 12.* Nervos autem accipere, non levis gratia, vult; quo cætere decet ad masticationem, sed ad firmiorem connexionem & à casu præservationem.

OBSERVATIO XXXIII.

Dentium doloribus à vermiculis in eorum cavernulis genitis.

IN Dentium cavernulis non raro vermes nascuntur sævienti doloris causæ: *Morbini Fundam. med. c. 10. §. 12.* Idem asserunt *Avicenna*, *Dodonæus ad Benivenii* cap. 100. *Al. Benedictus* l. 6. c. 13. *Rondeletius* hist. aquar. cap. de cancro fluxu. *Th. à Vega* comm. ad l. 1. cap. 5. de loc. aff.

OBSERVATIO XXXIV.

Dentes decidui ab eorum alveolis gypsea materia incrassatis.

DE deflexionibus, quibus obnoxii sunt Dentes illud dico, observasse me non semel præsepia tantam copiam gypsea: materiæ coacervasse, ut concavitate repleta Dentes omnes prorsus à vinculis soluti sensum foras expellerentur, ac tandem sponte cederent. *Enslachius de Dentibus cap. ult.*

S C H O L I A.

Gypsea materia.) De hac materia sic sentit *Helmontius*: Deotis natura inter petram & os orta est; quicquid sibi adnatum fuerit, illud Dens petrificat ex odore & semine petriformi, quem odorem polidemi adhærens per astracham haurit, & hoc est quod *Paracelsus* sequaces deceptit Tartari nomine, qualis ex cibo fuerit, cum tamen febricitanti, à quatuordecim jejuniis, hac macilago non desit, unde non ex cibo, sed ex male digesta materia ultimi alimenti sui provenit, quæ deinde putrescit: Nec omnino abso-
lutè *Helmontii* opinio, cum non io juventute, quo tempore maximi io diæta errores, sed senescentibus & ad frugem devenientibus accrescat rophacea illa materia, etiam accutur os elucentibus; unde constat male petagi eorum nutritionem & plurima redundare excrementa, non secus ac sordes copiosiores in senibus hæcicis &c. copiosæ cuti adhærent, hebetior factio calore nativo.

§. 1. *Gustus privatio, ob vitiosum nervorum sutum.*

Maxima admiratione me affectu inspectio Lazari vittrivoracis vulgò dicti : Hic nullo prorsus gustu dum viveret, præditus erat, nullam in edendo voluptatem, nihil in-jucundum perentiebat, insipida, amara, dulcia, pinguis, salis, acris non distingnebat; vitrum, saxa, lapides, ligna, viva, animalia, carbones, pisces è vivario extractos adhuc salientes vorabat, item lutum, lineos laneosque pannos, strum, stipulam, & ut brevi omnia complectar, quicquid homines, quicquid animantia vorant, quicquid edendum, seu deglutendum potius offerebatur, propolita mercede, dictum ac factum, ingurgitabat.

Cum igitur hoc naturæ monstrum mihi disciscandum esset Paravii, corpi hujusce rei diligenter, quoad ejus fieri potuit, causam venari, quam me tandem Deo duce ex particulari illius structura assequutini esse confido : Nam quarta nervorum congestio, quæ Gustus gratia in aliis hominibus à natura producta est, in hoc Lazaro neque ad palatum, neque ad linguam, sed ad occipitium reflectebatur. *Columbus lib. xv. Anatom.*

§. 2. Similem naturæ *mutabilitatem* in fartore naturali morte extincto notavimus. *Rollinccius Dissertat. Anat. l. 4. c. 35.*

S C H O L I A.

Quarta nervorum congestio.) Visus Clar. Th. Bartholinus & Willis sexia est, quam ferri ajunt io palatum.

A P P E N D I X.

Gustus privatio à lesione nervi illi sensui destinato.

Cur in Laryngibus vulnèrati sæpe sermonem, sæpe quoque saporem amittunt : Equidem non sine admiratione spectavi *Wilelmum Aurasiorum Principem*, accepto in collo vulnere sensum Gustus amisisse : Est enim nervus duplex à tertia conjugatione manans qui in laryngens inseritur ; altero quidem ramo lingua sermoni apta redditur, altero sapores percipiuntur ; hoc quidem respectu Gustus, illo sermonis usus amittitur : Quod cum *Aristoteles*, (l. de histor. anim. & l. de anim. & l. de sensu,) non prospiceret, pro decreto posuit nullum animal sine Gustu vivere posse : At Princeps Aurasius amisso Gustu tam diu vixit quoad occideretur : ac tamen cibos condimentis acris, acidis, salis, parari juberet, nihil tamen gustu percipiebat, ut quidem ab illo accepimus : Minus quidem mirum est Gustum amisisse, sed amitti sermonem ab eo qui audiat Lingua integra, incredibile antea mihi videbatur nisi experientia compertum haberemus. *Bollinus Theatri Nature lib. iv. p. 460.*

S C H O L I A.

D *Malpighius* in Lingua plures exiguas Eminen-tias detexit, quas præcipuum esse organum Gustus credit : Haud tamen omitendum quod *Prælesium* observavit, quod sicut Lingua versus cuspidem complures habet Eminencias, quibus obviam quasi it, ut ita loqui liceat, Saporibus, ita radicem versus complures contra cavitates habet in quas eos recipit : Hæ cavitates omnes in Nervos delinunt, &

quorundam quasi Infundibulorum alimenta eo portantium vicem subire videntur : Hinc est quod *Malpighius* dicat, quod etiam valde probabile sit, subtiliorem alimenti partem immediate ex Lingua transire in Nervos, & hinc quoque esse cur vivam, saltem ore exceptum, vires quoque reficiat.

*Ex actis Regis Societatis Anglicæ
Anni 1667. p. 152.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO XXII.

De vitiis Vocis & Sermonis.

OBSERVATIO I.

Aphonia & Rancido ab inflammata Aspera arteria.

ANNO 1624. in cadavere feminae Aspera arteria tota erat inflammata parte inferiore cum notabili nigredine : Quod nunquam à *Spigelio* antea observatum. Longo intervallo quum *Ranca* vixisset tandem obmutuit. *Ioh. Rhodius cent. 1. observat. 100.*

SCHOLIA.

Vocis præternaturalis variz recensentur differentiz : Commoditas vero distributio est quæ secundum actionum lesarum species procedit. Aufertur ea, vel immittitur, vel depravatur : Vocis ablatio *aphonia* vocatur : Imminuitur, deficientes ac defectæ voces. Hippocr. in Prothet. *ἡ ἀφασία*. *ἡ ἀσπὴ* dicuntur : Depravata sunt *Ranca*, *obscura*, *Tremula*, *Aspera*, *Clangea* : Lesionis causa, ut & Sermonis, in organis eas efformantibus querendæ sunt : sunt autem Larynx, cum annexis musculis Recurrentibus, Aspera arteria : Ob Aeris efflationem, Thorax, musculis suis instructus, & Pulmo : Concitant præterea, Lingua, Columella, Palatum, Dentes. Primò, Tollitur vox, & immittitur, aut nervorum principio læso, vel vocalibus instrumentis, vel si deficit vocis materia : *Abolitur* si cerebrum afficitur, ut in illius commotione vel concussione, apoplexia, epilepsia, necnon in lyncope, hystericaque suffocatione, ac similibus affectibus, à denegato spirituum animalium influxu : quo pertinet aphonia ab ebrietate inducta ; de qua Hippocr. 5. aph. 5. vapore narcotico spiritus animales sopiente : *Imminuitur* autem vox vel aboletur affectis organis vocalibus. Primò, si laryngis membrana nimio madore perfunditur, ut ab lapsu caracitæ. Secundò, Si laryngis rimula angustior evadit, oculgula vel compressa à tumore, ut in angina, & si cervicis vertebz luxuriam patiuntur : Tertio, Si musculi motui laryngis destinati ipsismo, paralysis, vulnere, contusione afficiantur : Quarto, A præcis nervis vocalibus, divulsis, interceptis, aut quomodoocunque læsis. Quintò, Ab incisa aspera arteria, phlegmonis tumore, obstructa, compressa. Tandem a negata materia, Vox perit aut immittitur, vel à tracheæ arteriæ vulnere, aut ab eadem compressa, hinc spiritui commeatu non concessio, aut ob thoracis musculos resolutos, vulneratos, confoscos ; vel idem succingenti costas membranz si accidas, prohibita ideo thoracis constrictione ; quod de insigni tantum læsione intelligendum est : Pulmonis quoque vitio multiplici idem accidere potest. Depravata vero vox variz sunt species, quas inter maxime familiaris est *Ranca* (hinc affectus *ῥαγία* dictus) à membrana laryngem asperam arteriam involvente, madure ni-

mio perfusa sæpe numero excitatur, ob catarrhum è cerebro defluentem & pneumatica organa rigantem. Talis & fit à crebra vehementiquævis, *ῥαγία* arteriæ indaceme, phibitica & emphysematica malum familiare : Ulceri quoque obnoxia dicta organa, hinc lue venerea insectis rancido molesta est : *ῥαγία* quoque parit sermo productior intensiorque vociferatio, à quibus tracheæ *ῥαγία* *ῥαγία* inducit : Secundò, *Vox obscura*, ten *ῥαγία* & *ῥαγία*, juxta Avicennam, illa est quæ refert sonum ex laminæ unius plumbi cum altera attritione nascitur humore admodum crasso, qualis est pituitus vitæ, spiritus instrumenta occupante ; Ex Rhais sententia, 6. contin. Uvulae abscissionem sequitur : Tertio, *Vox tremula* imbecillitati virtutis tribuitur, ac spirituum defectui instrumenta non sufficienter adadantur, ut in febribus quibundam observare est : Talis quoque evadit humore catarrhoeo imbutis laryngis musculis & linguz nervique his destituta : Timore perculli non lingua solum, sed & pedibus manibusque tremant, ad cor revocatis calore & spiritibus. Quarto, *Aspera vox*, *perfracta*, *perfracta*, meminit Hippocr. 4. de victu Ac. quam *ῥαγία* vocat, imbecillitatis simul facultatis moricis, & organorum spiritui efflationi assignentorum loboles : Allimitur tonox ex musculis organis expulso, si qui folles movet debilis sit, ac inæquali motu impellat, ab ea impulsio nis variare sonus interruptus prodicitur : Idem contingit à musculis materiz vocis efflandæ interservientibus, qui debiles, nec æquali tono agitant, soni anomaliam vocis interruptum parant. Quintò, *Vox tarda* facultati suppressæ, quæ libere thoracem movere non potest, ortum debet, ab effluo in spinalem medullam & nervos musculorum thoracis humore. Sextò, *Vox clangea*, ex Galeno 7. de usu Part. c. 7. Talis est à ticcitate nimia laryngis & asperæ arteriæ, ac defectu humiditatis ex natura lege arteriam rigantis, illique levorem inducentis ; febre ardente laborantibus & phreneticis familiaris.

Aspera arteria inflammata.) Ejus caput, scilicet Laryngem phlegmone tenari posse negat P. Barbott.

Vide Scholia ad Observat. 1.

sect. sequenti.

OBSERV.

OBSERVATIO II.

Vocis læsio ob tumorem exortu tracheæ innatum.

IN puella hæctica circa exortum asperæ arteriæ, ex pulmonis substantia moles fleatomatum carne permixta, ovi magnitudinem excedens inventa est, tam asperæ arteriæ quam oesophago adhærens, hinc vocis læsio, &c. *Vide tit. de Phthisi.*

OBSERVATIO III.

Vocis & sermonis amissio à lapidibus asperam arteriam & nervum recurrentem prementibus.

PUler decennis ex alto cecidit, &c. quum nec vulnus nec contusio extra appateret, morbus neglectus est, Demum asthmaticus factus est cum vocis & loquelæ anfrisione, &c. Lapidēs quāplurimū ex gypsea materia concreti, proxime cor, erant, adhærebant autem etiam asperæ arteriæ & sinistro recurrenti nervo, &c. *Vide lib. 4. tit. de Pulneribus.*

OBSERVATIO IV.

Vox obscura ob Pulmones scirrhusos, Tracheam arteriam aridam, Bronchia obstructa, &c.

ILLI Matrona Lepra infecta, si sermonem protraheret, vox illico fusca fiebat & obscura: Pulmones omnino erant aridi & exsucci: Bronchia mucoso humore obstructa: Trachea arteria arida & aspera. *Vide lib. 4. tit. de Habitu corporis vitiosi.*

OBSERVATIO V.

Vox clangosa ob fragmenta bronchiorum à substantia Pulmonum avulsâ.

HEntico N. in dextro latere thoracis inventa sunt fragmenta bronchiorum à substantia pulmonum avulsâ, qualia dum viveret in magna quantitate excreverat: Vox illi fuerat clangosa, qualis Gallorum Africanorum aut Calecutensium. *Iac. Bentiv. observat. 2.*

S C H O L I A.

VOcis consideratio magni est ad diagnosis momenti: Nam juxta Hippocr. lib. de Arte ex vitiosa voce docimur ad cognitionem eorum quæ intus latent: Ex voce & urinis, ait, nos doceri per *ἀναίρειας ἰσχυρίας*, interpretationes peregrinas: Thoracicarum partium & pulmonum præsertim vitia designat, utque ad Tabem propensionem; Hinc *Galenus* comm. ad part. 17. sect. 1. lib. 1. Epid. ait, Quæ distillationes hominibus primo tussim concitant, deinde Rauscedinem, neque consistunt, aletam Tabis differentiam afferunt: Et lib. 3. Epid. ad part. 32. sect. 3. plurimi facit ipsium vocis vicium, Cum multas ob causas, ait, tabes consequatur, tum maxime ob distillationem sit, eam præcipue quam vitium vocis consequi solet. Nam ex eodem lib. 1. Epid. sect. 1. part. 17. Tabes non semper advenit ob distillationes à capite, sed aut ob vitium ipsius Pulmonis, aut affecto eo ob affluxum ab aliis partibus quæ à capite: Sic est ubi Rauscedo floccipendi, est ubi magni fieri debet: Est & extra thoracem corruptæ vocis quandoque causa querenda; nec semper caput aut pulmones accusari debent, sed hypochondriorum ratio habenda & he-

paris: Sic Elephantici visiosam vocem habent, & quidam hypochondiaci: Saepè occulta est causa vitii vocalis. *Baldwinus* cons. 2. l. 3.

Vox illi fuerat clangosa. Sic elegantissime describitur à *Clariss. Menisio*, Morbota *ῥοχαλασθὶς* duplex est, una obscura & rauca: altera sonora & clangosa, velut si intra fidele siccum, aut cavum ædificium vox emireretur: quales etiam sunt voces græcam, anserum & aquilarum clare strepentes: In qua, sive fluidula, duo spectari debent, primum quod sit clara-sona, deinde quod aspera, Claritas sequitur immodicam ariditatem, quæ membranarum tendendo, ipsam clarescere facit atque resonare; Asperitas autem nascitur vel à merito calore exsiccante, ut per febres ardentis; inanitis enim membri spatiosis humiditate imbutis, quasdam ejus particulas paululum emicere, quasdam vero deprimi necesse est; vel ab acri materia arteriæ tunicam leniter arrodente, scilicet, aut ab eversa effusa anihymiali, aut à mordaci humore, ut in phelisi ac empyemate; item in cataractis fecinis ac ichalibus capitis vulneribus, pus inferne deponibus, ut observavi *Hippocr. libro septimo. Epid.*

OBSERVATIO VI.

Vox intercepta ob nummum venenatum in gula subsistentem, Pulmones inflammatos, Os ulceribus oblitum, &c.

CAtharina Clodiensis cum M. Ant. Boscolum ulcisci pro injuria illata non posset, simulara amicitia ipsius puerulo in strenam nummum, singulari quodam veneno delibu-

TUR

amice dedit; puerulus ejus pulchritudine allectus subito arripuit orique admovit: paulo post pustulis ex doloribus in ore excitatis ipsum forte fortuna deglutivit: mox faucibus & gula subinde inflammatis, vox faucibus ipsis hæsit; nec clamare potuit, & quamplurimis sed frustra admotis, sequenti die obiit: Ego vocatus, & visis in ore pustulis maxime cum inflammatione, indicavi nummum illum fuisse veneno infectum & maxime corrosivo: Rogavit vero uterque parens ut præterea dissectione inquirerem num puerulus extinctus fuerit simplici nummo per suffocationem, an vero per ipsum venenum nummo communicatum.

Sectionem itaque à mento auspicatus, ad os pubis usque recta deduxi, ac mandibula inferiori per medium divisa, amputata vero & separata lingua, & ejus musculis, carne nigrior omnibus exposita, ita ut mirarentur quod tam brevi temporis spatio, nondum xxiv. horis revolutis, in tantam devenerit gangranam: Ulterius progrediens, secundum gulam sectionem ad claviculam & secundam thoracis vertebrae usque deduxi, & quasi in gulæ medio, non longè ab œsophago, nummum ibidem fixum repertum, gula fere tota fuissem deorsumque cotrosa; una cum ventriculo valde contracto, ut ulterius descendere non potuerit: Extracto autem nummo, thoracem similiter aperui, Cor ut viderem, an jam esset veneno infectum necne: quo discooperto, nihil notari dignum in toto thorace reperi quam pulmones valde inflammatos: Cordis vero parenchyma cum suis vasibus contracta & strictiora reddita, & sanguis in ipsis contentus infectus valde, que ater erat. *Ex observationibus Georgii Garneri Medici Austriaci.*

OBSERVATIO VII.

Aphonia à Siccitate superficiei cerebri, & Nervorum originis, soluto gracilioris.

Clivis Leodiensis (*Vide tit. de Catalepsi.*) à Melancholia in Furorem abiit: hinc aphonus factus, post linguæ usum recepit, sed ad mortem usque vocem formare non potuit, instar infantis semelstris lallans, cerebrum illi siccissimum repertum in superficie, nervorum origines sicæ solitoque graciliores.

OBSERVATIO VIII.

Aphonia ab inflammatione meningum, quam sequutus sphacelus cerebri.

Quidam sapiens ebrius cum multam in noctem vino Hispano se saburrasset, sævissima cephalalgia cum omnium sensuum dejectione corripitur, nec verbulum, etsi alicuius à me premeretur, proferre valebat, &c. Eo mortuo inveni meningas valde lividas omninoque sideratas, cum inflammatione cerebri. (*Tit. de dolore capitis.*)

OBSERVATIO IX.

Aphonia ab abscessu tunicato in cerebro post vulnus capitis nato.

Miles acinace fauciatus in posteriore capitis parte, die 22. loquelam amisit, &c. die 23. obiit: Abscessum deprehendi magnum, qui in sinistro cerebri latere latitavit, ex quo pus fetidum magna quantitate effluxit. (*Vide tit. de Paraly.*)

OBSERVATIO X.

Aphonia à dextra cerebri parte purulenta, &c.

Juvenis faucibus oculo dextro à primo statim die aponeus factus: Cerebrum dextrum totum fuit purulentum, sinistrum plenum serosa piruita. *Ballonius lib. de convulsion.*

OBSERVATIO XI.

Aphonia ab abscessu in Pericardio.

Joh. N. interit à magno abscessu in Pericardio: Aphonos per duodecim horas, aut co plus manebat. *Ballonius Paradigm. §. 55.*

OBSERVATIO XII.

Aphonia ab humore concreto in cordis ventriculis.

IN hominis cadavere inventus uterque cordis sinus humore oblitus concreto, &c. Hic primum epilepticus & elinguis paulo post occubuit, &c. *Vide l. I. tit. de Epilepsia.*

OBSERVATIO XIII.

Aphonia à vicio pulmonum corruptorum.

Mulier ad occursum sororis insperatum vertigine corripitur, hinc aphonos jacet, sex horis post moritur, &c. Pulmones inveniuntur corrupti, sanie repleti, In cerebro nihil commemorabile, &c. *Vide l. I. tit. de Catarrho.*

OBSERVATIO XIV.

Vox deficiens ob Pulmonis vomitum & alia vicia.

§. 1. **J**oh. Taffino (*Tit. de Phthisi.*) sæpe vox deficiebat, ac si aut pulmo confossus, aut perforatus, aut adhaerens esset, Dolorem lateris pungentem & lancinantem querebatur; Aperto cadavere, deprehensus pulmo adhaerens in parte dextra & sinistra costarum: Circa gibbum diaphragmatis pars pulmonis tota in pus liquefacta erat.

§. 2. Joh. N. linguae minime continens repente concidit, obmutuit, &c. Dolorem lateris querebatur & ad regionem epatis, &c. Sæpe vox deficiebat: Deprehensus est pulmo adhaerens dextra & sinistra parte costis: eircum gibbum diaphragmatis pars pulmonis tota in pus & saniem liquefacta erat, &c. *Vide tit. de lateris dolore.*

OBSERVATIO XV.

Vox Rauca & turbida ob spasmus vicio cerebri ortum.

Miles spasmò correptus est flexo in posteriorem partem corpore, Turbide loquebatur, tanquam ex loco subterraneo vocem emittens: Vitalia & Naturalia membra integra reperta sunt: Cerebri ventriculi repleti erant materia viscida & glutinosa: hæc incumbens principio nervorum omnia symptomata excitavit. *Vide l. I. tit. de Convulsione.*

OBSERVATIO XVI.

Raucedo producta ob Thymum glandulam corruptis humoribus infarctum.

Thymum novi, ex quorundam lue venerea infestatorum cadaverum sectionibus, instar spongiæ ab excrementitiis corruptis humoribus intumescere: unde sonora non sunt voce. *Vide lib. I. sect. 21. Observ. 4.*

OBSERVATIO XVII.

§. 1. Vox Impedita, Rauca, ob variam Pulmonum lesionem.

Famulus quidam xxvj. annor. Hydropè motiebat, quo morbo cæperat laborare quatuor annis ante obitum suum, Sæpe fuerat homo morosus, stupidus & melancholicus, nunquam jucundus, nunquam ridens, uno verbo *moribundus*, præcipue à decem annis ante mortem suam: Voces reddebat quasi cum violentia, parum loquebatur, idque addito suspicio.

Cum fuisset dissectus, sinister locus Pulmonum videbatur penitus consumptus, nullo tamen in residua parte apparente ulcere vel præternaturali phænomeno, præter consumptionem: Capita vasorum, & rami asperæ arteriæ æque grandia ac in alto lobo: Lobus ille Epatis, qui pertinet ad diaphragma, erat niger exterius ad palmarum circiter latitudinem, intra parenchyma: Aliæ partes erant sanæ. *Observatio Nathanaelis Fairfax in Actis Philosoph. Societatis Anglica anni 1667. pag. 238.*

§. 2. Filius N. dyspnoea interit, cum Raucedinem haberet caninam. Pulmo erat parte dextra viciosus. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 3. Ill. Casauboni Pulmones corruperat & denigraverat ferina & petennis fluxio à capite, quam prodebat ordinaria rusticula, & in ultimo morbo consueta Raucedo ingeminata. *Vide l. 3. tit. de melle diffusi.*

§. 4. Janus N. Phthisicus obiit (*tit. de Phthisi.*) A primo morbi insultu vox intercepta fuit, ut præter affirmantis particulam effari nihil posset: Aperto thorace, pulmones spongiosi, plumaleviore reperti, parum sanguinis continentes.

OBSERVATIO XVIII.

Anatome Ranci in cujus ventriculo abscessus repertus est.

DOm. N. vox rauca cum dolore circa ventriculi regionem: observavi in ejus ventriculo materiam nigram lutulentam, quæ causa & morbi & symptomatum. *lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

S C H O L I A.

CAusa assignanda videntur læsio ramus Paris vagi illuc deducti, & aliorum nervorum qui huic comites se adiungunt: Quo sympathiæ ratio patet quædam de ramificatione & distributione hujus Paris adducenda ex Clar. Viri Necrologia: Octava, *tit. cap. 15.* Nervorum Paris conjugatio, ab antiquis pro secula habita, Par vagum appellatur, eo scilicet quod nervus ejus non uno contentus membro, aut corporis regione, partes diversas ac longe distantes respicere, atque ramificationes suas, non modo in vicinia circa caput & cervicem, sed per totam mediæ ac imi ventris cavitatem, ac ad pleraque in utriusque viscera exportigere potuit: Reverta hic Nervus provinciam satis amplam habet, attamen non adeo amplam ut putaretur, nam plures alii nervi, quoniam huic se adiungentes inosculati sunt, ejus pars esse perhibentur: &c. Plexus Gangliiformis, super Paris vagi truncum constitutus, nervum unum aliunde immittit recipi, aliundeque à se foras emittit: A plexu prædicto ramus insignis emittit versus Laryngem defertur &c. Exinde Paris vagi truncus, absque ulla insigni ramificatione descendit, ubi plexu altero constituto, furculi plures ac fibrae numerosæ vertitur in & appendium ejus constituitur &c. E regione cordis, Paris vagi truncus plures furculos insignes utrinque emittit, qui in Pulmones delati, una cum valis sanguiferis per totas illorum compages distribuuntur, ac in transitu Symphyram ductus, tum arterias quoque & venas *æ* modo assequuntur: Deinde ejusdem Paris vagi truncus, juxta tracheæ latera utrinque descendens, multas propagines etiam in Oesophagi tunicas distribuit: Infra tamen Pneumonicos uterque truncus Paris vagi, in duos ramos, maiorem & exteriorem dividitur: Rami utrinque interni, pariter externi, ad ventriculi varias partes diducuntur &c. Reliquæ Paris vagi fibrae si-

mul colligari in eodem truncum coalescere videntur, qui ita in furculo à Neruo intercostali sicco, Plexum gangliiformem constituit: Et quidem verisimile est hunc fibrarum, quæ in Paris vagi truncum simul complicantur, unam Nervum recurrentem, aliam Pre-cardiæ, tertiam Pulmonibus, ac demum aliam ventriculi destituti; quæ omnes licet inter se communicent, usque tamen ab ipsa origine distincti, spirituum animalium diversos ductus constituent: Quod autem à nervo intercostali furculus in superiorem Paris vagi plexum deferatur, ratio est, ut inter hos nervos archa quædam similitudo & necessitudo intercedat, eorumque alteruter circa alterius munia afficiatur: Cum enim Paris vagi nervus præcipue ad præcordia & stomachum, atque intercostalis ad reliqua imi ventris viscera propagines distribuatur, observare est quod inter hæc omnia, non modo committitur quædam, sed sympathia & actionum passivorumque consensus habeatur, quare necesse est ut nervi utriusque partibus designati inter se communicent.

Dissectum colicam Rancidum sequi notat Gafat Bartholinus *Institu. Anatom. lib. 3. capite 2.* Novum par nervorum, ait, aliis sexum & vagum, inter carotidem & jugularem descendens dividitur utrinque in ramum exteriorem & interiorem; Interior dexter 1^o, ad radices collarum cuilibet nervo intercostali ramulum de se largitur; deinde cum arteria magna septum pertransit, & infimo ventri toti prospicit: Abit vero in tres ramos, 1. ad omentum contendit, à quo alii tres ramuli, 1. ad Colon, hinc post colicam diuturnam Rancido &c. Hæc Bartholinus, Exemplum ante plures annos vidi in Dom. J. *Ann. de la Chène*, quem colicus dolor diutissime & frequentissime male habuit, Rancido autem & vocis summi obsecutus paulo post accessit ad mortem usque comes.

APPENDIX I.

Aphonia, neque ad apoplexiam neque ad epilepsiam pertinens, affectus inter utramque medius.

VOx & sermo aboletur ob cerebrum, nervorum principium, affectum in apoplexia, epilepsia, cerebri concussionione & commotione, ac similibus affectibus, ob quos spiritus animalis influxus prohibetur: In primis vero in affectu illo qui *non est Epilepsia Aphonia* appellatur, & neque ad apoplexiam, neque ad epilepsiam commode referri potest, sed inter eos quidam affectus medius videtur: Quem etiam in praxi sæpe observaverim, describunt tandem invenire hæcenus apud Authores non potui, nisi nuper apud *Adr. Spiegelium* lib. 2. de febre semitertiana, cap. 16. *Est morbus*, inquit, *in Germania & Pannonia frequens, quem Austriaci, Moravi & Syri Timorem appellant, inter Apoplexiam & Epilepsiam quodammodo ambigens: cadunt enim velut apoplectici sine sensu, non autem motu privantur, neque tamen convelluntur, ut epileptici: aliquando stertunt, nec tamen discusso morbo paralysim alienam membra incurant.* Si tamen causa magna sit veementia in apoplexiam vel epilepsiam degenerare potest, tandemque aliquos hoc modo affectos subito ut apoplecticos mortuos vidi. Talis aphonia etiam proculdubio est quæ fit ex ebrietate, de qua Hippocr. 5. aphor. 5. oritur autem fere à consensu partium infernarum, & vapore narcotico spiritus animales in cerebro sopiente seu perturbante, & propterea commodissime inter affectus cerebri

refertur. Sennertus Pat. lib. 2. p. 3. cap. 4. Rolfinkius lib. 2. conf. 15. de hoc affectu, ait fieri ab ea
 • Sanguinis vasorum de qua Hippocr. 3. de rat. v. in ac. 1. 23.

APPENDIX II.

*Vocis interceptionis, ut et Somnolentia iis accidentis qui Tortura subiungitur,
 ratio ex fundamentis anatomicis deducta.*

Politicos quosdam cognovi qui captivos in Tortura, clausis oculis ac si dormirent, obmutescerent, omnium sceleratissimos asseverabant, cum tamen naturaliter id fieri Anatomia nos edoceat: Musculi enim brachia pectori adducentes, apud Vesalium Tab. 1. musculor. L. notata, & ossi pectoris in eadem Tabula VI. notari adherentes, quia brachii inter scapulam & cubitum tenaciter inseruntur, ut ex Tabul. IV. musculorum (in qua insertio illa in dextro brachio Q. & T. in sinistro vero h. notata est) videre licet, si brachio retrorsum & in altum, crura vero deorsum trahuntur, pectus adeo constringitur & coarctatur ut Respiratio impediatur: Musculi enim laryngis, & Nervi recurrentes per consensum ira afficiuntur, ut mirum non sit hominem in maximis ac crudelissimis istis tormentis obmutescere ac vix spirare posse: Er quia ex violentia illa corporis extensione secundum par nervorum colli quoque afficitur, ideo palpebræ quoque concidunt claudunturque: Somnus itaque ille miserum caprivum neque reum esse significat: habet enim causas suas naturales: *Fabritius Hildannus in operum præfatione.*

OBSERVATIO XIX.

Loquela vitiat in quibus os Frontis non est sine excavatum.

§. 1. **O**s frontis sinu est excavatum, ut, authore *Fallope*, sit ὀρεῖον quoddam naturale, & aëre illo percussio vox canora fiat: Atque se animadvertisse quod quibus illi sinus dari non sunt, rancidulum quiddam balba denare loquantur.

§. 2. Ad nasi summum, supra supercilia, adsunt cavitates vel sinus amplissimi; sed non adsunt 1. in puellulis usque ad annum. 2. in quibus facies est depressa & sinu. 3. in quibus frons est divisa; ut plurimum gemini inrer utrumque tabularum, interdum membrana succincti viridi & separati, corpus quoddam molliusculum & medullosum continentes: Et habent hi sinu foramina qua desinunt in narium amplitudinem: Usus harum cavitarum 1. ad canoram reddendam vocem, quia sinus hi in iis, qui male loquuntur, non reperiuntur &c. *Bartholinus Anat. reformat. libello 4. cap. 6.*

S C H O L I A.

De his Sinubus in osse Frontis vocat *sinuiderum* 1. de osse cribiformi c*, eos non in omnibus reperi; Superioribus, aut, proximis annis hanc cavitationem in anatomis corporis humani ante omnia quam diligentissime persequuti curavi; & statim ferramentis adinveniri iussi, quibus hic cranii locus, cum non continuo appareret, nunc leniter incidebatur, nunc elementer radebatur, ut frustra fuimus, nam os eo loci minime erat excavatum, sed plenum & fungosum, nec plane penitus, sed sat exibat 1. 2. Ad formationem vocis nihil conferre: Quidam aut, credunt hujus ossis antium iis desse quibus Frons sic depressior: Id quod confirmat Highmorus, ac se caput ancillæ, hoc faciei vitio deformis dissecavisse, in qua hæc caverna omnino deliderata fuit: Nolite quoque (de quo paulo superius) cupis etiam hanc ossis frontis cavitatem curari, bene loqui potui; Nam cum hanc cavitatem notare non possem, statim ex iis quibus notus fuerat, quævis an clare loqui solitus fuerit, omnes qui pectus erant, inanimati consensu confirmabant ipsam vocem pectus profundere potuisse: 3. Quod licet iet de hac cavitare, si ficta est, semper ad nates feratur, ex eo tamen minime effici

posse, illam aut ad sonum vocis, aut ad odoratum facere, quod supra nates & os cribrosum hæc multum exat caverna. 4. Quoad visidem membranae cavitatem illam succingentis colorem, se hanc semper candidam, semper reuam & puram invenisse. Dissectionis autem Professores, sicuti Anomalia corporis, hanc cavitatem jam effradam inspiciere solere, quo tempore tam tenuis membrana plerumque est vitata: Et hoc est quod Petrus Paulus doceat Tympanum viridi colore esse prædium, qui absque dubio id in putrescente cadavere insperit: Atque interior quarti ossis maxillæ membrana ob eandem causam nonnunquam contraxit viridem colorem: Nam membrana in osse delitescens ætate facile corrumpitur, præterim cum in tennis. 5. Hanc cavernam semper innam esse, nec ullum humorem coereere, sed admodum teriam esse & splendidam: Sin novissimis diebus sectionis, quibus ossa coquantur, non negat viridiam quandam materiam ibi aliquando reperi posse, cum humores tabeculentium parium, quæ procul abant, in hanc cavitatem costringere posse videantur.

OBSERVATIO XX.

Balbuties. vitio Lingue jugiter irrigata à seroso humore, è cystide in cerebro eo repleta.

SUbit admirari sepe numero opera naturæ: Dissēctis enim corporibus admiranda inveniuntur, quæ citra autopsiam ita esse, ut sunt, vix persuaderemur. Roberto Barriere ferè quamdiu vixit destillatio perpetua ad nervos motui linguæ destinatos adeo loquelam impendierat, ut Balbutiem molestant inveniret, quæ nullis auxiliis potuit unquam emendari, unde tandem fluxione aucta suffocatione repentina est extinctus.

Aperto cranio, ac utrobique separata sensim portione extrema cerebri, in conspectum venit cystis, id est, sacculus robusta membrana compactaque contextus, undique serosum humorem continens, qui in fundo exiguum foramen habens semper novam materiam nervis linguæ communicabat: Quare cum nulla industria serosus hic humor absumi posset, tum ob copiam tum membranz densitatem, quæ nimium obstabat quo minus vis medicamentorum eo perveniret, uno ore diximus talem affectionem incurabilem fuisse. *Riverius cent. 4. observ. 7. additarum.*

OBSERVATIO XXI.

Balbuties pendet aliquando à defectu foraminum quarti ossis superioris maxillæ.

TPAULONIS affectus est in conformatione, non in intemperie: Sunt enim in media palati regione, i. e. in quarto osse superioris maxillæ, in illis omnibus quos huc usque viderim, qui literam R exprimere non possunt, duo foramina quæ nullo modo aperta & obvia inveniuntur in iis qui illo affectu tenentur: Ergo causa immediata, quæ posita ponit, erunt duo illi meatus aperti. *Sanctorius meth. vit. Error. lib. 3. cap. 9.*

OBSERVATIO XXII.

Loquela vitiata ob Epiglottidem induratum.

EPIGLOTTIDEM adeo quandoque induratum deprehendi, ut loquelæ abolitionem inferat: malum hoc incurabile. *P. Berbette Anat. Pract. lib. 1. cap. 4.*

S C H O L I A.

MOLLIOR est Epiglottidis substantia, utrinque iam lenio humore perfusa succingitur laryngis interna cavitas. *Bartholinus Anatom. Reform. lib. 2. cap. 11.*

OBSERVATIO XXIII.

Mutitas cum surditate nativa, ob deficiens officulum Incus dictum.

SCRIPTRUM mihi est à Medico, se aperuisse cranium hominis à nativitate Surdi & Muti, cui è tribus Auris officulis Incus deerat. *Marinus Merjennus Epist. ad Beverovicium, in hujus spicilegio de Calculo.*

S C H O L I A.

SILENTIO premenda non est Mutitas, infixæ Sorditatis comes individua: Nam à natura Surdi lugent quidem, gemunt & vociferantur, sed loquutionis plane sum expertes, ac nō habent est consequens adeo necessarium *ἡ ὥσις*, ut à Græcis *αὐτοῖς* pro mutis accipiantur: *Sordi à generatione*, inquit Hippocrates. lib. de Princ. loqui natus sed solum vocem edunt. Et Aristoteles, 4. de hist. anim. 9. *Quibus loquuntur, ex etiam vocem, at quibus vox non omnibus loquuntur: quæcumque sordi sunt à naturæ ratione etiam muti, vocem emittunt, loquutionem vero nullam.* Ratio est, quod vox homini naturalis sit, infantes namque à vagitu inarticulato vitam aspiciantur: vocis autem articulationi debeatur disciplinæ audium expostulandi: Quæmodum statua quoad materiam naturalis est, quoad formam artificialis, sic vox, loquela materia, à natura procedit: Loquela atque idioma arte conficitur: Lin-

gua etenim humana per se quidem, ac sine doctore mobilis est, vimque loquendi naturaliter possidet, sed dum actu sermonem pronuntiat, hunc habet ab imitatione, ipseque infansculum lallationes, nasdesque ac monosyllabæ dictiones, inchoata sunt auditorum verborum imitamenta. Illi ergo balbuciantur qui ludos à nativitate mutescere exiliant, læso nervo quinque conjugationis, cujus major iusculus fertur ad aurem, minor verò propaginis quibusdam in nates & buccas obiter transmissis, radici dentium, linguæ & laryngi distrahuntur, nam turditas ingenta, ob pravum organi *νεῦρον*, e. g. si primum, & anfractuolum utriusque aëris antrum, *αὐτοῖς* Græcis dictum, adnata membranula obrutetur, illis interim auditoris nervis, loquutionem nihilominus labefactat: Falso enim supponunt hujus

opinionis patroni, constantem furditatem nervi auditorii culpa semper oboritur, cum ex adverso rarissime id contingat: alioquin simul cum auditu tactus quoque id autem interna necessario deficeret, quod nervus ille utrumque sensum auribus impertiat: Jam autem à natura surdi patitur oculi taliam, quæ pariter tactum superfluum, ideoque nervi illius incommutatum demonstrat: Possumus insuper tantum nervi quatuor *oculorum* ad res perreptatorem naturaliter vel deesse, vel quocunque modo vitari, salvo altero ejusdem nervi (scilicet) qui ad linguam ducitur (quod sine dubio possibile est) nativa profecto ejusmodi furditas, juxta adversariorum dogma, haud deberet accelerare mutitatem, cum tamen illa presente hæc sit inevitabilis: Præterea natu grandiores, adeo jam per auditum loquendi indultis, si ob paralyticum nervi quind partis obfurditatem, nunquam simul mutos evasisse comperimus est, etsi fortan paulo submissius loquantur: Deinde, cur vix simul cum loquela non deest auditus, affectus, ut voluit, nervo laryngi & linguæ cum auribus communi: si dicatur à nervis recurrentibus ad

laryngem propagatis vocem factam lectam conservari, quidam etiam septima nervorum societas, ad linguæ mûculos delata, loquelam saltem naturam ac imperfectam præstabit. Addamus si propter aurium cum lingua sympathiam, ex ejusdem nervi commotione, furditas innata loquendi *adversus* secum adlucti, vicissim qui à natu à muti sunt, necessario furdos fore, contra hanc experientiam: Tandem ea hæc sententia sequeretur, quorquor à naturæ primordialis sunt furdaltri, eos omnes impedire loquutos esse, quod pariter eventus non quadat. *Merjium Diderot, de Mutitate*, Quod assert Vir Illustr. Non omnes à natura mutos patitur furdos esse, comperimus vidi in juvene quodam, *Colembier dicto*, incolæ pagi Troinæ, semihoræ spatio Genevæ discessit, qui mandata omnia, vel submissa voce data, promptissime exequabatur: Admiandum vero quod tradidit Fr. Vallis (scilicet Philol. cap.) quendam P. Poncium, etiam eos qui fudi nati non possunt docere loqui, res ipsas digito indicando quæ characteribus significabantur, deinde ad motus linguæ illis respondentes provocare.

OBSERVATIO XXIV.

Loquela impedimentum cerebri malam conformationem, sero undique suffusi, sequuntur.

Viri Illustr. præter motus convulsivos, paralyticis spuria totius corporis membra occupabat: Lingua vacillans verba non nisi imperfecta protulit: Hujus cerebri moles justo minor, & gyris paucioribus instructa fuit, unde spiritus animales non satis copiose producti sunt: Porro universa *τὸ ὑπερβαλόν* compages justo humidior, latice aquoso madida, *Vide lib. I. tit. de convulsione.*

SCHOLIA.

Sicut linguæ, hæc illavæ verba naturaliter profertent, multipliciter sunt inflexiones, nec expositione faciles, ita loquendi errores flexuorum illarum culpa exurgunt quamplurimi, vixque omnes distincte tradi queor: Nam sicut est cuicunque fere genti *idioma* acque veraculum elocutionis vitium, sic Doctores ut playstomii loquebantur à Græcis, quod ore in latum disjecto loquerentur, ac justo frequentius *in* dictionibus ingererent: Ereticis linguæ labatur quod verba ex, confusa, geminato *p* cum latine & appertate effertur, *justum* id vix dicitur, quæmodum *justum* & *justum* id vix dicitur, *justum* vocantur literarum *ex* & *mu* crebris *ouuiz* quæ itatationes; *mutum* vero ubi simplex, & multiplicatio *e. e.* cum libilo editur, Quidam etiam fingunt, id est præpedite & obicinis verba promittunt: nonnullorum denique subagressis est ac plane submissa pronuntiatio: Verum illis, & si quæ finitissimis, inventis loquutionibus possibilibus, agendum de *Balbutie*, quam Aristot. 11. Probl. 30. ad terminationem numerum reducit, scilicet *ἁπλοῦς*, *ὑπερβαλόν*, *ὑπερβαλόν*.

Terminum generis nomen retinens dicitur Aristot. 2. de part. animal. 17. *ἁπλοῦς* *ὑπερβαλόν*, cum nempe linguæ *ὑπερβαλόν* certas consonantes articulare non valens, in aliis defleat, v. g. T. mollis in D, ac G. in S, dicitur Capidolium pro Capitolium, & Anselmus pro Angelus: præsertim vero litteram acutiorem sequæ canalem R. deorquet in L. quæ hebetior est, ac pro maria sit malia: Cum enim consonantium nonnullis liberiores lingue dilationem, summiorumque incisuris dentibus ac palato inuicem requirant, sit ut lingua, si præ mollicie ac debilitate non satis amplifletur, denique obfirmetur, pro alpeioribus & quasi confusis litteris, leniores ple-

nioresque appeller, utpote magis affines, minoresque indigentes lingue expansione ac stabilimento: quemadmodum autem pariter oculus non est inamabilis, ita lingua transper trahitans, ac, ut vulgo loquuntur, paulo pingalor, decorem quandam sermone conciliat.

Altera *Balbutie* species Græcis *ὑπερβαλόν*, *ὑπερβαλόν* & *ὑπερβαλόν*, loquutio est deturcata, quæ litteris *ὑπερβαλόν* aboboritur aut eliditur: Hippocrat. *ὑπερβαλόν* vocæ, quoniam trunæ, & quasi terriata verba involuta sunt nec intelligibilia: Græci ita loquentem *ὑπερβαλόν* nominant, quod voces decurrit; item *ὑπερβαλόν*, & Latini *Balzum*: Alias vocantur *Balzum*, Valgi, qui huras habent extoriorum in octas, ad similitudinem litteræ A, quibus opponuntur *justi*.

Terminum *Balbutie* genus nuncupatur *ὑπερβαλόν*, per quam homo medio inter loquendum impore, repressis velut quodam ostensaculo conatibus, syllabas propere non connectit, sed in priori paululum detinetur, eamque cognit retetere ac alternare, seu in principio dictionis pro Cæsar dicens Cæsar, seu in fine, ut pro fama, fama: Ejusmodi hæsitacionem tractumque verborum *Balbutie* vulgo vocant, deluxa voce à Bato quodam herge: Ejusmodi *Balbutientes* ab Homero *liad. 7. ὑπερβαλόν* dicitur, Latinis *Bambalones*, *ὑπερβαλόν*, quod *ὑπερβαλόν* interpretatur labis *ὑπερβαλόν*.

Balbutie causæ sunt multiplices, 1^a, *ὑπερβαλόν* Linguæ non quidem stupor, ut in loquutione inamata, nec interit, sed potius tremor, per quem non plene absoluitur loquutionis integritas, at interdum intersturbatur: 2. Lingua, vel brevior, nec idcirco satis premens anteriores dentes, quod infrequenter fieri observat Galenus: Vel crassior ac tumidior, idcirco gravitas ac inflexibilis, nam lingua ad *ὑπερβαλόν* *ὑπερβαλόν*.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI PRIMI

SECTIO XXIII.

DE ANGINA.

OBSERVATIO I.

Angina latens à Pulmonis abscessu purulento.

LANIO quidam meridie circa laryngem & fauces dolorem sentit, & quandam in deglutendo cibo & potu difficultatem, Adit sub vesperam Pharmacopœum: datur ex aquis plantaginis, lactucæ & dianthorum, addito aceto, gargarismus, quo cum subinde uteretur, doloribus intensis, subiro, nocte, mente constans strangulatus interit.

Hujus corpore aperto, reperta est pulmonis substantia, sive πνεύμονα, in pus conversa, & ad unum ejus latus, abscessus pure quoque impletus: Nulla tussis huic antea fuerat molesta, neque sanguinis ulla spuratio præcesserat, sano validoque corpore eoque visus, eoque non gracili sed obeso. *Dodonæi cap. 18. observat.*

S C H O L I A.

NULLA inter Anginæ species æque periculosa est ac ea in qua nullus tumor in faucibus ac collo apparet, quam latentem hac de causa non inepte dixerimus: Talis autem quandoque hominem paucis diebus conficit ac è vita tollit, nec & sensibus integris; Quod & Hippocr. prædixit lib. j. cap. 8. scriptum reliquit, Angina, inquit, gravissima est & celerissime interitum, quæ neque in cervice (i. e. collo, interprete Galeno) neque in faucibus conspicuam quâ exhibet, hæc etenim eodem die & secundo & tertio & quarto strangulat: Plurimum vero hanc quoque dolorem inferre & spirandi difficultatem: Adjunt vero non modum hæc, sed & vehementem copiosaque humorum è capite destillatio, dolor autem circa laryngem & asperam arteriam talis, ut nec coniungi quantumcumque leniter, circa gravissimum dolorem queat, sed nec moveri sursumque attolli: Quare non spiritus tantum cum difficultate trahitur, sed & cibus ac potus ægerimè, aut non demiturus, Cum etenim per œtophagum descendunt, cedit & sursum ascendit larynx: Inflammata per hujusmodi anginam interiores ac latentes laryngis muculi exulsi-mo-ore, verum non nullam juxta laryngem, aut ejus muculos, vel circa asperam arteriam inflammationem aut abscessum cognovimus, sed pulmonem male affectum, quod superior historia demonstrat: Eadem de similia ætate anni 1765. diligenter annotavimus, quando multi angina, ac simul molesta ex capite destillatione correpi fuerat, præsertim ex his qui præcedente hyeme vel tussis vel rauridine laborassent, aut è peripneumonia evasisent: Plurimis eorum posteaquam circa laryngem dolor remissior tandem desisset, peripneumonia successit cum lateris dolore, non tamen pungente: aderant respirandi difficultas & pulsus mollis: horum oon pag. i. intra non multos dies mortui, tenentes viderunt & natura frigida: Pulmones horum vel purulenti fuerat vel ab-

scellum habuere: juxta vero laryngem aut ejus muculos nihil occurrat, quod v. l. ad ille vel adfuisse inflammationem ostenderet: Satis quidem apparuit pulmones male quidem prius affectos, superveniente ac accedente è capite destillatione, reliqua lymphomata successisse; laryngem vero non primo sed per sympathiam laborasse: Verisimile verò etiam est destillante humore asperam arteriam ejusque ramos impleri atque distendi: deinde eodem ad alia via transmissio, à dolore liberari quidem asperam arteriam, ac ejus supremum finem, ipsam laryngem: Pulmonis autem male affectus partes è dolore occupari, acque modo ex angina in peripneumoniam pertransitionem fecit: *Notandum Dodonæum.*

Ad hanc anginæ speciem, in qua nec intus nec foris rubor aut tumor adest, referenda ex videtur de qua *Aræti* lib. i. cap. 7. ubi collapsum instrumentorum adesse air & strangulationem vehementem, ut ipsamet in pectore latentibus partibus, cum cor atque pulmones, obdita (sic inflammatio videatur; & *Aræti* hanc propterea dici ait, quasi *cardiaca* & *hæmoptica*, h. e. interius vergentem & augmentem: Ego vero existimo, inquit, solius spiritus id vitium esse, ad calidissimum sicillimumque conversi, nulla corporis parte inflammatione laborante: Sont itaque Aræti duæ anginæ species, una cum tumore ingenti ac robore contulorum & fortis verus; quin etiam interdum, inquit, lingua, gurgulio, catæ æque partes in tumorem effluentur: Alia inefficui illis locis collapsum, sed interius compressio maiore strangulatione dictucua, ut interna inflammatio ad cor usque pertinere videatur: *Sennertus* autem vix ad anginam hanc speciem commodè referri posse putat, sed potius ad suffocationem, quia in pectore vitium sit, ubi spirandi initium ponitur: Atque si ea quæ tradit *Aræti* diligenter perpendantur, de acutissima aliqua Pulmonis inflammatione, aut certe de æstuosissima & acutissima

acutissima febre, qua spiritus calidissimus redditur, loqui existima: *Horum* dubitat non illa symptoma-
ta, quæ parat *Artem*, oritur ab inflammatione
ejus nervi, profecto magni, qui enatus ex vertebri
colli, ac per pericardium elatus, una cum illo peri-
cardio & diaphragmati implantatur. Sciunt, enili qui
anatomica tractant, pericardium & diaphragma con-
focilia & juncta adeo esse, ut vix dicas nunc hoc ab
illo, vel nunc pericardium a diaphragmate nascitur,
symphytia illa pericardii ad diaphragma æquæ qua-
tuor digitorum fere amplitudinem, ad limitem hab
osse licet ab eis; & ab ipsa ossis sterni superficie, si
duodecim digitorum latitudine distet: hinc valida
illa symptoma nata posse quæ dubitet?

Pulmonis fistula Gr. J. L. à Fovæ consule, p. re-
fert anno 1601, in Ducatu Vrbini, & Piceni regione,
gravidas esse Anginas, Pleuritides, Peripneumonias,
atque sceleræ agrotationum cadaveribus repetere esse
pulmonum abcessus, è quibus materia foetens pendit:
Unde inferre licet Anginam eorum quoque ha-
buisse ex illis Pulmonum abcessibus, atque pleuritides
Peripneumonias vocandas fuisse, quia simul
obiciunt Pulmones, Equidem Anginæ, & pleu-
ritides & peripneumoniz, sæpe coniungunt in febri-
bus, maiorem parte ad hunc locum depulsa, ut febris
essentialis potius sit, vel comitata, ut ait Escell. Plate-
rus, quam symptomatica.

Circa Laryngem & fauces Anginæ differentiæ, &
causas omnium optimè & clare tradit *Platerus* Prax.
lib. 2. cap. 91. Sanguinis, ait, influxus si in fauces ob-
sidentes muculos diffusatur, inflammationem, ve-
ram Anginam appellatam, parit & levem tolerabi-
lioremve prout delusio interiora exteriorave magis
possidet: Nam si interiores muculos laryngis & fau-
cium, ac ossis hyoidis, qui respiratio, vocis & de-
glutitionis intervium, procurat, cum vehementer
tunc auget & velut suffocat; prima & deterior erit
anginæ species: Si vero in exteriores potius eorum
illæ occupantes ferantur muculos, cum minus hæc
functionibus tunc incommodet; miorem, & quæ
tum humore externo sese quandoque manifestat, ter-
tior species dictam Anginam procreabit: Quod si
vero tam ad interiores quam exteriores se muculos
dispersat delusio, medio modo se habens, secun-
dæ species appellata nascitur Angina, In qua cum ra-
mor non ita collatus & abdius, ut in primis sit, ille
in faciem interioribus se nonnihil profert, ibique
potest conspici: Quæ ratione & rectius Anginæ ve-
ræ differentiæ explicatur, quam si, prout in hos
illosve muculos delusio cadit, cum in illis in abito
occultatis hoc discernere nequeamus, alia in super
ipsarum genera statuamus, & pro horum differentiis,
Cynanchas, Paracynanchas, Synanchas, Parasy-
nanchas appellamus: Ceterum si sanguis in glandu-
las illic positas potius delitescat, illasque inflames,
presertim humiliores apertæ arteriæ utrinque ad-
stratas, quæ propter venas, quibus iocæte sunt &
nigricant nonnihil, facile inflammantur, Anginæ quo-
que erit species, eoque magis cum & tunc vicini
quoque musculi fere inflammantur: deterior mi-
norve prout se in muculos dictos diffundit inflam-
matio: Si vero in glandulas elatioris, Tonsillas se-
vel Gargareonem feratur, harum partium inflam-

ationes, Amiciadum & Walz nominibus expressas
erit, quæ ad vicinas quoque partes sæpe expendun-
tur, frequenterque quæ Anginæ sunt, cum sanguis
in laxas hæc glandulas, magnis venis adstratas, ci-
rius quàm in alias, cum fluxu, feratur: Quod si in
Gula seu Oesophagi sedem potius descendat, quod
rarum est, dolorem graviter longe, presertim in
Deglutitione, à principio gula ad ventriculum usque
sele extenderent, sed non cum tanta spirandi difficul-
tate, nisi ad vicinas quoque partes se extendat, pro-
creat: Cujus influxus sanguinis, atque inde na-
ta inflammatio, causa eadem quæ cæterarum inflam-
mationum exillit, nimirum plethora, sanguine ad-
modum in corpore redundante, vel ferventiori &
teuore exillente, eoque sepius quam alio ob par-
tium dispositionem exortante &c.

Laryngem Errat censet *P. Barletti* in Anat. Pra-
ctica, eos qui Laryngi inflammationem adscribunt;
licet enim cartilagine ipsas inflammari, hinc cor-
rumpi posse non negat, Ceterum tamen credit inflam-
mationem cartilaginibus adscriptam, ad illas glandu-
las, carnosasque fascium partibus competere; alio-
quin tam sæpius enationem non admitterem, cum
corruptio atque inflammatio laryngis lethalis, in ju-
dice, sit morbus.

Adis Pharmasorum Gr. J. Accessit Medicus phle-
botomiam eamque iteratam, quæ in ejusmodi inflam-
mationibus princeps est remedium, præscripsit:
Tunditur vena in brachiis, maxime cephalica, post
venæ sub lingua: Sed maximi momenti est iugulari-
um apertio, Auxillii celestis & efficacia inde est,
quod iterum in sanguine superfluo, è cerebro per
ductum peculiariter in iugulares venas, extra cranium,
refunditur; (Vide lib. 2. Tit. de Casarum, ex *Leone*,
9.) quatum depletionis, ob viciniam & communica-
tionem cum parte affecta, opem civillimam affert:
Serum autem sanguini commixtum illi vehiculo est,
quo facilius exiles eorum partium venas subeat:
Hinc annotat eos qui sudantes ab exercitio col-
lum nudo aëri exponunt, Anginæ facile tentati,
repello fito, & in muculos glandulasque vicinas am-
bientis vi retro: Sæpe Anginæ, quam neque ter-
mè venarum brachii sectio, ac profusa sanguinis mis-
sio, neque ranarum apertio tollere potuit, solutio-
nem, eamque citam, beneficio apertæ iugularis, Vi-
di anno 1675, mensis Maji 1. in Dom. Dyonisio Bo-
dier Genevensi: Eadie faucium dolore & deglutitio-
di difficultate corripitur: comites erant nausea &
cardialgia, phlebotomia alia necessariam, prohiben-
tes, livebam enim præ sanguinis copia extremæ
manus: his sedatis languis ad uncias decem è basilica;
ob delitescentem cephalicam, educitur, floridas &
tenuis: Iteratæ postidic, mane & vespere, etiam-
num experti viti, atque adeo nullo successu: Ad cu-
cubituulas scarificatas, transiit quoque fit, præmis-
sa ranarum sectione, Tandem tuta iugulari sinistra
à Magistro *Fowleri*, dexterrimo Chirurgi, sanguis
omnino putris affatus exillit, ejus educationi Anginæ
cessit, sed descendente peiore affecta, qui priori so-
cium se pleurumque adspexit, scilicet Perip-
neumonia, à qua tamen, quanquam
gravi, paucis post diebus
emercit.

OBSERVATIO II.

Angina latens ab inflammatione Pulmonum in gangrenam desinente, Tumore Thymi glandulae, phlegmone obfesse.

Miles gregarius recens conscriptus à Nobil. Domino *Buiffon*, Genevensi Capitano, Helvetiorum legionibus, Regis Christianissimi castra sequutis adscripto, cui nomen *Abrahamus Perroux*, Territorii Laufannensis, quinquagesimum annum prætergressus, Enterocoeles molestias declinaturus castrationi se submisit, quæ feliciter peracta est inclinante mense Septembri anni 1677. Tertia post hebdomada, rite omnibus se habentibus ac consolidatione vulneris jam proxima, jamque per urbem vagari ubi inciperet, difficultate deglutendi prehenditur cum difficili respiratione: Tertia die & instante ægri fato acerfor, Lingua, præter apicem, atro carbone erat nigrior, erecto pectore cubabat, si quid è cochleari offerretur, suffocationem inducebat, quamobrem licet extreme debilis magno conatu oblata respuebat: velamina omnia abiciens, quamquam actu frigidus esset, solos pedes cooperiri permittens: Pastorem, qui animæ consuleret, illico advocari jubeo; Anginæ symptomata omnia video, quamquam nihil omnino, neque iutus neque extra appareret, si insignem illum linguæ nigrotem exceperis, unde pronuntiavi interiorem adesse gangrenam, internæ inflammationis sobolem, quam in pulmonem esse credidi: memor consensus qui inter Testes & pectus intercedit, ad quem attentum esse jubet *Hippocrat.* Medicum lib. 6. Epidem. Misillus sesquihora à meo discessu interiit.

Explorato vulnere inguini dextro inflicto, operationis rite & ex arte peractæ, à juvene *Colet* vocato, indicia fuere, nullis inflammationis notis præsentibus, Ad superiora facto progressu, dissecta secundum longitudinem paræcolli interior, ubi salva trachea arteria reperta est, omnis phlegmonis expert, ut & adjacentes musculus: Thymus glandula intumuerat, atro sanguine referta, tracheam premebat: Compresso thorace, exudabat per sectionem factam sanies; Ille apertus inflammationis insignis in pulmonibus notas exhibuit, a terrimo sanguine distentis, lividis, nigris creberrimis maculis conspersis, juxta dorsum præsertim, cum gangrænæ indicia evidenter: Hinc apparuit deglutendi & spirandi difficultatis, ac loquelæ impeditæ causas (vocales enim tantum literas A & O efferebat æger) adscribendas fuisse, tum compressioni tracheæ à tumida illa Glandula, Tum ejusdem retractioni ad inferiora à Pulmonum infarctorum pondere: Abscessum latentem inquirere, è quo sanies effundebatur, non licuit ob instantem sepulcrum: Jecur tamen vitiose coloratam, admodum tumidum, diaphragma sursum compellens se offerebat: Voracissimum fuisse audivi.

SCHOLIA.

Thymus glandula intumuerat, atro sanguine referta] Thymus Glans venæ cavæ dirempti vice pulvini subtenitur atque superjicitur, ita ut suo sinu eam comprehendat: Animadvertit *Galenus* hanc glandulam in nuper natis animalibus prægrandem esse, ob visorum molliem & imbecillitatem: crescentibus illis, otempore durioribus, ipsam exsiccat atque decre-scere, ita ut in juvenibus exiguum ejus vestigium remaneat: Sed in mulieribus est mollior & crassior, ideoque suffocationes quæ accidunt mulieribus fre-

quent, vitis interdum sine levi respiratione, ab ista glandula turgida dependet. *Boleus Anthropog. lib. 5. cap. 15.*

Enterocoele] Id in quibusdam à me annoratum, qui ejus causa eunuchismo se submiserunt, paulò post in afflicto pectoris, pleuritidem, peripneumoniam aut anginam incidisse; quod commonit facit *nos* quæ vitalibus partibus cum generalibus incedit, de qua *Hippocrat.* in lib. Epidem.

OBSERVATIO III.

Angina Pestifera in capite famiem habens.

AB anno 1618. erupit insuetus inter nostras gentes affectus, qui homines, *potissimum pueros, extincto vel præclaso spiritu* interimeret, *αγγίνα λοιμώδης* dictus, Tonsillæ pestilentes, ab aliis strangulæ oris faucium affectus, aut Carbunculus pestilens, aut laqueus Gutturis: à plerisque passio Anginosa, quibusdam aut ulcus Syriacum, cum Aretæo, aut Tonsillæ pestilentes, cum Aërio: Indicant autem plura non obscure superiore Tonsillis loco sedem affectam, quæ cerebrum est, cui nostræ suasioni faver Anatomæ complurium corporum vi morbi enectorum, In quorum capitibus exectis reperti grumi sanguinis lato schemate diffusi, sub maximis sinus membranæ crassioris &c. *Severianus de Abscessibus, Tract. ult.* Nervos per occipitis foramen in musculos cervicis, laryngis, hyoidis, & faucium in sanguinoso hoc affectu non leviter læsosprehendimus. *Thom. Bartholinus comment. in dictum affectum. Exercit. I.*

SCHOLIA.

S C H O L I A.

EUm affectum antecessit boum annua lues, quod mirum in modum strangulari concidebant: Exant de hac re peculiariter, compendiosa, luculenta & accommodata *Artem* monumenta, quae hoc ingenua produci placet, ut utriusque morbi idem quantum hodierna creat percipiri possit: Is cap. 9. lib. 1. de causis & signis morborum.

Ulcera Tonsillarum sunt aliqua mitia, familiaria, non laedentia: aliqua aliena, pestifera necantia: Mitia quidem sunt munda, caigua, non alie descendencia, non inflammata: Pestifera sunt laxa, cava, pinguis, quodam concreto tumore albo, aut livido, aut nigro sordentia: Id genus ulcera Aphtharum noncapantur: Quod si concreta illa sordes alias descendat, affectus ille Eschara est, quam cum conveniunt tuberculis excellens & inflammatio, & venarum dolor, quemadmodum in carbunculo, & eaigue rarique pustulae, quae Graeci cantharidata vocant, orientes, haeque aliae supervenientes in unum coalescunt, atque inde latum ulcus efficitur: Id si in os interius tergitur depulsendo, ad columellam usque pervenit, ipsamque exedit, & linguam etiam occupat, & gingivae & denarium alveolis, denique inde labefactantur & denigrescunt: In collam etiam phlegmone erumpit, &que isti haud ita multis diebus post phlegmonie, febribus, furore, inediaque consumpti intereunt: At si in pedus per arteriam id malum invadat, illo eodem die strangulat, Pulmo enim & cor, neque talem odoris feriditatem, neque ulcera, neque saniores humores sustinent, sed rursus spiritandique difficultas nascitur: Causa malefici Tonsillarum est frigiditas, asperitas, caliditas, acidorum ad stringendumque devotio: quod quidem hae partes peccant ad vocem spiritumque edendum intervium, & venter ad alimentum transmissionem, & gulae ad eisdem devotioem obsequio sunt: Interius vero partibus si quod contingat incommodum, venter scilicet, gula, & peccant ad istum & tonsillas, & loca ibi posita, mali coalescunt & eruptiones perveniunt: quare pueri usque ad pubertatem maxime hoc morbo renantur, praecipue namque pueri multum frigidum aerem inspirant, quoniam in his plurimum caloris inest, & ad cibos intemperantes sunt, & varia concupiscunt, & frigidum potant, & exardescunt ac ludentes alius vociferantur: Puellis quoque usque ad menstruae purgationis tempora hac vitia usitata sunt: regio Aegypti horum affectuum plane fecunda est, aer enim spiritandus siccus adducitur: varios praeter cibos suggerit, radices enim herbarum quae olea ibi laege proveniant, & acris femina, & porio crassa, utpote Nili aqua: Syria quoque illa, maxime quae Carle i. e. cava nominatur, Syriaci morbos procreat, unde Aegyptia & Syriaca ulcera id genus appellatur. Modus vero morbi quam miserrimus accidit, dolor quidem acer & calidus, qualis in carbunculo, spiritus vitiatas: exstant enim maxime putredinis odorem, eundemque vehementer in petus spiritandus adducit: Immundi adeo sunt ut nequam ipsorum odorem ferre queant: pallida his facili. livida facies, febres acutae, sitis, ut igne accensum videantur: Potum ventris dolores non admittunt, tristantur enim cum Tonsilla comprimuntur, aut potius (potus) in nates refili: Camque decumbunt, surgunt, ut sedant, & de ibi non ferunt, quod si sedant, quiete caen est: iterum decumbere coguntur: plerumque autem recti stantes obambulant, nam quietere nequeunt, solitudinem fugiunt,

dolorem tollere dolore remanens: inspiratio magna est, frigidum enim aerem ad refrigerationem delibant, capratio vero parva: nam veluti igne causta ulcera cum sint, a calido praetera spiritum incenduntur: & rancitas adest, vox nihil significat: atque haec in petus rursus cum subito in terram delapsis animis delitit, *Hac Artem.*

Cui Graecianae morbi figurae dispar haud est Italica nostra, nisi quod paulo auctior per symptomata capitis, quae minime recensita veteribus, videntur non insequenter in nostris hominibus male affectis, praesertim vitia & formis nato jam grandioribus: Equidem inter caeteros notavi duos, qui non sine comite, stupore, catibaria, atque aliis hoc genus occubere: Neque enim seiva Proserpina peregrini capiti Medici quodagenario majoris: Altera fuit Pharmacopoei confusa, quae delira per morbum saepe apparuit, morbo commotus: Excretiones & naribus confluit paritride, pituitosae, ichthoroides, aliquando canori commisit, aliquando duraxat cruentae mero: Puella quoque nobilis eodem affectu dice gravata, cum calium & strangulatu expellet, ex subita haemorrhagia profusiore praesentiam opem sensis, postremo veto ex malo ori venefico seivata, incertum quia nova morbi vi fuit incipere sublara: Interim scire licet nonum & tribus pueris, qui pessime habuit inter caeteros, & nervorum languore relicta, curibus appime interbellum, atque oculo strabum, transvoluta vero sic impedimentum, etiam a diu praeterito affectu, ut via emollim humore panem committere valeret: quoque duriniquas panis ossas, & solidas molles sibus ingereret commodiuscule: Quae eodem sanguinis per nates excretionis facta, puero decem illas perficite reddita est, quoque huc jugularis vena sectione fuerit egregie levata: *Inducant hac porro non obscuri superiores Tonsilla loca solum afflicta, quae cerebrum est, cui nostra sanissimi sacri anatum compluribus corporum vi morbi collorum, in quorum capitibus exalta repertum gravis sanguis, lato sibi maxime diffusi, sub maximo sine membrana oritur.* Accedit & quod in duobus pueris proventibus, & puero quinquenni, dira lues nates utraque compleverit putridis & prelaeis aphdis, quae vitio putridissimo manabant: Quid, quod cum purillaginem reddere vixit sunt nates, ut cerebri subtorium videretur: Sed & illud notandum, quod etiam Tonsillas pestilentes hocce viti vocemus, nihilominus observatum est saepe supra strangulatum, & paris jam visceribus, sublacos pueros morbo, qui liberi fuerant repant: imo post 30. dies & 40. Jam praetexti morbi furoribus, praeter omnium opinionem ex improviso sunt extinguiti, adeo scilicet, recoedita veneni vis est &c.

Quoad morbi procreationem, certum est neminem hanc analogiam habere ad acutem potellem, fortasse ob eadem calidum & humidum temperamentum, ad putredinem & pestem concipiendum aptum: aut ob naturalem impotentiam ubi sterodi causis modificalis, ratione laxi, tenet, spongiosaque corporis: aut ratione inordinati vitiis, ob quem subinde sanguis secundat crudus & impotus, paucius ad putredinem & exinde neminem concipiendam: unde altera pender analogia: cui tentis, parvis scilicet adstantia, quae omnia pestilientiam communicant per aerem inquinatum, potius aer ex Hippocr. lib. de morbo sacro, *primum admittitur à cerebro, reliquum ex ore suum ipsius*

regunt:

vigorem: Si enim, inquit in corpus primum advenit, & possit in cerebrum, degeneratione aut potius in carum & remota, ad cerebrum calidius jam exiens pervenit, & non finitur ad puras, sed admodum humore ad carum & sanguinem: His accedit quod cerebrum ad patendum, & ad discipendum maxime imbecillum & minime obstitens, molle scilicet & laxum, praeterit humidum & glutinosum est, quod unice facit ad concipiendum labem humidam & glutinosam: Ad haec cerebrum est glandulae simile; ex Hippocr. lib. de Glandulis, n. 7. aequi glandulas apposite consistit pessilientia, nimirum parotidas, alas, lingua, quod experimento quotidiano docemur: Postremo constat sanguinem fixum, putridum putidumque manare sub ista lue de naribus, & vocem tanciam ex his prodire, quod partem humorem os, alii, crudum, partim affectum sedem ostendit: Quae cum demonstrare volemus naturalibus adductis causis manifestis, non est tamen quod occulit morbi signa faciem obliat: Generationis autem modus hic est: Deductus aer purus per canales priorem sinum cerebri, pervenit ad rectissimum plexum arteriarum & venarum: Ibi primum corrupto sanguine, mox secedit & penetrat corpus cerebri, quod corruptum tellus a postremo contagio: quo tempore consummatur itatus & forma, live idea morbi: Haec enim inquam Sphacellismus est & corruptio cerebri, ex qua deinde sequuntur affectus alii ac symptomata omnia: Quod autem sit corruptio cerebri, audiendus Hipp. L. 2. de morbo.

D. 1. *Corruptum cerebrum tum aut novum calidum, aut perfrigeratum, blisum aut putrefactum plus solito factum fuerit, Et in Coacis, cerebro corrupto alii in tribus diebus, alii in septem moriuntur, hoc vero si effugere servantur, item aph. 51. 7. ubi Galenus corruptionem non accipit vulgi modo, sed pro nativi caloris exsolutione a materia praevaleat; quo quidem sensu, non mirabile est quod morbi quidam & lesiones cerebri non consequuntur perpetuo, ut apoplexia, catalepsis & ceterae organicae passiones, quae obveniunt secundum nervos & sinus ducentes cerebri: haec aliqui passio sit secundum cerebrum substantiam aequaliter: ac ut in hectica febre non agnoscitur dolor, aut aliter aliqua praecellens, & sine his etiam ad mortem iur, sic & in re nostra non est cerebro praecellens officialis aliqua lesio, praeterit exordio, sed conclusa illa & profunda labe iacito quodam exitio petdit omnem ejus crasso: quae dom sunt, communicatur de subjectis partibus visum, i. e. vicinæ tracheae, pulmonibus ac subinde cordi: Hinc esto talis morbi definitio, quocunque nomine veniat, Sideratio cerebri petulens, contagiosa, & leminariis impetente portidus, delatus cum aere, per ventos praeteritis*

nasales, ad glandulosas puerorum partes, & cetera. A. Severinus Tractatu proprio, qui alimus est lib. de Abscessibus, unde haec desumpta: Videatur & semon. Clar. Th. Bartholini.

Homines postquam parvi] Luvores senibus si frequenter angina corripuerit, quod bilioso sanguine scaturit: Vixi frequenter quum feminis (exquisita scilicet) quod etiam sanguis si frigido, laevis moror, acutusque partes & venae, ingulsiore exilioreque, qua de causa languinem diffusiore admittunt: Iocerrim anginae nocturnae, ob partium laxitatem excrementorumque ubertatem, vix magis obnoxiae sunt: Cut vero angina haec, pestifera potius praeterit adoriatur, causas reddidit supra Aetiam.

Extincto vel praesto spiritum aeternum] Non pauci cor in primae partis participationem adducunt: Sed certum est omnium malorum hanc causam (mortem) sequi cerebrum, non praecedere, eo praecipue argumento, quod sine febris impetie Padanchone fatum manet, cerebri non cordis affecti indicium: Cor enim omnis alienae contrariae virtutis advento, velut ad rem divertam & oxiatam, quocunque gradu contrahitur, perpetuos pulsum motus vel retardat vel accelerat: At vero alia cerebri conditio, corruptionem, sine vitalium intemperie, eoque perficit, donec venas, cordis ductus, vix in magni ordinis infert: Imo ex le, sine cordis contentu, mortem inducere quid valeat? quod animalium spiritum ad vitam utrumque iusta necessarium fata moderatur: De cerebro, medius fidius in Padanchone minus ambigo, quam de ejusdem partibus in societate mali, os praeterviam dicam, adhibenda: Quippe interiore nobilitatis cerebri recessus, quem medullam vocant, ut pars princeps excludi non meretur, apud quam animalis virgines a bitrium & potestas: Ab hac enim nervorum origine, per occipitis foramen in musculos cervicis, laryngis, hyoidis & faucium diffunditur per Vagum, ad larea tracheae exteriora, nervos recurrentes, vocis fere & respirationis moderatores expandens, quos in sanguine hae affectu non leviter lesos deprehendimus: quoniam causam alii, inter quos Aetius, in impedimentum pulmonum motum coniecit: Hinc pendet problematica solutio, quod fiat ut subito subinde, siue alia manifesta causa extinguantur argenti? In promptu ratio quaerit, ex cerebri nuclei conditio, quo vel leviter lesio, siue ab interiori incidente, siue punctura exteriori, animam inopinato mortis gremio prostratur: quod laetiorum artificum, solo acus in cervicem impactus, apud Subalpinos, improvidi boves caperunt.

tur: Bartholinus comment. in Padanchone.

OBSERVATIO IV.

Anatome cadaveris septennis pueri a Padanchone extincti.

Mortuus est puer septennis in valetudinario incurabilem, dissecus mense Novembri 1642. Padanchone affectus septimo post die obiit, anhelus & anxius, recto plurimum capite cubans: Mihi quidem Angina illa sicca visa est, Hipp. descripta 1. progn. comm. 13. p. 16. & ab Aræto lib. Acut.

Sterno resoluta, & costis utrinque dissectis, extitit pulmo latis maculis praerlividis & prope niger: auricula cordis dextra grumis sanguinis plena: venae omnes pulmonis & cordis distentae: Vena cava insectu suo adaperita sanguinem atrum & grumos reddidit, sic & ventriculi abunde saturi sanguine: In capite, una cum facie pratumido, facta dissectione, reperta inter cutem & musculos temporarios, pituita mucosa citrina, longo ad malum usque discurfu: Ossis testa reclusa, venae membranæ tenuis distentae undique sanguine, sic & item omnes suae membranae crassa, sic & rete mirabile: vasa ad summum omnia gravida

gravida sanguine, quæ cerebri basin emensa medullam nutrire fuerant parata. *Severius in calce lib. de Abscessibus.*

S C H O L I A.

In capite una cum facie prænotanda.] Cui colli exurnescencia, quæ alias ab Hippocr. inter salutaria signa habetur, hic mortifera est? Exitialis est tam ratione causæ quam signi; hujus respectu mala, quia nobilissima cerebri officina monitrix statum, ea malignæ mærelæ copia gravatum ut suis terminis amplius contineri nequeat: Deterior causa, quæ ut maturius moriendi necessitatem acceleret, recurrentibus nervis oppletis, strangulanti humorem suscitât, in musculis alloquin nudis innoxiam: Bonum ergo exterius vergete humorem in angina quacunque, si materis metastasis univèrsæ sequatur & extra nervorum tactum subsistat. *Bartholinus Exercit. 1. comm. in dictum afflictum.*

Omnes sine membrana crassa &c.] Quatuor in universum demonstrantur ab Anatomicis crassæ membranz veluti ventriculi, quibus tres alii Sylviani accedunt, inferior nempe falsis, & laterales duo: Horum omnium pressior cum arteriis est copula: ex latere altero veols locantur jugularibus, ad quas velut canalicali illum sanguinem amandant qui in superficiali cerebri nutritione ex arteriis venerat, ad inferiores jugularium veols solito gyro redimus; unde si rationem subducamus ex necessario horum ductu, ex-

peditam delabentis causæ morbificæ ad partes in Angina affectas. collumque, viam exituum solutionis, seu criseos gratia, quæ subinde per narium hæmorrhagiam periticitur, ex continuata longissimi sinus falscia cum summis naribus commanione: nonnunquam quoque, & supinas quoque per laterales sinus, venis descendens infertor, abicessu critico ad colli partes tentatur: quoniam frustra non raro operam ludat natura, ob impleti cerebri & corrupti vehementiam, qua io sinus grumescit sanguis spirituum defectu, & ad nares, corruptionis labe infectus, alius purridisque aphulis commutatur; cujus utriusque, & sinuum, & nasi turpes facies in demortuorum sectione *Severius* advenit. *Idem.*

Longo ad malum usque discurso.] Riolanus Encheir. l. 4. c. 9. ab eodem fonte hujus morbi & strumarum originem deducit: humore videlicet maligno, qui in siogum, gargarionem & Tonsillas decumbens, eas erodat aphthasque malignas generet; instimul stranguationem inducat, unde *Gaxotillo* Hispanis dicitur; malum Neapolitanis familiare, à quibus *Atus* Syriis cum dicitur, forsân à commercio cum Hispaniis quibus strumæ endemix, à quibus per traducem derivaturum.

FINIS LIBRI PRIMI





ANATOMIÆ PRACTICÆ SIVE DE ABDITIS MORBORVM CAUSIS

Per Cadaverum Dissectionem revelatis.

LIBER SECVNDVS.

DE AFFECTIBVS PECTORIS

SECTIO I.

DE RESPIRATIONE LÆSA.

OBSERVATIO I.

Dyspnoea ab infixo aspera arterie ossicula.

PUER septennis, Aurifabri Genevensis Dom. Gainier filius, anno 1650: oryzam juri carniū incoctam comedens, ossiculum deglutit, quod à consueto tramite deerrans, asperam arteriam subit, illi impactum hærens. Digito locum designabat, circa colli medium: hinc difficilis cum rursi anhelitus, maxime in *inspiratione*, dolorque pectoris: Cum nec progredi nec regredi ossiculo daretur, bronchotomiam suasi, alteri Medico ineptam visam, & sexto demum die, sed ab obitu factam: exemptūque os teres, æræ monetæ crassitie, triplici angulo parietibus arteriæ asperæ affixum: Spes erat salutis in mature instituta operatione.

SCHOLIA.

Difficilis cum rursi anhelitus, maxime in *inspiratione*.) Respirationis Inspirationis & Expirationis constas: Inspiratio lædi dicitur, quando uis ejus frustratur, aut quoquo modo inhibetur, quod sæpiissime accidit propter aëris inspirandi vitium, vel defectum: Posterius hoc accidit, quatenus nimium aër copia satis ubere introduci nequit: Cuiusmodi effectus cum plures & diversimodæ causæ existant, ut plerumque verò illud propter Respirationis organa, vel quoad motum impedita, vel quoad meatus obstricta contingit: Aëris, quominus libere Pulmones subear, inhibitiō respirationis lædens, sæpenumero ob vias, nempe Tracheæ ductus oclusos, aut non satis patentes contingit: Enimvero ductus illi ocludi, & plenum aëris ingressum prohibere solent, quatenus vel opplenitur, vel comprimuntur, vel æctus contrahuntur: Cum plures sint causæ & modi quibus Tracheæ ductus oppleti solent, imprimis & sæpiissime hoc facit seri, dum à sanguine obicitur, fluor catarrhalis, & è vasīs sanguiferis in has partes exundatio: Quod primò tenne & acie rursi molestissimam parit, postea per coctionem crassescens, & tracheæ parietibus adhærens inspirationis vias valde angustat, & extremitates earum protius opplendo, decurrit: par-

tes etiam sanguinis extravasati, necnon patris aut matris ichthoreæ & lymphæ ductibus, aut sanguinibus in vesiculas tracheales exudatio, dyspnoeam gravem, & non raro phibitū producit. Ductus tracheales tum ultimos, tum intermedios sæpenumero per compressionem angustari aut ocludi observatione facis vulgari constat: Enimvero à passu ubertiore, nec non à vini, aut cerevisiæ fortiori pota copioso (quatenus vasa pulmonica ob cruoris turgescenciam valde distenduntur & tracheæ lacera compelluntur liberum solitūque aëris ingressum non admittunt) homines alias satis sani, difficultes & anhelos respirant: quod quidem ob pulmones repletos & carentes, potius quam à stomacho saginato, & diaphragmatis sytolen impediēte, accidere putamus: Porro ob hanc rationem, etiam in febrium paroxysmis, respiratio crebta & laboriosa cauitur: Nec tantum à sanguine turgescence, sed etiam ab eodem stagnante, aut extravasato, insuper à concretionibus lapideis aliisque diversimodis, tracheæ vasa compelluntur inspirationem liberam perficere nequeunt. Secundò, Tracheæ ductus nonnunquam à fibris eorum spasmodico affectu propriis contracti & oclusi, aëri ad debitam inspirationem aditum negant: Hinc cum nulla sit in pulmonibus

K k

obstructio,

obstructio, aut mala conformatio, nulla insuper diathesis tabida, tamen à fibris istis præternaturaliter convulsis, & simul contractis, Asthmatis paroxysmi horrendi sæpe oriuntur: Præter hos inspirationis læsæ casus, subsunt quidam illi qui propter aërem in primo aditu, scilicet, intra nares, guttur, aut laryngem à tumore, aut mala conformatione prohibeantur excitantur; Ita namque polypos in nares, angina in gutturo, aut rosillæ in laryngis orationem difficiliorem reddunt, quæ pathemata cum sensui parant prætermittuntur.

Secundò, Respirationis organa aut sunt mere passiva, quæ scilicet moventur, uti pulmones, aut sunt activa, quæ seipsa, ac inferunt istos movent, uti musculi thoracis, ac Diaphragma: In quibusque horum motus impedimenta, quibus respiratio læditur varie contingunt: Et primò quod ad pulmones spectat, hic interdum ob vala plurimum ditenta & sanguine impleta, valde intumescunt, in tantum ut rigidi & inflexiles, thoracis systolæ ac diastolæ vicibus minime obsequantur: Porro interdum accidit ob phlegmonem, tubercula, aliisque diversifundis concretionibus, patem in ipsis rigiditatem excitati: Secundò, Respirationis organa activa, sive partes moventes, scilicet musculi pectoris & diaphragma, à functione sua motiva variis ob causas inhiberi aut perverti solent: Solutio continui in quolibet horum facta, sive per sanguinis agfectionem, sive per seri aliorumque humorum decubitus, ut in pleuritide & scorbuto, sive à plaga aut vulnere infectis, dolorem in loco affecto cum motus impotentia & respiratione difficili passim citet: Quinimo interdum sine dolore, aut causa quæpiam evidente, partes istæ à motu præpeditæ dyspnoeam gravissimam inducunt, prout in asthma, suffocatione uterina, & quibusdam aliis affectibus spasmodicis, aut hypocondriacis cernitur: cuiusmodi pathematum ratio procul dubio in eo consistit, quod spiritus animales, functioni illarum partium motrici destinati, à debito in fibras motrices influxu averantur: Ideo multi quoad pulmo-

nes suis læsi, & tantum cerebri & nervorum affectibus obnoxii, etiam dyspnoæ paroxysmis horrendis sæpe corripit solent.

Quoad aëris inspirandi vitium, si forte depravatus fuerit, sanguinem nec recte accendit, nec eventilat, quinimo nonnunquam hujus crisi pessundat sive venenat, prout in omni constitutione admodum maligna cernitur: Hujusmodi affectuum ut rationes præcipuas assignemus, advertere est quod si quidem particule aëris nitrosæ (ut multiplici experimento constat) ad vitam tuendam impuriis necessariæ existunt, ita frequenter accidit illud aëris nitrum aut deficere, sive ab aliismodi particulis obscurari in tantam aut ligari, ut virtutem suam communi facis exercere nequeat, aut denique eidem corpuscula maligna, sive exitialia adjungi: Primò, Aëris particule nitrosæ deficiunt, si quando ipso stagnante, aut valde assuante, nitrum inde abigitur, aut in actum minime concitatur: hinc in camera ardore vel nimis conclusa, aliisque in locis, aut hominum frequentia stipatis, aut solis ardore effervescatis ægre respiramus: Idem usque venit in locis valde excelsis, supra montium cacumina, utmosphæræ similitudinem excedentia, in quibus ob nitri defectum respiratio ægre ducitur, & diu illic vivere non licet: Secundò, Particulæ nitrosæ ab aliis accessoriis interdum obscurari aut obcurdi, quandoque nimis acuti solent: Quoties enim flammæ Austro, aut nimis humida & calida evadit, in quantum particule nitrosæ ab aqueis ac sulphureis occupantur, ac plurimum obundant, dum inspiratur illa, sanguis haud vegete accenditur, verum instat ligni viridis igni suppositi, fumigat potius quam clarè efflagrat: proinde ut dum ante tali aëris fluxu, torpidi ac hebetes, ac ad motum inepti peritemus: E contra autem cum severitate Boreæ particule frigoris, acerrimæ ac summe aculeatæ nitrosis adduntur, sanguis satis accenditur & libere respiramus: Autem flamma vitalis à gelu invento ipsi inproportionato undique reprimitur, & ni motu & calore refocillatur, non raro proliis extinguatur. *Wille Pharm. rat. p. 2. f. 1. p. 3.*

OBSERVATIO II.

Dyspnoea à pituita lenta intra Tracheam arteriam concreta.

A Gri quatuor mihi noti, qui eodem fere tempore interiere pene morbo consimili: Omnibus Medicis negotium dedit: Imo aulam asserere morbum non intellexisse: Difficultas erat spirandi summa, spiritus frequens & parvus ad mortem usque: In sicco velut spirare videbantur: nec tussis nec spurum, spiritum ne ad momentum cohibere poterant: Erectio paulum corpore ita parvum & frequens spirabant: febris non erat magna, nec quæ istam respirationem requireret &c. Chirurgus affirmavit se secuisse cadaver pueri ista difficili spiratione & morbo, ut dixi incognito, sublati.

Inventa est pituita lenta, contumax, quæ instar membranæ cuiusdam arteriæ asperæ erat obtexta, ut non esset liber exitus & introitus spiritui externo, sic suffocatio repentina. *Ballonius Epid. & Ephemer. lib. ij. pag. 197. & 201.*

S C H O L I A.

E A difficultas spirandi quæ eo tempore vagata est, non ab una causa eademque profecta est: Secundus æger (Scilicet Nicolaus Honoratus) tenes habuit puulentes cum summa bilis effusione in intestina: Filius D. le Noir (ait ibidem Ballonius) Pulmones habuit

parte dextra vitiosos: Nepri uxoris N. pulmones erant integri, aliquantula pars adhererat costis: Ut colligendum fit pulmonibus præfixum eam tempestatem bellum indicasse.

OBSERVATIO III.

Dyspnoea orta à lapidibus asperam arteriam prementibus.

V It quidam laborabat maxima anhelitus difficultate, non tamen tussiebat, non excrebat, nec ulla vel asthmatis, vel orthopnoæ, aut vulgari, alicujus pectoris vitii a derant

aderant symptomata : Medici curabant eclegmatis, syrups & similibus morbum non obsequentem. Ager tandem febre superveniente abiit ad plures.

Causa autem morbi & mortis postea sese aperto corpore aperuit: Lapidés varii, variazque figuræ, Asperæ arteriæ incumbentes immediatè, ita eam oppreslerant, ut tandem hominem profecaverint: Cætera enim interiora nihil contraxerant vitii: Ita sepe quæ latent in corpore medicantes latent. *Theod. Kerkringius Observat. Anat. xxviij.*

S C H O L I A.

VT tandem hominem profecaverint.) Respirationis usum perquam necessarium esse eleganter Hippocr. lib. de Flatibus declaravit, Mortalibus hic, (Spiticius) non vita tam morborum egrotantis causa est: tantumque corporibus omnibus spiritus non necessarius, ut si quidem alii omnibus, & ubi & potantibus quoniam abstinent, duci tamē & tres, vel plures dies postea vitam ducere, ut si qui

spiritum in corpore viam intercipiat, vel exigua diei parte, huiusmodi periculum fit: adeo necessarius est usus spirituum in corpore: Alii quoque quoniam omnibus aliis alimentis privantur quiescent, quod mutationibus immutatis viam fit non possit, ab hac tantum sola actione nunquam desistunt alimentis, quin aut spiritum adducant aut reddant.

A P P E N D I X.

Spiritus difficilis ob putamen nucis avellanae circa caput asperæ arteriæ inherens.

Civis Amstelredamensis septem amplius annos, divexatus ab indefatigabili tussi, traxit continenter spiritum adeo difficulter, ut corpus ipsi summopere emarcesceret sed ejecto tandem per vehementissimam tussim puramine nucis avellanae, duxit illico spiritum commodius, & evasit celerrime quod vitæ inrentabatur periculum.

Inhauserat aorem hoc putamen (quod adæquabat unguem humanum) circa caput asperæ arteriæ: uti satis distincte indicavit æger: forte prope illum locum, in quo aurcum nummum scribit ultra biennium delituisse Ph. Hæchsterus observ. 16. casu 10. *Tulpium Observ. lib. 2. cap. 7.*

O B S E R V A T I O I V.

Orthopnoea ab inflammata asperæ arteriæ.

Postquam Aadr. Spigelius, plurimum deditus experimentis, deprehendisset in orthopnoicis dissecis, inflammata asperæ arteriæ tunicam ob materiam tenuem ac biliosam ipsi infarctam, Diuturnæ orthopnoeæ accessiones medicamentis scammoniatis, ut Pilulis, coccis, Auris & huius generis cæteris levavit. *Tab. Rhodius Observat. 28. cent. 2.*

O B S E R V A T I O V.

Dyspnoea à Tumore lateri asperæ arteriæ adnato.

Viduz N. succrevit paulatim humilis ac latus tumor, insidens firmiter lateri asperæ arteriæ, hinc impediri evidenter spiritus: Offendimus hunc tumorem ad instar carcinomatis, radicibus diffusum per quamcumque colli partem. *Vide lib. 3. tit. de Deglutitione laesa.*

O B S E R V A T I O V I.

Dyspnoea à Thymo, glandula, humoribus excrementitiis repleta, Thracæam premente.

THymum novi, ex quorundam lue venerea infestatorum cadaverum sectionibus, instaf spongiæ ab excrementitiis corruptis humoribus intumescere, unde ægre spirant, compresso à tumore Thymi œsophago, renitente cartilaginosa asperæ arteria. *S. Pauli Digressione de febre maligna.*

O B S E R V A T I O V I I.

Dyspnoea ab aneurysmate aortæ arteriæ tracheam vicinam premente.

J. Pauli Tumor pulsatorius circa claviculæ sinistræ & sterni conjunctionem obortus est: exterius pugni magnitudinem multum superans, & Interius respirationi non leve impedimentum afferens: Aperto mortui thorace apparuit dilataa arteria aorta ad latus asperæ arteriæ. *Vide tit. de Hemoptysi.*

Dyspnoea convulsiva à Trachea bronchiis coarctatis & contractis.

Dyspnoeam convulsivam interdum excitari putamus ob tracheæ bronchiâ coarctata nimis, & non raro penitus contractâ: In Nevrologia nostra advertimus, plurimas nervorum fibrarumque nervearum propagines asperæ arteriæ ramificationes omnes ubique amplecti & circumligare: quos equidem nervos, si forsan acciderat à materia morbifica obfessos, in crebros spasmos irritari, propterea sequitur canales sive ductus quos ambiunt, valde constringi, & in quibusdam locis prorsus occludi. *Willis Pathol. Cerebri* c. 12.

OBSERVATIO VIII.

Dyspnoea & stertor à cauro pulmonis partem superiorem obsidente, & arteriam asperam premente.

Interdum pars superior Pulmonis in cancerum abit, atque ad juguli partem superiorem trahitur, ut sub alis lateat: unde compressa arteria aspera stertor quidam obauditur, non à puris multitudine, aut alterius humoris; sed ab angustia & interceptione meatus, in quo refractus & agitatus humor aliquis in gutture fuerit. *Latotius Comm. 1. in lib. v. sect. 2. aph. 67. Coacar. Hipp.*

S C H O L I A.

Ad juguli partem superiorem.) Hippocrates in Coacis c. 400, superiorum pulmonum alarum inflammatione obscurum, signum ponit clavicularum dolorem, amaram quidem, si ambæ superioris pulmonis alæ laborent, Unius funica.

In cancerum abit.) Sanguis qui inflammationem pulmonis patit vel purus est, vel biliosus, vel pituitosus, vel melancholicus: Pituita è capite deliens inflammationi occasionem præbere censetur: Bilis sanguini permixta Erysipelas pulmonis inducit, de quo *Hippocr.* lib. 1. de morb. & lib. de int. affectioni-

bus: Si fuerit melancholicus sanguis, isque exustus, cancerotam inibi affectionem patit, à qua Anginam abortum vidit *Hæmum* de morbis Pectus cap. 1. Sæpe, ait, in cancerum degenerat, hoc maxime fit in puellulis melancholicis quibus telui sunt menales: Nuper tres vidi, duas puellas, & unam senescentem jam fere, nupcam, Nigredo quædam ad epiglottida fere apparebat; Nupta pax glutinendi difficultate periret: Aliis exedebatur ætiophagus ac muculi sternohyoidæ, ita ut per anteriore protraheret ac exilis jugularibus hæmorrhagia interiret earum una, altera sensum carabui.

OBSERVATIO IX.

Respiratio læsa ob sanguinis transitum per venam pneumonicam, prope cordis insertionem lapidescentem, impeditum.

Quandoque vidimus tum arteriæ tum venæ pneumoniæ canales plane obsecos alicubi factos, eorumque parietes ita compressos, ut rima tantum exigua ad sanguinis transitum relinqueretur: Non ita pridem juvenem, à tali venæ pneumoniæ mala conformatione extinctum disseccuimus, in quo vasis hujus truncus, prope cordis insertionem lapidescens adeo coalescerat, ut sanguis non nisi guttatim, aut cum exiguo tantum filo cordi instillaretur.

S C H O L I A.

Cum ad Respirationis munus spectent pulmonum vasa, scilicet trachea cum bronchiis & vesiculis. Item cor cum arteriis & venis: Insuper adsint nervi cum fibris tum muscularibus tum nervis, Lymphæ ductus & glandulæ: Porro, cum & vasorum horum contentus, sc. ær, sanguis venos & recens cum sero ejus, Lympha & Spiritus animales viduum quodvis in uno quoque horum continens, sæpe totam functionem pneumonicam perturbat: Nec minus etiam organa pectoris motiva, scilicet muscoli cum diaphragmate, atque nervi iis destinati, quinimo interdum ipsius animales, antequam nervos eos subeant, perperam scilicet habentes, non raro magnam circa respirationem à se ipsos inducunt. Cum principia pulmonum functio de usus fuerint, sanguinem & ærem per totas partium compages intimoque recessus, atque ductus quos-

que minutissimos traducere, & obique invicem committere, in eum nempe finem ut sanguis venosus à circulo redux, & chymo recenti dilutus, proindeque crudus & velut semixinctus, tum perfectius misceratur & velut subigatur, tum potissimum & secundum omnes suas partes ab ære nitroso de novo accendatur, hinc primaria circa hoc negotium, sive munus pulmonare, delicta, ut plurimum in his duobus consistant, scilicet primo quod sanguis non ite trajicitur per cordis sinus & vasa pulmonica, Et secundò. Quod ær hæc debito modo in tracheam ejusque ductus inspiratur expiraturque: Utriusque horum duæ sunt partes: Primo enim quoad Sanguinis Trajectionem, culpa interdum intra cordis sinus dextrum, aut arterias pneumonicas; quandoque item intra venas pulmonares, aut cordis ventriculum sinistrum committitur: Dein 2^a, quoad ærem, modo in-
inspi-

incipiendo, modo in expirando imprimis ac fortius delinquitur: quoniam insuper utraque sanctio interdum ex quo peccat: Singulorum ex his variis sunt casus, plures item causas &endi rationes, quantum precipuus hic breviter perstringam: Primo igitur, quando sanguis non nisi cordis sinu deatum & arterias pneumonicas pertransit, aut proprii ipsius visio, aut ductuum modo liborum, modo ultiorum culpa illud contingit: quippe nonnunquam sanguinis rivus in ceteriore præcordiorum regione subilistit, propter obicem in altera factum: quinimo interdum ævis inspirati defectus, aut vitium, sanguinis trajicendi remota facit. Quod spectat ad sanguinis rivum, nostra fere sententia utrumque sanguinis rivum, pariter chylo recente peritum, procul homogeneum exillere: atque id propter vala lactea thoracica tam longe inter chylum pariem circumducere, quam tunica venæ cavæ descendenti, æque ac pariem alteram valæ metastica tranco ejus ascendenti infundunt, quod etiam una cum chylo humor lymphaticus vala subelavii infundatur, ita ut in sanguinem reduci percommode queat, nec quidem aliis aut pluribus ejus ductibus opus videretur: Porro humorem istum recte constitutum, æque ac chylum ipsum dulcescentum, malis sanguineæ, ubique lacta in corde exchara simul congruere & facile assimilari statimur: Sin vero humor lymphaticus, à cerebro & nervoso genere atque ac a glandulis redux, à debita crassi degener (ut cerebro absque) acotem contraxerit, idcirco sanguini venoso relictus ipsum fundit, & in ferociatibus præcipit, proinde ut magnaurin profluvia inducantur: At vero tantum abest ut talis humoris lymphatici flori in dextro cordis sinu majorem sanguinis effervescentiam concilet, ut potius è contra exinde cum pulu debili, sæpe totius infrigidatur, aut rigor, non raro etiam spirituum deliquia aut affectus spasmodici excutiantur, & utrimque copiosam & pallidam comitemur: Quotum ratio proculdubio est, quod tum humor limpidus à cerebro & nervosis partibus exundans sanguinem in ferociatibus fundit, & nimis diluendo refrigerat; proinde que spiritus animales vchulo suo delictum, aut deficiunt, aut motus inordinatos ineunt, At vero sanguinis in cordis sinu dextro, à partium dissimilium lacta, effervescentiam elasticam (*quam fluit Clavi symm*) uti procul negamus, ita quoties exinde in pulmones non debito modo ejicitur, illud non tam proprio ipsius quam sacularis animalis vicio aut defectu, accidere statimur: Si quando enim spiritus cordis fibras mollicies actantes; aut deficiunt, aut in à valis spasmodicas adiguntur, eor proinde inordinatè vibrans, latice euentum aut infirme aut irregulariter foras propellit.

Quod autem sanguis corde egressus arterias pneumonicas hanc semper expedite trajicit, id interdum propria est culpa, quandoque item ob vias obstruatur, quin debilis ob casus passim contingit: Ipse sanguis duplici respectu, scilicet aut quoad accentuationem, vel quoad crassum suum peccans, proprio per pulmones transire officit: utriusque horum varii sunt casus, Primò enim quatenus ille aut minus, aut nimis quam par est accenditur, in circuitu pulmonari impeditur: Si quando in massa sanguinea, spiritus ac sulphure absumptis aut depressis, partes aqueæ, retinescentes, aut salino sine præpollentur, id propter lætæ ejus, æque aut parum ab ære nigrolo acceptis, non facile intra ductus pulmonares rarefit, eoque exillens instat flammæ suæ sponte viz

trajicit, sed gravis & quasi limosus usque in viis hæret, atque plurimum molestia ac laboris, quo circumspellatur, cordi creat, Hinc quoties à totius corporis, aut partium ejus motu citatior, sanguis paulo ubertius in præcordia urgetur, cor & pulmones pro circumspulsionis ejus difficillime, & extremis quasi cum nixibus laborant: Arque in hoc casu verisimile est sanguinem, intra cordis sinum dextrum rapidius aggestum, aliquatenus stagnare, quia nimium in ductu à fronte oppletos oppletos statim transferti nequit: Porro ob hanc causam accretiones *gle granulosæ sive carnosæ, cetero Polypo dicitur*, interdum ex oculis videntur: Hinc & in *pne, leucoplegma, hydrops ac sibilus* inveterato, à corporis motu citatior Rescriptio valde difficilis ac laboriosa exilist.

Secundò, Sanguis nimis interdum accenditur, totiusque fere in flammam erumpens, ac supra modum expantus, intra ductus Pulmonares, quos plurimum inflat & extendit, viz contineri potest, quin eos inflammare sive accendere periclitatur: quare ne diutius in illis moretur, præcordia creberrimis simulque fortissimis viribus vibrant, ut sanguis ita nimium accensus satis eventitatis & circumagii possit: Sicut enim ille intra pulmones aggestus, eoque totos inflammans, functionem vitalem cito destruit: Præter hæc sanguinis quoad accentionem, restant alia quoad crassam sive mixtionem ejus viz, propter quod ductus pulmonicos minus libere aut expedite trajicit: Enimvero quando ejus compages aut minus laxa, aut supra modum siccata exilist, per exiles pulmonum meatus hanc facile pertranibit; quin sæpe in illdem hæret & stagnare, aut etiam excurrere & extravasari periclitatur: Sanguis in compage diversimode solutus, aut deliquis, aut recementa, aut corripelias suas in pulmonibus exoit, quæ in vasorum recessibus deposita, aut parietibus eorum affixa, tiri sanguinei cursum variis modis inibent aut pervertunt: Prima, Sanguinis dissolutio, quæ pulmonibus sepiissime (quamvis non periculosa admodum) infesta est, coningere solet quatenus scotolates, intra massam ejus contineri inhabiles, cum non satis per diaphoresin aut diuresin è vestigiis emolantur, intra pulmones à cruore abscedunt, adeoque effervescentes, & è propolis valis exundantes, tum ævis tum sanguinis transiunt perturbant aut præpediant; proinde ut recementis hujus letosi expellendi, & circuitus sanguinei continuandi gratia, pulmones in tussim crebriam & valde molestam irriterentur: Nec tantum latex serosus, sed & plures alii humores, aut sanguinis recementa in pulmonibus deposita, eorum ductus sæpe infarcunt, adeoque tum ævis, tum cruore transiunt præpediendi, Dyspnoeam aut tussim inducunt: Hoc in cacochymicis, gulosis, bibonibus, aliisque vitam inordinantibus aut desidem agentibus passim cernitur: Hinc curioses, ut pulmones humorum illuvie & sanguinis excrementis usque immunes babeant, dicta rema & perquam exacta videntur: observavi quosdam melancholicos, sanguinis fece adusta intra ductus pulmonares exundante, spiritum instat ramentum nigricans; quin & alios biliosos & ictericos flavum, & quandoque summe amaricans excrevisse.

Terrib, Insuper Pulmones interdum sanguinis corripelias & putrilagine luere, plures instans satis manifeste declarant: Si quando enim massa ejus misimare, aut contagio pestilente, aut venenato tacta, corampti incipiat, inque portiones coagulatas &

Kk 3 pha.

phacelatas facessat, pulmones inde labem præcipuum inscipiant: Hoc in variolis, morbillis, peste & febribus malignis nonum est: à quibus affectibus quoties ægri intereunt, ita fieri videtur, vel quia sanguis intra cordis aut pulmonum vasa grumescens, proprii ibidem circuli viam obstruit, proinde statim ut influxus ejus in cerebrum præpeditur: vel quia sanguinis corruptelæ ductuum pulmonumque parietibus affixæ, affectionem quasi phlegmonosam eis inducunt: proindeque tumorem moleculis, aut dyspnoeam, & non raro spiritum sanguineum acciunt.

Hæcenus de circulatorio sanguine impedimentis, quæ intra pulmones, propter crassum massam nimis dissolutam, inque partes aut porciones (quælibet dem relitæ ipsum ductum obstruunt) abscedere aptam, contingunt: Superiunt alia præcordiis haud minus innoxia, quæ à sanguinis compage nimis restricta, & nihil à se dimittente procedunt, cujusmodi ob causam, aut febrem causam, aut pleuriticam vel peripneumoniam oriuntur: In priore affectu, sanguis plus debito sulphureus, simulque crassus iterum non diluitur, quasque hujus in se particulas continet, à complexu suo ægre deponit, quare intra pulmones ubertius accenditur, cumque horum ductus tum ob maiorem effluenscentiam, tum ob crassitatem suam difficultatem pertransit, cor impigret & vehementissime vibrans, circumspulsionem ejus totis viribus molitur; nihilominus à flamma ejus majore intra præcordia gliscente, æstus & febris molestissima, cum lingue scabritie & velut torrefactione quadam oritur. In altero genere, videlicet pleuritide & peripneumonia, sanguis æque crassus, sed minus sulphureus aut inflammabilis existit: quapropter incendium haud itaneum concepit: at tamen ob crassitudinem suam, cum ductus thoracicos aut pulmonares non ita facile & expedite transiit, sæpenumero extravasatur, æque ductum interititum aut parietibus hærens, obstructionem & phlogosum brevi excipit, quibus sæpe dolor cum spiritu sanguineo tum discoloris succedit: Observare est à phlebotomia in hujusmodi morbis facta, crasis, postquam subsederit, imperfectam pellicula albicante, aut alias discolori, crassa & viscosa semper obduci; cujus ratio est, quod sanguis, cum inter circulantem particulas veteres non ita dimittit, novæque in se non ita recipit, diuturna coctione inspissatur, ac instar carnis elixæ, à colore sanguineo versus albidum moratur, in quo statu, si quidem vasorum ductus exiles haud facile pertransit, extravasari periclitatur, & pleuritici aut peripneumoniaci facile exarant.

Præter has sanguinis, dum præcordia pertransit, remotas, ob propriam ipsius naturam excitatas, sunt insuper alia suffragmina & impedimenta ejus, quæ aut *uræ* aut *viam*, aut etiam aëris inspirati viam, vel defectu contingunt. Quot modis, & quibus de causa cor in motu peccat, sanguinem minus recte aut debite à sinu suo dextræ per pulmones in sinistram propellit, in tractatu de affectibus cardiacis ostensum: Nuncium muliculus iste nonnunquam spirituum inopia aut defectu, laborans, vibrationes suas haud satis vegere & rebusse peragit: Re vera cum à corporis exercitio cror subito ubertius à vena cava in cordis sinum argetur, si quidem hoc firmiter se contrahere nequit, juxta vires suas impigret laborans, pulsus creberrimos, simulque debiles erexit: Porro, hanc ut suppetere ferantur, tum arteria pneumonica, tum alie in vasis corporis partibus, quæ sanguinem quoniamodo circumspellunt, contractiones crebras & inordinatas edunt: Hoc observavi in virgibus pica-

laborantibus, aliisque interdum cachecticis, à motu corporis citiore, non solum cordis palpitantem, sed in cella de temporibus aliisque locis arterias irregulariter pulsasse: Nec tantum spirituum defectus, sed quandoque etiam illorum inordinatio, in causa est quod præcordia minus recte sanguinem transmittant: quippe interdum spiritus nervorum cardiacorum incolæ, à copula incoegua irritant & spasmodice afflicti, cordi aut arteriis contractiones irregulares, quibus iter sanguinis varie pervertitur, aut impediunt, imprimunt, ut passim in cordis palpitatione, tremore, pulsa intermitente, &c. Tertio, Sanguis iter pulmonicum quandoque ob vias non suis parentes vane inhibetur: cujusmodi impedimenta contingunt quotiens motus, leve ductus isti, vel *struuntur*, vel *abruptumur*: Prioris due sunt rationes, in fendi modum, videlicet aliquando occluduntur, quatenus vasorum ductus, à fibræ carnis contractis ad se invicem propius adducuntur, ut in cordis palpitatione & asthma- te spasmodico nonnunquam accidere alibi ostendimus: Cujusmodi affectus, ob clausum sanguinis intra præcordia rivum, Respiratione difficili & anhelæ, pulsus exilis & totius insignidato comitari solent: Porro interdum sanguinis meatus occluduntur, quatenus vasorum ductus à *impure*, aut *humore quodam externo intrinseco* compinguntur: quare cum cellulæ, aut tubi bronchiales, (ut frequenter affloret), à phlegmate viscido, materia purulenta, sanguine demum extravasato implentur, sicut in ipsi liberior aëris, ita in vasis adjunctis etiam sanguinis transitus inhibetur: In cujusmodi causæ rationem veniunt *Tumores*, *tubercula*, *vermes*, *nonnunquam* velut *lapidosa*, *arenacea*, *testacea*, aliæque alia generis diversimode excitati solent: Insuper quandoque, &c. (vid. *uræ*). Secundo, Ductus sanguiferos sæpenumero impleri & obstrui, propterea ut sanguinis rivus obstruatur aut angustetur, plures instantiæ & observationes anatomicæ satis manifeste declinant: Ex his enim liquido constat *sanguinis contractiones gramasæ*, seu veluti carnes, ipsius cordis sinus, & vasorum majorum radices ita nonnunquam opplere, ut fluenti sanguini cursui fere in totum obstruatur: Quinimo hoc in vasis minoribus sæpius contingere de ratio iudicat & experientia concludit, quippe (prout modo innuimus) sanguis in rheumatismo, peripneumonia & pleuritide per phlebotomiam emissus, postquam refluxit, pellicula & confusio omni modo substantiæ cum concretionibus illis polyposis obducitur; indicio, uti videretur, manifestum, cum propter crassamentum illa viscosa vasorum quatuor ductus ægre pertransiret, quapropter, ut quoniamodo evadat, eis plentium distendit, quandoque etiam petrumpt: sæpe item eorundem oris icterici, inque Tracheam hiatus aperit, proinde ut crura extravasati portiones crebro trahi episcant: Quidam anhelosi obiterum (*vid. infra*) quorum pulmones multum intumuerant, eo quod sanguis crassior & facilius in vasa extendere; ac in minoribus tubis stagnaret: Insuper emotis facientia, modo salina, alii vero statim, modo sulphurea aut retrecta cum illa combinata, sæpe vasorum ductibus exilibus impactæ, ibidemque fixæ, eos penitus obstruunt, propterea ut sanguis circulatorio pneumonica, in ipsam brevius eorumitur, & consequenter rubis aut cellulæ compressis respiciuntur ambibus contrahitur: Plures & diversimodi talis obstructionis casus & species extant: Tertio, Sanguinis commotus pneumonicus non tantum ob vias occlusas aut obstruunt, sed quandoque etiam *abruptum impediunt*: licetiam vasa illæ in qui-

quibufdam tenuis, aut tenera, aut valde laxa, fanguinis impetu aut acrimonia non raro aperiantur, ita ut latex cruentus, vel in tracheam erumpens per fpirum egiciatur: vel ductum interitibus aggeffus peripneumoniam, vel in thoracis cavitatem decidens empy-

ma producat.

Remanet adhuc tertium Sanguinis in itinere pneumonico impedimentum, quod videlicet ob *Aria* defectum, aut vitium accidit, &c. *Willis Pharm. Rat. p. 2. fcll. 1. cap. 2.*

OBSERVATIO X.

Dyspnoea à tranfitu fanguinis per Pulmones impedito.

Qui in principio paroxyfmi Tertianæ mortui funt, illi fanguis in Pulmonibus lapfatus, incrassatus inventus, tranfitu caufæ morboficæ impedito. *Hartmann.*

OBSERVATIO XI.

Respiratio laefa ob Pulmones tumentes à Sanguine intra vafa ftagnantes, bronchia premente.

§. 1. **N**ovimus quofdam *domos* & anhelofos obiffie, quorum pulmones ulcere, aut continui folutione quavis graviore immunes, adeo intumuerant, ut illorum intra thoracis cavitatem motui fpatium defideraretur; Cujus ratio proculdubio fuit quod fanguis craffior & feculentior, proindeque vafa non facile pertransiens, arterias & venas ubique extenderet, inque minoribus eorum tubis ftagnaret. *Willis Pharm. Rat. part. ij. fcll. 1. cap. 2.*

§. 2. Afferimus afperæ arteriæ ramos, à diftenti venis & arteriis pulmonum ita comprimì poffe ut Afthma oriatur: Si menftrua non respondent, implentur fanguine vafa pulmonum, in tantum ut idem morbus nafcarur, & phthisis fequatur, aut fubfequi videatur: Talia defuncta corpora incidi juffimus, Ac invenimus vafa pulmonum vehemente fanguine diftenta, quibus rami afperæ arteriæ pervii haud erant: Quid? cunctum corpus pulmonum aliquando adeo refertum erat, ut thoracis membranam contingeret, & ei quoque adnatum effet: Hydrops pectoris etiam, teftè *Chiffletio*, otitur fuppreffio illo fanguine. *Schneiderus l. 3. de Catarrhibus cap. 6.*

S C H O L I A.

Adeo intumuerant.) Pulmonis Tumentis meminit *Hippocr. lib. 1. de morbis, Quam, inquit, pulmo tumuerit pax nimio calore repletus, Tuffus tenei fortis & dura, & erectæ cervicis fpiratio, & acervatim refpirat, & frequenter anhelat, & intumefcit, & nares expandit, velut equus ex cutia, & linguam frequenter extenfit, & pectus ipfi canere videtur & gravitas in ipfo inelle; quapropter hanc capere pectus non potest, fed dirumpitur & impotens fit, & dolor acutus emergit, & doctum & pectus & latera velut aculeis punguntur, & audent hæ partes velut ejus qui fedeat ad ignem, & rubores exortiantur ad pectus & doctum, velut à flamma, & motus fortis incidit, & angustia, ut neque stare, neque federe, neque decumbere poffit, Verum ita velut deperatis rebus anxius*

feipfum jactat, & jam mori videtur: Moritur autem maxime quarta aut feptima die quas fi effugerit, non valde perit: Hunc fic cures, Internam alvum quam cillidime, clyftere adhibito, probe purgare oportet, & de embrio, & nalo, & lingua, ac de omni corporis parte fanguinem mittere: Positiones item frigefacientes exhibere, & forbitiones idem præftantur: Danda funt de oxinum cientia fape, fed quæ non calefaciant: & ad ipsos quidem dolores, quum irruunt, calefactura levia ac humida adhibendo, locum calefacere ac humectare oportet ubicunque dolor fuerit ad reliquas vero partes frige factura adhibere, vili cillum ea apponendo ac tollendo, & ubicunque accitit, figus facere: A vino autem penitus abstinere.

OBSERVATIO XII.

Dyspnoea ob cruorem intra Pulmones extravafatum.

Theologus cum palpiratione cordis Dyspnoea affligi cepit: Pulmones fumme obftructi & cruore atro extravafato infarcti. *Vide ita. de Palpit. cordis.*

OBSERVATIO XIII.

Orthopnoea ob Pulmonem dextrum inflammatum.

XIV. April. 1676. in virgine 30. ann. aperta, inveni pulmonem dextrum insigniter, ad intima ufque inflammatum, cum duritie fumma, variis in locis fupparationis feffo ostendebant initia: utroque in latere fimiliter ac circa doctum firmiter Pleuræ cohererebat Pulmo: Imo etiam Epari, Lien, quæque ipfis nexæ partes, interventu fibrillarum nervearum innumerabilium miro modo fibi invicem uniebantur: Jam ab aliquo tempore Orthopnoea laboraverat, fubito valde extincta. *G. Blasius Observat. med.*

Kk 4

OBSERV.

OBSERVATIO XIV.

Dyspnoea à phlegmone pulmonum post venenum sumptum.

D. N. inquietudine, nausea, Respirandi difficultate afficitur, In pulmonibus deprehensa inflammatio ad livorem vergens. *Vide lib. 3. tit. de vomitu.*

OBSERVATIO XV.

Dyspnoea à pulmonum inflammatione & œsophogi.

Iuveni inter cornandum osculum in gula temanfit, hinc collum durum, tensum, & ad ipsum pectus tumefactum, cum dolore maximo, Dyspnoea. Oesophagus cum vicinis partibus plane sphacelatus: Pulmones ob præcedentem inflammationem lividi. *Vide lib. 3. Tit. de Deglutitione laesa.*

OBSERVATIO XVI.

Dyspnoea à pericardii & pulmonum phlegmone, hinc suppuratione.

Agricola plaustrum ruinam in se passus, de punctorio & gravativo pectoris dolore conqueustus est, cum quadam cordis compressione & dyspnoea, &c. Pericardium scatēbat pure copioso. Pulmo ejusdem labis particeps &c. *Vide Titul. de Pectoris dolore.*

OBSERVATIO XVII.

Constitutio interna & externa Senis, qui annos centum & quinquaginta duos vixit, cum Spirandi difficultate mortuus, ob Pulmones sanguine distentos & costis annexos.

Thomas Parte, pauper Comitatus Salonienfis rusticus, unde abductus à Nobiliss. D. Thoma Arundeli & Surri Comite, mortuus est postquam supervixerit novem Principes, decimi eorum anno decimo, ipsius ætatis CLII. & IX. mense.

Ejus cadaver, cum apertum fuit (vid. anno 1635. Novembris XVI.) repertum fuit admodum carnosum, pectus hirsutum, genitalia integra, quod nota fuit non exigua, qua firmabatur rumor ipsum publicas propter incontinentiam censuras subijisse, præcipue cum post hoc tempus (vid. ætatis CXX. anno) viduam duxerit, quæ agnovit cum eo rem habuisse ut alii mariti solent, cum ea congressum frequentasse: Porro amplum illum pectus habuisse, Pulmones minime fungosos, sed costis adherentes, atque multo sanguine distentos ostendit: livor in facie apparebat, sicut difficultate spirandi aliquandiu ante ipsius mortem laborabat, & durabilis post eam sub axillis & in pectore calor sentiebatur: Quæ signa simul cum aliis æque manifesta fuerunt in suo corpore ac solent in iis qui suffocatione moriuntur: Cor ipsius ingens erat, densum, fibrosum & pingue. Sanguis in corde existens diluto colore nigricans, Sterni cartilagine non magis olææ quam in aliis, sed flexibiles & molles: Sua viscera reperta sunt sana & firma, præcipue stomachus, & compertum est ipsum solitum esse sæpius noctu diæque comedere, quamvis contentus fuerit caseo antiquo, lacte, pane nigro, vili cervisia & sero lactis, Et quod magis notandum est, media nocte, paulum antequam è vivis exiret, cibum accepit. *Renēs* ejus cooperti erant pinguedine satisque integri, ut anteriori tantum eorum facie nonnulli aquei & serosi abscessus, ut videbatur, reperiuntur: quorum unus magnus erat, instar ovi gallinacei, flavescēte aqua repletus, quæ orbicularem cavitatem imprefferat in hoc rene, unde plurimum illum urinæ suppressionem paulo ante mortem passum esse cogitarunt: quamvis alii voluerint hanc urinæ suppressionem potius à regurgitatione serositatis in pulmonibus ortum habuisse. Nullum omnino signum repertum est calculosæ materiæ in renibus vel vesica: Sua intestina etiam labe intacta erant, nonnihil pallida circa superficiem: Splen ejus admodum exiguus erat, vix magnitudinem unius Renis adæquans: Ut paucis dicam, omnes ejus partes internæ adeo sanæ videbantur, ut si victum & aërem non commutasset, satis diu forte vitam produxisset. *Cerebrum* ejus repertum est integrum & firmum, & quamvis oculis captus esset, nec admodum valebar memoria aliquot annis priusquam diem obiit, auditum tamen & apprehensionem integerrimos habebat usque ad annum ætatis 130. quicquid rustici est operis perficere, etiam frumenta flagellis tricare potuit.

SCHOLIA

SCHOLIA.

I Plus mortis causa præcipue videtur & æris immutationi tributa est, quia à sereno, subtili & libero ære discedens in crassum Londini ærem venit, & post æqualem, simplicem & datum rursus videtur in splendendam familiam receptus est, in qua laute exsisteret, & copiose ex melioribus potabat vinis,

à quibus functiones sui corporis partium naturales supra modum onustæ fuerunt, Pulmones ejus obstruiti & totius corporis habitus male dispositus: unde non aliter evenire potuit quem ut citra sequebatur dissolutio. *Observatio Celeb. Harvi in Actis Regiæ Societatis Anglicæ an. 1668. & 69. pag. 69.*

OBSERVATIO XVIII.

Orthopnea ob Pulmones inflammatos à casu: Dextrum cordis sinum sanguine nigro repletum, &c.

A Nno 1587. obiit vir 54. annorum, alias robustus, qui ex casu decubuerat sine ullo sensu & motu sex diebus: Non poterat autem unquam jacere, sed cogebatur semper sedere in lecto, cum perpetua respirationis difficultate & periculo suffocationis.

Secundo cadavere, primo pulmo summè inflammatus repertus est, cum stridore & crebro spoli egresu inter incidendum, ut hujus cavitates humore totæ repletæ essent. Prodiit autem hæc inflammatio ex dextro cordis ventriculo, qui venam ad Pulmones emittens vicius hoc nimium replevit: Siquidem & ipse dexter ventriculus cordis, ad quem, pro sanguine perficiendo, vena cava insignem ramum porrigit, sanguine nigro, non tamen coagulato, sed tenui, torus refertus erat, cum aliquot filamentis ex pituita concretis, unde facile misce potuit suffocari. *Rumlerus Observat. 1v.*

SCHOLIA.

Dextro cordis ventriculo) Sanguis in dextro cordis ventriculo effectus, incalescens, parietes ipsius sensim magis magisque expandit, donec ista expansione irritatus cor, parenchyma suum musculolum, spirituum animalium ope contineat, simulque sanguinem contentum in pulmonalem arteriam capiat: ex qua per pulmonum parenchyma in Pulmonalem venam transfusus, ad sinistram cordis auriculam ventriculorumque sinistram pergit: Læditur hic sanguis per Pulmonis motus 1. quando nullus sit. 2. quando tardius. 3. quando celerius procedit. 4. quando alio quam quo decet propellitur languis. Vbi univ. sal. ac per omnia Pulmonum vasa coarctat motus ille sanguinis, valde impeditur aut cessat, brevi moritur homo, aut extinctus ob sanguinis defectum, aut suffocatus ob quendam copiam vel insignitiam, nisi confestim secunda vena redundans interueniat, vel pro tenata copiosius affluens alio evitetur: ubi autem in quibusdam duntaxat Pulmonum vasis, ob obstructionem moveri desinens sanguis aliquandiu ibidem stagnat, Peripneumoniam patit: *Præfixum Symp. Præfixum lib. 1. cap. 20.*

Vas hoc nimium replevit, &c.) Impeditur nonnumquam in suo Refluxu Sanguis, quoties is vel stagnat

subsistitque in suis vasis & vitiis, vel effunditur extra ipsa, sive hoc fiat intra vicinariam partium substantiam, vel corporis cavitatem, sive id accidat extra corpus ipsum: In vasis stagnans & paulatim collectus eadem magis magisque distendit, & ita quidem ut aliquando rumpatur, aut quoties modo alio exitum ipsi concedat, unde coniungit tunc sanguinis è vasis suis effusio, sive idem hæret in partium adiacentium substantia, sive colligatur in cavitatem corporis propinqua, sive effundatur in totum extra corpus: Causa omnis sanguinis effusus est Apertio vasorum quâlibet, sive illa fiat ex nimia vasorum à copioso, valde rarefacto, aut retardato sanguine, statibus distensione, sive ab humoris aut in vasis, aut extra ipsa subsistentis acrimonia rodente, sive à re dura & acuta valnerum, obtusive contusione, aut quovis alio idem coniungat modo. *Ibid. cap. 20.*

Sanguine tenui cum filamentis ex pituita, &c.) Cum Messier de Peripneumonia loquitur, notat quandam biliosam esse, aliam pituitosam: Porro pars quælibet laborat ab humore vel ut nutrimento, vel ut excitamento: Si pulmo laborat ab humore ut excitamento, à pituitoso humore laborat: Si tanquam à nutrimento, à bilioso, nutritur enim humore bilioso. *Idem.*

OBSERVATIO XIX.

Dyspnoea à Pulmonibus magnis, spumoso, atro sanguine turgidis, Exterior maculatis, gangrene notas gerentibus, &c.

Podagra Illustris Comitum Maximilianum Fuggerum diu habuit: habuit dico, quia à pedibus ejus raro secessit, orbavit gressu, causam effari non licet. Pilulis ex Turpetho minerali usus & hagioxyli decocto sepius: cum nec his cederet ad Thermas missus, & in Bollenibus aquis liberum incessum reliquit, in Badenibus Helvetiorum res ad grallos venit: Inter humorum acervos cumulum afflictionum sensit, & farraginem receptarum, nullum tamen auxilium recepit: Arthriticis dolores his ultimis annis observavi universales, ex destillatione à capite, non vehementes nec ardentes, vetum gravativos, & motum impediennes: præcessit semper gravado capitis, post nucha, dorsum, scapulae gravabantur ac si ponderoso onere gravarentur: Anno 1625. consilii loco ad Illustris quæ sita hæc respondis.

1. Quo

1. Quo Cantetia sint adhibenda? Quia copiosus humor ad consuetam fontanellam in brachio non fluat, neque sufficienter evacuetur ab ea, in opposito pede ponendum esset. Quia Fontanellæ quæ totius corporis gratia sunt, in cruribus ponendæ sunt, & quidem profunde, cum superficialiter nihil prosint, ut vult Vesalius, Solenander, Platerus, &c. in consiliis à Gaterio collectis.

2. Qualis Purgatio mensura instituenda? Pilulis consuetis Marocostinis: ventriculorum enim esse humidum & frigidum, unde crudi humores, quorum copia ex primis visceribus expurganda: Si illæ non placent, mihi consuetis utatur ℞. Aloes inebriatæ succis rad. Ebuli & primulæ veris ʒj g. Ammoniaci dissoluti aceto scyllit ʒss cum aqua betonica. formentur pill. Vel mco pulvere familiari de tartaro laxativo: ℞. Cholagogi infuscati, i. e. diagrid. ppti. cum fumo sulphuris, & postea succo rosar. pallidarum infuscati ʒss ermor Tatar. ʒss facculæ rad. aronis ʒj folior. Senn. mundat. ʒvj. M. F. pulvis, dozis ʒij vel ʒi.

3. An vernali tempore cura sudorifera instituenda? Cum sudor semper in humidioribus corporibus proficit, & inania spatia corporis evacuet, omnino profuturum.

4. Quasi vino utendum? Lacus Veneti, quæ Rhenanis propiora. Aeronii ut crudiora & magis styptica non prodesse, Ramensis ex Necarinis eligenda.

5. Qualia Topica prosint? Pedi dextro immobili vinaceorum usum convenire, calide, & cum remanentia quadam multo expressi fermentantium, quibus & sinister pes indendus.

6. Qualia corroborantia velim? ventriculo theriacanti, cum discutiat humores excrementitios, humiditatem absumat ventriculi, foveat calorem & omnem nutritionis æconomiam in ordinem redigat: in septimana bis, noctu iturus eubum ad drachmæ pondus suadere hoc Solenander, docete Galen. Caput lavetur lixivio medicato, betonica, verbenæ, chamædri, chamæpytide, rosæ, agarico, &c. Lotum exsiccatum fumo excepto linteis ex pulvere pretioso ad catarrhum: Pedes firmenut vel fortè ex aqua ferrata fabronum vel simplici, aut alterata verbasci, verbenæ, lavendulæ, rosæ, betonica, attemisæ, sale, &c. vel suffumigio ex sandata. Arab. ʒij thuris, succini ana ʒss rosar. rubr. femin. coriand. ana ʒij lignis aloës, garyophil. ana ʒi Benzoin. rotac. calam. ana ʒiv M. vel vestiamur emplastro diacalcith. ut docet Solenander, Strickam hoc anno obsecuravit dixit, licet antea minus sobrie vixisset. Venæ sectionem, à qua semper deterius, triennio omisit: Mannæ diluto in aqua sambuci purgatus optime: Flarus pilulis marocostinis & Francofurtensibus expulit. Anno 1627. persuasus à Medico podagrico, lotionis usus est pedum & brachii ex decocto ex halonitro & vitello, quod ut arcanum & in se probatum maxime exultit. Similis lotio est in cista Epistol. Hornungi, sed ea tendines pedum & brachii ita siccati sunt, ut atrophia laborarent; & tamen cum dolores leniret aliquomodo, scipius repetit. Assumpsit etiam intro alia exsiccantia corpus, ut Theriacam, mithridatium, spiritum tartari compositum, vinum Hispanicum & Gallicum, &c. quæ tempore inappetentia potius venena quam corroborantia medicamenta fuerunt. Paucis ante mortem septimanis de lassitudine conquestus, de Inappetentia, de obstructionibus mesenterii, de splene, calculus exagitavit vites, nec hoc exeluso tedibant: Itaque saburra accusatur & obstructiones mesenterii: exhibetur cremor Tartari, item liquor apozematis purgans, idque per vices, ac deterius habuit: Vocatur ego corroborantia & sistentia ordinavi, in purgationem antea non consentiens. Ambæ nares stillabant sanguine atro, proposita phlebotomia ad Dominicam Invo-cavit dilata; interim ille Bacchanalla utcunque vivit, inclinato capite & lassis viribus rheda evehctus urbe liberum ætem petit; incurvatio corporis & vox summissa testabantur de debilitatis viribus: domum igitur propetât, & in die cinerum, ad saltetium melancholiz fastidium in agrum expatriatur, & ovo sorbili sumpto lassus cubitum petit, dormit tredecim horis, expertecto adest dyspnoea, stillicidium è naribus sanguinis: famulitium ignarum debilitatis Comitibus gratulatur sibi de somno longo heri, sed curatorem adium cum visitans, deprehendit debilem, Ego vocatus, extrema extremis deberi remedia; postulanti venæ sectionem, sanguinem iussi demere, qui corruptus admodum, & quasi nullus sanguis erat: Disposuit domui suæ & circa principium noctis expiravit, a. Mattii 1629. 4. ejusdem cadaver conditum fuit, & simul in tendrem viscerum inquisitionem.

Dissecta cute abdominis decussatim & thoracis pinguedo copiosa membranam carnosam investiens apparuit, viscera ex abdomine aperto exempta, ligatis vasibus prius, exsiccavimus spongias cavo innatans humidum, Sic examinavimus.

1. Ventriculus magnus, membranofus, inanis quasi, (paucus enim humor ab assumpto Hispanico vino corrupto jam huiusmodi) sine crustulis, mucosa materia, rugis & pinguedine, quin & sine famelico & esuritivo humore.

2. Epar substantia, magnitudine, robore & robore integrum, in sima tamen, juxta cystis felleæ situm, virore bilioso parum maculatum.

3. Cystis

3. Cystis hæc in se paucum, crassum, subnigrum fellis humorem continebat, una cum decem lapillis magnitudine pisorum minorum siccatorum, coloris lutei.

4. Lēnis corpus non fuit magnum, boni coloris, satis compactum, sine sanguine crasso, nec bubulæ linguæ, nec vestigiū humani ænulum.

5. Ren dexter minor sinistro, arenulis tenellulis & subtilibus conspersus, sinister maior, in quo & arenulæ subtilissimæ, & lapillus ex iis concretus, triangularis, triabilis.

6. Mesenterium pingue.

7. Intestina flatibus plena.

Cavicatem Thoracis cum a visceribus, ligatis prius vasis, liberaremus, consideravimus:

1. Pulmonem, cujus substantia magna, spumoso, atro, sed tenui, pro natura visceris, sanguine turgida & repleta: exterius maculis luridis, lividis ac cœruleis passim conspersus, quem admodum in spermate ranarum bullæ seu pustulæ nigræ cernuntur, quales in parte inferioris Pulmonis vidimus, lividæ & fusæ. 2. Capsula cordis continuit paucum serosum humorem. 3. Sinister Cordis ventriculus habuit sanguinis atri multum: substantia ejus raræ, tecta pinguedine. 4. Vasa magna incisa sanguinis atri fundebant parum, nempe quantum una aut altera sponsa exsiccavit, &c.

S C H O L I A.

Viscerum dispositionem sic examinavimus. 1. Ventriculus magnus sine rugis, quia illustr. Comes, ut omnes illius sanguinis, statim comedit & mulla; qui autem multo cibo utuntur, aut crapulæ sunt dediti, illis ventriculus amplius & tenuis redditur, ut cor rugari amplius non possit, quæ foris causa deterioris concoctionis. *Bæmon Theat. Anat. lib. 1. c. 46.* Pinguedo non nisi in carnis est, idcirco sine pinguedine: Tenuis, an propter pugnantium medicamentorum, concoctionum sudorificorum? an propter spiritus accierci Tartari composuit an ob ejus cremoris frequentem, an propter calefactionis immodicæ sumptu dicitur noster *Pyrrhus*, accensum inflammatorum & calefactionem ventriculi? Ceteri ingenui in eo humor nullus, nec admodum crassus, vel à vino Hispanico suppressus, ob quem summa inappetentia: Cum itaque inappetentia adest, non statim accensum obstruendo menterii, substat copia in ventriculo, nec supercilioso consilio de nota, deque ejus amotione hant longa consilia; dispartitur accurate, sed vane, proponitur aperientia, purgancia, tartarea, spiritalia, peracat calamus, charta in mensa posita complicitur, ad sit à dextris cultos aramentis, insignitur character schedulæ, ut signum mercibus, subijciatur congestes ingredientium, coctum, colatum ac dulcoratum proponitur exurgens apozema.

Nam hoc semper evacuabile aliquid excrementi ex nostro corpore, sed una spiritus: Non sola cæcitate omnis morbi absolvitur curatio, quilibet habet propria indicantia; nec is medicus erit qui semper à corroborationibus, quæ etiam in cacochymicis destruentia sunt, incusat: Methodo opus est, in quo omniom secretorum in Medicina, si ex optime cognito morbo refertur, scaturigo posita est, ut quidam magnus *Acacius* lapilli Italus pro lectione dixit, & quidem vere dixit, sine enim judicio data secreta medica secernant animam à corpore. Sic imponere ovis situm doloris historia fecti cadaveris docet: Epus & Lienis integritatem vidimus, & tamen illa à medicis accusata fuit: Et sane ovis fere nostrum erit, nisi ex Lynceis sit, qui audiens ægrotos consequentes de ardore & dolore in sinistro hypochondrio ad dextro, qui non ægros de visio hepatis aut lienis garrat: Et quod apud nos frequenterium est, ut omne peccatum abdominis illi visceri adscribat in cuius sede sentitur dolor, sic noster Comes audiebatur spleneticas. Virgo ju-

venula. Vide tit. de Hydrope) ex viscerum detrimen- to in hydropem incidisse, & magnitudo omnium par- tium. *Ide ibid.* dicebatur Hydrops. Annon liceret dicere Medicionem & Medicos regi opinionibus, ægro pati & mori: Audiantur & peregrina, illos enim intra muros peccatur & extra: Excell. Gr. Hortius 1628. hæc ad me de Eiferichio, Nobili Bavaro, Scorbuto, D. Sagittarii literæ Lienem neque Insignis magnitudinis, neque coloris usque adeo prave exitille, &c. Quibus subjungit D. Hostius. Ex utriusque relatione constat quod salvo Lienis (contra communem opinionem) dispositio Scorbuto sæpius adesse queat.

Lapilli in cysti fellis inventi, nil rari: *Liberius* ear 4 fas lithogeseis hujus epist. 64. & 68. in cista medica has asertit: Marcius lapidum in hominibus magna sulphuream quam saliam esse, & hoc lapides hi altissime videntur: Vnum addo me apud mercatorem vidisse lapidem in cysti fellis bovis inventum, in vino infundi & exhiberi adversus calculi dolores cum fructu.

De pulmonibus quid dicemus? mirabatur maculatos Medicos domesticos: Ego omne illud violentum, quod prius artibus molestum ad pulmones ascendisse, quod inflammasset aliquomodo, quia eorum color peripneumonicorum linguæ apud Hipp. similis erat, certum gangrenosam quid passum esse, subnigra non fuit mors, etiam ignoscibus vita, spiritus enim vitales & naturales, imo & animales, jam longo tempore deficiebant, & suffocatus videbatur quam eum spiritus defecissent prius: spiritus enim & languinem regit & vivificat, ac hic putris in vocis & quasi nullus fuit, ut ex vena educus demonstravit; & qui in cerebro non rogebatur, effluxit, ex nanibus aer, ex auribus parientiam aberat: febris, forma solum ultima nocte longus & laborem faciens; locutio ad æqualis usque incitium, motio & assurrectio corporis ad horam proximam mortis ultionem, negat cerebrum quid apoplectici passum esse.

Clariss. *Reynus* de hujus cadaveris perustratione hæc, Anatomiam exaviarum illustr. Comitris libenter legi, nec aliam substantiam mortis causam invenio quam cacæthum Suffocativum, non tam ex copia destituentis materie, quod aliis fieri solet, quam quod nervosum genus debilitatum admodum, illas quoque tandem propaggines, quæ pectorales in musculos disseminantur, & præ cæteris in ipso quoque

quoque somno sufficientem ad respirationis motum animaleml influunt & *apine* recipiunt, ulterius regere non possunt: qua ratione confirmatos arthri-

ticos perpetuo tandem asthmale quasi suffocati ex-
pertos sum. *Methodum Decade II.*
casu. 12.

OBSERVATIO XX.

Dyspnoea à vitioso lobo dextro Pulmonis.

Filius Dom. le Noir Difficultate spirandi interit, cum *rancedinem* quandam habetet *caninam*, & tumentes paulum fauces. Pulmo etat parte dextra vitiosus. *Ballonius Epid. & Ephem. lib. 2. pag. 201.*

S C H O L I A.

R*ancedinem caninam*) Infantium Rubiolarum in pueris praecursorum, quatum materia nili foras prorumpat, in Pulmonibus laepe defigitur: Ejusmodi Dyspnoeae causas sic explicat Ballonius Lc. Difficultatis, aut, spirandi causa aliquando non tam est in Pulmone ipso, quam in regione hepatis aut lienis; Et quod inleto febrium, aut contumacium aut intermit- tentium, nausea, dyspnoea sicca tussis, & *canina*, pandi- culario, suppressio & ephialtae species inducitur: ita si movetur materia, & species quaedam febris, inus so- venit, quandam spirandi difficultatem asserere potest, quam nec ad catarrhum suffocantem, nec ad vitium pulmonum referre debemus. Filius D. N. videbatur

casurus in has affectiones orthopnoicas: dyspnoea erat & obaudiebatur strepitus magnus cum rancedi- ne: Id ad crudum succum referebatur, Aut ad fluxum malignum, in pulmone excitatum: at adventantis rubiolaris id fuit indicium: An non ea dyscrasia sit in pulmone eo modo quo in metu morbiliorum, ut spi- randi difficultas inde oriatur? Alius puer vii. annos natus consimili morbo interit, non est deprehensa tam gravi morbi & dyspnoeae causa: Eo tempore va- gabatur tussis, vulgo *Quinte* dicta. Et quod ex intervallis facti Quinze tussis causa fugax, id facit eadem causa fixa, hic perievertat difficultas spirandi usque ad interitum.

OBSERVATIO XXI.

Dyspnoea à Pulmone tumente & quodammodo exeso, cum humore tenaci & purulento in eo concluso.

Rever. & Illust. Praeful. arthritidi obnoxius, cum jam xv. dies febris, arthritis, sopor aliq; symptomata crudeliter exercuissent, Ecce derepente insolita accessit Spirandi difficultas, ad sublimem accedens & rectispira, &c.

Eo defuncto Pulmo insigniter tumidus & quodammodo exesus repertus, in iisque unus humor albus & tenax ac purulentus delitescens, &c. *Carolus Piso de morbis à sero Sect. v. c. 1.*

OBSERVATIO XXII.

Dyspnoea à Pulmonibus ichore spumoso refertis & discoloratis.

Senex obesus, respiratione difficilli & anhelosa affectus, derepente mortuus in humum concidit: Thorace aperto Pulmones discoloros & ichore spumoso per totum refeti dyspnoeae causam prodebant. *Vide lib. 1. Tit. de Soporosis affectibus.*

OBSERVATIO XXIII.

Orthopnoea à Pulmonibus semiputribus purulentis, nigricantibus.

Magnus in Germania Princeps, cum ætatis anno xviii. frigidam liberalius potasset, dif- ficillimo mox Asthmale correptus est per intervalla: paroxysmi, ut qui crasso & obatio esset corpore, graves erant: Sæpe in id patatæ ut integros dies & noctes sedens etiam dormire posset: Sæpe per biduum & ultra ita reclusus insidere solebat, ut vete ortho- pnoicus dici posset: Libetatus tamen est à difficilli hoc malo, ætatis annum agens circiter xl. culque plurimum profuerunt Badenses thetmæ.

Post mortem tamen inventi Pulmones magna ex parte nigri & putridi, non sine pure, ea præsertim parte qua dorsum attingebant. *Oswaldus Gabelherwerus.*

S C H O L I A.

R*igidam liberalius potasset*) Hinc impedito libe- to per Pulmones sanguinis commessu, qui inde labem concepit, ipsorum subitaneæ communica- tum: Seaguit in vasis sanguinis, inquit *Frans. Syllus Pract. lib. 1. cap. 40.* vel ob Pleuroam ad vasa, vel ob Angu- stiam, & præsertim Obstructionem. Obstruuntur ve- næ ab ipso sanguine, Piuivæ in ipsas coagularis ac

concretis. Sanguis coagularur & à frigore aëris vel Aquæ incendio, partes valde afficiente, &c. Piuivæ coagularur in dictis vasis ab iisdem causis, frequen- tissime tamen à frigore Aëris, Aquæ Potus alioum- ve Partes prius calentes subito infestante, atque pi- tuosam viscosam imprimis, quacunque de causa, in tenui præsertim intestino solutam, hinc ad sangui-

nem deductam, & cum ipso quaquā verum propulsum iterum inhibere cogente ac inspissante. De Frigiditate poras inimicitia erga Pectorales partes vide *Stippes*. lib. de Liquiditatē & aphor. 24. § 2.

Pulmones magna ex parte nigri & puridi non sine parte) Abscessus in his inflammatione: Sanguis enim in nominatis vasīs stagnans, & paulatim collectus, eadem magis magisque distendit, & ita quidem, ut aliquando rumpatur, aut quovis modo alio exitum ipsi concedant: unde consingit tunc sanguinis vasū suis effusio, postea hærens in partium adiacentium substantia, ubi collectus sponte mox excandescit & caloris sensum molestem in parte producti, ac sensim corruptus in pus vel saniem abire solet; Prior mutatio vocatur Inflammatio; Posterior Abscessus vel Apoplema: Arbitror autem incendi ac inflammationem parere sanguinem, quatenus ex ipso in vasīs suis valde distinctis, partibusve quibuscumque aliis subsistens, hoc est stagnans, mox incipit evanescere partes spirituosas, magisque volatiles ac subtiles, cum acidis tum salinis temperate solitis, unde utique aciores factæ acris in se mutuo insurgunt, effectū violentiamque ad partes sanguinis oleosas præsentem calidam excitant; quin paulatim sanguinem ita corrumpunt ut in Pus vertatur. *Idem ibidem.*

Cui plurimum profuerunt, &c.) Ad Inflammationis ergo, hinc & Abscessus sequens, curationem requiritur 1. ut Obstructio vasorum tollatur, 2. ut Subsistens stagnansque sanguinis motus restitatur. 3. ut Sanguis & vas effusus, si fieri potest, ante sui suppurationem inde removeatur. 4. Si temoveri, atque adeo suppurationi impediri nequeat, ut eadem promoveatur: Obstructio vasorum à pituita viscosa, vel sanguine in ipsis coagulatis, cutibusque assumptis & a moria peccantem humorem loci ventris, iterumque fluxilem facientibus: Inter interna conducunt præ aliis Salia volatilia ex variis animalium partibus

parata; quippe que egregie vi pollent coagulata & conglutinata omnia dissolvendi, eademque ad primitivam fluiditatem reducendi. Hinc est quod exhibito tempestive unico sæpe sudorifero, ex liquidis salibus volatilibus aut similibus parato, Pleuritis, Laceris nempe inflammationi, abique ulla utraque apertione, fuit felicitissime curata. Hinc est quod Mixture ex similibus paratæ, atque coactæ per intervalia breviter usurpant, tum Pleuritidem tum Peripneumoniam curaverunt: Exemplum hoc est, *℞. aqu. peruviana, hyssopi, fennicæ ʒi obnox. simpl. ʒb spiritus salis armon. ʒb laud. Opus gr. rr. fr. papav. err. ʒi m.* Inter externa conveniunt Ung. martiarum, Cataplasmata magis dissolvencia quam emollientia, que humorem coagulatum, sanguinem pituitamve incidant & solvant, ex partibus nempe plantarum acris & aromaticarum: Sanguini autem stagnanti, & in vasīs suis subsistenti, restituitur motus felicitissime sudoriferis, aliquando sanguinis missione: Sudoriferis, quatenus ab ipsis fluidior & mobilior fit sanguis, magisque rarefit à volatili sale ibi existente. Dum enim ad dextrum coëda ventriculorum perstringit earum sal volatile, ibidem amplius rarefit sanguis, ac non tamen sponte sibi exitum querit, sed & cordis ventriculorum amplius expandendo, ipsam ad frequentiores & validiores contractiones cogit: Venæ ictione autem, quatenus in eadē locum sanguinis transfertur vicinior, atque factio sic universo sanguinis spatio ampliore, movetur quoque sanguis omnis cum celerius tum potentius: quocirca & ille qui prius in vasīs suis stagnans subsistebat, nunc vero subacta plethura non sinitur amplius, sed & cordis ventriculorum amplius dum potentius constrictur: Tunc autem post hæc sanguinis detractionem sufficientem, utile est partis vicibus habere miluram dictam sudoriferam & incidientem. *Vide*

plana leu utro.

OBSERVATIO XXIV.

Dyspnoea à Pulmonibus media parte aqua tumidis, cum parenchymatis duritie.

REv. Parer febte assidua cum destillatione ad pectus consistatur: accessit gravitatis sensus in pectore, cum tussi, spirandi difficultate vehementi: Inventa est altera pulmonum pars aucta in magnitudine, altera quadruplo major & durior, qua secta multa aqua fetida exiit, & caro inventa densa, dura: ab eodem latere nonnihil læsi musculi intercostales. *Vide Tit. de Febribus.*

OBSERVATIO XXV.

Respiratio lēsa à gangræna Pulmonis.

IN Domini Coliches infante, in dextra parte pulmonis copria ichoris albi reperta est, inter puris, unde Dyspnoea, sed tussi non afflicta est: Ultraque pars Pulmonis nigricabat. *Christophorus Rasternus in Miscell. curiosis anni 1672. Observ. 337.*

S C H O L I A.

Pulmonibus læsis non, necesse est ut semper tussis adit: itaque non concludendum est, Tussis nulla molestat. Ergo salvi sunt Pulmones: *Servemus de Abscessibus pag. 269. contra Galenum statim Pechisio, & demonstrat, in qua Pulmones non sunt exulcerati, sed factem putrida quadam laxeitate infirmi;*

quod fit quando macore pituitoso ac semipartī diu multumque alluante: Gangræne vero in hoc infante causa, mea quidem sententia, fuit ichor ille albus perpetuus, quiproculdubio valde frigidus, & venenata qualitate infectus, calorem nativum Pulmonum exstinxit. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO XXVI.

Asthma à Pulmonibus viscidis oppletis humoribus.

Filius Dom. ab Hartzveck à commotione cerebri post casum Asthmaticus factus est. Tandem novo incidente catarrho in pulmonem, decessit à vivis. Cadavere incisio Pulmo ubique pituitosis & viscidis humoribus oppletus repertus. *Phrynius Hildanus cent. 1. Observat. xi.*

SCHOLIA.

Noxy incidentis catarrho) Dyspnoea aliquando est sine febrili, ubi materia occupat propriam pulmonum substantiam non vias. Sin hæc incidit in bronchia, motus fontis accedit. Angustia est maxima si duo casus concurrant, oblectis scilicet nam pulmonum parenchymate, tum bronchiis: aut quando materie crasse in viis detentæ, supervenit tenuis præcepto illapsum, unde catarrhus suffocativus: Hinc ratio deducenda eius dyspnoea laborantes aliquando orthopnoici evadant, qui erecti corvix facilius respiciant, quod pulmones tunc temporis debiles ac costæ minus graventur pulmones, minusque bronchia à mole pul-

monum, opprimantur. Catarrhi autem generationi in Puero, aniam dedit casus, quem commotio cerebri, hinc debilitas sequitur.

Pulmo pituitosis humoribus, &c.) In spirandi difficultate ab ejusmodi causa inducta, non esse formidandum etiam frequentem & magnam purgationem, quanquam multi prohibeant, ostendit *Rathmus Epid.* & *Ephem.* lib. 2. exemplo marionæ orthopnoicæ, cui magna copia pituitis in pulmone, frequentius ventris purgatione expurgata est, unde facili sequuta anacatharsi convaleuit.

OBSERVATIO XXVII.

Asthma à pulmonibus pituita putrida & purulenta infarctis, &c. Cordis ventriculi dextri ulceratione, &c.

Clariss. Domina de la Roquette sexagenaria, pinguis admodum & obesa, vitam agens sedentariam, à xv. annis dyspnoea laborare cepit, quæ paulatim incrementum susceperat, ita ut jam scalas ascendens in 3°. vel 4°. quoque gradu quiescere cogeretur, Circa principium Januarii 1642. cum iter faceret in aëre austriaco & pluvioso, subito correpta est catarrho, partim in pulmonem partim in mandibulas delabente. Inde aucta est difficultas spirandi, & tumor apparuit in gena dextra, tum mandibulæ ita erant coarctatæ ut iusculum tantum sorbillare posset, Corripi solebat per intervalla, jam à multis annis, Erysipelate tibiarum sinistrarum, quod sæpe exulcerari consueverat, & ante hujus catarrhi invasionem etiam apparuerat cum ulceratione insigni: Vocatus ad eam 8°. die morbi, invenio Pulsum admodum inæqualem, & tertiam vel 4. quavis pulsatione intermittentem, cum difficillima respiratione. Unde conjeci grave esse malum, non solum in pulmone, sed & in corde, aut vasis cordi proximis. Quod prognosticum certius reddebatur, ex eo quod ulcus Erysipelatis subito ac repente exsiccatum fuerat, juxta Aphor. 25. 6. Præterea resolutio paucis diebus genæ tumore, mandibulæ nihilominus clausæ permanserunt, rîmque apparuit illam constrictionem mandibularum, à musculorum eas moventium convulsione pendere: x v. morbi die matutinis horis dexter oculus clausus apparuit, altero aperto existente, quod contigit ex palpebræ paralyti, quæ graviores affectum minabatur, qui eodem die post meridiem contigit, scilicet Apoplexia levis, à qua intra duas horas aliquantulum resurrexit, sed media corporis pars, sinistra nimirum, reddita est paralytica, Et tri-duo post, sensum fatiscientibus viribus, extincta est. Toto morbi decursu nulla talis difficultas spirandi comitata est, neque stertor, nisi per unum diem ante iterum.

Aperto cadavere, Lien repertus est putredine affectus, ita ut levi compressione in frusta discederet. Pulmonis substantia livida, & humore aqueo perfusa, unusque illius lobus, ad sinistram partem situs, pituita putrida & purulenta refertur. Cordis ventriculus dexter parte interiori membrana denudatus, putridus & exulceratus apparuit, ut illius fibræ carnosæ, summis digitis contrectando, in frustula secederent: Auricula dextra solito majore apparuit, & omnino rosea substantia quadam carnosæ, partem rubra, partem nigricante, sanguini concreto similis, quæ tamen manibus dividi non poterat: Hos duos affectus, auriculæ nempe & ventriculi dextri, puto causam fuisse tantæ Pulsus inæqualitatis & intermissionis, dum Cor rem sibi molestam excutere tentans, variis modibus quateretur: Unde Pulsus naturalis interruptio atque interceptio ciebatur. Spirandi vero difficultatem à Pulmonis infarctu ortam esse satis manifestum est. *Riverius centur. 2. Observ. lxxvii.*

S C H O L I A.

N (*Ulla Ratio*) Quia scilicet putrida illa & purulenta pinda bronchia pulmonum non obstruunt, sed parenchyma erat concepta, quod *insensibile*, hinc cum initio non perciperetur, nulla incitatio ad tussim sequuta est, neque illertor, ob meatus eorum non obstruunt; his vero à materia extrinsecus subsistente compressis respiratio difficilis evasit. Neque etiamnum materia in levibus arteriis contenta tussim movet, etsi asthma producat, ratio est ex *Abocidero* §. de Cachar. cap. 4. 1. eorum imbecillitas. 2. quia sunt organa sa-

cuitatis naturalis, Tussis autem fit parum à natura, parum à causa morbifica, ex Galeno, 3. quia sunt instrumenta spirituum & sanguinem deferentia, atque cum sint sanguini alienæ, nequaquam ab humore irritantur ad difficultatem, sicut arteriæ, si soli aëri deferendo dicantur, quæ ab humore quolibet, etiam benigno, ad tussim proritantur.

Causam fuisse tantæ Pulsus inæqualitatis §. Vide Scholia ad Observationem sequentem.

OBSERVATIO XXVIII.

Orthopnoea à materia crassa & pituitosa in substantia Pulmonis, intra & extra bronchia.

Materia crassa aliquando continetur in ipsa arteriarum asperarum cavitate: Quandoque vero in ipsa Pulmonum substantia, & tamen orthopnoeam gignit, cujus rei vidi experientiam in Clar. Veneto Milledonio. *Saxonia Præf. Practic. part. 1. cap. 26.*

S C H O L I A.

Maffarius Avicennam reprehendit, quod statuat humorem Asthmatis causam contineri quandoque etiam extra bronchia pulmonum, in ramis levium pulmonis ateriolarum, quarum propagines multæ per Pulmonem distribuuntur; statuitque si in pulmonibus obstruantur propagines, non aperiæ arteriæ, cor laborare, pulsusque huiusmodi, minimeque asthma excitari, nisi bronchia pulmonum simul obstruantur: Verum enimvero materiam, asthmatis causam, quandoque etiam extra bronchia, in aliis pulmonum vas, imò in ipsa pulmonum substantia consistere, multæ Medicorum observationes docent. Et patet id ex eo quod qui asthmate laborant, non continuo cum stertore & sonitu respirant: neque enim semper tussunt, nec si tussant, tussis tamen sicca est; quod minime fieri debet, si materia in aperiæ arte-

riis pulmonum semper consisteret: Nam aër materiam transiens, & dispendens, solumque & stertorem excitat, & quicquid in aspera arteria, ejusque ramis exitit, tussim excitare solet: Et licet verum sit levibus arteriis affectis materiam in Pulsu fieri, tamen & respiratio tunc quoque aëri potest, si obstructio illa tam magna sit, humosique tanta copia, ut & asperæ arteriæ comprimantur, angustioresque reddat: docentque hæc factis paroxysmi asthmatici; qui per intervalla materia agitata in vas excitantur: Ideoque si materia in levibus arteriis consistat, & asperæ comprimantur, sive in utroque arteriarum genere consistat, simul & asthmata & pulsus inæqualitatem parit: Et ipsa origo asthmatis factis docet causam potius in venis & pulmonis substantia quam aperiæ arteriis contineri. *Sentenent.*

OBSERVATIO XXIX.

Asthma productum à materia pituitosa substantiam Pulmonum insarciente.

In quodam nomine Britio, Asthmate mortuo, Pulmo tanquam spongia imbutus multo humore pituitoso inventus est. *Hollerius Præf. lib. 1. cap. 25. in Scholiis.*

OBSERVATIO XXX.

Dyspnoea à materia contenta in Substantia propria Pulmonum.

In Dyspnoea aliquando non adest sonitus, quia talis si fit ex materia contenta in substantia propria Pulmonum; non in viis, facit difficilem spirationem absque sonitu, Observavi Venetiis in Clar. quodam Secretario cujus sectioni interfui post mortem. *Herc. Saxoniæ Pantbei lib. 2. cap. 4.*

S C H O L I A.

A (*Liquando non est sonitus*) Uti nec cum destillatio muculos prætoris invadit, de quatinus exemplum habet Ballonius Epid. lib. 1. p. 177. N. à destillatione ferina & dissipatione humoris, non à capite tantum, sed reliquis partibus ita undeunque est oppellus ut thoracem dilatare non possit: Externum erat malum & dolorificum: cruda & maligna erat materia, Et eadem est que catarrhos suffocantes facit, febribus potius fuit symptomatice: multo alvi pro-

fluvio liberatus est, admirabilis fuit hic morbus & Medicorum opinione major: facultas animalis non erat imbecilla, nec vitalis nec naturalis: mirum est quod *ipsa pons* consulti: sed tam non fuit ab imbecillitate naturæ quam à particulæ redundancia humoris naturam molestantis: circa xxx. aut xxxv. diem fodor subignis erupit toto corpore, fetens & venenatus: infecti enim eam custodem que manum corporei sudanti applicaverat.

OBSERVATIO XXXI.

Spirandi difficultas ab abscessibus duobus in infima Pulmonum parte.

ACre erat gelu, noctis initium cum Nob. Vir foco assidens, Bacchôque indulgens, vesicæ onere premeretur, qui foras progressus, inspirato aëre frigido, moxque reversus, adeo vehementer respirandi difficultate correptus, ut suffocatus propemodum fuisset, & nisi præsto mox perisset: hominem reperi pedibus vix insistentem, frontem tensam, sudores frigidos, alvus præ angustia excrementa deposuerat, pulsus tam exiguus ut pene nullus: Assumpto pulveris croci ʒ cum vini Cretici duobus cochlearibus, subito restitutus, libere respiravit, ab omni suffocatione liber, & potuisset in sanitate permanere, nisi pulmo male affectus fuisset, sed cum asperæ arteriæ ramuli subinde obstruerentur, quandoque etiam dyspnoea recurrit, minus tamen quam primo tempore vehemens, sed diuturnior, at quandoque duabus, tribus vel pluribus horis perseveraret; Crocus, qui initio multum ac cito profuerat, postea exiguum, deinde nihil amplius contulit: Tentata sunt & alia plura remedia, sed frustra, nam revoluta mense decessit.

In hujus Pulmonis inferiore sede ac basi, qua septo incumbit, reperti sunt abscessus duo, unus in dextra, alter in sinistra parte: per meatus Pulmonis purulenti ferebatur humor, qui inciso pulmone ex ipsius deſuebat. *Dodonæus Observ. Med. cap. xix.*

OBSERVATIO XXXII.

Dyspnoea à corporibus glandulosis in Pulmone, Sinistri lobo fere corrupto.

IN optimi Viri nuper Pulmonibus *Glandulosa* reperimus corpora, maxime in dextræ partis lobo, coloris Pulmonum; majores & minores. Sinistræ lobus aliquomodo corruptus & gangrenosus lituris variegatus. Hic aliquando hujus partis laboravit pleuritide à qua liberatus deſlexu in pedem: Spiritus ipsi erat difficilis aliquo modo, sed haud pro notatu hujus affectus. *Observatio D. Danielis Geiger Medici Augstani.*

S C H O L I A.

G*landulosa corpora*) Quoties ob vitiatam in dextro cordis ventriculo sanguinis ascendens descendit effervescitiam, vitius exister sanguis ex utroque exurgens, lædetur ipsorum Pulmonum nutritio, & quidem citius, faciliusque potentius quam ulla alia corporis pars, si ex parte saltem nutriantur sanguine à dextro cordis ventriculo accedente, quippe qui minus temperatus est alteri è sinistro cordis

thalamo effusus, & ab inspirato aëre plus minus loſidem temperato: *Sylvius de le Vie Pract. lib. 1. c. 14. § 3.* Depravata autem hic est nutritio à sanguine vitioso, vel vitiosis humores admittos habente: Ex *Plateri* sententia, cum sanguine ad Pulmones allabente per eorum alimento, confusis simul succis glandularum nutritio deſtinatus.

OBSERVATIO XXXIII.

Asthma à vesicis humore flavo plenis in Pulmone.

Ilust. Cardinalis Caetanus post fonticuli in crure dextro occlusionem, quatuor à mensibus afficitur respiratione præter naturam, celeri, frequenti, instar eorum qui vehementer sunt moti, major tamen in inspiratione quam in expiratione difficultas occurrit, cui immensa sitis, faciei color & vigilæ connectuntur: quod exspuitur exiguum est, salsedinis non expers; febris quoque lenta comes est. In spatio trium mensium ad ultimum vitæ exitum est deductus.

Secundo cadavere inventus est *Pulmo vesicæ plenus*, quibus apertis aqua exhibat flavum colorem referens. *Lalins à Fonte Consultat. viii.*

S C H O L I A.

P*ulmo vesicæ plenus*) Quæ constitutio non est præter naturam, nisi quatenus ex majores, & apertæ flavum humorem effundebant. Si fides adhibenda *Mate. Malpighi* Præfectori Bononiensi, qui diligenti indagine adinvenit tantam Pulmonum molem vasis excurrentibus appensam, esse aggregatam quid ex levissimis & tenuissimis membranæ, quæ exteriæ & sinuæ pene infinitas vesiculas orbiculares & spon-

das efficiunt, veluti apud favis alveolis ab extensa certa in parietes coſpicuas: quæ talem habent spongiæ & connexionem, ut ex trachea in ipsas, mox ex una in alteram patens sit aditus, & tandem deſinans in continenter membranæ: His concessis, nemini mirum sit si vesicæ in Pulmone aliquando manifestæ sunt humore turgida, quin potius quod frequentius non occurrat.

OBSERV.

OBSERVATIO XXXIV.

Dyspnoea ob Pulmones steatomatibus obfessos.

Non solum in Pulmonibus steatomata comperi, sed & ossicula non parva. *Columbus lib. xv. Anatomies.*

SCHOLIA.

Steatomata ad Tubercula referenda; Tuberculum autem duplex est, aut erudum & suppurationi ineptum, quale est atheroma aut steatoma: quod genus Tumoris scribit Columbus lib. xv. se in suspitiosis scetis saepe invenisse: Aliud ad suppurationem tendit, quale contigit filix Agelis apud Hippocr. lib. 4. Epid. 6. 4. quæ tamen fuit sine febre: Hinc colligepus cetera febrem in pulmonibus colligi posse. *Saxonia prælect. Præf. 1. cap. 16.* Tuberculorum autem in Pulmone generatio depravata eorum nutritionis scabula est. Depravatur pulmonum nutritio, inquit *Clar. Franc. Sylvius Prædic. lib. 1. cap. 24. §. 10.* à sanguine alteruto, (ascendente sc. vel descendente) vel utroque vitioso; vitiosos scilicet humores admittos habente: Hæc causis, nunc à bile, nunc à fæco Pancreatis, nunc à saliva, nunc à liquore hoc ternario exurgente; nunc à chyle, nunc à lymphæ, quovis modo vitiosis; nunc à sere in senibus haud secreto, verum in sanguine præter naturam permanente, & si quæ sunt plura quæ sanguinem vitare possunt ac solent, pendicibus debet Tubercularum hinc inde in pulmonibus

sæpius observationum extoritur. *Substantiaque ipsarum mollis & spongiosa muscio in ternasem, & edematosam, multitudine modis siliis duratam, solidatam alterve à naturali consistensla descilicentem:* Materiam vero Tuberculorum in Pulmone Hippocr. duplicem statuit; bilis & pituitam, i.e. humores calidos & frigidos provenire vero præcipue ab externa aliqua violentia statuit lib. de salubri Dieta: *Quisvisque, ait, delensum sunt ex refrigerio, sive ex extenuatione, sive ex alio aliquo labore, de quovis sensu, cum distinetur: potenter autem utantur quæ quæ panisforma in corpore assumpta plurimum artus ducat, quo vena referitur infusa non distenduntur repleta:* Ex talibus enim Tubercula oriantur & fiunt. Et enim sive ex causa externa sive interna venæ violentiter distenduntur, aut amentia, progerminant & simul materiam loco distento subministrant, seu sanguinem, naturalem seu humores vitiosos, ex quibus formantur Tubercula: Possunt tamen sine externa violentia à causa interna talia Tubercula fieri, non solum ac Tumores in aliis corporis partibus, cum pat. subis vario, *De signis consule Sennertum.*

OBSERVATIO XXXV.

§. 1. Asthma à Tuberculis in Pulmone, & Corruptione lobi dextri.

Tuberculum Pulmonis potest esse duplex, aut erudum & suppurationi ineptum, quale est steatoma aut atheroma: Id genus tumoris scribit Columbus lib. 15. se in suspitiosis post mortem scetis saepe invenisse: Aliud ad suppurationem tendit, quale contigit filix Agelis, de quo Hippocr. 4. 6. Epid. 4. & tamen fuit sine febre: unde infero in pulmonibus contineri posse pus nulla existente febre. *H. Saxonia Prælect. Præf. part. 1. c. xxvi. §. iv.* Binos fecui quorum uterque Dyspnoea ob cruda ab initio tubercula tentabantur. Utrique tamen suppurationi successit: uni quidem post duos, alteri post tres; ab initio affectus mensesi uterque sanguinem cum pauco pure & frustulis pulmonum expuit: Secundus antequam obiret, & jecotis tumorem satis magnum incurrit, ex quo hydrops leucophlegmatia, Post sectionem ambobus dexter pulmo interius prorsus corruptus, exterius jam pleuræ coaluebat. *Idem apud Schenckium.*

§. 2. In Pulmonum substantia congeri potest humor erudus viscidusque, & consistentis in tuberculum erudum congestus ac incuneatus, & vesicula etiam conclusus, qualem vidi in cadavete Nob. adolescentis. Car. Psjo de morbis à jero Sect. 3. cap. 4.

OBSERVATIO XXXVI.

Orthopnoea à Pulmone vesicis repleto, Hydropse thoracis, Jecoris tumore inflammatorio.

Anno 1600. Nobilis adolescens Burgundus, orthopnoea inveterata à multis annis, & febre funesta laborans, extremum obiit diem, vi morbi jugulatus. In ejus cadavere, præter inflammatorum in epate tumorem, repertus hydrops thoracis, sed in uno duntaxat latere, Ex Pulmo vesicis humore consistente, lentoque & pellucido, lustrat albuminis ovi prægnantibus repletus.

S C H O L I A.

Non est difficile inquirere hydatidum quæ in pulmone observantur: Nam quid mirum si serum tantillo mucos, vel potius purulentæ materiæ exquisitè permixtum alicubi colligi; & ejus partis siue pituitæ lenæ partem concrefcere in vesicam siue

cystis, ut in abscessibus satis frequentibus, atheromate, steatomate & meliceride? Nam hydatides ceterè citra abscessum nunquam mihi observatae.

*Carolus Piso de morbis à caliditate
ferreâ Sect. 3. cap. 7.*

OBSERVATIO XXXVII.

Dyspnoea ab ala dextri Pulmonis superiore & inferiore empyemate affecta, Ingens vomica in superiore, Pulmone per totum viscido pure obfito cum suis vasibus, & costis annexo, Alarum mutua cohesione, &c.

Herman Steas diu de anxia asthmatica constitutione querulus fuit: In ejus cadavere aperto miserandam Pulmonis constitutionem deprehendimus; nam lateris dextri ala superior & inferior empyemate infecta erat, ita ut in superiore ingens vomica, pugni capacitate, existeret: circumcirca autem undequaque ipsum pulmonis parenchyma pure viscido, tenaci erat oblitum, ita ut vasa quæ multiplicia per pulmonem decurrunt, viscida ejusmodi purulenta materia impleta essent, &c. Exterior Pulmo arctissime annexus erat costis, ipsæque alæ inter se firmissime copulatæ, adeo ut Chirurgi manu multo conamine avulsio facienda esset: Sinistri lateris alæ liberæ erant ab omni annexo, sed intus exiguè etiam quædam vomicæ passim dispersæ erant pure impletæ, &c. *Vide historiam Tit. de phthisi. Osio Heurnii hist. x1.*

S C H O L I A.

Ingens vomica) Vomica Pulmonis est abscessus exiguus, & parvis in pulmonis quadam parte collectio, quod membranula propriæque cysti arcte adeo conclusum, vix ut quicquam de se tetum in cor expirat. Hæc frequens est in tabida, sed & plerumque sine tabe fit, quam sanguis ex aperta, rupta aut caeca vena in parvam quandam Pulmonis regionem sedens. Illuc putrescit, sensimque murulus in pus, ac per summa succescens sibi cystin efformat. Latens profecto, & in primis abditum vitium, sæpe nec laboranti nec Medico notum, quo laborans ipse nec consueta munia intermitte, nec se morbo tenet putat, causamque lateris sui nesciens intus gerit sub pectore: Sic affecti sublivido fere sunt faciei colore, ejusque lingua leotore quodam est oppleta, maxime quam longe à cibo absunt; & corporis agitatione, aut potu ciboque calidore nimis facile tingitur, & pulsus citaret, citra tamen ullam spirandi difficultatem: Interdum vero post concitatioem corporis motum, pilule parvæ & globuli instillati pili exigui redduntur à pulmone, membranula conclusi, qui contriti digitis pus reddunt foetidissimum, quale è cavo puerique & colorato dente interdum expurgatur. Adolescens quidam à paulo vehementiore exercitatione, cum acerbis nulli nullo puncto temporis intermissione torqueretur, vomicam integram columbini ovi magnitudinis extexit, in qua aperta pus exquisitè albus & æquale deprehensum est: Cuiusmodi ex cretione interdum viduata persistit, magna febre magnæque corporis perturbatione; ac nihilominus servatus is est atque sanitate restitutus. *Parvulus Pulmonis hist. 9. cap. 1. ubi affert duo exempla ab iis vomiceis extirpatorum.* Titulo de morte subita querendorum: mirum tamen Fernellium vomicæ ejusmodi gestari citra spirandi difficultatem asserere, cum idem eadem nominatim paucis lineis interpositis inter signa recenscat.

Ingens vomica exstirpat) Vomica diu pectore gestata & causans exemplum memorabile affert Excell.

Barbælinus histor. Anat. 14. centur. 6. Quidam vomicam diu in pectore gestavit, quamquam ignorat, unde in spirandi difficultatem & atrophiam incidit. Forte in dextro vulneratur, gladio prope sternon inter costas penetrante: hoc vulnere vomica lateris felicitè aperitur, cusps putre deficiente repletus thorax vix læso spiritum concedebat. Aperto vero, sicut in empyematibus, latere inter costularum costas, magna copia vacuato pure sensim ad se rediit, convalescit & habituosior factus est. Apud Plinium Phlegma quidam Vomice morbo à Medicis deploratur, quoniam mortem in acie oppeteret, vulnerato pectore inventi medicam.

Pulmo annexo ossi) Hoc frequens est in asthmaticis à pituita viscida, quoniam illa per poros pulmonis foras protrahitur, ibi in membranularum tenacillimum consistentiam à loci calore excoquitur.

*Na ut vasa impleta essent, &c.) Vasa habet Pulmo et venam arterialem, atreticam pulmonariam atque arteriam. 1. Arteriam venosam. Hæc vasa in ramulis per pulmones dispersa, à crassius & viscidis humoribus obstruuntur, Asthma inducunt: Per arteriam venosam humores Pulmonibus insinuantur, ut & purulenta materia, in pulmonum ulceribus interdum ad sinistram coeliv ventriculum, & exinde per aortam & artum emulgentes ad tenes & vesicam deducuntur: Et hinc observatum est asthma sæpe citra tussim solvi: Quibus tamulæ. 18. exemplum proponit de Cardinale Palotro asthmatico, simul ardore & difficultate urinae laborante, in quo ardore urinae, & difficultate maxime urgente spirandi difficultas imminuebatur, & vice versa: Idem observavit Hygmem in quodam Theologo: Pus tamen si sit crassius & hæret in coact, de repente suffocat, teste Roslano. Exemplum habet Petrus lib. 5. puth. cap. 10. *Melius deinde. Phlegma. cap. 11. prædicto Heurnio Straz ejusmodi solutio non congrit, ob visciditatem materiæ & copiam perniciousis vasibus inhaerentem.**

OBSERV.

OBSERVATIO XXXVIII.

Dyspnoea vomica insignis in Pulmone progenies.

Mulier cumor in pectore enatus, qui in ulcus abiit, comite gravissima Respirandi difficultate: Inventa ingens vomica sinistrum lobum pulmonum magna ex parte corrodens atque ad cordis substantiam usque pertingens. *Vide lib. 4. tit. de Pulneribus.*

OBSERVATIO XXXIX.

Dyspnoea ab pulmones undique annexos, Tuberculis scirrhosis refertos.

§. 1. Virgo (de qua l. 3. tit. de affect. hysterici.) Febre prehensa respirabat crebro difficulter: Pulmonum lobi undique thoracis membranz firmiter annexi erant, ut sine dilaceratione non distraherentur: Tuberculis scirrhosis undique referti.

§. 2. Benjamin N. difficultate spirandi affectus, &c. Illi pulmones utrinque numerosis tuberculis scatebant: Lobi pluribus in locis pleurae adhaesi erant. *Vide tit. de Phibisi.*

OBSERVATIO XL.

Dyspnoea à binis in pulmonibus Tuberculis.

D. Ostor N. asthma ac orthopnoea ita erat defatigatus, ut non nisi erecta cervicc spiraret. Bina in pulmonibus tubercula reperta sunt. *Vide lib. 3. tit. de lictu.*

OBSERVATIO XLI.

Dyspnoea à lapide in substantia pulmonum, Tuberculis circa ramos tracheae: hydropes pectoris, Scirrhis viscerum naturalium, &c.

L. Rochalsinger per multos annos asthma & tussi laborans, tandem extenuatus obiit: In ejus cadavere (præter epatis, lienis, aliorumque viscerum obstructionem ac scirrhositatem) in pulmonis substantia lapidem prædurum inveni: præterea hinc inde per pulmonis substantiam, præcipue circa ramos tracheae arteriae Tubercula plurima ex viscida materia in scirrhos concreta reperiebantur: In pectore quoque & pericardio multum aquae innatabat, &c. *Fabritius Hild. cent. ij. Observ. 29.*

SCHOLIA.

L. *Apidem prædurum, Tubercula ex viscida materia &c.)*
Galenus 4. de loc. aff. c. 8. ex lentio humore, qui ante tussim replebatur, repleto, siccatu induraturque grandines generari statuit, concurrente forte pulmonum caliditate: Plautus gypseam materiam albam, duram, ex succo crasso pulmones nutriende, potius quam pituita, fieri censet: hæc enim adaluta visci instat tenax est, non friabilis ut gypica, quæ obstruendo intrinsecus ramos, discursum asthma, in quo pituita nulla suor indicia, parit, nisi forte accedens delusio malum gement & suffocet: Quod & calculum eadem ratione facere posse statuit, ex letoso pulmonum excremento in pulmonum angustiis genito, nunc friabili, nunc duro, nunc plano, nunc longum, de pro ratione vasorum topi instat, refert: Semper in internam viam ad coagulationem tendentem adjungit: P. Sydenh de la Boe, Praecl. lib. 1. c. 24. & Tu-

berculorum, hinc inde in pulmonibus serpiens obstruatorum, & substantia ipsorum, mollis & spongiosa, mutationis in carnosam, cedematofam, solis duritiem solidiorémve, aliterve à naturali consistentia deficientem, adscribit quoque depravata pulmonum nutritioni à sanguine utroque vitioso, vel vitiosos humores admittis habente, unde raro pulmones tantum, verum careræ quoque corporis partes simul afficiuntur ac perperam nutriuntur: Cum scilicet vel bilis, vel succus pancreaticus, vel saliva, vel ex hoc seruario emgens liquor, vel lymphæ quovis modo in vitio sunt, vel serum in teoibus huius secretum, ac in sanguine p. n. permansit: Lapidis sacrum & Grandinum in pulmonibus coexistentium signa omni modo obscura: Individua tamen comes est fere Tussis diuturnior: Quidam apud Remilium crebro calculos extulisse, gravitatis sensum in pedore percipiebant.

OBSERVATIO XLII.

Calculosi pulmones illa respiratione.

ANNO 1665. dum corpus Illustr. Baronis N. ex ulcere colli vesicæ defuncti aperiretur, præter opinionem apertos pulmonibus, eisdem hinc inde plurimis calculis milii magnitudinem æquantibus refertos invenimus, copiamque illorum ad duo cochlearia capacia collegimus, ille alias nunquam de ullo dolore aut difficultate pulmonum conquestus: Mortuum illorum præsentiam nullum notabile accidens unquam occasionasse. *D. I. Tac. Wente, Bobrensky à Negreponte, in Miscell. curiosis anni 1671. Observ. 181.*

SCHOLIA.

O Ritur dubium, cur re extranea in pulmonibus hærente, eisdem tamen non tam facile perferantur difficultas, cum aliis ubivis minima re contraria posita, natura suas turbaciones exciet? An ergo pulmones non ita sensu præditi ut alia membra, Et vero simile videtur, cum & Phalisci, in quibus pulmones consumuntur, de nullo plane dolore pulmo-

num, nisi tussis molesta sit conquerantur & sæviter suos dies finiant. *Idem ibidem.* Quod autem respiracioni noxam non intulerit, causam exitimo fuisse, quia hinc inde per substantiam pulmonum calculi dispersi fuerunt; aliis conglobati, præsertim juxta bronchia, necessario vel gravitatem vel dyspnoeam parituri erant.

OBSERVATIO XLIII.

Dyspnoea à calculis circa jugulum, in medio intersepiunt membranarum accretis.

IN pectore circa jugulum, in medio intersepiunt membranarum glandulis illis calculos accrevisse in Anatome observavi. *Platerus Observ. lib. 1. p. 180.*

OBSERVATIO XLIV.

Dyspnoea à metallis in Pulmonibus concretis.

A Medico quodam experientissimo, qui dñi Fribergæ, fodinis metallicis, nobili Mînnæ oppido, medicinam fecit, relaxum scio, Is enim cum aliquos ex fossoribus metallicis mortuos aperuisset, In pulmonibus ea ipsa concreta metalla reperit, in quibus effodiendis vivi laboravrant. *Sennertus lib. de cons. & Dissensu cap. ix. Magnus de Tabacco.*

SCHOLIA.

E Jusmodi Dyspnoeam, morboque alios à fumis metallicis oriundos, non aliter expugnari posse quam per mineralia medicamenta obvi v. Clar. Giegorg. Hæstius obs. 1. 7. obs. 25. quod aliquot exemplis confirmat, & quidem primo filii Aurifabri, qui asthmate fere desperato laborans, interis remediis omnibus appropriatis, exhibitione gr. xij. mercurii dulcificati semel atque iterum, ab imminente lethali suffocatione liberabatur: adlitterat autem pari deau-

randis vasis argenteis occupato. Secundò, Exemplo cuquidam in separatione materiz metallicæ, Aurifabris instar scorianum testudo, struere laborantis, qui in gravem dyspnoeam incidit, hacque pacto liberatus est, *℞. laxativ. mineral. compof. gr. viij. pulv. Syri gr. ij. mercur. dulcis ℥. m. cum conferv. ros. ℥i. f. bolus* Quæ evacuatione feliciter peracta, per antimonium diaphoreticum, cum paulullo Theriacæ permissum, bis sudorem infecto provocavit, paucisque diebus agrum restituit.

OBSERVATIO XLV.

§. 1. *Dyspnoea ab exsiccatis pulmonibus orta.*

Metallurgi plerumque morbis pulmonum intereunt, quos inter est quem Paracelsus vocat *Die Bergsucht*. In hoc affectu pulmones exsiccantur & attenuantur chartarum more, quasi in fumo suspensi. *tab. Theod. Schenckius Epist. 72. in Epist. Th. Bartholini cent. 4.*

§. 2. Morbo hoc affectu paulatim contabescunt, & si mortuorum pectus aperitur, nulum ulcus in pulmone apparet, sed pulmones veluti fumo exsiccati conspiciuntur. *Sennertus Pract. lib. 2. p. 2. cap. 2.*

SCHOLIA.

C Omnis inde quod spongiæ vicem pulmones subeunt, surgentes zonam thoracis torridam, ut aiebat *Pythagoras*: Tantus est horum usus quantum hepatis & lienis, sed in adulto potissimum & sanguineis. *Idem.*

Pulmones exsiccantur.) Dyspnoeæ quæ in febribus evenit causam Platerus refert in sepi transferti, quod liberum est, & in interioribus latens, interno calori undique expositum, exsiccationi & constrictioni.

OBSERVATIO XLVI.

Difficilis Respiratio à pulmonibus Calculis, Grandinibus, Lapillis, Osibus obfessis.

§. 1. **S** Ecabatur quidam Lutetiz, quem Medici tanquam Orthopnoicum diu curarant: At cum in cavitate asperæ arteriæ humor nullus crassus & lentus inveniretur, secta tandem substantia parenchymatis, Lapilli minuti reperti, sed friabiles; quidam etiam caseo perversi simillimi. *Salmuth. cent. 1. Observ. 7.*

§. 2. Illustr. Principis Bonifacii, Cardinalis Caetani, diu asthmate vexati, tandem mortui ex doloribus nephriticis, propter varios, asperos, angulares calculos, dissecato cadavere, varii inventi sunt in pulmone substantia lapilli, formæ potius latoris, omnino leves, qui exsiccati instar spongiæ foraminibus pervii visi sunt. *Cruicius de quassius p. 93.*

SCHOLIA.

R Espirationis læsæ duplex occurrit causa, essentialis una, altera per consensum; à tertium

enim vicio Dyspnoeam excitari infra ostenditur.

§. 3. Aliis examinandis occupato occurrit in Asthmatico dissecato, sinistro in pulmone durities singularis, eo loco ubi vena pulmonalis substantiam pulmonis intrat, osseum quasi circum-

circulum ab aliis connexis partibus separata repræsentabat, aspera aliquomodo, fungosa, subrubra, fragilis valde; unde etiam os an calculus substantia hæc haberi debeat dubitantem huc inclinare coegit. *Gerardus Blasius Observ. med. 18. parte 6.*

§. 4. Uxor Jac. Bagole morbo admodum furricato correpta, inter alia symptomata Respirandi laboravit difficultate: In ejus pulmone post obitum lapides plurimi hinc inde reperti, diversi coloris, parvi tamen omnes. *Fabr. Hildanus cent. 2. Observ. 89.*

§. 5. Plures materias Grandinosas habuit quidam Belga, qui anno elapso obiit orthopnoea, quem secumimus & inventa est grando multiplex. *Saxonia Panthei l. 3. c. 4.*

S C H O L I A.

Galemus 4. de locis capite octavo, ex lenso humore, reitento, siccatu induratoque Grandines generari statuit: Re vera humor crassus & viscidus calculorum in pulmonibus est materia, factique ad

concretionem etiam calcismino & pulmonum caliditas, Sed præterea requiritur *innata* internam ad concretionem & coagulationem dispositionem, æque in alium partium calculis generandis concurrat.

6. Vidi & in pulmonibus ossa non parva, ut superiore anno in Francisco Capello, quem Paulus IV. Pontifex maximus Commendatorem Hospitalis S. Spiritus fecit. *Columbus Anatomies lib. xv. p. 4. 88.*

§. 7. Pulmonibus innarum calculum repertum in sectione filii Parci Typographi anno 1557. Alium in sectione studiosi cujusdam. *Platerus Observ. lib. 1. p. 180.*

§. 8. Testor me vidisse in pulmonibus Alberici Quæstoris aliquot durissimos calculos, æquabili superficie, colore argillaceo. *Scaliger Exercit. 103.*

S C H O L I A.

Læta ea de causa respirationis differentia persequitur *Fernelius l. c.* Atque hæc quidem, ali, aliis tunc dyspnœa, aliis cum suspensio orthopnoea obtingant, quæ qui consistantur vehementi angustia pectus prope suffocantur, atque & suspensio ipsius multum & frigidum ætrem ducere contendunt, quo plurimo cor ad refrigerium indiget: Omnes hæc affectus fere asthmaticos, l. e. anhelantes & suspensos appellamus, qui pernoctant in quiete, & sereno celo facilius spirant: at quoties causa & materia inus condita frigido humidoque celo, aut etiam multa ciapula humerens & quali tamen diffunditur, nova quali dyspnœa accessione consistantur, multoque magis si forte recens quidam distillatio in arterias, veteri malo jam impedita insit: Hæc *Fernelius*: Signa vero & curandi rationem ex hoc exemplo à Benvenuto capite 24. allato collige, Henricus quidam *Almanus*, inquit, cum lateum doloribus utrimo jam vexaretur, & ob id opera & consilio multorum Medicorum, sed frustra usus esset, ad nos tandem venit, oratum ut si quomodo possem laboranti illi

opem ferrem: Interrogo igitur hominem an initium morbi causare teneret: curum scilicet ex frigore, vel ictu aliquo, aut nimio cursu, vel destillatione in capite, sive etiam ex præcedente aliqua alia ægitudine hoc illi contingeret? Respondit se nullam scire præcaraticam causam, sed tantum ea occulto initio paulatim increvisse morbum illum, adeoque auctam ut cum ad mortem deduceret: Anxius igitur, & tanti doloris causam minime deprehendens nequebam quæ me viderem: Neque enim ulla vel materia vel malis habitus erat indicia, cum tussicula quædam sicca hominem urgeret, neque item cacremia aliqua videbatur: Ei medicamenta etiam quibus curatus fuerat, intentiones fere omnes evacuaverant: Quare auctorum tandem sententia nixta, quibus docetur Medicus, cum causæ morbi abstinere iam, his præsidia uti quæ conferre quidem possit, nocere non possunt: Cœpi primum levare pectus, mollire guttur & asperam arteriam, donec calculo ad avellane magnitudinem de pectore propulso, & sicca illa tussicula & omnis præterea dolor amovus esset.

§. 9. Calculus ex seroso pulmonum excremento in eorum angustis natus, obstruendo intrinsecus ramos, diuturnum asthma, in quo pectus nulla sunt indicia, parit, nisi forte accedens defluxio ingeminet malum, atque suffocet: qui nunc friabilis, nunc durus, nunc planus, nunc æqualis, & pro ratione vasorum trophi instat formatus est: Quales aliquando sectione deprehensi, Alias tussi post diuturnum & immedicabile asthma rejeçti, quæ fuerit causa ostenderunt. *Platerus Pract. lib. 1. sect. 2. cap. 4.*

§. 10. Anno 1561. *Falsoppus* juvenis cujusdam viri corpus secuit, qui adversa valetudine diu usus, tabe paulatim consumebatur, de anhelu pectore & quotidiana Tussi præcipue quærens, donec tandem plane obiit.

In ejus pulmone quatuor lapides offendit, nullum faba majuscula minorem, laros nonnihil & tuberosos, cinereos & subduros. *Kentmannus lib. de Calculis.*

§. 11. Asthmate ingravescente lenius humor in grandinem concrevit, atque hæc tandem in veros calculos, quibus interdum dissectos pulmones confertos deprehendimus, *gypseapinita duritie*, omnes quidem propria cysti obductos: Sed etiam non ita pridem vir occurrit, qui quoties exercitatione incalescit, concitata tussi, calculos è pulmonibus edis præduros, eosque excreat modo hordei, modo pisii magnitudine: bona tamen is valetudine fruatur, præterquam quod paulo difficilior respirat, & in medio thorace gravitatis cujusdam pondus percipit. *Fernelius Pathol. lib. v. cap. x.*

OBSERVATIO XLVI.

*Asthma à massa coadnata pulmonis substantiæ, lapillis referta, Lobis adnatis,
& Compressione tracheæ arteriæ à pinguedinis copia.*

STrenuus Nob. G. à Sebottendorff per plurimos annos scire semper decubuit, statim hoc omni carens spirandi facultate, nec ulla ratione convalescere potuit: sed tandem facta concessit.

Apetto post obitum cadavere, inveni peritonæum satis putridum, ventriculum pene inanem, omni chylo destitutum, nec ullam aliam humorosam in se continentem materiam, & consequenter occlusum quasi ac parvum: Intestina nullo repleta excremento: Hepar corruptum, maxime in illa parte ubi à costis tegitur: Splen in sinistro latere suis ligamentis fuit solutus, duplicatus quasi, ac ex omni parte semiputridus: Inciso vel aperto diaphragmate, dum perveni ad pulmonem, massam admodum induratum, coadnatam essentia pulmonis, & ingenti copia lapillorum refertam, plenis manibus extraxi: Pulmoni adeo adnati fuerunt sui lobi, ut nullum illi morum communicare potuerint: Tracheæ arteriæ & Gulæ tantum adipis (à pinguisimis haud dubie carnibus sæpiusculæ ingestis contracti) indurati adhæserunt non modo beneficium spirandi & respirandi crebro desideraverit, sed paucos quoque dies ante obitum cibum assumere nequiverit, solo potu sustentatus, Et facile credo si diutius supervixisset, illum inedia, peritum fuisse: Cæterum externam mihi causam talem retulit, Ex Italia redux cum agrotare incepisset, impetium Chirurgum in consilium adhibuit, qui post primum statim intuitum audenter asseveraret illum infectum morbo (lue ven.) quo tamen haud unquam laboraverat: Præparavit itaque unguentum ex argenteo vivo, nunquam s. a. extincto: Adhibita inunctione, in dies magis ac magis, ob efficaciam penetrationis & resolutionis quæ est in hydrargyro, peius sese habuit usque ad finem vitæ: Causam ergo nullam aliam exitisse iudico, quam quod argentum vivum in ipsam essentiam Pulmonis, propter raritatem ac viscositatem ejus, infunderet, ac in minutissimas postea dissolutum partes quantitate sit adauctum. *Schenckius ex M. Joh. Fabri Observation.*

S C H O L I A.

Causam ergo nullam. Quid sibi velit Cl. Faber admodum obsecrum: Innuere videtur lithiasis istius causam esse hydrargiri in istam massam, lapillis refertam, metamorphosin: Afferit quidem *Petrus Castelinus*, Med. Romanus, dissert. 1. dodechap. chalcant. p. 7, in Xenodocho incurabili Romæ, in illis qui post mercuriales inunctiones obierant, capitis tibiae omque ossium cavitates argenteo vivo scaterere se deprehendisse: At in uxore J. C. cujusdam blinis ejus unctis in

capite reperisse: At illud propriam formam ibi servavit, nec lapidis indurati naturam: Præterea Mercurius caput potius quam pulmones obidet, atque ob horum spongiosam & porosam naturam, facile penetravit; nec moratur eo usque donec contrahatur: Causa ergo istius concretionis lapideæ aliunde repetenda, scilicet ab abundantia illius succi qui eadem transmutationem subire aptus natus est.

OBSERVATIO XLVII.

Dyspnoea sequuta pulmonum lapideam duritiem.

§. 1. **M**ulier Romana xxxv. annorum per plures annos inappetentiam passa, cum rursi sicca & Spirandi difficultate, cum frustra variorum medicorum auxilia tentasset, tandem moritur.

Dissecto ejus cadavere, ventriculi omnes fibræ nigræ duræque repertæ sunt: Tres vero pulmonum lobi adeo durati, ut potius tophos lapideos quam carnem omnibus videntibus eementirentur; Lien ipsius ovi gallinæ magnitudinem non excedebat. *Ex observat. Petri Sphererii Medici Florent.*

S C H O L I A.

Lien, &c. Hujus parvitas symptomatum omnium syndrome impati potest: Deficiens enim magnitudo causæ fuit quod massæ sanguineæ deficiendæ ab humore melancholico impar, hic illi remissus

economiam naturalem depravaverit: ad pulmones enim delatus materiam scirrhosam durici contrahendæ suppeditavit, &c.

§. 2. In Asthmatico duos & lapidescentes pulmones observavit Helmontius. *Th. Bartholinus Anatom. reformat. l. 2. c. 9.*

OBSERVATIO XLVIII.

Respiratio læsa ob pulmonum duritiem, vitri instar fragilium.

Quod nos semel propriis oculis observavimus, id hoc loco bona fide testari possumus, illustr. Principem Claudium Landum, Bardi, Compiani & Vallis de Taro Dominum

Domium, ex Asthmate gravissimo defunctum, annum 55. agentem annis superioribus exenterari iussimus: Huius pulmones sic induratos invenimus, ut vitri codi instar frangerentur. *Ioh. Bapt. Silvaticus Hysteria xxx.*

OBSERVATIO XLIX.

Dyspnoea à tribus Pulmonum lobis induratis.

Mullet tussi sicca & spirandi difficultate diu fatigata est: Tres pulmonum lobi adeo erant indurati ut rophis potius quam carni similes essent. *Vide l. 3. tit. de Inappetentia.*

OBSERVATIO L.

Dyspnoea à Parenchymate pulmonum densiori, minusque spongioso & explicabili.

Pulmonum vitio non sufficiens, ideoque frequentior fit aëris inspiratio, quando eorundem parenchyma univcrsum, vel saltem maxima sui parte, est minus spongiosum minusque explicabile, quoties fit magis carnosum & solidum, quale non raro reperi in quorundam post mortem dissectione.

S C H O L I A.

Quamvis huius affectus causam reddere adquam potem valde arduum, si non impossibile, conjecto tamen carnosum & solidius fieri pulmonum parenchyma, quoties ab actiore simul & vicidior

sanguine idem parte aëris ventilis intermedia, tum leviter excoriat, tum iterum consolidatur & nutritur, ita ut sensim solidior fiat ipsius caro. *Pl. Sylvius de le Boë Prax. lib. 1. cap. 22. §. 17. 18.*

OBSERVATIO LI.

Dyspnoea à corrugatione parenchymatis pulmonis.

Frequentior & non sufficiens fit aëris inspiratio, quoties pulmonum parenchyma corrugatum existit, quale aliquando à me observatum in quorundam post mortem dissectione: Quam corrugationem acceptam refero sanguini austeriori & acriori, ibidem ipsum leviter excoriatum potenter contrahenti potius quam vere nutriti: Nisi forsitan idem accidat à pure vel aqua similiter austeris, & in pectoris cavitate collectis, ipsumque paulatim penetrantibus & constringentibus. *Sylvius de le Boë Praxeos lib. 1. cap. xxij. §. 17. 18.*

OBSERVATIO LII.

Anatome canis dyspnoea laborantis ob pulmonum scirrhum.

Canem villosum plateas Wittembergenfes, amisso Domino, perentrantem emissarum nostri exceperant, quem eultrone anatomico subiceremus, an vivum aliis destinarem usibus in suspenso relinquebatur: Canis enim gestibus, ut poterat festuissimis, gratiam nostram studebat demereri, omnium maxime tamen exercitia nonnulla, sive artes ut vocant, quibus feliciter imbueus erat, misericordiam sollicitabat: Interea cum vitæ & mortis calculi in partem utramque ponuntur, animadvertimus canem difficulter respirantem, aliquo pulmonum vitio laborare: Videre gestiebamus quem fontem malum hucce agnosceret, utrum vasorum angustia vel obstructio, an ulcus pulmonem consumens & exsicicans dilatationi debite obicem poneret: Verum utraque opinione nos deceptos fuisse patuit, cum sublato sterno ingentem Scirrhum sinistræ pulmonum parti annatum, & super dextram aliquantulum porrectum, deprehenderemus: Longitudo & latitudo ejus ex more carpo manus habilioris æstimeretur, nisi quod ob figuram informem circa extremitates, præsertim qua ad partem dextram pulmonum pertingebat, magnitudine quasi extra oleas vagabatur: crassities duorum digitorum supra dimidium erat: Color respondebat pulmonibus, non item substantia, quæ scirrhus densa & crassa, nihil prorsus aëris quamvis pulmones folle crebris excitantur, admittens: Similem casum fere reperiet Lector apud Claudium consil. 43. Item apud Chiffletium Observat. med. 38. *Simon Schultze in miscell. cur. anni 1673. Obs. 262.*

OBSERVATIO LIII.

Susprium à siccitate Pulmonis.

JAc. Gallus J. C. in Academia Patavina diu Susprium torquebatur, cui Medicorum pessissimi decoctum ligni f. ex jure Galli nullo effectu suaserant, omnibus incallum tentatio ad

tis ad materię crassę attenuationem : Aceffus frequens Nicotianę ufus, quo se laborans, profecturum sperabar.

Mali verò causam fuisse pulmonem à siccitate subidentem ostendit eventus : quandoquidem in defuncti corpore sola restabat aspera arteria, cum pulmonum vasis fidium instar siccatis.

§. 2. Cujusmodi vicio quum sublatu esset Patavii anno 1611. Caterva Diamantinus, pulmones à diurno ligni Guaiacini decocto exaruisse, in eadavere compertum fuit : *Ioh. Rhodius cent. ij. Observat. xxi.*

S C H O L I A.

Asthma nonnunquam fieri à siccitate pulmonis notat *Arianna*, qua imprimis tenentur qui focuacibus assident, Ausubati, Chymiste, qui circa metallalia occupantur, à quibus fulciantur halitus, qui cum vere inspirari, pulmone siccum intemperiem inducunt : Signa illius sunt causę exsiccantes prægressę, Tabes sensim adveniens, respiratio parva & frequens, sitis continua, spiritus paucus, nullum ab exsiccantium usu juvenentum : Modola est per hu-

moctantium usum, cassia, liquoris, violarum, passulorum, amygdalarum dulcium, &c. Dietam præsertim, & cibos humidos : Asthma à simili causa indocum testatur se curasse *Salus Noris in Asthma cap. 48.* In juvene 22. annorum, sola pulsanę & lactis pota, ac victus ratione lenicior & humida :

De Tabę ex macore senili pulmonum exemplum, vide apud *Salmuthum*

p. m. 256.

§. 3. Vidi in quodam Typographo adeo siccatos pulmones ut aridum pomum fere dici potuissent *I. Heurnius de morb. Pest. cap. iv.*

§. 4. Dyspnoea aliquando contingit à siccitate pulmonum : Audi vi à D. *Tomitano* orthopnoicum post mortem secum habuisse pulmones ambos exsiccatos. *Saxonia lib. 2. cap. 4. Panthei.*

§. 5. Memini me vidisse quendam Religiosum qui curabatur ac si laboraret orthopnoea ex humoribus erasis : non conferentibus auxiliis, post mortem inventi sunt *ambo pulmones tabe affecti & exsiccati. Saxonia Prælect. Pract. lib. 1. cap. xxvii.*

S C H O L I A.

Asthma pulmonis *Tabę affecti.* Sequitur quoque difficultis respiratio ad siccitatem macoremque reliquorum viscerum, cordis præsertim, in quibusdam hypochondriaca affectione laborantibus manifestat : nam in ea siccitas est totius corporis per alimentum proprii corruptionem ; siccum est cor, calidum tamen calore acii, febrili & aequali : Unde cum id stabilisationem evenilationemque summe efflagitat pen siccitate, domjussicentem motum duplicem non habet ad refrigerationem ejus caloris febrilis, statim

reperito motu illud compensat ac refarcit : hinc fit ut dum paulo magis corpus agitatum est, quasi animal ipsum *æteru* remanet & velus suffocatum : Itaque omnino in eo veritandum est ut quacunq; ratione id fieri possit corpori prima moles restituatur, tollaturque tum alimentis cum medicamentis squallor & macor totius corporis : Adhuc enim quidam ex veteribus melancholia hypochondriacalabo-

raotes tum demum curatos censeri cum pinguetione.

OBSERVATIO LIV.

§. 1. Orthopnoea à Pulmonibus flatu distentis.

IN quodam flatu adeo abundabant, ut etiam à sonno superveniente orthopnoea, cum strepitu quodam per os erumperent : Tandem ingravescente animi deliquio, quo vexabatur assidue, subito occubuit : Aperto thorace, inventi pulmones flatu distenti, &c. *Vide tit. de Syncope.*

S C H O L I A.

Suffocationi ab ejusmodi causa imminenti remedio est paracentesis in thorace iostituta ; quam sæpius celebravit Parisiis, magno cum ægrotum levamine & pectoris solatio affecti *Cl. Raulum Encheir. l. 3. cap. ij. Hippocr. aveneris, dicuntur quibusthorax flatu distendit : Nili eo præsidio succurrant,*

curam difficillima est & funesta est dyspnoea : A flatu autem eam posse induci ianuit *Galen. comm. in Proth. 2. 39.* ubi ait, Asthma fieri à flatu, à pituita è capite delapsa, à pleuritide transmissa, à pure, A flatibus in pedente suscitatis ortam esse, in quodam coëssit *Platonem* ex murmure circa thoracem, sine stertore.

§. 2. Non semel vidimus in Nosocomio Leydensi, & alibi, atque in eadavere distentionibus sæpius offendimus pulmonum parenchyma atque vasa *flatu adhuc distenta. Reg. de Graaf de succo Pancreatico cap. 9.*

S C H O L I A.

A Succo Pancreatico acidiores halitus per effervescentiam excitatos, & una cum flatibus per venas lacteus in cor, hinc & in pulmones delatos, ubique hærentes, non tantum Respirationem difficultem, sed siccam quoque Tussim excitari statim *Clar.*

de Graaf atque in rei confirmationem superiorem observationem adducit : Si flatas *addit*, illos comitetur pituita viscida, eaq; in pulmonibus detinetur, quidni asthmatis species inde produci possit ?

Q U E R Y.

OBSERVATIO LV.

Suspirium à Pulmonibus inflatis.

ANno 1623. Nobilis vir diarrhœa cum suspirio extinctus fuit dissectus : Pulmones erant flatu adeo turgentes ut omnem thoracis cavitatem implerent. *Iohan. Rhodius observat. 22. cent. 2.*

OBSERVATIO LVI.

Dyspnea à Pulmone maximo.

Puellum secui cujus Pulmo iusto maior omnem cavitatem totius thoracis replebat, & latera illius velut inflatus attingebat : Erat duorum saltem mensium, & si diutius illum vivere contigisset, Respiratio illius qualis futura fuisset sane ignoro : hærebam quidem annon ex ultimo respirandi per agonem conatu, dilatari ab aëre inspirato Pulmo ita potuisset, & post mortem per aliquot temporis spatium talis permanere : Unde etiam alias cadaveribus spuma citra os & nares continuo etiam si abstergeretur, colligitur cum manifesto aëris per bullas egressu ; veram tamen ipsius parenchymatis eam magnitudinem fuisse inde constabat, quod licet compresso multoties Pulmone, ut aër si quis ibi crassior detineretur, expelleretur, priorem tamen magnitudinem ille semper retineret : Visus tum mihi sum videre quomodo *Ferdinando Imperatori*, & aliis, Pulmo thoraci adhærescere potuerit, per pituitam scilicet glutinosam, quæ gypsea postmodum fuit reddita. *Phil. Salmuth. cent. 1. observ. 22.*

OBSERVATIO LVII.

Asthma à Pulmonum infigne mole.

§. 1. **D**OM. Lælius Lombardus Genevensis, vir torpidus & hebes, quinquagenarius, derepente obiit anno 1646. Asthmæ erat obnoxius, quod malum toti familiæ obfusus ; Vindemiæ tempore *cellam vinariam*, in qua fervebat mustum, ingressus, tam violento paroxysmo prehensus est, ut vix dum in lectum impositus animam reddiderit : Aperto thorace, Pulmones citra labem, aut viciosum colorem deprehensi sunt, sed tantæ eorum erat moles, ut bubulos æquarent magnitudine.

§. 2. Augeri credendum Pulmonum nutritionem, quoties iudem consistentiam suam & substantiæ modum naturalem servantes, nimium tamen excrescunt, atque pectoris cavitatem ita replent, ut inde impedita potius quam difficilis reddatur respiratio, Cujus rei exemplum semel atque iterum post mortem in sectione habui. *Fr. Sylvius Præfatus lib. 1. cap. 24. §. 12.*

S C H O L I A.

AUctæ hujus Pulmonum nutritionis causam partim constitutionem ipsorum optimam, partim usum alimentorum nutriendis pulmonibus maxime aptorum, ac forte pulmonum ex junioribus animalibus desumptorum : Antæquam hanc Pulmonum nutritionem significabilis respiratio citra evidentem causam impedita, existente corporis reliqui constitutione laudabili. *Idem ibidem.*

degressu cellam vinariam] Suffocatos nonnullos in cellis cerevisiaris, quando illa recens pocta ebullit & fermentari observat *Solander* conf. 6. sect. 5. quia tum in istam crassam aër est, ut cum spiritu in pectus & pulmones attractus, repetitam suffocationem inferat : A fervente musto id evenit multo verisimilius

est, ob ejus penetrandæ vim efficaciorē : Antæ annos quinquaginta Geneva, domus famulæ Dom. le Faucheur, Patris Celeberr. Dom. le Faucheur, Pastoris Ecclesiæ Charantonienfis Lutetianæ, eodem tempore in cella vinaria extinctæ sunt, in quam mustum pridie dejectum erat : Similibus in casibus *M. Donati* cerebrum præcipue affici statim, quod reuera, ut & spiritus animales, afficiunt, quia postea quam resoluti sunt, quidam delictum : At concedendum organa quoque respirationis affici, aër enim istis famis infectus, calidi cordis ventriculo inreptus est, fulgillumque calidarum expulsionem impedit, Iudicio autem est quod nonnulli periculo suffocationis cessante, febre concepti sunt.

OBSERVATIO LVIII.

Asthma ab enormi Pulmonum magnitudine, lutulento humore infarctorum.

Illustr. D. de Chabotte (de quo tit. de Phthisi) tabidus cum insigni pectoris oppressione interit : Illius Pulmones summe viriati & gravissimi deprehensi sunt, humore lutulento undiq; peragantes ; qui bilanci impositi uncias octoginta cum una pependunt.

OBSERVATIO LIX.

Dyspnea à pulmone dextro ad jugulum usque retracto, pleura ad claviculam connexa; Sinistro maximo, tuberculis obfita.

Filius N. tumore henis insigni, aliisque affectibus correptus est &c. succcessit dolor pectoris ad pulmonem dextrum & respirationis clangoræ summa difficultas &c. In thorace pulmo dexter latebat exiguus, sinister vix dimidio æquans, nigricans, ad jugulum retractus & pleura ad claviculam connexus: Sinister duplo grandior, quibusdam in locis tuberculis obfitus, in quibus tophacea materia &c. *Vide lib. 3. ut. de Hypochondriorum tumoribus.*

OBSERVATIO LX.

Asthma cum exspitione purulenta sanguinea, ab utroque Pulmone costis annexo, pericardii hydropo.

M Aji III. 1676. apertui cadaver juvenis, 22. annorum, qui ante annos octo, dum calebat maxime ex cursu, frigidam postquam sumperat, pleurisiidem contraxit, quam *mageriam*, nulla instituta venæ sectione, sequutum asthma grave, cum purulenta & sæpius sanguinea expectoratione: dolor circa lumbos gravissimus, qui nephritidem semper mentiens, melancholicus semper.

Vesica fellea exigua valde, insigniter crassa, lenta materia repleta, ubi attingebatur satis dura, nigerrima hæc materia, interior crusta crassa etiam, & facile separabilis instar tunice specialis, nigerrimi etiam tota coloris: Hepat maximum, ultra Lienem, satis valide ope ligamenti transversæ, eo usque se extendentis diaphragmati coharebat, tuberosum valde, & satis ubique scirrhosum: Ren uterque integer, Lien etiam circa dorsum diaphragmati necebat: Venter totus tumidus aqua obscuri coloris, lenta: In Thorace uterque Pulmo inseparabiliter totus costis coharebat, maxime circa vertebrarum corpora, usque ad diaphragmatis inferiora, fere consumptus: In Pericardio ultra $\frac{2}{3}$ xxx. aqua limpidiissima, dulcis satis saporis erat, unde valde extensum: Hoc remoto, cor & auricula dextra insignis magnitudinis se offerebant: Ligatis omnibus aliis vasibus, ex aperta auricula, & ventriculo dextro eduximus sanguinis fluxillis, lentæ pituitæ, cruorisque nigerrimi plusquam uncias xx. *G. Blasius observ. med. 19.*

S C H O L I A.

Pleurisiidem *negliam* &c.] Pleuripneumoniam adfulide Pulmonem cum costis cohesio ostendit, inflammata quippe parte exteriore saniem effuderunt glutinosam, coactam cum pleura causam: Illi enim assignandum sequutum asthma, quod ante abscebat.

OBSERVATIO LXI.

Dyspnea à Pulmonis parte sinistra septo firmiter adherente, Et materia crassa sinistro cordis ventriculo impacta.

Filius Mercatoris quinque annos natus, cum male educatus fuisset à nutricibus, inter varia symptomata hoc præcipue pati solebat, ut cum curteret, aut vehementius moveretur, spirandi difficultate laboraret; Tandem 3. Julii, cum ab exercitio multum incauisset, incidit in tussim cum difficultate spirandi & febricula, cum alvi fluxu mediocri, in quo flava, puitrosa, & aliquando subviridia apparebant: hæc tamen symptomata adeo levia erant, ut de vocando medico parentes non cogitarent, sed à Pharmacopæo admodum fuerat vesicans posteriori cervici: Die quinta morbi vocatus ego, eadem invenio symptomata, ex quibus fluxionem consicieus in Pulmonem, cum metu peripneumoniz, V. S. præscribo, quæ facta non fuit quia vena non erat conspicua, sed cucurbitulæ scatificatæ statim fuerunt ad mortem, & julepus pectoralis refrigerans exhibitus: Hæc circa meridiem fiebant: at hora 3. vespertina subito æger correptus est leipothymia, à qua brevi excitatus est: postmodum vero pulsus apparuit parvus, languidus, frequens & pulsibus morientium similis, venter admodum tensus & dolens, respirandi aderat summa difficultas & sitis inexplebilis: Multa frustra usurpata, sed æger continuo in posu ruens media nocte interijt.

Aperto cadavere, partes naturales bene constitutæ apparuerunt, nisi quod cystis fellea grandior & humore nigricante repleta erat: Sed Pulmonis pars sinistra diaphragmati hærebat ita firmiter, ut separari non potuerit, unde difficultatem spirandi ex parte provenire censuimus:

eenfuimus : Siniftra vero cordis auricula, folito amplior, referta erat materia craffa & compacta, omnino alba, laridum coctum referente, quam fubitaneæ mortis caufam fuiffe cenfuimus, cordis ventriculum finiftrum fuffocando & illius ventilationem impediendo. *Lcæ Riverius centur. 1. obf. 83.*

S C H O L I A.

Materia craffa & compa. Sæpe in cachectico- rum cadaveribus, æt eorum qui morbis obno- xii vixerunt, corpora quædam five fibrofa five pitui- tofa reperiuntur, quæ ad notabilem magnitudinem ex- celfunt, radice, quæ agunt in caveris ventriculorum cordis, hinc & finiftra ramos lufum & deorfum per aortam emittunt, æque in varios ramulculos, juxta æ- teriarum capacitates & numerum difimunt : Hæc corpora qui fecum circumferunt, nunquam integra

valitudine fui poffunt, atque ex illis orthopœæ, fyn- copes cardiacæ, pulfum intermiffionis & interceptionis, aliorumque affectionum caufæ deduci poffunt, ut & Apoplexiæ, hæc in carotides & cervicales arte- riis iteant : Hoc ergo in cafu Dyfpnoæ caufa, non in unicam Pulmonum cum pleura cohaefionem refe- renda, fed to illam obftructionem auniculæ cordis fi- niſtræ, à qua & leipothymia & mors fubita deducen- da : Fidem facient exempla inferius adducenda.

OBSERVATIO LXXII.

Aſthma ob Pulmonem exanguem, meatus omnes pituita infarctos, vomicas parvas in parenchymate, undique coſtis annexo.

ANno 1646. apertum eſt cadaver Walonis annorum 50. qui diuturno & miferando aſth- mate attritus & enecatus erat : Deprehenſus eſt pulmo plane exanguis, ejus paren- chyma, omnesque ſpirabiles meatus infarcti, impleti & infuccati craſſa, viſcida pituita, concurrentibus multis parvis vomicis in ipſo parenchymate : Adnatus erat in utroque latere adeo pleuræ firmiter, ut vix multa manuum vi poſſet avelli : color erat pallidus, luri- dus, ita ut omni robore ad excutiendam materiam deſtitutus fuerit, nullaque ventilationis cordis erat oportunitas : quoniam manifeſtæ ſpirabiles viæ aſperæ arteriæ, arteriæque ve- noſæ, plane erant impletæ & anguſtæ copia materiæ, quæ caufa tandem calorem vivifi- cum cordis, retentis fuliginibus, oppreſſit & extinxit.

Cauſam tanti mali prava diæta, indeque debilitata viſcera naturalia poſſidebant : quip- pe ipſe ventriculus parvus languidusque exiſtebat, ac tenuiſſimæ ſubſtantiæ : Omentum plane erat extenuatum & omni pinguedine expoliatum : Hepar pallidum & ſatis exi- le, quæ atteſtabantur nec primam nec ſecundam coctionem ſatis officio functas fuiſſe. *Ortho Hemerius hiſtor. 9.*

OBSERVATIO LXXIII.

Dyſpnœa à Pulmonibus ſordique, etiam pericardio & mediſtino connexis, Inſinitis tuberculis obſeſſis &c.

Dyſpnœa cum atrophia ſeu Tabe, hiſtoria anatomica.

ANno 1676. menſe Februario, adoleſcens ex agro Schaphuſiano noſtrum in xenodo- chium deferrebat, quem macies imbellem ruſticisq; imparem laboribus reddide- rat. Facultates illi quidem animales integræ, ſed peſtoris obſtabant anguſtiæ quo minus ſeſe, quocunque veller, liberè mover. Sæpe enim citatior unus alterque gteſſus miſero ſuſ- focationem minari, ut humi poſtratus mox ſpiritum exerta lingua ægerimè duceret. Per- ſiſtitit aliquot menſibus iſta calamitas, quam à præcipiti, æſtuantibus præcordiis, frigido hau- ſtu orram dixerat ; imò reſpuens medelam crevit, cum tuſſicula ad ultimum viæ articulum moleſta & irrita. Mirè varius illi, ac in ſingula propè momenta mirabilis, pulſus. Mox enim celer, frequens & validus is erat ; mox larvâ mutata tardus, rarus & debilis ; nunc inæqua- lis, ac vel tertio quartove ſaltu intermittens ; nunc tremulus, denique & nullus. Urina con- ſummata jam morbo tenuis & pauca. Poſtremò, die 29. Maji, ſumma conſectus tæbe, inter- cepto ſerè æris in pulmones commeatu, vitam æger cum morte commutavit.

Deſuncti cadaver aliquot horis poſt, adjutus Clar. amiciffimique Viri *Matthai Harderi*, Medici noſtraris, operâ diſſecui, in lumbis ac juxta ſpinam ex decubitu liveſcens. Mox, pa- teſacto abdomine, Inteflina flatibus diſtenta cum impetu eruperunt, Quibus inſtratum Omentum vehementer extenuatum erat & lacerum, ac imprimis glandularum atque pin- guedinis loco multis hinc inde ſcirrhorum moleculis obſeſſum. Harum pleræque ciceris, aliquæ piſi, nonnullæ fabæ magnitudinem cum figura ſervabant. Plurimæ videbantur in æcervum quaſi congeſtæ, aliæ autem ſolitaræ ac à cæteris diſjunctæ. Omnium caſei in- ſtar antiqui dura & friabilis ſubſtantia. Præterea ex ileo prodeuntes alicubi vaſorum la-

æteorum furesculos, chylo albo adhuc dum scatentes, deprehendimus; sed filo tenui subtiliores, ac per mesenterium ad glandulas ibidem consitas excurrentes, quo chylium digitis adactum deposuerunt. Ipsis Intestinis tenuibus præter stans etiam lumbrici teretes inerant, massæ cuidam pultaceæ subflavescenti intestinorumque mucosæ immixti. Ubi maxima lumbricorum vis, ibi Intestini proximus paries valde rubebat; quasi à motu & rosione illorum in prociectu jamjam inflammatio fuisset. Ventriculus inflatus erat & flaccidus, lactis pridie oblatis coagulo pilicis ejus adhærente. Porro glandularum Mesenterii plurimæ induratae, & præter naturam tumidae degeneraverant; utpote quarum substantia, obstruētis ac deleteris pororum & vasorum tractibus, callo durior evaserat atque compactior. Idem utriusque Pancreatis fatum: quanquam id, quod *Asellus* vocatur, durius, altero genuino existeret. Hepar vitium magni momenti nullum præferat; nam & colore satis florido, & parenchymate laudabili se commendavit, præterquam quod superne Diaphragmati paulo pertinacius accreverit; quo in loco membranam quoque Hepatis solito crassiores, atque sero instar gelatinæ coagulato stipatam deprehendimus. Ipsa quin etiam bilis vesicula debito crassior fuit, luteo, sed tenaci viscidoque felle imbuta. Cervici ejus glandula phaeoli magnitudine & figura extrinsecus adnata hæsit, rubicunda atque vasis instructa sanguineis. Adhæc vasa lymphatica, ex hepate juxta Venam portæ, ductusque choledochos in Mesenterii glandulas determinata, notavimus hinc inde rimis patula & corrosa; adeo ut lymphæ ex illis profusa ad cyathi quantitatem in abdominis cavo jam contineretur, quæ igni exposita in spissamentum grati odoris abiit. Lienem tubercula caseosa, albidæ & dura tam superficie tenus, quàm in recessu deturparunt, numero innumera, majora minoraque: quorum substantia pisorum aquali maceraturorum erat persimilis. Iisdem renes etiam obfessi, atque horum maximè sinister, qui tres in superficie moleculas, nuclei avellanæ magnitudine, geminasque aktius reconditas exhibuit. Renes succenturiati sive glandulae, ut vocant, atrabilariz in scirrhus omnino versæ, nec cavitatem amplius, nec poros aut vasa conspicua obtinere; eolore eorum ex obscuro nigricante. Paulo infra renes, juxta Musculorum *Æolæ* confinia, gelatina plurima sive serum condensatum membranulisque interceptum apparuit, hydropis ascitis præhodium. Diaphragma, quæ respicit abdomen, verrucosum videbatur, ac pluribus in locis erosum inque thoracis cavitatem profusè absconditum.

Jam in thorace præcipua vitæ organa, Cor nempe cum Pulmonibus, maximè affecta deprehendimus. Nec facile verbis expteserim, quàm miro nexu ac intricato contentes ambienteque partes omnes cum contentis in unum quasi coaluerint. Neque enim ulla hic erat, præterquam quæ cultro siebat, distinctio. Pericardium extrinsecus undique Pulmonibus, anteriùs sterno, inferiùs (quod quidem lege naturæ, licet non tam casto nexu, fieri assolet) Diaphragmati arctissimè adhæserat, ut nulla ex parte liberam ægerimè distingui ac separari potuerit. Hæc eadem cordis membrana, duplo quàm alias crassior evaserat, ut corium potius quàm tunicam repræsentaret. Nulla hic mediastini vestigia, nullum inter pulmones discrimen aut paries quasi intergerinus. Pulmones quippe tum inter se invicem, tum undiqueque cum pleura, costis, sterno, diaphragmate coaluerant, ut maximo ad eos, nulla ex parte liberos, è thoracis cavo eximendos separandosque opus labore fuerit. Enimvero ipsa visceris tunica partibus illis ceu glutine affixa hæsit, quam & multum æquo crassiores spissioresque observavimus. Internam Pulmonum substantiam tuberculorum crudorum agmen occupaverat, à quibus pondus ac moles eorum non parum aucta. Videbantur enim omnes lobi, horumque cellulæ seu vesiculæ membranaceæ, in quas inspiratus aer comineat, aut ejusmodi farctæ tuberculis, aut mutuo coalitæ. Pulmonibus per tracheam inflatis, aliquot duntaxat vesiculæ, non integri lobi, nedum viscus universum intumuit. Imò frustum hujus ingens aquæ injectum, embryonis pulmonum instar, fundum illico petiit. Tantus autem erat tuberculorum numerus, ut quocunque pulmones in loco disseccarentur, plurima semper in conspectum venirent. Aliqua illorum pisum, fabas alia, nonnulla denique castaneæ fructum magnitudine ac interdum figurâ æquarunt. Quædam porro sevi aut casei instar antiqui & compacti albicabant; quædam obscurè rubebant, vasis instructa sanguineis. Reliqua nigricabant, pressu digitorum in amurcam vini fecibus analogam, absque tamen fœtore, diffusentia. Maximus omnium in pulmonis dextri infimo tractu scilicet thus apparuit, nucæ juglandæ major, subalbidus & latido quovis aut caseo compactior. Hoc ipso in loco pulmo diaphragmati pertinacissimo coalitu jungebatur. Cæterum nullibi pus verum, sed ichor duntaxat turbidus è compressis Pulmonum vesiculis emanavit; quo & imbutos asperæ arteriæ ramos notavimus. Cor flaccidum omnino & decolor,

ablato

ablato pericardii velo, cernebas; tristi vultu suæ miseriam fortis coram quasi deplorans ac exprimens. Sauciato eo magna è penetralibus sanguinis aequali fluidique copia manavit, quo & auriculæ plurimum turgere. Tandem Diaphragma ut infernè cortosum, ita superne Pulmonibus, infuso nexu, devinctum atque intra thoracem adeò retractum constitutum; invenimus; ut, antequam à vinculis liberaretur, abdomen versus nullo detrudi modo potuerit.

SCHOLIA.

Hic quoque illas majorum leihum carinamque adolescentem paravit & duo sunt tamen præcipuè affectus, quoniam alter viæ organa, alter œconomiam naturalem, uterque prædictis viribus præmarare corpus universum internectu dedit. Priori Dyspnoæ nomen, posteriori Atrophie universalis est. Illam pectoris angustia cum ipsiandi difficultate, ad motum corporis vel tantillum aucta, ætioque, dum viveret, molestissima, evincit. Hanc, macies omni moda; qua, exhausto succorum & sanguinis penu, contabescensque multos, impote genio suo fraudentis, aridam præter eamem diffusam superinductam, nihil erat relidui.

Ea verò his intercedit morbis necessitudo, ut alter ab altero, ceu à matre filia, insuauo licet partu dependat, atque Dyspnoam atrophiam, veluti umbra corpus, secuta sit. Sanguis enim, & qui ei inest succus nutritius, cum suæ perfectionis *إتمام*, & nutriendi vivificandique aptitudinem, in corde & pulmonibus potissimum adipiscitur; facillimum iudicium est, istius vitio quoqueque laborantibus, mos etiam illum, labem per traducem suscepta, corrumpi nutriendoq; inopem evadere, Idque tanto magis, quanto inhærens pectoris atque pulmonibus malum existeret gravius. In nostro equidem adolescente omnem auroplæ culpam, à solo organorum vitalium pneumatorumque affectu derivare possemus: si fas tamen imi quoque ventris viscera in scenam & erimen vocare, quorum prava *أشياء* rabi aut iuxta producentia, aut producta jam forentia, non possit non plurimum conferre. Pancreas intelligo clithus, lienis remanensque moleculas, glandularum denique in omento melesenticoque induratum tubera. Liavum enim partium commune ac naturale munus fert, ut chylum nutritio, tam generando quam depurando atque distribuendo vacantes, nutritionis maxime salutis atq; integritatis consuletur. Quod si iure magis à crati nativa deficiant, eò major nutritionis corruptio & detrimentum.

Quemadmodum autem affectibus hinc cognationis quasi vinculum est, ita causatum etiam similitas. Proximè enim ab obstructione pendet uterque; nec diversâ causa remioris, frigidae nempe infelici æliantibus præcordia haustus. Non congriam hoc loco plerumque exempla, quoniam simile delictum similis ex cepit pena. his namque auctorum sciant volumina, qui de affectibus corporis humani eorumque causis scripserit. Nec dubio, quin præclarum hoc ipsum D. *Hæni* opus plurima alia hic exhibuerim. Optandum potius, ut pauciora deinceps occurrant, mortaliumq; galandem aliquando sapiens, à cibo potuque intemptivis sibi temperet. Rationes tantum excedere jure, ob quas frigida ingurgitatio tantam fervido pectori noxam abdominibus inferre porit. Verus *Hippocratis* oraculum est, V. Aphor. 24. *ἡ δὲ ἀργὴ τῆ ὕλης μαλακῆ, frigida πῆστιν ἀδυσπνῆς*; cuius vniuersam exemplo iura & damno suo adolescens iste confirmat. Nec difficilis ratio, de qua *Hæni*um in notis fiet: *Qua vitæ interit pectus, caput tutela calere peragitur*; Enimvero gliscit pectore conclusus in præcordiis hominum, effervescentia & calore vitali se prodem ig-

ois, ad cuius ceu flammula sustentationem blando amicoque foris opus est. Secus idem à frigore, tantum maxime contrario, obuii, suffocari, denique exringui periclitatur. Nec figus hæc, nisi intemptivum ac in excessu, quod & *Hippocratis*, intelligendum. A moderato enim decentique præcordia lædi tantum abest, ut tempore æstiva aura poraque frigidiusculis nihil mortalibus corrigere possis acceptis. Ecce tempore igitur de excessu, quod hominum est intemptivum, noster peccavit adolescens, cum frigidam sive laborem sive cursu æstivam assatum ingurgitaret. Imber enim hic gelidus laryngem ac gulam mediæque thoracem pelucens, turgidos fervente sanguine pulmones enormi frigore perstrinxit; quo tum cruori in membranaceis illis veliculis & valorum extremiribus coagulatus, tum serum etiam in lymphaductibus superficiatis (quam descriptionem in parte posteriore Pharmac. ration. 28. *ἡ δὲ ἰσθμὸς, τῆ πνεύματος*, videte etiam) prostrigatis repente spiritibus densata. Jacta sic pectus fuit semina morborum. Ex his plerumque verisimile est, aut analogam illi fuisse affectiorem, Quæ neglecta, in dyspnoam fatalem cum atrophiam degeneravit. Sanguis etenim coëctus, & lymphæ stagnans, deoçaga expectoratione indolem adquiretur: heterogenciam, qua omnis valata pulmonum crasis & conformatio. Enimvero corruptus cruor, acrimonia sua vicinorum usque cellularum parietes & vascula erodendo, continui solutionem auit cui moderi sacgens natura, callis huius istos è succo nutritio generis opplevit. Veluti coalescentibus hoc modo in scinthis pulmonum veliculis, respiratio detrimenium cepit; aditu enim prohibebatur aër, quem viæ tantoperè exigis necessitas. Fatsumque hinc adeo, ut æger motu quantalocumque præcordicam suffocationis discentem experiretur. Quo accipit respirandi conatu, probabile est labefactas pulmonum tunicas alicubi rimas egisse. Inde serum transfusus vicium; & lymphæ ruptis ductibus profusa, glutinis vicem præbuit; quo Pulmones undiq; cum pleura, diaphragmate, pericardio & sterno coæstuerunt, promovent ne aum ac firmare pectoris, ob interceptum spiritum, quiete atq; compressione. His itaq; contritiis insuper vinculis pulmones dyspnoa immendabilis secuta est, tabe universalis, ceu comite individuo stipata. Nam sanguis cum chylis ad cor delatus, atq; per venam arterialem è dextro ventriculo expulsum, cum vala pulmonum ror præpedit obitaculis permeare, atqueque vitalis (qua sui ad perfectionem indiget) de mesolum haurire nequit, labem ex pectoris tande concepit, mor vitius est ciliis factus degenerare; imò, ejurata quasi nutriendi provincia, ex obstructionibus in mesenterio, pancreate, omento, liene renibusque obstructiones ferere. Donec tandem omentum de genet, in diachem hydroticam, analysi velut spontanea, deegeret. Quibus accedit, quod ventriculus ipse cum inest illi, intemptivo illo potu valde refrigeratus, chylum deinceps æquosum & nutriendum minus idoneum generaverit; quo tum lactea vala obstructa, nam melesentici glandulæ induratae, ac, ut verbo me expediam, omnia viscerum œconomia subversa fuit.

Mm 3

Dicendum

Dicendum apertius fuisse de obstruktionum & scirrhorum actu ac fiendi modis, nec non unde suum pulmonum & pericardii membranis in crassie augmentum? Vetus hæc observationibus nostris de hydropo anatomicis, ubi phenomena ista frequentes

occurront, referre videri est; quia aliquando, ut à *Köster* & *Du Roy*, publico nunc invidemus. His librum hunc observationum *Clar. Theophrasti* deinde dicam an onerasse, satis erit. Ex *Ann. de Calcutia* *Job. Comadi Peyer*, *Schaffnau* *Heterum*.

OBSERVATIO LXIV.

Dyspnoea à Pulmonum cum thorace & partibus aliis coalitu.

§. 1. **A** Perui corpus ejusdam ancillæ quæ in chorea, inter saltandum subitanea morte perit: Pulmones ita arte undique thoracis lateribus adacti inventi, ut vix separari potuerint, unde continua laborabat spirandi difficultate. *Salzmänn* *observ. p. 46.*

§. 2. Anno 1625. & duobus sequentibus, Pulmonum ad costas agglutinatior in plurimis cadaveribus observata eorum qui suspirio valde angebantur. *Ioh. Rhodius obs. 23.*

§. 3. Aliquando Pulmones coalescunt cum membrana succingente costas, & tunc fit asthma & orthopnoea, insanabilis: Hunc casum vidi in quadam Religiosa. *Herc. Saxonia Præl. Pract. part. 1. cap. 26.*

§. 4. Ferdinando Imperatori Pulmo thoraci adhærescebat per pituitam glutinosam, quæ gypsea postmodum fuit reddita. *Phil. Salmuth. cent. 1. observ. 22.*

§. 5. Anno 1629. dissecuri cadaver militis qui ferme per integrum annum langueret fluxu veneris æruginoso, Tussi sicca & insigni Respirandi difficultate: Huic æ vitalibus dexter lobus Pulmonis costis & diaphragmati erat adnatus, ut invicem continui esse viderentur: Usus sæpe fuerat holothuriis & eorum speciebus, lepore marino & sæpù, quæ peculiari vi pulmonibus sunt infesta. *Jacobus Bentius med. Indor. observ. 7.*

§. 6. Anno 1699. aperui feminam gravidam, quæ Asthmatica fuerat: Vidi in thorace Pulmonem dextro latere per valida filamenta nervea aliquot locis costis adnatum, Tum & in utroque latere non naturali colore pulmonem insignitum. *Pet. Perizon ob. Ann. 6.*

§. 7. Matrona 73. ætatis anno apoplexia subita opprimitur: Asthmate diu fatigata fuerat: Pulmones archissimo nexu costis affixi erant, qui vix sine laceratione distrali indepotuerunt. *Vide tit. de morte subita.*

§. 8. Domina Favre annum ætatis agens 73. morte subita extincta, diu Asthmaticæ obnoxia vixerat:

Referatis pectoris claustris tantam pulmonum cum costis cohesionem deprehendi, ut inde divelli absque dilaceratione non possent; quæ causa fuit quod asthma multis annis tentata vixerit:

S C H O L I A.

Non tamen censéo ejusmodi adhæsiōnem ex necessitate asthma invelire, cum contrarium deprehenderim in quodam vocato *Marassio*, cui simili

modo annexi erant Pulmones, egregius tamen perit sacra. *Jos. Christoph. Cernitardus observat. Jussu Chirurgus. 37.*

§. 9. Aliquando fit orthopnoea ex coalescentia Pulmonum cum costis, ut vix cultro possint separari: Secui ego monachum anno elapso & ita inveni eum:

Hæc coalescentia fit quando Pulmones in magnam excrescunt molem, ob carathosam materiam imbibitam, & ita vix moventur & causam præbent coalescentiæ: *Saxonia Panthei lib. 2. cap. 4.*

S C H O L I A.

Pulmonem in plucibus pleuræ connexam, nunc io altero latere, nunc in utroque vidimus: atque hæc Pulmonum in nonnullis cum pleura connexio in causa plerumque est ut medici penetrantia thoracis vulnere nequaquam agnoscentes; (quippe qui hoc Chirurgorum axioma putent, omne thoracis vulnus pericardium extra spiritare:) in illis quibus hæc pulmonum connexio cum membrana succingente corrigis, possunt vulnere thoracem perforante laborare, neque tamen spiritare vulnus cessatur. *Columbus Anatom. lib. 15.*

Coalescentia Pulmonum cum costis Per fibrosos nexos aliquando connascuntur Pulmones cum thorace, non scilicet laxa est ea connexio, neque omnium pulmonum partium: At si hæc colligatio ampla & acta fuerit, ita ut Pulmo immediate costis adhæreat, molestam spirandi difficultatem etiam in sanis hominibus affert. *N. vasa* hanc connexionem cordi utilem centes ne Pulmonum mole prematur, aut spirandi facilitas impediatur: Circa inferiores costas eam præterit annotavit *Clar. Thom. Bartholinus*, prope diaphragma, ne hoc prematur.

OBSERVATIO LXV.

§. 1. *Asthma ob Pulmones per filamenta nervea costis dextro latere accretos.*

Anno 1592. aperui feminam gravidam, quæ asthmatica fuerat: Vidi in thorace Pulmonem dextro latere per valida filamenta nervea aliquot locis costis accretum: Tum

Tum & in utroque latere non naturali colore Pulmonem insignitum. *Petrus Paulinus observ. Anat. 6.*

S C H O L I A.

P *Et valida filamenta nerva*] *Adrianus Spigelius* Pulmones Diaphragmati nexibus quibundam fibrosis à membrana, qua ineguatur, ortis annecti, eorumque superficiem posticam ejusmodi fibris costis & pleuræ adjungi, ut eo facilius motum thoracis sequantur refert. Hæ fibræ addit, si breviores fuerint, dyspnœa sequitur incurabilis: *Nighmoras* autem hæc fibras Pulmones pleuræ annectentes his tantum in perspetu dyspnœa laborantibus invenit: Putaque eam connexionem esse p. n. à viâio in nervo formatione, quæ eadem quoque fieri poterit à morbo: *Talp. 1. 2. observ. 17.* putat Pulmonem paucis corpusei-

bus esse omnino liberum, sed plerumque agglutinari vel huic vel illi costæ, neque tamen evidenter lædè respirationem, nisi accreverit ubique locorum: *Bartholini* cent. 2. libor. *Anatom. 35.* ait sæpe pulmones costis visos esse tam firmiter adnatos ut motus reciprocos cessaverit: *Avium* pulmones lateribus & costis adeo affixi sunt, ut paucum admodum diluari, assurgere & contrahi possint: præ cæteris tamen animalibus non modo facillime respirant, sed vocem etiam in cantu dissimulante modulantur, teste

Hartii l. de gener. anim.

Exercit. 9.

§. 2. Connexus Pulmonum cum Pulmone strictior per fibras, eos libere (quod vero requireretur) moveri non sinit: anhelosque, partem dum se movent, reddit: Quod quibusdam ab ortu, aliis post casum vel pleuritidem evenisse sectio tandem patefecit, cum alioquin hoc non liceat nisi conjecturis assequi. *Felix Platerus Pract. lib. 2. cap. 4.*

OBSERVATIO LXVI.

Dyspnœa ob cohesionem pulmonum cum pleura per membranas.

Pulmoni quandoque membranas adnasci, ipsamque pleuræ annectere, ex observatione anatomica satis liquet: attamen tales membranz, pulmonis cum pleura conjunctivæ, raro præexistunt, *Willis Pharmac. rat. part. 2. sect. 1. c. 8.*

OBSERVATIO LXVII.

Dyspnœa à Pulmonibus putridis & costis adherentibus.

Juvenis 25. annos natus, ex Dyspnœa, marasmo, vesicæ calculo extinctus fuit: Sinister Pulmonis lobus succingenti membranæ, una cum dextro, ita tenaciter adharebat, ut ad medias putrefactus, & summa puris copia refertus: Sicque & dexter ejusdem lividus plane & ponderosus, vix avelli potuerunt &c. *Fabritius Hildan. ex Petri Blandini commun. centur. 4. observ. 50.*

S C H O L I A.

Hippocr. lib. 1. de morbis Pulmonis ad latus prolapsus sui, rufus tenet & creta carne spirato, & Saliva rufu respicitur alba, & datur ad pituita aut dextrum emegit, & grave quid in pectore memore videtur, & dolores aut pungunt, & sanguis frigidus veluti pelvis & spissationem probat, Et ad afflicti quidem latus decubitus fuisse, non autem ad summum, verum veluti grave quiddam ipsi de latere dependere videtur, & per pituita si transire parat: Vide salvi commentarium in hunc locum: Fit autem hoc malum, vel à causa interna, ab ortu & mala conformatione: aut cum Pulmo, mediane pleura viscida &

tenaci interjecta, membranz thoracem vestienti adhaeret: Vel à causa externa, ubi vulnerato thorace, aut fulta paracetesi ob empyema, idem contingit, ut etiam à plenitudine: Non secus ac cæteræ partes ob nictus aut vulnus invicem coalescunt: Hippocr. lib. de locis addit exificationem à fici, Laterale morbus ficius circa fluctuationem oritur cum ex vehementi fici Pulmo admodum vesicatus fuerit, gracile evadit & impotens redditur, & latus præ impotentia inclinat ut ipsamque contingit, æque ventilo, cum humidum existat, et adhaesum & morbum lateralem suum.

OBSERVATIO LXVIII.

Dyspnœa ab insigni Pulmonum cohesione cum costis omnibus anterioribus.

Novi Nob. Romanum qui à diuturna capitis destillatione in spirandi difficultatem sine stertore inciderat, atque malo progrediente eo devenerat, ut in alterutrum latus non sine dolore & anxietate quadam cubare posset, in dorsum nequaquam, ob ingentissimos dolores & cruciatus quos in spinam jacendo, juxta anteriorem thoracis partem experiebatur: In ventrem autem commodior minusque molestior huic erat decubitus, sed tandem morbi fixitate obiit.

Dissecto cadavere, observatum fuit Pulmones thoracis costis omnibus anterioribus ita pertinaciter hære, ut non nisi cultro seungi possent. *Zecchini consult. i.*

OBSERVATIO LXIX.

Asthmatici Principis omnes Pulmonum lobi, intus & extra nigricantes reperti sunt, sanguine nigro turgidi, Cordis sinus infarci.

Illuſtr. Princeps Sexagenarius, bis aut ter in anno catarrho tenui ad pectus fluente, & orthopnoeam cum suffocationis periculo pariente, afficiebatur: In thorace omnes Pulmonum lobi, intus atque extra, nigricabant, Sanguine quoque nigro turgebant, substantia visceris æquali, dextro ramen lobo pleuræ adnato: Cor in utroque sinu substantiam quandam continebat. *Vide tit. de cordis Palpitatione.*

OBSERVATIO LXX.

Dyspnoea à Carunculis in bronchis pulmonum exortis.

FAmula cujusdam pistoris, quum die quadam lixivium ad lincreamina mundanda pararet, factum est ut inrer loquendum, capite in ahenum forte prono, ore hiantes vapores lixivii elevatos consertim imprudenter intra pæcordia receperit, à quibus mox pectoris angustiam sensit, quæ ad septennium usque duravit: Ego quum paupercula esset, ex perennibus forte destillationibus hanc angustiam autumans, pilulas ex aloë rosar. lambitium & sudoriferum præscribo, à quibus nonnihil levaminis accepit: Haud paucò inrerjecto intervallo, cum sortiora à me remedia quæretet, pilulas illi fortiores & alia præscripti, à quibus nonnihil opis persensit, sed non diu. Tandem desperabunda usum remedium omnino neglexit, hinc angustia hac magis magisque negotium facessente, contigit nocte quadam, cum bene saturata de mensa cubitum pergeret, ut tanta pectoris angustia corripereetur quæ suffocationem & interitum produceret:

Corpus apertimus, pulmonemque colore livido, ad nigrum vergente deprehendimus, absque tamen omni labe, ipso etiam dissecto post asperam arteriam secundum longitudinem dissectimus, & ecce, quam prope meatus Pulmonum, caruncule quamplurimæ nigræ, in modum parvarum glandularum, fabarum & pisorum magnitudinem nunc æquant, nunc excedentes invenæ sunt, quæ Pulmonum meatus replendo, externo aëri introitus & fuliginibus exitum impediabant: Hæc præterea diminuta menstruum fluxione laboravit, quæ forte angustiam hanc nonnihil auxit. *1. Bilgerus apud Gr. Horitium Tom. I. p. m. 142.*

S C H O L I A.

Diminuta menstruum fluxione] Cui jure merito ille caruncularum exortus adscribi potest: mensibus enim subsistentibus illorum ad thoracicas partes & pulmones plerumque recurrit sic, ob æmulationem quæ pectori & partes generationi dicant, in unoque sexu intercedit. *Hippocrati sect. 1. L. Epid. meminit*

societatis pectoris, mammarum, genitrix & vocis: Imo observatur consensus pressus cum arteria aspera & collo: In juvenibus puberibus vox mutatur & fit gravior: Ac venetis uti aspera arteria, catartides & jugulares distendi & ampliores fieri dicuntur.

OBSERVATIO LXXI.

Dyspnoea excitata à multiplici Pulmonum affectu.

§. 1. **G**Asparo N. dolor pectoris & respiratio clangosa: Pulmo dexter colore nigricans ad jugulum erat retractus, pleuræ ad clavicularum connexus: In sinistro tubercula tephaceam materiam continentia. *Vide lib. 3. tit. de Hypoch. tumore.*

§. 2. J. Arminius, cordis palpitationi obnoxius erat, cui accessit respiratoris difficultas &c. In pulmone nihil non aridum ac maculosum, cor magnum sine pericardio: Pulmo bili flavæ innatabat. *Vide tit. de cordis palpit.*

§. 3. Illuſtr. Marchesia febre continua affecta, cum respiratione frequenti laboriosa & stertore quodam &c. Reperti pulmones pene rabefacti & exsiccati, præsertim quoad partem sinistram; dextri multa humiditate excrementitia suffusi. *Vide tit. de lateris dolore.*

§. 4. Puellus crebris anhelationibus ventris inflatione afficitur: Pulmones illi erant flaccidi, & ex una parte purulenti. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 5. Illuſtr. N. difficultas spirandi; Pulmones utriusque lateris thoraci accreti, ab inflammatione nigri, & integra sui parte materia purulenta undique repleti. *Vide lib. 3. tit. de Ichuria.*

§. 6. Virgo biennio ante obitum altum ducebar spiritum: Pulmones illi syderati inventi sunt, maculati, qui compressi saniem & tabum eructabant. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 7. Vir

§. 7. Vir Rever. febre continua affectus cum difficili spiratione & dorsi dolore : Reperita est corruptio pulmonis in parte sinistra versus dorsum. *Vide tit. de Febrisib.*

OBSERVATIO LXXII.

Asthma ab insigni feri copia in thorace.

EX dissectione novimus thoracem repleti sero sanguineo nimio usu repellentium, quod anno 1553. Mercatori cuidam evenit, qui priusquam moteretur laboravit magna anhelandi difficultate : Nihil aut parum expuebat, tandem vita ceceffit, & in thorace reperiæ sunt feri amphoræ quatuor :

Id accidisse puto propter laminam plumbeam quam semper gestabat supra pectus, cancroso tumore affectum, & medicamenta fortiter refrigerantia & repellentia quibus usus est, etiam post supurationem : Argumento est sanguinem residuasse in pectus, quia tumor maximus erat, qui decumuit, & longe minor factus est post usum illorum remediumrum : Et prius cum non laboraret difficultate anhelandi, ab eo tempore difficulter anhelavit, donec de vira excessit : Serum illud erat sanguineum, i. e. videbatur sanguis paucus in sero dissolutus, nec tale esse quale reperitur in peritonæo & pericardio. *Rondeletius meth. cur. morbos lib. 2. cap. 23.*

OBSERVATIO LXXIII.

Dyspnœa ab Hydropse Thoracis & Pulmonum, in quibus aqua spumosa.

Hydrops Pulmonis casus rarissimus est, cujus meminit Hippocr. 2. de morbis, Et ego hunc Hydropem vidi ante annos septem in quodam Clarissimo ex familia Marcella, cui post mortem dissectio inventæ sunt libræ multæ aquæ spumosæ in capacitate Thoracis & Pulmonibus. *H. Saxonia Præc. Pract. part. 1. c. 26.*

OBSERVATIO LXXIV.

Dyspnœa ab Hydropse thoracis & Pulmonum vitio, dextro latere.

Benjamin de Clerck cadaver posttridie à morte, die Augusti x. 1637. apertum fuit, & deprehensum est latus thoracis dextrum humore aquoso subrubente, sed non foetente, repletum, ita ut tæxi. æquaret : Lobi Pulmonis ibi erant omnino flaccidi, vix dimidiam naturalem magnitudinem obtinentes : Vomicæ in iis exiliebant parvæ quatuor, & una magna ad asperæ arteriæ divaricationem, sed libere fluctuabant lobi, nullis villis pleuræ annexi : Sinistrum latus thoracis vix effatu dignum humorem continebat, ibique pulmo in naturali erat constitutione, sed colore paulo pallidior : Pericardium cordi erat firmius annatum, ita ut digitis ab ipso sine dilaceratione separari non posset. Substantia ipsius erat potius carnosa quam membranosa, & sextuplo naturali crassior : Cor omniaque ejus vasa nigro liquido sanguine repleta erant : In abdomine libræ duæ tantum aquæ rubicundæ continebantur : Viscera isturalla omnia erant integra, excepto omento, quod marcidum nigricabat, & folliculo fellis, in quo tres erant calculi, quorum major castaneæ majoris habebat magnitudinem, & figuram triquetram in pyramidale fastigium extensam : Duo reliqui phascoli erant magnitudinis, sed figura planiore, & angulosa ac triquetra fere : Omnes erant tophacei, leves, exterius nigricantes, interius lutei & mediocriter solidi, sed non adeo ac renum aut vesicæ calculi esse solent : aquæ injecti non natabant, ut multi scribunt, sed subsidebant : nec dissolvebantur aut aquam colorabant : In eorum majore apparebant circuli corticales sibi insidentes, ex agglutinatione sensim facta, sicuti in vesicæ calculis per agglomerationem & adhesionem contingere solet. *O. Hurnius observ. 6.*

S C H O L I A.

Ul multi scribunt &c.] Fernelius Pathol. lib. 6. c. 9. *Latus thoracis humore aquoso repletum*] Ex Lymphæ est Thoracis vasis Lymphaticis laterilibus obstructis, mox & ruptis, effusione, atque per tegentem costis membranam in Thoracis cavitatem penetratione Hydroper Thoracis pletumque, si non semper totum habere censet Sydenh. de le Bœ. Practic. l. 1. c. 30. Lympham autem, duplicem facit, unam Glandulosam, aliam à musculis aliisque partibus, ex spiribus animalibus eo delatis ac superfluis ortum habere : Veramque an confusam per eadem vasa Lymphatica pergere ad ductum Lymphæ chyloque com-

manere, ac per universum thoracem ad dorsi spinam, ideoque Thoracicum vocatum, donec tandem exoneretur omnis in venam jugularem, Axillaremve sinistram, ubi sanguini conjuncta descendit cum ipso per cavam venam superiorem ad dextrum cordis venriculum : Hic naturalis Lymphæ per vasa Lymphatica ductumque Thoracicum motus laedi potest 1. quando in totum, vel quodammodo (sic) impeditur, 2. Quando alia via & alio quam verius dicta vena moveatur Lymphæ : Si unquam in totum impeditur ejus motus per Ductum Thoracicum, diu non putem superfluum ægnum. In totum impedi-

potest

poscit per plura vel pauciora Lymphatica vasa Lymphæ motus, imprimis ob eorumdem obstructionem, licetiam à pituita glutinosa per eisdem vasa delata, inibi concretæ ac coagulata: Defertur solet pituita glutinosa per vasa Lymphatica, quoties ipsa in tenui lætissimâ, præsertim ab acris æstu quacunque, corporis motu vehementiore, potu spirituosio agnosovè, imprimis tepido vel calente, copiosius ingurgitato solvitur, & primo quidem per Lactæas venas, mox & Ductum Thoracicum sanguini confunditur, ac postea eum ipso una quaquavertum, ergo ad Conglobatas quoque Glandulas, hinc & vasa Lymphatica propellitur: Coagulan solet pituita eadem in vasis Lymphaticis, frequentius ab aëre externo, pluvia, aqua frigida, nive quoque quovis modo superficiei corporis mollesco frigore afficientibus, ac simul fluida quævis facile coagulabilia in ipso ubivis coagulanti-bus atque ad concretendum cogentibus. Quodsi modo impeditur Lymphæ motus per vasa Lymphatica, tum quando ipsa est glutinosa, adeoque ad motum lentior ac ineptior, tum quando ex parte com-pressa, vel quovis modo alio angustata sunt vasa ipsa: Quoties in vasis suis obstructis subsistit, & magis magis accumulata nimium ipsa distendit, & tandem rumpit Lymphæ, rotas eadem in loca vicina, vel ca-vitates propinquas effunditur, atque tunc alia via, & alio quam decet, movetur Lymphæ: Ea hac Lympha & Thoracis vasis Lymphaticis lateribus obstru-ctis, mox & raptim effusio, atque per regem in co-llassa membranam in Thoracis cavitate penetra-tione Hydropem Thoracis plerumque, si non semper oritur habere censio: Prevenietur vasorum Lymphaticorum in Thoracis intestinibus obstructio, cavendo 1. ne corpus nimium incalcescat, Et hoc si caveri ne-quiat 2. ne Thorace denudato idem mox refrigeret-

tur, ac per consequens pituita fusa, & quaquavertum diffusa poterit in vasis variis, ergo & Lymphaticis concretæ & coaguletur: Curabitur eadem obstruc-tio si quantocumque, quando locum habuerint cause ipsius memoratæ, atque metus est ne notarium malum fuerit productum, allumatur simul ac semel, aut vici-bus partibus sudorificum attenuans & incidens, quale præbent aque Theriacales plures: Vasa Lymphatica rupta, postquam obstructio notata fuerit me-dicamentis laudatis liberata, consolidabuntur sponte, sicut observamus evenire in vasis sanguineis, cum con-glutinandi vi præditum sit ejusvis partis alimentum proprium, quippe plus minus tenax & glutinosum: Hydrops Thoracis cognatu admodum difficilis, nrat satis frequens: Curabitur utilissime (post præmissam Lym-phaticorum vasorum obstructorum resectionem, ac consolidationem, quo ipsius non foretur amplius) continuato tam per laudata medicamenta, quam per stupham siccam iudose, sicque paulatim evacuari per corpus poros æquis, p. n. in pectore stagnantibus: Quibus si nihil efficiatur, & de Thoracis hydropes satis constet, non video cur non liceat per acuta at-tingentem cavam, in Thorace innoxiam instituire pa-cientem: Ea tali namque vulnere parvo nihil peti-culi imminet ægro.

Labii Pulmonis omnino flaccidi, via dimidiata magnitudi-nem obtinens, ramosa in se etc. Indicia dimittit & depravæ ipsius nutritionis: Leditur enim, quando dominatur vel absolute, & ipse plus minusve contabescit 3. 1. quando ipsa depravatur, & substantiam con-sistentiamque acquirit naturali duriorē, compa-ctiorem, aut contra molliorem flaccidi-

oremque, aut etiam inæqualem &c. 3. si id contingat, quando nimis augetur.

OBSERVATIO LXXV.

Hydrops thoracis sinistri, cum crassitie pleura in eo latere.

IN cadavere adulti vidimus hydropem pulmonis: erat in sinistra tantum thoracis cavi-tate collecta maxima copia aquæ limpidissimæ, ad mensuram ferme stulæ unus: nec erat imbibitur in aliquo membro, sed continebatur in cavitate thoracis: Eratque in ea parte thoracis pleura admodum crassa & callosa, Et similiter pulmones, mediastinum, septum transversum & Lien erant callosi fere. *Franc. Michellini observ. 7. appendic. ad Fallopi camm. in lib. Galeni de osibus.*

S C H O L I A.

PECTORIS regionem Hydropes nonnunquam affici, & certo & multiplici indicio plane constat, nam-que illud in vivencibus aquarum fluctuantium sensus ac sonitus, inque delinens æstus ipsæ anatomice eviden-tissime demonstrant: Atamen circa morbi hujus causam, & sciendi modum, quibus nempe vis, & quali-tas dispositio aquarum intra thoracis specum ag-gressio primo incipiat, dein sensum augetur, & sepe-namque insensum, donec morbus deploratus evadit, continetur, res adhuc in absorto latet: Si quando hydrops, aut nascentæ affectus generalis existens, & carnes & viscera cavitates, ubique, aut plerisque in locis occupaverit, nihil mirum est si aquarum istarum illuvies etiam pectoralis occupabit: atamen prop-terea interdum accidit regionem thoracicam, aut primo, aut solummodo inundant, cæteris interim parti-bus ubique satis sanis, aut secundario tantum læsis: Circa morbi hujus oriam, & generationis modum valde ambigitur, undenam, & per quos ductus aqua-rum illuvies usquam intra thoracis specum reperta illic perveniat: Auctor es nonnulli eam desuper, videl-

à capite per trachæam descendere: alique scanorigi-nem ejus ab infra derivantes, à cavitate abdominis, quandoque item ab hepate vel liene, aquas istas in pectoris cavitatem, per vias nescio quas cœcas defen-si statuunt: Verum neutra ex his sententiis, aut assen-sum nostrum vendicat, aut elenchum meretur: nul-lus enim sanguinis & humorum in corpore transitus pendens, aut hanc aut istam commensam viam ag-noscit: quin vero statueri oportet humorem sero-sum, hydropem pectoris excipientem, illic pervenire aut specie vaporis, qui à præcordiis & thoracis par-tibus exhalatus in aquam facile condensatur: Vel 2.^o serum illud deponitur sub propolis forma, quatenus nempe è vasorum, scilicet arteriarum oculis reteritur, in cavitatem istam caudat: Vtrum Lymphæ ductus, aut Chyliferi alicubi apendi, aut disrupti, morborescunt istum quandoque prætextu disquiretur: Quoad prius, in tantum probabile est hydropem pectoris à vaporibus intra specum ejus condensatis nonnunquam exoriri, ut mirum videatur quomodo usquam secus ha-beat, aut quicquam à tali affectu immunis degat: Quatenus

Quantum enim vaporis est, quod à sanguine ebulliente decedit, cumque in præcoctis illis insignis deferret, qui fieri potest quin vapor copiosus in claustris hoc, velut sub alembico conclusus in aquam condensetur? Et quidem non facile erit determinare, cum huius vaporis intra pectus speciem ita perpetim aggerantur, quid de illis fiat, quomodo abstantur, ex cunctis fors obtegetur: Profecto dicendum erit, non vel thoracis parietes penetrare, vel (quod potius videtur) in pulmonem poros insinuari, adeoque inter exspirandum abolari: Væque sane via vapores thoracici exhalare possunt, & forsitan si alterutra deficiat, aut præpediatur, propterea Hydrops pectoris accipitur. 2. Verum inique opinari subest morbum hunc etiam modo altero, (videl. quatenus seuum sub propria forma è vasis exeat) interitum contingere: Enimvero in constitutione corporis cacochymica, aut valde scorbutica, ubi sanguis squosus & subilis serum superfluum è compage sua pulsum dimittit, & ab arteriarum osculis etiam laxa & patentibus ubique officina circulationis filo excludit, nihil utilis est, quam cavitates, nec viscerum, non è præcordia, imò & cerebrum ipsum illiusve aqua inundari: Porro in tam generali ad hydropem diuersi, regionem hanc modo istam vel alteram, primo è nonnunquam fore tantum occupari: quandoque item penetratibus in tactis, cernens exteriores, scilicet masculos, eorumque interstitia, ab illiusve serosa inundari: 3. Inter vasa maxime hydropicam in pectoris cavitatem insinuantur, Lymphaductus & Tubi chylici merito in suspitionem veniunt: Ad priores quod spectat, natropia anatomicæ constitit ingens horum fasciculus ramos pulmones penetrare, utque ab exterioribus eorum oris citius lateris, velis ductus thoracicos tendere, sique lacteum suum, quem à sanguine arterioso suspensum ubique absorbent, maxima ex parte insinuant: Si quando igitur hæc vasa obstruantur, aut quoquomodo à muniere suo defungendo impediuntur, necesse erit aquarum in pectore aggeritionem fieri, quæ postea in pectoris cavitatem decidens, regionis istius hydropem excitabit: Enimvero hæc lymphæ in compagem pulmonarem teleguare, læpennetro accidit vësculis hydarides dictas, in extrema lusu visceris superficie excitari, quæ postea disruptæ, & aquas in thoracis cavitatem dimittentes, ibidem Alciem producant: *Insinuantur affectu in vasis, quando ob tempestatem humorem, & postea aqua ab hydropi progressu interitum, pectus cernitur:* Et quidem nonnunquam in homine pectoris alciem à tali causa procedere sequens historia plane à genere videtur.

Nuper adolescens satis sanæ & robustus, venationi, equitationibus improbis, aliisque corporis exercitiis quantumvis immolens, diu impune afflictus, tandem in thorace plenitudinem, seu velut inflationem quandam percipit: in tantum ut pulmonis lateris sinistram insumescere, & cor extra locum suum dextrosam prorsum videretur: ex sanguis ex parte poliaris eius maxime percipiebatur: Postquam in hoc statu aliquandiu persistit, tandem die cuiusdam quasi vasis intra thoracis cavitatem disrupti sentium habuit: indeque per semibotæ spatium in regione ista humoris velut ab alto in pectoris fundum cadentis, stillicidium non tantum ab eo percipit, sed etiam ab adstantibus ausculti potuit: Quamquam affectus huius celsitudo primo attonitus effect, quia tamen exiit quod vires, appetitum formumque, aliisque naturalia facili recte valeret, mox de nouo locum de medicina negli-

gens evasit: postmodum vero à corporis motu, inclinatione aut agitatione quavis, in latere sinistro aquæ intus aggerit fluctuatio ab ipso percipiebatur, quin etiam ab aliis motus & sonus evidentissime: tum tractu tum auditu percipiebatur: Hinc cum extra dubium foret Dom. insignem pectoris hydropem tunc afflicti, ita vestimentum videbatur morbum istum ex eo origine ducere, quod lymphæ ductus ad pulmonis lateris sinistram spectantes, prope inferiorem sinu in ductum chylicum primo obstructi, ad molem insignem intumescere, & postea disrupti humorem suum in thoracis cavitatem exillarent. Quando nunc præcordiorum, atque adeo vasis inundatio immineret, tandemque vis egregius sibi medicandum ratus medicum adit, & curationis ergo pharமாக quardam rursus sumpsit, sine ulla tamen fructu notabili: Deinde Londinum adveniens primo D. D. Lovett consuluit: Hic thoracis apertionem, quasi unicum remedium proponens, me quoque in consilii partes adiciit curæ: Dein statim communi consensu lateris scissio decernitur: itaque post factam rotas provisionem, Chirurgus inter sentiam de septicam venarum caustionem applicuit, & postmodum foras in pectoris cavitatem scisso canalem indidit, quo facto statim liquor crassus, ac instar chyli albescens, & quasi lactis effluebat: Huius primæ vice tantum sex circiter uncie detrahebantur, & postmodum tandem: Die tertio, cum paulo major quantitas eire sineret, magno statim langore affectus, & dein febricitans per diem unum aut alterum male habuit: Quapropter donec temperiem & vires recuperaret, morbus istius exitum inhibere visum est: postea vero ejusdem evacuatione tantum pauci quotidie facta, pectoris cavitatem in totum inaniebatur: adhuc vero canalem cum epithimio in foramine gerit, quo semel nycthemeri ipso apertio, humoris ulque tantillum emanat, aliisque exercitiis prius assuetis facis vegere obit: Pharmacia hæc molis est usui, aut opus habuit: Post tectorem cardiacam temperata scilicet pulverem perlarum, halapia & quandoque hypnotica, & postea decoctum tamaricum quotidie bis sumendum præscripsimus. Hæc methodo, & medicamentorum formæ aliquandiu continuatis, Vii insignis temperiem, vires, corporis habitum, imò & pectoris immunitatem recuperare visus erat, atque tamen cuncta à genere in lateris foramine (è quo ichor quotidie effluit) gerere: cumque post aliquot menses hæc subacta funicella occluderetur, intra pectoris specum ejusdem humoris, per sonitum de fluctuationem percipibilis aggeritio fiebat: deinde vero cum recurrente morbo idem recurreret remedium, proindeque lateris apertio decerneretur (forte natura hoc Chirurgi mauere defungente) ea sponte obveniens, materia ad erumpendum apta exitum præbebat: tamque necesse incumbit ad præcavendam pectoris illuvium, foramen istud quasi locum constanter præfieri. Ex his constare arbitror pectoris Alciem, quandoque ob vasa lymphatica intra pulmonem disrupa exoriri: nec minus dubito quin idem affectus etiam à ductibus chylicis, intra thoracis cavitatem distractis exoriri possit, aramen tamen sec.

Wills Pharm. rat. p. 2, f. 1. cap. 13.

Thoracis pleura admodum crassa Quod in pleuritidis casibus animadvertere licet: de cuplo crassorem & syderatam in his visidit aut

Rotam Anstr. Anatom.

lib. 3. 4.

OSNEY.

§. 1. *Dyspnœa à thorace aqua sanguinolenta pleno.*

Fuit Ingolstadii vir doctus, qui quod incautus esset in victu, & studiorum graviorum occupationibus detineretur quotidie, raroque exerceretur, sensum in cachexiam incliderat, quæ hypofarcam in propinquo esse denuntiabat: Sollicitus de salute me & plurimos consuluit: Etsi autem venter, qui prius subtrunidiore videbatur, falsis purgationibus convenientibus humorum mole sublevaretur, tamen spiratio difficilis tam non diminuta est, ut etiam sensum augetetur: Itaque cum diu hæc affectio protracta esset, tandem hic vir optimus suffocatione periit, cujus demortui thoracem cum aperiremus, animadvertimus (quod & ante suspicabamur) thoracem aqua sanguinolenta esse omnino plenum, ita quidem ut ea exempta, libras quatuordecim exquireret: Ex qua frequentem apparere hunc hydropem, si modo advertatur, conjici facile potest. *Ex Oethai observationibus.*

S C H O L I A.

Falsis purgationibus.] Mirum serum in pectus & pulmones effusum purgationibus non cedere, cum idem in habitum extra vasa illapsum seminare possit, quod in me aliquando sum expectus, cui à feri febre & orgasmo in caput facies adeo laevis mutata, ut ejus partium aliquas superessent lineamenta, quæ tamen protinus, & ad pulmonem sedem subdidit, assumpsit pulv. rad. Gialapæ ʒij. ut eadem die in prandio assidere mentis potuerim, nullo superflue tumoris vestigio: Sed experientia refragari nefas est, Testis Cræto apud Aëlium Conf. 4. In morbis aut, pectoralibus turissimum esse abstinere à medicamentis purgantibus re ipsa compertum. &c.

Circulum universum aqua perfusum, & thoracis dextri spatium aqua vi distentum &c.] Dyspnœa, pulmonum & thoracis vitio singulari ac socio excitatur, causas egregie reddit Thomas Willis *Præf. arteriæ cap. 12.* Dyspnœa, aut, affectio nem quandoque pulmonum vitio accidere facile credimus, quoniam anatomica plane detexit: nam si colluvies serosa ingent, in thorace deposita, pulmones plurimum inleat, illorumque poros omnes & meatus in tantam obstruit, ut in circuitu impediens vasa pneumatica hanc libere pertranseat, propterea quidem taliter affecti nullo non tempore anhelosi sunt: Deinde quoties sanguis, ab exercitio aut calore lecti plus incal-

lesens & rarefactus, pro circulatione sua intra pulmones spatium amplius requirit, tunc statim à tali occasione respiratio creberrima, live paroxysmus asthmaticus citatur: Si præter hanc morbidam diathesin pectoris, etiam massa sanguinea lactice seroso abundans, subitis fluxionibus & feri effervescens apert fuit, hinc etiam ob violentum feri effervescens, in pulmones prius obstruatos & valde oppletos incutitur, non raro istas morbi insulas graviores & pene suffocative eveniunt. Porro interdu præter asthmatis radices, uti dictum est, circa præcordia de his, ejusdem morbi germina quædam ab ipsâ v. pullulancia, prioribus occurrunt, cumque ista complicata, immaniores dyspnœæ simul producant: Nam siquidem pulmonibus sero oppletis, ejusdem amplius in sanguine redundantis quantitas alia, particulis ipsamodi inbus, capiti suffundatur, eadem nervos pneumonicos promptius quam alios subiens, asthma thoracicum prius simplex & moderatum, periodicè vehementius & convulsivum efficit.

Thoracis dextri spatium magna vi aqua distentum &c.] Ex Lympha è Thoracis vasis Lymphaticis lateralibus obstruatis, mox & cupis, effusione, si que per tegentem costas membranam in Thoracis cavitatem penetratione, Hydropem Thoracis plerumque, si non semper, ortum habere censet Sylvius de le Boi Pract. 1. 5. 4. 10.

§. 2. Quidam in Cachexiam (vide lib. 3.) cum difficili spiratione incidit, & sensu ponderis: Thorax universus aqua plenus repertus est.

OBSERVATIO LXXVI.

Dyspnœa ob Hydropem Pulmonum & Thoracis.

Sexagenario maxima erat Dyspnœa & Pulsus inæqualitas: Pulmo & Thorax aqua pleni inventi sunt. *Cardanus de causis & signis morborum.*

OBSERVATIO LXXVII.

Dyspnœa ab insigni Hydropre thoracis & Pulmone putri.

Thomas N. febre nocturna laborabat cum anhelitus difficultate pene suffocante: In thorace aderant serosi humoris putris libræ Parisienses decem: Pulmo totus putrilaginosus. *Vide tit. de Tuss.*

APPENDIX.

Thoracis Hydrops sine Dyspnœa.

Virgo brevi morbo sublata est: Dissecto thorace, ab utraque ejus cavitatem confertim aqua virose magna & effluxit copia ad libras iv. mirum quod orthopnœam, vel saltem dyspnœam, viventi non invexerit, aut fluctuationem non prodiderit. *Vide tit. de Phthisi.*

S C H O L I A.

AN forte conflatus sibilus lymphæ in thoracem à pure? fidem facere videntur morbi brevis, & forte sibilus sive ob obstruptionem vas aliquod, aut caelum à pure? fidem facere videntur morbi brevis, & forte morbi subita, inchoata suffocatione.

OBSERVATIO LXXIX.

*Orthopnea ab hydropse pectoris dextra parte, Pulmonibus retortidis
& pure prægnantibus cum diffusionione à capite.*

Exemplum Asthmatis convulsivi & Pneumonici.

VXor Nobiliss. N. initio Februarii anni 1616. eam spirandi difficultatem sensim incurrit, quæ tandem evidenter gravis, crebra sublimisq; esset & cum crecta cervicæ, sed inæqualis; de nocte scil. plurimum, sed diversis horis ingravescens, modo prima vigilia, modo 2. aut 3. pro vario cance pruinx casu, at de die remittens de sua vehementia: Huic difficultati palpitatio cordis sese adjunxit, à qua pulsus non admodum depraveretur, sed increbesceret tamen & minueretur admodum, adeo ut in æquæ paroxysmi prorsus in brachio sinistro delitesceret: Quartana Nobilem mulierem magnam superioris autumnii partem detinuerat satis, vehemens illa quidem, continua siti utens, & ad frigida potum largum & frequentem quotidie cogens: Superiores hyemes totas coryza tussisque negotium exhibuerant, sed hoc tempore acius infestare ceperunt: Prurire quintæ etiam erubescereque præter modum nares partemque confines, ac sanguis ex eisdem grummosus sæpe stillare; uti & in morbi decursu pustule aquosæ os sordare, & aqua ex dormientis ore continuo disfluere, denique caput gravari & sternutatione frequenter concuti. Cum igitur adeo manifesta essent capipleniæ & catarrhi in pedus indicia, arque propinquo medicamento phlegmagoga gravis illa dyspnoea tantum cepisset leuamentum, ut ægrotare per domum, prope sui juris facta, posset, ecce de repente tertio die, sub crepusculum & primam vigiliam, dyspnoea ingravescere adeo vehementer cepit, ut in suffocationis periculum pene venisset: Exinde dyspnoea, & præsertim de nocte gravior non destitit opprimere, sed ita ut per insignes temporum mutationes valde semper angeret ad prope suffocaret per aliquot dies, deinde vero mitius, sed premeret tamen: Febris interea non dare quietem, etsi levis admodum, sed tamen siti vigiliisque fere perpetuis comitata, Lingua autem nigra quidem, non tamen arida, & urinæ perpetuo decolores, h. e. aqueæ, feri lactis, sed non exquillite purati instar, & sedimento carentes, nisi quod aliquando purulentum quid in imo subsidebat: Cum hic status rerum esset roto quadragenario, vomitus inde urgere cepit, & de nocte fere quotidie, non solum assumptorum ciborum, sed & aquæ sinceræ, cui, quanquam non cessanti, sese post octiduum diarrhæa etiam aquosa & diurna sese adjunxit. Notandum ab initio fere morbi universum caput cachexiam evidentem præ se tulisse, abdomenque, sed præcipue hypochondrium dextrum, distentum apparuisse, & maxime pedes, qui sedenti præsertim adeo immanem in modum intumescebant, ut aqua per cutem quasi tralucere videretur, nedum fluctuantem eam tactu deprehendere erat: Ad hæc accessit circa deliquium Lunæ, Mali initio, soporosa affectio & insolens, quæ apoplexia aut lethargi non inane metum mihi iniecit, nam vix exadio dimidiato die apoplexia gravis & lethalis ingruit.

Dissecto cadavere Cerebrum universum aqua totum perfusum repertum, & thoracis dextri spatium magna vi aquæ distentum: quinteriam nonnihil aquæ in imo abdomine collectum repertum: Apparuit præterea substantia Hepatis, & utriusque Renis, omnino decolor & albida: Pulmones ipsi retortidi & multo purulento rabo prægnantes reperi, alterque à pulmonibus fere torrefactus & corruptus totus inventus. *Carolus Pijò de morbis à Sero sect. iij. cap. viij.*

S C H O L I A.

VEhementissimæ ex se & immodicabilis dyspnoeæ causas hæc facile sunt in tanta symptomatum heterogeneorum multitudine distingui cognoocere: Mihi tamen singula expendenti, præter catarrhum à capite factis manifestum, duo decredi alii longe graviores affectus, licet ex se obscuri, scilicet hydrops thoracis, & tumor viscerum ac præsertim

dextri, phlegmonodes: phlegmonodes quidem affectus tecum habui febrem continuam, etsi valde mediocrem, quasi latentem, immo etiam hepatis non obscurum, & occasiones externas, terrorem scilicet vehementem & horrorem triduum: Hic scilicet ex causis sanguis sponte in viscera, & præsertim hepatis secutus, simulque vehementer compressus

N n

pulsus

Pullus fuit, ut crassiore parte testente in iis tumor non mediocriter fuerit exaltatus, ilique brevi scirrhus per resolutionem aqueæ in eo partis, scilicet factam ab incendio febili: nam reliqua aquosior portio magna ex parte, tum compulsa ab usdem causis redundavit in vasa magna, deliquavitque & iterum in thoracem, unde similis hydrops quoque thoracis sequutus, live quod natura sibi invenit vias, ut loquitur Hipp. 6. Epid. corcæque per spiracula sibi apprimè cognita, aquam redundantem refandit, ut sepe alia recitamenta, live quod aquosus humor, una cum sanguine leviter è vasis thaliens, retodatur sub vaporis forma ex iis, imò ex membranulis, live pleura live pulmonum, ilique superatis mox in amplo eo spatio, remisso calore, ad ingremium redit aquæ, non aliter atque è eute ipsa quicunque vapor aqueus abire solet. Sive quod idem serum è finibus extremorum vasorum per amplas thoracis membranas decurrentium, sub propria forma & sensibili exiit, exundante confertim in thoracis cavum, vel in intestina ipsa, ut hydrops abdominis & diarrhoea aquosa facis indicant: Huius autem hydropsis pectoris lætencia fuit exacerbatio dyspnoæ, live primo somni tempore, live quociescunque serum semel ibi collectum, aliquem concupesci fervorem, aut vi temporum mutationum subinde ingruentium, aut per animi pathemata & præsertim iram: nam alias ipsosce deservetente sero, minor erat molestia, præsertim quod dextrum tantum latus aqua scæceret, ut decubitus & quies in eo uno non difficulter arguebatur. Probabile igitur priorem illam difficultatem fuisse cæteri sobolem, ex se evidentia, sed secundam longe graviores, illi adhuc supersticij superavisse cenno, per seri è vasorum spiribus decubium & confusum in thoracem, sensum ab ambien- tis inclementia, toto triduo quo se crepusculo & frigori externo exposuit, illanem: accessit quod verosimile est è pulmonibus, multa aqua ipsa præ- genantibus (cùm ex Hippoc. pulmones æstuantem epotam aquam affatim imbibant) non minimam ejus

partem pereolasse exundasseque in inane spaium tho- racis: Seroæ autem pleonæxiæ, live illius quæ deflavit è capite in pulmonem; live illius quæ è toto habita pulmonibusque ipsi inuit in thoracem medium, causæ previdentes fuerunt, partim error exercitus, partim corporis constitutio calida secca, tum nativa, tum adiecinia, ratione febris præternæ, & forte empyreumatis quantanæ: scilicet porus aquæ vel gelidæ profutissimus tota hyeme quodiduanus & frequens uberem materiam illi dedi: Notum autem sanguinis massam copiosam supra modum sero dissolvere in calidis licetis nautis, & præsertim quantanæ, quibus pet- petui quippe sudores, uinæ copiosæ spiritibusque assiduæ: Cùm igitur serum plurimum redundaret, sup- pressum ab hyberno frigore, & sensim ab intempe- rantie ponæ auxisset, quid mirum tanta corpus pleo- nexia serosa corpus laborasse, quæ omnes ventres & habitum proluet et inflat: quæ & caetera de hædæci confirmantur ejus præternam subitum è nervis san- guinis, & sanguis è vena secta educus, tum vero aquæ remissus diarrhoea aquosa, & imprimis dissectio cada- veris. Nam & cerebrum universum aqua perfusum fuit, unde Soporosi affectus supervenerunt, ilique tandem lethales: Et thorax dextri spaium aqua vi distentum, quin etiam ejus nonnulli in abdomine collectum: nam probabiliter major portio aquæ, quæ prius collecta erat in abdomine sensim depluit in atria singulis die- bus, quod ipsa sedete potius coegerit quam pætere: Substantia vitem hepatis & utriusque renis minime doletur & alvæ fuit, An quia depluvium aquæ, episcque len- tæ, assiduum, floridum vilcetem colorem, una cum calore insulo corripuitur examinæque: Pulmones autem ipsi retroride & involo parvulento loto prægnantes re- perit, scilicet verosimile est, saltem sub finem mor- bi, reliquias sanguinis intrasse in subelancos pulmo- nes & ibi potuisse tandem, unigue ab ejus inqu- natione computruisse parenchyma pulmo- num, nam aliter è pulmonibus fere interfectum & corruptum tum videntur. Idem ibidem.

OBSERVATIO LXXX.

Assthma ab aqua utramque Thoracis cavitatem replente.

NOBILIS N. temperamento impense calido, & annorum aliquot supra lxxx. sen- sim gravi spirandi difficultate opprimi cepit, & ea quæ de nocte potissimum ne- gotium exuberet, scilicet cum primum somnus eum de more teneret, tum de su- bito suffocatio somno interrupto senem excitabat, ut invitus è lecto surgere, & si- miru ad fenestras cubicali confugere, liberioris aeris naribus apertis captandi gratia cogeretur: Videre erat Senem inflammata facie spiritum ex alto citantem, scapulis palpitantibus, & nullibi locorum consistente placide, & vel rigidiore hyeme ab omni foco maxime aversum, imò dio sese ultro exponentem, ab ea tamen angustia sensum sine sensu, die procedente liberiozem fieri, præsertim post meridiem, sed succedente somno iterum affectio recurrebat & urgebat pariter optimum senem: Jam autem unum & alterum annum ita mire suspiciosus vixerat, ut animam in dies, aut potius in noctes agere videretur: Medicis, quos ille consuluerat, aliis Incubum, aliis Sonticum morbum opinantibus, sed tandem morte non immatura excessit è vivis.

Chirurgus mortuum disseccans reperit pulmonem præcordiæque in plurima aqua septris thoracis interclusa innatantia. C. Pijo ibidem cap. vij.

S C H O L I A.

Ego amente anhelum illum inuius, multaque per unam aut alteram horam apud me mediatur super causis tam pertinacis angustiae, & quotidianum circuitum per se ferens, conclusi tandem humorem illum, siue bronchia ipsiusque pulmonem occupantem, siue medio in pectore potius stagnantem, ejusmodi esse ut fomes quidem tempore, per palindomen spiritus vitalis in praecordia refluens, novum conciperet quendam fervorem, adeo ut cum ita effervesceret, ipso veluti suo contineri ut autem non posset, pulmones comprimeret necessitas, itaque motum liberum interceperet: fervore autem eo sensim quiescente per se, spiritus scilicet praecordia in habitum corporis, ut sit in vigilantibus, refluens, tum pulmones spatium liberius recuperaret, quomodo sic spiritus non tanta cum angustia: Eum porro hu-

morem unum serotum esse posse, siue aequum, qualem vieteram olim semel & iterum in dissectionibus corporibus: Quare summa ratiocinationis meae adducta est eo tandem, ut dyspnoeam illam singulis noctibus urgentem, & de die nonnulli remittentem, in hydroperem thoracis referendam esse apud me statuerim. Cum autem affectum diuturnum & gravissimum, nondum acrius adhuc viribus primo quoque tempore corrigendum esse ratio juberet, corpus statim repurgandum praecipui, & consilium me aperiri sibi permiseret latus alterum, ut sensim aqua illa educta animam liberiores duceret aeger: Quod consilium meum tandem quam par erat cum audiret Cliturgus, nimum agro blandiens, hic interrim excoctis & vivis. idem.

OBSERVATIO LXXXI.

Asthma à thorace universo aqua pura & stupenda copia repleto, cum Hepatis tumore.

Revetendus N. primo autumnii frigore febre & catarrho in pectus decumbente correptus, exactis sex septimanis circiter utcumque revaluit, sed die natalis Domini aquilonia tempestate desubito saviente, cum sacri pervigilii celebrandi causa media de nocte domo exiisset, ab horrore longo in febrem rursus ac dyspnoeam gravem incidit, quae somnum abrumperet, nec nisi sedenti & erecto spiritum ducere permitteret: Ego tum insignem in hypochondrio utroque, sed praesertim dextro, tumorem, febrile vehementi conjunctum cum deprehendissim, non aliam, ut ingenue fatear, dyspnoeam causam sum suspicatus, quam evidentem illam diaphragmatis compressionem à distentis nimum visceribus.

Sed in demortui cadavere, lx. die à recurso febris, praeter Hepar tumidum, induratum, retortidumque, & pumicis instar hincum ac poris distinctum, universus thorax aqua pura plenus inventus & in stupenda copia. C. Piso de morbis à sero cap. viij. sect. iij.

S C H O L I A.

Vl frigoris ambientis sanguis à praegressa febre aditus, in viscera praecordiaque, ceu sanguinis fontes, impulsus, ut horror diuturnus pallorque indicavit, parvus adeo per quatuordecim, ut venae sectionem, ab amente febre altis insinuatam, praefusa diffusit: Impulsus inquam sanguis in vas submerat, sed serum in thoracis medium spatium longe lateque & valis exadavit: quam feri copiam stupendam auxisse probabile est eporam pituitam, largius pridie mortem, ab anheloso scilicet, sed astuoso pulmone attractam immodicè, ut urina rursus suppressa penitus arguit. Animadversione autem digna fuit in Rev. viro resolutio utriusque brachii, jam à principio recursus manifestata: quam tamen tribui debere fluxioni à capite non improbabile nunc fuit, quod catarrhus priori febri se adjuverat, facileque is commutari potest cum stopore brachiorum: Hic, ut reliqui hydrope thoracis laborantes, pariter ægerime respirabat circa primam vigiliam, nec se loco continere poterat, non solum eo motum febris vespere recrudescens, sed eo fervorem aquae thorace delictiscentis: idem, idem.

Hepar pumicis instar hincum etc.) Ferunt Pathol. lib. 6. c. 8. hydrops ascitis causis inquirens, ait eum saepe accidere quia viscerum substantia siccitate humilisque penaria, ceu rimis quibusdam debilitate, eorumque ambientis membrana distringitur, ut non amplius tenue forum continere possit, sed id serum mo-

re elabi sinat, atque sensim quasi ex fissa olla stillare in vacuum abdominis spatium. Hic igitur mentio quia quaerit, cur cum Hepar Viro Reverendo repletum fuerit humidum, induratum, retortidum, (febris praegresse progenies) pumicis instar hincum ac poris distinctum, Cur inquam ascites non successerit praesentibus causis? Abhuc indicio est quod in imi ventris apertione, prodeuntium vel excurrentium aquarum nulla fuit mentio: Demum Dyspnoeam causam Clar. Piso non in solum thoracis hydroperem & hepatis tumidum rejecit, Cum inier hydropis ascitis signa dyspnoeam recensentur à presso diaphragmate: Hydropis thoracis causas adscribit Vir Clar. fluxioni à capite illapae. An non potius ferri ex abdomine in thoracem confusus incandens? Revera hydropis abdominis causa frequentissima & efficacissima adsiste, scilicet Jecoris siccitas & fetiditas constitutio: Si ergo serum in imo ventre non repletum, sed plenum in Thoracis cavo, illinc huc migrasse conjecturæ locus est, eo forsitan eo febris vehementiam illeceum & transilum: De viis non maxie sollicitus erit, qui praeter Effusam decantatam, valorum lymphaticorum Jecoris, (quod athenum coem principium est) cum vasis lymphaticis Thoracis communionem agnovit: quorum illa forte, nonobstante hepatis vitio, integra permanens: huc vel in partem, exesa aut alio modo vitata fuit, ut hinc repleta thorax fuerit.

*Orthopnoea à sero fetido capacitatem thoracis replente,
pulmonibusque sphacelatis.*

Henricus Appleton mense Julio 1664. cepit conqueri de orthopnoea, cujus occasione somnum capessere non poterat, sed semper erectus ambulare cogeatur, nisi forte in cathedra sedens prono pectore paulisper aliquando quiesceret, ut prae nimis vigiliis summam virum iacturam sit passus: pulsus interim satis robustus, lenis & aequalis erat, appetitus mediocris & utina laudabilis, nec omnino sitiebat, unde viscerum tum naturalium cum vitalium integritas significabatur: postquam aliquandiu laborasset, ego vocatus eum intellexissem illum continua quidem dyspnoea detentum, ea tamen praecipue affligi cum ad somnum se componeret, Hydropem pectoris adesse pronuntiavit: Multa illi praescripta fuerunt alterantia & hydragoga, necnon topica pectori applicata, sed in Emeticis praecipuum experiebatur levamen, fugax tamen illud & parum permanens, nam intra unum aut alterum diem relabebatur: hidrotica, quia in lecto recumbere non poterat, non praescripsimus: Narravit autem uxor superiore hyeme illum gravi catarrho laborasse, quo sponte evanescente scrotum illi tumuisse, eum tumorem topicis quibusdam applicatis, citra catharsin aut aliam totius praeparationem disparuisse: Hinc conjecturam feci ferisum humorem catarrhi materiam primo à pectore ad scrotum metastasi facta, tandem à sero ad pectus palindromen fecisse, ut facilis & frequens partium spirabilium cum genitalibus consensus, & è contra: quare dum adhuc viscera essent incorrupta, apertionem lateris ad feri educationem, ut in Empyemate fit, consului: Sed illo id remedium genus averfante, suasi ut saltem in utroque inguine permitteret excitari fontanellas, post cucurbitulas & vesicatoria frequenter ibidem applicata, ea spe ut serum à pectore ad scrotum, eadem quae ascenderat via remearet: Sed interea dum in levioribus tempus verteretur, sitis intendi, appetitus prosternei, pedes tumere, pulsus in crebrum, debilem, intermittentem mutari, morte non ita multo post sequuta.

Cadaver apertum, capacitatem thoracis sero fetente refertam, pulmones sphacelatos, ventriculum & hepar puria & livida conspectui exhibuit, sero ob diuturniorem in thorace moram putrescente, & putrilaginis contagium primo vicinioribus, ac tandem etiam remotioribus visceribus communicante: *Edmundus de Meara in hist. Medicis rarioribus p. 136.*

SCHOLIA.

A sero ad pectus palindromen, &c.) Consensus Tertium est magnus i. cum hypochondriis, intestinis, ventriculo, hepate & liene 2. cum corde, 3. cum pulmonibus, mammis & thorace, 4. cum aspera arteria & collo, 5. cum auribus, 6. cum oculis, 7. cum cerebro & nervis, inquit *Martinus Fundam. med. Physiol. p. 398.* Eum qui cum Thoracis partibus intercedit ostendit *Hippoc. 2. Epid. sect. 1. Quum Testis inquit intumuit à tussi, memoriam renovat societatis pectoris, mammae cum, genitura & vocis; Id est, explicante Vallesio, instrumentorum genitalium, quae sunt uterus, testes & virile membrum; Et vocalium, quae sunt impetibus larynx & nervi recurrentes; deinde*

de & thorax & omnia instrumenta respirationis: Hanc consensio & communio multis significatur indicia: Mutatione vocis ex usu veneris & ex testium desectis: Intumescencia mammarum, ex suppressione menstruum: gracilefcentia eorum in abortu, & mutua passione thoracis & testium, qua scilicet ex tussi sicca & antiqua intumescit Testis, & ex illius intumescencia fit Tussis: Illa vocalium cum genitalibus communio est manifesta in venis, quae de mammis descendunt per musculos testos abdominis & committuntur cum ascendentibus ex utero; Et in nervis sexu conjugationis, eadem enim mittit furculos quosdam in Testes & producit nervos recurrentes,

OBSERVATIO LXXXIII.

Dyspnoea à sero cruento loturam carnis referente, thoracem replente.

Notanda historia D. Briçonnet: diu laboravit, erat catarrhosus difficultas spirandi: Alii referebant ad *ζέρισμα τῆς γυναι μάχαλας*, Alii ad pulmones: Pulsus erat inaequalis & valde inordinatus & perturbatus: Interit repente.

In thorace magna quantitas reperta est aquae cruentae loturam carnis referentis: Unde hoc & quomodo factum fuerit, non est facile conjectura assequi: *Ballonius Epid. & Ephem. lib. 7. pag. 217.*

SCHOLIA.

Z (ἡσυχία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.) Aliquando vapores & flatus ab imis visceribus exurgunt sepiusque comprimentur, unde asthma fluctulentum exoritur: Humores præsertim melancholicus, hypochondriis concipitur, ubertem fluitibus materiam suppediat, hinc

melancholia fluctuosa τὸν ἀσθῆνα dicitur, quia ab hypochondriis est, asthmaque fluctulentum vel hypochondriacum nominatur: Aristoteles inter signa asthmatis immanentis, flatus in præcordiis, & eructationes præter rationem enumerat.

OBSERVATIO LXXXIV.

Asthma à sero cavitatem pectoris sinistram replente, lixivio simili.

*V*ixit in aula Imperatoris *Marchio de Finali*, Is per omnem fere ætatem prospera usus valetudine, robusto & procerò corpore, circa extremum, ultra 50. annum, multis & variis affectibus conflictatus fuit, nunc catarrhis, nunc scotomia, nunc melancholia, nunc pedum inflatione, nunc hydropis suspitione, postremo etiam Dyspnoea: multa tentata remedia, sed calor naturalis actuare ea nequivit: ita respiratione intercepta, cum nequicquam expueret, suffocatus obiit, cubans ut plurimum in sinistro latere.

Dum cadaver exenterabatur, in ventre inferiore nihil vitii conspectum fuit, sed pectoris sinistra cavitas aqua purpurea referta fuit, lixivio substantia & colore simili, qua spongia exhausta, apparuit in pulmone ulcus grande cum cineritio icthore: dextra pectoris cavitatis naturali formæ per omnia respondebat. *Ex Iohannis Aicholsii observationibus.*

OBSERVATIO LXXXV.

Asthma à pure in thoracis parte dextra contento, septum deprimente & pulmonis. ulcere, cum abdominis hydropo.

*S*uor nostras anno 1586. Vir annor. 30. apertus fuit, pituitosus, hydropo ratione asthmatis causato perit: Is antequam tumere venter inciperet, in regione dorfi latere dextro, tumorem habuit carnosum, non recedentem à colore cutis, quem Tonfor cultello incidit, quo aperto nihil nisi aqua effluxit per aliquot dies, postmodum vulnus curatum fuit: Sed cum tussi vehementi divexaretur, pedes cum ventre tumere inciperent, dyspnoea adesset, Medicorum consilio usus, tandem & meo, exhibitis iis quæ videbantur ad morbi curationem palliativam potius facere, per certa intervalla melius habere cœpit, mox recidivam passus perit.

Abdomine aperto, quatuor vasa xnea tonforum aqua tepleta citrina effluxere: *Viscera omnia in abdome contenta satis commode habebant, solo omento excepto: Diaphragma verò non ab hepate sursum comprimebatur, sed à matetia in thorace contenta præter modum deprimebatur: Thorace aperto purulenta materia vasa tria xnea repleta effluxere ex latere dextro, cuius lateris pulmo totus ea pus abierat, sinistro integro persistente & satis commode se habente: Hinc asthma, hinc tussis, hinc hydrops, ex pulmonis ulcere dependentia omnia. Gaspar Bauhinus de Observat. propriis.*

SCHOLIA.

*V*iscera omnia in abdomine.) Hinc constat hydropem abdominis aliunde ortam quam à vtro jecoris, quod sæpe accidit suo loco videbitur.

Solo omento excepto.) Quod in morbis longis vitia tum semper obiectatum.

Purulenta materia vasa tria etc.) Empyema nunquam primario & per se incipit, sed aliorum morborum haud rite iudiciorum fere semper prodoctum est: Ratio formalis, sive causa conjuncta, materia est purulenta è pleura, aut pulmone, (sicut præsentis in casu) aut lympe in cavitatem thoracis effusa: Circa materiam morbosam quædam disceptatio est, quippe alii hanc merum pus, alique non hoc, sed materiam purulentam esse contendunt, in qua opinione est Io. Heurnius, qui materiam purulentam pro Empyematis causa statuens, inter hanc & merum pus quædamque pus distinguit, asserens hoc fieri, ab humore maturo sanguine hoc est, ab ipso sanguine aliquantulum

corrupto, sed papasini capaci: materiam vero purulentam humorem excrementitium, vid. serum aut ichorem esse, quia sanguine inter circulandum alicubi prædicto & obstructo provenit: Hinc observare est de abscessu, qui pus verum & laudabile habet, cum plerumque compactum, undique conclusum, & vel cysti, vel privatis quasi montis obvolutum esse, deinde postquam maturus, & disruptus humorem concentratum effundit, cito ac facile sanari: verum abscessus materiam purulentam præbens nidum suum non ita constitutum & parietibus obseptum, sed plerumque inaequalem & sinuatum obinet, atque disruptus sanem potius quam pus effundit, dein ob ob peccentem humoris excrementitii sicut ginem ægce sanatur. Quamquam autem istam puris & materiam purulentæ distinctionem haud improbamus, tamen nec solummodo hanc, nec semper istud Empyematis causam conjunctam esse statuimus: cum hic morbus pleuritici

N n 3 simplici

simplici succedens, ab apostemate in latere sup-
purato & disrupto oritur rapidissime parum merum-
que pus est, quod in pectus decidens morbum istum
parit: Si succedat peripneumonia (nisi pulmonis
vomicæ intercedat, mæties ichorosa, circa plegmo-
nes locum aggesta, post coctione crassescens, pul-
monis unitatem solvit, & tandem membranam in-
vellicentem perforata, inque thoracem exundans Em-
pyema producit: Ista materis purulenta potius quam

merum pus dicatur. *Willel. pharm. rat. part. 2. sect. 1.
cap. 10.*

Hydrope ratione asthmae causæ.) Ab humoribus
scilicet crudis & serosis à venoso genere per arteriam
pulmonarem in pulmonem transactis, qui si ad bron-
chiorum canales profusant, verum asthma cum stre-
pore inducunt: Si verò in pulmonum substantiam, vel
in levibus arteriis subsistant, asthma spurium sine
strepore generatur.

OBSERVATIO LXXXVI.

*Asthma à triplici hydrope inductum, Thoracis, Pericardii
& Abdominis.*

Vir temperamenti laudabilis, ann. 32. cum aliquandiu potationibus nimis indulgisset,
præsertim vino Gallico stillatitio, paulatim in gravia incidit symptomata, Dejectus
ciborum appetitus, adaudi dolores hypochondriorum, maxime sinistri; anhelitus diffi-
cuker reciprocatus, *urina* cum redderetur, *turbida & pauca*: sanguis scorbuticus, superne
viridis, glutinosus, serum ejus multum & quasi croco tinctum, somnus vel nullus vel
parcissimus: Occursum fuit tot malis sanguinis missione repetita, emetico, catharti-
cis, vino medicato & per epicrasin operante, diureticis, antiscorbuticis, chalybeatibus, aliis.
Incasum universa: Invaluit violentissime asthma & dolor sinistri hypochondrii, quibus
tandem succubuit, & corpus suum post fata Anatomicorum ferro obtulit.

In appetito cadavere quæsitum statim hypochondrium sinistrum, ubi mox in conspe-
ctum prodit Lien, iusta magnitudine quadruplo auctior, durior naturali temperie, & nigra
quadam amurca hinc inde distentus, cui vicinissima costa suprema notha, & illa vitiose
distorta labem affricuerat. Intestina superiora lividiuscula, & gangrænam minantia in
aquis turbidis natabant, vero hydropis abdominis argumento: Hepar tamen cætera
sanum, nisi quod iusto durius esset: In pectore novus se calamitatis fons aperuit, enim-
vero & pulmones parvi, exsuccati, flaccidi, & si ultimos margines excipias, semiputridi,
aquis fixidis copiosisque innatabant, & quod stupori proximum, pericardium ita am-
pliatum distentumque, ut tres libras, & quod superat, acris turbidique liquoris sinu suo
complexeretur: Acrimoniam confirmabat non tantum astantium & degulstantium lin-
gua, sed & miseræ cordis externa facies, quippe nonmodo membrana cordis propria
absumpta erat, sed & exterior caro cordis, ab humoris illius vi profunde exesa, in laci-
nias & villos carneos putrescentes abierat, reliqua substantia interiori contracta, flacci-
da & marcescente. Idqueo magis mirum, quod de cordis dolore æger nunquam con-
quectus fuisset, sed tantum de Asthmate & hypochondrii sinistri dolore: Credibile ipsam
cordis carnem, sublata membrana vestiente, non esse admodum sensilem: Incumbebat
vixus dextro hypochondrio ægerissime: sinistro facilius, ideo haud dubiè, quia incumbens
dextro lateri, pondere illo gravissimo vastissimi lienis, sentiebat intestina affecta gra-
vari: contra sinistro incumbens, ab epate sano nullum adeo doloris sensum percipie-
bat: Quia autem Pulmones, & ab aqua in cavitate pectoris hærentes, quæ ad iv. libras
excreverat, premebantur, & ab amplissimo illo distentoque humore pericardio, hinc
asthma illud intolerabile profectum: Ita in uno corpore juvenili, & hydropis abdominis
deprehenfus, & pectoris & pericardii, mala quæ vix ipse curasset Æsculapius. *Olavi Bar-
vichius in Actus Medicis Th. Bartholini annor. 1671. & 1672. Observ. 89.*

S C H O L I A.

Vrina turbida.) Hinc Sennerti sententia confir-
matur, qui Asthma interdum fieri ait ab hu-
moribus crudis & serosis à venoso genere per ar-
teriam venosam in pulmones transactis; qui si ad
bronchiorum canales profusant, verum asthma cum
strepore producant: Si in pulmonum substantiam, vel

in levibus arteriis subsistant, asthma spurium gene-
rant: Comprobatur præsertim opinio ex conditione
urinae, quæ crasse & turbide esse solent, præser-
tim in paroxysmo, quia humorum crassorum & cru-
dorum, in venis agitatorum portio ad renes & vesicam
transfertur. Vide supra.

Varia Pulmonum lésiones cum Hydropse Thoracis, Empyemate.

Nobilis N. (de quo tit. de ventris dolore lib. 3.) In cavo thoracis habuit serum corruptum, biliosum, fetidum, unde Respiratio difficilis: Pulmonum corpus magnum, flaccidum, conspurcatum hinc inde maculis nigris ad exta; gangræne signum, certum, &c. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

Virgo ann. xiv. brevi morbo sublata est, ante biennium tamen alium ducebat spiritum: In thorace aqua repleta, Pulmones syderati cum tabo, Pleura & muscoli intercostales viciati. *Vide tit. de phthisi.*

Puella septennis febricula Irregulari, Variolis (Rossalis dictis) affecta, cum dyspnoea pectoris pondere, &c. Pectoris cavitas aqua citrina repleta erat: Pulmones ambo lividi & gangrænosii. Sinistro dissecto apparuit abscessus, &c. *Vide l. de Febris.*

Uxor N. Ascetica pridie mortis dyspnoeam cum rauedine persensit. In sinistro pulmone sanolapillum reperi: Dexter quibusdam locis adhererat succingenti tunica & diaphragmati. In utroque thoracis latere multum feri. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

Nob. cum febre incidit in pectoris angustiam, dyspnoeam. In pectore serum sanguinolentum copiosum: Pulmones sanguine crassiore scatebant. Extremis eorum partibus induratis & nigricantibus. *Vide Tit. de Febris.*

Nobilis cepit venter subito quandoque intumescere cum summa Dyspnoea. Pulmones erant inæqualiter colorati, & ex parte viriosi, integri tamen, è quibus secus cruor atque pituita prodibant; sibilis costis, sinistro præsertim latere, adnexi erant. Thoracis cavo aqua quoque inerat. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

Jac. de Vala (de quo tit. de Hamoptysi) conquerebatur de difficili respiratione: Ex mortui thoracis cavitate aqua copiosa valde effluebat: Substantia Pulmonum firmiter erat, & à flaccidis distincta: Multum sanguinis nigricantis & coagulati in substantia hærebat: Costis annexi erant, præsertim sinistèr. *Vide Tit. de Hamoptysi.*

Sartor Asthmate diu laboraverat: In thoracis cavitate dextra aderant aque librx xv. Pulmone ex ea parte consumpto. *Tit. de Phthisi.*

Sexagenarius per quadriennium initio lævi, post gravi pectoris angustia detinetur: Aperto mortui thorace, mox aqua ex viridi citrina cum impetu profluit: Pulmo multis maculis nigris variegatus occurrit, quo dissecto sanguis nigerrimus profluit. *Vide tit. de morte Subita.*

Nob. puer ex febre continua decubuit cum difficili spiritu, sublimiori quam pro febris ratione. Reperta vomica in dextro pulmone, universam simul dextræ partis thoracis pleuram occupans. In cavitate thoracis dextræ plurima aqua citrina. *Vide lib. de Febris.*

Uxor D. N. nata parte pulmonico, concepit, peperit; à partu substituerunt lochia, febris, dolor lateris sinistri, ægre spirans, frequens spiritus. Pars sinistra pulmonis magna sui parte tabuerat; Purulenta materia continebatur illa thoracis parte. *Vide tit. de Phthisi.*

Juvenis vulneratur prope claviculam dextram, & prope scapulam sinistram. Sanguinem exspuebat, & Difficultas spirandi urgebat. In cadavere ingens inventa copia materiei purulentæ, sinistram thoracis cavitatem occupantis; quæ diaphragmati incumbens respirandi difficultatem auxit: Pulmo sinistèr inusitata erat parvitas, sed sine manifesto vicio. *Vide lib. 4. tit. de Pulneribus.*

OBSERVATIO LXXXVIII.

Asthma ab hydropse thoracis parte dextra, Pulmonis consumptione ex parte; & vomica.

Sartor quidam Patavii asthmate diu laboraverat, tandem medicamentis utitur, sed frustra, in primis vero in sinistram latus cubare non poterat, & pulsus semper erat formicans: De causis symptomatum cum D. Valthero varie pugno, moritur tandem subito.

Cadaver aperio, & in thoracis cavitate dextra heminas aque reperio ad minimum duas, h. e. libras xv. pulmone ex ea parte prorsus consumpto, ut ne tantillum de ejus substantia restaret: aderat simul vomica instar ovi gallinæ: vasa erant plane purulenta: Pulmo interius sinistèr integerrimus, & pericardium plenum aqua, unde Pulmus formicans exiterat. *Ph. Salmuth centur. 1. Observat. xiii.*

Dyspnoea ab varium partium thoracicarum vitium.

IN *gibbosis* corpore aderant indicia heclicæ cum purrida, & Dyspnoea dextro potissimum latere: Dexter pulmo humidus repertus, quo incisio, sanguis spumofus, crassus effluebat. Divisus bronchiis, alba materia fere rota referta erant. *Vide tit. de Phthisi.*

§ 2. Ill. matronæ (de qua lib. 4. tit. de Febr.) Respiratio fuit difficilis, phthysicorum similis. Pulmones omnino erant aridi & scirrhosi: bronchia viscido humore obstruata: Trachea arteria arida & aspera.

§ 3. Puella cum tussi continua expiratione laborabat: Utrique pulmones tenacis & spumofæ pituitæ glutine costis coaliti inventi sunt: superjacens Thymus plane osseus erat. *Vide tit. de Tussi.*

§ 4. Joh. le Mire querebatur de dolore ad nothas costas: Respiratio difficilis cum magnum spirare cogeretur: Pulmo illi erat amplus, thorax angustus, semipurris pulmo à medio partis inflammatione, contumaciter lateri dextro adherens. *Vide tit. de lateris dolore.*

§ 5. Adolescens à pueritia gibbo & asthma te fuit vexatus, tandem phthysicus obiit. In dissecto cadavere reperta vitiosa spinæ figura: Vertebrae quædam carie exesæ, quarum fragmenta Pulmonis substantiæ infixæ erant, cum ulceribus Pulmonum callosis. *Vide tit. de Gibbositate.*

§ 6. Virgo (*Vide tit. de morte repentina*) gibbosa, ad minimum motum anheia erat: Pulmones erant lividi: pituita viscida circumfusi, cum pure multo in parenchymate: Spina dorso conorta pulmones comprimebat.

§ 7. Diu anhelantem spiritum quidam circumtulera: octa contentione vapular, xiv. die moritur: Pulmo sinister compurruerat totus, scærens pure foetido: Tunica externa pleuræ adnata: Sana pars superstes ponderis *bu* civilium. *Vide tit. de Phthisi.*

§ 8. Vir Nob. multis annis fuit phthysicus & Asthmaticus: Pulmones dextri lateris duplo erant majores solito, sinistri pleuræ & costis accreverant, quorum interiora plena erant sanie, pure & scirrhis. *Vide lib. 1. tit. de cap. dolore.*

§ 9. Dom. N. Phthysica Respiratio semper fuit difficilis: Dissecto mortuo corpore inventi sunt Pulmones purres & costis adherentes, cum ulceribus variis. *Fernelius conf. 21.*

§ 10. Adolescenti (de quo lib. 1. Tir. de Phrenitide) in levi febre, difficilis erat respiratio, cum faciei, maxime genarum rubore, &c. Illi Pulmonis partes dextræ lateri contumaciter adherabant, plenæ vomicis, tabo & pure.

§ 11. Dom. Fr. Sylvium fœminam aperuit, quæ anhelosa fuerat & asthma te ab octo mensibus, ob menstrua ab 18. mensibus suppressa: Illi pulmo costis undique annexus, luridi coloris & distensus: Ex dextro lobo aperto sanguis profluebat copiosus, stagnans ibidem ob obstructions. *Vide Tit. de Phthisi.*

§ 12. Ill. puellus rrimus febre acuta prehenditur cum gravi anhelitu: In sinistra parte abdominis occurrit magna diaphragmatis propendens instar sacci, à totali suppuratione sinistri lobi pulmonis. *Vide lib. 4. Tit. de Febris.*

§ 13. Chirurgus renum & dorsi doloribus diu vexato, tandem Dyspnoea supervenit: In sinistro pulmonum lobo copiosissimus inerat extravasatus sanguis: Diaphragma perforatum. *Vide lib. 3. Tit. de Lumborum dolore.*

OBSERVATIO XC.

Varie Partium thoracicarum lesiones coactæ corde.

§ 1. **I**uvenis diu Dyspnoea fatigatus cum marasmo, Thorax apertus exhibuit utrumque Pulmonis lobum pleuræ tenaciter annexum, putridum, purulentum: Dextrum lividum ponderosum, cum variis cordis & partium vicinarum vitis. *Vide Tit. de Phthisi.*

§ 2. Filia D. N. febre correpta fuit cum febre intermittente, sicca tussi, Dyspnoea. Inventus est Pulmo colore albicante, costis undique & diaphragmati adherens, tum etiam pericardio: Cor media fere sui parte exesum atque exulceratum. *Vide Tit. de Hamoptysi.*

§ 3. Puero rrimo ferebatur ab humido capite tam frequens distillatio in pulmones, ut inde contraxerit summam spiritus difficultatem: Pectus erat aqua refertum: Pulmones flaccidi, & sinistra Cordis auricula variis ulceribus exesa. *Tit. de Syncope.*

§ 4. Mulier asthmatica tympanitica obiit: In cordis dextro ventriculo substantiam pituitosam viscidamque reperi, ovi vitello similem: Pulmo in dextro latere per valida sila-

mentis

menta nervea aliquot locis costis adnatus erat. In utroque non naturalis color. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 5. Quidam ita abundabat flatibus, ut superveniente orthopnoea cum strepitu per os erumperent: Inveni Pulmones flatu distensi: Intus magnæ arteriæ ramum, & venæ arterialis radicem, carnæ excreſcentia insignis. *Vide Tit. de Syncope.*

§. 6. Dom. S. palpitationi cordis ac paroxyſmis aſthmaticis diu obnoxius fuit: Aſthma cum ingrebat liberioſiorem aëtem quæſere cogebatur. Pulmones erant maximi, quibus diſſectis apparuit materia ſanioſa: lobus dexter coſtis coharebat. Circa auriculas cordis adnatum erat corpus carneum vel membranaceum. Inter duas meninges collecta erat ſerî copia. (*Tit. de morte ſubita.*)

§. 7. Job. N. cruce dextro mutilus percepit obrepentem ſubito reſpirationem difficilem, cum anhelatione, ut ſuffocationis periculum immineret. Poſteriores pulmonum lobi, ad doſum poſiti atro ſucco, atramento ſimili, turgidi erant ac ſubtumidi: Dexter cordis ſinus ſanguine turgēbat. *Vide Tit. de Suffocatione.*

§. 8. Illuſtr. N. aſcite derentus cum oris ventriculi dolore & reſpirandi difficultate: Latere in abdomine xvi. menſuræ aquæ, In thorace quatuor. Epar erat durum, ſcirrhoſum. Cor bovino majus erat, totam thoracis cavitatem replens. In ſiniſtro ejus ventriculo inventi duo Polypi. *Vide lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

§. 9. Johanna N. variis à nativitate morbis obnoxia fuit: aderat anguſtia peſtoris & reſpirandi difficultas: Subſtantia pulmonis materia purulenta erat imbuta: Siniftra parte ob ſpinæ incurvationem compreſſa: Pericardium perinagnum, diaphragmati in medio tenaciter annexum. *Vide Tit. de Plethiſi.*

§. 10. Dom. N. palpitatione cordis laborans, tandem & Dyſpnoea affectus eſt. Pulmotorus ſanguine multo reſertus erat: cordis ventriculus uterque ſanguine plenus, caruncule aderant in ſiniſtro. *Vide tit. de cordis palpit.*

§. 11. Ill. N. (*l. 3. tit. de ventris tumore*) orthopnoeam cum ſuffocationis peticulo ſæpe incurrebat: Omnes pulmonum lobi, intus & extra nigricabant: Lobus dexter pleuræ adnatus, ſanguine nigro turgēbat. Cor in utroque ſinu ſubſtantiam quandam continebat.

OBSERVATIO XCI.

Aſthma à cordis præternaturali magnitudine ortum.

Quidam difficulter ſpirabat, anhelus erat, macruerat, Omnes accuſabant Pulmones. Aperto cadavere nil commemorabile in Pulmone repertum: Cor, quod admirabile, majusculi capiti magnitudinem æquabat: adeo increverat, ut ambu ſanguinis & ſpiritus coſſa ſit coſſip & coſſipou. *Ballonius Epid. & Ephem. l. 2. p. 144.*

S C H O L I A.

Omnis ſanguinis & ſpiritus ſalla ſu coſſip) Quod & contingit cum à nimio labore & vehementiori corporis motu reſpirationis actus valde inœdior, ut ſpiritus fere deficient ac ſæpe delinquere petiſſentur. Ratio eſt, quoniam à validis exercitiis ſanguis in cordis ſinus plus omnino cogitur, qui ne ipſum ſuffocet, ſed in pulmones exarctetur, reſpiratio valde crebra & anhelæ inſtituitur.

Cor majusculi capiti magnitudinem) Cauſam assignat *idem* conſil. 2. lib. 3. Pulmo, aut, præ anguſtia thoracis corde æſtante majus refrigerium requirit & attrahit ſanguinem, cum oſo ſufficiat inſpiratio exſpirationi, hinc Cor dilatatur, id quod in multis obſervatum eſt: Cor enim calidiuſ effectum aut oppreſſum, multi aëris indigens vehementer moveatur, & inferni aëtem oequiens attrahere, ſanguinem valide attrahit: ſanguis vi attrahit, & copioſior quam par ſit, imo quodammodo cumulat & conculcatur, opprimit & vaſa diſtendit: Hanc affectionem veteres medendi magiſtri, barbaro ſed appoſito nomine Sanguisugum vocaverunt: partes enim huiusmodi modo alliciunt & attrahunt: Deinde Cor vehementius & cæteris mo-

vetur majore refrigerii ergo & pene animas ſuffocari videtur, & veluti *apſiſſi* adiunt, attracto multo ſanguine, & corde petiſſantur oſo habente, &c.

In ventre inferiori ubi viti) Cum tamen pedum inflatio & imminens hydrops ſuſpicionem latentis in eo vitii præbere debuerit: Sed norandum ex *Galeno* cap. 12. lib. 2. de diſſipata, hæc ob difficilem reſpirationem, cauſa ipſa thoracis non egrediente, dolorem oboriri in partibus ventris, qui in ventriculo ipſi: Et tunc male Medicos partibus dolentibus manum applicare, cum dolor oriatur ex eveno, quia omnium pendentes aut agnæ partes ventris inferiores, inſtumentis reſpiratoriis trahantur in confortium partium ſuperiorum: Et vice verſa, Thoracem ſæpe dolore ob affectum imi ventris, per meram ſympathiam, Sic *Quercetanus* adnotavit pleuritidem ortam à vermibus in inſeſtinis: Hypochondriaci de doloribus laterum & peſtoris ſæpe tunc queroli. Vide tit. l. 3. tit. de ventris dolore hiſtoriam *Capraſii*, imi ventris vilcera phlegmoe laborare cececeis, quæ poſt obitum illaſi reperta, morbi ſumme in peſtore conſiſtente.

OBSERVATIO XCII.

Respiratio difficillima & laboriosa, à Polypis ingentibus in sinibus cordis, & Pulmonibus sanguine stagnante infarctis.

Filiolus Nobiliss. Comit. circiter decem menses natus, antea satis sanus eodem morbo obiit, postquam ille per 4. aut 5. dies tussis cum febricula laborasset, subito deterior factus, respiratione crebra & laboriosa, lingua sicca, magna inquietudine & iactatione totius corporis afficiebatur: quibus symptomatis fere continuo instantibus, intra biduum extinctus est.

Cadavere aperto, viscera imi ventris sine culpa, Thorace inspecto pulmones sanguine stagnante infarcti, discolors, scilicet purpurei, inque multis locis nigricantes apparebant: erant tamen abscessu, tumoribus, aut ichoris suffusione satis immunes, ut illorum affectio febris productum potius quam causa videretur: Dum vero hanc, & lethi adeo subiti occasionem sedulo rimamur, tandem corde dissecto, in sinibus ejus Polypi ingentes, concretionibus adiposis similes, inque omnes arterias exporrecti, earumque cavitates obstruentes reperiebantur: Novi insuper ante aliquot annos, puerum alium triennem, propter eandem causam moribificam subito, ac fere improvise diem obisse. Quin etiam suspicari fas sit plurium aliorum morbos, aut mortes vulgo dentitioni, aut lumbricis imputari solitas, à tali cordis affectione procedere. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO XCIII.

Respiratio difficillima & anxiosa, cum cordis oppressione, à Polypo cordis in arterias Pulmonicas illapso.

Memini in adolescentula Polypum cordis post morbillos accretum, & in arterias Pulmonicas illapsum, eas fere in torum, (uri ex cadavere postea dissecto apparebat,) obstruxisse, ut hinc sanguis intra dextrum cordis sinum aggestus, & ultra progredi non valens, maximum illic gravamen & oppressionem, cum respiratione difficillima & maxime laboriosa inruerit: Puella autem postquam tres dies continuo hujusmodi agone conflictata jacuerat, facultate animali sensum fatiscente, & demum attrita, expiravit. *Th. willis Tractatus de Affect. Hysterici & hypochondriaci.*

OBSERVATIO XCIV.

Difficilis respiratio ob adhaesum Pericardii cum Corde, & defectum humoris in eo.

En habere observationem raram ac prorsus admirandam, Decessit nuper post puerperii labores Ill. Dn. D. Halincourt, Proregis in Gallia Lugdunensi conjux: cujus rimato cadavere, cordis illud involutum quod Pericardium dicitur, cordi ipsi adhæsisse, humoréque illo natæ providentia, ad ejus irrigationem & refrigerium instituto, vacuum fuisse repertum est: Res stupenda profecto: & nemini antea quod sciam observata: Per sensum sane illa ex humoris istius inopia evidenter incommoda. Nam æstivans perpetuo ætherem captabat frigidum, Siti molesta torquebatur, ne tenuissimi etiam tegumenti patiens, pectus nudabat: quinetiam à fervidiore corde concalescentis pulmonibus, in eorum brouchia attractis atque exorrefactis humoribus, Difficili Respiratione laborabat, Quæ symptomata nulli alii causæ potius quam pericardii ariditati imputanda sunt. *Philibertus Saracenus Epistola ad Hildanum, cent. 4. Observ. 32.*

OBSERVATIO XCV.

Respiratio sensum deficiens à Polypo cordis ventriculos obfidente.

D. D. Zacharias Mannagetta, in anatomia Publica Parisiis, demonstratum vidit Polypum utriusque ventriculi cordis, cujusdam hominis lenta morte, respiratione sensum ac sensum absque causâ manifesta deficiente extincti: dexter major sinistro, uterque magnitudinem fabæ non excedebat, sinum vero prope valvas & orificium cordis obtingebat.

SCHOLIA

S C H O L I A.

D Theod. Kenningius observ. 73. p. 145. ejusmodi Polypus propter odopolypis agnoscit. Dubito, an, vidille ullos verum polypum cordis aut aliarum partium : Servo ejusmodi quos vocant Polypus ex variis partibus collectos (unde ibidem depingit pseudopolypum arterie venosæ, hepatis, dextri ventriculi cordis) nihil aliud fuisse quam sanguis qui post animalium mortem refrigeratus & grumolus redditus, densiusque ex corde, hepate, aliisque partibus, extrahitur, in varios ramos divitius ; prout ubi in variis cavi-

tatibus hæret, qui polypo narium ita similis est, ut prima fronte procius appareat idem : Sed cum similes polypus in animalibus formare possint quoties libenter, non æque fecerat docti, qui putarent, id genus mobilis fuisse in vivis, cujus in mortuis orta est aliqua similitudo, ex concreto in variis cavernosis sanguine, qui concretis ob admixtionem acidi peccantissimi humoris : Experimentum fieri potest si cani vivo vena secetur, eique spiritus vitrioli infundatur, coagulabitur statim sanguis, & putantius faciet Polypus.

OBSERVATIO XCVI.

Dyspnoea à materia p. n. in cordis auricula dextra, & pinguedini simili in sinu dextro.

Puella palpitationi cordis & asthmae obnoxia, tabida oblit, Huic fuit auricula cordis dextra prætumida, cui inerat materia quædam alba, membranosa, crassa, oblonga : In sinu cordis dextro materia pinguedini similis.

OBSERVATIO XCVII.

Dyspnoea ob induratione Pericardii & sinistra cordis partis.

Illustr. Schonbergius (*Vide tit. de Suffocatione*) à longo tempore difficultate respirandi laborabat. Illi membranea & carnea omnis pars, quæ sinistram cordis regionem regit, & ad flabellationis assidui usum dilatatur ac comprimatur, ex immodico calore tota ossæ evascat.

OBSERVATIO XCVIII.

Dyspnoea à Pulmone sanguine referto carunculis in sinistro ventriculo.

DOm. N. decubuit, cum difficultate spirandi laborare inciperet, & tibiz inflatz apparerent : Pulmo totus sanguine multo refertus visus : In sinistro cordis ventriculo inventæ caruncule rotundæ. (*Vide tit. de cordis Palpitatione*).

OBSERVATIO XCIX.

Dyspnoea à pericardio crassiori, cordi undique adnato.

VXor N. per tres vitæ ultimos annos anhela fuit : Pulmones satis sani reperti, Sed corditori pericardium arcte accreverat : Porro hæc membrana veluti callosa fuit. (*Vide tit. de Synope*).

OBSERVATIO C.

Respiratio læsa à Polypo cordis innato.

Momma Baxius, répentè occisus à morbo attonito, (*Vide de Separatis affectibus*) in sinistro cordis ventriculo Polypum gerebat, qui constabat ex alba ac concreta pituita, inclusa membraneo involuto, & inhzrens suis radicibus carnis fibris cordis, a surgebat bifida trunco obturatum non minus arteriam aortam quam venosam, quarum viarum obstacula, impedimenta fuere ne deinceps vel ætrem libere attraheret vel fuligines debite expelleret cor, &c. *Tulpius lib. 1. Observ. cap. 27.*

S C H O L I A.

Experientia constat vasa sanguinem deducencia adeo impleri & obturari, ut ejus hinc curius intercipiatur aut retardetur : Id aliquando sanguinis concretiones grumolæ ac velor carnes efficiunt cordis sinus & vasorum majorum radices opplentes, Imo & nonnunquam vasa minora, ejus commestum omnino prohibentes Ejusmodi sanguinis dispositio ad tales concretiones apparet in plenitudine & petipnea-

monia laborantibus, quibus sanguis emissus in superficie vicida pellicula obdactus, substantia concretionibus illis polyposis non abimilis : Imo sanguinem per phlebotomiam emissum in Typographi Genevensis nomine *Migge*, uxore, carnem subitaniam acquisivisse observavi anno 1668 læto innatantem, quæ exempta & aque calenti immerita indissolubilil permutata, miculolæ carni omnino similis.

OBSERVATIO CI.

Dyspnoea à Pericardio aqua distento.

In corpore cujusdam palpitatione cordis & Dyspnoea laborantis, repertum Pericardium immanem in tumorem elatum, pluribus libris aque distentum. (*Vide tit. de Palpi cordis*).

OBSERV.

OBSERVATIO CII.

Dyspnoea à pericardii inflammatione.

CUldam cum acuta febre rhoracis erat incendium & Respiratio celerrima & frequens. Sectio à morte palam fecit adfuisse pericardii inflammationem. *Vide tit. de Laterii dolore.*

OBSERVATIO CIII.

Dyspnoea à copia adipis cor & pulmones invadente.

REVER. N. corpore ob nimiam pinguedinem vasto, per aliquor annos de dyspnoea, maxime inter eundem, sæpissime conquestus est. Viscera omnia mediæ ventris, Cor insigni pinguedine præditum cum Pulmonibus reperimus: In abdomine adeps, octo digitorum transversorum crassitiem superans conspiciebatur. *Vide Tit. de morte subita.*

OBSERVATIO CIV.

Dyspnoea à Pericardii & pulmonum phlegmone in suppuratum abente.

AGRICOLA plaustrî fœno onusti ruinam in se passus, de pectoris dolore conqueritur, succedente ardente febre cum Asthmate. Pericardium in defuncto scatebat pure copioso, cui velut immersum cor. Pulmo ejusdem tabis particeps. *Vide Tit. de Pectoris dolore.*

OBSERVATIO CV.

Dyspnoea ex amplo corde, firmius annexo diaphragmati & pleura.

VENERUS quidam annorum x l. temperamenti calidi & humidî, crapulæ deditus, de difficultate respirationis & hypochondriorum angustia conqueritur, qui multis adhibitis frustra remediis, Patavium cum venisset, postera nocte morte repentina extinctus est.

Aperto cadavere, in hypochondriorum regione nihil quidem præter naturam se prodidit, verum in rhorace cor adeo amplum observavi, ut tria naturalis magnitudinis adæquaret: ventriculis itidem amplissimis, cujus capsulæ ubique pressius adhærebat, superiori ac lateralibus partibus pleuræ etiam annexum; inferiori verò, diaphragmati, nec solum membranosæ ejusdem parti, sed ob ejus molem, carnosæ quinetian.

S C H O L I A.

EX quibus conicere non præter rationem fuit, præsertim gravem respiratiorem aliunde ortum non duxisse quam à pulmonum & diaphragmatis compres-

sione, quæ & causâ fuit doloris hypochondriorum, & porissimum distensio ejusdem. *P. de Marchesi Obs. xli x.*

OBSERVATIO CVI.

Dyspnoea ab atra bile & sanguine nigro in corde concreto.

MULTOS difficultate spirandi laborasse cognovimus, sed inter cæteros quendam, qui nonnisi recta ceruicæ spiritum trahens, paulatim ex angustia deficiente virtute, toto corpore pallidus ac livens efficiebatur: nullus tamen in pectore, nullus in præcordiis dolor erat; sed nec sibilus aliquis ob angustias, per quas evadit, percipiebatur, ex quo judicare posses ægritudinem in pectore concipi: Verum cum paucos post dies invalescente morbo, nullis conferentibus auxiliis, æger evitâ migrasset.

Aperto corpore, non parum atræ bilis & sanguinis nigrioris in ejus corde coisse invenimus, unde etiam per venas diffusus, non est mirum si corrumpente eo spiritum ipsum, hominem ad festinam mortem deduxerit: quod etiam, auctore Galeno, alias contigisse cognovimus. *Beniventus cap. lxi. de abditis.*

S C H O L I A.

NON parum sanguinis nigrioris in corde. Hoc referenda Dyspnoea scorbutica, de qua Excell. *M. Valisii* Tract. de Scorbuto sic distat. Respiratio difficilis, ac ad motum quævis anhelæ, familiæ scorbuti symptoma est, cujus cû binæ solent esse causæ, modo ab una modo ab altera, & aliquoties simul ab utraq; causâ, dependet: Ea dyspnoea si valde crebra delecte cõstitum fuerit, à sanguinis itatu pauperiori & quasi effuso, qui quidem in corde stagnare & non statim accendi aptus est, provenit, quare à motu quovis, si quidem multum vasa sangüifera comprimendo liquorem cõteo-

tum protusum urgent, sangüis aliquanto inertius in cordis ventriculos ituit, qui cum illic non statim accenditur, & foras erchitur, cor aggravat & functionis vitalis deliquium minatur: idcirco pulmones, ut suppetias ferant, celcius moventur ut sangüinem cõditum exantlent: adeoque in hunc finem, nempe sangüinis effusi, & ex se pene immobilis circolationem, respiratio valde crebra & anhelæ instituitur: In hoc casu cum respiratiõne laboriosa etiam pulsus celsus & parvus existit. De altera causâ quæ nervos generis culpa commingit. *Vide Scholia ad Obs. 79.*

OBSERVATIO CVIII.

Asthma ab abscessu in vena arteriosa.

Monachus asthma brevi interit: Dissecto repertus abscessus in vena arteriosa integris Pulmonibus. *Gul. Ballonius Paradigm. 99. Hollerius de morb. int. cap. 23.*

OBSERVATIO CIX.

Asthma à corporibus fibrosis sive pituitosis in arteria aorta contentis.

In femina quadam diu asthmatica, & cum cordis palpitatione conflitante, tandem cardiaca Syncope interempta, corpora, sive pituitosa, sive fibrosa, ulnæ longitudinem superantia ex aorta extraxi. *1. 1ac. Wesserus Exercit. de Apoplex. p. 197.*

S C H O L I A.

Carunculas longas repertas tam in arteria venosa, tam in vena arteriosa, nec non cava vena dextra cordis ventriculam arriogente, citra tamen ullam difficultatem respirationis, narrat *Ballonius Paradigm. 176.* Vterque ren tabuere ægro, nec in utroque quicquam succi & carnis; An prædictæ carunculae hinc eo translatae fuerint, inquisitione dignum: quod mediante circulatione sanguinis possibile videtur.

OBSERVATIO CX.

Dyspnoea ob dilatationem primæ arteriæ ex aorta procedentis, sub corde.

Joh. Fabri circa 50. annum cepit ægre Respirare cum Dyspnoea: Prima arteria sub corde, ex magna ad caput ascendente orta, maxime dilatata & dilacerata erat. *Vide lib. 4.*

APPENDIX.

Respirationem peragi beneficio Diaphragmatis, ejusque nervorum, experimento in cane factò probatur.

Enarratio methodi qua Canis respirare cogitur ad instar Equi asthmatici, adinventæ & experimento confirmatæ per Richardum Lovver Medicum Oxoniensem.

Hoc experimentum repetitum fuit coram Regia societate Oct. 17. 1667. postquam aliquandiu ante id temporis privatim ab autore fuerit probatum: Ecce Autoris verba. Postquam sæpe mecum perpenderam Methodum Respirationis, & ex multis observationibus collegeram præcipuum ejus organum esse Diaphragma, non alio probabiliore experimento illud probari posse arbitrabar quam rumpendo nervos quorum ope motus ejus perficitur: 1. Perfosa latus animalis inter 6. & 7. costam in medio Thoracis, & regione cordis, cultello incisório, cultro admoto in ipsam cavitatem Pectoris, deinde cultello extracto immittere Ditectorem, eumque infige ad profunditatem unius digiti, directa extremitate ejus sternum versus, compressaque ad latus Interius Pectoris: Postea super eo secæ ad digitum unius longitudinem musculos Intercoştales, ne forte acie cultelli lædas Pulmones: Hoc factò impone digitum, & ungue separa Nervum qui porrigitur juxta latus pericardii Diaphragma versus: Deinde impone specillum, paulo incurvata extremitate instar hamæ, & apprehende nervum, eumque protrahe ad orificium pectoris, ac resecta, arcuque confuse foramen: Idem operare in altero latere, & statim Canem dimitte, videbis eum respirare omnino instar Equi Asthmatici: Idipsum apertius observaveris si canem post sectionem aliquandiu ad funem agitaveris: Sed quo quis facilius hoc Experimentum perficiat, primo observet quomodo Nervi Diaphragmatis porrigantur juxta utrumque latus pericardii in animali mortuo, antequam periculum fiat in vivo:

Ex hoc Experimento pronum est sequentes colligere observationes. 1. Modum Respirationis totale penitus alterari: Nam cum sano animali, aërem trahente seu inspirante, Venter tumescat elevatione intestinorum per contractionem Diaphragmatis, Eodemque Exspirante venter subsidat per Relaxationem ejusdem, in asthmatico Cane vel Equo contrarium omnino observamus, Eo enim aërem trahente ventrem contrahi in tenuem longitudinem, Exspirante autem relaxari & rursus tumescere planissime videmus, 2. Cum constet Pulmones per se nihil omnino moveri, sed illorum motum totaliter dependere ab Expansione thoracis per musculos Intercoştales & Diaphragma, ex hoc experimento liquet quantum simplex motus alterutrius illorum speciatim conferat ad Respirationem:

Oo

Cum

cum enim omnis Inspiratio fiat dilatione Thoracis, illaque Dilatatio perficiatur partim per musculos Intercoſtales, elevantes coſtas, partim eodem tempore per Diaphragma, contraſtione ſua deprimens inferiores tenues coſtas, quibus adhæret, atque elevans viſcera inferioris ventris, quibus una omne poſſibile ſpatium præparatur, quo aër admittatur & Pulmones diſtendantur, neceſſario inde ſequitur Intercoſtalibus muſculis operatione ſua deſiſtentibus, Diaphragma naturæ impulſu magis anniti quo ſuppleat illorum deſectum, & vice verſa: quando utraque, nempe & Intercoſtales muſculi & Diaphragma duabus diverſis functionibus ſunt deſtinata (quanquam in eandem finem) & necrum alterius munere fungi poteſt: Quæ res evidentiffime apparet, nam Diaphragmatis uſu, ex deſectu ejus Nervorum ſublato, muſculi Intercoſtales ſolito amplius dilatant coſtas, vel in extremam poſſibilem diſtantiam, neceſſitate cogente: quemadmodum manifeſte videre eſt ubi canem agitaveris aliquandiu poſt ſectiõnem, aut Equum aſthmaticum in concitatiſſimum curſum impuleris, 3. Cum modus Reſpirationis in cane, cujus nervi Diaphragmatis ſecti ſunt, idem ſit qui in equo aſthmatico, plusquam probabile eſt cauſam in utroque eſſe eandem, prout ſigna ſunt eadem; Eſtque veriſimile admodum, quanquam alia vitia in Pulmonibus illorum animalium occurrant, ea ramen inferri ex languore Reſpirationis, occaſione primùm arrepta ex relaxatione ſeu ruptura nervorum diaphragmatis: quod ipſum eo credibilis videatur, quod obſervemus ex nimia preſſione Diaphragmatis, (qua nervi plane rumpantur, vel extra propriam tonum extendantur) ut plurimum morbum illum accideret. *Ex Actis Philoſophicis Societatis Anglica anni 1667. pag. 231.*

OBSERVATIO CXI.

Dyſpnœa à corpore ſub Diaphragmate ſucceſcente.

NE ſemper elegmatis, bechicis, aliſque ad aſthma & pectoris morbos conducentibus remediis operam ſuam ludant Medici juniores, dum iis æger abutitur reſpirationis difficultate pectorisque anguſtiis laborans, narrandum videtur quod anno 1669. mihi oblatum eſt rarius circa id morbigenus phænomenon: Obierat mortem poſt longas paulatimque auctas pectoris anguſtias reſpirandique moleſtias Vir quidam annorum 45. Tuſſis nulla, nullæ inflammationes adfuerant, omnis denique ſymptomatum caterva, quæ ſtipare ſolet pectorales illas ægitudines abfuerat, & tamen reſpirandi difficultas de medio ſuſtulerat ægrum.

Simul atque ventrem inferioreſ diſſecuiſſet culter Anatomicus, objecit ſe corpus quoddam, ea conſtans tunicæ ſpiſſitudine quæ ſolet eſſe eorum peſaſorum quibus noſtrares à capite arcen cœli injurias: Continebat autem aquæ inſipidæ, niſi quatenus eam fecerit corruperat, unciſ circiter 40. Innatabant aquæ filamenra quædam oblonga, quæ digitis contracta etiam in latitudinem quandam diduci poterant: Locus unde corpus iſtud aſcebat, erant ex lumborum vertebræ quibus bini diaphragmatis proceſſus implantantur: Quod diaphragma tanto verſus pulmones compellebatur vehementius, quanto in dies capiebat incremenra majora corpus hoc, tam importuno loco ſucceſcens: unde reſpiratio reddebatur primo difficilis: deinde coarctatis nimium pulmonibus, etiam impoſſibilis: Ita ut mirum non ſit hominem, non alia vexatum ægitudine, præcluſa reſpirandi facilitate, reddidiſſe animam. *Theod. Kerkringius obſervat. Anat. 89.*

OBSERVATIO CXII.

Dyſpnœa à pure ſupra Diaphragma decumbente, à quo efformatus in eo ſaccus, deciduo à ſuppurato ſiniſtro pulmonis lobo.

Iuſtr. Comitis Filioſus trimus, tumorem pone aurem ſiniſtram, ad juncturam maxillæ inferioris radicatum patitur, uſq; in collum prorenſum, cum dolore ardente: ſequenti febris acuta ingruit, cum difficili anhelitu & tuſſi ſicca conſtanter ad mortem uſq; renentibus.

In demortui exenteratione, ſiniſtra thoracis parte, obviabat magna diaphragmatis proſpectu, inſtar ſacci, purulenta à totali ſuppuratione ſiniſtri lobi Pulmonis infarcta. *Vide lib. 4. tit. de Febris.*

OBSERVATIO CXIII.

Dyſpnœa ob materiam viſcidam diaphragmati adherentem.

Contingit non raro materiam lentam & viſcidam, ad digitum craſſitiem ſuperiori Diaphragmatis parti intidere, quæ niſi vomitu auferatur, ægrum jugulat: Sic obiit Lant-gravius quidam Haſſix, in cujus cadavere ejuſmodi materia eſt inventa.

S C H O L I A.

Hinc falsum illud in omni morbo pectoris novum esse vomitum; verum illud si pulmo laboret solutione continui, non si repletus sit crassa & viscidis humoribus. *Walsl. meth. med. p. 36.*

OBSERVATIO CXIV.

Dyspnęa à Steratomatis Diaphragmati adnatis.

Nata supra Diaphragma pugni magnitudine steratomata, ponderis mollesti difficilisque respirationis causas præbuerunt. *I. Feilngim Syntagmatu Anat. cap. 9.*

S C H O L I A.

Diaphragma liberę respirationis organum esse apud omnes in confesso est: illud quando tenditur, ut, ne detur vacuum, ore & oculis atrahitur, à quo attracto, tum ipse thorax distenditur, tum pulmones elevantur, intestina autem deprimuntur, à quibus inferior venter intumescit & sic fit inspiratio: Diaphragmate autem remittente, concidit thorax, & simul pulmones & intestina, antea depressa, extolluntur, & sic expiratio: hinc fit quod Patrus, & alii observant, ut in vulneribus diaphragmatis, io expi-

ratioe, intestina & ventriculus in thoracis cavitatem ascendant: Diaphragma in respiratione primum motorem esse patet ex eo, quod sublato ejus motu, ipsa tollatur respiratio, & homo in momento suffocetur: Barbaris hoc oorum, qui umbilicalem venam, quę io homine extra utrumq; coostructo vasculari vicem obit, resecant, at hepar collapsum tendat diaphragma, impedit ejus motum, & ita ipsam respirationem simul cum vita tollat. *Motivum Fundam. Physiol. cap. 14.*

OBSERVATIO CXV.

Dyspnęa ob pus diaphragmati incumbens, à vulnere.

Juvenis punctim prope claviculam dextram & scapulam sinistram vulneratur: succedit Dyspnęa &c. Ingens copia mareris purulentę candidantis in sinistra cavitate thoracis continebatur, quę diaphragmati incumbens respirandi difficultatem auxit. *Vide lib. 4. tit. de vulneribus.*

OBSERVATIO CXVI.

Dyspnęa exorta à cartilaginea costarum parte in ossam substantiam indurata.

Cartilaginee costarum, quę ad morum faciliorem edendum circumferentiam pectoris ex parte componunt, si induratz in substantiam ossam, reliquis costis similem converrantur, quod scilicet causa aliquibus, aliis citius, idque fere in mulieribus, mammarum sustinentur causa evenit, quia tunc thorax sufficienter dilatari non potest, suspiriosos, accedente præsertim pondere mammarum, si mammosę mulieres dorso incumbant, efficit. *Platerius Prax. lib. 1. cap. 4.*

S C H O L I A.

Cartilaginee costarum &c.] Frequentior est nec satis periculis dyspnęe causa à costarum vicio: Anno 1675. mense Iulio, Vir Reverendus & Clarissimus Dom. Petrus Mussardus, Ecclesię Lugdunensis Pastor, Vir quadratus & plethoricus cooquestus est de dyspnęa, sine tussi aut stertore, à sumpto cibo maxime urgente, Multos in consilium adhibuit; Medicus Pleuricidę cum allici ratus, quamvis omnino abesset febris, purgatione, metu periculi præparatę & mortis interdixit, quę tamen à Pharmacopęo exhibita auxilium amisit: Causa externa præcesserat, gestatio graviosior ponderis manu fuisse, & è terra elevatio, libelliciter grandioris, quamquam nocentum non illico perciperet, unde verisimile ab alio Medico existimatum in quopiam musculorum pe-

ctoralium *pignus* contigisse, fibrarumve aliquam divisionem; Accedens vero muliercula deprehendit notatę ultimę costę cartilaginem depressam, quę in locum reducta illico cessavit dyspnęa: Per mulierculę ejusdem industriam longa invalitudine liberata Nobilis puella Lauianensis, difficultate spirandi, oppressione pectoris à paucissimo cibo, torcetum vomito, per 18. menses vexata, quę omnia obstructions & chlorosicos soboles credita tuę, accedens tamen medicastia dicta, nomine Crespio, diuturn costarum extremitatum cartilaginearum depressionem observavit, quantum inferiori superiori incumbebat: quibus pristinę sedis, manus opera, restituit, symptomata omnia protinus delierunt.

OBSERVATIO CXVII.

Dyspnęa malam sterni conformationem sequuta & mammarum molem Thoraci incumbentium.

In mulieribus mammosis & obzatis, detracta mole mammarum, sternum acuminatum deprehendi, & pectus angustum; quod in illis causa fuit Dyspnęe: Eam angustiam excitaverat pondus mammarum: *Riolanus Encheir. lib. 2. c. 2.*

Respiratio laesa à Pleura adipe contexta Pulmones premente, & Mediastino adiposo quatuor digitorum latitudinem obtinente.

A Br. Clef Montbelgardenensis Bielæ incolæ, hydrocephalo olim sub cura mea liberatus, anhelosus, cachecticus, fræda crurum & pedum scabie conspurcatus, erysipelati phlegmonodi aliquando obnoxius, die 7. Januæ. 1657. Nidavio bene potatus rediens, flante oriente & rigido cælo friguit, & calidum domingressus hypocaustum, circiter horæ quadrantem post fornacem dormivit: Expergestus surgit, cadit stupente lingua & latere sinistrorsum: Edormita crapula sequenti die melius habuit, sed cum à vino sibi non temperasset, vespere sensit insignia circa umbilicum tormina cum dysuria: Accessit die 39. in dextro hypochondrio dolor punctorius cum spirandi difficultate, solita majori, tussis sicca sine febre: Detrahus sanguis cute flava obductus erat, circumducta aqua citrina: A die quarta ad mortem circa clavículas obaudiebatur insignis ebullitio & strepitus materiarum crassæ in trachea sursum & deorsum agitata, non expectoranda. Die 7. pulsus febrilis factus est, supervenit loquelæ impedimentum, tussis suppressio, inquietudo: Diei non æ hora 5. vespertina obortus est sudor calidus, universalis, copiosissimus, & post sciquihoram mortuus est suffocatus, spumante ex ore pituita.

In aperto cadavere nullam inveni vesicam urinariam, (*Vide hystor. lib. 3. tit. de urina difficultate*) Hepar & Lienem habebat amplissimum, Fells vesiculam ovi aserini magnitudinis, plenam; Abdomen pinguedine repletißimum: In thorace Cor erat maximum: Pulmo sinistre tertiam manus palmæ parte nec major nec crassior, sed aliquanto dextrum superans, extravasati sanguis, phlegmati confusi cochlearia fere tria continens (sonitus in respiratione causam) color utriusque pulmonis diversus erat, subalbus, ruber, viridis & sublividus: Inter utrumque utrebatur Mediastinum mere adiposum, 4. digitorum transversotum latitudinis: Ipsa pleura undique tanto regebatur adipe quantum ad implendum thoracem, imminutis pulmonibus, sufficiebat: Quæ omnia in vitæ cursu & morbis contingentium symptomatum rationem patefecerunt apertissimam, nempe conformationis vitium sola Anatome detegendum. *1. Nic. Binningerus observ. 34. cent. 2.*

OBSERVATIO CXIX.

Dyspnæa à pleuritico apostemate coactæ pulmonibus.

Studiosus iter faciens insignem persensit rigorem in latere thoracis sinistro, subsequente febre, Dyspnæa ingenti &c. Inventum ingens in latere sinistro pleuriticum apostema, quod pulmonem simul occuparat. *Vide lib. 4. tit. de lateris dolore.*

OBSERVATIO CXX.

Dyspnæa à Pleura parte dextra pustulis obrita, Pulmonumque lobis eodem modo affectis.

Juveni oboritur erypelas in tibia, quod à medicamentis introrsum conversum est, unde summa Dyspnæa oborta est: Illi Pleuræ pars dextra pustulis miliaribus obrita reperta est; nec non pulmonum lobi antici & postici. *Vide lib. 1. tit. de Phrentide.*

S C H O L I A.

Pleura pars dextra &c.] Coactæ simul vicinis musculis, unde constitutio pectoris, hinc Expirationis præstium difficultas: Expirationis autem læsa cantis clare, de more tradit Extell. *Willelm. Plurm. rat. p. 1. fol. 1. c. 4.* Sicut Expiratio, ait, multo facilis & cum minore negotio quam inspiratio peragitur, ita quoad ædum suum minus inhiberi aut perverti periclitatur: Enimvero ad litum perficiendum musculorum pauciorum nixus conerctivi requiruntur, in tantum ut nonnulli adferant partium mortuorum, à quibus pectoris dilatatio periclitatur, metas relaxationes ad contrictiōnem ejus sufficere: hinc cum in agone mortis ultimus naturæ labor sit thoracem aperire, & spiritum docere, quo vitæ flamma petenatur, quamprimum intritus ille coactus fuerit, nullo cum negotio animal expirat & moritur: At vero constat tamē haud minus quam à *Cervæ* petuā à

musculorum peculicariū opera obiri: Quare cum Expirationis organa lædi aut inhiberi contingit, necesse erit functionis illius difficultatem aut depravationem ostendi: Paetes mortices, quæ pectus constringunt, ejusque cavitatem coarctant, præcipue sunt musculi Pectorales interni, Lombates quidam, alique abdominis: insuper laryngis & tracheæ fibræ musculatæ; propter vitia quævis, modo hæc modo illas, aut singulares aut plures simul occupantia, Expiratio diversimode inhiberi aut perverti solet: Quoquam autem hujus functionis læsio sepe tamē ab inspiratione læsa dependet, quandoque tamen ea solitas contingit; ita ut cum ærem facis recte & facile ducimus, eum nonnulli impedire aut perverte reddamus: Quod quidem ob varias causas, & pluribus modis (quorum præcipuos hic breviter attingemus) fieri solet: Primo enim, si quando solutio continui, vel affectio

affectio (palmodia, vel paralytica in musculo (qui expirationem facit) uno aut pluribus accidit, propterea thoracis pulvis ad aërem sive spiritum plenius effundum, non ita libere constringi ac comprimari potest: Hinc Pleuritis, tumore aut valvule in mu-

sculis intercostalibus, aut abdominis laborantes, suffocari aut canere, alioque expirationis fortioris actus non facile obire possunt: nec minus ob fibras istarum partium motrices resolutione aut spasmus affectas, thoracis coarctatio debita inhibetur.

OBSERVATIO CXXI.

Dyspnæa ab abscessu inter pleuram & costas abortio.

Filiola Rever. N. tussicula continua & difficultate anhelitus vexabatur: circa 11. mensem ætatis sub axilla dextra exortus est abscessus, quo aperto pus copiose per mensem effluxit, sine magno levamine, Tandem clauso ulcere, symptomata aucta sunt, ita ut 18. circiter mense è vivis discesserit.

Inciso cadavere, ingentem abscessum sub axilla sinistra, & quidem inter pleuram & costas inveni, in quo pus copiose repetitum. *Hildanum cent. 2. observ. 28.*

OBSERVATIO CXXII.

Dyspnæa à spine contorsione, Pulmonibus purulentis & Pericardio septo annexo.

Puella quædam laborabat tot morbis complicatis, ut ne ipse Esculapius mederi potuisset &c. Maxima illi humiditas cerebri spinam dorsii adeo irroraverat, ut inde incurvata fuerit, præsertim circa sinistram partem pectoris, unde angustia pectoris & dyspnæa: Substantia Pulmonis materia purulenta erat imbuta: Pericardium permagnum; ac septo, & quidem in medio ubi nervosum est, tam tenaciter & mediante callosa materia anne xum erat, ut illud non nisi novacula separare potuerim. &c. *Hildanum cent. 6. obs. 74.*

OBSERVATIO CXXIII.

Asthma ob mediastinum sero sanguineo plenum, Pulmones materia purulenta infartis.

Anno 1632. Vidua Dom. N. cum paucis induta vestibus è lecto in fenestram transfussisset circa mediam noctem, illico correpta est, dyspnæa asthmatis paroxysmum æmulante &c. Aperto cadavere, inventum est mediastinum plenum sero sanguineo, quod forterupta membrana versus partem superiorem pulmonis, eamque atque asperam arteriam comprimens subito suffocaverat; Præterea inventa est pulmonis universa substantia repleta materia purulenta & gravitate insigni prædita. *Riverium cent. 1. observ. 60.*

S C H O L I A.

Sero sanguineo &c.] *Olaus Rudbeck* inventis vasis glandularum serosis, cœles congregari posse aquam inter sternum & mediastinum, obstructis illis vasibus quæ à glandulis sterni (Tab. 2. fig. 2. o. p.) ad jugulum positis orta, ductui chyliifero ad insertionem ejus in vasicam axillarem inhiant: Sicut & in pulmonum parenchymate ac thoracis cavitare, illis oculis quæ à glandulis pulmonum (Tab. 2. fig. 1. f. r. f.) sinistro cordis lateri adnexi, ac pinguedine pericardii procedunt, & ductui chyliifero inoculantur.

Mediastinum sero sanguineo plenum] Intra mediastini duplicem eam materiam aliquam colligi posse, quæque per foramen sterni à sedulo Chirurgum elici possit, ait *Columbus Anat. l. 2. c. 3.* Notandum autem præternaturalem esse illam intercapedinem, ubi viam vi sibi

faciunt status & humores, si verum est quod volebat *Adrianus Falsturgium* Anatomicum Leydenis Excell. membranas mediastini antici sub sternum evidenti intervallo nequaquam distare, neque eam cavitatem continere, quam credunt plurimi tam late patere quam laevum est ipsum sternum: Arduissime enim adeo duæ hæ membranæ copulatæ sunt, ut oequidem arte, nisi violentia accedat, separabiles sint: Quod inque in dissectione corporis ab Anatomico exhibetur sub sternum cavitatis, per accidens est, & sic cum ist sternum magna, vi à membranæ mediastini divelli: Nec est quod cavitatem eam, quæ notabilis satis sub sternum, ubi mediastinum septo unius sese exhibet, nobis obtendant, Ea enim sub parte aliquæ sterni iancum est, non vero sub eo toto, ut volunt auctores.

OBSERVATIO CXXIV.

Dyspnæa ob Mediastinum copiosa pinguedine suffartum, Et Pulmonis lobum superiorem costas affixum.

In corpore virili obzso, annorum 22. deprehendi Pulmonis dextri lobum superiorem costas affixum, Et Mediastinum, quod rarius, pinguedine copiosissima suffartum: ut propterea una cum Pulmone costas affixo Respirationem fecerit tanto difficiliorem. *I. Daniel Major Histor. Anat. cap. 13. §. 14. 15.*

OBSERVATIO CXXV.

Orthopnea à mediastini inflammatione.

§. 1. Quidam orthopnoicorum more cubabat, quoties enim quiescere supinus cupiebat, statim animi deliquio corripiebatur.

Mortuo ægro secto inventæ fuerunt *membrana intersepientes maxime inflammata*: Maximus est morbus qui prope cor, vitæ fontem stabulatur. *Dem. Panorum Pentec. 2. observ. 10.*

§. 2. Nob. febre acuta derinebatur cum respiratione frequenti admodum & celeri. Eo secto inventus est in membranis intersepientibus tumor inflammatorius satis notabilis magnitudinis. *Vide tit. de Pectoris dolore.*

S C H O L I A.

Membrana intersepientes maxime inflammata &c.] Inflammationi obnoxium quoque diaphragma, cujus exemplum affert Platerus in obitv. p. 159. Recenset ibi Medicum quendam primarium morbo correptum, de dolore in regione ventriculi, cinguli in-

stic ventrem supra lumbos ambiente potissimum con-
quiescens esse simulque de respiratione impedita, pul-
sa febrili, delirio, & de cingulo quodam suffocante,
Quem dolorem ipse septi transversæ causa evincere
jocicavæ, ex qua etiam brevi post mortuum est.

OBSERVATIO CXXVI.

Asthma ob Pulmonem sinistram consumptum; dextrum dorso connexum, Empyema sinistri thoracis; Hepar, Ventriculum, Lienem Diaphragmati annexa, Ventriculum & Intestina flatu distenta.

Febr. 13. anno 1669. Anatomico meo cultro subiecerunt amici virum 60. annorum, emaciatum omnino, qui ante 26. annos venenum aliquod assumpserat, à quo tempore variis malis affligi cepit, Asthmate imprimis, quod etiam ultimis vitæ annis adeo grave, ut ne verbum quidem proferre valuerit cujus vis ab adstantibus intelligi posset.

In aperto cadavere *omentum* arte adeo margini ossis pubis dextri adhærebat, ut non nisi cultri ope separationem facere liceret: *Hepar* etiam *Lienque* & peritonæo, & diaphragmati firmissime adhærebat; *Ventriculus* flatu distentus diaphragmati itidem atque hepatis, molarum fibrarum membranacearum beneficio junctus erat: *Intestina* non nisi flatum continebant, à quo summe erant extensa: *Ren* dexter exiguis valde pure scatebat, sinister arenulis: *Vesica* contracta adeo ut ne nucem sua cavitate continere posset: *Pulmonis* pars dextra dorso connexa, in latere & antèrè libera, sinistra vero tota consumpta, sic ut pus spatium illud totum thoracis repleat: In pure autem hocce laminæ plurimæ reperebantur, ossis duriciem coloreque intime referentes, quarum particulam in musculo meo refervo: Quod mirum, puerpera decumbebat viri luxurxor. *G. Blasius P. 4. observ. med. 5.*

OBSERVATIO CXXVII.

Dyspnæa hydrops pectoris soboles, Pulmonum cum costis, septo & vertebri cohesio; cum Pericardii absentia & Iecoris mole excedente.

ANno 1675. Junii 6. obiit D. Marcus Guillermetus Genevensis, annos natus 56. Crebris ille hæmorrhagiis, per multos ante obitum annos obnoxius fuerat quibus tandem Asthma omnem remediorum vim eludens successit: accessit tibiæ sinistræ tumor tandem dehiscent, aquæ limpide & inodora singulis diebus libras plures fundens, superfluitate ramen asthma, comitibus crebris *leptærhymia*: Decumbere nequaquam illi concessum, sed di dies & noctes affixio: Die 18. Junii anni 1674. tumorem tibiæ gangræna excipit, convenientium remediorum, balsami præsertim Saturni, usu repressa: relicto ramen ulcere universam tibiæ occupante; vix, & plurimum intervallo, ad cicatricem mea opera deducto; nec ramen omnino, cum reliquiæ coronati argentei magnitudinem æquarent, fonticuli vicem gerentes, adeo ut ad solitum opificium redierit æger: Donec 26. Aprilis 1675. rediviva fuerit affectuum priorum cohors (asthma scil. hydrops, non unius tibiæ solum, sed & utriusque, imò crurum tumor,) nullis remediis expugnabilem:

Annuentibus, imò rogantibus consanguineis, cadaver à me fuit apertum coram Clariss. D. D. le Clerc, Senatore Genev. Ablato sterno cor nudum se exhibuit, aquis innans, Pericardio omnino destitutum, cujus ne minima exrabant vestigia: Pulmones admodum erant contracti, costis, vertebri & diaphragmati tam arcto nexu coherentes, ut nisi vi magna ab eis divelli potuerint: Coloris subcærulei, serosum humorem intra se continentes: Jecur repertum maximum, ex parte scirrhosum: Splen admodum parvus, sed incul-

patus:

paues : Renes hydatides, dextrum præsertim obfidebant, Nihil vitij cæteris in partibus :
Ex communicatione M. Stephani Dentand Chirurgi Genev. peritissimi.

S C H O L I A.

Pericardii defunctum Id defuisse in quodam suorum condiscipulorum testatur Columbus Anar. lib. 15. Hippo]. Boicæ, de Facultat. Anar. Lect. 4. air Anr. Mariæm Cannanum inflexisse cadaver eo carens, cujus vices pinguedinis mællis supplebat : Constat autem Galenæ, Beniveniæ & D. D. Bartholinus. Hinc collige, si quidam sine pericardio vitam traxerint, eos errare qui putant vitam sine aqua Pericardii servari non posse : Jafolinus hanc petmagini facit, credens eam, sic loquatur, transmissam esse ab ipsa natura, primigenio forsan ortu : *Corpi & Brinio* credunt hominem consumpta hac aqua immo illico mori : Ego nunquam (air Claviſ. Schneiderus 2. de catarrh. c. 10.) unam atque alteram guttam duntaxat inveni in pericardio, nonnunquam fere nihil, quare hæc aqua nunc auctior nihil utilitatis fere afferet : nam in morientibus, & jam mortuis, aliquanto tediousior est : In viventibus tantum vaporis ex visus cordis emittitur, quantum humoris ad humectationem membranarum sufficit, hicque est usus vaporis in aquam eun-
 tis : In morientibus, invia quasi natura, plus vaporis exhalatur, isque facilis in aquam vertitur, quod membrane natura frigidiore sine, & jam resigescere incipiant : quo sic ut talis aqua post mortem in ea cavitate sit aggetta : In cavitate pectoris, item abdominis, nonnihil aque inest, in fundo subidet, facile conspicitur si cadaver sigidam etechamque consili-

tuitur, illa est pauca, & si corpus longinquis morbis non fuerit maceratum, albida & limpidissima : Si corpus fuerit ægum, aut si guttur laqueo fractum fuerit, illa aqua subeiventa est, & nonnunquam acris & copiosa : Atque hinc philosophari hoc modo licet, Cavitates pectoris, abdominis, sunt extrementorum receptacula, quis nunc clara, nunc vitiosa aqua in illis invenitur : Gignitur ille Pericardii liquor ex vaporibus, hinc naturalis ejus claritas : Simpliciter ac creduli fuerit veritiores, qui opinabantur ejus defectu corpus tabescere : Aqua, inquit *Corpi*. Cor litorat & prohibet ne efficeatur à forti calore; quæ si exhausta sit, cardiacus morbus efficitur, quo animal ad tabem perducitur, ut Simia Galeæ : Vetum sæpe fecisse sanguis, inegris visceribus, hepate & liene, quare aqua nunc in abdomen, nunc in thoracem & ejus in membra, nunc in pulmones, nunc in pericardium effunditur : illaque vasorum exudatione hæc aqua nonnunquam augetur : Si tereciss sanguis, non potest nutrire corpus : Eo jam tabescente, serum ex oculis vasorum ad viscera exudat : Ubi ergo in eo illi, qui corpora incidunt, tantam vim aquæ invenerunt, continuo credere tabem & mentium ex illi aquæ copia ortum fuisse : Qui putant vitam sine hac aqua servari non posse, si meminerint quoddam sine pericardio vitam transisse.

OBSERVATIO CXXVIII.

Dyspnœa à vitio Pulmonum ex parte purulentorum; ex alia seroso humore imbutorum; cum scirrhus per totam substantiam, plurimis calculis, & variis cordis & imi ventris affectibus.

JAc. Bagole uxor morbo admodum intricato correpta, cum difficultate spirandi : Huic post obitum Pulmo dextra parte materia purulenta ac fœrida; Sinistra vero humore seroso imbutus erat : Dein per totam substantiam scirrhi plurimi, colore lividi, in quibus materia nigra atramenti instar contenta fuerat, conspiciebantur præterea lapides plurimi.
Sec. Hildanus cent. 2. obs. 89.

OBSERVATIO CXXIX.

Dyspnœa ob Pulmones consumptos, Thoracis cavitatem sanguine putrido plenam, & pericardium pure, ac hepar maximum.

CAdaver dissecuimus in quo repertus Pulmo consumptus, thoracis cavitas plena sanguine putrido & concreto; in pericardio plusquam mensura puris albi continebatur : Tota cordis superficies absumpta erat & putrida, extenuatunque admodum cor : Hepar usque adeo magnum habebat, ut infra umbilicum descenderet, totam anteriorem partem hypogastrii occupans : Symptomata, quibus vexabatur erant, Tussis, febricula, dolor in thorace, & in anteriore ventris parte, difficultas respirandi; paucis diebus ante mortem, deliqua animi : mens constabat. *Iob. Bauhinus.*

OBSERVATIO CXXX.

Dyspnœa cum gutturi exulceratione, à Pulmonum vitio & putredine, in quorum summo vomica, cum hepatis & renis dextri vitio.

Mulier honesta mollis & rara, annorum 30. febre, destillatione veteri in pulmones laborabat, fœtum gestans octimestrem : contra exulceratum guttur pugnarum est. In difficultate anhelitus eucurbitula alternatim scapulæ affixa : Peperit die 7. levata febris : Mortua decima hora à partu :

Aperitæ uterus grumis plenus inventus; Totus venter flatibus tumens, Ren dexter purulentus, Hepar quantitate peccans, lobo uno costis adhærens, colore totum vitiatum, aridum, ac veluti fixum, aliis partibus quasi putredine mucosum: Similiter & pulmones, in quorum summo ad arteriam vomica pure plena erupit. *Hollærius in observ. ad consilio curandi §. 8.*

S C H O L I A.

Hic plerumq; casorum concursus ad difficilem respirationem, pulmonum vitium; hepar grande diaphragma premens, lobo uno costis adhærens, venter flatibus distentus; Aura maligna à grumis in utero contentis; cum Renis dextri vitio; Reoibus autem affectis dyspnœam induci, hac sectione ostenditur: Distillationi veteri in pulmones malum adscripsit auctor, verius deduxeris à vitia partium naturalium æconomia, & corrupto alimento pulmonibus oblato, accedente proprio illorum vitio.

OBSERVATIO CXXXI.

Dyspnœa & pectoris oppressio, ob Pulmones tabo sine ulcere refertos, Hepatis & Ventriculi molem, in angustias partes spirituales redigentem, Renes male constitutos.

Anno 1795. cum Sereniss. Ernestus Archidux Austræ, Protex Belgii, vehementer frigida aëris constitutione domum reverteretur, in arthritidem, ut sæpe solebat, incidit; qua cum per aliquot dies detineretur, accessit capitis dolor, destillatio in pectus, mox febricula, cum nausea vomitu, cibi fastidio, ac dolore ad uretices, cum micu laborioso & strangurioso. Visum fuit Medicis tum ratione dolorum, tum febris, tum nephritidis, cuius non obscura signa aderant, non aliud commodius ac præstanteum remedium, nec citius ac securius esse V. S. quæ adhibita fuit; à qua levius visus fuit habere, quamquam id sine ratione Medicis visum fuerit, cum urinæ albæ, perspicuæ, ac tenuissimæ forent, ac omni sui ratione calculus esse videretur, Itaque cum perseverarent vterumque dolores, vomitus ac meiendi difficultas, propinarum est oxymel cum temperante syrupo, quo hausto per aliquot dies, calculum exclusit album, rotundum, à quo dolor abfuit, & meiendi difficultas sed non vomitus: Cum vero ex eo Medici & alios lapillos esse suspicarentur, cassiam dedere cum speciebus hieræ, à qua bis tervè; sine ullo incommodo, multa pituita tenaci levatus est, sed persistit vomitus cum nausea, ac urinæ omnino limpidæ: nocte non bene dormire, non quiescere poterat, *anxius ac circum præcordia oppressus*: Ruxit præterea sanguis ex naribus, non multus, albidus & serosus, ex quo Medici desperare cœperunt, Consilium tamen fuit clysteribus ac levibus vomitoriis, sursum deorsumque humorem peccantem ducere, revellere, trahere, sed omnia frustra, crescente anxietate & aucta pulsus imbecillitate, ita ut interfectus videretur, myarus, mox capillaris, tandem sine pulsus; quo cum per biduum vixisset, esse desit 20. Februarii, (*initium ægritudinis 15. Janu. 17.*)

Quo jam vita defuncto, cum corpus disseccaretur, in conspectum venire, pulmo, cor, pleura ac septum vi retracta, ac in angustum coacta hepatis mole, & ventriculi, septum quasi superantia: Pulmones nigricantes, sine ulcere quidem, sed digitis compressi tabum quoddam reddidere; cor integrum, sed inæquali figura præditum; Hæc in superiore ventre, inferior talis erat: Mesenterium valde pingue, Hepar multo maximum in uno lobo livebat: Renum uterque magnus, durus, colore livido: in dextro pustulæ, phlyctenæ esse diceres; sinister, præter dicta, in acuta cuspide, ulcus cavum habebat, nigrum & cum *exanthematibus* esse videretur, non immemito cancer esse videbatur: Aderant in cavitare fragmenta calculi & majores arenulæ multæ, ut videretur aliquis calculus egressus in in vterores deliruisse, Et vesica putrida, fortens, livida &c. *Schenckius lib. 3. p. m. 442.*

OBSERVATIO CXXXII.

Dyspnœa inducitur à pulmonibus costis adnatis, hydre thoracis, & utroq; Rene calculoso.

Plumarum venditor emortuus ob Renum Pectorisq; vitia, habuit in utroque Rene insignem calculum: In thorace tres aquæ libras, Pulmonem costis adnatum, & cor non tantum pericardio suo destitutum, sed exprimens præterea extrema sui parte naturam pallescentis sevi: quem colorem ipsi proculdubio impresserat aqua in thorace contenta, uti videre est in eorum musculis quos accidit vel *adnatis* vel *adnatis*. *Tulpus lib. 2. observ. c. 44.*

S C H O L I A.

Tres aquæ libras] Ob vitium cordis quod primarias, secundum multorum opinionem, partes tenet in opere sanguificationis, Et Renum, qui calcu-

lo obfessi, nec sero liberam excretionem concedentes, hujus in pectoris regionem transfusionem pepererunt.

OBSERV.

Respiratio Lęsa à Pulmonibus flatibus dissentia, dextro costis adhærente, & abscisso tentato: Hepate & Liene insolite magnitudinis, septo adnexis &c.

ANno 1663. die 9. Febr. Clar. Franc. Sylvius de le Boë in Nosocomio Leydensi vetulam secuit, in cujus cadavere sequentia notabantur. Hepar folio grandius, & usque ad os coxendicis inferius protensum, in sinistro vero latere diaphragmati validissime annexum, ut separari non posset sine ruptura diaphragmatis: Lien insolite magnitudinis & mirabilis conformationis quasi ex pluribus lobis compositus videbatur, diaphragmati validissime adhærebat, & inferius eousque propendebat ut sinistram renem plane comprimeret, eumque admodum parvum relinqueret; Lienis color & parenchyma plane diversa erant à statu naturali, color erat valde rubeus, qui naturaliter solet esse plumbeus: Parenchyma erat firmum, instar parenchymatis renum, quod naturaliter laxum esse solet & diffusum: Membrana externa crassa erat & fere cartilaginea, quæ substantia usque in profundum tendebat: Ventriculus infra umbilicum protendebatur, loco superiori amplior erat, intermedio loco angustior, loco inferiori iterum amplior: Angustia in medio causam esse putabat magnitudinem insolitam hepatis & lienis, à quibus coarctabatur ventriculus: Pulmo à flatibus erat distentus, ita ut cum dissecaretur flatus erumpere, variisque in partibus thoraci per fibras adhærebat in dextro latere, in sinistro plane erat liber: In dextro Pulmone, quæ parte firmiter adhærebat costis, abscissus erat pus foetidum, subviride & valde tenax continens ultra duo cochlearia. Color obscure tubens viscebat in variis intestini tenuis partibus, ipsæque vasa intestini erant turgida: quæ parte attingebat folliculum fellis, ab ejus colore tinctum erat intestinum, qui color penetrabat usque ad partes interiores. Humor fuscus & obscure nigricans continebatur in ventriculo & intestino tenui, qualem sæpe à moribundis evomi aiebat, idque pessimum esse signum, & raro ægros talia evomentes evadere: Putabat eam esse miscellam bilis & succi pancreatici valde vitiosam, ubi jam omnia à statu naturali abierunt. In rugis intestini duodeni quærendam esse aiebat insertionem ductuum biliaris & pancreatici; styllum non poterat inducendum immittere, ob aliquod in illo obstaculum, idque indicium esse putabat alicujus valvule in ipso ductu: Transverso pollice satis grandi distabat insertio ductus pancreatici ab insertionem ductus biliaris: Duplex erat insertio ductus pancreatici in intestinum tenue; alter ramus erat in loco aliquantulum superiore, & erat minor; alter, qui major erat, inferebatur eo in loco, in quo erat exitus duplex biliaris: quæ duplex insertio ut frequentissima est in brutis, canibus præsertim, ita rarissima est in homine: Ductus Pancreaticus tantæ erat capacitatis, ut styllum calami scriptorii crassitie admitteret: Immisso tubulo in ductum & inflato, attollebatur tota substantia pancreatis. Inter duplicem tunicam intestini tenuis, ad transversum pollicis latitudinem, inferebatur ductus biliaris, plane ut ureteres inter duplicem tunicam vesicæ inseruntur. Ren sinister erat valde exiguus ac mollis, & cum dissecaretur, pus aquosum emittebat, in parte superiore bona sui parte consumptus erat, nullus tamen aderat calculus. Suppurationem illam renis provenisse putabat à compressione ejus facta à liene grandiore, unde urina diutius retenta acrior facta substantiam renis erosit:

Membrana Renis interna, quæ pelvim constituit, triplo fere crassior erat quam naturaliter debebat, idque sæpius fieri aiebat in partibus purulentis, sanguinem enim affluentem partes tum magis munire adversus acrimoniam humorum: Ureter sinister satis erat grandis, ut raro tam grandis appareat: Ren dexter in parte superiore, ubi sit secretio feri à sanguine, cavitatem habebat pisi magnitudine, in quo calculum laxissime putabat, & hinc inde per totam renis substantiam observabantur granula quædam sabulosa albicantia. Vena umbilicalis non profus coalescerat, reperiebat enim stylo per eam ingressum in venam portæ: Uterus totus erat contortus versus dextram, quod sibi nunquam visum aiebat: fieri quidem interdum ut fundus uteri magis declinet in alterutram partem, sed totam uteri substantiam ita contorqueri rarissimum esse putabat: Causam esse existimabat propinquitatem nimiam ossis sacri, cui ureter necessum habuisset cedere: Putabat idcirco illam partem habuisse minus felices: Ob viciniam enim ossis sacri coangustatur locus per quem fuerat transcundum est: Iusto quoque grandior erat uterus, & vasa in eo valde conspicua, quod in vetula mirum. Orificium vesicæ admodum erat amplum: existimabat proinde illam aliquando excrevisse calculos: Inferta tubulo in apertum aliquod vas in Tuba uteri & inflato, plurima vasa hinc inde per tubum discurrentia attollebantur, in quibus vasis sæpe stagnare putabat sanguinem, & variorum morborum in fœminis causam esse. Ductus Theoricus valde erat exilis, ut diceret se tam exilem in corpore humano non reperire:

Dum

cavitas aquis diffundebat, sterno enim remoto velut ex fonte lymphæ cum impetu dimanabat. Verum ergo Hydropem pectoris ibi reperi & ipsam mortis causam (Pulmones enim syderati erant & male affecti) Perigo ramen sectione ad anum ventrem, & ibi ventriculum tam pusillum, tam contractum vidimus, ut pugni magnitudinem non excederet, hepatis vero iusto grandius erat & scirrhum, quamvis abdomen aquis nec dum distentum esset: *Observatio D. Caspari Collicien Medici Dani, in Altit. Medicin. Bartholini, anno 1673. observ. 118.*

S C H O L I A.

DE Pectoris hydrope pauci apud Practicos repetimus, ita enim *Lac. Rivieri* Pr. med. l. 7. c. 5. Practicorum vulgus huic morbum non describit: *Carsus Piso* tamen Tract. de morbis ex colluvie fetosa, p. 214. & *nuper Sydenham* in Praxi sua l. 1. c. 50. paulo fufius & satis accurate de eo scripserunt, si sequens tamen est malum in oculis præstetum maritimis, ratione scorbuti, & cognita difficile. *Idem idem.*

Nulla signa apparent] Vt cognita difficilis est iste morbus, ita etiam curatu: Cognoscitur enim proprie difficultate spirandi, quod igitur tamen ambiguum est: signum pathognomonicon facere oportet, inquit C. Piso, Eam igitur difficultatem ac crebilitatem, quæ delubrio fomori primo tempore invadat & quiete deficiat, sed tamen procedore die sensum lecefcit; quod signum tum ratio mihi dicta-

vit, tum experientia in omnibus confirmavit: Curatu difficilis est, *pergit Piso* 3 Vacuo certe contentæ materię in thorace reotati quidem posset five purgantibus, five per nassum vacuantibus, five discutientibus, five aliis huiusmodi, sed verendum ne ab eorum calore agitata materia dyspnœa increbescat, suffocatioque laborat: quo sane consilius videtur ut vacuetur illis sensibilibiter thorace aperto cauterio potentiali, in aliis autem masculi animi, actuali: *Idem.*

Hepar iusto grandius & scirrhum] Sic igitur omni hydrope specie Hepar laborare verum est, cum enim sit coloriorum sanguinis, illo male affecto etiam sanguis patitur ratione leri quod vehiculum est sanguinis, vnde hydrope & alia mala, prout Hepar affectum est, *Idem.*

OBSERVATIO CXXXVIII.

Dyspnœa ab Hydrope Thoracis, Diaphragmatis exulceratione, Crassitie membranæ Pulmonum, Parenchymatis eorum duritie, Glandulis in eo, vario vitio partium naturalium.

ANno 1663. die 22. Junii Clariss. Pylvius secuit in nosocomio Leydensi secuit Saram Janßen, in cuius cadavere sequentia notatu digna occurrerant; Hepar in dextro latere loco admodum profundo situm erat, & infra umbilicum superioremq; partem ossis coxendicis propendebat: Pallidiusculum erat, & quia satis grande, partes subjacentes inferius, quam secundum naturam esse debebant, sitæ erant: Suspensorium Hepatis, quod solet esse in dextro, vel medio Thoracis, plane in sinistra parte situm erat, & tres digitos transversos minimum distabat à medio: alter lobus Hepatis occupabat totum sinistram hypochondrium, quod eo totum replebatur: Folliculus fellis in sinistro etiam conspicebatur latere: Tinctura ipsi peritonæo à folliculo fellis erat inducitur: Ventrículo non contigebatur in medio, sed totus in sinistro hypochondrio situs erat, & quodammodo convolutus: Pylorus etiam erat in sinistro latere. Ventriculi substantia inferior interius nigricabat, & vasa minima insigniter conspicua erant, & stellula quædam quasi representabant, ex quibus alia vasa exibant: Pancreatis substantia bene se habebat, sed glandulæ conglobatæ ipsi adhærentes grandiores & duriores erant: Lien admodum exiguus erat, ut raro tam exiguus appareat: Intestinum colon situm erat loco decliviore ob hepatis magnitudinem, & flatibus erat turgidulum, cumque communiter à dextro latere transversim versus sinistram feratur, in hoc subiecto deorsum ferebatur: Vasa minima & capillaria in eo variis in locis turgidula erant, quod indicium esse putabat alijcuius phlogosæ, idque sibi nunquam in crassis intestinis visum: Tam tenuis etiam erat membrana intestini ut in nullo tenui esse solet, quod etiam rarum: apparebat autem tenuitas illa eo possimum in loco ubi major ejus erat distensio: Intestina tenuia aliqua sui parte distensa erant, & vasa illorum turgida & rubicunda, aliqua vero parte flaccida & pallida: Glandulæ plures notabiles in mesenterio apparebant: Ren dexter admodum grandis erat, Sinister comprimebatur à partibus superioribus, quare etiam aliam à naturali conformatione habere figuram. Ductus Pancreaticus satis grandis erat, ut duos stylos admitteret, ingressum ejus in intestinum cum ex pancreate non posset invenire, dissecito intestino & immisso stylo in orificium ductus biliaris, manifeste in intestino protuberantis, stylus in ipsum ductum pancreaticum penetrabat, Spatium inferioris ductum in intestinum quatuor circiter transversos digitos distabat à pyloro. *In cavitate thoracis, potissimum*

in dextra ejus parte aque frigida copiosa continebatur, qua aliquot casinos implebat. Ab acrimonia illius aquæ, pleura & rota superficies interior diaphragmatis exulceratæ erant & erose ut etiam pus darent. Membrana Pulmonis dextri quadruplo fere crassior reddita erat ab illa aqua purulenta, Pulmo dexter plane durus erat & corrugatus, coloris lividi & fædi. In partibus superioribus interius corrumpi exeperat Pulmo dexter & aliquid puris continebat; Pulmo sinister melius habebat, in sinistro latere aqua etiam coeperat colligi, sed limpidior, nec partes ita rubebant & excoctæ erant: hinc inde in substantia pulmonis sinistri parvæ glandulæ erant: Pericardium plenum erat aqua limpida, quæ 6. vel 7. cochlearia implebat, cum vix naturaliter duo cochlearia adesse debeant. In principio interno uteri marcia viscida reperiebatur. In parte interna colli uteri parvi quidam musculi eleganter apparebant, observatio D. J. Henr. Brachfeld in Aitii M. Bartholini ann. 1673. Observ. 16.

OBSERVATIO CXXXIX.

Dyspnoea à Pulmonum vitio, & spiritalium partium compressione ab utero elato.

Mulier quædam à partu statim expiravit: Uterus illius occupabat rotam capacitatem ventris usque ad foveam pectoris, ventriculūque compulerat versus diaphragma: Pulmo lividus atro sanguine repletus; laboraverat autem asthmate. Vide lib. 3. tit. de partu difficili.

OBSERVATIO CXL.

§. 1. Dyspnoea à multiplici viscerum vitalium & naturalium vitio.

Vicentinus, &c. Pulmones habuit nimio vini potu debiles, hinc tussis, Respirationis difficultas: Apertum cadaver exhibuit pulmones male constitutos, siccos. Dextæ colitis adhaerebat mediante muco: Serum aderat in thoracis cavitate, in musculis externis & visceribus; cordis auricula dextra sanguine distenta erat. Vide Tit. de Phthisi.

§. 2. Uxor N. affectibus tentata, tussicula, Dyspnoea, hydropo, &c. Pulmo dexter materia purulenta plenus erat; sinister humore seroso. Scirrhī per totam eorum substantiam; Lapides plurimi hinc inde sparsi: hydrops abdominis. Vide Tit. de Phthisi.

§. 3. N. Palpitationi cordis cum asthmate obnoxius fuit: Corrupti pulmones deprehensi sunt, Lobus dexter diaphragmati annexus: hoc sursum à colo tumido compulsus. Vide tit. de Cordis palpitatioe.

§. 4. Dom. N. Pulmones magni, flaccidi, colore lividi, variegati & quasi gangrenati; diaphragmati arcte connexi, ut & pleuræ, Hepar diaphragmati annexum: Pinguedinis copia vesticæ omnia viscera, ob quod pondus spiritus impeditus fuit. Vide lib. 3. Tit. de ventris tumore.

§. 5. Juvenis (ischuria laborans, Vide lib. 3.) de difficili respiratione conqueritur: Hepar & Pulmones diaphragmati cohaerebant: aderat polypus in corde, cum hydropo abdominis.

§. 6. Netrix in difficili partu oblit; uterus ad foveam pectoris pervenerat; ventriculū compulerat versus diaphragma; aderat hydrops abdominis. Pulmo erat lividus, atro sanguine repletus: Ex thoracis capacitare aqua ichorosa effluxit: Laboraverat asthmate. Vide lib. 3. tit. de partu difficili.

§. 7. Fr. Chapuis; gravida à sex mensibus in continuum febrem incidit, erecta cervice spirabat, rubor erat genarum: Fortis aperto corpore in conspectum venit, grandior: interstina omnia flatibus turgabant: Pulmones erant tumentes, lividi, pure prægantes, Vide l. de Febribus.

§. 8. D. N. Aliquot ante obitum septimanis, gravissimis destillationibus affatim è capite destillantibus in thoracem instillabatur, ut nonnulli recta cervice spirare fas, unde aliquando ingens impendebat suffocationis discrimen: Aperto demortui thorace inventum pus in eo: Hepar, Pulmones & Cor, in arido & exsiccato corpore admodum grandia & pallida. Vide lib. 1. tit. de melancholia.

§. 9. Illustr. Dom. de l'Isle (de quo tit. de Phthisi) præeunte virium languore, febre lenta & tussis à Pectoris oppredione ac dyspnoea extrinsecus est. Huic Pulmones tumidiusculi inventi sunt, & repleti partim humore lutulento, partim flaru; Jecur in extraordinariam molem excreverat.

§. 10. Vitiosa Pectoris figura in Rachitide Respirationem facit impeditiorem ac crebriorem. Jecur quoque supra modum dilatatum, cum in ventre non inveniat sparii satis, in thorace mutuatur quod ipsi deest, ac versus superiora assurgens, diaphragma longe impellit. Vide Tit. de Gibbositate.

§. 11. Conquestus quidam de Febricula dyspnoea, dolore hypochondrii dextri: Ingens abscessus in Jecore inventus, Thorax pure abundabat. *Vide lib. 3. tit. de Hypochond. dolore.*

§. 12. Uxor N. diu Dyspnoea laborabat: Illius Hepar durum: Pulmo dextra parte materia purulenta: sinistra fero imbutus erat: per totam substantiam scirrhi plurimi, & lapides hinc inde dispersi. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 13. Puella ab ephemera febre in heticam incidit. Illius Hepar mediante materia gypsea tenaciter diaphragmati adnatum erat, hinc anhelitus difficultas: Thorax aqua plenus, Pulmones materia purulenta & steatomatis imbuti erant. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 14. Seren. N. febre duplici tertiana afficitur cum spirandi repentina difficultate: Intestina omnia flatibus distenta erant. Jecur tumidum, cor prægrande: In cavo pectoris aqua & v. Dextra pulmonis pars flaccida, crasso & mucoso humore oppleta; Sinistra in sanie resoluta, tunica pulmonis ut in sacco concepta, &c. *Vide Tit. de Febris.*

§. 15. Dom. N. palpitationi obnoxius fuit cum asthma: Pulmones purgidi reperti; lobus dexter diaphragmati per corpus cartilagineum connectebatur. Diaphragma sursum compulsum erat à tumido ob flatu colo. *Vide tit. de palp. cordis.*

§. 16. Uxor N. pleuritide lateris sinistri correpta interit. Lobus dexter pulmonis parenchymate erat destitutus, membrana superstes diaphragmati arcte connexa: Sinister totus in putrilaginem abierat: Pleura crassa erat, sydetata: Cot solito majus Diaphragma solito elatius, à Jecore tumido, scirrholo, maximo sursum compulsum. *Vide tit. de Exspiratione purulenta.*

§. 17. N. fatigatus & calefactus, potui litavit, hinc dolor thoracis cum Respiratione difficili, &c. Pulmo dexter totus erat scirrholus cum fistulosis ulceribus, adnatus pleure, diaphragmati &c, mediante hoc, hepati. In sinistro erat quoque ulcerosa colluvies, & cum pleura cohesio. Sanguis in utroque cordis sinu nigerimus, Hepar totum adnatum diaphragmati, &c. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 18. Doctör Rumoidus pluribus annis asthma ac orthopnoea, ut non nisi erecta cer vice spirare posset, defatigatus fuit: Præter bina in pulmonibus tubercula, lxxij lapilli in vesica fellis & poris choledochis sunt reperti. *Vide lib. 3. tit. de Lithera.*

OBSERVATIO CXLI.

Respiratio in Bobis difficilis à pila conglobata in ventriculo oboriente.

Concreta sunt Poma in Boum ventriculis: quæ penitus exarstians, interius ex meris pilis bovinis arctissime compactis constare reperi, & exterius glabra, nigra, & dura pelle regi: Unde crediderim boves sibimet pruriente cute dentibus pilos evellere, qui cum ab omaso digerì nequeant, in massam coguntur rotundam, quæ postea in pilæ majoris magnitudinem excrevit, unde anhelosi & asthmatici diu incedunt. *Quali. Charleton Diatriba de Lithiasi sect. 1. cap. 2.*

OBSERVATIO CXLI.

Dyspnoea à ventriculo ob pus intra membranas conclusum tumente.

Respiratio intercipi potest à diaphragmate intortum compulso à ventriculo tumente, & pure inter duas membranas collecto prægnante: ut observavi in matrona, uxore Mag. Joh. Chavotii Pharmacopolæ. *Car. Piso de morbu à sera sect. 3. cap. 4.*

S C H O L I A.

Diaphragmate interdum compulso à ventriculo Ventriculorum situm naturalem interdum mutasse observatum, dum aut sursum revulsus diaphragma premittit, quod à palstu dyspnoeam inducit, aut deorsum fertur, imò ad umbilicum usque: aut ad lœra declinat: Qui plurimo utuntur alimento dyspnoea sunt obnoxii, tum ex multitudine sanguinis, unde major occasio ipsi pulmoui sui implendi, & oppressionis oc-

casio major: Tum ex ventriculi isomere, hic enim ingesto alimento, ut pars membracea, facile dilataetur, & affluente capiendi multi alimenti, dilatatur magis, unde sine plenae, sive vacuæ, ut amplificari solent, diaphragmati, liberæ respirationis instrumento, oneri est: hoc pressum thoracem angustum reddit parte inferiore: hinc Pulmo, præ angustia thoracis corde æstuant, majus refrigerium requirit.

OBSERVATIO CXLI.

Dyspnoea à ventriculo tumido diaphragma premente.

Mulierì venter in insignem molem excrevit, cum difficultate Spirandi. Ex aperto ventre x c. libræ aquæ prodierunt, quas è ventriculo mire dilatato ortum habuisse ostendebant superstites vesicæ. *Vide Tit. de ventris tumore.*

OBSERV.

OBSERVATIO CXLIV.

Dyspnoea ob vitiosum ventriculi & omenti in thorace situm.

Studiosus graves singultus & vomitus passus, In sinistro latere thoracis omentum & ventriculum sitos habuit. Ante vivebat athleticè, nisi quod asthma paulisper laboraret. *Vide lib. 3. tit. de vomitu.*

OBSERVATIO CXLV.

Dyspnoea à ventriculi parte, cum portione duodeni & coli, in thoracem per pertusum diaphragma delata.

Militi gladius anceps paulo infra cartilagineum xiphoidem intruditur, hinc respiratio intercipitur, &c. Invenitur ventriculi orificium & pars sinistra ejus, cum portione duodeni & coli ad thoracem per vulnus diaphragmatis delatum, &c. *Vide lib. 6. de vuln. &c.*

OBSERVATIO CXLVI.

Dyspnoea à tumente ventriculo ob serum intra ejus membranas coërcitum, Hydropoe abdominis.

Mulieri gravidam se credenti abdomen in magnam molem excrevit: tandem in febrem continuam incidit cum difficultate spirandi, &c. & 7. die obiit. Aperto abdomine ingens serosæ humiditatis factum est effluvium: Ventriculus prægrandis per medium dissecus ulnam Patienssem superabat: membrana interior multis hydatidibus conspersa erat, &c. *Vide lib. 3. tit. de ventris Tumor.*

OBSERVATIO CXLVII.

Asthma periodicum à flatu tumidis intestinis, & lapide insignis magnitudinis in cysti fellea.

Hoc anno circa finem Janu. mortua matrona quædam, vidua N. per triennium asthma: periodico detenta: hanc humi sedentem, erecta cervice respirantem, pedes & ventrem tumidum biduo ante mortem, cum ordinario alias Medico D. D. Schilpachero, visitavi. Cum adstantes vomitorium urgerent, nos vero summam virium prostrationem & extrema instare adverteremus, timendo ne in ipsa operatione medicamenti agra deficeret, illudque ac si eo strangulata fuisset nobiscum diffamaretur, postulatam caute declinavimus, alia præscribendo: Avidus filius sciendi unde hæc Dyspnoea, aperiendam concessit.

Dissecto itaque thorace, ubi omnes alias Medici veram sedem figunt Asthmatis, in Pulmonibus nil neque viscosi, neque serosi, neque impacti quicquam in illorum bronchiis observavimus, sed bene constitutos ac laudabiles invenimus, præterquam quod exiguis si brillis hinc inde, imprimis in dextro latere pleuræ adnexi hæsetint: In hoc tamen non acquievimus, cum viciū illud à prima conformatione videretur, ipsa vero à triennio demum asthmatica: Continuavimus itaque sectionem, ventremque, qui, ac si hydropica fuisset, distentus erat, aperuimus, sed remotis integumentis ne gutta efflueret aquæ, intestina vero omnia, imprimis jejunum, mire inflata, distenta & tota vacua conspecta: Lien bonus, ut & Hepar laudabile: vesica fellea magna, aperta nihil continuit bilis, sed lapidem inclusum habuit magnum, inæqualem, pondere quatuor drachmarum officinalium: *Carolus Reggerus Observ. xi. Miscell. curios. anni quarti.*

S C H O L I A.

Hinc conclusimus Asthma fuisse flatuosum, & flatulentiam auxilii alvi constipationem prope coniungam, oriam procubulo à defæctu bilis, nam per aliquod tempus nunquam, nisi clysteris aut aquis laxativis, sollicita alvus suam fecit officium, ad

omnia autem purgantia melius se habuit: Vidimus etiam frustra quod à nobis exhibitum fuisset vomitorium, si quidem materia non impacta fuit Pulmonibus, flatu vero per superiora pauci vel prorsus nulli evacuantur, *idem.*

Dyspnoea ob tùmida flatibus intestina.

M Inoris ordinis D. Francisci focius, Respirationis difficultate aliquando laborans, co-
li dolore subito è vita discescit.

Intestina ejus adeo flatibus intumuerunt, ut venter apertus in adstantes proflueret: compresso igitur septo transverso Pulmonibus movendi atque Respirationis facultas cohibita fuit. *Ioh. Rhodius Cent. 2. Observ. 26.*

OBSERVATIO CXLIX.

Dyspnoea à fecibus exulceratis intestinis in eorum abdominis effusis, viscera versus thoracem compellentibus.

V Xori N. post partum venter intumuit, &c. accessit respirandi difficultas quæ in dies increpescens vitæ finem imposuit. Dissecto ventre, fœces nigre, quales in cloacis, effluxerunt, crassæ, fœtidæ, quarum tanta copia ut quatuor urnas implere potuissent, &c. Distensio ventris tam magna, ut jecur, lien & ventriculus, cedente septo, intra pectoris spatium ascenderint. *Vide lib. 3. Tit. de ventris Tumore.*

OBSERVATIO CL.

Dyspnoea à flatibus viscera omnia replentibus.

L udovicum N. vidimus spiritus magna angustia affectum: Viscera omnia in eo ventro plena conspeximus. *Vide lib. 3. Tit. de ventris doloribus.*

OBSERVATIO CLI.

Dyspnoea ab obturata arteria cœliaca à pituita concreta, & hujus aneurysmate.

A nna N. febrem incurrit stipatam orthopnoea, pulsatione vehementi supra ventricul-
lum, &c. Detecta parte quæ primis magnæ arteriæ divaricatus sentit, corpuscula of-
fendimus tria ex pituita concreta, transversum arteriæ ductum obturantia, &c. Arteria se
obtulit cœliaca ita dilatata ut compressum pugnæ admitteret, &c. *Vide tract. de Febrib. I. A.*

OBSERVATIO CLII.

Asthma ab Hepate magno, materia indurata infarcto, Pancreate maximo.

V Ir Nob. dolore hypochondrii dextri per plures annos confectus fuit, cum ventri-
culi & diaphragmatis compressione. Initio, cum degeret in agro Picaviensi, hic dor-
lor pro colico, huic regioni vernaculo à Medicis judicatus fuit. Ex remediis parum utilita-
tis habuit: postea Lutetiam se contulit, celebriorisque urbis Medicos advocavit, quorum
judicio abscessus in Hepate genitus dicebatur, variæque absque emolumento exhibita: Ego
sub finem morbi & vitæ vocatus, inveni ipsum gravi Dyspnoea laborentem, & dolore hu-
jus lateris & abdominis ita vexatum & compressum, ut neque in dorsum nec in latus posset
recumbere, sed cogeretur residere in lecto, & pro doloris gravitate & vehementia ipse dis-
rumpi sibi videbatur, tandem atrocibus hisce doloribus confectus extremum obiit diem.

Aperto cadavere Hepar magnum multis abscessibus repletum inventum est, & materia
quadam indurata, vitæloisq; ovorum colore referente repletum. Pancreas erat admo-
dum ingens: Ren erat luxatus & è suo loco dimotus, propellente scilicet ipsum parietem deor-
sum Pancreate. *Cæsterius Observ. x.*

S C H O L I A.

Materia vitælois ovorum colore referente) Vitellina
erat bilis à calore effluens: Vitelline est cum
morbus ab initio pro colico habitus & curatus sit, in
vitem ducta fuisse remedia calefacientia, qualia ad ejus-
modi morbum, plures & statim fere solentem, solu-
pantur: Ab his bilis in jecore hoipitantem incan-
duisse & dolorum maximam partem induxisse, novam
genitum, &c.

*Ren erat luxatus) Fc. Pedemontanus, qui continuavit Gen-
badini, i. e. Practicam Meliani, mentionem facit dislo-
cationis Renis & vesicæ, atque remedia proponit ad*

correctionem ejusmodi morborum. Verum quidem est
luxari Renem, sed dubitatur de vesica, quæ similiter
affixa est & inclusa duplicato peritoneo: Causa luxa-
tionis Renis potest esse vii. lenta & diuturna tussis, quæ
percutit exagitant Diaphragma, ejus extremitates,
quibus incumbunt Renes, possunt Renem alteratum
sua sede dimovere. Ren deest magis obnoxius est
luxationi, quia major ob viciniam jecoris, liqua-
ta pinguedine, quæ ipsam intus gloriis lumbis
affigit, facilius devolvitur. *Reinardus Antropog. lib. 2.
cap. 26.*

OBSERVATIO CLIII.

Dyspnoea ob tumorem Hepatis scirrhusum, & Lienem in tabum resolutum.

Lædi potest Respiratio ab alterutro viscere, aut utroque; in insignem tumorem elaro: juxta illud Hippocratis, *Orthopnoeam inferunt hydropici æstibus duri*. Coacar. sect. 2. l. 5. §. 29. ut hoc tempore vidimus in studioso quodam, Israël l'Alman, qui à quatuor mensibus insigni tumore inflammatorio Hepatis oppressus, cathedræ toto eo tempore insidere & indormire coactus, interit nuper, cujus Patens simili orthopnoea triennio ante jugulatus est.

In cujus cadavere Hepar scirrhusum valde inventum, una cum liene in tabum verso. C. Pijo de morbis à sero Sect. 3. cap. 4.

S C H O L I A.

Insigni tumore) Hoc exemplo videtur Excell. Th. Bartholinus, Tract. de vasis Lacteis cap. 15. probaturus suffocationem, sive orthopnoeam sæpe insidendi, delato mœrelo chylo ad thoracem per novos Ductus thoracicos, quia hujus commentus ad hepar ob illius affectus p. n. intercipiatur: quo in casu vitæ & sanguinis muila supplere & præstare cor statuit, sed quia solum nequeat hepatis auxilio destitutum, perire ho-

minem: Hujus læsæ respirationis causa vulgo assignatur tumido visceri, diaphragmatis liberum motum impediens: Sed & aliis illius affectionibus, citra tumorem, ut scirrhu, corruptioni &c. succedisse fidem faciunt plura exempla: Hinc recte colligitur Vitæ illustr. orthopnoeam illam iterum affatim chylo, pulmoneque in transitu afficiunt, adhibendam esse.

OBSERVATIO CLIV.

Asthma ab abscessu juxta lienem genito.

Nobilis vidua per multos annos pedem graviter ulceratum & fontanellam etiam in altero habuit, horum diuturna molestia defessa, per Chirurgum, disfluente me, consolidari tamen & ad cicatricem perducere curavit, quo facto, statim spirandi difficultas occupat, appetitu edendi non dejecto, imo ipsa dicente, jam vegetiori reddito ita ut desiderio indulgere, ob asthma, nunquam audeat, Tandem facies & manus extremæ, cum abdomine atque pedibus, ob humores stagnantes, & exitum amplius non habentes, intumuerunt, & asthmate aucto, viribus diuturnitate fractis & attritis, vitæ naturæ reddidit.

In hujus post mortem latere sinistro, ad lienis situm, abscessus, quem omnium cum admiratione, occultum habuerat, apertus inventus est, ex quo, defuncta jam ipsa, magnam foetidissimæ saniei copiam effluxisse mihi relatam: Hinc patet ulcera diuturna, aut abscessus, in quos naturæ exonerat, caute tractandos esse, nisi in aliud tristiū discrimen se conjicere quis velit. Greg. Horslius Observ. xv lib. ix.

S C H O L I A.

Considerari) Hippoc. 6. Epid. sect. 3. tit. 18. veteris abscessus, qui aliorum affectuum modè sunt curati; In quem locum commentarius Vallesii memoria tenendum: Definitio autem horum abscessuum diuturnitas est, sunt enim diuturni, quod natura jam consuetudinem eo mirandi comparaverit: Igitur in omni diuturno abscessu, sive fit cum evacuatione; ut ulcus, fistula aut hæmorrhoidis, sive etiam sine ea, ut venæ podagra, videndum quomodo cures, Plurimi enim eorum qui tali morbo malis jam annis labora-

rant, solent in nephritidem aut asthma, aut etiam aliquam apoplecticarum passionum incidere: ut contra multa heri vidi ex Epilepsia, aut alio cerebri morbo magno, nephritidem, & ex hac podagram. Tales igitur abscessus, cum jam sunt inveterati, etsi cum evacuatione non sunt, dico esse aliorum morborum incedam, ut fistulas: quare sæpe curati prohibeo, aliquando etiam fieri sudeo, juxta præceptum Hippocratis; Quibus in morbis facti decubitus liberant, eosdem si ante fuerit, prohibent.

OBSERVATIO CLV.

Dyspnoea à variis Hepatis & Lienis vitis.

Instrumenta respirationis moventia aliquando impediuntur ab externo corpore, ut hepar p. n. diaphragmati agglutinato: hinc retardantur in suo motu, ut nos vidimus non semel, & nuper in Nobili juvene & Religioso ex familia de Pouly. Car. Pijo de morbis à sero Sect. 3. cap. 4.

Bimulus Princeps defunctus 26. Julii 1676. Hepar illi valde durum, albicans, inusitatæ magnitudinis. Præterea undique angustum & arcte costis spuris & diaphragmati accretum: hinc facile colligi potuit unde difficilis Respiratio orta. In Actū Medicis Th. Bartholini ann. 1674. 75. 76.

§. 3. Puella in hæticam incidit cum tussicula, Anhelitus difficultate. Hepar medianæ

Pp 3 moria

matéria gypsea tam tenaciter diaphragmati adnatum erat, vix ut avelli posset. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 4. Matrōna semper conquesta de difficili respiracione. Hepar pendebat libras xxiii. Duo tumores faxei pendebant ab ejus suspensorio. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 5. Cuidam dolor & tumor in hypochondrio dextro cum Dyspnoea. Inventus ingens abscessus in Jecore, unde pus venæ cavæ tamum superiorem subierat & thoracem. *Vide lib. 3. tit. de Hypoch. dolore.*

§. 6. Cuidam aderat febris, pulsus durus, Dyspnoea, & dolor in superiore parte thoracis: Vomica in Hepate, cum maxima puris coacervatione inventa. *Vide tit. de Lateris dolore.*

§. 7. Dom. Penso magnus erat abdominis tumor cum anhelitus difficultate, &c. Aperto abdomine prodit Lien maximus, latissimus, ita ut totum impleat abdomen: Jecur valde durum, obstructum, pendens libras xi. &c. *Vide lib. 3. c. de ventris Tumoribus.*

§. 8. Vir sinistri lateris tumore & dolore diu cruciatus fuit: Lien insolite molis adhærebat diaphragmati firmissime, unde Spirandi difficultas quam ambulaturus fuerat expertus. *Vide lib. 3. Tit. de Hypochondr. dolore.*

§. 9. Latus sinistrum deciduo ex loco superiore lapsu affixerat Th. Iohannis, &c. Exterius illæsum in tumorem assurgit, &c. Accedebat anhelandi difficultas quam rebantur alterius morbi sobolem, &c. Unica tot malorum causa fuit Lien isto lapsu læsus, qui præter modum induruerat, & magnitudine diaphragma premens, dyspnoeam induxerat. *Vide l. 3. Tit. de Hypochondr. Tumoribus.*

S C H O L I A.

Respirationem lædi à tumente Liene, pondere suo se vocat *Molin in Medic. Physicæ. cap. 17. §. 17;* diaphragmatis, cui alligatur, motum impediens.

§. 10. Mulierem diu fatigavit Dyspnoea, cum abdominis mole: Aquarum stoffæ xv. educuntur, inventumque Hepar xxiii. libras ponderans, scirrhum. *Vide l. 3. tit. de ventris Tumore.*

OBSERVATIO CLVI.

Dyspnoea ab insigni Mesenterii tumore, in quo plures vesiculae, Jecore magno septo accreto, &c.

Filia N. discicta ostendit in mesenterio insignem tumorem ponderis lib. xx. interius referto pluribus vesiculis limpida aqua distentis, &c. Inegro triennio vix unquam spiritum libere duxerat, sive ob copiam aquæ, sive ob jecur diaphragmati onerosum & illi firmiter accretum. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

OBSERVATIO CLVII.

Dyspnoea producta à variis Mesenterii vitiis.

§. 1. Mesenterii glandulam offendit Fabr. Bartoletus in muliere, quam plures annos gesserat; unde Dyspnoea, retracto per ventriculum diaphragmate: mirum admodum haud interceptam fuisse. *Ioh. Rhodius cent. 2. Observ. 29.*

S C H O L I A.

Mesenterium) Ea glandola ab Asellio Pancreas vocatur, ex qua venarum lactearum originem deducit, quæ ibi in unum omnes coeunt, indeque tum iusculum tum decusum ad hepar portiguntur: Re-

vera mirum sanctorum ideo non fuisse impeditam, neque atrophiam sequutam; Sed chyli Receptaculo, ductuque chylosi illius, chyli distributio illac comarum habuit.

§. 2. In Asthmatico crebra & per intervalia anhelosa respiracione affecto, tam gravi insultu ut sæpe oporuerat sedeter, in paro xyfmo mortuo, nullum in pulmonibus vitium, sed in Mesenterio magnarum glandularum copiam inveni, argumento evidenti non omnia asthmata à defluxionibus in pulmonem, sed sæpe vaporibus solis ex hypochondriis ascendentibus oriri. *Guern. Ruisinkius Dissert. Anat. lib. 1. cap. 13.*

§. 3. Quidam cura ventris tumore querebatur de difficili Respiracione. Aperto abdomine ingens moles, pinguedinem in superficie referens se exhibuit, totum fere mesenterii spatium occupans. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 4. Isabel-

§. 4. Isabellæ N. abdomen in tumorem sensim ac sine sensu incremente crevit: Respirationi illi erat difficilis &c. Mesenterium totum, atque in mesenterio Pancreas, tumore miro & incredibilem turgens animadvertimus &c. suberant infirmi in eo abscessus &c. Respirationi ob septi compressionem difficilis erat, &c. *Vide l. 3. tit. de ventris Tumoribus.*

OBSERVATIO CLVIII.

Dyspnoea inducenda à variis Omenti affectibus.

§. 1. **D**yspnoeam in muliere deprehendit Fabricius Bartoletus ab Omenti pinguedine septum transversum comprimente: Dissidentibus Medicis, qui pulmonum hydropem adesse cogitabant. *Rhodus cent. 2. Observ. 24.*

S C H O L I A.

1. **O**menti.) Omentum membrana est pinguedine in obliquis copiose perfusa, venticulo circa fundum conjuncta: Quousque se demittat in vivo corpore varie disceptatur; aucta pinguedinis mole ponderosum reddituram; potius infra tendit quam ascendit: hinc in mulieribus utero pressio sterilitatem aliquando invehit: Si ergo adipis copioso perfusum Dyspnoeam peperit, id coartat à compello venticulo, qui solum compulsi diaphragma oppressa, liberumque motum impedit.

3. *Difficultas spirandi.*) Difficultatem spirandi non solis spirabilibus organis affectis imputandam esse, quod quibusdam videtur, sed & à partium imo ventris concluturam vitio pendere ostendit Galenus cap. 12. lib. 2. de Difficili respir. Peripneumia est, aut, quod venticulas, pericoronum, splen, hepar, alvus, superiora ventris intestina, & musculari precordiorum in magnis thoracis moribus dolore vexantur, minus in parvis: Ob id parvus & densus, non solum in pleuritide, sed & ventriculi doloribus & totius ventris spiritus erit: Consimiliter respirabit qui hepar, aut spleenem, aut aliquod ex eis membrum affectum habebunt: Omnia enim talia partim appressa, partim agnata, Respirationis instrumenta ad horum motum commoventur: *Hætenus Galenus.* Quæ valde noranda sunt, fere enim omnes cum difficilem respirationem vident, accusant pulmones, cum sepe vitium in imo ventre relideat, & tunc est adminiculandum partibus in eo contentis relicto thorace.

Ab Omenti pinguedine.) Microscopii ope detexit Malpighium Epiploon, ingentis instar sacci constructum esse, sacculos alios innumeros intra se continens, adipis congetiem suam suo concludentibus: Vasa plurima, adiposa ipsi dicta, ex ea membrana exiliter observavit, ac per totam corpus diffundi, adipem convenientia, non secus ac arterie sanguinem afferunt: Ac ubicunque adepa repetitur, ibidem ejusmodi sacculorum numerum repetiri, in quibus reconditur: Eaque de causa lo macilentis corporibus & extenuatis, pinguedinis vice membranulas tantum occurrere: Addit idem, sacculorum & cylindrorum illarum structuram, valorumque adiposorum, sat manifeste ostendere Adipis generationem accidentariam non esse, ex sanguinis pinguibus vaporibus, que communis est opinio: Sed verius esse potius inservire saltem temperationi per sanguinis massam & serum diffusorum: Reversus idem macilentos, & quibus Epiplois portio exsecta est, per ceteris Rheumatismo esse obnoxios, leucæmiis similibusque morbis facilius totius quoriam acrimonia homotum patens est: Viceversa pingues ita minus affici, quod feri acrimonia admixtione adipis emendetur, non secus ac lizivium quodvis, atque acre, ab admixto oleo habet. *Vide in Tractatu anatomico, Epist. M. Malpighii, & Caput. Brasaviani.*

Pulmonum hydropem.) De hydropse pulmonum & thoracis, vide supra signa & causas observat. 74. & sequenti.

§. 2. Ego vidi Omentum carnosum, seu potius glandulosum, semipollicari crassitie, à virgine cachectica exsectum, (*Vide lib. 3. tit. de Cachexia.*) Abdomen circa regionem umbilicalem duriusculum & subrumidum apparebat: paulo post ruficula cum Spirandi difficultate oborta est &c.

§. 3. Uxori N. ejusmodi erat ventris tumor ut ascitem mentiretur, cum compressione pectoris ac diaphragmatis &c. Aperto abdomine intestina juxta dextrum latus ascendentia occurrebant; quibus remotis Tumor ingens, totam capacitatem infirmi ventris complens, occurrit, Exemptus pendebat libras 14. &c. *Vide l. 3. tit. de ventris Tumor.*

OBSERVATIO CLIX.

Orthopnoea à Rene purulenta.

Nicola Honorata cum febre lenta laboravisset, & bene cœnavisset, cepit brevi spirare & frequentar. Ista respiratio mansit donec expiraret: Retulimus ad ventrem inferiorem malum, non ad pulmonem, alii contra.

Appeto cadavere repertus est Ren dexter purulentus: unde credibile à maligno vapore hanc orthopnoeam siccam inductam fuisse: Incredibile enim qualia symptomata afferat aura venenata à pure traducta: Porro huic puellæ pulmones erant integri: aliquantula pars adhærescebat colliis, sed id non erat *ἀσπλην*: *Gul. Ballonini Epid. & Ephem lib. 5. pag. 497.*

Apertæ uterus grumis plenus inventus, Totus venter flatibus tumens, Ren dexter purulentus, Hepar quantitate peccans, lobo uno costis adhærens, colore totum vitiatum, aridum, ac veluti frixum, aliis partibus quasi putredine mucosum: Similiter & pulmones, in quorum summo ad arteriam vomica pure plena erupit. *Hallerius in observ. ad consilium curandi §. 8.*

S C H O L I A.

Hic plurius causarum concursus ad difficilem respirationem, pulmonum virium; hepar grande diaphragma premens, lobo uno costis adhærens, venter flatibus distensus; Aura maligna à grumis in utero contentis; cum Renis dextri vitio; Renibus

autem affectis dyspnoiam induci, hac sectione ostenditur: Distillationi veteri in pulmones malum adscripsit auctor, verius de duxerit à vitia partium naturalium æconomia, & corrupto alimento pulmonibus oblato, accedente proprio illorum vitio.

OBSERVATIO CXXXI.

Dyspnoea & pectoris oppressio, ob Pulmones tabo sine ulcere refertos, Hepatis & Ventriculi molem, in angustias partes spirituales redigentem, Renes male constitutos.

ANno 1795. cum Sereniss. Ernestus Archidux Austriæ, Prorex Belgii, vehementer frigida aëris constitutione domum reverteretur, in aī thriridem, ut sæpe solebat, incidit; qua cum per aliquot dies detineretur, accessit capitis dolor, destillatio in pectus, mox febricula, cum nausea vomitu, cibi fastidio, ac dolore ad ureteres, cum micu laborioso & strangurioso. Visum fuit Medicis tum ratione dolorum, tum febris, tum nephritidis, cuius non obscura signa aderant, non aliud commodius ac præsentaneum remedium, nec citius ac securius esse V. S. quæ adhibita fuit; à qua levius visus fuit habere, quanquam id sine ratione Medicis visum fuerit, cum urinæ albæ, perspicuæ, ac tenuissimæ forent, ac omni sui ratione calculus esse videretur. Itaque cum perseverarent vtreterum dolores, vomitus ac meiendi difficultas, propinatum est oxymel cum contemperante syrupo, quo hausto per aliquot dies, calculum exclusit album, rotundum, à quo dolor abstinuit, & meiendi difficultas sed non vomitus: Cum vero ex eo Medici & alios lapillos esse suspicarentur, cassiam dederunt cum speciebus hæræ, à qua bis tervè; sine ullo incommodo, multa pituita tenaci levatus est, sed persistit vomitus cum nausea, ac urinæ omnino limpidæ: nocte non bene dormire, non quiescere poterat, *anxius ac circum præcordia oppressus*: fluxit præterea sanguis ex naribus, non multus, albidus & serosus, ex quo Medici desperare cœperunt, Consilium ramen fuit clysteribus ac levibus vomitoriis, sursum deorsumque humorem peccantem ducere, revellere, retrahere, sed omnia frustra, crescente anxietate & aucta pulsus imbecillitate, ita ut interfectus videretur, myarus, mox capillaris, tandem sine pulsu; quo cum per biduum vixisset, esse desit 20. Februarii, (*initium aggritudinis 15. Ianuar.*)

Quo jam vita defuncto, cum corpus dissecaretur, in conspectum venire, pulmo, cor, pleura ac seprum vi retracta, ac in angustum coacta hepatis mole, & ventriculi, seprum quasi superantia: Pulmones nigricantes, sine ulcere quidem, sed digitis compressi tabum quoddam reddidere; cor integrum, sed inæquali figura præditum; Hæc in superiore ventre, Inferior talis erat: Mesenterium valde pingue, Hepar multo maximum in uno lobo vivebat: Renum uterque magnus, durus, colore livido: in dextro pustulæ, phlyctenas esse diceret; sinister, præter dicta, in acuta cuspidè, ulcus cavum habebat, nigrum & cum *igneolis* esse videretur, non immerito cancer esse videbatur: Aderant in cavitate fragmenta calculi & majores arenulæ multæ, ut videretur aliquis calculus egressus in in vtreteres delivisse, Er vesica putrida, fortens, livida &c. *Schenckius lib. 3. p. m. 447.*

OBSERVATIO CXXXII.

Dyspnoea inducitur à pulmonibus costis adnatis, hydropè thoracis, & utroq; Rene calculoso.

Pulmarum venditor emortuus ob Renum Pectorisq; vitia, habuit in utroque Rene insignem calculum: In thorace tres aquæ libras, Pulmonem costis adnatum, & cor non tantum pericardio suo destitutum, sed exprimens præterea extima sui parte naturam pallescentis fevi: quem colorem ipsi proculdubio impresserat aqua in thorace contenta, uti videre est in eorum musculis quos accidit vel *anagorystis* vel *aduripæ*. *Tulpius lib. 2. observ. 44.*

S C H O L I A.

Tres aquæ libras: Ob vitium cordis quod primariū, secundum multorum opinionem, potius tenet in opere languificationis, Et Renum, qui calor

lo obfessi, nec sero liberam excretionem concedentes, huius in pectoris regionem transusionem pepererunt.

OBSERV.

Respiratio lęsa à Pulmonibus flatibus distentis, dextro costis adherente, & abscessu tentato: Hępate & Liene insolite magnitudinis, septo adnexu &c.

ANno 1663. die 9. Febr. Clar. Franc. Sylvius de le Boë in Nosocomio Leydensi vetulam secuit, in cujus cadavere sequentia notabantur. Hępar solto grandius, & usque ad os coxendicis inferius protensum, in sinistro vero latere diaphragmati validissime annectum, ut separari non posset sine ruptura diaphragmatis: Lien insolite magnitudinis & mirabilis conformationis quasi ex pluribus lobis compositus videbatur, diaphragmati validissime adhærebat, & inferius eousque propendebat ut sinistrum renem plane comprimeret, cumque admodum parvum relinqueret; Lienis color & parenchyma plane diversa erant à statu naturali, color erat valde rubeus, qui naturaliter solet esse plumbeus: Parenchyma erat firmum, instar parenchymatis renum, quod naturaliter laxum esse solet & diffusum: Membrana externa crassa erat & fere cartilaginea, quę substantia usque in profundum tendebat: Ventriculus infra umbilicum protendebatur, loco superiori amplior erat, intermedio loco angustior, loco inferiori iterum amplior: Angustia in medio causam esse putabat magnitudinem insolitam hepatis & lienis, à quibus coarctabatur ventriculus: Pulmo à flatibus erat distentus, ita ut cum dissecaretur status erumperent, variisque in partibus thoraci per fibras adhærebat in dextro latere, in sinistro plane erat liber: In dextro Pulmone, qua parte firmiter adhærebat costis, abscessus erat pus foetidum, subvitide & valde tenax continens ultra duo cochlearia. Color obscure rubens viscibatur in variis intestini tenuis partibus, ipsaque vasa intestini erant turgida: qua parte attingebat folliculum felleis, ab ejus colore tinctum erat intestinum, qui color penetrabat usque ad partes interiores. Humor fuscus & obscure nigricans continebatur in ventriculo & intestino tenui, qualem sæpe à moribundis evomi ajebat, idque pessimum esse signum, & raro ægros talia evomentes evadere: Putabat eam esse miscellam bilis & succi pancreatici valde vitiosam, ubi jam omnia à statu naturali abierunt. In rugis intestini duodeni quęrendam esse ajebat insertionem ductuum biliarii & pancreatici; styllum non poterat inducendum immittere, ob aliquod in illo obstaculum, idque indicium esse putabat alicujus valvule in ipso ductu; Transverso pollice satis grandi distabat insertio ductus pancreatici ab insertione ductus biliarii: Duplex erat insertio ductus pancreatici in intestinum tenue; alter ramus erat in loco aliquantulum superiore, & erat minor; alter, qui major erat, inferebatur eo in loco, in quo erat exitus duplex biliarii: quę duplex insertio ut frequentissima est in brutis, canibus præsertim, ita rarissima est in homine: Ductus Pancreaticus tante erat capacitaris, ut styllum calami scriptorii crassitie admitteret: Immissio rubulo in ductum & inflato, attollebat tota substantia pancreatis. Inter duplicem tunicam intestini tenuis, ad transversum pollicis latitudinem, inferebatur ductus biliaris, plane ut ureteres inter duplicem tunicam vesicę inferuntur. Ren sinister erat valde exiguus ac mollis, & cum dissecaretur, pus aquosum emittebat, in parte superiore bona sui parte consumptus esse, nullus tamen aderat calculus. Suppurationem illam renis provenisse putabat à compressione ejus facta à liene grandiore, unde urina diutius retenta acrior facta substantiam renis erosit:

Membrana Renis interna, quę pelvim constituit, triplo fere crassior erat quam naturaliter debebat, idque sæpius fieri ajebat in partibus purulentis, sanguinem enim affluentem partes tum magis munire adversus acrimoniam humorum: Ureter sinister satis erat grandis, ut raro tam grandis appareat: Ren dexter in parte superiore, ubi sit sectetio feri à sanguine, cavitatem habebat pisi magnitudine, in quo calculum hæsisse putabat, & hinc inde per totam renis substantiam observabantur granula quędam sabulosa albicantia. Vena umbilicalis non procius coaluerat, reperiebat enim stylo per eam ingressum in venam portę: Uterus totus erat contortus versus dextram, quod sibi nunquam visum ajebat: fieri quidem interdum ut fundus uteri magis declinet in alterutram partem, sed totam uteri substantiam ita contorqueri rarissimum esse putabat: Causam esse existimabat propinquitatem nimiam ossis sacri, cui uterus necessum habuisset cedere: Putabat idcirco illam partem habuisse minus felices: ob viciniam enim ossis sacri coangustatur locus per quem fortui transeundum est: Iusto quoque grandior erat uterus, & vasa in eo valde conspicua, quod in vetula mirum. Orificium vesicę admodum erat amplum: existimabat proinde illam aliquando excrevisse calculos: Inserta rubulo in apertum aliquod vas in Tuba uteri & inflato, plurima vasa hinc inde per tubam discurrentia attollebantur, in quibus vasis sæpe stagnate putabat sanguinem, & variorum morborum in feminis causam esse. Ductus Thoracicus valde erat exilis, ut diceret se tam exilem in corpore humano non reperire:

Dum

Dum immitteret tubulum & inflaret, tentans an partes ductus superiores intumescere vellent, obtinere id non potuit, ob aliquod quasi concretum in ipso ductu, quo remoto intumuit, ut optime pateret infectio ejus in venam axillarem sinistram. Liquore rutilo totus ductus erat plenus, quod sibi nunquam visum aiebat: Vasa cerebri à sanguine valde erant turgida, ut nunquam se adeo turgida vidisse diceret;

In sinu falcis superiore reperiebatur substantia renax & viscida, per totum ductum falcis dispersa, quale quid frequenter reperiri, in Belgio præsertim, posseque eam appellari Polypum cerebri aiebat: Addebat reperiri etiam in omnibus venis sæpe talem substantiam, & reperisse se in venis capillaribus: Subinde in venæ sectione in venis hæere talem materiam, ut Chirurgi aliquando cogantur abstinere à venæ sectione, nec eam administrare possint nisi emollita & sublata hac materia: Aqua cruenta satis copiosa, modicæ fæsedinis particeps reperiebatur inter utramque meningem, ut & spumæ satis multum: Cujus causam esse putabat, quod cum inspirando mortua esset, facile potuisset fieri ut in illa angustia aliquid aëris ad cerebrum penetraret: Immisso tubulo in arteriam carotidem & inflato, intumescabant omnes arteriæ per totam cerebri substantiam dispersæ: In cerebri ventriculis aqua copiosa salis saporis continebatur: Infinita vascula ab arteria carotide tendebant, usque in plexum choroidem, qui ex multis parvis rubicundis glandulis constabat, quo in loco, si quod sit, esse putabat Rete illud mirabile Galeni: Ex radice cerebri duo corpora nervosa satis conspicua utrinque serebantur in ipsam glandulam Pinealem, quæ se primum reperisse aiebat, ipsi etiam Cartesio ignorata, quem in Anatomicis plane imperitum & inexercitatum fuisse aiebat, ex propria illius ipsi facta confessione. In glandula Pineali arenulæ grandiores reperiebantur: *Ex observat. Joh. Henrici Brechfeld; Medici Dani, in Alia Medicin. Th. Bartholini anni 1672. observ. 14.*

S C H O L I A.

Non expressit quo morbo interierit vetula, & quamquam Apoplexia intemptam esse suspicari fas sit, quod cerebri vasa sanguine essent turgida, & Sinus falcis superior obstructus esset; Aut Phlusi,

ob abscessum & ulcus in Pulmone, Ac obstruccionem Ductus thoracici, Si tamen conjecturæ locus, Respirationem illi difficilem fuisse credendam ob Pulmonem & Septi variam lesionem.

O B S E R V A T I O CXXXIV.

Pectoris oppressio & dyspnœa à Pulmonum inflammatorio affectu, & Hepatis magnitudine præternaturali.

Illud jam Medicis solenne est, etiam melioris notæ, ut si dubia sit morbi idea & causa, illico ad obstrucciones imi ventris, Lienis præsertim, recurrant, & mala idiopathica per sympathiam excitata judicent; adeo ut morbi causa alibi quam in fonte quaeratur: Junii 8. anni 1677. vocatus fui ab Illustriss. Comitibus de Savigni & Salanova, quo præsertim dissectioni cadaveris Puelli, octodecim menses nati, filii dicti Comitibus à Salanova: Toto vitæ decursu languidus fuerat, quod lactis & nutricis vitio adscriptum: Respiratio illi plerumque anhelæ, cum sibilo quodam sed sine stertore, frequens aderat cordis palpitatio, tussicula sicca, pectoris oppressio: volarum manuum squallor & calor, quæ quandoque flavescebant; vicissitudines crebræ ruboris & palloris in vultu: Hæc omnia vaporum è liene & hypochondriis elatorum soboles credita, & obstruccionum partium alvinarum. Præscriptæ aliquot purgationes, potus aperientes, foras imi ventris, à quibus pejus habuit; paucisque diebus ab eorum usu interlit:

Ancequam dissectio institueretur, examinarum totum corpus: quod pluribus in locis lividum erat & ecchymosis latis fœdaturum, præsertim in dorso & externis semoribus: Macie confectum cum abdominis tumore & scroti lateris sinistro, ob Enterocelen, qui ab incunabulis obnoxius fuerat Nobiliss. Puer: Admota novacula, illico extra profliere intestina tenuia, quæ cum ventriculo statibus tumebant: hic vero ab eorum eruptione, flaccidus, mollis & extreme relaxatus apparuit, ac pro ætatis ratione major: Jecur maximum erat, substantiæ tamen & coloris laudabilis: cui adscribenda *ad dyspnœia* & edendi aviditas insignis, necnon ex parte dyspnœa, à compresso diaphragmate: Lien integerrimus, Ren sinister dextro duplo fere major, intra parenchyma abscessum pure referentem, avellaneæ magnitudine continebat: Dexter naturalis erat: Productio peritonæi, per quam Ileon in scrotum devolvebatur, (unde crebri ventris dolores) latissima erat, digitum medium facillime admittens: In pectore vero plerorumque symptomatum & lethi causa apparuit, Pulmones enim inflammationis erysipelatosis prægressæ notas gerebant, marmoris instar variegati, viridi coloris, lividi, rubri, exsucco, paucum tantum cruorem

eruorem nigerrimum dissecti fundentes; ab omni connexione cum costis undiqueque liberi: Rarissimus autem occurrit casus, Auricula scilicet cordis dextra ovi columbini magnitudine æquans, pure referta, quod è ventriculis cordis manabat: Adco ut in ventrem, si renem dextrum excipias, & ventriculum laxiorem ob didam voracitatem, culpa pene liberandus fuerit: Cum è contra Thorax, partesque in eo contentæ; nullo vitio idiopathico laborare iudicatz sint, præcipuorum tamen affectuum sedes & lethi causæ. *Ex propriis observationibus.*

OBSERVATIO CXXXV.

Bovum strages epidemica à vitio Pulmonum, Hepatis, hydatidibus obfessorum, Respirationem anhelosam inducentium, Tussiculam, &c.

Uo obtusior Bilis est, eo oleosæ partes & pingues luxuriant magis, carnesque licentiosius obsident quam naturæ ex re sit: Tum alias, tum Abrahamitropii Siciliæ 1674. id observasse contigit: Aegrotabat pæne omnis Bovum familia, omni corpore languor, respiratio anhelæ, tussicula rara; comedebant, coibant, imprægnabantur, pinguescebant: Quædam utriusque sexus horum animalium dissecui: Pioguedo ubique copiosissima, carnibus flaccidis, Pulmones innumerabilibus hydatidibus referti, quædam duos pugnos æquabant, In vaccæ unius Pulmonibus numeravi 17. exterius, sed copiosiores intra ipsos pulmones latentes numerum non admittebant: Non tenues pelliculæ has involuebant, sed crassæ membranæ, vulneratæ limpidum cruorem profuderunt, quædam, at pauciores, flavescentem: Omnis thoracis cavitas aqua cruenta inundabatur: In aliâ vaccæ dexter Pulmo una hydatidis videbatur: Circa cordis cum vasis nexum copiosa pinguedo: Cœventus in pericardio liquor, copiosus, similis ei qui thoracem inundaverat: Cor in omnibus, si fibras spectes, flaccidum: In vaccæ alicujus cordis dextro ventriculo substantiam, parieti non septo, adnatam offendi, magnitudine gallæ, quatuor cruribus parenchymati cordis, polypi instar, se insinuantem, extrahi cum cruribus haud ægre potuit: Abluto simplici aqua cruore, ceræ instar flavescebat, dissecta copiosas ostendebat fibrillas, cujus stamina sevo farcirentur, substantia concisa igni injecta & pinguedinem fudit, & crepuit: Omnium Hepar pessime habuit: multarum vaccarum innumeris replebatur aquosis tumoribus, pugni, pomi, juglandis, avellanæ, majoris minorisve quantitatibus, membrana crassissima cornæ oculorum nec duritie cessit, nec colore: Vulnerati tumores quidam aquam salinam, plerique vel flavescentem, vel viridiusculam amarescentem effuderunt: Rarus erat tumor magnus cui non complures minores includerentur, pari omnino tunica vestiti; nonnullis ex eadem membrana parietes erant & septa: quarum Hepar ita scatebat tumoribus, iis Hepatis color quasi adustus erat, & ex atro rubeus. Aliorum bovum jecinora hydatidibus quidem destituta erant, sed passim in scirrhis induruerunt: Omnium cystes felleæ consuetò longe majores erant, copiosissimo humore repletæ, qui colore pallidus, leviter amarus, fluidus instar aquæ: Quamplurimis non tantum in omnibus propemodum venæ portæ ramis, sed ductibus etiam biliaris vermes reperiébantur copiosi: Lien, Renes, Genitalia &c. nil præter naturale ostentabant:

Scilicet ubi sanguis sulphuris sui & salis legitime proportionem orbat, facilis est putredo, aut ejusmodi insectis apta corruptio, & succorum benignorum degeneratio, quæ sæpe in generationem copiosæ pinguedinis, sive ea sebum, sive lardum, sive aliud quid mentiatur, facessere potest. *Johan. Val. Willius in Aliis Medicis T. Bartholini ann. 1674. 75. & 76. pag. 132.*

OBSERVATIO CXXXVI.

Dyspnœa à Strumis in Pulmonibus, orificio Stomachi, Omento, Mesenterio &c.

Juvenis Strumis, quæ gulam asperamque arteriam oppresserant, moritur. Eo mortuus repertæ quoque Strumæ in orificio ventriculi, Pulmonibus, omento, mesenterio &c. *Vide sit. de Suffocatione.*

OBSERVATIO CXXXVII.

Respiratio læsa ob Hydropem pectoris, Pulmones siccatos, Hepar grandius & scirrhosum.

Nuper cum ex officio in cadavere forminx alicujus causam mortis indagarem, cum in supremo ventre nulla mortis signa apparerent, aperto Thorace tota pectoris cavitas

cavitas aquis diffundebat, sterno enim remoto velut ex fonte lymphæ cum impetu dimanabant. Verum ergo Hydropem pectoris ibi reperi & ipsam moris causam (Pulmones enim syderati erant & male affecti) Pergo tamen sectione ad imam ventrem, & ibi ventriculum tam pusillum, tam contractum vidimus, ut pugni magnitudinem non excederet, hepæ vero iusto grandius erat & scirrhotum, quamvis abdomen aquis nec dum distentum esset: *Observatio D. Caspari Colluben Medici Dani, in Altit. Medicis Bartholini, anni 1673. observ. 118.*

S C H O L I A.

DE Pectoris hydrope pauca apud Practicos repetimus, ita enim Lat. Rivinus Pr. med. l. 7. c. 5. Practicorum vulgus hunc morbum non describit: *Carolus Piss* tamen Tract. de morbis ex colluvie fetida, p. 214. & nuper *Sylvius* in Praxi sua l. 1. c. 50. paulo fulius & satis accurate de eo scripsit, siquens tamen est malum in oculis præsertim maritimis, ratioque scorbuti, & cognita difficile. *Idem ibidem.*

Nulla signa apparent Ut cognita difficile est iste morbus, ita etiam curari: Cognoscitur enim propriè difficultate spirandi, quod signum tamen ambiguum est: signum pathognomonicum statim oportet inquiri C. Piss, Eam in spirando difficultatem ex crebritatem, quæ defubito somno primo tempore invadit & quiesce defraudat, sed tamen procedente die sensum leotescit: quod signum tum ratio mihi dicta-

vit, tum experientia in omnibus confirmavit: Curatio difficilis est, *pergit Piss* 3. Vacuio certe concurre materię io thoracis tentari quidem posset sive purgantibus, sive per tussim vacuoribus, sive discutientibus, sive aliis id genus, sed verendum ne ab eorum calore agitata materia dyspnoea increbescat, suffocatioque laboratur: quo tunc consilium videtur ex vacuetur illa sensibilibus thoracis sperto cauterio potentiali, io aliis tamen masculis animi, actuali: *Idem.*

Hepar iusto grandius & firmius Sic io omni hydrope specie Hepas laborare verum est, cum enim sic coloratum sanguis, illo male affecto etiam sanguis patitur ratione terti quod vehiculum est sanguinis, unde Hepas affectum prout Hepas affectum est, *Idem.*

OBSERVATIO CXXXVIII.

Dyspnœa ab Hydrope Thoracis, Diaphragmatis exulceratione, Crassitie membranae Pulmonum, Parenchymatis eorum duritie, Glandulis in eo, vario vitio partium naturalium.

ANno 1661. die 22. Junii Clariss. Pylvius secuit in nosocomio Leydensi secuit Saram Jansen, in cuius cadavere sequentia notatu digna occurrerant: Hepar in dextro latere loco admodum profundo situm erat, & infra umbilicum superioreque partem ossis coxendicis propendebat: Pallidiusculum erat, & quia satis grande, partes subjæctæ inferius, quam secundum naturam esse debebant, sitæ erant: Suspensorium Hepatis, quod solet esse in dextro, vel medio Thoracis, plane in sinistra parte situm erat, & tres digitos transversos minimum distabat à medio: alter lobus Hepatis occupabat totum finistram hypochondrium, quod eo totum replebatur: Folliculus fellis in sinistro etiam conspicebatur latere: Tinctura ipsi peritonæo à folliculo fellis erat induta: Venterculus non continebatur in medio, sed totus in sinistro hypochondrio situs erat, & quodammodo convolutus: Pylorus etiam erat in sinistro latere. Ventrículi substantia inferior interius nigricabat, & vasa minima insigniter conspicua erant, & stellulas quasdam quasi representabant, ex quibus alia vasa exibant: Pancreatis substantia bene se habebat, sed glandulæ conglobatæ ipsi adhærentes grandiores & duriores erant: Lien admodum exiguus erat, ut raro tam exiguus appareat: Intestinum colon situm erat loco decliviori ob hepatis magnitudinem, & flatibus erat turgidulum, cumque communicet è dextro latere transversum versus finistram feratur, in hoc subjecto deorsum ferebatur: Vasa minima & capillaria in eo variis in locis turgida erant, quod indicium esse putabat alicujus phlogosæ, idque sibi nunquam in crassis intestinis visum: Tam tenuis etiam erat membrana intestinali ut in nullo tenui esse solet, quod etiam rarum: apparebat autem tenuitas illa eo possilissimum in loco ubi major ejus erat distensio: Intestina tenuia aliqua sui parte distenta erant, & vasa illorum turgida & rubicunda, aliqua vero parte flaccida & pallida: Glandulæ plures notabiles in mesenterio apparebant: Ren dexter admodum grandis erat, Sinister comprimebatur à partibus superioribus, quare etiam aliam à naturali conformatione habebat figuram. Ductus Pancreaticus satis grandis erat, ut duos stylos admitteret, ingressum ejus in intestinum cum ex pancreate non posses invenire, dissecto intestino & immisso stylo in orificium ductus biliaris, manifeste in intestino proruerant, stylus in ipsum ductum pancreaticum penetrabat, Spatium insertionis ductuum in intestinum quatuor circiter transversos digitos distabat à pyloro. *In cavitate thoracis, potissimum*

in dextra ejus parte aque fusida copiosa continebatur, qua aliquot catinus implebat. Ab acrimonia illius aquae, pleura & tota superficies interior diaphragmatis exulceratae erant & erosae ut etiam pus darent. Membrana Pulmonis dextri quadruplo fere crassior reddita erat ab illa aqua purulenta, Pulmo dexter plane durus erat & corrugatus, coloris lividi & foedi. In partibus superioribus interius corrumperet Pulmo dexter & aliquid puris continebat; Pulmo sinister melius habebat, in sinistro latere aqua etiam coeperat colligi, sed limpidior, nec partes ita rubebant & excoctae erant: hinc inde in substantia pulmonis sinistri parvae glandulae erant: Pericardium plenum erat aqua limpidi, quae 6. vel 7. cochlearia implebat, cum vix naturaliter duo cochlearia adesse debeant. In fornice interno uteri materia viscida reperiebatur. In parte interna colli uteri parvi quidam muculi elegantiter apparebant. *Observatio D. J. Henr. Brachfeld in Atilii M. Bartholini ann. 1673. Obs. serv. 16.*

OBSERVATIO CXXXIX.

Dyspnoea à Pulmonum vitio, & spiritalium partium compressione ab utero elato.

Mulier quaedam à partu statim expiravit: Uterus illius occupabat totam capacitatem ventris usque ad foveam pectoris, ventriculūque compulerat versus diaphragma: Pulmo lividus atro sanguine refertus; laboraverat autem asthma. *Vide lib. 3. tit. de partu difficili.*

OBSERVATIO CXL.

§. 1. Dyspnoea à multiplici viscerum vitalium & naturalium vitio.

Vicentinus, &c. Pulmones habuit nimio vini potu debiles, hinc tussis, Respirationis difficultas: Apertum cadaver exhibuit pulmones male constitutos, siccos. Dexter costis adhaerebat mediante muco: Serum aderat in thoracis cavitate, in musculis externis & visceribus; cordis auricula dextra sanguine distenta erat. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 2. Uxor N. affectibus tentata, tussicula, Dyspnoea, hydrops, &c. Pulmo dexter materia purulenta plenus erat; sinister humore seroso. Scirrhi per totam eorum substantiam; Lapides plurimi hinc inde sparsi: hydrops abdominis. Vide Tit. de Phthisi.

§. 3. N. Palpitationi cordis cum asthma obnoxius fuit: Corrupti pulmones deprehensi sunt, Lobus dexter diaphragmati annexus: hoc sursum à colo tumido compulsus. Vide Tit. de Cordis palpitatione.

§. 4. Dom. N. Pulmones magni, flaccidi, colore lividi, variegati & quasi gangrenati; diaphragmati arcte connexi, ut & pleurae, Hepar diaphragmati annexum: Pinguedinis copia vestiebat omnia viscera, ob quod pondus spiritus impeditus fuit. Vide lib. 3. Tit. de ventris tumore.

§. 5. Juvenis (ischuria laborans, Vide lib. 3.) de difficili respiratione conqueritur: Hepar & Pulmones diaphragmati cohaerebant: aderat polypus in corde, cum hydropo abdominis.

§. 6. Netrix in difficili partu obiit; uterus ad foveam pectoris pervenerat; ventriculū compulerat versus diaphragma; aderat hydrops abdominis. Pulmo erat lividus, atro sanguine refertus: Ex thoracis capacitate aqua ichorosa effluxit; Laboraverat asthma. Vide lib. 3. tit. de partu difficili.

§. 7. Fr. Chapuis; gravida à sex mensibus in continuam febrem incidit, erecta cervice spirabat, rubor erat genarum: Foetus aperto corpore in conspectum venit, grandior: intestina omnia flatibus turgabant: Pulmones erant tumentes, lividi, pure praegnant, Vide I. de Febribus.

§. 8. D. N. Aliquot ante obitum septimanis, gravissimis destillationibus affatim è capite destillantibus in thoracem infestabatur, ut non nisi recta cervice spirare fas, unde aliquando ingens impendebat suffocationis discrimen: Aperto demortui thorace inventum pus in eo: Hepar, Pulmones & Cor, in arido & exsucco corpore admodum grandia & pallida. Vide lib. 1. tit. de melancholia.

§. 9. Illustr. Dom. de l'Isle (de quo tit. de Phthisi) praesente virium languore, febre lenta & tussis à Pectoris oppressione ac dyspnoea extinctus est. Huic Pulmones tumidiusculi inventi sunt, & repleti partim humore luto, partim flatu; Iecur in extraordinariam molem excreverat.

§. 10. Vitiosa Pectoris figura in Rachitide Respirationem facit impeditiorem ac crebriorem. Iecur quoque supra modum auctum, cum in ventre non inveniat spatii satis, in thorace mutatur quod ipsi decit, ac versus superiora assurgens, diaphragma longe impellit. Vide Tit. de Gibbositate.

§. 11. Conquestus quidam de Febricula dyspnoea, dolore hypochondrii dextræ: Ingens abscessus in Jecore inventus, Thorax pure abundabat. *Vide lib. 3. tit. de Hypochond. dolore.*

§. 12. Uxor N. diu Dyspnoea laborabat: Illius Hepar durum: Pulmo dextra parte mareria purulenta; sinistra sero imbutus erat: per totam substantiam scirrhi plurimi, & lapides hinc inde dispersi. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 13. Puella ab ephemera febre in hæticam incidit. Illius Hepar mediante materia gypsea tenaciter diaphragmati adnatum erat, hinc anhelitus difficultas: Thorax aqua plenus, Pulmones materia purulenta & stætomatis imbuti erant. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 14. Seren. N. febre duplici tertiana afficitur cum spirandi repentina difficultate: Intestina omnia flaccida distenta erant. Jecur tumidum, cor prægrande: In cavo pectoris aquæ lb v. Dextra pulmonis pars flaccida, crassa & mucoso humore oppleta; Sinistra in sanie resoluta, tunica pulmonis ut in sacco concepta, &c. *Vide Tit. de Febrili.*

§. 15. Dom. N. palpitatio obnoxius fuit cum asthmate: Pulmones puri reperti; lobus dexter diaphragmati per corpus cartilagineum connectebatur. Diaphragma sursum compulsum erat à tumido obflatus colo. *Vide tit. de palp. cordis.*

§. 16. Uxor N. pleuritide lateris sinistri correpta interiit. Lobus dexter pulmonis parenchymate erat destitutus, membrana superstes diaphragmati arcte connexa: Sinister rotus in putrilagine abiebat: Pleura crassa erat, syderata: Cor solito majus Diaphragma solito elatius à Jecore tumido, scirrhuso, maximo sursum compulsum. *Vide tit. de Expiratione purulenta.*

§. 17. N. fatigatus & calefactus, potui litavit, hinc dolor thoracis cum Respiratione difficili, &c. Pulmo dexter totus erat scirrhusus cum fistulosis ulceribus, adnatus pleuræ, diaphragmati & mediante hoc, hepati. In sinistro erat quoque ulcerosa colluvies, & cum pleura coherens. Sanguis in utroque cordis sinu nigerrimus, Hepar rotum adnatum diaphragmati, &c. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 18. Doctor Rumoldus pluribus annis asthmate ac orthopnoea, ut nonnisi erecta cer vice spirare posset, defatigatus fuit: Præter bina in pulmonibus tubercula, lxxij lapilli in vesica fellis & potis choledochis sunt reperti. *Vide lib. 3. tit. de Lithera.*

OBSERVATIO CXXI.

Respiratio in Bobus difficilis à pila conglobata in ventriculo oboriente.

Concrescunt Poma in Boum ventriculis: quæ penitus exassinans, interius ex meris pillis bovinis arctissime compactis constare reperi, & exterius glabra, nigra, & dura pelle tegi: Unde crediderim boves libenter pruriente cute dentibus pilos evellere, qui cum ab omato digeri nequeant, in massam coguntur rotundam, quæ postea in pile majoris magnitudinem excrescit, unde anhelosi & asthmatici diu incedunt. *Gualt. Charleton Diatrika de Lithiasi sect. 1. cap. 2.*

OBSERVATIO CXXII.

Dyspnoea à ventriculo ob pus intra membranas conclusum tumente.

Respiratio intercipi potest à diaphragmate introrsum compulso à ventriculo tumente, & pure inter duas membranas collecto prægnante; ut observavi in matrona, uxore Mag. Joh. Chavotii Pharmacopolæ. *Car. Piso de morbis à sera sect. 3. cap. 4.*

S C H O L I A.

Diaphragmati interdum compulso à ventriculo) Ventriculorum licum naturalem interdum mutale observant, dum aut luctum revulsus diaphragma premis, quod à passu dyspnoeam induci, aut deorsum fertur, imò ad umbilicum usque; aut ad latera declinat: Quæ plurimo uicuntur alimento dyspnoea sunt obnoxii, tum ex multitudine sanguinis, unde major occasio ipsi pulmmoni sui implendi, & oppressionis oc-

casio major: Tum ex ventriculi tumore, hic enim ingesto alimento, ut pars membracea, facile dilatatur, & affluente capiendo multi alimenti, dilataetur magis, unde sive plenus, sive vacuus, ut amplificari solitus, diaphragmati, libertæ respirationis instrumentum, oneri est: hoc pressum thoracem angustum reddit parte interiore; hinc Pulmo, præ angustia thoracis corde æstuate, majus refrigerium requirit.

OBSERVATIO CXXIII.

Dyspnoea à ventriculo tumido diaphragma premente.

Mulier ventem in insignem molem excrescit, cum difficultate Spirandi. Ex aperto ventre x c. libræ aquæ prodierunt, quas à ventriculo mire dilatato ortum habuisse ostendebant superstites vesicæ. *Vide Tit. de ventris tumore.*

OBSERV.

OBSERVATIO CXLIV.

Dyspnoea ob vitiosum ventriculi & omenti in thorace situm.

Studiosus graves singultus & vomitus passus, In sinistro latere thoracis omentum & ventriculum sitos habuit. Ante vivebat æthetice, nisi quod asthma paulisper laboraret. *Vide lib. 3. tit. de vomitu.*

OBSERVATIO CXLV.

Dyspnoea à ventriculi parte, cum portione duodeni & coli, in thoracem per pertusum diaphragma delata.

Militi gladius anceps paulo infra cartilagine m xiphoidem intruditur, hinc respiratio intercipitur, &c. Invenitur ventriculi orificium & pars sinistra ejus, cum portione duodeni & coli ad thoracem per vulnus diaphragmatis delatum, &c. *Vide lib. 6. de vuln. c.*

OBSERVATIO CXLVI.

Dyspnoea à tumente ventriculo ob serum intra ejus membranas coërcitum, Hydropæ abdominis.

Muliet gravidam se credenti abdomen in magnam molem excrevit: tandem in febrem continuam incidit cum difficultate spirandi, &c. & 7. die obiit. Aperto abdomine ingens serosæ humiditatis factum est effluvium: Ventriculus prægrandis per medium diffectus ulnam Parisiensem superabat: membrana interior multis hydatidibus conspersa erat, &c. *Vide l. 3. Tit. de ventris Tumor.*

OBSERVATIO CXLVII.

Asthma periodicum à flatu tumidis intestinis, & lapide insignis magnitudinis in cysti fellea.

Hoc anno circa finem Janu. mortua matrona quædam, vidua N. per triennium asthma te periodico detenta: hanc humi sedentem, erecta cervice respirantem, pedes & ventrem tumidum biduo ante mortem, cum ordinario alias Medico D. D. Schilpachero; visitavi. Cum adstantes vomitorium urgerent, nos vero summam virium prostrationem & extrema instare adverteremus, timendo ne in ipsa operatione medicamenti ægra deficeret, illiisque ac siccò strangulata fuisset nobiscum diffamaretur, postulatam caute declinavimus, alia præscribendo: Avidus filius sciendi unde hæc Dyspnoea, aperiendam concessit.

Difsecto itaque thorace, ubi omnes alias Medici veram sedem figunt Asthmatis, in Pulmonibus nil neque viscosi, neque serosi, neque impacti quicquam in illorum bronchiis observavimus, sed bene constitutos ac laudabiles invenimus, præterquam quod exiguis si brillis hinc inde, imprimis in dextro latere pleuræ adnexi hæsetint: In hoc tamen non acquievimus, cum vitium illud à prima conformatione videretur, ipsa vero à triennio demum asthmatica: Continuavimus itaque sectionem, ventremque, qui, ac si hydropica fuisset, distentus erat, aperuimus, sed remotis inregumentis ne gutta effluxit aquæ, intestina vero omnia, imprimis jejunum, mire inflata, distenta & rota vacua conspecta: Lien bonus, ut & Hepar laudabile: vesica fellea magna, aperta nihil continuit bilis, sed lapidem inclusum habuit magnum, inæqualem, pondere quatuor drachmarum officinalium: *Carolus Reggerus Observ. xi. Mssell. curios. anni quarti.*

S C H O L I A.

Hinc conclusimus Asthma fuisse flatuosum, & stautentiam auxilii alvi constipationem prope continuam, ortam proculdubio à defectu bilis, nam per aliquod tempus nunquam, nisi clysteris aut aquis laxativis, sollicitata alvus suum fecit officium, ad

omnia autem purgancia melius se habuit: Vidimus etiam frustra quod à nobis exhibebam fuisset vomitorium, si quidem materia non impacta fuit Pulmonibus, flatus vero per inferiora pasci vel procius nulli evacuantur, *Idem.*

Dyspnoea ob tùmida flatibus intestina.

M Inotis ordinis D. Francisci focus, Respirationis difficultate aliquando laborans, coli dolore subito è vita discessit.

Intestina ejus adeo flatibus intumuerunt, ut ventre aperto in adstantes profillerent: compresso igitur septo transverso Pulmonibus movendi atque Respirationis facultas cohibita fuit. *Ioh. Rhodius Cent. 2. Observ. 26.*

OBSERVATIO CXLIX.

Dyspnoea à facibus exulceratis intestinis in eorum abdominis effusis, viscera versus thoracem compellentibus.

V Xoti N. post partum venter intumuit, &c. accessit respirandi difficultas quæ in dies increfcentis vitæ finem imposuit. Dissecto ventre, fordes nigrae, quales in cloacis, effluerunt, crassæ, foetidæ, quarum tanta copia ut quatuor urnas implere potuissent, &c. Distensio ventris tam magna, ut jecur, lien & ventriculus, cedente septo, intra pectoris spatium ascenderint. *Vide lib. 3. Tit. de ventris Tumore.*

OBSERVATIO CL.

Dyspnoea à flatibus viscera omnia replentibus.

L udovicum N. vidimus spiritus magna angustia affectum: Viscera omnia in eo ventre plena conspeximus. *Vide lib. 3. Tit. de ventris doloribus.*

OBSERVATIO CLI.

Dyspnoea ab obturata arteria cœliaca à pituita concreta, & hujus aneurysmate.

A nna N. febrem incurrit stipatam orthopnoea, pulsatione vehementi supra ventriculū, &c. Detecta parte quæ primos magnæ arteriæ divaricatus sentit, corpuscula offendimus tria ex pituita concreta, transversim arteriæ ductum obturantia, &c. Arteria se obtulit cœliaca ita dilatata ut compressum pugnum admitteret, &c. *Vide tract. de Febrib. I. 4.*

OBSERVATIO CLII.

Asthma ab Hepate magno, materia indurata infarcto, Pancreate maximo.

V Ir Nob. dolore hypochondrii dextri per plures annos constitutus fuit, cum ventriculi & diaphragmatis compressione. Initio, cum degeret in agro Pictaviensi, hic dolor pro colico, huic regioni vernaculo à Medicis judicatus fuit. Ex remediis parum utilitatis habuit: postea Lutetiam se contulit, celebriorisque urbis Medicos advocavit, quorum judicio abscessus in Hepate genitus dicebatur, variæque absque emolumento exhibita: Ego sub finem morbi & vitæ vocatus, inveni ipsum gravi Dyspnoea laborentem, & dolore hujus lateris & abdominis ita vexatum & compressum, ut neque in dorsum nec in latus posset recumbere, sed cogeretur residere in lecto, & pro doloris gravitate & vehementia ipse disrumpi sibi videbatur, tandem atrocibus hisce doloribus confectus extremum obiit diem.

Aperto cadavere Hepar magnum multis abscessibus repletum inventum est, & materia quadam indurata, vitellioque ovorum colore referente repletum. Pancreas erat admodum ingens: Ren erat laxatus & è suo loco dimotus, propellente scilicet ipsum panatim deorsum Pancreate. *Casserus Observ. x.*

S C H O L I A.

Materia vitellus ovorum colore referente) Vitellina erat bilis à calore exsiccata: Vitellum est cum morbus ab initio pro colico habitus & curatus sit, in usum ducta fuisse remedia calefacientia, qualia ad ejusmodi morbum, pituitæ & sanguinis fere lobulæ, ut suspantur: Ab his bilem in jecore hospitantem incanduisse & dolorum maximam partem induxisse, novam genitum, &c.

Ren erat laxatus) Fr. Pédemontanus, qui consuevit Geubadium, i. e. Practicam Meluati, mentionem facit dissolutionis Renum & vesicæ; atque remedia proponit ad

corationem ejusmodi morborum. Verum quidem est laxari Renum, sed dubitant de vesica, quæ firmior affixa est & inclusa duplicato peritoneo: Causa luxationis Renis potest esse vii lenis & diuturna trahit, quæ percutit exagitant Diaphragma, ejus entremittit, quibus incumbunt Renes, possunt Renem aliter utrumque sua sede dimovere. Ren dexter magis obnoxius est luxationi, quia macrior ob viciniam jecoris, liquata progredire, quæ ipsum intus glomeris lumbis affigit, facilius derohitur. *Rosalanus Andropag. lib. 1. cap. 26.*

OBSERVATIO CLIII.

Dyspnoea ob tumorem Hepatis scirrhosum, & Lienem in tabum resolutum.

Lædi potest Respiratio ab alterutro viscere, aut utroque, in insignem tumorem elato: juxta illud Hippocratis, *Orthopnoeam inferunt hydropici affellus duri*. Coacar. sect. 2. l. 1. §. 29. ut hoc tempore vidimus in studioso quodam, Israele l'Alman, qui à quatuor mensibus insigni tumore inflammatorio Hepatis oppressus, cathedræ toto eo tempore insidere & indormire coactus, interit nuper, cujus Parens simili orthopnoea triennio ante jugulatus est.

In cujus cadavere Hepar scirrhosum valde inventum, una cum liene in tabum versio. C. Piso de morbis à sero Sect. 3. cap. 4.

S C H O L I A.

Insigni tumore) Hoc exemplo utitur Extell. Th. Bartholindus, Tract. de valis Lacteis cap. 19. probaturus tufoacilonem, sive orthopnoeam sæpe induci, delato universo chylo ad thoracem per novos Ductus thoracicos, quia hujus commentus ad hepar ob illius affectus p. n. interceptatur: quo in casu vitam & sanguinis munia supplete & præstare eos statuit, sed quia solum nequeat hepatis auxilio destitutum, perire ho-

minem: Hujus læsæ respirationis causa vulgo assignatur tumido viceri, diaphragmatis liberum motum impediens: Sed & alius illius affectionibus, citra tumorem, ut scirrho, coarctationi &c. succedisse fidem faciunt plurima exempla: Hinc recte colligit Vir Illustr. orthopnoeam illam æreosæ affluvi chylo, pulmooisq; eo transitu afficienti, adhibendam esse.

OBSERVATIO CLIV.

Asthma ab abscessu juxta lienem genito.

Nobilis vidua per multos annos pedem graviter ulceratum & fontanellam etiam in altero habuit, horum diuturna molestia defessa, per Chirurgum, dissuadente me; consolidari tamen & ad cicatricem perducere curavit, quo facto, statim spirandi difficultas occupat, appetitu edendi non dejecto, imo ipsa dicente, jam vegetiori reddito ita ut desiderio indulgere, ob asthma, nunquam audeat, Tandem facies & manus extremæ, cum abdomine atque pedibus, ob humores stagnantes, & exitum amplius non habentes, intumuerunt, & asthmate aucto, viribus diuturnitate fractis & attritis, vitam naturæ reddidit.

In hujus post mortem latere sinistro, ad lienis situm, abscessus, quem omnium cum admiratione, occultum habuerat, apertus inventus est, ex quo, defuncta jam ipsa, magnam foetidissimæ fauci copiam effluxisse mihi relatum: Hinc patet ulcera diuturna, aut abscessus, in quos natura se exonerat, caute tractandos esse, nisi in aliud tristius discrimen se conjiceret quis velit. Greg. Horslius Obscrv. xv. lib. ix.

S C H O L I A.

Considerari) Hippoc. 6. Epid. sect. 3. tit. 28. vetæ abscessus, qui alioque affectum medela sunt curari, in quem locum commentarius Vallesii memoria tenendum: Definitio autem, horum abscessuum diuturnitas est, sunt enim diuturni, quod natura jam consuetudinem eo mittendi comparaverit: Igitur in omni diuturno abscessu, sive sit cum evacuatione; ut ulcus, fistula aut hæmorrhoidis. Sive etiam sine ea, ut vetus podagra, videndum quomodo cures. Plurimi enim eorum qui tali morbo multis jam annis labora-

runt, solent in nephritidem aut asthma, aut etiam aliquam apoplecticarum passionum incidere: ut contra multa fieri vidi ex Epilepsia, aut alio cerebri morbo magno, nephritidem, & ex hac podagram. Tale igitur abscessus, cum jam sunt inveterati, etiam cum evacuatione non sunt, dico esse aliorum morborum medelam, ut fistulas: quare sæpe curari prohibeo, aliquando etiam fieri suadeo, juxta præceptum Hippocratis, Quibus in morbis facti decubitus liberant, eosdem si ante sunt, prohibent.

OBSERVATIO CLV.

Dyspnoea à variis Hepatis & Lienis vitis.

Instrumata respirationis moventia aliquando impediuntur ab externo corpore, ut hepate p. n. diaphragmati agglutinato: hinc retardantur in suo motu, ut nos vidimus non semel, & nuper in Nobili juvene & Religioso ex familia de Pouly. Car. Piso de morbis à sero Sect. 3. cap. 4.

Bimulus Princeps defunctus 26. Julii 1676. Hepar illi valde durum, albicans, inusitaturæ magnitudinis. Præterea undique angustum & arctæ costis spuris & diaphragmati accretum: hinc facile colligi potuit unde difficilis Respiratio orta. In Aliis Medicis Th. Bartholini Ann. 1674. 75. 56.

§. 3. Puella in hæticam incidit cum tussicula, Anhelitus difficultate. Hepar mediante

Pp 3 mmeriz

materia gypsea tam tenaciter diaphragmati adnarum erat, vix ut avelli posset. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 4. Mastoma semper conquesta de difficili respirazione. Hepar pendebat libras xxiii. Duo tumores faxei pendebant ab ejus suspensorio. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 5. Cuidam dolor & tumor in hypochondrio dextro cum Dyspnoea. Inventus ingens abscessus in Jecore, unde pus venæ cavæ et arum superiorem subiecit & thoracem. *Vide lib. 3. tit. de Hypoch. dolore.*

§. 6. Cuidam aderat febris, pulsus durus, Dyspnoea, & dolor in superiore parte thoracis: Vomica in Hepate, cum maxima puris coacervatione inventa. *Vide tit. de Lateris dolore.*

§. 7. Dom. Pensio magnus erat abdominis tumor cum anhelitus difficultate, &c. Aperto abdomine prodiit Lien maximus, latissimus, ita ut totum impleat abdomen: Jecur valde durum, obitruum, pendens libras xi. &c. *Vide lib. 3. c. de ventris tumoribus.*

§. 8. Vir sinistri lateris tumore & dolore diu cruciatus fuit: Lien insolite molis adhærebat diaphragmati firmissime, unde Spirandi difficultas quam ambulaturus fuerat expertus. *Vide lib. 3. Tit. de Hypochond. dolore.*

§. 9. Larus sinistrum deciduo ex loco superiore lapsu affixerat Th. Iohannis, &c. Extrinsecus illæsum in tumorem assurgit, &c. Accedebat anhelandi difficultas quam rebantur alterius morbi sobolem, &c. Unica tor malorum causa fuit Lien isto lapsu latus, qui præter modum induruerat, & magnitudine diaphragma premens, dyspnoeam induxerat. *Videl. 3. Tit. de Hypochondr. Tumoribus.*

S C H O L I A.

Respirationem lædi à rumente Liene, pondere suo te vocat *Molim in Medic. Physiol. cap. 17. §. 17;* diaphragmatis, cui alligatur, motum impediens.

§. 10. Mulierem diu fatigavit Dyspnoea, cum abdominis mole: Aquarum stoffæ xv. educuntur, invenitque Hepar xxiii. libras ponderans, scirrhusum. *Videl. 3. tit. de ventris Tumoribus.*

OBSERVATIO CLVI.

Dyspnoea ab insigni Mesenterii tumore, in quo plures vesiculae, Jecore magno septo accreto, &c.

Filia N. dissecta ostendit in mesenterio insignem tumorem ponderis lib. xx. interius referto pluribus vesiculis limpida aqua distentis, &c. Integro triennio vix unquam spiritum libere duxerat; sive ob copiam aquæ, sive ob jecur diaphragmati onerosum & illi firmiter accretum. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

OBSERVATIO CLVII.

Dyspnoea producta à variis Mesenterii vitiis.

§. 1. Mesenterii glandulam offendit Fabr. Bartoletus in muliere, quam plures annos gesserat; unde Dyspnoea, retracto per ventricululum diaphragmate: mirum *ad idem* haud interceptam fuisse. *Ioh. Rhodius cent. 2. Observ. 29.*

S C H O L I A.

Mesenterium) Ea glandula ab Asellio Pancreas vocatur, ex qua venarum lactearum originem deducit, quæ ibi in unum omnes coeunt, indeque cum salsum cum doctum ad hepatis portam: vera mirum anastotin ideo non fuisse impediam, neque atrophiam sequutam; Sed chyli Receptaculo, Ductuque chyliifero illatis, chyli distributio illac coeamus habuit.

§. 2. In Asthmatico crebra & per intervalla anhelosa respirazione affecto, tam gravi insultu ut sæpe *apnoeum* sederet, in paroxysmo mortuo, nullum in pulmonibus viciu, sed in Mesenterio magnarum glandularum copiam inveni, argumento evidenti non omnia asthmata à destitutionibus in pulmonem, sed sæpe vaporibus solis ex hypochondriis ascendentibus oriri. *Guern. Ralsinkus Dissert. Ann. lib. 1. cap. 13.*

§. 3. Quidam cum ventris tumore querebatur de difficili Respirazione. Aperto abdomine ingens moles, pinguedinem in superficie referens se exhibuit, totum fere mesenterii spatium occupans. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 4. Isabel-

§. 4. Isabella N. abdomen in tumorem sensim ac sine sensu incrementum cepit: Respirationi illi erat difficilis &c. Mesenterium totum, atque in mesenterio Pancreas, tumore miro & incredibili turgens animadvertimus &c. suberant infiniti in eo abscessus &c. Respirationi ob septi compressionem difficilis erat, &c. *Vide l. 3. tit. de ventris Tumoribus.*

OBSERVATIO CLVIII.

Dyspnoea inducitur à variis Omenti affectibus.

§. 1. **D**yspnoeam in muliere deprehendit Fabricius Bartoletus ab *Omenti pinguedine* septum transversum comprimente: Dissidentibus Medicis, qui pulmonum hydropem adesse cogitabant. *Rhodius cent. 2. Observ. 24.*

S C H O L I A.

1. **O**menti.) Omentum membrana est pinguedine in obliquo copiose perfusa, venterculo circa fundum conjuncta: Quousque se demittit in vivo corpore varie disceperat; anteaque pinguedinis mole ponderosum redditum, potius infra tendit quam ascendit: hinc in mulieribus utero pressio sterilitatem aliquando invehit: Si ergo adipis copioso perfusum Dyspnoeam peperit, id contingit à compellio venterculo, qui insimul compulsi diaphragma oppellit, liberumque motum impedit.

2. *Dissidentibus Medicis.*) Difficultatem spirandi non solis spirabilibus organis affectis imputandum esse, quod quibundam visum, sed & à partium imo ventre concluditur vitio pendere ostendit Galenus cap. 12. lib. 2. de Difficili respir. Perspicuum est, aut, quod venterculus, peritonaeum, splen, hepar, alvus, superiora tenuia intestina, & masculi praecordiorum in magnis thoracis moribus dolores vexantur, minus in parvis: Ob id parvus & densus, non solum in pleuritidis, sed in venterculi doloribus & totius ventris spiritus erit: Consimiliter respirabit qui hepar, aut splenem, aut aliquod ex eis membris affectum habebunt: Omnia enim talia partium appendia, partim agnata, Respirationis instrumenta ad hunc motum commoventur: *Mallem Galen.* Quae videae notanda sunt, fere enim omnes cum difficultem respirationem vident, acculant pulmones, cum sepe viciam in imo ventre residet, & tunc est adminiculandum partibus in eo contentis relicto thorace.

§. 2. Ego vidi Omentum carnosum, seu potius glandulosum, semipollicaris crassitie, à virgine cachectica exsectum, (*Vide lib. 3. tit. de Cachexia.*) Abdomen circa regionem umbilicalem duriusculum & subtumidum apparerat: paulo post tussicula cum Spirandi difficultate oborta est &c.

§. 3. Uxori N. ejusmodi erat ventris tumor ut ascitem mentiretur, cum compressione pectoris ac diaphragmatis &c. Aperto abdomine intestina juxta dextrum latus ascendentia occurrebant; quibus remotis Tumor ingens, totam capacitatem infimi ventris complens, occurrit, Exemptus pendebat libras lvj. &c. *Vide l. 3. tit. de ventris Tumor.*

OBSERVATIO CLIX.

Orthopnoea à Rene purulenta.

Nicola Honorata cum febre lenta laboravisset, & bene cœnavisset, cepit brevi spirare & frequenter. Ista respiratione mansit donec expiraret: Retulimus ad ventrem inferiorem malum, non ad pulmonem, alii contra.

Aperto cadavere repertus est Ren dexter purulentus: unde credibile à maligno vapore hanc orthopnoeam siccam inductam fuisse: Incredibile enim qualia symptomata afferat aura venenata à pure traducta: Porro huic puellae pulmones erant integri: aliquantula pars adhaescebat costis, sed id non erat *abscessus*: *Gal. Ballonius Epid. & Ephem lib. 15. pag. 497.*

S C H O L I A.

Hispanus, Nicolaus Honoratus, Nicolaus Du Buisson, nepos uxoris Gilberti, interiere pene morbo consimili: Omnibus Medicis negotium dedit: imo ausum afferere morbum non intellexisse: Difficultas erat spirandi summa, spiritus frequens & parvus ad mortem usque, in siccio velut spirare videbantur: nec rullis nec spiritum, spiritum ne ad momentum cohibere poterant: erectio paulum corpore in frequens & parvum spirabant: febri non erat magna nec quæ istam respirationem requireret: Medici accusabant pulmonem, alii cancerum esse putabant, alii inflammationem, aut phlogosin pulmonis: Quod non erat credibile, cum febris non esset, saltem commemorabilis: nec phlebotomia, nec subductio alvi juvit: Nicolaus Du Buisson sic ut superius, (Nicolaus Honoratus) interit: A venena aut a credibile quoque istud factum: Nam huic per anapnoe 15, aut 16. familiaris erat excretio puulenta per urethram: a reobus id erat, minus æquo excretum est: Dolor colicus ortus, deinde difficultas spirandi

sine tussi aut aliquo consimili symptoma, mors: An colicis doloribus & tetræ anarhythmia hæc succedere possit dyspnœa, quæri potest: Nos id deicimus & animadvertimus prædictis exemplis: Porro tam affectionem dubitamus an vocare jure possimus orthopnoeam siccam, an sanguiugum? orthopnoeam siccam, quia videbatur aliquid affine habere ei affectui quem Hippoc. vocat orthopnoeam siccam parte paræ at. lib. 4. acut. Galenus vocari putat eam dyspnœam quæ sine spiritus, vel eductione per tussim ulque eo vehementer est, ut inclinari, citra suffocacionem, qui ita affectus est non possit: hæc autem à spirituum interceptione fit: meminit autem inflammationum hypochondriacum, quod horum affectio eam affectionem inducere possit: Vel Sanguiugum vocabamus, Gordonium imitari: Porro Sanguiugum est difficultas anhelus, cum aliquis non potest expellere aerem p. ut tanto, quia p. claus & canna non possunt constringi sufficiens, sibi retinentur summoz superfluitates. *Idem. Epid. lib. ij. pag. 157.*

OBSERVATIO CLX.

Orthopnoea à Calculis renes obfidentibus, & contorsione Spinae dorsi.

Illustr. Virgo annorum circiter xxx. optimo corporis habitu, sed paululum gibbosa, ex subotto in proprio conclavi igne ira perterrita fuit, ut menses ab eo tempore non amplius fluxerint: interea utcumque se habuit, nisi quod aliquando de difficultate respirandi, nec non dorsi dolore conqueretur, cujus nomine varia tentata remedia: Elapsis veto sedecim annis, computatione à retentione menstruum facta, prædicti dolores magis magisque intenderunt, ut mors tandem subsequenda sit.

Corpus cum condierimus, spinam dorsi instar majusculæ literæ S. Binos etiam lapides in sinistro rene invenî. *Hildanus cent. vj. Obs. cxiij. ex communis. Luca tussî.*

S C H O L I A.

Respiciendi difficultatis causa non semper in pulmonibus & thorace latet, emetiturque & incitenter multi illuc recurrunt, cum tæpe aut hepar tumens, aut hypochondriaca affectio, aut affectus renalis, aut vitium nervorum à spinæ medulla derivatorum ortum præbeat: Rationem autem reddere cur affecti renes pneumatica instrumenta in consensum trahant, dyspnœamque inducant, etsi non adeo facile sit, Experientia tamen testificari solus est, ubi corporum illi pathemati obnoxiorum aspectu non aliam exhibuit causam, ut patet ex allato exemplo, Et curatio instituta per Renum meorum *ingressum*, respiciendi libertatem testificat, testibus *Baldono & Dodoneo*: Ille consilio alvj. lib. 1. Quidam, inquit orthopnoea laborare videbatur, unde gravissime haberet, Nonnulla erat suspicio affecti pulmonis, non tamen certa erat argumenta quibus apparet vitium in pulmonibus conceptum: ut tamen cum orthopnoea ac anhelosus maneret, quæritur quæ illius difficultatis causa esset: multa ad ungum pertractatis, in eam ventum est tandem opinioem, ut nil tale in pulmonibus consistere crederetur quod eam difficultatem foret: Sed ut plerique sunt aliis oculatores, dictum est suspicionem magnam esse calculi in renibus, quod cum contingeret, aliquarum singularis spirandi species apparet potest: consilium, rebus est, deturbatis remediis conveniuntibus calculis, libertas respirationis est restituta: Causam autem epi rei esse voluit, quod nervulus est à lexi conjugatione pervadens diapragma, & ad renes usque perterritus, qui oppressus, ac in opposito femore illovis sensum tollit, ita in partibus superis difficultatem nonnullam

respirationis afferre potest, nam renes ambigunt inter partes superas atque inferiores: Et nos vidimus mulieres aliquot & viros, quibus familiaris renum dolor est, gravis & pungens, qui sæpe conqueruntur de dolore lateris, ac si plenitudo aliqua nothas costas occuparet, cum tamen nil sit tale, led ob obfidentem renem à calculo, aut ejusdem oppressionem ab aliquate obstruente, ratione nervi implantis in totum corpus, idem sit quod & in lienis & hepatis tumore aut obstruente, nam circum clavículas dolorem sentiunt tenuium: Quærit quis, cur uno id in omnibus calculosis contingit, aut quibus præpediti sunt renes? Non est necesse, nam levis insignioris suoz nervi in aliis atque in aliis, ac errore quodam naturæ in eam eodem partis alicuius insensum, in qua sensus viger magis, ac consensus major est cum partibus vicinis: Nec enim quibusvisque contentis in capacitate renis lapillus est, is obiectum oppositorumque femur stupet, tametsi stuporem tanquam *ovine cordis* lapidis in rene controci consilium Hippocraticum, *Hæc Baldoni: Dodoneo* autem Observ. xx. ait mei catorem, etiam juvenem, Orthopnoea contortum, nullo fructu omnia remedia admittisse, tandem calculi in renibus doloribus ac podagra correptum, ab effluu libetum factum, qui ante in sedili tantum formum capere di buera: Sed præter rationem à *Baldono* allatam, ex nervorum consortio delumptam, altera à Renum officio afferenda, quod est sensum à sanguine segregare: hoc si calculo præpediti, vel aliter non sanguantur, redundans serum ad pulmones dyspnœam facile inducit, Vide *Vide Joh. Rhodum præf. ij. Observ. xxxij.*

OBSERVATIO CLXI.

Dyspnoea ob Renes Iecori affixos.

Renes ambos Jecori affixos vidi: Aeger de pectoris angore & spiritus impeditio-
ne subinde conquerebatur. *Vide tit. de Pothisi.* In pulmonibus, corde, thorace, nihil vitii:
Valde sitiens hauserat poculum vino frigidioris plenum.

OBSERVATIO CLXII.

Orthopnoea ab immensi Renis unius tumore excitata.

Intercepti potest Respiratio compresso Diaphragmate, una cum intestinis, ab immensi
Renis alterius tumore, ut in Elizabetha Des-Bordes, uxore Panatii Principis. *Cor-
pifi de morbis ab illuvie serosa sect. 1. cap. 4.*

OBSERVATIO CLXIII.

Dyspnoea à massa carnea crinita & aqua ingenti copia in abdomine.

VXoti N. abdomen in insignem protuberantiam assurgebat, adeo ut præ pondere vix
incederet cum difficili anhelitu &c. Aperto abdomine lxxiv. aquæ prodierunt; In-
natabat dictæ aquæ folliculus crinitus admirandæ formæ & magnitudinis. *Vide l. 3. tit.
de ventris Tumoribus.*

OBSERVATIO CLIV.

*Asthma convulsivum in occipite, juxta nervorum origines, causam habens,
colluviem scilicet serosam.*

Asthmatis convulsivi causam nonnunquam in occipite juxta nervorum origines
consistere, per Observationes Anatomicas plane deteximus, nimirum adverti quos-
dam ægrotantes, qui cum ab aliis morbis deploratis decumbentes insuper Asthmatici
fierent, necessum habuerunt intra lectum aut cathedram cum capite semper erecto aut
prono detineri: reclinari autem aut supinati, statim anhell, ac velut moribundi difficul-
tissime respirabant, cujus causa (*prout per dissectionem apparuit postquam obierunt*) tantum erat,
quod cum intra cerebri cavitates feri acris colluvies ingens aggereretur, si ob caput re-
clinatum, illa in nervorum octavi paris originem recideret, illico præcordia, ac imprimis
spirabilia spasms horrendis tentabantur: Porro interdum ob hanc rationem videretur
esse quod orthopnoici in lecto absque suffocationis periculo decumbere nequeunt, quin
corpore erecto sedere cogantur.

S C H O L I A.

Asthma (quod ob peculiare interdum symptoma etiam orthopnoea dicitur) describi potest quod
fit Respiratio difficilis, crebra & anhelosa, cum magna pectoris agitatione, & plerumque circa febrem:
Respiratio actus dependet, Tum à pulmone mo-
vendo, cujus conformatio ejusmodi esse debet, ut
ductus ejus & meatus omnes, pro aëre libere inspi-
rando & expirando semper pateant: Tum à parvis
sive organis ipsum moventibus, quæ per abrenas
fistulas & ductus vices, pectoris cavitatem, & con-
sequenter ipsos pulmones dilatai & contrahi faciunt:
Cum inque plures & diversæmodi sint efficiendi ra-
tiones quibus Respiratio laeditur, ad binas hæc capi-
tæ ferre omnes reduci possint, nempe quod vitium sit,
vel in *Pulmone movendo*, vel in *Parvis* sive instrumen-
tis quæ ipsum movere debent: Atque hinc morbi
istius differentie & species optime designantur. Nam
juxta variam causæ morbiicæ naturam & finem
Asthma dicatur, vel mere *Pulmonum*, omnino à du-
ctibus aëris obsistis, aut non facis potentibus
procedens: vel mere *convulsivum*, quod tantummodo
ob defectum, aut culpam in organis moventibus
vel *mutum*, quando utraq; partes in vicio conspi-
rant, cujusmodi originem Asthma quodvis immane
& inveteratum habere solet: Super his singulis or-

dine dicemus, & primo Medici veteres, & plerique
adhuc moderni, primam solummodo Asthmatis
speciem agnovere, morbi hujus causam usque proximi-
mam, & fere unicam, stauentes Bronchiorum angustiam:
videl. quod ductuum illorum spatii vel per
obstructionem, vel per compressionem coarctata,
quoties respirationis usus augeatur, aërem in copia
satis idonea non admittant: quæ ob plenioram
aëris quantum opus est ~~intra~~ respirationis organa
nibus creberrime repetitis difficillimè laborant:
Quod autem nonnulli, sine manifesta pulmonum
labe, paroxysmis asthmaticis obnoxii reperiuntur, totum
hoc vaporibus à liene, utero, mesenterio, aut
alio quodam viscere satis immerito adscribi solebat:
at vero pathema istud, absque bronchiorum angustia,
aut viscerum istorum culpa, à parvum motuum
spasms oculi alibi vicinis, & mox clare ostende-
ant: Bronchiorum angustia, primam Asthmatis
speciem inducens, per *obstructionem* fieri supponit, quo-
ties aut humores crassi & viscosi, vel materies puru-
lenta, vel sanguis extravasatus iis impinguntur, aut
tubercula, scirchi vel calculi eorum ductibus inside-
bunt: vel denique humoris serosi catarrhus in eos
confestim dephuet: Porro idem affectus per *compressi-
onem* excitari putatur, quoties ejusmodi (cujusque
istorum

illorum generis) materies arteria: aut venæ pneumonica ductibus inhærebit: Profecto à variis hæc causis & efficiendi modis diarrhæis asthmaica dependet: verum morbi insulsi quique, aut saltem paroxysmi majores, propter accidentia quadam, aut occasiones excitari solent: quippe dum sanguinis citius dimissus, & leniter decurrens, respiracione modica contentus esse potest, præcordia sine magno pulmonis aut pectoris labore pertransit: Si vero iste effectus, & pulmones impetuosius trahantur, plenioris aëris inspiracionem desiderat, propter hunc per vias angustas admitendum, organa pneumonica statim omnia in nexus erceterimos accipiunt: Quicquid igitur sanguinem efferefaciat, inque organum concitat, ut motus violentus corporis aut animi, frigoris aut caloris externi excessus, vini potus, ventus, quinimo interdum merus lecti calor, in prædispositis insulsi asthmaici accedit: Usuratum est huic morbo obnoxios, sæpe lectum ingredi non ausos, tunc immo dum in cathedra, aut super cubili vestibus induror dormire posse: Cujus ratio est, quod corpore stragulis cooperto & conchæ sado, sanguis proinde in mutum penulo citacionem concitus & servicens, uberoiem aëris inspiracionem requirit, quam per tracheæ ductus coarctatos supplere queat: nam quo plus sanguinis quaque hyoles & distolles vice pulmones trahit, eo propter accensionem, similique eventilationem ejus, æt copiosius & celerius fugeri recteque debet: cum penso (cum propter impedimenta non facile absolviatur) tamen quomodo peragendo, pariter omnium respiracioni dicatarum, cum magna totius pectoris contentione, conatus ulimi exerantur: Porro sanguis agnatus, in prædispositis non tantum asthmaici occasio, sed aliquatenus etiam causa existit, nam proinde vasa sanguinea intra pulmones magis impleta & dilata, ductus tracheales jamjam angustos comprimunt & multo altiores reddunt.

2. Asthma Convulsivum (quod secundum hujus morbi speciem esse, & sine magna bronchionum obstruccione, aut compressione, à meris fibrarum motuum ipsarum excitari statimur) non uni loco, aut peculiari cuiquam organo limitatur, sed ubique valde diffusum, ad partes itæ omnes respiracioni dicatas (quantum modo hæc modo illa, vel alia in culpa est) extenditur: Enimvero affectio (pulmodica insulsum asthmaicum citius, ad vasorum pulmonarium fibrarum motrices, aut diaphragma, ad musculos pectoris, aut nervos, qui è pectoris aut pulmonis ditine sunt, quinimo ad nervorum illorum origines intra hypochondria confusus spectat, atque singulis hæc in locis dum morbosica moribifica holpiatur, respiracionis opus inhibens aut pervertens, morbi illius paroxysmi insensit: quippe spiritus animales, ad respiracionis munus destinati, si quando valde molestantur, inque motus irregulares urgentur, organorum spirabilium fibrarum necesse tum motrices inordinate subunt, eisdemque proinde irregulariter modo conetahi, modo dilata, necnon solennes & equabiles systoles & distolles vice vixit perorbant aut impedit faciunt. Causa moribifica, sive materies spiritus, opert pneumonico accinctos irritans, cum variis in locis, nam præcipue in his tribus vim suam exercere solet, videl. primò ut in ipsa fibrarum muscularibus, aut secundo in ramis vel propagibus nervis, vel tertio denique intra hypochondria nervorum origines: 1. Quod prius, interdum materies heterogenea, & spiritibus inimica, ab insulsi in nervorum truncos effusa, exinde per eorum ductus & propagines, si fæcis in quantitate peteagita fuerit, abique noxia magna, aut multum

sensibili, in finis ultimos dilabitur: Cùmque dein fibris nervis incidere, & sensum in dies aggesta demum in molem accreverit, spiritus incolæ molestare, inque ipsos asthmaicos concitare incipit: qui subinde insensit, & pro ratione consensum evidenter augentur, nec plene cessant, donec penus materie sic aggeste discitarius penitus & abluatur: & dein quando renovatus ille ad plenitudinem allurgit, morbi illius paroxysmi repetant, & proindeque, uti observavimus communi patet, læt penumio periculi calidum: Juxta hæc attendendi rationem, Asthma convulsivum causam nonnunquam in vasorum pneumoniarum tunicis muscularibus, quandoque item in septis, aut processum ejus lumbarium fibrarum delinisse merito suspicamus: si hæc multis probabile est morbi illius nidum, juxta hujus aut illius musculi p. Quævis fibrarum consistet: quæquam in totis bacis etiam ab his materiis pulmodica oblectis, dolores & ipsos leviores cū respiracione læta obortus novimus. 2. At vero (propterea alibi non tantum rationibus, sed per observaciones ægotiarum historias plane ostendimus) Asthma convulsivum sæpius inferne quoritas materies moribifica, in nervos pneumonicos delapsa, alibi intra ductus eorum, & præcipue circa ductus hæret: unde quoties ad plenitudinem aggesta discit & moveri incipit, propterea spiritus ibidem lætantes, & ad respiracionis organa allucens perturbant, inque anomaliam adiungunt, illique mos spiritus alios, fibrarum pectoralium aut pulmonarium incolas afficiunt, inque ipsos irregulares & asthmaicos excitant: Propter hæcmodi causam, & efficiendi rationem, non tantum morbi hujus insulsi, sed insuper & præcordia promde perturbant, passiones cardiacas accendi declaravimus. 3. Asthma convulsivum causam nonnunquam in occipite, juxta nervorum origines consistere per observaciones anatomicas plane deteximus &c. vide textum.

4. Quamvis nonnunquam Asthma ab initio simplex, scil. vel pneumonicum mere, vel convulsivum existat, statim postquam alteruter morbus aliquando in hæret, plerumque alterum sibi concitat: hinc ut concludere liceat, Asthma quodvis inveteratum affectionem mixtam esse, & patim pulmonis male conformari, partimque nervorum & fibrarum nervorum ad spirabilia pertinentium vitio excitari: Quippe cum ductus pneumonici à quolibet causa coarctati, vel obstruati, liberam aëris inspiracionem expiracionemque non admittunt, propterea etiam sanguis, quinimo & humor nervus à curiosis suis præpedit, atque lente procedere & stagnare coactis, facientis itas & excrementa partibus nervis affigunt, unde spirituum meatus obstruuntur, aut pervertuntur: ipsique demum labes pulmodicas accerunt: Porro sanguis, si quidem intra præcordia hæd debere insulsi aut eventilantur, tandem in crasi sua vitium, cerebro & nervolo generi succum nonnulli depravatum suppeditat, cujus delicta respiracionis organa, impute prius læta & debilitata, maxime lunt: Pariter etiam & contra recipit occur malum, quoties hæc morbus nervosi generis culpa incipit, nam quatenus pulmonum motus propter fibrarum muscularium ipsos cerebro fititior, aut impeditur, tum sanguis, tum liquor nervosus à moribus tollitur coarctat, recrementis & feculentis congeritur, eoque partibus continetibus affigunt, à quibus non tantum humores vitiosi & durum obstruuntur, sed & tumores hancque tollitior concretæ, pulmonis combustionem vitiantur, producantur. *Ubi de Phlegma. tumore. part. 2. sect. 1. cap. 11.*

Asthma ab abdita causa productum.

§. 1. **R**etulit mihi D. D. Guakherus Needham se novisse lanium, qui cum diu laboraverat asthmate periodico, intra 14. vel 20. dies, ut plurimum recurrente, tandem in ipso paroxysmo extinctus est.

Cadaver apertum exhibuit viscera omnia sana, præsertim Pulmones: neque aut *excrementis in bronchiis collectis, aut sanguinis in venis restantibus* ulla indicia prodita sunt: Hoc tantum p. n. accidit, quod vesica fellea calculos complures in se continuit: *Cætera, subdis illis, generi nervoso affecto tribuenda erant, vel causæ nobis ignotæ, certè oculis non conspicuæ: Thomas Willis Pathol. cerebri cap. xij.*

§. 2. Vir, ante hydropem, cibum sumpturus, vel cum ad somnum se componeret, summa anhelandi difficultate & suffocationi proxima concipiebatur. In nullo vitium quicquam vici notari potuit. *Videlib. 2. tit. de ventris tumore.*

S C H O L I A.

Nequè aut excrementis in bronchiis collectis, aut sanguinis in venis restantibus ulla indicia prodita sunt: Hoc tantum p. n. accidit, quod vesica fellea calculos complures in se continuit: Cætera, subdis illis, generi nervoso affecto tribuenda erant, vel causæ nobis ignotæ, certè oculis non conspicuæ: Thomas Willis Pathol. cerebri cap. xij.

Asthma hæc causam vulgares Medici nullam fore aliam præter fluxionem à capite agnoscent: Interdum ratione ducti ab humoribus crudis & ferros, à venoso genere, per arteriam venotant in pulmonem translati substantiam, vel in laves arterias, endæsthma ipsum generetur, ostendit *Pyth. lib. de morbis à colluvie serosa, & quæ ex eo Summus.* Hæc species Dyspnoæ confirmatur primo ex stertoris absentia, secundo ex urinarum conditione, quæ in paroxysmo redditur turbida & crassa sunt, à crassorum & crudorum humorum parte ad vasa urinaria delatione: Denum asthmaticorum nonnulli stranguriam obnoxii sunt, quæ dum urgentur, respiratio illis inculcata est: recedente vero asthmate, vicissim urinæ libertas restituitur, pro varia humorum in venis contentorum hac vel illac meritali: Adde indicium à juvenibus & lætulentibus, In ea enim dyspnoæ specie quæ stertoris est experta, adeo utilis est v. t. ut ea in paroxysmo facta, ubi primum sanguis fluere incipit, respirandi libertas statim accedat, eique peracta ægi omnino liberi conspiciantur: Comes præterea huiusmodi dyspnoæ est cachexia, pedumque oedematosis tumor, unde colligendum materiam vasis contineri ac ab hepate præstet: Harverian ex principiis, deferuntur humores & vapores crudi, cum testis sanguine, in dextrum sinum cordis, ex eo in pulmonem vasa & parenchyma, ibique firmati bronchia asperæ arteriæ comprimunt: Qui transitum per parenchyma non admittunt, in levium arteriarum repletionem acquirunt: Detectio vasorum lymphaticorum locum hic forte tenuerit: Eorum usus precipuus est. 1. Ut nutriendas partes onere inutilis sibi aque levaret. 2. Ut aquam alius partibus certis in fines apponeret, in primis cordi, sive ad sanguinem, alioquin crassorem, nonnulli diluendum, sive calidiorum temperandum, sive ad sanguinis contractionem promovendam: His obstructis in pulmonibus, coëscerent lymphæ, quæ compressione bronchiorum dyspnoeam inducit: Si præ plenitudine ea dehiscant, in ipsa irruptione in pulmones & cavum thoracis Hydrum inducit.

Causa quæstæ aut oculis non conspicua. ¶ Ut cum majores præsertim nervi lepi, à dorsali medulla progressus deflexionibus aut aliis morbis separati & solliciti infestati, dyspnoeas quandam patiunt, qualem in asthmaticis, nullis illis pulmonum affectionum indicibus apparentibus, continuo ægrotos infestare observamus. *Placitum Prænot. part. 2. lib. 1. cap. 4.* Huc refert Asthma illud Scorbaticum quod periodice ægros

affligit, & nonnunquam locutos jugulat, qui accidit quia spiritus ligantur & eorum intus in organa respirationis impeditur; Remedia ex arte exhibitia sapientius eludit, sed præ cæteris valet extractum croci ipsius, in aqua appropriata dissolutum & per intervalla exhibitum; ideo juvenis quæ crocus insignis est restitutus caloris nacti: *Thom. Bartheolin in Aduers. anni 1671.*

Generi nervoso affectu. Dyspnoæ scorbaticæ interdum à nervi generis culpa procedit: postquam enim labes morbida cerebrum ac apud nervos occupavit, particula heterogenea ab hypnoso dimissa, uti nervos alios, ita pneumonicos aliquos affinet, scilicet diaphragmatis & muscularum pectoris morali interveniens crebro subeat: proindeque intra quod nervi illi à munis rice deflagrantis aut inhibetur aut pervertuntur, respiratio difficilis varil generis producit, estque ut plurimum aut paralytica aut convulsiva: tenent particula moribunde caudices nervos subeunt, & circa eorundem utras, aut extenuatas uberius congelat, spirituum copias affigunt: hinc aliquando accidit à tali particula (si forsan illa narcotice faciat) coactione, spiritus quorundam nervorum incolas ligari profus, & ab actibus designatis inhiberi, node respiratione impedita, cæteri ipsius nervorum adhuc immunitum hospites, ut ipsi proprio matre penum commune perstent, valde cærentur, adeoque quæ licet respirationem magis ciebram & laboriosam edunt: quandoque vero spiritus, intra quosdam ex respirationis munere nervos scærentes, copula heterogenea explosiva, sive spasmodica afficiuntur, cujus elidendi gratia, cum illi ob plenitudinem, vel propter occasionem aliquam eaciantur, motus convulsivos insunt, proindeque pulmones cum laboriosis & cæbris repetitis, modo systoles modo diastoles vicibus, paroxysmis quasi asthmaticis deinentur: In his casibus quandoque nervi diaphragmatis, interdum pneumonicis ac pectoris motus abolventes, item forsan aliquando bronchia amplectentes, ac illorum modo hi, modo illi, foras à reliquis, aut narcotici, aut affectionibus spasmodicis obnoxii sunt, ac propterea respirationis anomalæ variz differentiz ac modi occurrunt: Euglenus, Morisius & Sennertus dyspnoæ scorbaticæ causam à visceribus imo ventris intus aut tunc factis, proindeque sepeum comprimentibus deducunt, non secus ac in gravidis de hydropicis fieri docuit: ac hæc opinio non admetenda, quia symptoma illud non raro ita evenit quibus venter & hypochondria læta mollia ac infra costas sub-

stentia,

silentia, spatium pro sepi motu suis liberum concedunt: Quod anem lienis perturbationi respiratio difficilis patim in hypochondiacis, & quandoque fortan in leucobacis succedit, ratio est, quia nervi splenici cum pneumonicis communicant; quandoquidem igitur utrique materia morbida sc. spasmotica obducitur, eadem in alterutris commota spal-

mos clem, alteros in affectus consensum trahit, prout de passionibus hypochondiacis differens declaravi in omni dyspnoea, ob nervosi generis culpam excitata, pulsus ut plurimum satis fortis ac d. b. h. celerior, ac interdum intermitiens exiit, *Thomas Willis Tract. de Sanguine capite tertio.*

OBSERVATIO CLXVI.

Dyspnoea à pulmonum defectu, & humore lacteo in cavitate thoracis.

Retulit mihi Joh. Baptista D. M. se subiectum vidisse cui decrant ambo pulmones, ut utrinque quid potius substantiæ pulmonum analogum videretur: In cujus thorace stagnabat aqua veluti lactea, quæ tamen non erat ex empyemate pus verum. *Fabritius de diff. respir. p. 3. c. 3.*

SCHOLIA.

Aqua veluti lactea.) Chylum arbitrari fuisse Cl. à discepto vel hiant. Ductu chyliero thoracem per-

OBSERVATIO CLXVII.

Lobus unus pulmonum potest deficere vita superstita.

Quia lobus pulmonis sinister maior dextro est, propter sinistri ventriculi cordis non tantum eventationem, verum propter fuliginum receptionem, ob id potest animal abique lobo dextro vivere: quod bis est à me observatum in cadaveribus hominum qui inuncti fuerunt propter Venereum morbum, erat enim absumptus in his lobus dexter pulmonum usque ad bronchia; Et hoc à viris gravissimis, ut ab Excell. Brasavola fuit sancitum: *Hippolitus Boschi de Facult. Anat. Lect. 4. p. 40.*

§. 2. Anno 1623. Franc. Plazxonus secuit eanem cui sinister pulmo globulo, sauciatus plumbeo putruerat, illi dextro, cujus beneficio diu superstit. *Ioh. Rhodius cent. 2. Observat. 6.*

SCHOLIA.

Plazxonus quoque naviam Patavii medicabatur in superiore dextri pulmonis ala vulneratum, qui per tres hebdomadas cum pote ipsum pulmonis parenchyma ejecit: Ex quo tulpicus ille absumptos pulmonis lobos: Sinistri tamen usum vixit, sed cum

difficultate spiritus: Quid igitur mirum ulcera pulmonum sanari si putrida ipsorum valvula sanantur? Galenus difficultatem ostendit l. 4. c. 5. de loc. non impossibilitatem, relicto nempe callo, notante Cardano de causis, sign. loc. morbum, §. 60. idem.

§. 3. Saepe natura in formanda una corporis parte deficit, luxuriando in altera: Ita accidit cuidam Ill. Baroniæ: Ambo enim Pulmonis lobi, scil. superior atque inferior sinistri lateris defuerunt, non ex ulcere consumpti, quia cicatrices adfuerant, sed quia natura defecit in eorum productione, alio distribuendo materiam: Ventrículus magnus adfuit; Lien erat ponderis libr. vj. Intestina tantum tria apparuerunt: Natura ergo cum defecit in producendis medio pulmone, parvo epate, & brevibus intestinis, supplevit defectum in Liene.

SCHOLIA.

Hic Anatomicus campum habet quærendi quomodo circulatio sanguinis in hoc corpore fieri posuerit deficiente arteria venosa, in sinistram pulmonis lobum excurrente, cum non facile admittat septum cœdis pervium à Galeno sancitum: Sed quod

maxime consideratione dignum est, unquam spirandi difficultate fuit decens, cum pulmones obstructi eam impediant, Deficientes penitus auferant.

Anonym. de Pract. Observat. xxx. misit. cent. nov. 17.

APPENDIX I.

Asthma & dysuria reciproca, ut hac præsentē cessaret asthma, hoc urgente illa desineret.

Refert Zecchi conf. 18. Cardinalem Paleottum asthmaticum, simul ardore urinæ & difficultate laborasse, & ita quidem, ut cum urinæ ardor & difficultas urgeret, spirandi difficultas evidenter imminueretur, & rursus cum majore impetu, stranguria cessante, repeteret: Nos de his hanc ferimus sententiam, Asthma oritur ab humoribus tenuioribus qui cunctæ massæ sanguineæ insunt: ac ii de capite, qui per se plus sanguinis,

sanguinis, pluresve venæ sunt, ut tradit Hippocr. ad pulmonum venas sæpius veluntur: quare nulla tussis præcedit, sed nonnunquam quædam capitis gravedo: Per cavum asperæ arteriæ ille humor de capite non labitur: Quare frustra est *Zecchius*, causam explicaturus cur æger tussire non incipiat: Asthma finitur nonnunquam incipiente *stranguria*, ideo quod humor crassior ad renes feratur, tenuior in pulmonibus relinquatur: Et hoc quoque est quod Asthma desinat & incrementum tumore pedum, ut ego sæpius vidi, & copiosa urina, ut testatur D. Joh. Rhodius. *Schneiderus* l. 3. de Catarrh. c. 6. Vide *Sennertum* lib. 2. *Præf. qu. 45.*

APPENDIX. II.

An Homo vivere possit sine Respiratione.

Galenus 6. de loc. aff. cap. 5. scribit *Respirantem non vivere, & viventem non respirare, impossibile est*, Galeni sententiam confirmant multæ Rationes de necessitate Respirationis, & Experientia: cum in dies videamus homines respiratione privatos illico mori: Verum eadem ipsa Experientia nonnunquam contrarium quoque docuit, cum variis exemplis demonstrati possit nonnullos homines notabili temporis spatio sine ulla respiratione vivos superfuisse: nominatim in India dicuntur Urinatores illi, qui margaritas & corallia in fundo profundissimorum fluminum quatunt, plerumque per semihoram, vel diutius, sub aquis commorari posse, sine ulla respiratione.

Hujus rei ratio inquirenda restat: Galenus passim variis firmisque rationibus & argumentis, ab experientia & sensu communi desumptis, docet cordis calorem esse causam necessitatis respirationis: Quo usque enim per suum calorem cor sanguinem attenuat, & dilatum è dextro ventriculo in pulmonem impellit, necessario requiritur refrigerium, per respirationem allatum, ut calidus attenuatus in pulmonem impulsus sanguis rursus condensari, sicque è pulmone in sinistrum ventriculum delabi possit, quo refrigerio denegato, mox halituoso sanguine replentur pulmonis vascula, & seroso vapore vesiculosa substantia, nec quicquam ad sinistram cordis sinum descendit, sicque citissime suffocatur homo: Ex hoc fundamento jam sequitur alterum, scil. quoties cor nimis refrigeratum est, vel calor ejus à morbificis causis adeo oppressus, ut nullam sanguinis illapsi effervescentiam seu dilationem faciat, tunc etiam nullam respirationem necessariam esse (sublata enim causa necessitatis, tollitur necessitas) atque isto tempore hominem sine respiratione aliquandiu vivere posse: In omnibus, quæ adducuntur historiis, atque etiam ab aqua frigida sola (ut in margaritarum piscatoribus) totum corpus, ipsique simul pulmones adeo refrigerati sunt, ut illa refrigeratio aliquandiu sanguinem è corde in pulmonem, sed minus calidum, & pauciore quantitate ob totius frigus) impulsu satis refrigerare ac condensare potuerit: vel à maximo terrore & frigore simul, cor, una cum toto corpore, adeo refrigeratum & contractum est, ut fere desierit pulsare: Vel à vitiosis malignisque vaporibus aut humoribus ejus calor adeo oppressus est, ut etiam plane desierit sanguinem dilatare ac pulsatione propellere: Desinente autem propulsione sanguinis in pulmonem, non est necessaria respiratio, eaque tunc homo aliquandiu carere, & tamen vivere potest, si modo ille status non diu durer, scil. donec ipsum calidum innatum penitus exstinguatur: Sed tunc vivit homo immobilis, suisque impositus, sicut hyberno tempore vivunt muscæ, ranæ &c. quæ veluti mortuæ sine ulla respiratione latent, eo quod calor cordis oppressus & veluti extinctus sit, neque ullo refrigerio indigeat. Galenus ipse hanc difficultatem prævidens, ut ex ea se expediat, confugit ad Transpirationem, quæ fit per universi corporis poros, eamque ponit ranquam speciem minimam respirationis, seu potius ejus vicariam, quam ad vitam sustentandam sufficere posse existimat, verum hoc diverticulum non sufficit ad probationem, nam cum & humores non moventur, tunc totum Corpus illico refrigeratur, & neque halitus calidus expellitur, neque aër frigidus usque ad cor intromittitur: Itaque dicendum potius sententiam Galeni priorem veram esse de communi modo vivendi, non vero de casibus raris, in quibus res aliter contingere potest. *Diemerbroeck Anatom. lib. 2. cap. 13.*

OBSERVATIO CLXVIII.

Urinatores, & animalia amphibia, diu in aquis subvā respirazione subsistunt, quia foramen ovale per totam vitam apertum servatur.

Amphibia, quæ ad libitum suum modo in terris modo in aquis degunt, etsi constat hæc non semper nec perquamdiu subter aquas morari posse, attamen mirari subest quomodo interea respirant, nam si tracheam aperiant, aquæ statim irruentes pulmones inundabunt: Bartholinus hoc dubium facile solvit asserendo in his brutis per totam vitam foramen ovale, sicut in embryonibus, apertum servari: *Cornelius Consentinus* eodem ritu etiam in urinatoribus habere statuit, innuereque modum quo homines quicunque ad urinandum habiles fiant, nempe si dum infantes fuerint, ad plorandum sæpius irritati, spiritum diu cohibere sinantur, hinc ut necesse foret sanguinem subinde per foramen ovale trajici, & propterea coalitionem ejus impediri: At vero in Brutis istis, de tali præcordiorum conformatione periculisimè Anatomicus D. D. Gualtherus Needhamus, ambigit, eamque in nonnullis, post dissectionem indaginemque ocularem desiderat. *Th. Willis Tract. de Anima Bruti. p. 1. cap. 3.*

Ufus septi cordis est, ut per id sanguis tenuior ex dextro ventriculo in sinistrum transeat, ad vitalis sanguinis spiritusque generationem, qui postea per arterias in universum corpus distribuitur: crassior vero pars & major naturali ordinariæque via per arteriosam venam arteriæ venosæ mediantibus pulmonibus communicatur: Tenuior per septum transiens illud in transitu nutrit: Hac sola vi urinatores & suspensi aliquandiu vivunt & reviviscunt, motu pulmonum cessante. *Bartholinus Anat. Reform. lib. 2. cap. 7.*

S C H O L I A.

Foramen Ovale. In corde aliter se habent vasa dum totius in utero est, aliter cum jam in lacum editus est: Nam conjunctiones seu uniones vasorum cordis in fœtu sunt duplices: Alia si per anastomosis, alia per coalem: Per anastomosis fit unio venæ cavæ & arteriæ venosæ, sub dextra auricula prope coronariam, atqueam cava se plane in dextrum ventriculū aperiat: foramen est amplum & ovalis figuræ, cui in cavitatē arteriæ venosæ apponitur membrana pendula, tenuis & dura, forami-

ne major: Post partum aliquantulo tempore coalescit hoc foramen & exsiccat, ut locus hic nunquam pertusus fuisse poterit: Verus ejus usus est, ut partem sanguinis lo fœtu, ex cava hepatis in istum ventriculū cordis transfundat, qui ordinaria per pulmones non dilatatos nec respirantes illuc ire non potest: Ne vero sanguis in coram relabatur, prohibet membrana apposta quando coalescit. *idem ibidem cap. 8.*

APPENDIX I.

De Respiratione Urinatorum.

Foramen ovale his qui sub aqua vivunt hac ratione existimo conferre: sanguis qui à dextro cordis ventriculo in pulmones per arteriam pulmonariam propellitur, requirit in sinistrum ventriculū permeare, nisi aer arteriæ apertæ furculos inflet atque distendat: Hinc enim pulmonariæ arteriæ ramuli comprimuntur, & conclusi in his sanguis protruditur in furculos venæ pulmonariæ: ubi vero aer non potest distendere apertæ arteriæ furculos, sanguis per alios ductus ex dextro ventriculo in aortam, & ex venâ cava in sinistrum cordis ventriculū non trajecto pulmone perlabi debet: Jam cum in infans natus recens natis & fœtibus tales ductus peculiare observemus, qui pulmonum vias suppleant, quamdiu in utero hærent; in submersis vero (& urinatoribus) aer minime pulmones subire valet: Idcoque ut in animalibus utero conclusis, ita in his à suo munere pulmones vacent, admodum vero mihi simile sit per eosdem ductus, vel non satis coalescentes, vel patulos (quales in quadrimulis & quinquennibus, imo grandioribus natu pueris observantur Anatomici) motum istum sanguinis absolvi. *Martinus Fogelius in miscell. curiosis annor. 1674. 75. & 76. pag. 162.*

Offenditur (experimento facto in Cane, cui vita prorogata fuit per horam, jugi aeris per follem in ejus pulmones impulsu, etiam disruptis thorace & diaphragmate) mortem immediate non pendere à cessatione motus Pulmonum, aut ab inhibita sanguinis circulatione, sed à recentis aeris inopia.

Dominus Hook, experimenti author, Societati Regiæ relationem hanc exhibuit: Alias, ait, coram Societate experimentum à me factum in Cane, cujus vitam produxi, etiam disruptis pectoris claustris, dissecis costis & diaphragmate, imo dempro pericardio cor ambiente: Experimenti autem veritatem quod plerumque suspectam haberent, id propterea assidente Societate universa, ultimo conventu propalare volui: Privatim & publice æque ad votum successit, Effracto enim canis thorace, contractaque aspera arteria, cujus cavo tubulus follis inditus fuerat, infra epiglottidem resecta; insufflari in pulmones aërem curavi, eos sponte demum subsidere permittens, cujus reciproci motus ope animal ultra horæ spatium vivere conspexi, Confirmaturus autem ulterius meam hypothesin, in gratiam eruditorum quorundam Medicorum, motum pulmonum ad vitam omnino esse necessarium asserentium, quod præcipuum circulationis sanguinis sint organum, ideoque animal statim suffocatum iri ac pulmonum motus desicere; existimantem, Experimentum quoque sequens addidi priori, (modo nempe intermissa in pulmones canis insufflatione,) convulsionibus correpti ubi omnino illi subsidebant & quiescebant (modo reddito illis motu inspirationis follis beneficio, unde vitæ restitui illico videbatur; hæcque vicissitudine reciproca cani, vitæ per horam integram conservata) Alterum follem priori immediate conjungi curavi, machinæ interventu eam in rem à me concinnatæ, Compuncto postmodum per acutissimum scalpellum calamarium universo pulmonum ambitu, postremum follem maxima celeritate agitari jussi, cujus interventu, dum prior aëre semper plenus erat, insufflatio in pulmones assidua fiebat, unde continuo turgidi & immobiles manebant; ab indefinenti aëris in eos impulsu, & quantum illius per facta à scalpello foramina exire concedebatur: Ejusmodi insufflatione aliquandiu protracta quietus, ut ante, mansit canis, cum oculorum nitore toto eo tempore, ac regulati cordis agitatione: Desinente vero insufflatione, pulmonibus autem concidentibus & quiescentibus, illico rediere convulsionem quasi mortis proximam effect: vitæ autem restitutus est quo momento aëri recenti in pulmones regressus concessus est, ab immisso folle.

Peracto hoc experimento, lobulus pulmonum omnino resectus est, in quo liberam sanguinis circulationem deprehendere licuit, ejusque per pulmones liberam transitum, non modo quamdiu perpetuo turgidi erant, ope artificii prædicti, sed & ubi post concidentiam quiescebant: Hinc arguendum videtur, sicut simplex & solus pulmonum motus, absque novi aëris impulsu, ad animantis vitam nequicquam confert, quod æque vitæ munia obit illis quiescentibus aut motis, Non à pulmonis motu aut cessatione mortem immediate pendere, vel circulationem sanguinis inhiberi, sed à novi aëris defectu. *Ex Ephemer. Eruditorum xiiij. anni 1667.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI SECVNDI.

SECTIO II.

De SUFFOCATIONE.

OBSERVATIO I.

Suffocatio Anginosa à Constrictione Venarum Inguarium orta.



AUD pridem venas jugulares, subducto his filo in cane arte ligaveram, & post aliquot horas partes omnes supra ligaturam mire intumescabant, & intra duos dies canis quasi angina suffocatus interit: ab impedito sanguinis abarteriis in venas circuitu. *Richardus Louvver Traict. de corde, cap. 2. pag. 124.*

SCHOLIA.

A Carotidum arteriarum simili constrictione occurrere soporem, unde illis nomen, ostensum lib. 1. Tit. de soporosis affectibus: Suffocatur autem homo cum aer ventilando calori cordis necessarius non attrahitur, ut *Sennertus Traict. libro secundo, pag. 10. cap. 1. unum*, fuliginis calidæ expiratione non emittuntur: sicut primò cum via aëri attrahendo dicitur occluduntur, quod fit interdum ore occluso seu obstructo, simulque natibus moco obrutis, unde interdum apoplectici & epileptici periculum suffocationis imminet: Secundo si fauces, præsertim circa laryngem occluduntur, id quod fit in tumoribus malignis faucium, laryngis, glandularum, columellæ, & ut in luxatione vertebrae cervicis: Tertio, si aspera interia caput à re quacunque obstruitur: tunc enim facile hoc non fiat, sed nimis ob imminens furmen periculum, per nullum magno contra omnia talia excreta conetur, tamen si res in perniciem & sine simulæ illi inhereant, Suffocationem inducunt: Ita Adrianus Pontificem à musca in fauces involante suffocatum esse tradunt historici, aliosque uræ acinæ, infantes quosdam nummis &c. suffocatos esse tradunt: De suffocatis ab aqua vide observat. 44. Quamvis, ipse quidem asperæ arteriæ ductus non facile obstruitur, cum sit satis patens, à vi tamen externa collo obstructo, ut fit in strangulatione, via omnis spiritalis intercepti potest: quod & à tumoribus, ut bronchitis, tracheam præmentibus fieri potest, Præterea fingorū quorundam ulcus, ut & alia venenata, strangulare solent: quod proculdubio fit cum ob membranam, quam œsophagus habet cum aspera arteria & larynge commensuram, laryngis rima contrahitur & coarctatur: Ita ex medicamento fursum ac deorsum purgante fere suffocatus Ulucot apud Hæpaldem, lib. 7. Epidem. Quibus, accidit etiam in apoplexia suffocatio, cum motu thoracis omni, & membrorum respirationi intercipitur, nulla fit respiratio: Secundo, in casibus etiam febri & confectis ab pulmonibus ructe suffocatio fieri potest, unde suffocativi nomen à suffocatur, de cuius generatione vide lib. 1. sect. 17. observat. 11. & sequ. Peritiam huc & aëri, qui attrahitur, ventilando calori ineptus & suffocatus, gen-

lis est ille qui è carbonibus, cloacis, multo &c. exhalat, qui quomodo suffocationem inducat, vide infra observat. 40.

Quomodo autem à venarum constrictione suffocatio inducatur ostendit Louver loco superius adducto: Quemadmodum, ut, venarum alicubi dilatatio sanguinis supplementum & infusionem debitorum diverendo, cordis motum valde dimittit, ita ubi venæ in angustum adeo ambitum compinguntur, ut sanguini commensuram satis liberam non concedatur, idem omnino incommodum cordi accedit: quippe in valde obelutis animalibus, propter venas à nimia pinguedinis mole & inclementio compressas, quia sanguis pro motu cordis continuando debite suppeditari non potest: proinde in vasis suis & cordi haurire & concretæ spiritus est, adeoque suffocatum & mortuū serpentine (præsertim quibus à natura cor regitur & robustum datum non est) obnoxios reddit: ut autem venæ euphysiam, minoris licet, compressio sanguinis motum inhibendo aliquantulum alienat, ita quoque plura & majora eorum vasa obstructa aut constricta fuerint, eo præsertim cordi periculum impendunt: Et licet à morte paulo supra diaphragma compressio, sanguinem totum corpori debitum, & omnibus simul vasis quantitate proportionatum in partes solum superiores coegerendo, caput ipsum & cor obruit & pessandat, ita si venæ cavæ paulo supra diaphragma, in dextro pectoris latere, ubi tunc ab omnibus corporis partibus distincto & discourtino versas cor incedit, adeo arctè ligetur, ut sanguinis per illam affluxus protinus soppiatur, dici vi potest quanto animalis detrimentum hoc fit: quippe licet ab injecta vena ligatura, nullum doloris aut cruciatum sensum contentione aut ejulatu fuerit, mox tamen adeo oblangere & fatigare incipit, ut pedibus iam stare possit, quia & non tam procumbere quam in terram ruere & concidere semel vidi ferocem molosseum, non aliter quam vi vitam omnino destitutum esset. Ratio autem quare tanto discrimine & tam tranquille venam cavam ligari, aortam vero adeo anxie comprimi sustulerit, alia esse non videtur, quam quod vena inibi ligata sanguis toti corpori debitum, inferiori solum parti plurimum impenditur, adeoque

adeoque caput vixit ejus infuau valde orbatum, spirans pro cordis motu sustentando Imperire adeo potens non est, ut utrumque vacillare de deficere multum necesse fuerit, quod nullo insulique dolore perficeret: compressa autem aorta supra diaphragma, sanguis qui maxima ex parte inferiori corpori, & visceribus ventris debetur, totus superiori & minori

suffunditur, quem cum excipere omnino incapax sit, nimia ejus copia prosum opprimi & suffocari debet, atque ideo cum mor cerebro, & cordi ipsi, tantam molestiam afferat, ad primam compressionem animam rem tam inique patitur de summo comata amoliri nique.

OBSERVATIO II.

Suffocatio à viro palati Abscessu, Et auriculæ dextræ cordis ab aëre sanguine distensione & infarctu.

Villicus adolescens ex frequenti & diu producto subdialis frigidiq; aëris usura, provocato viscidæ pituitæ distillatu, sentit sibi primum nescio quid ad palati forolum adhære scire, quod aliquot post diebus in tuberculi formam se prodidit, atque ex majoribus in dies incrementis ad eam magnitudinem tandem increvit, ut totas hominis fauces oppleret, ne dum firmiter alimenti tractum, sed etiam potum inspirantemque præcluderet: renixu duro, colore carneo, variis liquor plicamentis in ambitu excurrentibus præruptum. Decoctum salis patillæ diu potum nihil profecerat, ac neque buccatus & gargarisinata varia: Ego re inspecta nova & insolenti, præfocatum hominem iti certo agnoscens, Collegis meis laryngotomiam non dubitavi proponere, qua sola velut sacra anchora, tum miserandæ sortis exitio posset occurrere: Quæ nostra persuasio cum admittitur approbatæ non fuerit, denegatis interim vitalis auxilii fomentis, fato functus est miser homo.

Quo, frigente mox corpore, in anatomicam inspectionem vocato, præfectum tuberculum ostracium intero repertum est totum, cum aliquo particulæ conformatu & quarundam quasi alarum & rostri discretu: Itaque non inepte à plerisque adstantibus, & à nobis ipsis æquiparatum est testudini terrestri parvulæ.

Sed ante hanc tuberis excisionem, experimentum quod fecimus laryngotomia narraboi dissecta enim primum cute secundum longitudinem corporis, ex hoc aditu facto, resoluta transversum trachea, qua bronchia per synchondrosin connectuntur, confestim & subito visus est humor prodidisse cum spuma, audiriq; fragor spiritus veluti dissilienti ab angusto conclusioque loco: Quare sic plane cognita præsertim consuevit valde probabile ut viventi jam ad prorogandam spiritus usuram ejusmodi pertusio subventura singulariter fuisset: Quod autem magis optandum erat, nunc vero tantumdem dolendum est, fortassis quotidianis epidemicæ anginæ casibus conclamatis, eo exemplo Medici nostrates animati didicissent aliquando succurrere.

Sed hujus ejusdem hominis visceribus exactis, quæ offenderimus enarrandum: Reperta dextera cordis auriculæ durior & cartilaginæ, plurimo atro sanguine distenta sic ut pugni magnitudinem æquasset: quæ dissecta neque resedit neque repressa est, sed eodem modo fornicata persistit, velut obfirmata huic statui & velut tigillis affabricata sinistra quoque auricula nil à petiore varians: Intestina fibris quibusdam velut lacinis aut appendiculis distincta luteis, quas & in hominis suspensæ cadavere secto per nos anno 1630. observavimus. *M. Aur. Severinus de Recondita Abscessuum doctrina p. m. 197.*

S C H O L I A.

Experimentum laryngotomie.) Bronchotomia scribendum esse pro laryngotomia, docuit Celeb. Renatus Moravi: Pauci tamen hæc tam cultere qui eam in usum adducere ausi sunt, idque vel periculi meto deterreti, vel agendi opportunitate destituti, vel ab ægrotum amicis propter rei novitatem revocatis: At quandoquidem, juxta Celsum, facius sit anceps ex-

perici auxilium quam nullum, in casu extreme necessitatis insitui potest, præsentem cum profertur exempla eorum in quibus hæc operatio bene cessit: Nec metus est ne partes mobiles aut vaia lacerentur: demque vulnera ejusmodi cito coalescere exemplo docet Tulpus observat. 30. lib. 2.

OBSERVATIO III.

Anatome Suffocate puella tabida, ob effusum copiose crivorem à Pulmonibus; asperam arteriam replentem.

Anno 1676. Junii mensis initio, Filia Gener. Dom. de Sergy, in Præfectura Giesfensi, annos xlii. nata Genevam adducta est, ob imminentem tabem, moxque curæ commissa est: habuit illius, sicut & parentis *œmorrhæ*, perpetua tussis molesta erat, per

quam purulenta copiose, cetera præcedentem hæmoptysin, excludebantur; De gravativo dolore ad sternum imum querula erat; anxietas in acclivibus & productiori deambulatione, *disponens*, medicamentis omnibus infesta; sola iuscula, eoque raro, China, rad. pimpinell. pulmonar. capillo ven. rufilagine alterata admittens: Ideoque lactis muliebris pusul se disponens, eadem die qua discessum in domum paternam meditabatur, medio in prandio, quidpiam in pectore disruptum esse exclamat, suffocari se fatumque instare, & verbo emissio Dei misericordiam implorans, post excretum paucum cruorem, suffocata extinguitur.

Quarta post hora à Mag. Danello, Chirurgo peritissimo, dissecatur cadaver, referatque pectore, primò illius hydrops deprehenditur; plurima enim aqua cruenta in eo continebatur, parte præsertim dextra, cui pulmones innatabant: Secundo remoto sternò, glandulosum corpus se exhibet, scirrhum, album, castaneam mediocrem adæquans, utrinque depressum, extremo uno pulmonis dextri inferiori lobo affixum; altero mediastino & diaphragmati. Teriò, dum examini subjiciuntur pulmones, simile corpus ad dorsum, latere dextro, illis & pleuræ coherebat: Utrumque dissecit glandulæ induræ formam referebat: Quartiò, pulmonum labes insignis non fuit, varie tamen exterius coloratis dissecit & compressi cruentam purulentiam fundentes; substantiæ quam decet densioris: parte postica leviter ulcerati: His levissime compressis spumeus cruor plurimus ex ore manabat, ante anatomen spuma alba sponte effluente: Mirum vero nec vel tantillum illius materiæ, quam copiose dum in vivis erat expectorabat, in Pulmonibus animadvertam esse: Quintò, Tumidum valde occurrit pericardium, è quo dissecto feri cruenti $\frac{3}{4}$ xvi. effluxerunt, ejusdem conditionis cum eo quod capiebat thorax: Sextò, extima cordis superficies lanuginoso panno omnino similis, aut intimè ruminantium animalium ventriculi tunicæ, quasi corrota, proculdubio à feri acrimonia intra pericardium conclusi. Septimò, trachea arteria sanguine semè concreto infarta erat, quæ Suffocationis causa fuit: Reliqua scrutari non licuit, ob Parentem in proximo cubiculo lugentem & infensum.

S C H O L I A.

AB insigni sanguinis, ejusque feri acrimonia, potius quam copia referatum fuisse insigne quoddam pulmonum vas, hæque tracheæ arteriæ proximom, verisimile est: Primò quod nullus stagnans in eorum parenchymate apparuit; paucus io cordis ventriculi: Secundo, ex constitutione puellæ tabescentis & exanguis: Tertiò, ex cõditione tunicæ cordis atque extrinse subhoriz, omnino corrota, acerrimi feri effectus, pericardio inclusi, ut affectum illum jure merito cum Hildano cent. 1. observat. 45. Hydrocardiam, aut Cordis hydropem vocare possunt tres hebdomadæ à me in uxore Clariss. Dom. D. Cræmeri, obfervatum) Mirum vero hæmoptysin, præsentibus causis, non præcessisse, Id quoque spiritum Hydropis thoracis, præter dyspnoeam, ulla alia se exhibuisse indicia, cum decubitus in omniem partem facili fuerit, somnus prolixus & in multis lucem productus,

cetera suspicia, qua nota præsertim morbus ille se præfert: A tussi enim nullum iudicium desumendum erat, quæ illis sicca est, puellæ vero perpetuo humida: Nec minus mirum de cordis palpitacione nullas unquam fuisse querelas, quanquam causa id opprimens, exuberans serum, adesset: An quia scotum aggesto, illi itadem assuevit, ab aliusci aures non hæ passio? Jampridem vero ibi congestam fuisse palam facit cordis passio, in superficie corrosi & tunica pene delituit: Tabis autem pulmonariæ cum duæ præsertim assignentur differentie, vnos quæ pulmonis ulceris soboles est; altera quæ insitam illius debilitatem insequitur, ab hac postrema causa orum duxille dubium non est: Notandum autem Nob. puellam rufo fuisse capillitio donatam, quibus autem tale obigit, si acerrimos plerumque humores congerant.

OBSERVATIO IV.

Suffocatio à Struma interna abscondita circa jugulum.

Filius Marci Peresii, quinque menses natus, bene habitus, nullo præcedente alio affectu, subito cum fridore & respirationis difficultate, è medio sublatu est: quo genere mortis prius quoque cum duos amisset filios, causam scire cupiens, ipso rogante pectus aperimus.

In regione juguli glandulam illius loci, in strumam quandam magnam, unciam unam cum semisse pendentem, spongiosam, venisque refertam, & quæ beneficio membranarum duntaxat vasis maximis illis circa jugulum ascendentibus adhærebat, excrevisse deprehendimus, carniformi quadam materia & sanguine oppleta, quo subito irruente, glandulamque illam dilatarunt, adeo ut vasa illius loci premeret, suffocatum fuisse infantem judicavimus. *F. Platerus observ. lib. 1. pag. 184.*

SCHOLIA.

Glandulam istam scilicet Thymum intelligit, de qua Warthon Adenographia cap. xvi. Hanc quatuor genera vasorum assignat, arterias, venas, nervos & lymphaductus, quos vidit frequenter per hanc partem decurrere. Ex quorundam iudicio Glandularum rotundius corporis manus est lympham transcolare, quomunere nisi sanguine, crasset hanc lympham, glandulamque in tumorem attollit, à qua comprimunt aspera ar-

teria. Hoc in infantibus facilius accidit, quibus Glandula illa quam in adultis multo maior est. In aliarum exemplo augmentum accepit à sanguine per arterias delato.

Glandulam istam dilatant Ex tunc etiam stranguationes etiam viris possunt accidere, sed in mulieribus hystericiis frequentius ex tunc etiam ipsa suffocatur, nisi scilicet vena succurratur. *Riolani Anthrop. l. 3. c. 9.*

OBSERVATIO V.

Suffocatio à pituitæ viscidæ copia ad uvulam delatæ

A Perui corpusculum filioli D. D. qui die præcedenti ex improviso, post sectam & colligatam fissuram labiorum interiit.

Causam mortis tam inopinatæ scrutaturi, invenimus in palato, seu ad uvulam, satis magnam pituitæ viscidæ copiam, in qua suffocatus videbatur: quæ sorte ob commotionem, ejulatum & ploratum, ex operatione causatum, delapsa à cerebro fuit: relique enim omnes partes & viscera sana erant: Erat autem & palatum fissum usque ad sellam Turcicam, quemadmodum stylo percipere potui: gingivæ quoque non coibant invicem ex parte illius fissuræ. *Id. R. Saltzmanus Observ. pag. 42.*

OBSERVATIO VI.

Suffocatio à carnis frusto devorato, subsistente inter epiglottidæ & laryngis rimulam.

SUENO Olai, juvenis robustus, sed pallido faciei colore, annorum 19. cum in corna convivis, iussu hospitis inserviret, linguæ frustulum bubulæ, in patina residuum, clam & festinanter ori iniecit, unde statim vox sublata & respiratio, nec caro deglutita conatu ullo aut vi ulla potuit elici. Antequam advocatur Chirurgus, suffocatur.

Postmodum cadaver apertum fuit, inventumque est frustulum illud linguæ bubulæ, pondere uncie unius cum dimidia, inter epiglottidæ & laryngis rimulam se insinuassee, totamque laryngem obturasse, tam arcte ut vix manu eximi posuerit: unde mirum non est subito & vocem cessasse & perisse respiracionem: Oesophagus, quanquam ex vicinia comprimentis carnis angustior fuerit, ex ventriculo tamen potum regurgitantem per os narisque defuncti admisit. Pulmones à naturali defecerant statu, colore lividiores & flaccidi, unde color lividus faciei: & dubio procul exiguum vivendi spatium superfuisset, quanquam voracitas defuisset. Hepar solidum & liene duplo majus. *Th. Bartholinus cent. 1. hystor. xi.*

OBSERVATIO VII.

Suffocatio ex frusto rupti Pulmonis in Trachea arteria subsistente.

VIr quidam 36. annorum, calidus & siccus, phtisicus, morte repentina emoritur penes suam uxorem, huius mortis insciam, quæ necquidem tam funestum casum sibi imaginabatur: Mane ea surgens maritum suaviter quiescentem à somno excitare noluisset, sed tandem impatiens longioris somni, adhibito omni conatu in eo experge faciendo, illum mortuum invenit.

Aperitur cadaver ad causam subitæ mortis investigandam, in cuius cadavere nihil notatu dignum reperi: Ad thoracem accedens, vidi primo ictu oculi circa cartilagineam arytenoidem collum instans ad instar strumæ, quam inflationem vivens non habebat: Aperto thorace inveni Pulmones exulceratos & pure repletos: ruptum autem erat ulcus illud, quasi per mediam partem sinistri lobi, cum deperditione substantiæ & alicujus particule quam ibi non invenetam: Ex hoc suffocationem mihi statim imaginabar, adeoque totam asperam arteriam, in qua illum tumorem tum temporis inveni, extraxi una cum pulmonibus & corde: his extractis volebam folle pulmones per asperam arteriam inflare, sed nullus halitus aut aer transivit: Digito causam resistentiæ indagans, inveni illud frustum rupti pulmonis in aspera arteria ita infixum, ut unci illud non nisi lacrarum extrahere potuerim, quod transivum aeris impedit, adeoque subito suffocari

misèrum necesse fuit : Postquam autem frustum illud extractum erat, pulmonem inflabam, (dextrum tantum non sinistrum, qui erat laceratus) magna tamen cum difficultate ob copiam purulentæ & viscidæ materiæ : Sed multo mirabilius in hoc cadavere inveni, Resectis Pulmonibus Cor aperui, in cujus dextro ventriculo foliolum integrum vitidæ sisymbrii, per modum acetarii pridie vesperti comesti (ut referebat vidua) & sapore & odore inveni. *Ex Observat. Joh. Georg. Greifels Med. Frunensis in miscell. cur. anni 1670.*

OBSERVATIO VIII.

Suffocatio ab alimenti sordibus asperam arteriam occupantibus.

Nuper in Virulo morticino causam mortis investigans, eam inveni ubi minime suspicabat, habebat is asperam arteriam scæno permixtisq; aliis sordibus ita plenam, ut animæ interclusus fuerit exitus : erat epiglottis ei parva adeo ut vix medium tracheæ hiatus obtegeret : hinc scæno paulatim, ut ex substantia ejus semiputrida appaebat, obturandæ arteriæ fecerat copiam. Nec in brutis hoc tantum usuvenit. In puero triennali alias tracheam corrupti alimenti sordibus oppletam reperi, cui & epiglottidem fuisset, quæ non esset opplendo arteriæ illius osculo petsepexi. *Th. Kerckringius Observ. Anatom. xviii.*

OBSERVATIO IX.

Suffocatio à Bronchocele asperam arteriam promente.

§. 1. **F**ilia quædam Bronchocele laboraverat, quæ in parte colli anteriore nata, trium citius mensium spatio ita excreverat ut longe ante mentum prominere, miseramque tam præcipiti augmento enecaverat.

Nobis quomodo id factum esset post mortem inquirentibus, Tumor hic, substantia glandulosus, visus est ita asperam arteriam cõlli vertebreis appressisse, ut inde *Præfocata* fuerit. Quod quia rarum videbatur, hic, annotandum putavi, ne lentis nimis in similibus rumoribus, subito incrementibus, naturæ arbitrium otiosus expectent Medici : præstiterat hic humores imminuisse, reliquias eorum aliò divertisse & localibus adfuisse remediis, quam permittere ut misera misere strangularetur. *Th. Kerckringius Observ. Anatom. 74.*

§. 2. Bronchocele in thicatro P. Marchettus proposuit, ubi glandulæ diversæ asperæ arteriæ adstabant, quarum quædam sero copioso turgabant; quas si ante mortem dissecuissent, mortem ipsam evasisse credidit *Marchett. Henr. à Moirichen in Epist. Bartholini Cent. 2. Epid. 77.*

OBSERVATIO X.

Suffocatio à lapidibus asperam arteriam prementibus.

Quidam laborabat magna dyspnoea sine tussis, Lapidès varii aspectus arteriæ incumbentes immediate, ita eam oppresserant ut tandem hominem præfocaverint. *Vide III. de Dyspnoea.*

OBSERVATIO XI.

Suffocatio à colluvie purulenta in asperam arteriam confluenta à vomica Pulmonum disrupta, &c.

Anno Dom. 1574. pridie Calendas Junii, facta est dissectio corporis Caroli IX. Regis Galliarum, Cujus Pulmo, qui in partem sinistram thoracis incumberebat, à costis illegitimis ad clavículas usque totus lateri adhaerebat, ita firmiter & obliquate ut avelli non potuerit sine dilaceratione & dissectione cum putredine substantiæ, in qua se prodidit vomica rupta, è qua colluvies purulenta, putrida & graveolens effluxit, cujus tanta fuit copia ut in asperam arteriam redundaret, & præclusa respiratione præcipitis & repentini interitus causam attulerit. Alter Pulmo sine adhæsu fuit, magnitudine tamen naturalem constitutionem, turgidus & distensus, superans, (ut & sinister superabat in substantia, insignem corruptelam præ se ferens) parte superiore putris, referens & conspurcatus humore pituitoso, mucoso, spumoso, puri finicimo. *Jacobus Guillemeau, Opera pag. 856.*

OBSERVATIO XII.

Suffocatio à seroso humore, affatim è cystis seroso humore plena, in cerebri extrema parte sua delabante.

R Barriere destillatio perpetua ad nervos linguae loquelam quamdiu vixit impedit, quæ tandem aucta Suffocationem intulit: Aperto cranio, in extrema cerebri parte, in conspectum venit Cystis robusta membrana contexta, undique serosum humorem continens, in fundo exiguum foramen habens. *Vide Tit. de Lingua affectibus lib. 1.*

OBSERVATIO XIII.

Suffocationis sensus à liquore p. n. cysti contento, tertiam circiter thoracis sinistri partem occupante.

P Uella 18. ann. languida erat admodum obstructio thorace: domum egressa tempestate ventrosa, cogebatur domum properare, patum enim abesse aiebat quin vento strangularetur. Mortuæ cavitate thoracis aperta, evaporabat fœtor olidus admodum, Dextrum tantum ejus latus erat integrum: In tertia circiter sinistri parte aderat cystis plena liquore cremori simili, ad quantitatem trium pintarum. *Vide Tit. de pectoris dolore.*

OBSERVATIO XIV.

Suffocatio excitata ab insigni Aneurysmate in Arteria magna prope jugulum.

Q Uidam Juvenis, vix in curationem recepto Medico, derepente Suffocatus perit: Cum de causis mortis subitanæ dubitaretur, pectus post mortem fuit apertum, ubi tumor Aneurysmatis insignis, in arteria magna prope jugulum deprehendebatur, ob sanguinis ebullitionem & incandescentiam, suffocationi occasionem præbens. *Greg. Horfium Observat. 1. lib. 9.*

S C H O L I A.

I N internis partibus Aneurysmata sæpius incurabilia fieri, non tantum Aushores, sed etiam experientia confirmat, imptimis in his qui litas aque liores ad curationem morbi Gallici torres sustinuerunt, ob sanguinem attenuatum & incandescentem, arterias majores in amplitudinem p. n. dilatentem quod *Pareus in cadaveris ipsiusdem reperiendi, qui quædam aneurysmate arteria venosa repente rupto subito mor-*

tus fuerat. Similem observationem hic in Nosocomio Gallico quoque notavi ordinarius Medicus *de praxidlo juvene*, qui vix in curationem receptus repente suffocatione perierat. *Idem.*

Prope jugulum) Partem affectam sæpiissime, imò fere semper, ob arterias carotides, colliam esse observat *P. Barbatus* *prax. Med. lib. 1. cap. 3.*

OBSERVATIO XV.

§. 1. Suffocatio ab aquarum copia in thorace inducta.

N Uper dissectui Nob. mulierem, quæ viginti quatuor horis à partu decessit è vivis, Aquarum copia, quibus abundabat thorax, corde suffocato. *Riolanus Anthropol. lib. 5. c. 1.*

§. 2. Vir doctus sensum in cachexiam incidit, tandem Suffocatus obiit, Thoracem aqua sanguinolenta omnino plenum reperimus. Vide Tit. de Dyspnoea.

§. 3. Infans variolis infectus Suffocatus interit, Thorax aqua viridi plenus cernebatur.

*§. 4. Plurimæ morborum causæ, quæ continentes vocantur, ac immediate morbum producant & foveant, plerumque sensum coacervantur, sæpe diu in corpore delitescunt nullisque molestias exhibent, & non raro pauca sui indicia præbent. Aut si quandoque molestæ sint, nondum tamen illum morbum efficiunt quem parituræ sunt, si vel virtute validiores, vel quantitate abundantiores evadant, vel sepius quasi ab occasione aliqua excitentur; Tunc enim sæpe subito in aquam deducuntur, morbosque gignunt: Fidem facit hydrops pectoris, in quo aqua sensum cumlata, primum parum vel nihil molesta est: hinc crescendo & acrior facta rursus siccam efficit: adhuc abundantior respirationem difficilem reddit, palpitationem cordis excitat, tandemque quantitate major quam ut pectoris cavum eam capere possit, pressis undique pulmonibus, subito hominem, nondum id timentem suffocat, Ut nuper admodum in juvene quodam *Philippo Sparlino* observavi, qui nullo in pulmonibus vitio, si compressionem excipias, apparente, subito, ab aquæ copia in pectore cumlata suffocatus obiit. *J. Juss. præfatus Exercit. de Apoplexia pag. 186.**

OBSERVATIO XVI.

Suffocatio ab Vterino hydropo & Thoracis.

Mulier incurrit tumorem ventris Asciti vel Tympaniti similem, &c. In thoracis cavitate aqua erat copiosa, quæ potuit esse causa suffocationis, &c. Ex abdomine effluxerunt aquæ circiter libræ 73. Illa aqua omnis in uteri cavitate continebatur, &c. *Vide lib. 3. Tit. de ventris Tumoribus.*

OBSERVATIO XVII.

Suffocatio à materia purulenta bronchia opplente, Pulmone dextro tumido.

Aperto corpore Phthisici, dexter Pulmo tumidus inventus, adeo ut totam illam imple-ret cavitatem. Incisis bronchiis, alba materia & puriformi repleta erant, qualem ante eiecetat, quam si extulsiſſe potuiſſet, Suffocatus non obliſſet. *Vide tit. de Phthiſi.*

OBSERVATIO XVIII.

Suffocatio à carunculis in bronchiis Pulmonis abortis.

Fœmula N. diu pectoris angustiam perſenſit, tandem ſaturata de menſa ſurgens, auſta pectoris anguſtia, ſuffocata oblit. Pulmo deprehenſus coloris lividi: aſpera arteria diſſecta, carunculae quamplurimæ nigrae inventæ ſunt. *Vide tit. de Dyſpnoea.*

OBSERVATIO XIX.

Phthiſici ſuffocati moriuntur aliquando, ob materiam viſcidam bronchia obſtruentem.

Modus terminationis ad mortem in Phthiſi eſt 1°. diarrhoea, & aph. 12. 2°. Suffocatio; cum ſputum fuerit retentum, aph. 16. 17. Tamdiu vivunt, ait Galenus, quamdiu ex-tulſiſſe, & per ſputa pulmones expurgare queunt; ubi vero intus remanent, reſpirationis obſtuuntur viæ & Suffocantur. In demortuis apertis illam à purulenta, tenaci & viſcida materia obſtructionem bronchiorum ſæpe obſervaviſmus. *Ralfinkius meſſ. partic. &c. lib. 1. part. 2. cap. 6.*

OBSERVATIO XX.

Suffocatio ob Pulmones variolis obſeſſos.

Puellus variolis obſitus Suffocatus oblit, Pulmones ita undique Variolis intus & foris erant pleni, ut nil plane ſani conſpiceretur. *Vide Tit. de Febris.*

OBSERVATIO XXI.

Suffocatio à Sanguine univerſo ad pulmones conſluxo.

Ex rupea vena fuit Suffocatus ſubito G. Ulrich. aurifaber. Secto ejus corpore, omnis ſanguis repertus eſt in Pulmone. Ex obſervat. *Joh. Heſii Medici Norici.*

OBSERVATIO XXII.

Suffocatio à turgidis & ſanguine diſſentis venis internis.

Agnum morti proximum, ſemiſopitum, ſine ſenſu & motu xxx. circiter annorum vi-di, cùmque aliqua ſpes in phlebotomia illuſceſceret, quoniam corpore eſſet quadrato, tamen renuente ſeniore medico, phlebotomiam conſenſu ipſius reliqui, ipſi adminiſtrando, ut calor natiuus, (ut ille aiebat) excitaretur 1°. clyſterem, ligaturas dolorificas, caute-rium in nucha, veſicantia brachijs & tibijs, columbum per dorum diſcũ capiti appli-catum, epithemata cordialia teſtibus, extremis partibus, cordi, quibus omnibus optime pa-ratis, æger mortuus eſt.

Secto corpore, nulla in hepate, in cerebro aut corde, lethalis noxa percipiebatur, ſed venæ omnes turgidæ ſupra modum ad immenſam molem excreverant; ita ut aliquæ venæ in alijs corporibus exiles ac parvulæ, in iſto cadavere craſſitudinem pollicis æmula-tenentur. *Dom. Panarolus Pentec. 1. Obſerv. xiii.*

S C H O L I A.

Vide in hanc rem Galeni comm. in Aphor. 3. sect. 1. de habitus athletici periculosa constitutione, & quomodo cito sit solvenda: Exemplum mihi præbuit annus 1668. Petrus Bonneton Lugdunensis, Hortulanus Sereuil. Principis de Longueville in Arce Colombiensis, vir sexagenarius, quamquam vulnere & alacritate corporis xl. annorum vix attigisse videretur, totosus, quadatus & vere athletici habitus: Post aliquam in sole moram ~~ex~~ evadit, immo & in-

conviventibus oculis, cataleptico similis, venæ omnes illi ad summum turgidæ erant, pulsu vix micante, circa merinoctium accessius filii Chirurgum illico advocavi qui lapsum sanguinem demeret, & instantem suffocationem arceveret: Idæa vena sanguis salu cubiq. lacunar attingit, quem ad libras duas exire permisi, hinc vox statim restituta & altera die incolomis ad officium rediit pulchrum.

OBSERVATIO XXIII.

In suffocato & strangulato Pulmones Sanguine spumoso pleni reperti.

ANATOMEM virilis cadaveris ob furta strangulati, hominis proceri, sanguinei, habitusque corporis robusto instituens, Inveni pulmones grandes, variegatos, corulcos, rubore insperso, marmoris instar, leves & spongiosos, sanguine spumoso tam plenos, ut non tantum externæ venæ tumidæ ubique in membrana apparent, sed in dissectione cordis demonstrantem me fere impedirent. *Th. Bartholinus Histor. xxxii. cent. 1. §. 31.*

OBSERVATIO XXIV.

In Strangulato fistula Pulmonum Spuma repleta inventa.

Virile cadaver, hominis sanctissimi, strangulatum à me dissectum est anno 1656. Fistula Pulmonum spuma copiosa erat impleta ex strangulatione. *Barthol. centur. iv. histor. vi.*

OBSERVATIO XXV.

Suffocatio à crasso nigroque succo cordis sinus infarciente ac posteriores lobos Pulmonum.

IOH. GINGK annos supra 50. natus, crure dextro paulum infra genu ante circiter xxx. annos resecto, mutilus: homo ~~corpore~~ & robustus, allato in prandium pane, vinoque de more hausto, & quidem adhuc jejunos, percepit obrepentem sibi subito (citra tamen rissim, vomitum, nauseam aut leipothymiam ullam præcedentem) respirationem difficilem cum anhelatione, ut densissime, nec nisi stando spiritum ducere quiret, & Suffocationis præsens periculum sibi ingruere videret mente integra. Advocatus Medicus, pectoris angustiam magis magisque augescere thoracem *collumque intumescente*, adeoque mammillarum loca in altitudinem panis domestici turgescencia conspicatus, ideoque veneni sumpti suspicionem habens, rheriacæ & ex aq. card. bened. liquore propinat, & simul mortem prævidens, de Medico animæ accersendo hortatur, æger interim, & quidem paulo post horam 1^m. pomeridianam, animo constans loquensque, suffocati in modum expirat.

Ante cadaveris apertionem, (quæ inter 3. & 4. horam vespertinam sicbat) utraque palpebra in altitudinem ovi gallinæ indurata, per medium in longum secti, tumebat, colore dilute flavo: tumebat & tota facies, malæ, frons, capillitium, cervix, collum, humeri, pectus; scapula; brachia, dorsum, venter, nates, femora, usque ad genua, in quibus turgiditas desinebat. Tympani pulsationem concavam tympani sonum referebat, in velleris ovilli, à lano ad deglubitionem faciliorem inflati modum: Tempora, cervix, scapula; humeri, dorsum, non solum vivebant, sed nigrescebant potius, lividum hunc nigrumque colorem ante horam ix. mane ejus diei, jam animadvertenter Medicus.

Dissecto peritonæo, ventriculus, intestina, hepar, lien, culpa vacare videbantur, præterquam quod ventriculus cum intestinis paucò flatu turgerebat: lien nihil livoris naturalis habebat, verum rubicundior quam pro natura existebat: Venæ ventriculo, colo aur hepatis infusæ nigrescebant, fellis folliculus multa bile ac pallescente plenus, eoque colore intestinum jejunum tingeatur. Pectore recluso, anteriores pulmonum lobuli dexter atque sinister, satis sani apparebant, verum posteriores ad dorsum positi, dexter quidem, atrotoxo succo atramento simili, turgidus ac subdurus erat: sinister autem similiter

militer, sed paulo minus nigrescebat; Pericardium nihil humoris continebat: At dexter cordis sinus atro, crasso & fusili sanguine scatebat, sinister verò nigricantem paulo minus habebat.

SCHOLIA.

Causam dyspnoeae, orthopnoeae & suffocationis, uniusque posterioris lobi infarctum, Subitanæ autem mortis culpam in crassum nigriūque succum consiciendam puro, quo uterque cordis sinus oppletus fuit, qui ipsius vialem optimebat, quem sibi destitutum & putridum venenatumque facultas capultrix, thesauri paraxillum quidem adpota, eum verius amoliri conabatur; sed crassitie ejusdem, & pororum curia densitate, calotique vitalis imbecilliarie exterminare protius nequibat, at in flatu convertit: Talia moliri videmus nauisam per anostomosis, referatis vasorum oculis, in hypophagmate, utroque ictero, in edemate, hypotacta & in ichthris allicque cutis viis: Nigres & atrabilarius erat, ob lienis imbecillitatem, non tatis validi ad extrahendum expurgandumque faeculentiam ex hepate fortes, limumque melancholicum, qui in mala sanguinis relicta, illum inficerebat, refrigerabat, calidumque nativum extinguebat: Exemplo famuli Principum Indiarum, Nec non illius. Principis Frederici III. Electoris, quorum uterque atrabilarius in ventriculi cordis, verèque nigri & crassum succum gerebat. *Uterum Jussieu Hist. lib. 2. pag. 380.*

At in flatu convertit Atrabilarius succum uberem flatuum proventum facere omnibus notum: Testatur hypochondiaci, quorum affectui flatulenti nomen ob id imposuit. Hydrotom sympanitica à flatibus ex atrabile sollicita oculi multi conuulsant, ac inter hos Sennertus.

Collum intumescit In affectibus hysteriis & quibusdam hypochondiacis suffocationis sensus in gutture, symptoma crebreum & familiare existit: Enimvero ipsalium in nervo quopiam incipiens ejusdem docti ulterius prorepere solet, adeoque partes modo has modo illas successively invadere: Si quando igitur spasmas in utrovis partis vagi, aut incoastalis nervo alicubi oriatur, & exinde sursum aut deorsum tendens ad alterutrum plerumque pervenit, illico ambobus affectis, malculique in rursus vicinis contrahis, in gutture moles seu tumor globi instat, cum suffocationis sensus excitatur. *Vidu Anat. seribri cap. 19.*

Quoties paroxysmi convulsivi à Liene aut Ventriculo incipere videantur, ut pote quorum initia sunt partium illarum inflationes, & perurbationes insignes, verisimile est materiem ipsamodice nidam intra *plexu nervos*, ad Lienem aut Ventriculam pertinere secundum fuisse: Quin etiam ejusmodi materies, intra plexum cardiacum, gravissimos *cordis tremores & passiones*: Intra *plexum paraventricularem aut servantes*, terribiles *afflictus* insulatus excitare videantur: Porro ab eadem causa, scilicet materia *amalgama* intra *plexum gangliiformem* aggregata, & per vices explota, illum in *gutture profusum sensum*, in paroxysmis convulsivis iam crebro excitatum procedere (nec immerito arbitramur *idem lib. de morbo convulsivo, cap. 6.* Hunc *Profusum sensum* à liene Pancreatico auctiore deducunt *Fr. Sylvius & Regn. de Graaf.* Hic Tract. de *fuso Pancreatico* §. 189. Unum at, de ipso magis auctore liber addere, octum ab ipso habere stragulationis sensum ac metum, feminis quidem quam manibus magis familiariter, atque sicut meri alcaus nuntius passum notum, cujus notabile in viis Clar. exemplum libet afferre. Factum anno 1663. ut oblatus mihi ab Excell. D. Sylvio succum Pancreaticum gustarem, eumque preceperim *1.* ut videbatur, lubialium, motum tamen non nihil apote, viis est deinde esse cum levi autem tunc subacutus, fecit in oee productus tantum, ut qui mecum erant me de factore monerent, similique erat ille sicut illi qui ex aqua limosa & fustulata oritur, os & succa non solum inde extirpabantur, sed & contringebantur ita ut suffocari videretur, Acc. Erat iustus ille ex cane à me praesente D. Praefide eductus. Hinc non absurdum videtur dicere viros aliquando suffocatione laborare Hysterice consimili, cujus causa proxima accedat à tenui intestino, in quo excitatur, ob viscosam concurrentium humorum effluvescentiam, halitus & status asitici, quoties per oesophagum assurgunt, eundem ita angunt ut in strangulationis periculo se versari putent aegri.

Hic Graaf: Prior autem aetologia alla-
to exemplo accommoda-
ri potest.

OBSERVATIO XXVI.

Suffocatio ab utroque cordis ventriculo tenui sanguine distento.

Quidam ex alto decidit, &c. Ventriculus uterque cordis tenui sanguine distentus erat, unde suffocatio acciderat: Respiratio viventis magna erat & crebra. *Vide lib. 4. tit. de vulneribus.*

OBSERVATIO XXVII.

Suffocatio ob pericardium & cordis regionem sinistram offesa reddita.

Nemauso in Septimania, dum à Confluentia inclinata jam die reditur, res nec opinato intervenit summopere tristis: ad Santantonianam urbis portam *Schembergium*, qui cum

qui cum *Thaurum* manē Confluentiam venerat, in curru suo, antequam in proximum diversorium deduci posset, animam Deo reddidit, intercepto spiritu statim ehectus: Is jam à longo tempore difficultate respirandi laborabat, ad quam per intervalla accedebat acutissimus circa præcordia dolor, quo cum corripiebatur, sudorē per totum corpus diffuebat, adeoque debilitabatur, ut prope anima linqui videretur; Verum ut erat moderata & patienti natura, cum nihilominus quotidiana aule officia minime intermitteret, lingua assuetudine & morbum sibi familiarem & suis minime suspectum fecerat.

Scito corpore, quod prævalidum ac vastum vivus habuerat, admiratione dignum Chirurgis ac Medicis fuit, quod membrana, & carnea omnis pars quæ sinistram cordis regionem tegit, & ad flabellationis assiduae usum dilaturatur ac comprimitur, ex immo-dico calore & liberaliore victu tora ossa reperta est, ita ut respirandi facultatem impederet, idque tandem repentina suffocationi causam dedisse creditum est; nam alioqui saluberrimo temperamento, nullaque pars in eo non maxime sana erat, nisi quatenus crebra spirituum strangulatione vexabatur. *Thuanus histor. lib. 122. p. m. 864.*

S C H O L I A.

Hippocras. lib. de corde, Cor musculum ait esse validum, non nervo, verum carnis ipsissimum, *αἰναισίν*, quod substantiæ quidem soliditatem requirit ad motus premitatem, at non eam quæ contrictioni & dilationi, inhabilem reddat, hinc pulcritudine facultatis interceptio accidit, cujus prima-

rius effectus est sanguinem cum spiritu vitali distibue: secundarius finis, seu usus est *αἰναισίν* & à recte mentis repurgatio: Ventilatione illa fuligines pulmonum expiratione distillant, quæ cohibere suffocationem invehit.

OBSERVATIO XXVIII.

Suffocatio ab aneurismate aperto arteriæ magnæ sub corde.

R. P. Franc. Bertorius Metaph. Professor, ætate 56. annorum, 10. aut 12. annos pulsationem p. naturalem in sinistra thoracis parte, ubi cordis præcipue pulsus micat, passus est, quæ ab anatomis ignaris Cordis palpiratio censebatur: Ego vero accitus, coniecxi ipsum laborare aneurismate; ex quo postmodum, multis incassum tentatis remediis, noctu suffocatus obiit:

Dissecto cadavere, cavitatem thoracis dexteram sanguine repletam observavi, cui copia seri superfusa erat, Pulmonis dextri substantia consumpta & sola ejusdem superstitie membrana, instar sacculi: qua dissecta patuit membrana interna arteriæ magnæ, prius quidem laxata, postmodum verò, cum dissectioni nullus esset locus, disrupta: Aneurisma itaque fuit in arteria magna, extra cor duos solummodo digitos transversos: quo loco sanguis à sinistro ventriculo effusus, valido impulsu prius Internam disruptit membranam Internam dilatare: qui, cum nullum aliud pareret sparium, intra pulmonem dextrum sibi viam fecerat, ubi calore, motu & compressione substantiam ejusdem consumpsit. *P. de Marchettii observat. 48.*

S C H Q L I A.

Cordis palpitatio censetur] Quod coniecxi ex affectu dignitate & pertinacia: Nulla enim palpitatio cordis adeo continua est, quæ indaciam non concedat aliquam; alias Cor similem noxam tamdiu tolerare nequit, quæ illi sit essentialis: *Galenus* enim 1. de loc. aff. 2. ait motum eorum qui hæc specie corripuntur quinquagesimum annum superare posse: Nam cæteræ differentie palpitacionis, quæ ex fluctibus vel vaporibus facultatem irritantibus huius non necessario Interficiunt ante quinquagesimum.

OBSERVATIO XXIX.

Suffocatio à rupta vena in Pulmone & in eam effuso sanguine.

EX rupta vena fuit subito suffocatus Gaspar Ulrich aurifaber: scito ejus corpore omnis sanguis repertus est in Pulmone. *Observatio Joh. Hessi, Medici Norici.*

OBSERVATIO XXX.

Suffocatio à Pulmone inflammato, sinistro latere copiose aque imatante, dextro costis adhærente.

Vocatus Chan ad Priorem, Dom. de Jaillon, laborantem defluxione in Pulmonem, scapulas & thoracem, tussi, tensione ingenti ventriculi, ructibus, nausea, præcessit diarrhæa: à levi medicamento exerevit magnam copiam humorum biliosorum & pituitosorum

Rr

tosorum

tororum frententium : Nephriticus ac lithiasi nonnihil quoque tum vexabatur, arthritidi obnoxius April. 13. subito suffocatus : adveni paulo ante mortem cum esset in stertore :

Aperui cadaver, Pulmo dexter undique costis adnatus cernebatur, tumebat, ac durus ab inflammatione, In sinistro latere bene habebat, innarabat tamen copiosae aquae sanguinolentæ, quod à me nunquam fuit visum : In rene sinistro aliquot calculi, & unus magnus, occupans ureteris principium, deprehensi, magnitudinis amygdali cum cortice : dexter totus consumptus, in abdomine aqua. *Ex observ. Ioh. a. aubini.*

OBSERVATIO XXXI.

In juvenis ab ictu in pectore repente suffocati cadavere, reperti Pulmones plurimis lividis maculis conferti.

Juvenis temulentus, ictus vehementer in pectore, concidit repente attonitus in terram ceu fulmine confternans, & cum spiritu gravi, vomitu frequenti, voce suppressa, & spuma ram confertim ex ore emanante ut intra paucas horas amitteret vitæ usum.

Cujus inopinati eventus causa fuit, partim evidens calvariae rima, à casu exorta: Partim vero frequens sanguis effusus ubertim cum supra tum infra cerebri membranas : Sed Pulmo habebat plurimas lividas maculas : *Tulpii lib. 1. observ. 6.*

S C H O L I A.

Maculis] Adscribendas forte vel repentine suffocationi, vel Nicotianæ crebrius allumpe: Ad suffocationem quidem has referre suadebat cum spumæ tum livoris natura : Spuma quippe est spiritus & humorum mixtis : sique in morbo Acuto, vel ex distillante capitis pituita per aërem saesata: vel ex spirituofo oppressi pulmonis vapore : Priorem spumam plane innoxiam declarat quotidianus spumolæ epilepsiae ictus, Sed alteram lethalem repentinæ apoplecticorum mors, orta proculdubio ex adempto spiritu, sine quo ne momentum quidem subsistit homo : Cujus spumæ periculum propositorum Celsus, subiungit, Neque si ad vitam redi qui ex suspendis spumante ore detractus est. Quippe hanc spumam non producit Pulmo, nisi summe laborans, sive à resolutione humidis, sibi condique insit : sive à spiritibus, ob retentis vaporibus, impediamque respirationem adeo asservelescentibus, ut in extremo dissolutionis metu sit calidum inaratum : Quam luctam cum designat hæc spuma, quid mirum tam utique prælagie ineducibilem hanc mortem ? Inducitur enim post illam partibus obiectis, loco vividis coloris, obsecutus ac luridus livor, non secus ac a solis occasu tenebit, & à flammæ suffocatione carbonis nigredo : Livor enim sequitur, vel extinctionem, vel interceptionem spiritus ac caloris vitalis, Potuit itaque hæc repentina suffocatio has quidem produxisse maculas, sed rarius, cum occurrant in eorum Pulmonibus quos occidit morbus attonitus : & contra frequenter in illis quibus Nicotiana fuit in delictis : Labet autem hic exornare naturam illius sumi,

qui cœli permixtus & ore attractus tam bene facit ad mulorum palatum, Extra omnem controversiam aliam est, Nicotianam potui dæcam tantum adversari ventriculo ac intestinis, quantum prodest humido ac frigido cerebro : Sed dubitatur utrum fumus ipsius offendat Pulmones, calida quippe est planta, imo acris ac vellicans, sive natura, sive arte & ex pulvere, videlicet euphorbiæ, pyrethris, piperea aliorumve acrimæ aromatatum, linci casis, à frigidulæntis mercatoribus clanculum contortis ipsius foliis inspersis : quorum omnium vapore verisimile est non minus offendi pulmones, quam à raptim aërethæ ac piperea tinnia cerebrum sterturans : immodicus itaque calor ut exhaustis humidum radicale, sic obicitur nebulosus ipsius fumus non parum illustrem nostræ vitæ spiritum, imo suffocat tam efficaciter calidum inaratum, ut instat tabidum (quæ ex Gal. sententia à siccitate consumuntur) plane extenuentur, cum nulli petenni & insuperabili spiritus discurrat : quæ duo arguant inextinguibile oppressi pulmonis vitium : A quo equidem plurimos, qui dies ac noctes cum hac Helena transegerant, vidi pessundos : Moderata certe ut nullibi, sic neque hic culpantur : sed modum in hoc fumo si excesseris, defatigaberis à tussis, vitabitur pulmo, emarefcescet animus, & tandem consumetur corpus univèrsim : vel lente, si fueris integer ac valens ; vel celeriter, si quid viri albi sis in visceribus Sicut videre fuit in hoc agro : quem eo, proculdubio, citius strangulavit morbus attonitus, quo minus potuerit reluctari, & spiritum ab interiori vendicare exfucus ac maculosus pulmo. *Idem*

OBSERVATIO XXXII.

Suffocatio à sanguine grumoso cor replente, & abdomine humore distento.

Virgo 48. circiter annorum, jam per sex annos ægrotans, ex ingenti corporis intumescencia, ulnas duas & quartam unam in circumferentia superante, multis ab aliis incassum tentatis mensium acciōnem respicientibus, Suffocatione expiravit :

Abdomine aperto, mensuræ 46. humoris, non serosi sed muco instar effluebant : Omentum duplicatum omni ex parte saniosum, aliis officinæ naturalis visceribus optime constitutis. Naturæ lufum circa renes & vasa emulgencia animadverti, quatuor enim vena emulgentes in latere sinistro, non confusas nec intricatas, sed levi negotio superabiles deprehendi : Aperto thorace, dexter thoracis lobus ita costis adhaerebat, ut vix violente r

line

sine dilaceratione dimoveri posset : Cordis corpus grumoso repletum sanguine, quod in Suffocatione familiare. *Zacutus Praxii admir. lib. 2. obs. 63. ex Nic. Ruy. Beslero.*

OBSERVATIO XXXIII.

Suffocatio ob auriculas cordis & vasa, aqua & sanguine grumoso & nigro distenta.

FILIA 17. annorum orphana paralytica, sine manifesta causa suffocatur subito.

Secundo cadavere, cor Inveni duplo majus ordinario : auriculas ejus maximas, venas arteriasque aqua & sanguine nigro grumosoque admodum distentas : Ita ut diceres hanc hydropse thoracis laborasse : Res notatu digna, *nunquam antea deliquis*, cordis palpitatio laboraverit, nec unquam macula aut suspirabunda fuerit, neque circa cor dolorem sensit. *Nic. Fontanus, Responf. & curat. pag. 59.*

S C H O L I A.

NU quam animi deliquit } In corde plura eaque multo infusa innasci posse auctorum testimonium est : Aegros autem in quibus similia noxaverit semper ante mortem de syncope, leipthymia, catadigmo, palpitacione cordis, aut aliis thoracis affectionibus, ex quibus, veluti propinquo mali fomite, in cor continuo & veluti in cubem fecerunt consequentes audierunt : Quid ergo dicendum de hujus ægræ subitanæ mortis causa ? Eam non ad cor, sed ad pulmones, carianthali materia repletos referendum dicerem, sic & ad retobusum, debilitatum cerebrum & carianthum infusum : Quid eorum nunc hanc resolutionem concussam, & cerebro paribusque animalibus debilitatis, malam pituitosi sanguinis & crudi labutram pregenuisse, quæ in pulmones delata, orpote debilis, & magnum concitum cum patibus nervosis habentes, subitam

nonem (negato aëre libero cordi) introduxit : Et cum hæc in tanta copia, materia ichorosa & cruda in pulmonibus impasta esset, tam ultimo conatu, vi lenoque motu cum expelleret natum ad cor sibi vicinum ejusque ventriculos expulit, unde sinus cordis dilacerati, vasa disrupa, & sic magna sanguinis crudi copia in corde inventa est : Neque bonum argumentum quæpiam fecisse paro, qui mortis causam in cordis aff. dum retulerit, quod cor duplo amplius inventum sit, & auriculæ ejus majores quam in statu naturali : neque enim exilium circa noxam ullam, ut dixi, aut altitudinem cordis potuisse vivere filiam, quin de eo conquestus sit : Materiam ergo carianthia in cor insiliens mortem acceleravit, non concitius iuger sanguis, aut ichorosis humor, multo minus cordis molis, quam ego naturalem fuisse ovis dubio : *Idem idem.*

OBSERVATIO XXXIV.

Suffocatio à copiosiore pericardii humore indulta.

SÆPE in Pericardio copiosus humor colligitur qui Suffocationem affert & cor obruit. *Riolanus Encheir. lib. 3. c. 4.*

S C H O L I A.

AB illius aque augmento Cordis palpitacionem orti voluit *Galenus* 5. de loc. aff. & *Apuleius*. Verum copiam illius aque potius cordis motum impediri esse, non auctum ostendit *Riolanus*, cum sentiente *Hylano*.

Cor obruit } Si non possis exhaustive istud sermone per

hydriagoga, licetne Terebra sternum apostere intervallo pollicis à capillagine Xiphoidæ ? quia pericardium sui adnexum ad suspensionem cordis : Dabitur salus extra desperationem potior : Sanius est anceps remedium experiri quam nullum : Vbi nulla spectacula ovis ex machina. Deus assistit. *Riolanus docet.*

OBSERVATIO XXXV.

Suffocatio à materia alba circa cor in sanguine contenta.

INterfui apertioni cadaveris vitilis in Hospitali aulico Viennæ, in cujus dextro ventriculo cordis & vasis Pulmonicis, vena cava, portiones aliquot materię cujusdam albae, rercitis, renacisac viscosæ, spichamæ circiter longitudinis inventæ fuere : Similes quoque portiones, à cadaveris cujusdam corde ac vasis Pulmonalibus extractas, ad theatrum Anatomici Viennensis detulit D. D. *Schubert*. Ego materiam illam pro chylo crasso ac viscido habui, qui ob fermenti vitalis vitium ac debilitatem spiritusascere, volatilifari ac in sanguinem elaborari, nec ob crassitatem debite circulari poterit : Unde in vasis illis stagnans, formam illam oblongam contraxisse videtur : Nec dubito materiam hanc in cordis ventriculos vi propulsam una suffocationis ac mortis causam non minimam fuisse : *Ex observ. Georgii Sebas. Insigni Medici Viennensis in miscell. cur. anni 1670.*

S C H O L I A.

Observant jamdum quoque *Erasmus* concretionem in co. di. pituitum illam sententiam in istar medullar, quoniam in bonis coctis illis repetitur, ait Th. Bartholinus Anat. refoctus. l. 2. c. 7. p. 262. Et

in sinistro cordis ventriculo albicantem pinguiam vidit concretam *Fontanus* apud D. I. Danil. Hostium man. ad m. d. p. c. c. l. a. th. 5. Et materiam crassam, compactam, albam, latissimam admodum referentem in

Rg a finitiss

sinistra cordis auricula, *Rivinus* obs. 82. l. 1. Quod autem materia crassa, alba, in sanguine reperta fuerit circa cor, comprobatur eo facilius aliorum fidem, qui etiam in sanguine per V. S. ducto inveniuntur materiam albam egredientem, quam alii piuitam, alii Lac, alii chylum vocant: Sanguis ergo in Tertiaa duplici extractus & salivarella, plane albus fuit & glutinosus in modum pituitae, referent *Rhodo* cent. 1. obs. 36. videtur idem cent. 3. obs. 31. & *Borellus* cent. 3. obs. 25. Quidam chylum prodidisse putant in talibus venarum sectionibus: *Borellus* cent. 1. obs. 25. narrat vico febre maligna detento, vena secta sanguinem missum albedinem lactis retulisse: quod laesa vi sanguifica, chylum immoratum relinquentem accidisse creditur: Refert Collegium Regium Anglicanum ex *Lawson*, Virgii, postquam largius jentaculum sumpsisset circa 7. matutinam, venam sectam fuisse 11. ejusdem diei in pede, priorem sanguinem exceptum in pelvi,

brevi spatio totum album. evasisse: posteriore exceptum acetario, ex tempore albidum evasisse instar lactis gelati: post 5. vel 6. horas, cum qui erat in pelvi, partim fuisse sanguinem partim chylum, quibus serum album instar lactis supernatabat: Qui in acetario erat, metum fuisse chylum, sine minima apparentia gutte sanguinis, & cum separatim calefieret ad ignem, utrumque induratum fuisse instar albuminis ovi cum coquitur: aut instar fesi sanguinis quando calcit, sed multo candidius: Eam virginem, addidisse bonae valetudinis, sanguinemque misisse ob monstrum suppressa: Aliud ibidem erat exemplum Tom. 1. n. 8. p. 129. *Thoma* *Bay* miscebat sanguis, cui erat albus instar lactis, cum cecideret è brachio dilare rubebat, sed mox, cum in vas delaberetur, et albus: caesum redderet Medicus, quod arger multos edidit pilices: In scabioso sanguinem lactum vocavit *Borellus* lib. 2. obs. 25. Alia alibi prostant exempla.

OBSERVATIO XXXVI.

Suffocatio à nimia in toto pinguedinis redundantia.

Macie confectum vidimus puerum biennalem, *vide tit. de Pithiis*. Examinemus nunc pinguculum & crassiusculum, medio anno seniotem, qui nescio an alio morbo quam nimia pinguedinis copia obicit: Vidi candelam non raro nimia sua pinguedine extingui, praesertim dum flamma elychinii exigua debilius erat quam ut affluentis seu absumeret copiam: Idem hic factum si affirmem, omnes corporis partes sanæ & integre, sed pinguedine undique obrutæ, mox suffragabuntur sententiae: Si enim pueri exterior pellem tangeres, Indicem usque ad primi articuli finem imptimebas, interius autem exiles musculos pinguedo copiosa circumdabat & abscondebat: Aperto thorace, cor abesse faceret veterum quispiam, qui ea ratione populo imponebant, exclamasset, latebat enim ita pinguedine obvolutum, ut non appareret, hodieque à me aservatum sub eadem pinguedine delitescit, uti & pericardium, cujus membrana vix conspiciebatur: Inferior venter viscera omnia sana, sed omnia vix semelstis pueri magnitudinem exquantia dabat, ita erant omnia vix pinguedo, Omentum & mesenterium adeps pura: cum cerebro autem flaccido ventriculis inclusa erat aqua insipida: plexus chotoideus obsessus hydaridibus, quarum una ad nucis avellanæ excreverat magnitudinem: *Theod. Kerckringus* obs. *Anat.* 66.

S C H O L I A.

Suffocatio à nimia pinguedinis mole & incrementum contingit, quia sanguis pro motu cordis continuando debet suppeditari non potest, proinde in

vasis suis stagnare & congregare apens est, adeoque mortis repentinæ praesertim quibus natura eos vegetum & robustum non est obnoxios reddit.

§. 1. Si viscera interna propter pinguedinis copiam comprimentur, eorum actiones laeduntur: Id quam sit perniciosum vidi Coloniz Agrippinz in Illustri quadam femina, quam diuturno morbo mortuam esse nonnulli Medicorum, qui ipsi multa variae medicamentis praescripserunt, constanter asseverant, sed perperam, Ego enim cum *Clar. D. D. Joh. Slotano*, Colonienfi Medico, vocatus ut cadaver condiremus, sancte affirmare possum viscera omnia tam integra inventa fuisse, ut saniora in corpore videti posse vix credam, pinguedine veto erat adeo onerata & compressa ut officio suo fungi non potuerint: ut enim de monstruoso omento taceam, pro certo affirmare possum è regione lineæ albæ, secundum longitudinem abdominis facta incisione, pinguedinis spissitudinem spithamas duas excessisse: Pinguedinis itaque abundantia potius quam morbi violentia exitum fuisse matronam hancce à *D. D. Slotano*, aliisque multis qui dissectioni interfuerunt, statutum fuit. *Fabritius Hildanus* cent. 6. obs. 97.

APPENDIX.

Obesitas nimia Suffocationem minitans arte curata.

§. 1. **T**ribunus militaris sexagenario maior, abdomine tatarus & pinguedine nimia distentus aliis gravis, sibi invisus fit, cui malo cum varia quæsierit remedia, inedia, acida, exercitia, frustaneo eventu, novissime in mercurio dulci opera invenit: Progreditur enim pilulis mercurialibus ad eam paulatim dozina, ut apertis gingivarum laxitatibus Ptyalismus consequatur,

consequatur, nec is perfundioris, sed qualem in adultis Veneris nepotulus efflagitant medentes ut fœdam luem expuant: Per has vias Omasum sese exonerat & alacrem Tribunalum ad munia sueta reddit expeditiorem: Ex eo triennium integrum exigit ab infesto aqualiculi pondere liberum: Tandem redit sensum malum & quinto post anno novam curam deposcit, *Bartholinus in Actis Med. anni 1671. observ. 74.*

§. 1. Scipio Vitellius, celebris in historia Belgica, cum sub mediam ferme ætatem, in-
crescente adeo corporis mole ut fasciæ collo demissa sustinendus venter esset, immodi-
cè projectus, videret tardiorum quotidie reddi se ad belli munia, homo ad miliciam cun-
cta referens, vino sua sibi sponte interdicto, acetum exinde bibere ad vitæ usque finem
perseveravit: effectique ut detumescente abdomine, defluenteque ventris pelle, qua ipse
se thoracis instar obvolvebat, octoginta septem librarum decrevisse pondus compertus sit:
Strada l. de bello Belgico 8.

OBSERVATIO XXXVII.

*Suffocationis sensus ab abscessu sub ala sinistra, Suppuratione septi transversæ,
Pleura vitata.*

Virgo sexis dolotibus sub ala sinistra cruciabatur, expotrectis ad thoracis vertebrae
& imum ventrem, & non taro suffocari videbatur. Inventum est septum transver-
sum interiori parte suppuratum, pleura contaminata relaxata, cum abscessu sub ala sinistra:
Vide tit. de Lateris dolore.

OBSERVATIO XXXVIII.

*Suffocatio ab hydropse thoracis, Tympanite abdominis, Pulmonum vitio, Copiosa
in thorace pinguedine.*

Peruimus Dn. D. Dinckelius & ego Puellam hydropse thoracis suffocatam: nil aqua-
rum abdomen inundaverat, sed tanta flatuum moles intestina distenderat, ut vix factò
per musculos foramine magno conatu contenderint foras: Thorax plenissimus aquis:
Pulmones multis parvulis hydaridibus referti, pressi leniter copiosam sanielem fuderant:
pericardium, mediastinum, quin omnis fere thorax pinguedine obidebatur. *Ioh. Val. Wil-
lium in Actis med. Thoma Barthol. ann. 1674. 75. & 76. p. 134.*

OBSERVATIO XXXIX.

§. 1. *Anatome infantis repente suffocati, cuius Pulmones lateri dextro cohererant,
cum lecoris præternaturali magnitudine.*

ANNO 1674. mensis Februar. 21. Colonix puellus anniculus, filius Illustr. Dom. Eze-
chielis Spanhemii, S. S. Electoris Brandenburgico & Palarino à consiliis &c. post
quatríduanam ægrotationem suffocatus interiit.

Aperto cadavere; Pulmo dexter vitiatum deprehenditur, costis annexus: Jecur autem,
pro ætate, iustam magnitudinem excedebat: Quate judicarunt Medici Interitus causam,
tum compressioni diaphragmatis ab hepatis mole, Tum pulmonum vitio & coactioni, ob
quam libere explicare se non poterant, adscribendam esse.

§. 2. Vidua N. diu decubuit assidua febre affecta: percipiebatur tumor in abdomine
versus umbilicum, ad dextram partem inclinans: Aperto cadavere, inventum Hepar tu-
moribus scirrhisosis refertum: Torum pendebat 20. libras & amplius. *Vide lib. 3. Tit. de
ventris tumore.*

§. 3. Adolefcens Tertiana laborans subito suffocatus interiit: Hepar immani tumore
distentum erat: In Pulmonibus vomica pure prægnans. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

OBSERVATIO XL.

*Suffocatio ab insigni abscessuum magnitudine in imo ventre, diaphragma
sursum compellentium.*

Filiola N. insigni ventris tumore & tensione vexabatur, &c. Dissecto abdomine à sini-
stro laterelimenfæ molis abscessus repertus, ab apophysibus transversis vertebrarum
lumborum ortum ducens, deinde sub liene transiens totum id latus occupat &c. *A dextro
latere duo inde alii &c.* Abscessus illi ita sursum ad clavículas diaphragma impulerant, ut
duorum digitorum spatium pulmonibus non esset reliquum ad motum, quod causa ut ve-
lut suffocata obierit. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumoribus.*

S C H O L I A.

Ad *diversas diaphragma impulerant* &c.] *Clar. Bartholinus* censuit. 3. Epist. 76. dubitat an externa illo partis compressio eor ita possit adstringere & in angustam compellere ut statim ejus motus impediantur: Premii quidem sit in hypochondriaciis, scilicet uteris, hydropticis, strangulacione uteri, sed tum vel lentum motum inducere, vel interno humorum vaporumque affluxu accedente necem accelerare, tumque copia sua vel cor vel pulmones implere: Piltosum asthmaticum, summa ingluvie copiosius ingesta, cocta scilicet cum pane cerevisia, suffocatum obisse existimat, non intercepto diaphragmate, hinc con-

dis pulmonum motu, sed copioso chylis, celestiter propter aviditatem cocto, & cordi insulo, cujus partem pulmones obstruendi nequiverunt recipere: alioqui si tardior fusta fuisset coctio, vel distibutio, diaphragma motum in lacteis transisset alimentum, copia pulmo & cor obitum non fuisset: Revera aeream si ad eam alacritatem afflatus diaphragma, ob affectus inferioris ventris, ut & ipsius motus omnino prohibeant, simulque pulmones in eas cogantur angustias, ut neque ipsi cordi libero moto huius concedatur, suffocationem ab ea causa posse oriri quis dubitaret?

OBSERVATIO XLI.

Suffocatio excitata à tenuium intestinorum per vulnus diaphragmatis in thoracem ingressu.

Cuidam cultellus inter quattam & quintam costam adigitur: Inventum fuit diaphragma omnino perfectum, tenuiaque intestina in thoracis cavum irreperant, Pulmonemque & cor suffocarunt. *Vide lib. 4. tit. de vulneribus.*

OBSERVATIO XLII.

Suffocatio orta ab utriculo utero adnato, diaphragma opprimente.

Foemina diu ventrem tumidum gessit instar praegnantis, atque obici praefocata brevi temporis spatio: Uteri fundo extimo adhaerens erat utriculus, ventris capacitatem explens & diaphragma premens. *Vide tit. de ventris tumore.*

OBSERVATIO XLIII.

Suffocationis suspicio in infante, praesentibus illius notis, mortuo ob compressum manibus caput.

Memini me ante aliquot annos in curiam Cassellanam vocatum, ob infantem nuperime editum, mortuum, & in fasciculo stramineo repertum, cujus caput, humeri & pedes plane nigra erant; nares sanguine stillabant, propendulum intestinum rectum extra abdomen: Apertum corpusculum viscera omnia optime constituta repraesentabat, nisi quod pulmones flaribus turgidi erant, tumida & nigra etiam lingua, & circulus rubicundi coloris circa collum, ita ut Ego & Chirurgus iudicium de suffocato infante tulerimus, licet puerpera postmodum capta nostrum errorem ipsamet detexerit, & se tenerimum infantis cranium manibus compressisse, & ita occidisse confessa fuerit: quod nostrum erroneum iudicium in eo excusationem merebatur, quod Iudex apertionem capitis concedere noluerit, quoniam infaus ante occasum solis adhuc erat sepeliendus, vesper appropinquabat, & ne portae civitatis clauderentur metus erat, sufficentia satis suffocati infantis indicia adesse putans, & adhuc infelix illa meretrix tam altitudo & artificiose iterum cranium adapeverat, ut exterius, extra cutis nigredinem, nihil vitiatae conformationis in conspectum venerit. *Ex communicatione Excellent. & Clariss. D. D. Ludov. Hermanns Combach, aula Hassiae Medici, die 17. Martii 1675.*

S C H O L I A.

Revera suffocatus interit infans, Suffocatiois enim expressa indicia adhaerent, quanquam nec causa a compressione capitis ortum duxerit: Tenella enim cranii ossa, & adhuc membrae, premens manibus citra fracturam cesserant, hinc subditi cerebri sinus, per duram materem excurrentes, cum nec sanguinem per arterias advectum, ob angu-

stiam admittere potuerint, nec superfluum in vena jugulares, retrudere, factum est ut in vasis illis coagulans concreverit, livoremque & nigredinem partibus superioribus induxerit: Idem libere per pulmones circulari cum nequirit, inde illorum tumores, adeo ut infans eorum mox interierit, quos suffocans conspicit Carathus.

OBSERVATIO XLIV.

In aquis qui suffocantur, moriuntur, non quod aqua multa ventriculum subeat; sed quia aer ad respirationem necessarius pulmones non subeat.

Eos qui aquis immerfi moriuntur, non quod aquam affarim & nimium hibant, ut vulgo creditur, sed quia suffocantur, extingui sic probatur: Quod aqua nonnisi per degluti-

deglutitionem ventriculorum nostrum subire possit: deglutitio autem, cum motus sit ex arbitrio nostro pendens, cohiberi ne fiat, atque in aqua atque extra eam, nec ad eam tunc impelli possit, etsi forte aliquid deglutatur, in hac necessitate & agitatione tamen parum illud esse liquet, quod patientem tam cito interimere minime valeret, *Sic utinam suffocatorium in aqua ventriculis observatum à me aliquoties fuit, in quibus paululum aqua fuit inventum.* Eamque aquam quæ inverso corpore ab illis qui ex aquis extrahuntur destillat, à vclibus porius desilire certum est: Quamobrem quod aeris per respirationem ab aqua intercedente attractio impedita sit, cum aer attrahi deberet, aqua illius loco in asperam arteriam illabatur causa suffocationis illius, illaque mortis exiit. *Platerus Quæst. Patholog. 55.*

OBSERVATIO XLV.

Pueri fulmine occisi meninges sulphureis maculis tinctæ repertæ sunt, sulphuris odorem emittentes.

Puerum olim vidi fulmine occisum dum dormiret, qui nec digiti inde articulum movit: Invenimus autem cerebri panniculos in secto huius cadavere sulphureis tam odore quam colore maculis tinctos. *Nardus Antonius Recchius.*

S C H O L I A.

Sunt qui sentit eos qui noxio aëre hausto, musti scilicet venis, carbonum, cloacarum &c. extinguntur, illam auram per tribiformia foramina penetrare & cerebrium lethaliter affligere; quam opinionem quidam vehementer probant, inter quos principem locum tener M. Donatus, quem sequitur D. D. Sennerius, nam hic de vapore narcotico, unde oritur Apoplexia, verba faciens, Maxime ventrari, *inquit*, consentaneum est vapores illos, seu fumos à carbonibus accensis, multo & cerevisia exhalantes, aëri permisceri, & sic cum spiritu quem doctus, attrahi, atque ad cerebrum penetrare, ibique spiritibus animalibus misceri, & eos à nervis suis immutare & ad officium suum ineptos reddere: Addit *Reuchius*, hi qui vel multo, vel fumo carbonum motuuntur, placidissime moriuntur: Quod causis etiam in aëro illo, dicto *La gratta de cani* una venit, & in *puero* supra dicto, qui nec digiti articulum movit: Si enim horum quisque ex Pulmonibus ac cordis, & non cerebri porius atque animalium spirituum suffocatione moreretur, ne ille brachiorum jactatione, sibilum attractione, & rotis corporis denique agitatione atque labore molestaretur: *Sunt* qui sentit Cerebrum, & simul Cor & Pulmones tali vapore affligi: Quam in opinionem Dominicus Terribus differt: Licet, *ait*, in universum rota animalium corpora ab aëre alterentur, due tamen partes principales, à quibus postea totum corpus bene & male habet, alterationem recipiant: Aër namque inspiratus bifariam partitur, altera quidem minore sui parte per nates ad cerebrum devehitur, pro spiritibus animalis generatione: Altera vero majori per asperam arteriam ad pulmones pro symmetria caloris nativi servanda, pro refrigeratione equali em, pro spirituum vitalium assidua regeneratione: Defertur etiam ad eor aliqui aeris paulo, cum distenditur cor ut expleatur, facta fuliginem evacuatione, quod ex magnitudine distensionis sufficienter indicatur, alius datur vacuum in cordis cavitatibus. Cùm ex dictis patet aërem maxime necessarium vitæ & conservationis vitalis caloris, qui est viæ instrumentum, existere, & corpora nostra ex necessitate alterare, cum data præcipuas partes ingreditur, & contingat cor & cerebrum, facile modo erit ex dictis videre quomodo aër suffocare, & animalibus respira-

tionem interciperi assiam possit: Nam si aër per angustas pulmonum vias, asperæque arterie ramulos, per subitaneam ipsorum divaricationem, facile penetrare & recipi debet, tam & impemissum necessarium esse congruum est, non etiam, non fuliginosum, non à carbonum fumo contaminatum, non caliginosum, à quibus causis profecto animal suffocatur, & de repente brevi temporis spatio morietur, *Cordis* debita privato extensione, necessarioque calidi innati refrigerio: talis enim crassities angustas arteriolas permeare non potest: Si quoque nimis copiose attrahatur, vel ingreditur, idem suffocationis discrimen affert, ut si quis per vias maximo veniarum perspiratiles patentes, ore ejus appositus ambulet, aut suffocabitur, aut suffocationis periculum perferent: Vel si quis per longum temporis spatium aërem introspiciat, absque ulla expirationis interpositione, idem discrimen experietur: Aër etiam calidus hum. extimie, ut in balneo; vel calidus siccus, ut in Laconico, maxime si sit fumus carbonum, si diutius aliquis ibi moreretur, assiam suffocando interficere potest &c. *Hæc Terribus:* Apud *Paracelsum* quoque disputatur prolixius in utramque partem, ad extremum autem assensit utrumque vicius ladi: Quam opinionem & *Solander* amplectitur, *Nos* vero arbitramur tali vapore Pulmones & Cor unice affligi, quamvis eo violente afflicto etiam Cerebrum tandem laedatur: Cum enim viscera, præsertim cor & jecur, vapore illo noxio occupata sunt, iisque negetur refrigerium, membrana ventriculi conestantur, & ex assante calore spiritus suffocantur: Nobiscum quoque facit *Galenus* 7. de 5. part. 8. Spiritus, *ait*, qui ab asperis arteriis extrinsecus trahitur, in Pulmonis quidem carne primo conficitur, postea vero in corde atque uterino, & illi maxime que in plexu sunt testiformi, altimum ac perfectissimum in cerebri ventriculis: *Hæc Galenus:* Confusio narium & cerebri hunc errorem fecerunt, ut traditum sit aërem per eas ad cerebrum ire. Quis enim nates à cerebro proxime absum, continuo creditur huius aërem ibi capi, & ad cerebrum vehi, Sed longe secus est, Narium meatus unice ad meum fert, qui dilatati cum haustibus avidè &c.

C. F. Schneiderus lib. 2. de sensibus c. 1.

ANATOMIÆ PRACTICÆ


LIBRI SECVNDI

SECTIO III.

DE TVSSI.

OBSERVATIO I.

Tussis excitata à vitio Pulmonis dextri, prope assumpti, sinistri inflammati, costis agglutinati, Pectoris hydropo &c.

 EORGIUS N. Tussi aliquot mensibus vexatus est, Inveni pectus plenum serosis humoris: Pulmonis dextram partem prope assumptam; Sinistram non medio-criter inflammatam. *Vide tit. de Cordis Palpitatione.*

SCHOLIA

Tussis defecit potest, quod sit Expiratio vehemens, crebrior, inæqualis & sonora, propter cuiusdam molesti & irritantis aut sedationem, aut è Pulmonibus, per Tracheæ ductus expulsiorem, excitata: Quippe aër violentè exclusus, & in transitu ad ductum trachealem latera allicius, quicquid illi ubi impetum est, si facile mobile fuerit, ducit & absterget, & non raro foras amandat. Ad Tussim excitandam, tum musculi thoracem contrahentes, tum bronchioeum fibræ motrices intima *membrana* lo-mota concurrunt: Quippe illi dum pectoris cavitatem coarctant, ac undique totos pulmones compingunt, hi ductus tracheales, modo hos modo filios contrahendo, & à sergio aërem, dum foras propellunt, occludendo, expulsiorem ejus citiorem & vehementiorem moluntur: Omnem Tussis actum inspiratio subita intensior præcedit, nempe ut aër io majore copia admissus, itatim violentius explodi possit: in quo nisu non tantum recens, qui modo inspiratur, sed etiam vetus, intra veticulas tracheales antea aggestus, ad augendum spiritus exitum una exploditur: cunctaque non primo impetu quod molestum est, sedatur, aut moveatur, busulmodi vehemens expiratio crebra vice usque ad magnam naturæ fatigationem iteratur.

Tussis cuiuscunque causæ primaria est nervorum aut fibrarum, ad pulmones pertinentium, irritatio: De nervis oblatere est, quod non tantum tamè & propagines eorum pulmonibus inserti, verum alii è quibus oriuntur illi, aut quibuscum intime commu-

nicaot, in locis à pectore distitis læcessit, illico tussim accient: quam ob causam sæpe humor acris inna *tracheæ* aggestus, inleque in capicillo nervorum pectoralium decumbens, tussim molestissimam aut affectus athmaticos inferre solet: Propter eandem rationem molestia naibus, palato aut gula iussita, tussim, seu potius tussendi uixam, licet inanem concitat, Pacum insuper scet ex arteriis, in palæ aut laryngis partes superiores exitans, absque notabili pulmonum noxa, tussim crebriam & valde molestam producit: At vero hæc irritatio, nervis ac fibris in ipso pulmone distributis insidita, crebris & quidem inmanibus tussendi oiaum provocat, qui per vices iteratur, docec quod molestum est foras exersitur, aut irritatio ejus compescitur: Causæ irritativæ Tussim inducentes, & sunt multiplices & variis in locis consistunt: præterquam enim quod neci, prout modo innuimus, insuper & membrana, quibus intima cum pulmonibus commuicatio est, in nare patulo, aliisque in locis irritatæ pathema illud è longinquo pulmonibus imprimant. Sæpiissime expiratio ista irregularis propter aliquid incongruum, aut aliquomodo improporcionatum, pulmonibus impactum excitatur: quippe molestia hujus amovendi gratia, imprimis nervi fibræque oeræ circa pulmones dispersæ irritantur: dein, horum consensu, musculi pectoris contractivi, simulque tracheæ fibræ motrices in coarctationes vehementes & crebro iterandas adiguntur. *Wille Pharmat. rat. p. 1.*

Id. l. 6. p. 3.

OBSERVATIO II.

Tussis ab humore lulentento intra Pulmones conclusa.

Iustr. N. diu languidus fuit cum febre lenta & Tussi: Pulmones summe graves erant, lob humorem lulententum in tis inclusum citra ulcus. *Vide tit. de Phibisi.*

SCHOLIA.

O *humorem lulententum* Tussis omnis vel humida est vel sicca: in priore humor quidam alacri intra ductus tracheales depositus tussiendo succentur, sursumque in os foras excrendis ejicitur: Humor iste cum multiplex & diversimodis exitat,

ut plurimum dicatur vel serosus, vel nutritius, vel purulentus, vel sanguineus: Prioris plures sunt species & differentie, nempe, quoad consistentiã, aut tenuitatem, aut crassum, aut sive crudus vel concoctus, Quoad colorem, aut albus, aut flavus, aut subviridis, quoadque

doque item casus aut ater : Porro Tussis humida varie distinguitur, quoad loca in quibus humor catul-
fendus procedit : quandoque colim laryngis parietibus adhærescent, aut iis exstant, fibræ motuibus per lenem tussiculam succussis, facile ac levi transi-
tu in os ejiciunt : Interdum maxime excrentia paulo
aliquis hionchiorum tubis impacta, nonnisi per expl-

rationes magnus & crebro repetitis : Denique oon-
nunquam accidit recrementsa ejicienda intra tracheæ
vesiculas ultimas deponi, in quibus non sine vehemen-
te & crebrius iterato tossiendi labore educiunt, &
dein longo per rotos pulmones icinere, foras propul-
liunt : De Tussi humoris ovisitii, item sanguinei &
purulei postea cum de Plethisi agemus. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO III.

Levis Tussicula in magno Pulmonum & Thoracis affectu, cum hydropo & empyemate &c.

S Erenius. Venetorum Dux, Franciscus Contarenius, incidit in febrem typum duplicis
tertianæ servans : Inter alia symptomata aderat quoque levis Tussicula, quæ è fauci-
bus videbatur aliquid pituitæ cæstæ reddi : Mortui aperto cadavere, præter alia vitia, In
cavitate pectoris Æv. circiter aquosæ materiæ repertæ : Dextra Pulmonis pars flaccida
videbatur, crasso & mucoso humore opplera : Sinistra prorsus resoluta erat in saniem al-
bicantem, quæ tunica Pulmonis tanquam in sacco continebatur, Ea dissecta effluxit in ca-
vitatem thoracis sanies ad 3xvi. circiter : Plane nullum pulmonis vestigium sinistro latere,
præter membranz, (quæ costis adhærebat) indicium relictum erat : Hæc quamquam ita
se haberent, *Tussis nunquam fuit continua*, imo aliquando integris horis, etiam paulo ante
obitum, non tussiebat, unde arguebant quidam in thorace nihil noxium contineri : multo
minus in profundis partibus Pulmonum, Et potius concludebant leve faucium irritamen-
tum, ex aliquo decubitu catarrhi, Tussiculam efficere : Illam vero, quæ aliquando cum la-
bore fiebat, sed raro, Pulmonum siccitatem causam habere, impediens liberam con-
tractionem, ad expulsiorem aliquarum catarrhi reliquiarum, deorsum labentis per asperam
arteriam. *Vide historiam integram tit. de Febr. lib. 4.*

S C H O L I A.

T *ussis nunquam fuit continua, &c.*] Quæstio oritur
possit cur, cum tanta copia materiæ purulenz
in thoracis capacitate contineretur, non multum
tussiebat, & nihil illius materiæ educeretur ? Solu-
tionem vide Titulo de Plethisi ex Ballonio.

OBSERVATIO IV.

Sicca Tussis à Pulmonum vasis & substantia statu distentis.

A B halitibus acidis per lacteas venas in cor, hinc & Pulmones pertingentibus, ibi-
demque hærentibus, non tantum respiratio difficilis, sed sicca quoque Tussis excita-
ri potest ac sæpe solet : Cujus rei confirmationem habuimus non semel in Nosocomio
publico, & alibi in dissectione cadaverum, repertis adhuc Pulmonum vasis & parenchyma-
te statu distentis. *Regn. de Graef Exercit. de Succo Pancreatico cap. 2. §. 182.*

OBSERVATIO V.

Tussis ab inflammatis, postea suppuratis Pulmonibus, & pleura latere sinistro.

F lliola Dom. Florzi, cum sub dio partim in Sole versata esset, dolere caput cœpit &
Tussire : febrisprehendit acuta, & quæ tamen ex intervallis major esse videretur,
omnes noctes plenæ molestiarum fuerunt : maxime enim ad sextam serotinam & febris &
reliqua exacerbabantur : jactabatur, nullo consilitebat loco, Tussis & Tussendi cupiditas
illam perpetuo infestabat, Nil è pulmone educere poterat tamen si esset stridula : In
pulmone humoris concursatio quæ observaretur : Sitis erat ingens & implacabilis, sic quens
& brevis respiratio cum difficultate : *Postquam tussiverat statim ejulabat* : aliquando in par-
tibus extremis febris mitescere videbatur, imo leniter perfrigerabantur ac si nova foret ac-
cessio, sed illud fallax fuit : Pugnabatur cum febre & Tussi, quod eam partim à capite exci-
tari crederemus, partim à refudatione ichoris à calefacta pituita in pulmone : Octavo die
symptomaticus alvi fluor, nono interijt.

Aperto cadavere, latus sinistrum purulentum erat, & pars pulmonis, quæ illud contin-
geret, imo & pus in cavitate fufum erat. *G. Ballonius cons. 76. lib. 1.*

S C H O L I A.

P *ostquam tussiverat statim ejulabat.*] Et hoc erat ar-
gumentum pleurididis : Exemplum domesticum
mihi præbuit anno 1662. filius meus L. Andreas, sex
menfes natus, ab alio morbo denatus : Acute febrie-
bat cum tussi valida, quam statim excipiebat ejulatus,
ut & si latus sinistrum costringeretur, non item dex-
trum, unde suspicio nata pleurididis : quia robustis-
simus erat, & bienni non inferior cum magnitudine
tumi

rum ob ore brachio, quod erat è directo lateris affe-
cti, dunt affligi jubeo hirudines, à quibus protinus re-
missis dolor ac febris, ac postmodò sanus redditus est.

Levis fuisse purulentam & part Pulmonis Est.

Quod sine exulceratione fieri potest, alias Phthisis
semper sequeretur: Saepe enim sanguinem uti & alios
humores, in pus abire, citra patris substantiae suppu-
rationem ostendunt oculi pure sordidi.

Quod eam à capite exarari crederemus Nos valde
decepti fuimus existimantes Tussim à capite
esse; Sed quod tam frequens esset & sicca, &
cum difficultate spirandi juncta, illud inflammatio-
nem aut in latere, aut in Pulmone, aut in utroque sa-
tis significare poterat: Tamen unum desiderabat
ut agra de dolore lateris quiesceret: hoc expectaba-
mus, interea ignorantiae rei praesidium in inflamma-
tionibus thoracis usurpavi solum magno incommo-
do omittimus: Et si illud usurpavissimus, certis signis
requerentes affequei utra pars esset affecta, è latere
dextro (singulorum nullo profectu detrahissemus: Itaque
postea periclitari & morosis maximam peti-
culi partem creavi: Rubor genarum non erat, ta-
men fere perpetuo adest in inflammatione partium
thoracis: Item aliquando clauso ore dormiebat,
quod nos in eam adduxit opinionem ut crederemus
costas non esse obfensas, sed omnis ratio ista nos de-
cepti valde: Tamen vix excusari possumus quin san-
guinem demere debuerimus, cum inflammationis in
thorace magna esset suspicio: Ad sectionem venae &
ingens febris, & inflammationis suspicio, & sitis in-
extinguibilia, & jactationes ob incendium nae, &
maxime difficiles illa spirandi horae debebant:
Nam cum difficultas differenter à motu ipso suman-
tur, ut velox itaque respiratio dicatur, A materia
calida & frigida; A thorace magna parva: A quiete,
densa, rara: quemadmodum magna & siueque in-
cendium in corde arguit; magna & rara delirium
parva & frequens in febris, aut oedema, aut im-
pedimentum in thorace, ut inflammationem aut quid
simile: Cum videremus ingenui pueri ætate æstu, puel-
lam habere frequentem admodum respirationem, &
tamen parvam, veluti oppressa & coarctata thora-
ce, de inflammatione aliqua suspicari nos oportebat:
Tamen hoc affectum sæpe non observasse in pueris
valde febricitantibus frequenter parvamque respira-
tionem, licet affectus thoracis non esset: Sed nonnun-
quam magna intercidit respiratio, in omnem dimen-
sionem dilatata thorace: At in hac puella nihil tale
observavimus, imò cum dilatata thoracem vellet, sub-
sistebat quodammodo & vociferabatur. Hæc à nobis
eo consilio scribuntur, ut cum alias, tum maxime

puerorum curam suscipientes, tanto diligentiores lo-
corum morbis nos præsumamus, quanto minus certos
de suorum affectionum ideas reddere nos solent: Imò
cum pueris, tanquam cum moris ægris nos rem ha-
bere existimemus, ut quoniam ex relatione, quæ ta-
men in dignoscendis morbis plurimi scienda est, nil
certi nihilque pensabimus, aliis conjecturis signis
& symptomatum ob evanitionibus nitamur, alioquin
puerorum filios valde periclitamur: Nec enim ab ista
agra pacilla expectandum erat ut dolorem lateris
pungentem quiesceret, quo secunde venæ occasio-
nem porrigeret, sed aliis modis res erat allequenda
Notandum

Tametsi esset frigida Unde, & ex obaudita humoris
in Pulmone congesta ione, Pulmonem affici con-
jiciendum erat. Stertor enim ob lesam Pulmonem
coningit, Tunc enim, ut se *Janus*, oboritur steror
cum in brachiis, æris coceptaculis, materiam ferret;
Hippoc. 5. Epid. Peripneumoniam sterototam fuisse
ait: Et in Coacis ait Anxie iterere ipsi copiam in
Pulmone significare. *Idem* studem.

Credendum Tussim à capite exarari Piruotam ma-
teriam, nunc eisdem nunc pusulentam, nunc tenacem
& vitcolam, alias sublidam, alias subvidiam
quæ Tussis, à sensibus præsertim & hyemis tempore
excitatur, non semper à cerebri excrementis à capite
in pulmones destillantibus, sed ab excrementis quo-
que in Pulmonibus continuo congestis proficisci, il-
lud docet, quod quemadmodum sterototam propter
valutum copiam continuo superfluitatibus caret,
tunc maxime quando sanguis impetior est, cerebrum
que imbecillius, ita & pulmones quæ valis innume-
ris constant, sanguine omnino redundant, si cacochy-
mia sit corporis continuo ejusmodi excrementa col-
ligunt, eaque in minoribus vasis in majores aspera
arterie ramos protrudunt, è quibus dein una cum
excrementis, defusione hæc delata, nulli rejiciuntur,
hæc accedit quod tanta copia pueris, quæ quotidie
excreant, ita exire continuo in pulmones de-
fluere, perpetua tussis, ob deluentem materiam a pe-
ramque arteriam trullantem, homo diu xareat,
periclitum si maligna, qualis fere reperitur, existere:
Unde magnam illius portionem in pulmonibus con-
gecti, atque eam quæ à capite delatam remanet, mox
diuturna in pulmonibus mucosam viscosamque feri
judicamus. *Plateri quæstion. Patholog.* 51.

Plenus fuit Vel potius, Pleurisyne monia, nam
præterquam quod lesionis in Pulmonibus indicia
hære, symptomata eos affectos esse clare argue-
bant, steror, humoris congestio, sitis ingens,
febris acuta & alia.

OBSERVATIO VI.

*Tussica Bovis lues ob vitium Pulmonum, vel costas firmier annexorum, vel tandem
absumptorum & deficientium.*

IN Tussientibus Bovibus anno 1660 mactatis, Pulmones vel deficere observavimus, & ma-
xima sui parte absumptos, vel costas firmier annexos.

SCHOLIA.

NE ea pestis jumenta inficiat, rabiesque consumat,
expectum ex veterinariis nostris remedium pro-
ducam, quod raro fallere mulæ anni hujus experien-
tiæ, quærum quomodo sum testis, testantur, 7. Anti-
monii 3j. sulphuris 3j. Tere utrumque, per se & cri-
bro percola: Tum sume pulverem contritum, &
cerevisiam calidam, vel fontanæ, & invicem omnia
subige, ut fiat massa ovi gallinæ magnitudine, vel

pulmentum: Bovi hæc per os diffunde, capite bene
elevato donec deglutiverit: Æget Bos vel Vacca
tussica vesperi domi continentia, ut nihil illa nocte
comodat: Mane vero exhibetur jumento prædictum
remedium, nec eo die & nocte sequenti quicquam
pabuli concedendum: Postmodò edat bibatque: Ju-
nior bos media dozi contentus fuisse vacca impa-
rata fere conceptum rejicit, solet hæc Medicina
lagus

largius ventrem movere: Potest etiam sanis animabus injici, ut à rabe & tussi præservet; Notandum vero ut accuratè expendantur dozes pro lingua-

lis jumentis: Sulphur ad sufficentes quoque laudet *Pegrum* lib. 3. veterin. cap. 68. *Bartholinus* cent. 6. *liber*. 97.

OBSERVATIO VII.

Tussis excitata à Pulmonibus sanguine stagnante infarctis.

Filius Nobil. febricula, Dyspnœa, Tussi &c. fatigabatur: Pulmones illi sanguine stagnante infarcti reperiuntur. *Vide ut. de Dyspnœa.*

S C H O L I A.

Pulmones sanguine stagnante infarcti] Tussis sicca interdum naturæ instinctu, velot audit loco excitatur, nimirum ut sanguis, vel ubi propriam dylicrasiam, vel ob vala pneumonica non satis patentia, pulmones ægæ pertransiens, partium harum succo, si promovetur, ac in motum rapidiorem urgei possit:

Willa Rorrm. rat. part. 2. s. 1. cap. 3. Quod si beneficio tussis sanguinis stagnatio impediatur, cur huic puellæ accidit? Dic causas quæ sanguinis liberum exitum prohibent, angustiam scilicet vel sanguinis copiam, validiores fuisse, quoniam ut Tussis illam promovetur, vel in gere ponatur:

APPENDIX.

Tussis diuturnam dilatatio varicosa vasorum Pulmonum sequitur.

Pulmo sæpe Tussi vexatur, modo mediocri modo vehementi, quæ anhela est, ac penè suffocans, à catarrho ferino, sive subita fluxione & copiosa: Inde ex Tussi molestissima quætiante Pulmones oritur Spadon vasorum, sive dilatatio varicosa, quæ species est Aneurismatis periculosa & formidabilis. *Riolanus Encheir.* lib. 3. cap. 6.

S C H O L I A.

Dilatatio varicosa,] *Xpœr* vocat Paulus lib. 6. c. 82. venæ dilationem ab affluu humoris copiosi & crassi cui negatus exitus: Omnis enim copiosior sanguinis in venam confusus, cui illuxus non conceditur, varices facit: Idem Paulus quædam eorum sedes in corpore statuit, tempora, partes infra umbilicum, testes de scrotum, postremo cunctas, quibus palpebras adjungit *Aërias*: Vasciculis Pulmonis totus meminit Hippocr. 1. de morbis duobus in locis, primo ait, ex venæ spasmate, si omnino iuxta non fuerit, fieti spadonem, id est, distensionem similem varici: Et paulo post, à labore æque violemia venæ fieri distensionem, quæ si omnino iuxta non fuerit, est quasi varix: Hinc collige Vascicem Pulmonis ortum habere à spasmate, h. e. definiente *Gloria*, solatione continui in parte nervosa circa vulnerationem: Distinctio tamen adhibenda, quod vena in spasmate patitur tantum distensionem in longum, propter oer-

volas fibras quas habet: ut in vitæ vena patitur distensionem in longum & laevum, propter multitudinem & crassitudinem affluoris materie: Libro autem de morbis internis sic describitur ab eodem Hippocr. textu 5. *Si in Pulmone varix sit, Tussis sicca apprehendit, & rigor & fibra in principio morbi, omnino cum impetu & vehementer: habet autem & erisipelas: & in capite confusa (causa morbi) & supercilia videntur suffundi, & tumor pervenit ad faciem, & ad pedes & ad pedes, sæpe etiam (tumoris materia) in caput decumbit, & videre non potest pro dolore, cum labor habet, & corpus suppalidum, & vena aut inflammata, aut nigra extensionem patitur in ipso corpore.* Ex venis autem vasciculis, quæ priores occupant sedes, quod corpus extonerent, ex salutaribus esse queunt: quæ vero pulmones obident, partem ad vitam maxime necessariam, eo in censu habende non sunt.

OBSERVATIO VIII.

Tussis à tuberculo Pulmoni adnato, cum sanguinis copia ad pulmones offluente.

DN. incidit in sputum sanguinis cum Tussi &c. Inventum tuberculum crudum adnatum Pulmoni, ex materia ram acri natum, ut adjacentis costæ fere mediam partem consumpserit: Omnis etiam sanguis redibat in pulmone collectus, cum cæteræ partes viderentur exangues. *Vide ut. de Hæmoptysi.*

OBSERVATIO IX.

Tussis à tuberculis Pulmones obidentibus.

Nobil. N. varilis affectibus fatigatus, tandem dyspnœa, Tussis continua & violenta, hinc tabes supervenit, &c. Huic Pulmones utrinque numerosis tuberculis, variz magnitudinis, instar coryliconum vaccarum, scatebant, quorum unum uncias duas pendebat &c. *Vide ut. de Phthisi.*

quasi (uod dicitur) herba suffocaretur. Sed cupis curæ auspicio & iurio, præter omnem spem & opinionem, patiens duos calculos inter tussendum me præfente rejiciebat, cum ræretia purulenta cruore nonnihil tincta; Hisce visis & petulatis, pulmonum subitariam hujuscemodi calculis referam esse, haud obscure colligere potui. Quæ prope cum plures subinde ejusdem farinae per intervalla dierum rejicerentur calculi, materiam purulenta, viridem & subflavam referente colorem, fætoris haud expertem, ulcerationem pulmonum innueret, in eam incipiti casu alium etiam medicum accersendum curavi: communicato invicem consilio, dubique spæi relicto prognostico, seledissimis & pretiosissimis contra hostem hunc pugnarum est remediis, sed frustra & incaum tentatis omnibus. Quippe per octodecim septimanarum spatium durante affectu concurrente sub finem morbi & vitæ etiam *abdominis & pedum tumore*, Hydropem ascien præfagiente, omnemque medicamentorum vim eludente, tandem strue hac calculorum (prout ocularis inspectio docuit) oppressus, membrisque omnibus fessus, Juvenis illædem suum obiit.

Aperto cadavre libras aliquot aquæ in abdomine fluctuantis emisimus; Demum inspectis diligenter visceribus, præsertim Pulmonibus, prohi Deum: tantum calculorum diversæ magnitudinis agmen, in illis maximam quidem partem *exulcerati*, repertum est, ut aliquot centum erueri ex illis quis potuisset: Imo, vera scribo, in tanta copia apparuere, ac si manu seminantis injecti fuissent. *Hepar induratum & quasi elixatum* conspiciebatur. Cæteris visceribus, quantum judicare licuit, salvis & illæsis.

§. 2. Non abimilem in substantia Pulmonum germinantem calculorum prolem aluit Parens defuncti studiosi. Idcirco ex semine, morbois hujusmodi rincturis inquinato, per hæreditariam dispositionem in filium etiam hunc affectum derivatum & propagatum esse nemo facile negatum ibit: Huc quadrare videtur illud.

*Qui vires in foliis venit à radicibus humer,
Sic Patrum in nato veniunt cum semine morbi.*

Ioh. Fri der. Haldenreichius in miscell. cur ann. 6. & 7. p. 326.

OBSERVATIO XIV.

Tussis multiplices Pulmonum affectus sequuta.

§. 1. **P**Uella paulatim in tabem incidens, Tussicula vexabatur continuo. In dextro Pulmonis lobo abscessus erat puridus & fetidus; in quo continebatur pus membranæ conclusum, ad libram unam & semis. Erant & steomata & multi scirrhi undique per substantiam pulmonis. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 2. J. Spœrlin, septuagenarius anno vitæ ultimo Tussire cepit, & purulenta exspuit Pulmonum superiores lobos utrinque accretos invenimus, Ambo subduri & compacti erant, nondum tamen ad illam duriciem pervenerant quam alias in phthisicis observavi. *Vide lib. 1. tit. de Paraphi.*

OBSERVATIO XV.

Tussis sicca, ob tres Pulmonum lobos induratos.

MUllerem diu Tussis sicca & dyipnoea fatigavit. Tres Pulmonum lobi adeo erant indurati ut tophos referrent. *Vide lib. 3. tit. de Inappetentia.*

S C H O L I A.

TUssis sicca, quoties pulmonum idiopathica est, pluribus modis, & ob varias causas excitatur: hanc enim duorum quorumcumque pulmonum obstruio, sive per compressionem, sive oppletionem, sive contractionem ea fiat, necessario inducit: Quæpropter inflammatio, tumor, tuberculum singulis ob plenitudinem aut depauperationem itagnatio, item concitationes argillaceæ, lapideæ, polyposæ, vermes, quin & mul-

ta alia præternaturalia, quia fibras nervæ perpetuo irritant, Tussim siccam & inuicem, sed valde molestant inducunt. Cæterum Tussis sicca interdum naturæ instinctu, velus antilæ loco excitatur, nimirum ut sanguis, vel ob propriam dyic aliam, vel ob vala pneumonica non suis parentia, pulmones agrestantians, partium harum succellu promovet, ac in motum rapiditatem vigeri possit. *Ullæ Pharmac. rat. p. 2. §. 1. l. 1.*

OBSERVATIO XVI.

Tussicula ab impacto tracheæ arteria osicula.

Puer Septennis offam comedans officulum deglutit, quod in tracheam deersns, illi affixum manet, hinc Tussis, dyspnoea, motus. Aperto cadavere repertum in asperæ arteriæ medio officulum, planum, triangulare, angulis lateribus ejus affixum. *Vide hâteriam Tit. de Dyspnoea.*

OBSERVATIO XVII.

Tussis diversos affectus Pulmonum sequens.

§. 1. **Q**uinquagenarius tabi opportunus Tussicula tres annos laboravit. Inventus Pulmo aridus, scirrhis plenus, &c. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 2. Quidam febre renatus fuit, Tussicula, sed rara, Pulmo insigniter erat tumidus, quodammodo exesus, cum humore albo tenaci, purulento. *Vide l. 4. tit. de Febribus.*

§. 3. Quidam querebatur de tumore paulo infra inguenuo borto, diutissimâq; Tussi vexabatur, Pulmo inventus est putris in regione ipsius mali. *Vide l. 4. tit. de Tumoribus.*

§. 4. Anno 1601. In Ducatu Urbiui, totâque Piceni regione, grassabantur Tusses. Sectis cadaveribus reperti sunt Pulmonum abscessus, ex quibus multa materia foetens spumoli peribat. *Vide tit. de Febribus lib. 4.*

§. 5. Nob. N. à suppressis lochiis incidit in tussim molestatam, cum pectoris dolore & gravitate. Pulmones toti purulenti inventi sunt; In his juxta clavículas deprehensus sacculus pure repletus, exesa pulmonum substantia productus. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 6. Nob. N. ex maxima refrigeratione crurum, ac vehementi animi consternatione Tussi fuit correptus. In pulmonibus magnus abscessus fuit inventus, in quo putrida materia fere librarum vi. pendebat. *Vide lib. 4. tit. de Tumoribus.*

§. 7. Quidam tabi opportunus Tussicula, &c. tres annos laboravit. Inventus mortui pulmo aridus, scirrhis plenus, syderata pars pleuræ. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 8. Picior cum valida Tussi sanguinem rejecerat. Illi Pulmonis pars quædam nigricans reperta & sphacelo correpta. *Vide tit. de Hæmoptysi.*

§. 9. Mulier destillatione veteri in pulmones laborabat. In Pulmonum summo, ad arteriam, vomica pure plena erupit, Exulceratum erat guttur. *Vide lib. 3. tit. de Partu difficili.*

§. 10. In cadavere mulieris reperi in lobo dextro pulmonum scirrhum ovi gallinacei magnitudine, laboravit hæc febricula, nec non Tussicula. *Vide tit. de Febribus.*

§. 11. Miles per annum diarrhoea, Tussi sicca, &c. affectus fuit. Dexter lobus pulmonis costis & sepro erat adnatus, ut invicem continui esse viderentur, usus erat diu lepore marino, Pulmonibus infesto. *Vide tit. de Dyspnoea.*

OBSERVATIO XVIII.

Tussis à variis Pulmonum & partium thoracicarum viis excitata.

§. 1. **V**idua N. cum paucis induta vestibus è lecto in fenestram transisset circa mediam noctem, illico correpta est Tussi, dyspnoea febre, &c. Inventum est mediastinum plenum sero sanguineo, & Pulmonis vniuersa substantia repleta materia purulenta. *Vide tit. de Pectoris dolore.*

§. 2. Quidam per multos annos Tussi, &c. laborans tandem extenuatus obiit: In Pulmonis substantia lapidem inveni præterea tubercula plurima in scirrhos concreta: In pericardio ad libras duas aquæ uti & multum in pectore. *Vide tit. de Dyspnoea.*

§. 3. Virgo annorum x i. cruciatur doloribus sub ala sinistra & ad costas mendosas, ad thoracis vertebra & imum ventrem exportatos, cum Tussi, inventum diaphragma in interiori parte suppuratum, ulcusculis repletum: Tota pleura contaminata & relaxata, cum abscessu sub ala sinistra. *Vide tit. de Lat. dolore.*

§. 4. Sereniss. N. Tussicula laborabat cum difficili in latera decubitu; Cavitas pectoris continebat libras quatuor aquosæ materiæ: Dextra pulmonis pars erat flaccida, muco operata. Sinistra resoluta in sanem, superstitie sola membrana. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

§. 5. Nobill. N. cum pectoris angustia Tussi affligitur: Pulmones secti effuderunt cruorem atrum & pituitam. In Thoracis cavo aqua inerat. *Vide lib. 3. Tit. de ventris dolore.*

§. 6. Uxor N. morbo intricato affecta, Tussicula, dyspnoea, &c. laborabat. Pulmo tabidæ ortuæ dextra parte materia purulenta ac foetida, Sinistra humore seroso imbutus erat, per

Per totam eorum substantiam scitum plurimi, colore lividi, in quibus materia nigra atramenti instar contenta fuerat, conspiciantur. Lapides plurimi hinc inde per pulmonem, diversi coloris, parvi tamen. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 7. Uxor N. cum dyspnoea, Tussi infestata fuit. Illi thoracis dextri spatium aquae magna vi distentum erat, Pulmones retortidi & multo purulento tabo praegnantēs. *Vide Tit. de Dyspnoea.*

§. 8. Filia D. N. febre correpta, non poterat in sinistram latus decumbere, quin statim cardialgia & Tussi corripere, &c. Pulmo costis undique & diaphragmati adhaerebat, tum etiam pericardio: Cor media sui parte fere exesum & exulceratum, &c. *Vide tit. de Haemoptysi.*

§. 9. Virgo brevi morbo sublata, ante obitum febre continua fuit prebentia, decumbens non nihil tussiebat sine spūto. Thorace mortui inciso, ab utraque cavitare aquae virosae magna effluxit copia. Pulmones syderati inventi sunt: In ambitu passim puncta albicantia, quae levissimo tactu disrupta tabum eructabant. *Vide tit. de Phthisi.*

OBSERVATIO XIX.

§. 1. Tussis à variis Thoracis affectibus excitata.

Puella Tussicula continua vexabatur. Ingens abscessus sub axilla sinistra, & quidem inter pleuram & costas inventus. *Vide Tit. de Dyspnoea.*

§. 2. Virgo dolebat sub ala sinistra, ad costas mendasas cum Tussi, febre, &c. Inventum est septum transversum in interiori parte suppuratum, ulcusculis refertum, Abscessus sub ala sinistra. *Vide Tit. de Lateris dolore.*

§. 3. Filiolus Nob. trismus gravi anhelitu & Tussi sicca ad obitum usque detentus fuit. In sinistra parte obviabat magna diaphragmatis propendētia instar sacci, à purulencia sinistri lobi pulmonis. *Vide tit. de Dyspnoea.*

§. 4. Juvenis inter 6. & 7. costas vulneratur. Sequitur febris gravitas in parte, Tussicula sicca. Ingens inventa copia puris inter thoracem & Pulmones. *Vide l. 4. tit. de vulnere.*

OBSERVATIO XX.

Tussis à vario Thoraciarum & Naturalium vitio inducitur.

§. 1. Cadaver secui cuiusdam qui crebra Tussi fatigabatur. Repertus pulmo consumptus, Thoracis cavitas plena sanguine putrido & concreto, in Pericardio pus album, Hepar maximum. *Vide tit. de Dyspnoea.*

§. 2. Vitiosae pectoris figurae in Rachitide Tussicula sicca plerumque comes est. Jecur quoque immensè adactum diaphragma & partes spiritales impedit. *Vide tit. de Gibbositate.*

§. 3. Puella cachectica pulmones habuit latus & extra corruptos. Hepar valde magnum. Ad abdomen scatebat materia aquosa multa. Haec crebro tussiebat, &c. *Vide lib. 3. Tit. de Cachexia.*

§. 4. Puella hektica, Tussicula affecta est, &c. Hepar per materiam gypseam tenaciter hepatis adhaerebat, Thoracis vacuum aqua limpidi implebat, Pulmonis substantia materia purulenta imbuta, &c. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 5. Puella in febrem ephemeram, mox in hekticam incidit cum Tussicula, &c. Hepar mediante materia gypsea tam tenaciter diaphragmati adnatum erat vix ut avelli posset. Thoracis vacuum aqua limpidi plenum; Pulmones substantia materia purulenta imbuta; cum steatomatis nucem aequantibus, &c. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 6. Pueri duo Tussi & tunc detenti obierunt. Inveni in Jecore & Pulmone pustulas. *Vide Tit. de Phthisi.*

OBSERVATIO XXI.

Tussis sequuta Pulmonum compressionem à spina incurvatione, & purulentiam eorum.

Puella Tussi gravissima per dies aliquot ante obitum affecta fuit. Substantia pulmonis materia purulenta imbuta erat, praecipue ex sinistra parte, ubi ob spinæ incurvationem compressa, ideoque magis livida quam in dextro latere conspiciebatur, & principium sphaceli ibi fuisse color ostendebat. *Vide tit. de Phthisi.*

OBSERVATIO XXII.

§. 1. Tussis ab hydropo Thoracis cum Pulmonis & pleura corruptione, &c.

Virgo 35. annor. post profusam narium hæmorrhagiam cachectica facta, 14. die ante interitum corripitur Tussi molestissima & sicca, &c. In ejus cadavere Thoracis capacitas dextra erat aqua subnigra & putrida plena, ad cantharum unum & dimidium. Pulmonis dextra pars, in ea cavitate collocata, cum pleura corrupta ac nigra fuit, &c. *Vide lib. 4. tit. de Febri.*

§. 2. Thomas Cartier Parisiensis annos natus 57. temperamento sanguineo bilioso, vergente ad atrabilarium, laborabat Tussisula & febricula. Utrumque symptoma adauctum in eam magnitudinem ut coactus fuerit decumbere. Febris nocturna gravior cum anhelitus difficultate pene suffocante: dolor etiam per intervalla acutus ad latus sinistrum supra regionem lienis; Tumor pedum neque die neque nocte desinens: Adauctis omnibus symptomatibus successit febris acuta, continua, maligna, quæ hominem ante septimum diem sustulit. Quatuor mensibus ante mortem, erat plane *asthenicus*.

In dissecto cadavere deprehensæ sunt in toto thorace fluctuantis serosi humoris, putris & graveolentis, libræ Parisienses decem, Pulmo totus putrilaginosus, præsertim in parte sinistra. Lien quoque majore sui parte putris & foetido ichore plenus. *Aspositas* nulla alia deprehensa fuit causa præter x. aut xii. grumos sanguinis crassi, nigri, concreti, collecti & stabulantis in ipso ductu aortæ prope Cor. Th. Bartholinus cent. II. Observ. vii.

S C H O L I A.

Laborat Tussisula, febricula Commemorabilis est locus apud Ballonium lib. 2. Ephem. & Epidem. p. 175. de causis Tussis à congectione extenuiorum in Pulmonibus, qui hinc ægro adaptari potest: In morbis, aut, Medico multum est negotii sæpe, Non solum enim ej cura habenda est Melenterii, sed Pulmonum, capitis. Etenim quod alvo comingit, idem de cæteris partibus, Alvus sæpe, quidcommune est

recapitulum potulentorum & esulentorum, habet evacuationes & *asthenicus*. Idem alii partibus evenit, postquam enim diu congescerint extenuiora tandem minima occasione externa, laxa is veluti fibræ, exoneratæ se volunt: Hinc Tussendi diuturnum molestia, defluxiones, diarrhoeæ, & in febribus longa *purpurationis*: Et id valde annotandum, ut reddatur ratio *his symptomatibus à multis ejus causis.*

OBSERVATIO XXIII.

Tussis ab Hydropo Thoracis excitata.

§. 1. **V**idimus duos laborantes hydropo thoracis & pulmonis: in altero aperta est via, obortaque Tussi & vehemente siti, arefactis scil. pulmonibus, mortuus est. Alter non fuit sectus, sed tandem interiit, & illi inventus est Pulmo omnino corruptus. *Hellerus comment. ad Apher. xiv. lib. vi.*

S C H O L I A.

Non fuit siccus Paracensis thoracis institui debet visceribus adhuc integris, alias inutilis est si vi-

tium concepere: Hydropicos, inquit Hipp. 6. Epid. sect. 7. celeriter secare oportet.

§. 2. Cachecticus quidam Tussi aspera, sine stertore & prorsus sicca laborabat, Thorax universus aqua cruenta repletus repetitus est. *Vide lib. 3. tit. de Cachexia.*

OBSERVATIO XXIV.

Tussis à mediastino inflammato excitata.

NOb. cum febre acuta detineretur, Tussis initio sicca fatigabat, quæ postea subsequens est humida. Secto mortuo, inventus est in membranæ interserpentibus tumor inflammatorius facis notabilis magnitudinis. *Vide Tit. de Pectoris dolore.*

OBSERVATIO XXV.

Tussis excitata à pericardii inflammatione.

Quidam acuta febre prehensus est cum Tussi sicca, respiratione frequenti, &c. Sectio palam fecit adfuisse Pericardii inflammationem. *Vide tit. de Lateris dolore.*

OBSERV.

OBSERVATIO XXVI.

Tussis à laculi parte in Diaphragmate latente.

P Astoris in pago Cimbriz nostræ Hunslund, vacca rufcula diu vixit, & vizio Pulmonum laborare credebatur, quod frequens hoc 1660. anno inter pecora nostra malum fuit, plurimis damnosum. At quum ventrenne anno ad usus culinarios mactaretur vacca, Pulmones sine vizio inventi, sed in diaphragmate repertum ferri frustulum, digiti longitudine, jaculi forma, angustum & crusta lapidea obductum, quod tubere singulari diaphragmatis carnosius crassitiem ad tres digitos extenderat. Divinare nescio qua via ferrum hoc penetraverit, an deglutitum, an sagitta extrinsecus immisissum? quaecumque enim eligamus viam plenis obfeca erit difficultatibus: postrema tamen est verisimilior, quanquam cicatricis externæ vestigia rudior & incautior lanii manus neglexerit. Passim enim insolentiores Sarmatæ, in exercitu federatorum, sagittis obvia animalia quæque insectabantur, & carnosæ septi transversæ parti facile infigi jaculum potuit: Naturæ vero studium admiramur, quæ quum nullam infensam rem posset expellere, inducto quasi operculo muniverit, & annuo spatio pertulerit. *Bartholinus cent. vi. hist. xcvii.*

OBSERVATIO XXVII.

Tussis à vario partium naturalium vizio excitata.

§. 1. **V** Irgo Cachectica tandem Tussicula, dyspnoea, febricula, &c. infestabatur; Jecur male coloratum erat, vesicula fellea liquore nigricante & frustulis sabulosis repleta: Omentum incrassatum, &c. *Vide lib. 3. tit. de cachectia.*

§. 2. Cuidam diu vox rauca, Tussis, &c. In ventriculo reperta materia nigra lutulenta, &c. Fuit abscessus in ventriculo. *Vide lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

§. 3. Vir quidam (de quo lib. 1. tit. de Paralyfi.) quotidianæ bilis vomitui obnoxius, hac repente suppressa, ventriculi dolor prehendit cum Tussi inani. Deprehensa est ab obitu bilis sincera, eaque prassina, circum jecoris cava, libræ pondo, membranæ cœcra.

§. 4. Quidam rumorem durum in hepatis regione habuit, levi Tussi correptus, &c. Inventa vomica simul parti Hepatis connata, satis magna atque aperta, reliqua satis sana. *Vide lib. 3. tit. de Hypochondr. tumore.*

§. 5. Duobus Jecur vulneratum fuit, ut post mortem videre licuit. Hi cum febre ardente Tussi continua afficiebantur. *Vide lib. 4. tit. de vulneribus.*

§. 6. Quidam in magno æstu sitiens, exhaustis prægrandæ poculum vino frigidiore plenum: Mortui cum renes investigarem, inveni eos jecori per membranas quasi adnatos. *Vide tit. de Tabæ.*

§. 7. Matrona (de qua tit. de Ventriculi dolore) in regione ventriculi dolebat, accedit febris, Sitis, Tussicula arida: Pancreas magnitudinem naturalem multo excedebat, scirrhum omnino. Pulmones erant naturales.

§. 8. Jurisconsultus sicca Tussi vexatus, tæbidus tandem obiit, &c. Obviam secanti se obtulit tumor pendulus & annexus lateris dextri muscibus lumbæribus, cum plurimis adnatis cyttidibus, &c. *Vide tit. de Phrysi.*

OBSERVATIO XXVIII.

Tussis continua & sicca à gravi Ventriculi affectu, salvis Pulmonibus.

Cum sæpiuscule Friderico Slesvici & Holsatiz Duci, &c. valerutinis laborumque Chymicorum causa adessem, sæpe per jocum mihi Medicorum errores objiceret; hanc identidem in fidem rei exponere historiam solebat, nimirum Sereniss. Patrum, Joannem Fridericum, Episcopum Bremensem, &c. cum ex Tussi continua & sicca, eaque post fornum invalescente diu laborasset, & tandem contabesceret, à Medicis pro Phthisico fuisse habitum, adeoque omnem curam in everrendis sanandisque Pulmonibus collocaram.

Et hæcenus ea quidem federat sententia, sed cum deinde post mortem in causam mali paulo accuratius inquirerent, Pulmones præter omnem opinionem intemerata substantia salvos reperere, Ast, quod minus crediderant, Ventriculum tam male affectum, ut facile iis fidem fecerit omnem ab eo mali causam subortam fuisse, tantam nempe putredinem conceperat, ut etiam ad levem contectationem in squamas & membrangulas

OBSERVATIO XXXII.

Tussis illasus pulmonibus fatigans, ob nervosum genus affectum.

Olim pro puerulo nobili consuli, qui 12. circiter menses natus, paroxysmis convulsivis, & quasi Epilepticis, à quibus brevi satum oblit, gravissime affligebatur: Saepius observatum quod dum spasmi partium exteriorum remitterent, Tussis immani & singultuosa corripereetur: unde suspicio fuit materiem morbosam hand minus in pectore quam in cerebro desigi.

Post obitum vero cadavere aperto, pulmones sarti recti, vicio quovis immunes apparebant, ut manifesto liqueret Tussim istam propter nervosi generis affectionem excitatam fuisse. *Thomas Wyllis Pathol. cerebri cap. xij.*

S C H O L I A.

Propter nervosi generis affectionem etc.) Tussim aliquando sine magno pulmonum viro, propter materiam morbosam nervis pulmonis illam excitaris, clare indicat historia Nob. puella paroxysmis convulsivis, ac insuper vetigine gravi & coarctata laborantis, nam cum ex Medici praescripto fuit ex decocto cephalico capiti adhiberetur, illico somnia cessabant, inque vicem ejus Tussis inanis, sine ulla spuro, sed dies de noctes fere perpetuo molesta, succederet: quod proculdubio consistit ob materiem spasmodicam a cerebro in nervorum origines depulsam: Hujusmodi exempla Tussis mete convulsivae in adultioribus raro occurrunt, ut affectum hunc similem huius saepius viderim: Azamen alicuium est in pueris (quandoque etiam novi in viris) Tussim à collectione serosa pulmones inundante exoriri: quae cum primo simplex & moderata fuerat, postea vehemens & convulsiva evaderebat, ita nimirum ut inter tussendum; & diaphragmate solum contracto, ac in systole longiori aut creberrime repetitis dentato, pulmones valde coarctati in motu suo plurimum inhiberentur: interim ob respirationem impeditam, & sanguinem intra praecordia cohibeum, proindeque in alia loca iturgentem, laborantes suffocari periclitentur, & non raro vultum lividum & cadaverosum acquirant: Certeum in hac casu praeter spasmos cum tussicodici impetu, circa praecordia excitatos, non raro etiam vemiculus in consensum adductus, quicquid suo coarctatus finis vomitu rejicit: Quin & novi in quibusdam tenebrosus hoc ritu affectus, morbum tandem in alias excitasse, ac demum lethalem evasisse: Hujusmodi Tussis convulsiva inter pueros frequens valde est, & quibusdam annis ita plurimum corripit ut plane Epidemica videatur: ubi radices ejus, difficultate admodum remedia sunt, quin saepius diu protrahat, via aliter nisi ab immutato anni ritu curari solet: Si praedicti affectus causae iugulantur, obvium erit procurrant eas, ad serosi humoris in massa sanguinea, & aliquatenus in toto corpore redundantiam referre: cujus materiae portio quaedam arteriarum oculis in pulmones eandem Tussim ordinariam

erant: postea cum serosa colluvies, adhuc in sanguine exuberans, & particulis spasmodicis repleta, eam intra caput aggreteretur, eadem nervis pulmonibus subiens, Tussim simplicem in convulsivam adtingeret: Cum enim nervi circa extremitates suas prius irritati supra modum exercerentur, illi propter materiam spasmodicam, juxta principia sua deposuerant facilius inebunt: Cumque adeo demum binis in locis, scilicet capite & cauda, atque ob duas distinctas causas, scilicet à spirituum tum irritatione tum explosione, in motus irregulares adigerentur, nihil mirum est si Tussis primo communis, postea in malum morem creta, adeo immanis & spasmodica evadat: Porro cum inter eundem accidit eandem materiam in capite aggrebam, nervos quocumque alicui subire, propter Tussim convulsivae, aliamodi pathemara spasmodica non raro superveniunt: Hujusmodi affectum, pueris possimum familiaris, curatio difficilis & nonnullis longioris temporis exigit, Praecipue autem indicationes erunt, tum humores serosos & acres à sanguine & vitibus expurgare, ut illorum sibi ad decubitus in cerebrum, ac aliquando forsan intra pedus praecaverent: Tum has partes, ne seri alicuius superfluitates facilius admittant, corroborare: In hoc hinc vomitoria, & cathartica leniora fere semper conducunt, & aliquatenus iterari debent: Vescitioris saepe proficua sunt: Quinimo si morbus via committitur, fontanellae in nuca aut brachio, vel circa axillas excutiantur: Potius & aliena liquida in quantitate solito minori sumantur: Illius vice Bocherum ex sassa, china, (santal, rasura eboris, &c. cum ingredientibus diureticis & amspalmodicis ulnperari in hoc casu remedia quaedam velut specialia valde commendantur cujusmodi sunt *masys poudam* in pulvere exhibitur, vel lacti incoctus, adeoque crebra doxi quotidie exhibantur: Decoctum vel syrupus ex castoreo & croco: decocta radicis peroniae, vici quatuor, item hyssopi multos parantur: Aque cetiorum nigroclavifragae; aqua limacum cum sero lactis ac ingredientibus appropriatis diluata, saepe cum fructu adhibetur. *Idem.*

OBSERVATIO XXXIII.

Tussis excitata ab aqua cerebri ventriculis congesta.

Puellae bienni caput mirum in modum intumuerat, ab aqua in dextro sinistroque cerebri ventriculis contenta ad novem fere libras: Caput illi quoties paucis ante mortem diebus etiam leviter movebatur, gravis illico Tussis molesta fuit cum difficili respiratione &c. *Vide Tit. de Hydrocephalo.*

vinosorum, qui per nasum & faciam arterias ex-
cerni debebant, humorum ad Pulmonem conversio-
nem: eum nulla alibi inveniunt emissaria, ita ad hos
spungiosos folles: Non tamen negamus ex faucibus
& ore, per tracheam, sepe hac carachorum ad Pul-
monem collinare fluentia, nulla cerebro deprehensa in
calpa: Et ibi. cap. lvi.

Nonnulli Tussiculosi sunt conversi et toto per

veas in dextrum ventriculum, & ex eo in arteriosum
venam cum nutrio Pulmonia, & sinistro cordis sinus
destinato sanguine, excrementaria materia. Huc
eum tota modo per semia fere imperiosus meatus, in
arterie superius translocat bronchia, interna irritus
membrana, iustique contrahere thoracis musculus
sit effusio illa vehementissima que
appellatur Tussis.

OBSERVATIO XXXII.

*Tussis pertinax ob pulmones arte & undique costis adherentes, Seriè capite in
nervos pulmonicos illapsam.*

Margarita Binninger, filia mea longe dilectissima, annum ætatis tertium agens die 11
Septembris anno 1661. post clamorem horrendum circa quartam matutinam, insulsa
corrupta est Epileptico: Illucescente & protrahito die viscidam pituitam copiose evomuit,
inde Tussis corrupta est epidemica, qua fere omnes infantes illo tempore laborabant;
violenta concussionem circa noctem invalescente vivebat: Successit die xlii. Auris dex-
træ dolor: Die xvii. antequam Tussis invaderet, de cephalalgia & frontis dolore quereba-
tur, quam Tussis cum continua expiratione, suffocationis metu, febre lenta & marcore
excipiebat, donec violentia maxima pituitam expectorasset ægra, inde repetebat adhuc se-
mel semper cum stercore, sed minor accessio. Nullis autem nec evacuantibus, nec bee-
chicis, nec sudorificis, nec cephalicis, nec alexipharmacis tolli potuit affectus, ut in omni-
bus epidemicis infantum Tussibus nuper præteritis annis observare contigerat. A pituitæ
per violentiam & diuturnam Tussim, inter pulmonum lobos & pleuram propulsa, adacta
calore p. n. sensim incrassata viscositate, pleuræ coaluisse pulmones suspicio tandem in-
sit, unde matutinis singulis, fricato & uncto pectore, manu dextra sinistram apprehen-
dendi talum, & sinistra dextrum, inverso in posteriora corpore cohebam. Inde ingraves-
cente malo, evectis jugiter crassius in cerebrum fumis, illius frigiditate resolutis, accessit
comatosus affectus. Suppositoria, clysteres, hydropilegmagoga, cephalica, vesicatoria;
sternutatoria, sudorifica, corroborantia, methodice præscripti, non neglecto affectu prima-
rio, varia: Impediri autem paterna cura & Medica arte non potuit quin expleto semi an-
no 23. Martii 1662. obiret puella; Diagnoseos in cura instituta probe quidem multum consi-
cius eram sed ut omnem scrupulum à mente mea amoverem, Chirurgum à prandio vo-
cari jubeo: Huic foliæ defunctæ tam diuturnæ & incurabilis Tussis causam, coalitos Pul-
mones dico, & soporis, mortis tandem, Serii vel aquæ citrinæ in basi cerebri forte coch-
learia duo, sensuum nervos & animales spiritus obruentis: corpusculumque me presente
& præmonstrante aperiret rogavi.

In abdomine omnia probe constituta inventa sunt: Aperto thorace, utrique pulmones
tenaces & spumose pituitæ glutine, ita costis toti coaliti inventi sunt, ut ab illis avellendi
à Chirurgo omnino dilacerarentur: Superjacens thymus, spongiosus alias, plane ossis
reperitus est: In orbem circumcisus cranii involucri & cranio serrato, duræ matris incum-
beunt aquæ dimidium fere cochleare erat: Ruptis meningibus & scissa transversim cere-
bri substantia, eo ipso in loco ubi prædixeram, eadem propemodum quantitate, stagnan-
tes aquæ citrinæ nervorum conjugationes inundantes nobis paruerunt. Hoc ubi ex Ana-
tome obtinuissem, & in diagnosi mea ita confirmatus fuisset, Deo M. gratias egi qui in-
curabilibus affectibus laborantem, nec nisi, si vitam diutius protraxisset, miserum vidua-
ram puellam beatæ sedibus donasset. *I. Nic. Binninger Cent. iii. Observ. xxx.*

S C H O L I A.

Signantes aqua nervorum conjugationes inundantes)
De Tussi convulsiva, sive suffocativa, infantibus
& pueris familiari ejusque generatione supra
actum: Ad hanc pertinet Tussis Epidemica, Gallis
Quintana dicta, cujus origo ex Balloni senten-
tia spetius adducta est, Anglis Chimærg, de qua
Ipsius Rhæmus. Rat. part. 2. cap. 6. sect. 1. Ad hanc
classem aut, Libi de Tussi, quo ordinem phibitis est,
agitur refert debet Tussis puerorum convulsiva, seu
suffocativa, Morbus hic pueros & infantes potissi-

mum incessit, & quibusdam temporibus, scil. vetè
præsertim & æmulo, epidemicus esse solet: As-
groscientes tussendi paroxysmos crebros ac atroces
admodum habent, in quibus nimirum respiracio-
nis organa non tantum graviter laborant, sed etiam
spasmodice affecta ætus suos varie interrumpunt,
suspendant aut pervertunt: Plerumque vero diaphrag-
ma per se, aut partium aliarum impulsu convul-
sum, modo systolen, modo diastolen perquam
diu obstinere ita continuat, ut inspiratione, vel
expiratione

expiratione pro tempore inhibitis, spiritus vitalis vis se ne via duci queat, proinde ut tussientes quasi prae-focari ejicient, & ob sanguinem stagnantem, in vultu atredinem conserant: si forsan istis organis non in tantum convulsivis liberius tussire possint, usque tametsi vehementius & diutius, donec vires succurrant, tussire coguntur: Morbi hujus ratio formalis, sive causa conjuncta, in his duobus consistit, nempe quod adus crebra & vehemens pulmonum irritatio, quia ad molestiam aliquid tussire possunt, usque tametsi vehementius & diutius, donec vires succurrant, tussire coguntur: ac insimul quod partes thoracis motivæ, vid. nervi ac fibræ nervæ ad spasmos prædisponunt, quoties irritantur, tussim non regularem sed convulsivam, & ordinario respiracionis muneri oppositam aut injuriam accedent. Materies pulmonem in crebro in tussim irritans, videtur esse serum è massa sanguinea propter compagem ejus nimis solutam per petio expulsum, atque pectus ita molestant: quatenus per arterias tum tracheales in alveis arterie cavitate destillant, tum per pneumonias in ductus quosque parentes copiose suffundunt: Partium,

motricium diarthrosis palmoedica, ut in aliis aff. d. bus convulsivis, procedere videtur a materia heterogenea & elastica, è cerebro per nervonum ductus una cum liquore nervo, in fibras pect. vis motrices prolapsa, quare cum spiritus fibrarum illarum incoque, ad motus expirationis violentos edendos incitantur, motus convulsivos ineunt. *Hallem Wika.* Ejusmodi Tussis anno 1657. totaestate Neocomi Helvetiorum epidemica fuit, ut vis puer aliquis immunis evaserit: Meus natu major, tunc quadriennis, ab ea gravissime afflictus fuit, ac pene ad eadem deductus: Cypus erat immensitas, ut ea correptus prostratus in ventrem procumberet, humi lese volucina; ea vehementia, ut quanquam intercederet spatiosa aëre meum & illius cubiculum, tussis impetus tamen obaudiretur: Juvenis & imbecis fuit atque crebro emolussonum ex amygdalis & seminibus frigidis, purgationibus ex manna, sed parvum levamen acutuli frequens pedum intepida lotio incoctis malva, violariæ & liliis planarum pedum ex liliis pinguedine, à quibus somnus placidus subsequabatur.

ANATOMIÆ PRACTICÆ LIBRI SECUNDI.

SECTIO IV.

De Pectoris, Laterum & Dorsû Dolor.

OBSERVATIO I.

*Pectoris dolor & gravitas ob serum intra mediastinum conclusum,
Materiam purulentam in pulmonibus.*

VIDUA D. N. anno 1632. 8. April. cum paucis induta vestibus è lecto in fenestram transisset circa mediam noctem, illico correpta est magna dyspnoea, asthmatis paroxysmum æmulante, cum tussi, sputo cruento, febre & faciei rubedine: Vocatus ego venam cubiti dextri aperiri jubeo, hinc statim spirandi difficultas quievit: post clyster laxans injectus, & julepus refrigerans exhibitus: Die 9. eam invenio febriçantem cum tussi & sputo sanguineo, cum pondus grave sentiebat in medio pectoris cum ardore interno & puncturis in variis locis: Impero s. m. ex brachio sinistro, clysteris ac julepi iterationem & pectoris inunctionem: A V. S. statim levata & sensus ille ponderis cum ardoris sensu in thorace valde imminutus: hora quinta vespertina credens ab inferis partibus vapores & humores in thoracem transferri, quod orthopnoea illa indicabat, præscribo missionem sanguinis ex saphena, ex qua etiam melius habuit: Die x. mane melius habuit, febris & reliqua symptomata valde remissa: circa tertiam vespertinam levem refrigerationem extremorum passa, cum sudore levissimo in pedibus & volis manuum, inde febris aucta, pulsus valde oppressus & gravitatis sensus in thorace plurimum actus: Vocatus in consilium D. Banchinus, censuit affectum esse pleuritidem anteriorem ex inflammatione mediastini, & ex communi consensu missus sanguis ad 3viij. ex brachio dextro, unde etiam melius habuit, reliqua remedia continuata, & frictions, ligaturæ, cucurbitulæ in partibus inferioribus: Die xi. morbi lii. commotus iis quæ observaveram in alio morbo ejusdem ægræ, in quo fluxu alvi tenesmode & catarrho in pectus vicissim affligebatur, ita ut quoties alvus restitaret, catarrhus graviter affligeret & fluxu alvi redeunte, statim catarrhus cessaret, facta palindrome ad intestina humoris in pectus defluentis, censui purgationem ipsi fore

utilissimam, à qua multa pituitosa, serosa, acrida steridâque excrevit; nihilominus exacerbatio circa vesperam tediit, ut die præcedenti, attamen pulsus non erat oppræsus ut antea, & gravitas pectoris minor: sed dolorem percipiebat circa claviculam dextram, qui etiam tactu exasperabatur: Die 4. morbi, cum mane febris & dolor ad claviculam perfererent, accessit maxima palpitatio cordis, quæ etiam apparuerat in hypocondrio dextro, tum etiam in latere sinistro, sed exiguo tempore: at in regione cordis permanebat, & instar mallei violenter percutiebat: Cum suspicio esset vapores ferri ab utero, præscriptus clyster hystericus, cucurbitulæ in partibus inferioribus &c. Die 5. morbi mane eam invenio cum exigua febre, sine ulla pectoris oppensione aut dolore, & exigna cordis palpitatione &c. Die 9. alvi fluxus tenebrosus levis, quo pituitosa & pauca deiciebat, & anteillum fluxum per vomitum rejecit amara multa: Die 10. alvi fluxus minor, vespere omnino substat, febris nulla, Inde omnino convaleuit: Die 29. ejusdem mensis, cum optime se habere videretur, & negotia domestica ageret, sedens in scilla, subito in terram concidit exanimis & vere emortua.

Aperto cadavere, inventum est mediastinum plenum sero sanguineo, quod forte rupta membrana versus partem superiorem pulmonis, eumque atque asperam arteriam comprimens, subito suffocaverat, Præterea inventa est pulmonis universa substantia referta materia purulenta & gravitate insigni prædita: Tum etiam testiculus sinister exigui oui magnitudinem æquabat, colore nigricante, eoque aperto, substantia illius spongiosa, nigra & velut gangrena affecta visa est: Imo vero statim ab apertione excidit à testiculi medio materia quædam nuclei instar, & grumo sanguinis putrefacto similima: Inde oriri conjecimus affectus hystericos quibus erat valde obnoxia: Imo verò forsan cordis palpitatio inde oriebatur, à tetris nempe vaporibus ab ea elevatis. *Rivæ rini cent. I. Observat. lx.*

OBSERVATIO II.

Pectoris Dolor & ardor à Mediastini inflammatione.

VIdi Nobilem Januensem, qui cum febre acuta detinetetur, ad quam inquietudo magna, ingensque sitis conseqnebatur & cætera quæ febres ardentes comitari solent (in his spiratio frequens admodum & celer erat) in thorace maximum aderat incendium, unde & frigidum aërem inspirare desiderabat, & calidum spiritum resare: Nullus in thorace aderat dolor insignis, præterquam ad sternum, ubi angustiam & offendiculum quoddam inspirando potius, quam dolorem sentiebat, Tussis initio sicca, quæ postea subsequeuta est humida: quæ per tussim exercebantur, erant colorata, vel rubra vel flava, plurimum tamen flavi coloris, paucissima rubei: Pulsus qualis pleuriticorum esse solet, ut si dolorem lateris habuisset, certo pleuritide laborare judicarem: Hic inquam cum omnibus his symptomatibus tenetur, & ad oblata cæteraque omnia tam bene se habebat, lotiâque admodum laudabilia essent coctionemque indicarent, quorum merito judicabatur ex morbo cum convalesceretur, ex insperato præcedentibus nonnullis synopsis, nona die defunctus est.

Cum dubitaretur inter Medicos de morbo, & ejus amici inspicarentur de veneno, ob synopsis dictas, scitus est, in quo nullare alia re p. n. præsentem, inventus est in membranis intersepientibus tumor inflammatorius satis notabilis magnitudinis, qui etiam in parte communicabatur pericardio. *F. Salus Drersius de affectibus particul. cap. vj.*

S C H O L I A.

ENarrata symptomata considerans, videlicet febrem acutam, incendium in thorace, spitationem frequentem, offendiculum illud ad sternum, Tussim cum sporis coloratis, pulsus durilem, non potui non induci quæ crederem ægotantes, in quibus talia animadvertentem, inflammationem in partibus spiritalibus pati: quæ cum oco esset Peripneumonia, quoniam nec aderat illa difficultas angustive anhelantis quam in peripneumonia adesse cõveram, nec illa pulsus duriles consummare poterat: Ex cum pleuritide similiter esse non posuisset, cum huic non affideret lateris dolor pun-

gius: Nec etiam cor hoc pati judicarem, impore quod incipientes fere via tolerare possit inflammationes: Reliquum erat ut cõsisterem membranas intersepientes pericardiumve hanc pati, quibus inflammationis necessario omnia superius dicta consequantur: Febris quidem acuta & vehemens accidit, tum ratione affectus, tum quia sedes affecta parum distat à corde, quod cum supercalescat admodum à proxima flamma, non mirum est si etiam in thorace incendium sentiant, inquietudineque succedat maxima, & sitis aliquando inextinguita, hocque multo magis inflammaco pericardio quam mem.

membris illis, quorum membrorum inflammatio altera sæpius ob viciniam alteri communicatur : Cæterum an magis afficiatur pericardium vel membranae, hoc ex subsequendis habetur : Affectio enim magis pericardio, urgente morbo syncope aliquæ nonnunquam contingit, & effluvia ingentes accedunt, quoniam inflammatio cor ipsum sæpe contingit, omniaque symptoma in hac sunt sæviora quam affectus membranis : Iisdem inflammationis, quoniam annectuntur & membranae succingendæ & thoracis sequitur anhelitus difficultas, spirarique inde frequens ; celer autem ratione necessitatis aduocæ : Dolor autem, licet inflammatio sit in parte membranosa, non adeit ita pugilivus sicut in pleuritide, quoniam hæc membranae, sicut illa, non firmitur ad costam, vel ad os alterum, cujus merito compressa maiorem periculis ab eo punctiorem, sed est in parte laxa thoracis : nec hæc, sicut illa adeo tensione viget : sed offendiculum illud ad sternum easum illis succedit, quoniam hæc partes ibi colliguntur : quare

& ibi inflammatio tanquam parti magis sensitivæ, quoquo pacto communicatur : Tussis autem cum spuri coloratis adiungitur, quoniam cum in omni inflammatione, quæ operculo durior non tegatur, semper aliquid recludet, ideo his partibus affectis, materię diversæ apparet colores, & inde spiritum coloratum : Quod profecto fuit principale signum quod me ad hoc iudicandum induxit, cum viderim Galenum ipsa colorata in acutis passionibus adscribere inflammationibus partium spiritalium, scilicet vel pleuræ vel pulmonis : quorum neutrum cum in prædicto casu clara luce deprehenderem inflammatione affectum esse, conieci banc in membranis illis adesse, communicata aliquando ipsi pericardio hac affectione, Pulsus omnino durus in hoc eodem casu accedit, quia genia inflammatione in corpore membranoso, cujuscumque hæc duo sunt, necessario in arteria talis durities imprimitur, qualis in pleuritide videri solet : *Vide plura loco citato, Henricum comm. ad aph. 24. sect. 5. alteri historiam juvenis ab ejusmodi inflammatione mortui.*

OBSERVATIO III.

Dextra Thoracis partis dolor ab abscessu sub integumentis communibus, ad finem musculi Serrati minoris.

Eminentis. Cardinalis Melchior septuagenarius, jam menses aliquot de obtuso quodam dolore in dextra thoracis parte ad claviculam conquestus, non simplices catarrhi, quamvis levioris, molestias aliquoties perpassus, aliquam capitis debilitatem advertebat, quibus febris fociam se superaddens, 14. ab invasione de Aëgrum è medio fustulit, quam convulsio pridie præcessit.

In dissecto abdomine nullum vitium notatu dignum se obtulit, nisi quod semiputridus Lien simplici tactu inter manus nostras colligaretur, tunica à parenchymate sponte descendente : In thorace, sub integumentis communibus, ad finem musculi serrati minoris antici, inter primam & secundam legitimarum costarum, abscessus erat non ita magnus, pure pauco, albo, æquali & minime fixto scatens, quod illæsa pleura primam costam corroserat ac transversim diruperat, sine ulla tamen coloris mutatione : Distabat hic abscessus duos digitos à confinio primæ sterni cartilaginis, in dextro latere : Dum vixit, in cute nullum hujus abscessus indicium, etiam diligentissime intuentibus apparuit : Pleura sana, pulmonis tunica abscessui propior fibris pleuræ adhærens, callo obducta erat : Pulmonum substantia pure referta : In superficie Cordis vesicula erat : In dextro ventriculo Polypi duo, tendinibus mitralium valvularum implicabantur, digiti minoris crassitie, quorum unus è fundo ventriculi in venam arteriosam ramos aliquot spargebat, alter in venam cavam : E sinistro ventriculo alii duo prodibant variis fibris annexi valvulis tam tricuspidibus quam semilunariis : major in arteriam aortam iusto ampliorem ad octo digitos excurtebat : Non tam frequentes alibi ac hæc Romæ vidi Polypos cordis : In arteria aorta plurima apparuerunt ossis rudimenta, qualia etiam in sigmoides fute valvulis : sparsa erant hæc frustula ossis hinc inde per arteriam ad distantiam trium à corde digitorum : Cranio aperto, plusquam libra feri tenuioris, inter duram & tenuem meninges, diffusa videbatur, quo turgida pia mater solitatem crassitiem quater superabat : Eodem sero, sed rubicundiore, ventericuli cerebri erant repleti. *Henricus à Meiningen Centur. ij. Epist. xxviij. Bartholinus.*

S C H O L I A.

Ad *Primum ubi angustia & officinalium* Arn. Boerhaavii Tractatu de affectibus omittis cap. 11. interpretor ejusdem doloris ad sternum, ab humore peculiariter membranae ibi concluso, cujus affectum integram descriptionem afferre libet: *Utrum alterumque in thoracis notum habui quos in superiore sterni parte dolor vexabat, non levis oes aprit, sed periclitat ac diuturnus, & qui intermitteret quidem quotidie magnam diei partem, ita tamen ut semper aliquis molestie sensus impeteret: Non sciebat difficilem respiciationem hic dolor, nec rursus habebat comitem, magna tamen inspiratione ac profundis suspiriis aliquantulum exacerbatetur: uti & tuba ac magna corporis respiratione, capitisque ad dorsum reclinacione nec non punctione, praesertim si utrumvis istorum post magnam corporis anxiolationem ac dorsum inclinacionem fieret: quibus rebus efficeretur etiam ut molestiam illam, intermissionis tempore residuum persentiret, quum alioquin ea penitus fere obliuisceret: Fixo uno semper in loco perseverabat, interduum tamen in proximam pectoris partem ac versus axillam sese propagabat: judicavi dolorem hunc provenire ab humore qui inter membranam peculiarem (illa enim toti thoracis communis, Pleura seu succo-*

gens dicta, à sterno longius recedit, dum mediastinum constituit) atque ipsum sterni corpus, qua cavitate thoracis lotro respicit, impactum erat, haud magna copia, nec valde acris sur malignis, biliosis tamen, utpote in vigore aetatis, servidiore temperie, lictero aliisque à bile morbis admodum obnoxio: atque apertis multumque iis infestato: Consequam hanc sumavit eventus atque ipsa curatio, peracta precipue cholagogis, mi ioribus quidem, (cum corpus picrocholum ac rare tenuius vehementiora non sustineret) sed aliquoties iteratis: quum aliquantulum contulissent etiam focus partis ex anodynis ac relaxantibus, & gestatione emplastri ex olivaceo, cetera virginea, ac pice Brucia, quam Burgundicam vocant, cujus egregia vis est ad cujusque modi humores acres ex alio blande evocandos & sensim dissolvandos: Puro humorem, qui illum dolorem fecit, non eundem semper persistisse, sed naturali calore victum, oculis dispnoce sensim absumptum fuisse, relicta duarum crupis portuiculis, à qua io mediis etiam intermissionibus nonnulla vellitatio semper superesset, ac cui alius de novo humor se associavit, (transmissis aliunde in partem debiliorem, ut solet, exonerante se natura) dolorem toties repararet.

OBSERVATIO IV.

Pectoris dolor à Pericardii & Pulmonum phlegmone & suppuracione.

Jacobus Ruanus agricola, annos natus 45. plaustrum foeno onusti everfionem ruinamque in se passus, de Punctorio, simulque gravativo doloris sensu in pectore, nec non de quadam cordis compressione & spirandi difficultate conquestus est: Thoracis vertebrae, quae circa nullam costarum fracturam contortae & subluxatae conspiciebantur, levi negotio operam Chirurgi restituta fuerunt, ipseque xger post quarriduum adeo levatus, ut ad consuetos labores redierit: Verum aliquot elapsis diebus ardente febre conficiari coepit, cum altitudine, deliracione, vigilis perennibus, siti maxima, genarumque rubore & leipthyimia sibi mutuo succedentibus, ita demum 11. morbi die (cum praesertim à vini usu, conjugis indulgentia non abstinuisset) vitam finivit.

Aperto cadavere, id imprimis rarum innouit, Pericardium scatenis pure copioso, cui velut immerfum cor, magna sui parte, ad unamque potissimum auriculam, partim exesum, partim etiam marcidum videbatur, quinimo contagium supernam sinistri ventriculi regionem jam invaserat: Insuper & ab ipso corde, dum Chirurgi manibus comprimeretur, sinistria quadam materia exillit: Pulmo ejusdem labis particeps, aliis interim viceribus & statu naturali parum immutatis. *Fabritius Hild. cent. 11. observ. 27.*

OBSERVATIO V.

Agitatio & Pectoris dolor à Cysti maxima liquore cremori simili plena, à sinistro humero ad extremum lateris dextri diaphragmatis extensa etc.

Puella Rumburgo Suffolciensis 15. circiter annorum, adhibitis medicamentis chalybeatis contra Leucophlegmatiam seu chlorosin, remissionem quidem sensus morbi, sed post multum laborat obstruccionem flatuum: Ab anno 16. ad 22. semet summo opere affligebat ob obitum parentum & corruptos mores Fratris: Interca singulis annis uno duobusve morbis acutis laborabat: Anno ætatis 18. languida admodum erat, obstruccionem thoracis & melancholiam; domo fortasse egressa tempestate ventosa, coquebatur domum properare, parum enim abesse aiebat quin vento strangularetur: Aegre admodum & lente ambulabat, magna cum difficultate ascendebat in montes, vel per scalas in contignationes superiores: Tum observabatur magnopere premi siti, cum soletet bibere cubitum itura, necnon aliquando noctu, nisi veller, ut ipsa aiebat, siccitate suffocata perire: Inter annum 21. & 22. ætatis suae descendens de scalis, persensit horribilem agitationem in pectore suo, quod cum aliis in eadem domo significabar, monstratoque illis modo agitationis illius motu corporis sui, secum omnes in admirationem ejus accidentis pertraherab; qui judicabant (provi plerique omnes ex fremitu judicabant) Pectus ejus totum fere aqua esse repletum:

T t

repletum:

tepletum : Utebatur variis medicamentis sex circiter menses, sine sensu remissionis morbi : Dimidio post anno, initio Autumni, levi frigore affecta, tantam passa est obstipationem, ut nihil nisi mustitare valeret, nec poterat prostrata cubare, sed fedefat ab angulum obliquum suffulta cervicalibus : Ego acceffus, extemplo venam secari curabam, cum phlebotomia sit remedium procurandæ liberiori circulationi & spatio extricando quo natura semet exoneret : Intra unius horæ intervalum spiritum recipiebat, pristinamque conditionem recuperabat non multo post : Afferebat se nunquam fudasse, neque ei sudorem elici potuisse per vulgaria sudorifica : desiderio remedii empirici præscripti pilulas Malthei, quæ illi facile sudorem eliciebant, ultra memoriam ejus : Singulæ quotidianæ dozes pilularum Lockieri quaternarum, agitationem illam in pectore removebant, ut aiebat, deorsum magis diaphragma versus, cum metuens hypercatharsin pilularum usum ad duos tresve dies omitteret, & deinde denuo reiteraret, nulla ulteriori agitatione per illas inducitur : Nunquam sinistro latere prostrata jacere poterat : Anno 33. ætatis, tempore Brumæ, periculosa laborabat Febri, comitata Diarrhœa, sed convalescebat : Anno 34. hyeme rursus frigida, Gravedo illi totalem obstipationem inferebat, & post quinque sexve dies convulsionem patiebatur, antequam vena ei secta fuisset, per negligentiam familiarium ejus : Sera nimis phlebotomia statim passionem levabat, ipsa vero vespere quidem hilaritate perfruebatur, at postidie illius diei moriebatur : Ipsa adhuc vivens, ejusque confanguinei, permiserant mihi corporis mortui sectionem, quam etiam perfecti.

Quamobrem primo os pectoris seu sternum dissecabam, à cartilagine ensiformi usque ad collum : Ibi tum cavitate thoracis exposita, evaporabat primum fetor olidus admodum, non obstante rigido gelu temporis illius, quod erat circa Natalitium diem Salvatoris nostri : Deinde ubi viam parabam, exponendo utrique lateri sterni, cum stupore videbam, (ut præfenseram, totam fere cavitatem thoracis superius vacuum, cadavere supino jacente) & inferius nonnisi crasso lacte repletam : Sed ulterius investigando comperi tantum dextrum latus Thoracis integrum, & tertium circiter sinistri partem ita se habere : Extendebatur in parte collum versus latitudine palmæ, & excurtebat in crassilem digitalem trium, ad dextrum latus mediastini : Liquor cremori similis erat, vel potius glutini albi Hispanici, seu cerussæ distinctæ flavo, instar colostræ : Immisso enim cochleari extraxebam ex fundo spissam, limosamque materiam, simillimam cerussæ, quæ subsidit in fundo glutinis : Quantitas erat circiter trium pintarum, continebaturque in sacculo, qui illius diaphragmæ & amplius capiebat : Sacculus porrigebatur à sinistro humero ad extremum lateris dextri diaphragmatis, non directe in longum, nec firmiter extensus, sed ad palmæ latitudinem ab ortu directe descendebat ad diaphragma, cum quo in longitudinem occurrebatur : Cutis seu pellis ejus crassior erat pelle stomachi, ejusque capacitas amplior quantum flexuræ costarum illi adiacebant, & componebant plusquam dimidium circumferentia : Ubi adhærebat diaphragmati, digitum fere crassa erat : & in loco quodam, in quo separatim eam conabar à diaphragmate, offendebam tenuiorem sacculum, unde effluebant duæ triæ cochlearia aque putæ, quæ qua via eo penetrasset, invenire haud poteram : Mediastinum vel totaliter fuerat absumptum, vel intextum in crassitudinem Sacculi, quod observabam accidisse in pleura, quousque sacculus pertinebat : Porro sacculus ille solutus & remissus jacebat ab axillari sinistra ad Pectus, cum ante fuerit repletus aut distensus vel vento vel liquore : Tota cavitas erat inquinata circumcirca agitatione liquoris Instar algæ limosæ quæ æstui maris est subiecta : Lobus ille Pulmonum qui debuerat excisus in latere dextro, perierat totus : dexter autem tertia fere parte mutilus erat ; in ventre inferiore omnia se recte habebant.

S C H O L I A.

DOLOR *Brumæ* sic se offendisse simile quid in Authore Italico, Ipsi erat sententia salvandi cam : Ego mediabam Paracelsin : nam ex fremitu liquoris, & eo quod non posset sinistro latere cubare, concludbam quod esset cystis in dextro : Sed si id factum fuisset, sacculo nimis crasso existere, mors for-

san insequuta fuisset, Agitatio similissima erat agitationi aque vel lactis : Hæc vermina phœo pectore instar maris prædita erat : Quæritio est, an liquor processit ex delapsu chyli ab axillalibus, quod vultum aliqua ratione probabile : *Observ. Nichomæna Falsæ in Acta Philosoph. Societatis Anglicanæ an. 1667. p. 23. de pp.*

OBSERVATIO VI.

Pectoris dolor ab angue in levo cordis ventriculo contento.

§. I. **N**Ob. Anglus, nom. Joh. Pennant, annos natus 21. die 20. Nov. 1639. fato functus est Londini : Hic adolescens totis tribus ante obitum annis perpetuo conque-

stus fuerat de *Pectoris injuncto dolore ac gravitate in sinistram latus divergens.*

Aperto post obitum corpore, reperiens est in ipsius cordis levo ventriculo anguiculus,

cætero

cætero quidem corpore apprimè candidans ac lucidus, capite vero rubro: cauda bifurcata erat, singuli autem caudæ rami quadripartito rursus vifcebantur dirempti: *Zachus Lufitanus Praxis admir. lib. 2. obferv. 140. ex communie. Clariff. Dom. D. Caroli Sponis Med. Lugdunenfis; Vice-Decani Excellent.*

§. 2. Hoc producit hiftoria monftrofi corporis, quod in finiftro cordis ergaftulo creatum ac foris aliquandiu, mox conditorem alumnumque fuum quacunq; fera ferius mifere perdidit, cuiusque hiftoriam ex Anglia nobis cum icone transmillam tibi B. L. ob oculos prius proponere libuit: Londini in Anglia anno 1637. Eduardus Maff, Vit in Medicina arte undique confpicuus, Johannis Penant vita functi ætatis anno 21. cadaver magnis impellentibus caufis aperire voluit: adfcitoque fibi primi nominis Chieurgo; fectionem aggreffus eft à regione naturali: Veficam ulceribus plenam &c. invenit: Tum ad vitalem regionem accedens, altius omnia fcrutabatur, & in Pulmonibus quidem minus læfionis apparuit, cor vero globofum & in latitudinem magis quam in longitudinem deductum, cuius de xter ventriculus cinerei coloris, exinanitus, crispatus, contractusque ad crumenæ coriæcæ formam repertus eft, abfumpto penitus pericardio: Sinifter vero longe altero major atque in lapide obduratus, ex quo incifo tanta vis fanguinis effluxit, ut toto ex corpore ad finiftum illum cordis ventriculum confluiſſe credi potuerit: Verum fide majorem partis illius craffitudinem ac duritiem admiratus eximie vir peritæ Eduardus, ejus orificium latius aperiri jubeat: Inde (mirum dictu) carnea quædam ſubſtantia, in gyros collecta, ſerpentem referens, ſeſe oculis objecit, cuius formam ſequens figura repræſentat: Serpentis deinde extenſi dimensionem & partes ex altera figura cognofceſ, monſtri hujus memorandi color omnem humanorum corporum albedinem excedebat: pellis etiam nirens more imaginis tæcens illuſtrata: caput ſanguineum & ſerpentino ſimillimum crura rami, fibre, nervi, chordæ, vel quicquid fuerint, carnis omnia colorem referebant: In re tam nova adeoque obſuſcenda vix ſibi credens Eduardus, ne vel ſibi vel aliis de ejus veritate dubitandi locum relinqueret, ſuſpicatusque nec ſanguinis concretis, aliſve alterius rei ſpecies aliqua oculos veluti præſtigio caperet, rem exploratus Inquirere aggreſſus eſt, quare attentiffime omnia circumſpexit, caput doſum cæteraque diligentius ſcrutatus, omnia ſerpentis reperta ſunt: caput denſam, ſanguineam, glanduloſam ſubſtantiam præ ſe ferebat, collum (ut credidit) ex violenta à corde ſeparatione aliquantulum contuſum, cõpõpus muliebri tenuique capillorum diſcerniculo tentatum ſolidum viſum eſt, venam tamen vel arteriam habere videbatur, quæ ad naturæ beneficium ſerviret: Quæ omnia fideliffime, ut coram teſtibus bonæ fidei, acta ſunt, ita narrantur. *M. Annelius Severinus de Abſeſſibus p. m. 281.*

S C H O L I A.

C Ompertum eſt, quicunque ſi ortus rerum alienarum noſtro corpori, in hujus ſimilibus præcipue non obſcure neque exilibus fieri, nimirum in quorũ affluere aut congeſſi facile poſſent, ad generationem accommodatæ: Adde quod in hiſce loca ſcæte vagari que plurima ſpiciunt copia ſtabili natura legè, quam annotavi oculatus Galenus alioſque Reſpondentibus igitur & ſubjectæ materiæ numeris & effectoris vicibus in loco, præteritum congruo, & naturalibus illiſciſus, reliquum eſt ſubſide ut procedat exiſtiatque ſuius; vivens inquam ſpecies, non tamen viræ expertus: ſic in alio ſcuides; in vero non intoleranti ſitu monſtroſa corpora, quæ quidem procreations ſuæ ſerme frequentes: Cæterum inſequentiori ordinis viliumus, & que in cerebri latebris, & que in antichis gignuntur beſtiolæ, & quæ in manibus cirones, & in cibus draconuli vocali antiquitas: Videntes autem maxime ex pueri, aut ad præterit accedente materiæ hac exorti: quæquam hinc ſubpartem affici. Cionem adeo eſſem iudico ſepe, ut ſi non ſentiantur interdum, aut interdum etiam facile ſeruat à complectente partuſa præteritum coſulta: Nota autem ſunt que cetulis ſoh. Schenckius ubi de corde: novum quod promit Hollerius de Scorpionem pto in ſinu cerebri: novum quod abſturbati ſunt noſtri ſeipotes de zheromatum materiæbus diverſis. Porro materiæ univerſa, ex qua principio mundus conſtituit eſt, reſpondens variis generis

portiones, atque ſegmenta in uno homine ſtudioſe natura patens complexa eſt, nimirum & qui toto rerum ambulo nunquam intermittere videntur quid ſuo generationes & motus, hos omnes in parva univerſitatis imagine mentium excitandum excolendamque gratia, quotidiana ſerme ſpectacula expromeret atque reſteter; ut non miſeris jam, præſente ſemper materiæ multiplici fornice, iam variis exare viciffim novarum rerum facies in humano corpore: an enim ullo rerum apparere ſemio, ſubito creandi uſo deſes & oſiola, ſaura ſi poſſit, cui producendi atque niſcendi libidinem & propenſionem unam ſi detrahas, neque etiam nomen reliquum ſit.

Nunc audi, M. Houghon, quod hac expendentibus ſuſcitatio nobis: Cum ad ſententiam corporum geos communis omnium calculis facile reſideret huiusmodi ſpiciendi ſerabolom, hoc equidem ſi vegetabilium categoriæ repono: Rationabilium autem eſt his acceteri que depreſſionis & inferioris ſunt ordinis corpora, horum quippe tum proclivior, tum ſcilior eſt generatio quam peſſetiorum; in quibus quippe procedendi & plinium & majorum requiritur via: Deinde, naturæ pugnantius eſt animal digniſſimo viceris rheono iuten, iedum & imobile minus moleſtum: Terſio, forma & figura biſſis, & in plures poſſetimo ſoboles diſſiſſe, recte quidem vegetabili adqueſant, incepte angul, qui

monothylus i. e. simplicis & unius est ductus: Itaque si deflexeris hunc caput, vel radicem, rectius meo iudicio fungam sublaro trunco, & allurgenibus hinc acque inde raris, qui in luteulos plurimos finiunt, sic apparebit phlegma plenum, at me ineptum futurum etiam est hoc non solum, si nos abstrusum illum suum extra cordis sylvestra parcos; verum etiam eandem ipsum natura indium in cordis claustris comperis, qui ad ventris radicem non alia, preterquam basi viceris parte inhalisse, quae basi inferiori mundi loco, hoc est, recte respondet, maxime si id spectes quod homo stirps est inverta: Praeterea vero inani corpore conflatum sit huiusmodi concretum (Id quippe ostendit lacerula in ultimum trunci discrepans, dirigente manu, virgi) haud videri (sane illa vacuitas animantium cunquam esse; Verum enim vero propria est plantae, ex quo genere novissima à trunco ad ramulos inanes nonnulli, ut fanniculi, fionis, cardui cuspisiam: Denique anguis omnis stabili quadam naturae proprietate à crassioribus & capitis & ventris initiis minoribus perpetuo momentis in stillicia tendunt; contrario vero modo stirps quaecunque, ab exilibus exorta fibris, perpetuo in spacia laetiora divaricatur, atque plantae modo non anguis sane procedit ejusmodi germen: igitur plantae potius quam anguis & credendum & nominandum est illud. Quas ob res, pace primi observatoris, quem virum de hac edita re plurimum laudo, quod anguem indigemus, quod gustu debeamus vere! an quod magnificenter est

anguis nomen quam plantae! sed non curant, nec aspernuntur potius Philosophi: Verum enimvero, sit animal, sit planta, non multa refert, dummodo & *signa* ejus & ideam teocamus: haec curam assignati latentibus sic hujus rei principii & causis vero non potest: Verum quod divinare in tanta rerum caligine licet, amico privam dicam, Eucurus dextro cordis sinus, per magnam venam lenticis famigolia, & metida pithia in alitrum ventriculum, atque hic tatis collectas, dum potest, à calore vivido finituri lateris agiteus & focus, in eam quae renacitatem marcius sequitur, formam iraductus est: Neque enim in Anatome nova sunt haec, Sed & mihi plus semel inventa in venticulis cordis vagantur: productio: Testes mihi Rev. Neapolitani P. N. qui à me dissecto in corde P. Menemini, ex hydrope mortui, viderunt vaginale sublarum concretum, quantum tota ascendens cava recipere. Haec sunt quae mihi super hac re meditati locuti &c. *idem.*

Serpentem referens] Sepe vermes intra pericardium gigni tradit Richardus Læur, *Tract. de corde* cap. 2. Signa autem esse ejus tremorem, pulsus intermissiones, dolorem pungentem & syncopas: Remedia proponit Caraplasma à foliis cinnae, anacardi & abjuthi vulgaris, aceto vini albi acerrimi incoctis, & cum prout michtidulo mixtis; quod regio cordis applicatum animalium catervam dissipavit. *Vide Tit. de Palpitatione cordis ex Hartmanni Praxi chomatina.*

OBSERVATIO VII.

§. 1. Pectoris Pulsativus dolor ab aneurismate arteria venosa.

Aneurisma vidi arteriae venosae, quae in eam amplexitudinem distenta erat, ut manum in pugnum complicatam capere potuerit: Tunica autem illius interna offica evaserat. *Parenti lib. 6. cap. 28.*

§. 2. Nos similem casum ante duos annos in hac urbe vidimus, nempe Aneurisma in pectore, ex arteriae dilatatione, quae pueri 15. annorum pugnum recipere poterat: Tunica vero arteriae cartilagineam crassitiem ac duritiem acquisierat. *Lazar. Riverius Prael. lib. 11. cap. 5.*

OBSERVATIO VIII.

Pectoris gravitas, cum fluctuationis sensu, ob hydropem Pulmonem.

Nos binos tractavimus Pulmonum hydropem laborantes, in quorum thoracis cavitate, dum se hinc inde moverent, aqua commota sonitum edebat qualem in utre agitato fieri observamus: haec quoque in dies sensum & sensum per univermum corpus disseminata est ac dispersa, ita ut primo abdomen & facies, mox coxae & crura pedesque in maximam molem excreverint: Altera mulier fuit B. Lancini uxor: alter vir F. del Reame dictus, qui ambo nullis proficientibus auxiliis interiere: *M. Donatus hist. mir. lib. 3. cap. 9.*

OBSERVATIO IX.

Pectoris dolor à variis Pulmonum & Thoracis affectibus.

§. 1. **N**Ob, Mulier à suppressis lochiis in Pectoris dolorem & gravitatem incidit: Pulmones toti purulenti sunt inventi, cum sacco juxta claviculas pure repleto. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 2. Gasparus N. post multas aegritudines sensit dolorem pectoris ad pulmonem dextrum: Pulmo dexter parvus, ad jugulum erat retractus, & pleurae ad claviculam connexus. *Vide lib. 3. tit. de Hypochondr. tumore.*

§. 3. Illustr. N. diu languidus fuit cum tussicula & Pectoris oppressione: Pulmones citra ulcus summe graves erant, qui statim impositi 3lxxx. pondus exaequantur, ob humoreta lotulentum in his conclusum. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 4. Post

§. 4. Post sanguinis spurum in *phœdæ* corpore, ingentis in dextro pulmone ponderis sensus animadvertitur: Aperto mortui thorace, dexter pulmo tumidus, adeo ut totam illam impleret cavitatem: Eo incisio sanguis crassius effluebat &c. *Vide tit. de Phibisi.*

§. 5. Illustr. N. febre affectus fuit cum tussi & Pectoris gravitate quadam: Pulmones fuerunt inventi tumentes & pravi coloris. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

§. 6. Illustr. febre corripitur cum dyspnœa, tussiculâ, & Dolore universi thoracis superioris: Pulmo insigniter tumidus & quodammodo exesus repertus, in iisque unus humor albus, tenax & purulentus. *Vide tit. de Febribus.*

§. 7. Vir Rever. febre assidua prehenditur cum dolore sinistri lateris & dorsi: Rupta corruptio pulmonis in parte sinistra versus dorsum. *Vide tit. de Febribus lib. 4.*

§. 8. Vir Illustr. febre assidua prehensus cum tussi, dolore non ita intenso ad mediam thoracis partem vergente: &c. Pars dextra pulmonum fuit inventa corrupta, Et ejusdem lateris Pleura male affecta. *Vide tit. de Febribus.*

§. 9. Nob. N. cum febre incidit in pectoris angustiam, dyspnœam: Pulmones sanguine crassiori repleti, Extremæ eorum partes induratae. *Vide tit. de Febribus.*

§. 10. Rev. P. febre assidua prehenditur cum sensu gravitatis thoraci incumbentis &c. Inventa est altera pulmonum pars aucta in magnitudine, ut quadruplo major esset altera, & durior: è qua facta multa aqua fetida exillit. *vide tit. de Febribus.*

§. 11. Puer Rosalis affectus de pondere intra Pectus conquirebatur cum stertore: Tota pectoris cavitas aqua citrina repleta Pulmonesque lividi erant, ganglæ nosi &c. *vide ib.*

§. 12. N. Cursu fatigatus & calefactus, copiose bibit, hinc sensu dolorem thoracis circa sterni dextram partem, &c. Dissecto sterni, inventus pulmo dexter totus scirrhusus, adnatus diaphragmati, pleura &c. *Vide tit. de Phibisi.*

§. 13. Cadaver sectum in quo thoracis cavitas plena sanguine conereto, In pericardio plusquam mensura puris, Tota cordis superfacies absorbpta, Hepar maximum. *Vide tit. de Dyspnœa.*

OBSERVATIO X.

Dolor circa mammam dextram vitio jecoris lapidibus obfessi ortus.

IN Friderici Clegeri, diuturnis dolotibus circa mammam dextram vexati, Hepate viginti quinque lapides deprehensi sunt, quorum minimus æquabat fabam: pondus omnium uncia duæ & drachmæ tres, forma laxum cornutum rufum, (vulgo *roiber feurstein*) referebant, duritie vero smiridem. *Turneiserus.*

S C H O L I A.

Sæpe cacochymia imo ventre concepta, & obstructio hypochondriorum dolores facit, qui maxime apparent & proferuntur in pectore ob contextum diaphragmatis, & quia in thorace communis est membrana & lateribus & diaphragma: in parte convexa: Sic in iis qui affectioni hypochondriacæ obnoxii sunt circum mammæ & sternum & latera dolores turgent: Sic initio paroxysmorum & in specie incubi, & contumaci obstruptione viscerum, oriuntur dolores in

thoracis partibus: In his excludis maxime valet illud quod dicitur totum corpus consipiar ac confluere, at sæpe dolor alia in parte excutitur quam ubi causa primaria sit: An istum iocumodi dolotibus ad sanguinis missionem recurrendum, quod pletique faciunt? Nequaquam, ostendit enim experientia si vel cholera morbus succedat, vel alvi fluxus, solvi ejusmodi dolores: Ergo potius de evacuatione cogitandum per purgationem, & de aperitione obstruptionum. *Ballonius.*

OBSERVATIO XI.

Pectoris dolor ob ventriculum facibus & flatibus distentum.

VERGO febre maligna afflicta, in Pectore & hypochondrio sinistro maximum sentiebat dolorem ac æstum; nulli latere incumbere potuit: mortuæ ventriculus mirum in modum copia tum fæcum tum flatuum inflatus erat ac tumidus. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

S C H O L I A.

ILLud observandum in affectibus hypochondriorum (ne similitudinis errore decipiamus) quod in thorace dolores sentiuntur, ac si pleuritidis argumenta

aliqua forent: Et Ignari Medici ad remedia male confugiant pleuritidis, cum dolor sit per hypochondrii sympathiam ortus: *Vide hystor. lib. 1. consil. 9. Ballonii.*

OBSERVATIO XII.

Dolor ad Pectus ob Renum vitium.

VIDUA N. sæpe nephritica erat, Dolor ad Pectus, Ren sinister obfessus erat lapide exiguo; in magnam molem undique increverat: adeo quabat renem bubulum magnitudine; Dexter admodum parvus. *Vide lib. 4. Tit. de Febribus.*

OBSERVATIO XIII.

Pectoris dolor & scapularum à flatu viscera extendente.

Ludov. N. viscera omnia vento plena conspeximus, quo cum in monoculo afflictaretur, dum pars parte premitur, exitu negato hinc inde, non solum viscera & pectus, sed scapulae etiam incredibili extendebantur dolore. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

OBSERVATIO XIV.

§. 1. *Pleuritis sedem aliquando in sola pleura habet non coactis Pulmonibus.*

Pleuritidis (quoties morbus primarius & solitarius existit) sedem in pleura, seu membrana interna costas succingente consistere, tum doloris sensus, tum observationes anatomicae Pleuriticorum defunctorum habitae plane testantur. *Willis Pharmac. rat. lib. 2. sect. 1. cap. 9.*

§. 2. Videmus in Pleuriticis cadaveribus Pleuram syderatam decuplo crassiores, Ergo in semorbis continebat, Non inficior posse communicari Pulmonibus & Pleuritidem degenerare in peripneumoniā. *Riolanus Encheir. Anat. lib. 3. c. 4.*

SCHOLIA.

Non inficior posse communicari] Vulgus observatio est Peripneumoniā supernumerā pleuritidi succedere aut supervenire: Super hoc opinari duces Peripneum. & Pleuritidis affectus esse modo singulares & separatos, modo connatos & primus coexistentes; & modo invicem successivos aut succedaneos esse: Enimvero causa procatartica in actum concita, adeo ut singulis lenticulis simulque effervescent vasa minora alicubi obstruat, morbi nidus interdum in pleura, aut pulmone leparum, quandoque in utrisque simul, & nonnunquam primo in hoc, & denique in illa, figitur: pleuraeque vero pleura imprimis salutaria, mox eadem causa morbilica etiam vasa pneumatica invadit: Porro novimus diversimodam hujus affectus metamorphosin, cum vid. 1. latus dextrum, vel sinistrum, mox eo relicto pulmones, & dein utrisque deserta occupasse cerebrum, & non raro sedem inde in priora loca transulisse: Cæterum quo rationem praeditam Peripneumonia, non tantum pleuritidi, sed frequens etiam anginae, & aliis interius affectibus succedere: quippe dum sanguis lenticens, simulque effervescent, febrem in toto continuat, obstrucentem phlegmonem hac illuc varie transfert: Atque hinc observationis istius, vid. quod peripneumonia interdum paralyticis, aut hemiplegia lethalis succedat, solutio, quae interpretes ita plurimum rogit, liquido patet, in quantum sanguis, qui lenticens modo vasa pulmonica obstruxit, postea vasorum plexus quoddam carotidas inficiens,

spirituum animalium in hac aut illa hypocrata regione genesis, indeque in partes nervas respectiva, affluxum inhibet: *Willis ibidem.* Utinamque affectus eadem procatartici, vid. sanguinis ad lenticendum, simulque effervescentum diathesis: quinimo eadem causa conjuncta est, nempe vasorum alicubi minorum, ob talem sanguinis dispositionem obstrucent phlegmonem: Porro à Medicis pleuritidis neotericis ad utrumque morbum eadem praeteribitur rosendi methodus: potissima discriminis ratio, quae ab invicem distinguuntur, à locis affectis, quae nomina eorum denotant, detumitur: Enimvero sanguis, ad obstrucentem inflammationem alicubi accendendum praedispotus, morbi nidum ideo saepius in corpore deligit, quoniam hic propter incendi vicalem focum, immensius efflagrat, ac infimul effluvis vaporosa, aliisque recrementis, quae circulationem praepediunt, minime liberat: Quibus accedit, quod regione hac clausa sanguinis compages, periculosus angustioris transitura, non uti in visceribus iml ventris, aut semimemo quopiam recitatur, aut succo aquoso recens diluunt: itaque si fortan cruor per artenas venabiles in membranam costas succingentem provectus, in transitu suo circa vasorum angustias aut intercapedines haerebit, affectus, de quo nunc agitur, succedet: Pariter si quando intra ductus Pulmonares obstrucent contingat, Peripneumonia excubabit. *Willis ibidem.*

§. 3. Observatum fuit in Pleuriticis post mortem apertis Pleuram adeo intumescere ut decuplo solito sit crassior, & propter viscositatem hujus membranae costarum vivent: Propterea scripsit Hippoc. cadavera pleuriticorum dissecta apparere fulgurita, quod de partibus internis thoracis est intelligendum. *Riolanus Anthrop. lib. 3. cap. 5.*

SCHOLIA.

Pleuram adeo intumescere] Quidam dicunt eam adeo attenuari in pleuritis ut vix conspici queat: Duplex autem est ubique, ut inest duplicemque vasa ferri queant: Inter eas membranas saepe materia pleuritica colligitur, nec tantum inter pleuram & musculos: Galenus simplicem facit, duplicemque tantum etiam mediastinum admittit: Duplicemque illam de crassitie interpretatur *Riolanus*, non sine laceratione demonstrandam: Contrarium in pleuriticorum tumido latere est manifestum. *Bartolinus Anat. Reperit.*

lib. 2. cap. 4.

Quod de partibus internis] Latus lividum, (vehementis pleuritidis reliquias,) vidi in viro 30. annor. Fabio Scloperario, anno 1698. propagata phlegmone ab internis partibus ad externas: alias li exteriores partes solum inflammatae fuissent, vix fuisset pleuritis lethalis.

Duplex crassior] Enormis illa crassities satis ostendit solitatem pulle inflammationi: Pleuram tumidam vidi à scirrhotico tumore; Callosam in hydropneumonia

monia Polypus: Si autem vas habet, arterias & venas, quin & collarium petriolium (quod innumera ven-

sum sine conspectum esse ait *Eulamus*) cur phlegmone non tentabitur illas pulmonibus?

§. 4. Quod in plurimis ex Pleuritide interemptis pulmo affectus invenitur, inde concludendum non est semper ita contingere, nam pleuritides vehementiores quæ mortem inducere consueverunt in peripneumoniam ut plurimum degenerant: Sed plurimi testantur, & nobis etiam experientia compertum est, in multis pleuriticorum cadaveribus, solam pleuram corruptam & putrefactam inveniri. *Lez. Riverius Pract. lib. 7. cap. 2.*

S C H O L I A.

Pleuritidis solitarie non coactis Pulmocubus, indicia sunt tussis absens aut raritas, & excretionis; vehementia vero doloris insignis: Talem observavi mense Julio anno 1676. in Geocrosta. Nobili, Dom. de Fernex, Illustr. Guilelmi Bodei Propere: Adeo acutus urgebat dolor, lancinans pectoris partem dextram infra mammam, ut anhelus leipothymiam frequenter incurteret: Inter riduum malum desit theriacum usum, forum scilicet ex Jache vesica incluso, & carapellum ex malva, albi. flor. lilior. alb. chamom. ut. mellis. sambuc. hyper. pariteralis, femina. lini, fenugr. lacti incoctis, addito croco: Ictura est potio ex oleo amygdal. dulc. syr. papav. erant. & albi; aqua taraxac. arripic. papav. charad. card. S. & Mariz, additis pulv. ex mandibula lucci, oculis cancri & flor. epydum papav. Toto vero morbi decurso nulla fuit tussis neque anacatharsis: In pertinacia doloris parti dolenti succam cucurbitulam admoventi curassem; præcesserat autem sanguinis

missio, qui parus & interruptus prodit absque levamine. Complicare cum peripneumonia pleuritidis; sed io qua exima tantum membrana pulmonum affecta fuit, recensissimum habeo exemplum: Apud 10. 1678. Dom. la Tou Sedacensis, insigni vomitu materie biliose corripuit, succedit immediate dolor puotioris sub mamma dextra, comite ruscicula, sed sine febre: Phamacopus accersit venæ sectionem impetras, quam supervenies inhibeo, ac acetem clysterem petriolo, à quo plurima excelsa bilis: Pergrame dolor sanguinis missionem concedo ad lib. qui paria omino; mox sequenti ad eandem quantitatem educo, pulmo minus impugnat: postredie tandem, cujus pars prior exiens corruptionis notas adhuc dabo, reliqua pusum sanguinem exhibui; quo emissio julepum anipleuriticum præbui, hinc sedatis dolor, tussis cessavit; at paucissima diei spatio per anacatharsim excludit: Interim febris, carapellum admoventi; lecta sex dies morbo omnino defunctus est.

§. 5. Scio in Arehiohospitali St. Spiritus, ad quod pauperes ex Romano agro curantur afferuntur, quotidie observari cadavera pleuriticorum, in quibus latus læsum & corruptum reperitur, cujus rei plures & ego oculati testes sumus: *Propter Martianus comment. in versum 261. lib. Hipp. de loc. in homine.*

S C H O L I A.

Zuchim in appendice ad consil. 26. ait se io sectione demonstratorum eorum qui Pleuritide periisse judicari, non membranam succingentem inflammationem, sed pulmonem cum sua membrana laceratos & corrosos observasse: hæc experientia nris, & loco Hippoc. lib. de loc. in homine. *Quam ante latus doluerit, reliqua eorum funta velut in prorsu fuerit, hoc quidem Peripneumonia, illa vero Pleuritis* etc. asserit pleuritidem omnem Pulmonis inflammationem esse: Ex hac apud ipsum tanti forte ut cetera omnia Hippoc. loca rescere studuerit, in quibus latus, quod collis, carne & membranis contrahitur, in pleuritide affici testatur: Verum ei considerandum fuerat Authorem hoc in loco de Pleuritide non exquisitum sermonem habere, sed de ea quæ à destillatone à capite ortum ducit, quæ à vera & exacta pleur. multum differt, & ratione materie, & quodammodo loci affecti: In hac enim materia pleuritidem cum peripneumoniam faciens io pulmonis cavitatibus consistit, dum à capite descendens per asperam art. fertur: Ubi quoniam inflammationem excitare non admodum est apta, nisi ex propriis natura calida sit, ideo Hipp. hanc apertum conditionem, *si sola fuerit*, Sic enim humor in pulmonis cavitatibus consistens caloris tantum inducere potest, ut inflammatio in eo exciteretur, quod raro alia humoribus evenit: In vera autem pleurit. aut peripneum. quia materia non à capite descendit, sed à toto; & à proximis partibus ad affectos locos procedit, ut aperte testatur Hippoc. 1. & 2. de morbis. ideo hæc facile inflammationem in parte ad quam fuit inducere potest, dum à venis eg. effluat, per canaque & eorum porositates dispersa, potest, indeque

incalescens inflammationem inducit, hæc enim inflammationis est generatio: Ex quo altera notatur periduram affectionem differre, quia ad veram pleuritidem, aut peripneum. generationem, bilis & pituita simul concurrunt, ut locis allegatis testatur Hipp. In his vero, de quibus hoc loco tractatur, bilis sola requiritur, alioqui bilis puerit admixtione ita contemperatur, ut in cavitatibus pulmonum ob acis frigidi consilium accendi esset impossibile, & in hoc consistit differentia inter hæc affectum & veram peripneumoniam, in qua bilis & pituita, quia ut testatur Hipp. 1. de morbis. à toto ad interiores pulmonum cavitates fertur, eorum petrioliosis substantiam, ita in localis est, ita ut cum ad internas cavitates pervenerit, refrigerari non possit, quod evenit in hoc affectu, in quo materia à capite descendens ad pulmonis cavitates immediate pervenit, in quibus ita tamen refrigeratur, ut inflammationem excitare non possit, nisi bilis simplex fuerit, &que copiosa, ut ait Hipp. in textu: cum ergo adeo inter se differant prædicti affectus, eorum etiam minime simul confundenda: Et si ab Hipp. Pleur. & Peripneum. nomine sunt denominati, id ob similitudinem symptomatum factum, cum enim apud omnes constat Pleur. esse affectionem lateris; Peripneumoniam vero pulmonis inflammationem: Et quia pleurit. pro majori parte non tantum latus occupat, raro utrumque, ob distensionem dextræ lateris à sinistro. E contra vero peripneumonia ob pulmonis loborum coactionem & continuam, raro evenit unam ejus partem inflammari, altera permanens illa: Hæc omnia respiciens Hippoc. qui morbos à capite ortundos descri-

bere proficiebat, ut demonstraret & pleuritidem & peripneumoniam à capite originem habere posse, Pleuritidis nomine unius tantum lateris affectionem appellavit, Peripneumoniam vero utriusque affectionem. Nec Pleuritidis hæc demonstratio impropria censenda, quin in Peripneumonia læus affectum esse demonstrat Hippocr. quia, ut ipse inquit, fluxione bilis in pulmonem dilabente pulmo repletur, repletusque tumescit, adeo ut latus attingat, cui adhesens inflammationem ei imperitur, unde dolor oritur, non ratione inflammationis pulmonis, quia ob scilicet exiguitatem minimum dolet, sed ratione affectionis ipsius lateris &c. Quæ omnia Vis præfatus solimod. vertere debuerat; nec ex hoc unico loco, & in quo de his affectionibus non ex professo tractatur, cætera omnia rejicere in quibus de his peculiariter agitur? Quod si in omnibus scitis cadaveribus pulmones læsi in pleuritide semper reperiunt, considerare debue-

rat Romæ id observasse, ubi ob cæli inconstantiam, & humiditatis excessum morbi à capite pro majori parte ortum ducunt, ut mirum non sit si pleuritides & peripneumoniz, quæ hæc vagantur, sint fere omnes de numero eorum de quibus hoc in loco fit mentio? Scio quidem in Archihospitali S. Spiritus &c. (vidi supra) Quare quoties Pleuritis est vera, cujus signa, observationis modum & affectum locum diligenter explicavit Hippocr. 1. de morb. lib. 2. v. 200. & quæ à 150 diebus incipit, ut testatur idem l. c. ex communi experientia, non nunquam destillatione à capite, semper læus affectum invenitur, pulmone illaeso apparente, nisi ubi contigerit pleuritidem in peripneumoniam transmutari. Hallerus Martianus: An vero Pleuritis à curatio à capite delabente orti possit, vide *Absteram* lib. 2. de catarrh. p. m. 206. *Epidemique*

Theses de Peripneumonia cap. 1. §. 3.

4. §. 6. & seq.

§. 6. Subcostalis tunica ampla est, thoracis cavitati respondens, tenuis sed robusta, crassior tamen circa dorsum; atque in thoracis morbis quibusdam ita sæpe excrescit tumescitque, ut decuplo crassior quam cum sana erat, sicut observavimus, evadat: *Plateri* lib. 2. de hum. corporis fabrica. p. 168.

SCHOLIA.

Pleura ubique duplex est, ex quibus illi pars crassior est quæ thoracis cavitatem respicit, tenuior vero costis alligatur: Inter utramque vasa omnis generis excutuntur, ex quibus venæ sunt 12. utrinque, quæ partim ab intercostali ramo claviore derivantur, quæ duæ superiores: partim à vena sine parit decem inferiores: Toridem quoque sunt arteriæ, quarum quatuor superiores ab intercostali superiore, costarum radicibus arteriæ nascuntur: Inferiores octo à posteriori sede trunci descendens arteriæ moyæ: Quia autem plurima hæc vasa sunt, propterea & fie-

quens admodum hujus membrana inflammatio nascitur; Neque tamen inter pleuram tantam, & musculis intercostales, quos una cum costis pleura incingit, si quando inflammatio hæc in abscessum veris fuerit, pus ipsum conservavit, sed pluries sine ictu duplicaturam hujus membrana, per quam vasa incedunt, & quæ stabiliantur. *Agellus Anat. lib. 9. cap. 3.* Duplicem cui fecerit natura hanc membranam, rationem reddit Columbus Anat. lib. 2. cap. 3. ob officium scilicet duritiem, ne interna, crassius scilicet, ob pulmonis indolentem motum laedatur.

§. 7. Hoc notavi minime veram esse, *Zecchi*, *Fel. Plateri* aliorumque doctrinam, pertinaciter defendentium in Pleuritide, quæ frequens est morbus, vel nunquam vel rarissime Pleuram, sed semper inflammari exteriorum Pulmonis membranam, in eaque propter exquisitum sensum (*hunc male* & præter omnem experientiam ei tribuunt) tam crudeliter dolores excitari: in Peripneumonia vero inflammati interiorum Pulmonis substantiam, quæ obtusissimi sensus est, atque hinc tantum obtusos in ea fieri dolores: Quippe ex multijuga cadaverum pleuritide extinctorum dissectione, rem aliter se habere invenimus, & Medicinæ Studiosis non semel demonstravimus: Scilicet competi sumus, in omnibus Pleuriticis inflammari pleuram, eamque solam si Pulmo liber esset ab ejus connexu: sed si ille pleuræ adnecteretur firmius, tunc una cum pleura etiam pulmonis adherentem partem inflammari, *De Diemerbroek* Anatom. lib. 2. cap. 13.

§. 8. Anno 1656. mensis Decembr. in Nosocomio profeci cadaver mulieris Pleuritide interceptæ, quæ primis 14. diebus acutissime afflicta fuerat: Postea vero inflammatione ad suppurationem deveniente, morbus per aliquot dies mitior visus, sed tandem morte finitus est:

Invenimus Pulmonem à Pleura omnino liberum, & in dextro latere totam pleuram, ad axillis usque ad diaphragma inflammata: abscessum vero disruptum fuisse ad quintam & sextam costam, quæ duæ costæ digitorum latitudine, per ruptionem abscessus omnino erant à pleura liberatæ, & pus in thoracis capacitatem medioctri quantitate effluxerat: Pulmo autem prorsus nulla inflammatione, aliæ prava affectione læsus inveniebatur. *Idem ibidem.*

§. 9. Plane similem casum etiam demonstravi anno 1657. in utro pleuritico extincto, qui media ætate in fœno colligendo occupatus, & valde sudans, cerevisiam frigidam magno haultu biberat, sicque illico morbum, & paulo post mortem contraxerat: In quo etiam tota pleura unius lateris inflammata reperiebatur, Pulmone prorsus illaeso. *Idem.*

§. 10. Ex his liquet minime verum esse quod scribit *Regius* lib. 2. Infit. cap. 11. In omni pleuritide exterioris partis Pulmonis inflammationem etiam adesse, idque omnium pleuritide

ridite extintorum corporum sectiones docere, in quibus semper Pulmones affecti inveniantur, Pleura saepe integra; Credo Clariss. Virum ex præconcepta opinione hæc docere, nam ut certum duco cum Pleuriticorum sectiones nunquam fecisse, ita etiam vero simile existimo: illum easdem ab aliis institutas, vel nunquam vel rarissime vidisse: Nam autopsia omnino contrarium docet, ut ex multa pleuriticorum extintorum sectione, quam in studioforum Medicinæ grariam privarim institui, abunde liquet: Nunquam enim Pleuriticidem illaesa pleura factam invenimus, sed in quibus pulmo pleuræ affixus adhærebat, in his Pulmonem, qua parte pleuræ adnæsceretur, simul etiam affectum vidimus: In aliis vero, quibus Pulmo liber à Pleura erat, cum nihil affectum fuisse: hacque in parte oculis nostris magis confidimus quam dictis aliorum qui forte nil tale viderunt: Si *Platerus* scilicet quid tale aliquando observasse scribar, nihil miror, fortassis ille (quod etiam aliis contingere potest) inter plurimos variis morbis interemptos, tamen paucos Pleuriticos secutus. Et forte paucis illis quos secutus, etiam pulmo pleuræ affixus fuit, *Quemadmodum ex dissectionibus comperio illud tertia vel quarta hominum parti contingere*: sed alios quibus Pulmo à pleura erat liber, secuisse non videtur: Quales tamen non semel nos spectandos exhibuimus, cum gravi pleuræ, nulla vero pulmonis inflammatione, aliave affectione. *Idem.*

OBSERVATIO XV.

Lateris dolor ab abscessu in pleura & musculis interioribus thoracis.

Quondam Viri Illustr. à Pleuritide spuria & diuturna defuncti cum Anatomen faceremus, manifesto liquebat abscessum magnum in pleura & musculis intercostalibus suppuratum ac interioris disruptum, puris copiam ingentem in thoracis cavitatem profudisse, quod diaphragma subitatum corrodens, ingens in eo foramen excuderat. *Willi. cap. de Pleuritide.*

S C H O L I A.

Pleuritide spuria] Pleuritis distingui solet, quod sit vel exquisita & vera, ab inflammatione ipsius pleuræ, ex assensu sanguinis effluente: vel Notha, quæ sedem habet in musculis intercostalibus, vel in eorum interstitiis, à flatu, vel humore seroso & acri ibidem aggesto: Notha tunc dupliciter talis est, vel ratione sedis affectæ, vel ratione causæ: Hoc in casu notha non fuit ratione causæ, abscessus enim adfuit, è quo insignis puris copia prodit, cujus generatio est à sanguine: Sed ratione affecti loci: Dedit enim abscessus fuit in musculis intercostalibus, qui disruptus viam sibi fecit per pleuram à pure corrosum: Quanquam plurimi censent viæ possibile esse ut musculi mesopleurici non simul ob contiguitatem inflammantur cum pleura: Id vero plerumque contingit in notha pleuritide, ratione causæ, in legitimam transit, cum scilicet flatus inter pleuram & musculos irrumpant, vel inter pleuræ dupliciter: sic enim via fit sanguini adpertsis vasorum osculis, quod ratione doloris promptius confluit.

OBSERVATIO XVI.

Lateris dolor excitatus à tumido ea parte pulmone, cum vitio muscutorum intercostalium.

Rever. N. febre assidua confictatus est eum dolore sinistri lateris: Invenit est altera pulmonum pars aucta in magnitudine, ut quadruplo major esset quam altera & durior: qua secta multa aqua fetida exiit, Et ab eodem latere musculi intercostales lxxi. *Tit. de Febribus lib. 4.*

OBSERVATIO XVII.

Anatome Pleuritici cujus Pleura supra modum erat crassa, Et pulmo vicinissimè illi adnatus.

Jac. Cobler in morbum acutum thoracis incidere: Defuncti eadavere dissecto, Pulmo dextri lateris pleuræ validissime adnatus erat, ipsaque pleura supra modum crassa, ut facile conspici fieret hic morbi initium & focus fuisse: nam totus ibi Pulmo fovee eonsumptus erat. &c. *Vide tit. de Phthisi.*

OBSERVATIO XVIII.

Anatome Pleuritici, cujus uterque lobus Pulmonum arcte costis adhærebat.

Henricus N. in lateribus dolorem senserat: Inventa sunt fragmenta bronchiorum à substantia pulmonum avulsa, cum sanie copiosa: Et uterque pulmonum lobus arcte adnatus costis, ut sine laceratione avelli non posset: In dextro latere majorem dolorem senserat. *Vide tit. de Phthisi.*

OBSERVATIO XIX.

Sinistri lateris dolor ab abscessu sub ala sinistra, cum vitio Pleurae relaxatae, Diaphragmatis suppuratione.

Virgo annum agens 21. gravissimis doloribus cruciatur, qui regionem sub ala sinistra lateris, & costas mendosas occupant, & interdum ad thoracis vertebrae & ad imum ventrem exporriguntur: saepe motibus convulsivis tentatur, & non raro suffocari videretur: Tussis deliriumve aliquando coram est: assidue febricitanti lotis pinguntur crassiora: Anno praeterito experta est tumorem in eodem latere, qui suppurari non potuit: Infelix juvenis vixit usque ad 44. diem.

Secundo cadavere inventum est septum transversum in interiori parte suppurarum, ulcusculis refectum, quemadmodum tota Pleura contaminata & relaxata, & abscessus manifestus sub ala sinistra, in parte interiori non disruptus. *Lelium à Fonte consult. 132.*

S C H O L I A.

EX propositiorum symptomatum diligenter expositione, non difficile est judicium facere affectionem referendam esse in tumorem sub ala sinistra interioris suppurarum, cujus materiam possi dum ad meningis vertebrae ventur, dolores efficit acerbiores: Dum ad septum transversum trajicitur, ejus naturale temperamentum & substantiam permixta, caetera accidentia accersit: Dum ad peritonaeum profunditur, ventris dolorem producit: Neque minus hujus materiei noxae ad has partes facilius esse profusionem; maximo enim inter has partes reperitur consensus: Pleura namque à tenui duraque meningibus medullam spinæ obtegentibus, originem ducit, ut omnium membranarum uoum sit principium: Haec igitur meninges mox in cavum thoracis emergere incipientes, latus sese explicant, prodantque membranam pleuram dictam: quapropter dura tenuisque meninx erunt principium à quo & peritonaeum & pleura reliquaeq; vero membranae originem trahunt: Diaphragma verò *φύλαξ* Aristoteli dictum, adnectitur extremis costarum unumquodque nostrarum, à quo duodecimae dorsii vertebrae, & ori ventriculi illum perforant, atque inferiori sui parti, interveniunt perito-

naei, Superiores autem interveniunt Pleurae, ut illi origo (cum musculus sit) pendeat à cartilagine omnium costarum nostrarum, tum ab ultima dorsii vertebra: atque ita principium illius erit circulae & perfectum, à commemorata partibus deductum. Decretum igitur sit symptomata omnia fluxioni purulentae accepta referri debere, quae ex consensu partium finitimarum, in principis convenientium concitatur: ad quas dum materia noxia profunditur, eorum temperatio atque consuetudo alteratur, atque inflammatio suboritur, & postea, ratione cujus omnia symptomata proposita originem ducunt: Alii Medici (quorum opinio praevaleat) arbitrabantur dolores à flacibus proficisci & à vermibus. *Idem*

Vergo A levi & vires conditione peculiares emergere indicationes, quod morborum idea inde varietur, in eosd. floere: Observandum cum Nartices sunt pleuriticae, graviter eas aegrotas & magna dyspnoea tenet: Quod contingit & quia mammae adhaerent, & ad eas impetu humor fertur, ut Gal. docet in lib. de Simpl. med. facul. Sic corpora exercitata & robusta facilius à pleuritide & peripneumonia intereunt. *Hippoc. in Coacis lecte.*

OBSERVATIO XX.

Pleuritis & Peripneumonia saepe complicantur, ut pleuritis solitaria raro existat.

§. 1. **S**emper in hac fui sententia ut Lateris dolores magna ex parte ad Pulmones pertineant, raro autem ad membranam illam costas succingentem: Cum in pluribus praesertim corporibus post obitum dissectis, aegrotum qui communiter accepta pleuritide periisse judicabantur non membranam hanc affectam fuisse sed Pulmones observaverim, una cum sua membrana laceratos & corroso. *Zecchin appendice ad consult. 26.*

S C H O L I A.

Pleuritidem nonnulli & recentioribus non potant diu perdurare solum sine propagatione humoris in Pulmones, qui saepius adhaerent pleurae, imo transilire per metastasin humorem in Pulmones & formare Peripneumonia: Id primus proposuit *Zachius* in consilia, ex Hippocratis auctoritate: Ratioibus aliis id confirmant, scriptis editis, ut Vincentius Bontorum libro de Peripneumonia (*quem sequuntur Schaefferus in Thesim à Liberatori propugnata*) Atque illam combustionem affectum thoracicum *Pleuripneumonia* appellant, quod ante ipsas monogram in mea *Anthropographia*, caput de Pulmone: Locus Hippocratis consideratione dignus est, cujus explicatio mihi tentanda, Ego vero sic interpretor, Saepè Pulmones in utroque latere, vel alterato, ad-

haerent membranae costas succingenti: vel si non adhaerent, quando latus primo facit affectum inflammatione, membrana pleura ex affluu humoris inebriata & mollior facta, exuat teum glutinosam & Pulmones verò cum inspiratione totum implent thoracem, tandem adhaerent Pleurae, & nexus ille firmior redditur per adhaerentem fibrilem: Nec morum Pulmonum impedit istam adhaesionem, quia inspirationis & expirationis, adhaerentis lateris dolore, motus sunt exigui ex parte aegrotantis, meo dolore vehementioris: atque sic agglutinatur Pulmo parti dolenti, tuncque pleura itis transit in periton. Vel utique affectus conjunctus est, & proinde facilius expectoratio humoris, primum cruenti, ex levi exulceratione tam pleurae quam membranae Pulmonis: deinde reliqua

reliqua materia partim ex latere procedit, partim ab incremento Pulmonis nascitur, vel ab impunitate malis sanguine circulari transcurrit per pulmones: inde tanta copia materiae tumens biliosi, putrosi, quod rejiciat sufficiens: Si vero non adhaeret Pulmo Pleura, vel effunditur ichthoreidis humor, sive sabulosus in capacitate thoracis, & difficillime reoritur, utique nascitur Empyema, quod nisi sponte vacuetur, aperto latere exsurgendum erit: Itaque ex Hippocrate, doctrina, quam sequuntur sunt Herophilus, Aulore Caelio Aureliano, & C. Celsus, vera Pleuritis est si accesserit Peripneumonia unitus lateris. Si utrumque lateris dolet, vera erit Peripneumonia, quia totus Pulmo laborat, tam datur quam finitur: atque assidue duriorem collas ichthoreos, quo distillat, imbuit & lardere potest: Itaque Pleuritis & Peripn. sunt affectus lateris & congestes, qui sibi morbo tradunt operas ad perniciem vel solatium agi: prout valida fuerit aut imbecillitas constitutio Pulmonum, atque remedia, praestent V. S. libelli sublevari fuerint: Nec potest per alias vias materia Pleuritica transferri vel propagari in Pulmones, per metastasim vel epigenesin: Videmus tamen in Pleuritide cadaveribus pleuram syderatam decuplo crassiores, ergo in se morbum continebat: Nun inficior posse communicari Pulmonibus, & Pleuritidem degenerare in Peripn. sed eo modo quem dixi. *Ritellus Embryonis Anat. lib. 3. cap. 4.* Esti vero solum conatum pro causa admittit *Ritellus*, immixtus hoc fundamentum quod via non adit communis, cum Pleura ramos accipiat ab aërya vena, Pulmo autem ab arteriola & arteria venosa, accidere tamen potest in inflammatione in pleura & pulmonibus simul excitari, scilicet in ipsos pars pleurae afficitur, quod illa cum membrana pulmonis ambiente communem habet, & circa partem superiorem: hi

cum pleura connectantur: dum sanguis p. n. in hanc influit, facile etiam in pulmones simul illabi potest: Sed vicissim concedendum solum membranam collas succingentem aliquando inflammari, & vetam pleuritidem, cui ob id a pleura nomen inditum. generari posse: membranam enim hanc in inflammationis capacem esse ostendit ejus constitutio, cum enim duplex sit interior & exterior, inter quas venit de arteria perrepant, sit ut à sanguine p. n. affluente adeo intumescat excrescatque, ut decuplo lana crassior evadat, quod *Platerus* observavit: Idque contingit cum inferior ejus pars phlegmone afficitur quae cum Pulmonibus non cohaeret. *Vix* autem per quas sanguis ad Pleuram pervenit, communiter statuuntur venae cavae ascendentes ramuli, & quidem venae mammae, quibus nutriendis quatuor collae superiores, vel aërya vena, quae ramos ad inferiores reliquas collas deducit: Si huius capillares propagines quovis modo aperiantur, sanguis in pleuram exilit: Ex decreto circulationis sanguinis, hic per arterias transmittitur vel attrahitur: Transmittitur, cum in his congestus sponte effervescit, à toto aut parte aliqui impulsus: Attrahitur vel admittitur ab imbecilli pleura, calente vel dolore affecta: quoniam concedi potest ex arteriis per venas recessus sanguine pleuram etiam irrigari posse.

Pulmonis lateris & aëryae] Quidam Medicus magni nominis, cui non esse minus si Pulmo ita corruptus aperto cadavere reperitur, nec propterea talem sepe esse ante mortem qualem antea ostendit: Probabile id quidem, sed ut concedam post obitum alterari, praeterea si corpus diu infectum servetur, sed tamen id tam opere non afficit pulmonem: Quibus Pulmo totus viridis est, huius lateris in pulmone est quae falsas pleuritides infer, nec sanguinem exprobat: An his multus porus bonus? nequaquam. *Ritellus Epid. & Ephem. l. 2. p. 165.*

§. 2. Dom. de Gatinolis à Pulmonia & Pleuritide complicatis convaleuit beneficia tam copiosa excretionis cruentae, ut quotidie linteum unum & alterum lecto infratum tabo rejeto complueret: Sed quadriennio post simili affectu rerudescere, in interempe cadavere abscissus in Pulmone reliquus post detectus. *C. Piso de morbis ab illarvie ferofa sect. 3. c. 9.*

S C H O L I A.

A Pulmonia & Pleuritide simplicibus] Pleuritidem & Peripneumoniam distinguere à se invicem operis precium est: Sunt autem fere germani & similes affectus: quae similitudo vel doctores saepe fallit, Hippocratis annotatione: Iuniores itaque deinceps meminissent non solum doloris specie distingui, Pleuriticas namque acutus est & pungit vehementer alteratque latus aut utrumque, cum in Peripneumonia gravis quidem, sed obtusus & parvus, ac paucos aliquot dies premar pectus fere supra mammae, sed etiam hinc notis, scilicet in Peripneumonia spumam cruentam primis statim diebus de largius distillat, si salubris praesentim futura sit exitus, sed obscurus de 40. etiam dies, ut observari non sine admiratione in D. de Gatinolis &c. (*vide supra*) Deinde vero vomica utrumque affectum à se distingui, quoniam nullus quod sciam Praedictorum annoverit, diuturna tamen me experientia docuit, primis nimirum diebus Pulmonitici vomere familiaris esse, forte quod membrana communis est aëryophaga & bronchii pulmo-

monum, ideoque facile Pulmonibus ventriculus expulso toleret: *Piso* hoc citat.

excretionis cruentae] Pro varietate sanguinis inflammationes hae pulmonum generis sunt diversi: nam si ille purus fuerit, qualem arteria venosa continet, simplex erit phlegmone, in qua quod expulsi sanguinis sinceris mixtum esse apparet: Si vero tenuior fervidiorque sit, qualis in venali arteria exilit, phlegmone erysipelato des dicta, nascetur, in qua febris vehementior: uti & si succina bile perfusus, tunc spumam cruentam & substatum redditur: quod cum frequenter eveniat, causam parvam ut peripneumoniam ab erysipelate pulmonum prodire aliqui scripserint: Fit quoque ut si bilis arta sanguini commisceatur, succina & substat spumam cruentam commixta esse videantur: Sed & à crudo, seroso, putrosoque sanguine si phlegmone fiat, spumam minus coloratam erit: Ab humore à sanguine separato verum pleuritidis aut peripneumoniae causam statueri, quod aliqui faciunt, non possumus. *Platerus Tom. 1. Pract. p. m. 343.*

§. 3. *Sepph. Jonam* corripuit acutissimus lateris sinistri dolor: Pulmo mortui totus viciatus deprehensus cystisque accretis. &c. *Tulpius observ. lib. 4. cap. 19.*

S C H O L I A.

Coffia acuta] Ab exsiccante sanie glutinosa compingente pleuram & pulmones: quod facilius contingit in iis quibus à natura simul cohaerent: vel quibus ex pleura, hoc vel illo latere (sed frequentius sinistro) nervae quaedam fibrae expullantur, quarum interventus simul connectitur; ideoque fit ut simul & semel pleuritidis & peripneumonia exoriantur.

Acutus lateris dolor] Punctorio lateris dolorem solum pleurae quidam adscribunt, pulmonis membranae detrahunt: At quid impedit quominus pulmonis membrana, à mordacissimo humore vellicata, punctorium percipiat dolorem? Hippocr. 1. de morbis, textu 57. ubi de Pulmone ad latus prolapsio, Et dolores

aut arguit aut; Neque etiam in Pleuritide necessarius est iste dolor Punctorius, cum Hippocr. in Coacis, in pleuritide mites dolores admittit ab initio, dicens, Quibus Pleuritidis initio dolores sunt mites, ingravescent autem 7. aut 6. die, facit ad 12. usque diem pervenire: ubi Dixerit in comen. Initio dolores sunt mites, quia non adeo essent humor, nec visus fuit, nec inflammatio magna: Potest ergo contingere ut aliquando pulm. dolore punctorio afficiatur, si humor sit effectus, vel tensio valida, vel inflammatio magna: Non ergo simpliciter ex dolore valido & punctorio arguendum Pleuritidem esse affectum.

§. 4. Vidimus apertum cadaver Iohanna, Navarrae Reginae, Caroli Noni Galliarum Regis, Joh. le Mire & aliorum, qui omnes interiere à latente Peripneumonia, praecedente dolore lateris aliquo, sed non magno, Et iis omnibus Pulmonis corpus putre erat, saniosum & foetidissimum: Carolus Rex peripneumonicus erat, sed inflammatio vete eum non sustulit, quanquam dolores lateris eum saepe fatigaret: Alii vero Peripneumonici intra sex aut septem dies periere, cum in latere dolor ortus esset qui derepente evanuit. *Balsamii Ephem. l. 2. p. 154.*

S C H O L I A.

Latente peripneumonia] Levis pleuritidis specie imponente, quia lateris dolor, aut mitis est, aut secunda vena aliore remediis usurpato statim evanescit, cum tamen saepe peripneumonia comes sit, aut succedat: Imo isti dolores lateris per accidens tantum contingunt, scil. per resudationem seu actiosculi in corpore ipsius pulmonis stabulantis: Et cum febris adest, & praeteritum thoracem occupat, contingit humorum ebullitio & velut turgescencia, hinc dolor alius in sinistro latere, qui pleuritidem refert, Et tunc tamen secus vena: hinc cessante dolore lateris, superfluit tamen zitus, sui, dyspnoea, secus esse solet Medici, quod ille deserit, cum tamen in Pulmone deterius foroveat malum, scil. phlogosis, à sanie ibi concepta & fervente. *Idem.*

Dolore lateris aliquo] Dubitari aliquis an inflammatio Pulmonis dolores in lateribus excuset? Primum id experientia videmus, imò plerique vix distin-

guunt inflammationem Pulmonis cum febre conjunctam à febre causode, quod vera inflammatio Pulmonis raro adveniat. Sed illi scire peripneumonici intererant, quorum Pulmones infirmi natura saniem collegerunt, unde corruptio ipsius Pulmonis, sequuta est: Id vidimus in eadem. *Navarrae Reginae* &c. Et quae inde Peripneumoniae, & febris foris in Pulmone habentes nascuntur, decipiant Medicos: Hippocr. lib. de rat. affl. cum Peripneumoniae descriptis, aut, Peripneumonia fit cum Pulmo largum aut putram saltem in se attulerit: ab initio & per totum morbum visus arida & acuta, rigor, febris, dolor in pectore & in dorso manebit, aliquando etiam in latere, creta curvus fiat, Maxime vero observavimus in iis dolores laterum excitari quibus sae thorax hydropse laborat, aut

Pulmo duriculus sanie multa fecer, Quod in superioribus visum est. *Balsamii Ephem.*

& Ephem. p. 154.

§. 5. Joh. le Mire, cum Meloduno Parisios Intre devescus petir, rigente admodum hyeme, vi frigoris ita calor intro cogitur, ut inde horruerit valde, deinde calorem ingentem conceperit: Media nocte coepit queri de dolore fixo ac pungente ad nothas costas: Magna notha Pleuritidis suspitio est: Is narrabat saepe se ea in parte dolores, quos colicos vocabat, solitum esse sentire, qui fomentorum usu non ita multo post levarentur: Ac primum ei credidimus, cum tamen apud nos potius valeret opinio ac suspitio pleuritidis per congestionem aliquam excitare, quam narratio de vetere dolore, coegimus ut alvus enemate sublueretur: Ac dolore perseverante, ut urgeretur occasio, rectis pomeridianis bolum cassae, addita confectio de dactylis portiuncula, ne medicamentum ignavum maneret, exhibuimus: hujus usu multa corrupta admodum educta sunt: Sequenti die relicta sede priore, dolor ad officium ventriculi pertinebat: Tunc nos poenituit quod non die praecedente venam secuissemus, ut ne inflammatio ad aliam partem nobilem, uli contingeret, serperet ac obertaret; valdeque timuimus ne in ventriculo malum figeretur, gravioraque omnia nascerentur: Per dies tres continuos venam ter secuisimus, paralem sanguis detrahitur est, ne guttula quidem puri sanguinis: viribus intuebatur ob exatrem ingravescentem, Dolor non erat fixus, thoracem dilatare omnino non poterat: Respiratio aliqui erat facilis, nisi cum magnum respirare cogeremus: At tum narrabat se aliquid imis costis inhaerens sentire quod respirationem elideret: Sitis & febris erat ingens, omnia cruda, nam nec alvus nisi sollicitata ferebatur, nec quicquam ex facili è Pulmone educabatur: Dubitamus an diaphragmatis esset inflammatio, praesertim in parte concava, praesertim

præsertim quæ attingit nothas costas : Si inflammatio foret illius partis, cui non deliraret quærebamus : Suspiciabamur collectam ibi illam materiam & præsertim serosam (quod dolores vagi apparent) quæ olim colicos dolores excitarat : idque evenisse arbitrabamur ob ambientem frigidum impense, unde suppressio nata foret : Ad id cogitandum situs partis dolentis incitabat : Tamen quærebatur, si ea in parte inflammatio esset, cur non ad claviculas dolor pertineret ? Sed sectio corporis post mortem omnia aperuit : Ergo cum circa finem diei quartæ dubitarem, an quarto secunda vena esset *in tantâ siccitate morbi*, febre, difficultate spirandi, Ecce primarius Medicus videns nostras sectiones inutiles, ratus collectionem esse quandam, ad catharticum confugit, idque vehemens admodum, ut vi deturbaretur humor qui infra diaphragma consisteret : At cum humor nullus esset infra diaphragma morbi author, irritum medicamentum fuit, & duabus post horis hypercatharsin induxit, perturbationem tantam ut brevi agro intereundum fuerit.

Aperto cadavere. Ren sinister plane putris & corruptus repertus est : Inveni duo in vesica calculi, qui suppressioni urinæ in progressu morbi occasionem dederant : Morbi mortisque causa hæc erat, Pulmo erat admodum amplus, thorax angustus : Semiputris erat pulmo, & ita contumaciter *ad latus dextrum adhererebat*, ut vix avelli potuerit : Abscessus in ea parte erat : & sua mole & magnitudine ad nothas fere costas descendebat. Erat inflammatio mediæ partis pulmonis, præsertim ejus quæ abscessum fovebat : Adacto cultello Chirurgico, putris & fixæ sanies manavit, cujus portio dum decurreret per membranas continuatæ, dolorem excitabat, & cum effluebat, dolor cessabat, ut mirum non esset si modo pars doleret, modo non doleret : Et quoniam osculum alvi medium diaphragma transcurrit & secat, dum per gibbas diaphragmarum serum decurreret à parte putrefacta manans, attingeretque osculum ventriculi, non mirum si dolorem in ventriculo sentiret, ac si in capacitate ejus malum foret : quanquam non erat inflammatio in ventriculo, tametsi adesse videtur : Hepar erat maxime vitiatum, & præsertim pars ejus superior erat friabilis & *incoherens*. *Culietmus Ballonius consil. 94. lib. 1.*

S C H O L I A.

Magna notha pleuritidis signis est.) In qua purgationem sanguinis nulli præfuit Hippocr. part. 11. lib. 2. de Diff. scutorum, Quæ questio quoniam est de apicibus artis, audiendum est Ballonii loco cit. de aa judicium. *Purior, ait, sequens erat Galeni consilium, cujus verba ad ungues tenenda sunt, ubi non solum acutus morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, verum cum febre vehementissima, magis mox curanda purgatio, atque per sectionem vena trahenda magis, etiam si ad hypochondriam dolor sinuatur : Nempe, est minus quidem auxilium quam per purgationem sequatur, si urina tamen multo exilis : Iste nullum parvulum impedit ex eo quod sit per sectionem vena, ac diffinitio maximum subvenit quod per purgationem tentatur, maxime si laborantis naturam non fuerit expertus : Si enim naturam non noveris, metus est ne plus jussu vacuet, aut nullo pacto naturam moveas : aut si moveris, non sufficiens vacuet, quæ omnia in magni morbi assensus parietur, quod non facile ut in eo qui non febricitant, emendatur. Camigitur non fuerit vehementis febris, & naturam laborantis expertus fueris, ad medicamentum purgans te conferre, in qua ab Hipp. dilla sunt, usm.) Atque hoc in loco tria animadvertere oportet, dum sectionem venæ antecedit purgationi, primum est, cum meministi febriū vehementissimæ, ut vehementia febriū dehorari debeat purgationem, præsertim & cum adhuc inflammatio : Febriū autem vehementi & inflammatio purgationem dehoratur, quod medicamentum purgans sit adiacendum : Secundum quod minus auxilium à sectione venæ sequatur quam à purgatione : Tertium quod securitas sit magna in sectione venæ, non item in purgatione, Quæ tria sunt diligenter animadvertenda, ne forte sententia Galeni male intellecta nos valde monitos putemus cum alioqui gravissime erramus : Quid enim obest illud quod obijcitur de febre ardentissima, nam in pleuritide, ea præsertim quæ occupat hypochondrium (de ea enim eo loco agit, quanquam & generaliter illud intelligi*

potest non est tanta febris : Si non tanta febris, tunc minus auxilium affert venæ sectio quam catharsis, ut idem faciat Galenus, omni ratione amplectenda est purgatio, non autem purgationi præferenda sectio, ut securus consilium & remedium : Quotum enim ita securitas si non proficit remedium ? Præterea si febris vehemens, possimus dare medicamentum non ita eradicans, non calfaciens, non agrans, item, quod ad eum calorem quem præbuit medicamentum affert, par respondit Galien. in aphor. 24. 1. medicamentum quidam calfacere, sed majus sequi commodum ex evacuatione humorum morbosorum, quam incommodum ex ea calificatione & febris auctio : Denique, si purgatio in vehementia febriū nocet, cur non & v. s. Relinquamus Arabes qui in biliosis morbis phlebotomiam reformidant, sequamur ipsam Galen. li. comm. in part. 6. prothet. lect. 2. ait, Resiccacos nec rigorem nec vacuum in signem, nec simile quid ferre : ac Escarocarum nomine & biliosos audiemus, & eos qui biliosissimis & siccis morbis tenebuntur : Pleuritides maxime ex parte biliosæ sunt ex Galeno aphor. 12. 1. cum ergo siccus sit morbus bilialis, & ratione inspectus, & quia sæpe nihil exacerminat, præsertim in alio, & febris juncta est, affectus & siccus & siccat, An locus erit vacationi per phlebotomiam ? Præterea, si ex Hippocr. in malicibus biliosis, etiam naturalis mentium eruptio formidabilis affert symptomata, ut ipse eo loco docet, frequens v. s. conferet ? Quoniam in comm. in aph. 23. 1. in biliosis & ardentibus febribus non reformidat v. s. etiam ad leipthymiam usque : Ad superiora uno verbo respondebimus, omnis inflammatio facile irritat & tollitur s. m. nihil enim est quod tam refrigeret corpus & inflammationis occasionem tollat, ut pleuritidis inflammatio est quod autem medicamentum daretur, illud suo calore febrem & augebit & corpus siccat, & vix de

inflammato loco quicquam educet. Cum dicat minus auxilium à sectione affrui, sed securius, illud intelligit de infectionum costarum inflammatione: nam si de inflammatione superiorum intelligeret, hoc falsum esset: non enim liber est exitus ad excretionem materię per partes inferas: At cum pleuritis inferior est, cum sit à congestione potius, & quę iustā diaphragma sunt purgatione per inferiora, potius tūgi debeant quā alia arte. Libero etiam existente exitu, potius ad cathartico accedendum est: Sed ignorantia ejus qui purgatur, & metu incrementi febris, vult non impediri ne tam audacter purgemus, ac venam secemas. Jam vero hoc loco statuendum est purgationi potius laudandum esse in pleuritide, & dolore occupante oothas costas, si tria illa animo comprehendere, si medicamentum non sit perturbans & calefaciens multum, si febris non sit incensa, si inflammatio oco sit magna, sed potius dolor à congestione quadam humoris: Unde hodie graviter peccatur ab illis qui festinanter nimis audio omine doloris ad laque, (ubiqueque is dolor sit) statim ad v. s. confugiant, Imo etiam si nulla ad sit febris, aut exiguā, etiam audacter venam secant; & persuasi illi sententia Galeni superius adducta, quod securius sit remedium phlebotomia, minus tamen auxilium: At nosse debent illas conditiones quas attulimus, & quas nisi noverint, non sunt digni Medicorum nomine: Itaque quemadmodum nimis tardos esse non oportet in v. s. celebranda, ita festinatio probeo est: Multi enim dolores pleuritici mentiuntur, in quibus aut solum fomentum, aut leviscula purgatio abunde erit, ut ita in humano sanguine fundendo liberaiores non simus: Nec nos ad sectionem

venę iterato, imo pluries facienda in incitabile impud sanguinis effluxu, quod plerique ponunt occasionem celebrandę v. s. sepeant, & v. s. cum sanguedinem non huc magno vitæ periculo.

Pleuritis sanguine detrahenda est; ne quanta quodam puri sanguinis. Ex purulento sanguine deducto argumentum, finit debuit costarum pulmonum, & quibus inflammata talem effundi ostendit experientia morbo jam progressu. Quod si secunda vice detrahitur talis apparatus, nec lacerari de puri sanguinis ulla vestigia, conclamari morbi indicium est.

In tanta siccitate morbi. Siccā erat pleuritis, non eo modo quo dicitur morbus siccus, i. e. erudus, sed sicca sine spūto dicitur: At nullum inanum & aridarum duo sunt genera, cum materia tenui quidem, sed quę tandem aliquam crassitudinem acquirat in pulmone, cuiusmodi est pleuritico rum tussis loitior alia est Tussis ioanis, quę nihil potest telineia, est autem ejus causa ipsius ichorolus, aut ichor ipsius vofus omnis pepalini expect. Ita Hipp. 2. prognost. ait, in inflammatione Hepatis, ob letem retuldam tussim fieri & inane desiderium: tussis, si magis materiale est iterum, & tussidum inane desiderium, si magis effectum, tunc, ipsius vofus. Apud Hippocr. duplices reperiuntur pleuritides, aliz cum spūto, quę & siccę & humidę dici possunt: siccę, iustia cum nondum procedit spūto: Aliz sine spūto, ut quales hyeme saepe grassantur, & quę a calore fundunt & colliguntur sunt: Item quę a sereno ositantur, quę omnium deterrimę: In siccis autem pleuritidibus omni ratione hæmectico convenit, tum ad retundendam humoris acrimoniam, tum ut maior redditus cedat naturę, expellens.

§. 6. Quadragenarius febre ardentissima correptus, doluit etiam à latere: detrahitur mediocriter sanguis ad vascula duo, perseverant omnia, neque cedit dolor remedii: 6. die detrahitur iterum sanguis ad duo vascula, putris & corruptus: Sudor 7. levis, tenuis & tantum in capite & thorace: nihilo melius habuit: deliria nocturna, æstus & inquietudo magna, urinx turbidę, sudavit 9. & 11. nihilo levata febre: decimo levius habere visus est, nocte eadem patitur: 11. urinx subsident, sed divulso & nigro sedimento: Sudar ut prius: pulsus perpetuo frequens & magnus cum pauca inæqualitate: Jam tendens maximum, sine manifesto membri motu, revelli sentiuntur: Urinx bene coloratę & corporatę cum sedimento nigro: 13. floecos colligit manibus, & velluntur digiti, delirium fere perpetuum: 14. media nocte mortuus est.

Pulmonibus corruptis & nigricantibus inventus est. *Hellerius libello observationum proprii. xiiij.*

SCHOLIA.

Febris ardensissima. Febris pleuritidis comes non semper symptomatice est, sed aliquando essentialis, quę illi dat originem primam: Ubi scilicet initio febrim coordinatum sanguis in venis servens à natura in partem suscepit: maxime ptonam expellens, quales sunt partes laterales, unde fit inflammatio: Hęc febris à symptomatice dignoscitur, quod primo ægrium adortitur; hinc secundo aut tertio die lateris dolor sequitur: At ubi symptomatice est, morbi erodiam est à dolore lateris, quod febrem paulo post accipit: Medici, ut *Ballonius Epid. & Ephem. lib. 2. p. 108.*

Plurimum debent animadvertere ut dignoscant an febris sit essentialis an non, quoties agitur de dolore lateris. Filii D. *Pess* observanda historici; fallacior quippe saepe Medici, qui audientes *phx* quoddam junctum cum dolore lateris, cum expectoratione exigua, de finistro rei eveni præiungunt: Ille convuluit præter spem, Ex febris potius erat essentialis: lo omni febre essentiali, cum junctus est lateris dolor, febre acuta dolor augetur: at in vera pleuritide augetur febris nocto dolore.

§. 7. Pleuritide interemptum secui qui maximam saniei copiam tum in pleura tum in pulmonibus, firmiter coctis adhærentibus habebat: Sed cordis inspectio maximum stuporem patiebat: Illud enim totum albidum & tomentosum, instar pellis quę vulgo *cerviatto* dicitur, aspeximus: Pus enim, ut credo, cum ob crassitatem & copiam totum per anacathartion expui non posset, tunicę cordis, ob immensum ipsius calorem, dum aliquomodo exsiccaretur, adhærebat, unde totum tomentosum nobis conspicuum fuit. *Dem. Panacoli observ. xlvij. Pentecoste 1.*

§. 8. Studiosus, validi temperamenti & sicci, erysipelate cruris eodem anno bis infestatus, Erfurto Jenam media hyeme, frigore intensissimo iter faciens, insignem *per seipsum rigorem in laterethoracis sinistro*: Eum excipit insignis calor, dolor, *tussis sicca, post humida*, excernitur spumofum quid sanguini permixtum puro: difficultas respirationis, adest ingens interstecne morbo excernit putulenta in magna copia duarum septimanarum spatio, post sanguinem purum, Tandem per alvum nigrum grumofum sanguinem foetidissimum adstantes civitate donatis opinionibus imbuti, pulmoque & *fecre excerni* putaverunt.

Aperto post obitum cadavere, inventum ingens in latere sinistro pleuriticum apostema, quod pulmonem simul occuparat, *excepit* prægressa inflammatione, eumque totum absumpserat: ventriculus & intestina grumosa plena sanguine, qualis per alvum copiose fuerat excretus. *Rolfincius Dissertat. Anatom. lib. vii. cap. xxviij.*

S C H O L I A.

Præfente rigorem in latere. Qui sit ut magna pars eorum, qui in pleuritide incident, horrear, cum tamen illud non videatur esse de natura istius mali? Hippocr. 1. de morbis explicat cur laboraturum pleuritide horroer occupet, sive ebrius sit sive sobrius; atque ait, *Cum latu natura carne nudum sit praeventum corporis partibus, & non sit quicquam in ipso quod veniat, præter ventriculi cavitatem, maxime rigorem præcipit.* Et cum *rigueris ac perfrigeratum fuerit, tum caro que est in latere, tum vena contrahitur ac convellitur*: Vicinia autem cum panniculo carnosio, qui horrois subiectum est, facit ut ea vel vaporibus vel humoribus acris impedita, hic concutiantur & rigorem in toto concitent.

Tussis sicca, post humida. Mirum quod in pleuritide, cum inflammatio sit, sanguisque biliosus plerumque author sit, non tamen aut pus, aut sanguis excernitur, si materia conjuncta est malo, sed pusilla quædam puris, & ea solvit pleuritidem: An quia membrana inflammatur, ideo sanguis quodammodo pinetescit, ut sit in inflammationibus partium nervosarum? sit enim excretio, aut feci tenuis, aut mucosæ piculoseque materies.

Jaur excerni &c. Interrogari an per arterias aut venas splenicæ, cœlicas & mesentericæ frusta Hepaticæ, Lienis aut Pancreatis, imò etiam pulmonis ad intestina deferri & per inferiores excerni queant? Respondemus constanter Atterum lib. 1. *de xenis* cap. 14. in abscessu scirrhosi lienis suppus incoctum, subalbidum & cinereum, quandoque fæculentum & lividum, nigrum, quandoque & lucci lienis tabescentis particulam exprimi: *subnigro*, Quibuidam præterea & incoque lienis partes

excernunt, si quidem natura dissolubilis lien: *Mathew de Gradibus in 9 Rhafis* part. 1. cap. 7. post Hepaticæ ulcus multam quædam materiem hepaticæ excernit testat: *Oxyserum* nullo non die, cum per urinam fibrillas, per alvum vero frusta borum viscerum colloquarum excerni, cum ea tripode puerantur: quin etiam nemo non vulgi opinionibus imbutus, quod per alvum grumofum in aliumque vider excerni sanguinem, iudicat esse pulmonis & hepaticæ partibus: Sed hoc modo viscera excerni posse verisimile non est *Sennertus Paralip. ad 13. præf. 12.* neque hepaticæ neque lienis tubulantis subtilitatem per alvum excerni posse putat, quod vix commode non denui: iudicat potius frusta carnea ab hæmorrhoidibus vel metastasis fuisse extrata, & antea fuisse sanguinem concretum & in illis vasis condensatum. Nobis placet *si inuenerit* adhibita distinctione, in abscessibus Hepaticæ & Lienis parenchymata colloquar per vasa ad intestina deferri queant, sine abscessibus nunquam. *Idem ibidem. Sennertus ex Zernigero* afferit historiam Hepaticæ (ab inflammatione ulcerata) qui carnes portioneulas, eueniens facibus mixtas alvo deiecit: nec sanguinis fuisse grumos ex massa illa perinatæ aquæ injectæ sibi coherente, fibris quoque implicata deprehendit: conuulsisse tamen ægnum aic, alvo Philo-
sophi beneficio coëctia: Et quid exigua carnis partes, distensis metastasis non (ut fingunt) tenuis vix obuiis, sed commotam sui magnitudinem nactis, arceret transitu? Valere (addit) hic Columbi velim, adjectis oculis metastaticarum intestosæ versus valvulas novas item quorundam ægulis, qui exiles diælis venis obteulas fabricant, qua in intestinorum carum se derivant, tunicas.

§. 9. Tassinus vertigine oppressus linguæque minime continens repente concidit: Obmutuit, &c. designabat locum dolentem ad dextras lateris partes, qua septum alluit, &c. Dextrum latus dolere narrabat, & sinistram ante doluisse &c. Restituit tandem de reliquis doloris in latere & capite querebatur &c. Pulmonicum quid putabant, aut à pure vaporem, aut tuberculum, aut convulsionem articularum pulmonis, aut adhaerum, &c. Post magnam purgationem convaluit, *Ballonius histor. 1. consil. lib. 2.* Exitus morbi, qui cum uno post anno prehendit & de medio sustulit, unam ex conjecturis veram esse comprobavit: Vomica aliquam subesse conjiciebamus à qua vapor teeter effertetur vehementium symptomatum author: Nec ego unquam putassem *elatum à pure materiae purulentæ vaporem* tanti esse: Ad mensem Augustum dolore capitis incredibili tenatur, febri assidua, iactationes, verebatur ne in ea incurret in quæ prius ceciderat: multum sanguinis è naribus fuderat antequam morbo prehenderetur: statim injectum enema, missus sanguis, Eodem die datum medicamentum: alvus liquidissimis excrementis fluxerat, nec quicquam compaetum apparuit: Ingens erat incendium & vires naturæ dejectæ erant: Dolorem lateris querebatur, & ad regionem Hepaticæ: his locis pungentem se dolorem & lancinantem percipere ac sentire narrabat: De vomica conjectura augebatur: Sæpe vox deficiebat, ac si aut pulmo confossus, aut perforatus, aut adhaerens esset: Nihil purulentum expectoravit: Non poterat multum & assatim bibere quia deficiebat spiritus

tus & potus velut in cavum descendere videbatur, septimo die tandem cum sudore pingui interit.

Aperto cadavere *deprehensus est pulmo* adhærens tum in parte dextra tum sinistra costarum: membranae utrinque subliebant: Circum gibbum diaphragmatis, pars pulmonis tota in pus & saniem fixentem liquefacta erat: Magna quoque puris materia transfluxerat in Hepatis regionem, & ibi conclusa erat, Nova ibi vomica conclusa videbatur, at non erat: Totum corpus internum fetens admodum, Hepar sanum & Lien: Intestina alieno maxime colore. *Ballonius conf. 6. lib. 1.*

S C H O L I A.

Anno præterito quo maxime laboraverat, parulenta habuerat dejectiones: ac credo idem hoc posteriore morbo arietem moliri voluisse, sed vix non fuisse idoneas & faciles: credo quod si ultus fuisset aut festus, magna salus spes affluisset: Nec minus si periclitatorum cæcis medendi ratio sæpe methodicorum & Rationalium præceptis & ratiocinationi antecet. Et cum summus Hippocrates passim hoc remedium in libris ubi *temperamentum* utarper, non quid facius est aliquo remedio cuncto & accipiti certissimam mortem, si aliter facias, & id genus remedium omittas, rodime? Humanum est & officii plenum aliqua ratione ægrotum antiorum dolores elevare, atque id magis si id cum aliquo salu-
tis spe.

Etiam à pure aliæ materie parulenta vaporem. Verisimile est in febribus putridis, à loco & foco ipsi vaporem excipere ignitum, eos appetere & ferre, quæ donec difficilis fuerit materie pars, à qua est elevatus, alii febrem, ut enim in ægro nostro *deprehensus* est, & à certo foco, nempe à vomica, fuscinebat vapor qui & aphoniam & febrem excitabat, & vixit miraculo quodam paroxysmus solvebatur deinde redibat tertio modo: magna est vis vaporis maligni, præsertim ubi est *id est* *remedium*, ut loquitur Galenus aliquo loco: In Conch. Hollerius multa continetur quæ ad demonstrationem hujus difficultatis bibendi, nullo existente in fuscibus tu-

more, faciunt. *Theriacum in viti.*

Deprehensus est pulmo etc. Huic puris erat pulmo; immixtus, semilacer & adhærens: In tali casu oppugnare oportet putredinem per siccantia: Et tamen vulgus medicorum fere humectantia consilium Sic dum habet rationem *cupisidam* extenuationis, aliqua putrefactiva præscribit: Galenus multo melius lib. ult. 4. de locis affectis, in eo casu deficcantia & aromatica præscripsit: vide diligenter illum locum. *idem ibidem.*

Querelatur ad regimen hepatis. *Saxonia Prælect.* Pract. part. 1. cap. 17. propria experientia observavit pleuritides quædam incipere ab intestinis & lecore, ut non minus emolumentum acculeret chylis quam vebat scilicet, ut si vena scilicet præmitatur, humor fluens sursum trahatur: Itaque interrogandos vult qui dolorem sentiant, utrum simul motum & ebullitionem quandam in ipsa lecoris parte sentiant, Tunc enim præmiti chyliferum vult: Vide quæ dicta sunt de Pleuritide descendente observat. 15. Exemplum habui anno 1661. in Nob. Neocomensi Domi; L. Jac. Tribolet, annos 35. nato, Huic subitis cum subortus esset vehementem dolor in regione jecoris, curat sibi venam secari, hinc facta humorum metaprosi in pulmones & pleuram; (dolor enim superiorem regionem illico occupavit) irritis omnibus remediis quæta post die obiit.

§. 10. Ex pleuritide peripneumonico secui, in delirio mortuum, Dextro in latere pulmones stereo & costis, fibrillarum plurium ope adhærebant: quarum quædam rotundæ, aliquæ latiores, tum albæ tum rubicundæ: In sinistro liber ab ejusmodi nexu pulmo fuit: *Pleuræ pars dextra* superne *parulenta* erat, ipsæque tunica discedebat corrupta, pus tenacius referens: Eadem & crassior justo observabatur: Dextræ pectoris cavitati vel integra puris mensura inerat, fixitidi, obscure flavescens, & stris sanguineis cruentari aque acido acris: Qualis etiam intra pulmones ipsos stagnabat, Ex quibus dissectis tabes & sanies copiose dimanarunt. *Ex literis Joh. de Muralto Medici & Chirurgi Tigurini, die vij. Aug. 1677. datis ad Clar. I. Jac. Peyr. Doct. Medicum Schapusanum, cujus benevolentia debeo observ.*

S C H O L I A.

In Delirio mortuum.) De Delirii generatione & causis. Vide lib. 1. sect. 7. Observ. 19. in schollis.

Pleuræ pars dextra superne parulenta.) Succingentem unicam quoque inflammari non negamus, uti & victus illi periclitia (quæ tamen separatim nonnquam inflammari, indeque privam aliquam pleuritidis speciem nasci, cum adeo pertinaciter succingenti, ubi costis illa obducitur, hæret, concedere minime possumus) quod tamen cum sit, non inflammationis simul pulmonibus, pleuritidis illa, quæ vera dicitur, non erit, in qua citius & purulenta sunt per spiritum excretionem, cum succingens eo se exonerare minime possit, sed illa ejus species quam peculiariter succingentis pleuritidem nominavimus: In qua, si magna præsertim sit inflammatio, sine dubio etiam

presso thorace dolor nonnihil exacerbat, & ad extensorem se aliquoties extendit, cum inflammatione tunc adeo in tenui succingente membrana, vel periclitia collecta, subsistere nequeat, quin ad malculos illi contentos quoque se dilatat: & proin exitus secus etiam, cum thorax adeo pressus non sit (in eo peritonæo inflammato videmus accidere) tactu percipitur: In qua insuper specie, si inflammatio superaretur, extrorsum potius abicellus quam introrsum vergit, illucque se aperit: Vel si in interioribus persistens illic disrumpatur, pus in cavitate pectoris potius, quam pulmonibus, ad quos tam cito perferri, cûque penetrare minime possit, effundit: Hoc autem ita evenire, ut hæc comprobant, sic & verisimile videtur, si succingens pulmonem inflam-

matum

innoturum causis simili inflammetur, & oriturque partibus concurat inflammatio, dicitur tunc eam potius quae in succingente sit quam suppurari: cum tanta copia sanguinis tunc in pulmones infusa, in semel succingente tunica non facile colligatur: aut si illud fiat ad exteriora potius ferri, uti ostentum, musculoli quoque illos quoque implere illique suppurari: atque inde est, ut post pleuritidem veram, licet succingens simul inflammetur, oihique foris appareat, rarus, uti tamen aliquando fit, empyema subsequatur.

Pleura pars dextra purulenta. A praecepta inflammatio: Hic vero inflammatio, tam suppuratio, tam pleuritide vera, in pulmonem aliqua sede accedentes, uti & cetera, à sanguine procedunt. Quo cum universus pulmo, in vasis amplis & multis quibus intensus est, redundet, illic propter arterias & vicinum eos feruor exultat, facilius inflammatur, crebriorique ceteris proin inflammationibus lateris huius pulmonem inflammationes exiliunt. Quae à sanguine, oei & reliquae inflammationes sunt, quando is è vasis suis, vena arteriosa & arteriola venosa,

non in asperae arteriae ramos effusus, (alioquin haemoptoea fieret passio) sed per pulmonum substantiam diffusus, eos adimplens & atollens, gravitatem pectoris & compressionem angustiamque patitur, calorique suo vicinum cor, jam prius febre fere accensam, amplius calefacit, perque tussim, quam commovet, portione illius in asperae arteriae ramos impulsus, sanie primus, tenuiore, mox calore ipsorum imbuat, tandemque maturatus, & calore coctus suppurescitur, tandem donec penitus expurgatus fuerit, excutitur, illa tamen pulmonum substantia, alioquin enim ea exulcerata, phthisis, sicuti cum haec laeditur fit, illaque interdum post has morbos relinquitur, sequere. ut: Sed & evenire potest ut pulmonum inflammationum causa, in vicino latere sanguis in succingentem quoque membranam infusus cum inflammetur, quod tamen non ita frequenter, cum exigua paucis vasis eam perfundant, venaque illa cui potissimum causam attribuitur, azygos dextrarum tantum latus periret, pleuridis vero saepe etiam sinistram occupet, accidit: *Platerus praef. tom. 2o. p. m. 341.*

§. 11. Filiola N. febris continua, cum dolore sinistri lateris fugax: Totus sinister pulmo, & thoracis pars sinistra pure plena erat. *l. 4. tit. de Febris.*

§. 12. Filia D. N. patiebatur dolorem in summa scapula sinistra & summitate brachii &c. aderat & per intervalla dolor lateris pungens, &c. juvenis est pulmo costis undique & diaphragmati adhaerens &c. Cor vero media sui parte fere exesum & exulceratum &c. *vide tit. de haemoptysi.*

§. 13. Ill. N. febre laboravit cum difficiliore spiritu quam pro febris ratione & lateris dolore ad tactum: Reperta vomica in dextro pulmone, universam simul dextrae partis thoracis pleuram occupans. *Lib. 4. tit. de Febris.*

§. 14. Filius N. quatuor annos natus febre corripitur cum dolore ad sternum & latus sinistrum: Una pars pulmonis veluti stipula ardente deflagraverat, ut & hepar. *ibidem.*

§. 15. Uxor I. à partu subsisterunt lochia; febris, dolor lateris sinistri: Pars sinistra pulmonis fere magna sui parte tabuetat & tabo infecta erat, sana reliqua substantia: *vide tit. de Phthisi.*

§. 16. Uxor I. N. pleuritide lateris sinistri corripitur: Lobus sinister pulmonis totus fere in putrilaginem abierat: Pleura ea parte et assa erat, syderata, cui cohaerebant fragmenta membranae pulmonis: *vide tit. de Exspulsione purulenta.*

§. 17. Puellula Cachectica. (*vide lib. 3.*) pulmones habuit intra & extra corruptos, foetidos & purulentos: Dolor punctorio crebro afflictebatur.

§. 18. Uxor N. de dextri lateris dolore conquesta est cum aliis affectibus: Dexter pulmo quibusdam locis adhaerebat succingenti tunica & diaphragmati, non tamen multum tumens & inflammatus: *vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 19. Thomas N. cum dyspnoea dolorem etiam per intervalla acutum ad latus sinistram percipiebat. Pulmo totus putrilaginosus erat praesertim parte sinistra: *vide tit. de Tussi.*

§. 20. Rudolphus N. pleuritico simillimus, nam dolor lateris &c. pulmones toti erant putridi, purulenti, foetidi: *vide l. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 21. In cadavere cornobitæ cucullati, empyemate cum tabe extincti, conspexit Bonned. Silvaticus laesos ante pleuram pulmones: Aeger nempe ab angina in peripneumoniā, & ex hac in pleuritidem incidere. *Tab. Rhodii cent. 2. observ. 11.*

§. 22. Matronam sustulit pulmo & thorax purulentus, copia autem puris erat insignis & omni superior fide: Antequam ita purulenta diem suum obiisset, per annum unum & dimidium anrequerebatur de siccitate linguae, siti & calore incredibili thoracis, omnia sicca erant, nihil expectorabat, ne tussiebat quidem: Cum postea per dies xx. continuos de dolore sinistri lateris quæsta fuisset, & novies phlogosternum, cum spiritu frequenter, & inquietudine incredibili faris concessit. *Ballanius consil. 3. lib. 3.*

§. 23. Nos non tantum in peripneumonia, verum etiam in pleuritide, quam veram vocant, pulmones inflammatos fuisse, in mortuis aliquoties apertis spectavimus. *Platerus Praef. tom. 2. p. m. 339.*

S C H O L I A.

I Dem melonibus, quas certas vocat demonstrat: à tunica succingente inflammata tam cito praeterit, Quod sanguis, quem tam cito excutit pleuritidis, fertur per pulmones, illisque vasis, ad expulsi-

Vu 3 dem

nem penetrare, nec separata ea, pos ex eo loco transire sibi per pulmones, illis non lesis aut ulceratis facere, & sic ad excretionem usque perfecti minime posuisset: Sed potius si inde maneret, in thoracis cavitatem deflueret, atque illic empyema gigneret: Quae proinde cum in pleuritide statim & copiose interdum excremone, uti in peripneumonia, hæc à pulmonibus provenisse, nec aliunde eo pervenire posuisse scia declarant: Sicuri & accidentia reliqua utrique affectui communia, eandem sedem affectam, pulmones scilicet ambobus esse, luculenter

ostendunt: Quod obijciunt, pulmones in pleuritide non inflammari, quia dolor affectio in partium membranarum, quales non sunt pulmones; in pleuritide autem pectoriorum esse, illis proprium, qui gravatius est in peripneumonia; solvit dicens, si circa interiora magis inflammantur pulmones quæ circa externam superficiem, nullas punctiones sentire: Si circa ambitum pulmonum inflammatio sit, ipsius tunicæ causa punctiones aliquæ sentiri, cum pulmo non sit omnino insensibilis: Si pleura quoque coadlescat, manifestiorem esse punctiois sententiam.

§. 25. Porosa est pulmonum membrana, ut si forte quid saniei in thorace colligere-
tur in pleuritide & peripneumonia, in eos pateat aditus, quo per tussim rejiciatur: In
quibus tamen affectibus & pulmones affici statuimus: Sic ex pleuriticorum anatome, &
remanente difficilli respiratione, ejusque lateris aliquo dolore, in iis qui convalescere ad
finem vitæ, edocet. *Baehnius Anat. lib. 2. cap. 26.*

§. 26. Uxor Aurisabri à partu pleuritide sinistri lateris corripitur: Ibi disrupti abscessus
notæ deprehensæ, coherebatque latus cum vicino pulmone sanie mediante. *Lib. 3. tit. de
Hypochond. dolore.*

§. 27. Quinquagenarius phthisicus obijt, triennio ante pleuritide laboraverat: Inven-
ta syderata pars membranz succingentis & costarum. *Tit. de Phthisi.*

§. 28. Quibus pulmo totus vitiosus, est, ut *Regi Carolo* contingit, iis sanies in pulmone
est quæ falsas pleuritides inserit, nec sanguinem expectorant. *Gul. Ballenius Epid. l. 2. p. 169.*

§. 29. Pleuriticorum duorum sectioni adhibitus, cum examinarem costas succingen-
tem membranam, maculam taurum lividam in ea deprehendi, illique affixos pulmones,
qui ægre ab ea nonnihil lacerando avellebantur, eosque potius quam succingentem
membranam affectos. *F. Platerus.*

§. 30. Ursula Pulen Frisen, (*Vide histor. lib. 1. Tract. de Suppuratione affectibus*) noctu in lecto
horrore concutiebatur, subsequente æstu, cum dolore lateris dextri pectorior: Pleuritide
neglexit, vinum bibit, venæ sectionem distulit ad signum zodiaci gratius, & magis ex
superstitione valetudini commodum: singulis horis dolor lateris dextri incrementa
sumpsit, tussit frequenter: ob doloris vehementiam sputi subcrevienti parum excrevit
dolor à latere dextro, quandoque ad collum usque pertigit, qui tamen nec continuus
nec una sede fixus permanfit: Die 25. Februarii expectatus venæ sectionis dies advenerat,
(quintus ab initio doloris) Verum ob virium languorem & delirium omittebatur: die 26.
mortua est, &c.

Mortuæ steruo remoto, pulmo in toto dextro latere firmèr pleuræ adhæsit: quo
avulso, in postica pectoris cavitare ad libras duas circiter feri pallidi comparuit: In si-
nistro latere fibris intermediis pulmo leviculæ accretus erat: In dextro latere pulmonum
lobi omnes magni, duri, tensi, utrunque rubri, vel potius ex rubro variegati: illorum
membra externa densa & crassa: Incisi inrus pleni ichore subcreviente, subaqueo, spumoso,
& in partibus profundioribus purulento adimpleti erant: Sinistri Pulmonis lobi erant
molles, flaccidi, albicantes, paucilla rubedine disuti, &c.

SCHOLIA.

IN pleuritide alterutrum pulmonum lobum inflam-
matione Plateria, pluriq; litorum hoc sæculo,
rationibus & sensibus permoti staterant, quibus
quoque hæc Anatome calculum præbet: §. *Janus
Wierseus Dissert. de Apoplexia lib. 27.*

In partibus profundioribus etc. Cum pulmonum par-
tes profundiores obidet phlegmone; tunc nullæ in
latere punctiones sentiuntur: In prædicta Ursula do-
lor lateris dextri adfuit pectorior, quia pulmones
interni & externi, necnon eorum membrana afficieban-
tur: Si enim adeo ad exteriora usque diffundatur in-

flammati, ut ejus causa pulmones nimium disten-
derent, præsertim quando insperso aëre dilatentur & exur-
gant, (quo tempore solum punctiois sensus adest)
accidit tunc ut ob fibras (quarum intervenerit succin-
genti tunica consuetum & continuantur) adstric-
tas & divulsas, punctiois in latere sentiantur,
quævis inflammatio membranam non attingit,
quod & à flaribus fieri notum est: Gravior autem
affectio est si eadem succingens tunica & sympathice
à pulmonibus, & idiopathice patiatur incallescere
& tumere.

OBSERVATIO XXI.

Phthisis superveniens Lateris dolor, ortum debet pulmonum cum pleura cohesioni.

Cautio adfuit ne longa à Tabæ emaciaris sanguinem abducamus, cum his lateris super-
venerit dolor, Etenim secari vidimus plurima talia corpora, ac deprehendimus eorum
pulmones

De Pectoris, Laterum & Dorsi Dolore.

311

pulmones arcte, *ad plevrā*, membranæ costis intextæ annexi: Dum enim ventosus quîs vapor se inserit huic nexioni, continuum avellit. *Hennius lib. de Aff. Pectoris.*

OBSERVATIO XXII.

Pleuritis lethalis ob succedentem pleuræ Sphacelum.

IN Pleuritide dolor adest per sepe immanis, ita ut æger de vita periclitetur: Si vero perseverantibus signis deterrimis ipse conquiescat, timendum quia inflammatio, pestilens quandoque & maligna, in corruptionem abit & sensum partis aufert: Quo cum premere- tur quidam immisericorditer, ut præ doloris vehementia insomnes noctes ac dies duceret tandem cohibito spuro evanuit dolor, qui cum sanus à Medicis judicaretur, post diem sub- bito occubuit.

Aperto cadavere, inventa est pleura in parte interna tota fere nigrore perusta: Quod si- gnum veneni intus sævientis & sphaceli est certissimum. *Zachm PRAXIS adm. lib. 2. observ. 6.*

§. 1. In pleuritide gangræna aliquando accidit, quod vidi in Duce Medinæ Cæli, qui ante 6^{ta} obiit: Tunc nullus dolor in parte sentitur, cum sphaceli ratione sensus deficiat: *Lazarus à Soto Comm. in lib. Hipp. de loc. in homine text. 16.*

OBSERVATIO XXIII.

Lateris dolor peripneumoniam sequutus cum hydropè Pectoris.

PARENTUM morbosæ dispositiones jure hæreditario in liberos transfundi apud omnes In confesso est, quanquam non eadem semper idea affectus erumpant Id ut in pleris- que partibus, sic & in thorace elucescit. Virum nobilem Dom. Jacobum Favre, Senatorem Genevensem, hydrops pectoris abstulit, sub febriculæ specie, in hypochondriis fomitem habentis imponens. Eiusdem Filium annos xli. natum, virtutum, bonorum & muneris Sena- torii hæredem, idem morbus, aliis thoracæis affectibus, peripneumonia scil. & pleuritidi connexus, abstulit anno 1669. mense Decembri: Peripneumoniam, totò morbi decursu in- dubia fuerunt argumenta, pridie vero ante obitum ingens lateris sinistri dolor obortus est, qui Medicis non parum negotii dedit, quod virium debilitas à principe remedio, venæ sec- tione, dehortaretur. Pluribus ante mensibus foedis faciei color & cachecticus, ac luridus labiorum, difficilis gressus imarumque tibiarum sub vespertam intumescentia, cum pectore anhelo, vitii parenti suspicionem apud me movebant; Vix animam trahenti suppetias, in- ter plurima præsidia, solum urticæ decoctum, attulit, cujus ope cruenta è pectore exclu- debantur.

Dissecto cadavere, Cor & Jecur nihil vitii præ se tulerunt. Pulmo dexter à consti- tutione naturali quodammodo deflexerat. Sinister fere consumptus, uterque plane exan- guis: Pleura, qua parte dolor fatigavit, pene syderata erat. In cavitate thoracis æquæ libræ xviii. repertæ sunt. Glans item plumbea, eo è summa scapula, ante aliquot annos vul- nerata (quam nulla Chirurgorum industria eximere valuit) deducta. Lien parte superna viriatus & corruptus erat: Ren sinister lapillum continebat; maximum vesicæ, quatuor un- ciarum & semis pondo, extremitate acuta fundo vesicæ annexum, neque pondere neque urinx difficultate molestum. A pueritia Nob. patiens nephritidi obnoxius fuerit, hinc calculi in vesicæ lactantis certa signa exhibuit; quamobrem in consilium adhibitus Illustr. *Dum. de Mejerne* lapidem exterrere præscribir, à quorum usu omnes molestiæ desierunt crediditque In posterum vir Excell. efficacia medicamentorum detrusum calculum, qui se vesicæ supernæ affigens omnibus imposuit.

SCHOLIA.

LATERIS sinistri dolor) Notæ Fernus Pathol. lib. 5. cap. 10. ubi peripneumoniam, pulmonum ulcere aut abscessu laevis dolor accedit, sique interior, fixus & permanens, significare affe- ctum pulmo- nem pleuræ jam adhærescere, interveo- piove aut saniei cojoidem leniæ à latio pulmone effluens: Eo in casu non aliis remediis locus, quam iis quæ coha- sionem illam solvere valeant, tanleque aut pituitæ lentorem liquare: Foxibus ex aqua tepida, lacte & similibus, vesicæ inclusis: *Depur. part. siccæ* no-

cent / saniei & pituitæ lentorem augendo. Mover idem *Zachm. Epid. lib. 2. pag. 18. multus, an.* Pulmonia- cia levi de causâ doloris lateris excitantur, pleuritidem mentientes, An his ad sedationem doloris frequens venæ sectio? minime, cum tantum aut status sit, aut febris exigua: sic sectio non confert, nam si cum do- lor ortus, secuerit, laesæ plurimum, nam latera tan- dem debilitantur, & hoc occet. Si inflammacionis sit suspicio, id quid in agendum & procius ad anodyne occurrendum. *Vide Observat. xxi. ex Henrico.*

OBSERVATIO XXIV.

In Peripneumonia saepe unus aut alter lobus tantum Pulmonum inflammatur.

IN Pulmonia non est necesse totum Pulmonem inflammari, quia saepissime unus aut alter lobus tantum id patitur, ut Infinitorum Cadaverum apertio nos docuit. *Soubertus cap. 10. de affl. Thorac.*

OBSERVATIO XXV.

Pectoris dolor gravatior in Peripneumonicis contingit ubi Pulmonis viscus inflammatum est, Punctior ubi pleura cohaesit.

IN Pulmonis inflammatione pectoris angustia adest cum dolore; Dolorque non est pungens sed gravatior, spinam attingens, ubi membranz pleuram attingentes sustentantur, isque dolor remissior est, nisi membrana simul inflammata fuerit. Nam deprehensum est in dissectis peripneumonia mortuis saepe membranam pulmones ambientem simul inflammari, & aliquoties simul cum pulmone pleuram quoque simul inflammatione corripit, ubi dolor acutior & punctior est. Ubi vero ipsa membranz primario non afficiuntur, sed visceribus quae ambiunt inflammatis extenduntur, dolor tantum gravis excitatur. *Sennertus Pract. lib. 2. p. 2. cap. 3.*

APPENDIX.

Varia Lateris Doloris Ideas & causas Continens.

Pleuritidum & dolorum lateris tres fere ideas in artis operibus observavimus: Alii enim dolores sunt ob phlegmonem, alii ob erysipelatoden affectionem, ut in nostris consiliis scriptimus: alii ob purum & sincerum humorem à capite labentem, & tunc non tam est pleuritidis quam lateris dolor: ac fere talis dolor inflammationis non est comes, sed tantum congestiois cuiusdam humoris & adhaesionis: Imo multos vidimus laborantes dolore lateris ob copiam excrementi in pulmone, cuius pars tenuior & ferosior dum ad membranas funditur, dolores excitat: Sed quod diligenter est observandum, major pars pleuritidum, & dolorum capitis, est tum à congestione cuiusdam excrementi in pulmonem & thoracem, tum ob recursum tenuioris humoris per orgasmum à ventre inferiore, quam à capite & partibus superioribus, Quod diligenter videndum, quoniam plerique non audent purgare & solvere ventrem; at saepe hoc plus confert quam phlebotomia, imo tunc sectioni venae locus non est. *Ballonius Ephem. lib. 1. p. 79.*

Aurumno anni 1570. Pleuritides grassatae sunt: potius dolores erant laterum ob diffusionem feri à capite. Non erat magna dyspnoea; non tam in tumore & phlegmone consistebant quam in effusione quadam erysipelatode, Juvabar venae sectio. *Idem p. 7.*

Tempestas verna anni 1576. innumeros dolores hypochondriorum inulit, per quandam expressionem inferne sursum mali feri & ichoris à cacoehymia manantis. Hi dolores falsas nothasque pleuritides retulerunt. Nec tam de secunda vena cogitavimus quam de purgando, quanquam & V. S. locus fuit: dolores erant saevi, & inter ceteros adoriebantur mulieres, & quibus anxietas agnatioque aliqua fuit. *Idem p. 168.*

Cum dolores vagabunde tenent nothas costas, & continuatione membranarum attingunt aliquando mammas & pates stetni anteriores, caute videre oportet an propter ventris inferioris cacoehymiam, à qua propter vapores elatos dolores surgunt, sensio adsit doloris, An causa ipsa à partibus superioribus pendeat, an vero in thorace ipso sit: Vulgo enim secatur vena, undeliber dolor sit, atque id quidem male: Quis enim nescit, si dolor iste agnoscat causam in ventre inferiore, non modo non prodesse S. M. sed etiam nocere saepe, quod attractio fiat à partibus inferis, & si nondum adsit pleuritis, ea per sectionem venae acceleretur: *Ibidem pag. 88.* Plerique queruntur de dolore pectoris unaque ventriculi, & sese animam ducere non posse dicunt: Hic nihil aut parum proficit S. M. Declatatum exitus, etenim si vel cholera morbus succedat, vel alvi fluor, vel laxante alvus sollicitetur, manifesta est istorum dolorum sedatio: Sic cacoehymia, obstructio hypochondriorum dolores facit, qui maxime apparent & proferuntur in pectore ob consensum diaphragmatis, & quia in thorace communis est membrana, & lateribus & diaphragmati parte convexa. Sic in iis qui melancholia statiosa tenentur, circum mammas & sternum & latera dolores surgunt, an ideo venam secabis? Non, praefertim ad evacuandum, sed si velis & utget dolor, ad libertatem obstructionis: Sic initio paroxysmorum, & in specie incubi, & contumaci obstructione viscerum, excitantur dolores in thoracis partibus, & frustra seatur vena. Sic in talibus tentandam prius purgationem existimo, non phlebotomiam

contra

contra opinionem vulgi. In doloribus excitandis maxime valet illud quod dicitur, totum corpus conspirare ac confluere, ut sæpe dolor alia in parte excitetur quam ubi causa primaria sit. *Idem pag. 97.*

Alios & dolores laterum observavimus à flatu. Flatum autem excitabat *Spasmus Venter* & *Deæxi*, & præsertim cum chyli sit anadosis, aut quibus solennis est frigida haultus dum cubitum disceditur, aut crudorum fructuum esus. *Idem pag. 8.* Medici debent attendere ne temere affectus unus pro altero supponatur; nam novi plicisque hypochondriaci sectam esse venam ob dolorem lateris, cum is tantum esset ratione cuiusdam flatu ab hypochondrio surgentis. *Idem histor. 1. lib. 2.* Dolores homoplatarum hypochondriaci familiares, & virginibus quarum faciem fœdus deturbat color, & in his non tam laxare venam quam ventrem convenit, & flatui exitum dare. Hanc flatuum copiam & imbecillitas caloris nativi, & melancholici succi *Spasmus* inducit, præfente quadam ipsorum lactum & pylori phlogosi, ex Dioclis sententia. *Idem conf. 48. lib. 2.*

Plerisque, hyeme præsertim rigente, dolores ejusmodi laterum excitantur à congestione ob ambientem frigidum: An his S. M. imperanda ad organum impediendum? faciendum, aut omnino, nam purgationi tunc nullus locus. In hoc à plicisque peccatur, & ideo Hippocr. purgationi præfert S. M. *Ibidem pag. 18.*

Dum sævit hyems dolores pectoris & lateris sæpissime grassantur: imo & 3. aph. 3. inter hyemales morbos numerantur lateris dolores: qui sæpe à flatu crudo & frigido in pulmonem thoracemque ducto oriuntur, & mendax est id quicquid est: Ad id festinanter Medici phlebotomiam præscribunt, & id temere, Potius valet usus liuum & thermaſmarum. Hic gravissime aberratur usu & experientia parum probanda. *Idem pag. 54.*

Ancilla subito correpta est dolore atrocissimo, Latus dextrum & lumbos tam immantiter infestante, ut illa continuo ejulare cogeretur: Cum nulla febris adesset, affectum esse hystericum existimavi; Ideo statim oxycrati cyathum exhibui, quem post horæ quadrantem vomitu rejecit cum multapituita; Sedato vomitu alterum oxycrati cyathum hausit, & statim dolor protinus evanuit, eaque prorsus liberata est. *Lac. Riverius cent. 4. Obs. 6.*

Multis Pulmonicis levi de causa dolores lateris excitantur, pleuritidem mentientes; an his ad sedationem doloris frequens venæ sectio? minime, cum tantum aut flatus sit aut febris exigua: sic sectio non confert, nam si cum dolor oritur, secueris, lædes plurimum, nam latera tandem debilitantur, & hoc nocet: si inflammationis sit suspicio, id quidem agendum, & protinus ad anodyna concurrendum, *Ballonius Epid. 1. 1. p. 18.*

Pleuritides & Peripneumonix sicæ, i. e. quæ non tam in humore & tumore phlegmonode consistunt quam in phlogosi & vagabunda affatione aut adustione, jugulant homines incautos & minime cogitantibus Medicis: Harum author est serum acre, subtile, malignum, efferum, eludens exclusionis anſam & pepasini occasionem, à quo siderantur pulmones decerpente. Signa sunt rubores genarum fugaces, rufus inanis, indolentia fere, iactationes, ariditas linguæ & extenuatio præter rationem dolores pungentes & fugaces: De his agit Hippocr. L. de morbis. *Idem pag. 83. Vide pag. 32. & 20. ibidem.*

Dolor lateris aliquando oritur à sanguine bilioso pulmonum venas replente, ac partium inflammationem quandam fuscitante: quo quidem certis quibusdam horis magis minuisse ferocente, ideoque membranam pulmones ambientem distendente, dolor ille concitatur. Nam licet Pulmones non sentiant, eorum tamen membrana sensu aliquo non caret Ejusmodi dolor non est punctorius & acutus, sed admodum mitis, non continuus, sed longo temporis intervallo leviter fuscitatur; certo loco minime circumscriptus est, sed modo hanc modo illam lateris partem invadit: nulla vel exigua tussis adest, raro admodum excitata. *Zerchius consult. 26. p. m. 273.*

OBSERVATIO XXVI.

Lateris dolor contusionem sequutus, cujus vestigia intrinsecus apparuerunt.

Rusticus ab equo calcatus dolore protinus in latere sensit; Eo mortuo, post apertionem pectoris intrinsecus contusionis signa eo in loco apparuerunt. *Vide tit. de Hamoptysi.*

SCHOLIA.

Pleuritidis à causa externa excitata domesticum exemplum habui anno 1666. mense Julio in vrozze charissima, Celebertini & Rever. Dom. Spanhemi, Theologie Lugduni Batavorum olim Professoris filia, &c. Hac gravida septimestris, equo in planitie pro-

strato, latus sinistram terræ graviter allisit, Illico pleuritidis signa pathognomonica oborta sunt; sed paulo post facta venæ sectione, multoque sanguine educto, quia plethorica, Postridie exhibito decocto traumatico, ex artemisia, bogula, ſaniculo, alchymilla, betula

bera rubra, hedera terti. scabio's, flor. papav. errat. ejedilque hujus ope, semel tantum assumpti, grumis sanguinis pluribus per anum, quorum quidam nucem juglandem mole æquabant, intra quadriduum omnino sana evasit, adeo ut sulceprum medicum ex Helvetia

in patriam, cum bono Deo, die Veneris sequenti (casus autem antecedente Dominica ejus noctis horam decimam acciderat) inchoaverimus. Lateri dolenti stigma evasendum h. rubram admodum fuit.

OBSERVATIO XXVII.

Lateris dolor à Mediastini inflammatione, costarum contusionem & contractionem sequuta.

ANno 1638. apertum est cadaver Joh. Hax Hoflati, qui ex gravi contusione lateris dextri versus dorsum, in tribus primis costis spuriis (unde *stultentus adematofus tumor* procreatur) in musculis gangtænam, & in illis costis cariem effecerat: proredebatur hoc malum à spina dorsi, manus extenſe in longum amplitudine anteriorum. Multa puris copia proflebat, ipsique costarum substantia, ubi spinæ apophyibus articulatur, non tantum inæqualis conspecta fuit, verum etiam aliquatenus contracta: Pleura à naturali constitutione non multum erat alterata, nec Pulmo corruptus, Cor integrum. Verum admirabile erat, quod in mediastini intercapedine, ad cartilaginem tertie costæ, à parte superiora numeranda, vomica *exiſſebat crasso* pure repleta; similique etiam sterno sub pleura insidebat, eo loci ubi mediastinum connexum erat, vomica affectum, Itaur inter se duæ hæ vomicæ communem aditum habebant: Ex autem non aliunde quam à *pleuritide mediastini* originem habuisse videntur.

Aperto abdomine nullum viscus præter naturam graviter affectum deprehendimus: Sed admirationem faciebat magna puris copia abdomini innata, præcipue autem ad aequaliculum collecta, cujus cum causam accurare perſcrutaremur, nullam aliam oculatè deprehendere, nec ratione comprehendere potuimus, nisi quod pingue do omenti, & quæ intestinis foris adnascitur, tabifica febre eliquata esset: nam cum residua intestinorum & omenti pinguedo attraheretur, liquida difflebat, similique ideam purulentæ dictæ materie repræſentebat. *Obſo Hewnii Obſerv. xii.*

S C H O L I A.

Hippocr. 6. aphor. 5. Inter costarum pectorisque dolores, & partium aliarum, quantum interſu prædicendum jubet. Hoc vult magna Medicinæ Magister ingens esse momentum in præxi, Dolorum varias species, magnitudinem & durationem observare ac dignoscere, nam inde pars affectus, causa, affectus & eventus dignoscitur: Quippe dolor Punctorius designat membranæ affectum, Tensivus membranæ copia materie dissentiam; Gravidus partem carnosam laborare; Pullativus partem coarctatior exitur. Ita in Rene dolor Gravis indicat carnem insidere calculum, & interdum etiam abscessum: Punctorius autem designat calculum ejus pelvim lancia-re. Sicio Hepatis dolor gravis parenchyma affici arguit, acutus autem & pungens ejus membranæ: Vult præterea Hippocr. in ex syndrome lignorum, præcipue pathognomonico, Medicus distinguat, in thorace an foris tantum malum sit, an simul etiam intus, vel an tantum intus deliteat. Inde enim duenda sunt indicationum curativarum fundamenta, ex natura partis læsæ & morbi specifica constitutione desumpta. Cum autem costarum lésiones nihil sæpe periculi potendere videantur, & postea in mortiferum affectum malum degeneret, ideo Hipp. in aphor. Costas priore loco posuit, nisi ignobiliores partibus thoracis contentia: coarctat ex costarum percussione mortiferum fieri apoplexiam, dum caro musculorum collisa supra costas ab eis secedit, non quidem initio, sed post aliquot dies. Etiam dolor molis humorea tunc eo attribuit, qui in tumida illa, & tunc fungosa carne suscepti, ob ejus temperamenti imbecillitatem, non possunt in ejus substantiam converteri, ideoque nebulosam & fluviosam crassitiam acquirunt, ita inter carnem & costas interſerunt, sentientesque crassæ & viscidae pituitæ mucidæ copia ibi colligitur, quæ nisi

educatur, carni inferit gangrænam & costia sphacelum: Ad hoc malum præcavendum oportet statim initio omnia molli Medicum, utque secessit à costâ caro, ei pilulis & ligamentis decenter apprimatur. Quod si medicamentis malum non cedit, ad ferri auxilium deveniendum, & apoplexiam aperiendum, materiamque, si copiosa sit, fistula interceda est plumbea deorlum protensa, ut quæ materia perseveraret in hoc apoplexiam incurrit, etiam continenter inde exitum sentiat. Si autem ea mali pravitas existat ut etiam hæc remedia spernar, postremo ad ignem erit deveniendum, & cauterio actuali caro gangrænosâ emenda, caute vitando costæ pericostium & membranam pleuram. Sin pericostium exitum fuerit, tunc costæ caries cauterio eris complananda; consingit tamen raro in hoc morbi genere ut agrosi mortem vitare queant, quoniam ex terra anathymiali, ulcersque evaporatione, provenit febris hectica tabifica, lente agros necans.

Stultentus adematofus tumor) In Belgii maritimis Provinciis, non raro contingit ut Pleuritici, qui multum & diu humidis fomentis utuntur, coarctant in externis thoracis musculis tumorem pugni magnitudine, à stultenta materia eo confluenta, ob aeris & dietæ humidam constitutionem, locique ex vicinis pleuritica inflammatione calorem. Is curatur & dissolvitur calido siccoque fou, qui continuari debet donec plene morbus deletus fuerit: nam consuevit de die evanescere & de nocte recurre.

In mediastini intercapedine) Post inflammationem intra duas mediastini tunicas materiam purulentam nonnunquam deicendere observavi P. Barthez Anat. pract. l. 3. cap. ult. cum ea per pulmones ejici non possit, Trepano sternum perforare jubet, quo foramine & via facta, penicillorum, spooigæ, aliorumque instrumentorum

instrumentorum ope, pus educi queat: Notandum autem mediastinum in homine tam magnam non habere cavitatem quam in canibus aliisque animalibus.

Vide *Ristam* Enchir. anat. lib. 3. c. 4. qui idem auxiliam proponit.

OBSERVATIO XXVIII.

Pleuritis à vomica sub mamma, plena humore virescente.

Interdum malignæ & vulgares Pleuritides grassantur, qualem anno 1598. vidi, quæ generabatur ex humore tenui virescente, & omnibus qui ea corripiebantur fere lethalis erat.

In cadaveribus dissectis, sub mammis reperiebatur vomica plena virescente liquido humore: Huic Pleuritidi unicum in sectione remedium, quod humoris pravi nulla sit mitigationis & coctionis spes. *Iac. Fontanum Med. Præf. lib. 2. c. 3.*

S C H O L I A.

Utrum in sectione remedium) Et noxia Venæ sectio: *Ballonius* L. Epid. p. 20. meminit cujusdam pleuritidis epidemice, erysipelas odis, à tero maligno ortæ, quod pepalini erat incapax: Reperitina erat doloris invalso, tussicula inanis: inoumeris lethalis fuit S. M. cessabat dolor ea instituta, sed postliminio revertebatur: multis ad pulmones metastatis, hinc ad caput, quæ omnia organum humoris tenuis, pepalini incapax indicant.

Utrum in sectione remedium) Ut & in ea pleuritide quæ solam pleuram obidet inchoylique multalosa, nisi vi naturæ sponte discumpat abicellus, aut pus ad vias urinas defleat. Anno 1658. curandam habui Neo-

comi Helvetiorem viduam Dom. Gautier Genevensis, mercatoris Gemmarii, Mariam Floricam. Hæc preheors dolore lateris punctorio, comite febre, tussis, dyspnoea, puliue duro, nihil quicquam toto morbi decursu per anacathesin expulit. Punctorio dolore gravatius succedit & lateris intumescencia. Pyroticam, multis dissectionibus admoventi jubeo, hinc pus profluit rite coctum. Paucis post horis lætras, meo pure perclusam profunde unguem, cuius exhalio promota est emulsiõe fructuum halicababi & terribi. *Fig. majorum, ex decocto sicum, electum tub. summ. uricæ & liquor.* Hinc integrè convaluit.

OBSERVATIO XXIX.

Anatome Pleuritici, à Pericardii inflammatione extincti.

Quidam in ætate florente acuta febre est prehensus cum siti ingenti, anxietate, respiratione celerrima & frequenti, thoracis incendio, tussis sicca, syncope, cordis tremore, levissimo in thorace dolore sternum versus, cum angustia summa, pulsu duro & inæquali. Hic pro pleuritico curatus, triduo è vita sublatus.

Sectio à morte palam fecit fuisse Pericardii inflammationem, nam tota fere tunica livida & rugosa visa est; & in multis partibus asperitudines apparuerunt milliaceæ, nigrore infectæ, omnia ab adurenti calore profecta. *Zacutus Præf. ad lib. 2. Observat. 138.*

S C H O L I A.

DE inflammatione Diaphragmatis, Mediastini, Pericardii, speciatim non meminere Præcici, quod juxta *Avicennam* eadem infestent symptomata quæ in pleuritide, communique velantur tunica: Hinc *Galenus* 4. de præf. ex Pulibus c. 7. Cum omnia

qua magnis pleuritidibus accidunt respondent symptomata partes nervosa diaphragmati, tam quod summa cava tunica multis nervis prædita sit, tam quod adherent septæ membranisque thoracem interspersentibus, per quas ad cor commutatur, &c.

OBSERVATIO XXX.

Anatome mulieris Pleuritice, cujus pericardium pure plenum inventum est.

Secabatur femina quædam Patavii, quæ pleuritide laboraverat, atque pro tali curata fuerat, cui etiam sectio respondit. Postquam vero ad cor perventum est, eorum pericardium pure plenum, & quasi illo obductum, cordis substantia illæsa reperiebatur. *Phil. Salmuth cent. 1. Observat. 15.*

APPENDIX.

Puris sputum iis Pleuriticis advenit, quibus Pulmones Pleuræ connectuntur, Empyema quibus à liberi sunt.

In praxi hoc notatu dignum observavi, scil. illos quibus ex aliquibus signis judicabam Pulmonem pleuræ adherere, facilius & frequentius in pleuritidem incidere quàm alios: eaque durante suppuratio accederet, etiam pus sanguinolentum ex latere affecto facilius & citius

& citius exspuere. In aliis vero quibus Pulmo à pleura liber est, pleuritidem minus frequenter contingere, eamque, si ad suppurationem deveniat, rarissime solvi per puris exspuitionem, sed plerumque mutari in empyema: Ratio hæc est, quod in priori casu pus ex pleura apostematæ possit immediata defluere in ipsam pulmonis substantiam ei annexam, atque una cum pleura, forte ob viciniam nonnihil quoque inflammata, & sic exspui: In posteriore vero non possit non defluere in thoracis cavitatem, & qua non facile datur introitus in Pulmonis poros. *Diemerbroeck Anatom. Lib. 2. cap. 12.*

OBSERVATIO XXXI.

In Pleuriticis quibusdam doloris sedationi succedit cordis gravamen, ob sanguinem in sinibus cordis & vasis concreviscentem.

Solent pleuritici nonnulli, cum dolores evanuerunt, de insigni gravamine, & velut pondere circa cordis regionem defixo queri: Cùmque ex huiusmodi affectibus obeunrium cadavera aperuimus, in cordis sinibus, & vasorum circumcirca cavitatibus, sanguinem in frustula & glotmeres oblongos concrevisse vidimus. *Wrislib. de Febris. cap. xi.*

S C H O L I A.

IN Pleuride, angina, peripneumonia, & similibus affectibus, advertere licet sanguinis aptitudinem quandam ad coagulandum, qua sit minus fluxilis, adeoque in vasis minoribus coagulari habilis, non secus ac in lacte cetatur cum acetoere incipit, nunc enim sine coagulatione non coquitur, nec super foco incalescit. Pariter & in sanguine suspicari est diathesin quandam ad accendum, cuius ratione coagulationi sit obnoxius: facile enim constat quod in Pleuritide & similibus affectibus, inflammatio, seu cruoris extravasatio, non semper depêdet à sanguinis exobertantia & vasorum plenitudine, sæpe enim cum pulsu debili, & vasorum subsidemia, sanguis in motu sistitur, & in latere, aut alibi extravasatus dolorem acutum infert. Imo ex una parte depulsus mox in alia desigitur: Quandoque in ipso corde stagnare incipit, ibidemque opprestionem sæpe lethalem inducit. Quare solent Pleuritici nonnulli, cum dolores evanuerunt, de insigni gravamine, circa cordis regionem defixo queri. *Idem.*

Cum dolore evanuerit) Cum dolor secta vena disparet, atideo leucos de morbo esse oportet. Nequaquam, nam multos statim Peripneumonicos evasisse vidimus. Ingens erat suis incendiis in pulmone nota, tussis non aderat nisi aliquando, Fallacia sæpe sunt signa inflammationis Pulmonis, quia ex quibusdā ratio niger; Si inflammatio apertæ, ingens tussis, sibilus, lingua cum vitore pallida, pulsus durus, cum molitudine, vomitiones, circa alvum dolores, alvus facile irritatur, sic casus & restrictos esse oportet in via catharticonum: Animos sæpe videtur deficere tum ob plegma contentum, quod sanguinem quandam inducit, tum ob vaporem, tum maxime quod cordis regia accensa animus præ incendio videatur d. fieri. Accedit revocatio caloris & spiritus ex omnibus partibus, excitatio potius capite accenso, evocatio humorum ichorosisque à partibus inferis, quod Hippocrates observavit. *Bellinus l. 1. Epid.*

Epitom. p. 12.

OBSERVATIO XXXII.

Anatome pleuritici in cujus thorace copia puris deprehensa est.

§. 1. **P**US aliquando ex aperta vomica in pleuritide in thoracis spatium confertim effunditur: Sic in Dom. Danserville & de S. Ygnon cadaveribus, præ vehementia pleuritidis quarta morbi die extinctis, pus ad libras plures collectum repetitum est, præter eam particulam quæ à naribus effluxit. *C. Piso de morbis à serasa illorū scilicet 3. c. 4.*

S C H O L I A.

PUS in thoracis spatium) Quod vesiculosum quam penetrare à pleura in pulmones, ad quos tam cito transferri nequit: Si copiosum per anacathartin educitur, proculdubio coacti fuisse pulmones. Alias si succingentis costas membranz ingrus sit inflammatio, vix fieri potest quin ad exteriora se non potius,

multiculisque connexos afficiat, hinc à succedente supputatione abscessus exteriorum potius quam ad interiora vergit, ibique se aperiet, vel si in interioribus consistat, ibique dissipatur, pūs in pleura cavitatem delabi necesse est.

§. 2. Juvenis punctim gladio prope claviculam dextram, & prope scapulam sinistram vulneratur. Succedit dyspnoea, sinistri Lateris dolor, &c. Ingens copia materiæ purulentæ candicantis in sinistro thorace reperitur. *Vide lib. 4. tit. de vulneribus.*

Lateris dolor aliquando excitatur quia Hepar fibrarum ope moliſ collis alligatur.

Corporibus nonnullis à natura datum eſt, ut Hepar fibris quibuſdam ita coſtis inferioribus hæreat, ut hoc viſcere laborante diſtentoque, coſtarum regione dolor incideret, arque Pleuritidis ſpeciem referat, quemadmodum multis abhinc annis obſervavi, & experimento comprobavi. *Zecchini conſult. 26. Hollerius lib. 3. c. 26.*

S C H O L I A.

Hoc viſcera laborante) Omnibus Jecorariis, id eſt, quibus grandius hepar, amplius, tumens & calidius, cum febris magnisprehenduntur, maxima ex parte tempore urgentis febris, dolores in claviculis & ſecundum homoplaſas ſentiant ſacis vehementes: & ſigna diagnoftica pleuritidis ſuperiores aut inferiores partes occupantis Hippocrit, deſcribit ex do-

lore aut claviculas "aut ileos regione occupante" Hepate accenſo, aut inflammato, aut per inſignem febrem aſthante plurimum, dolor poſſet ad jugulum pertinere. *Ballinus conſil. 77. lib. 1.* A Liene etiam dolores in mammis & ſcapulis oboriri docet Hippocrit. lib. de int. affectione, cap. de Hydropce & Liene.

OBSERVATIO XXXIV.

Lateris ſiniſtri dolor, ob Diaphragma Lienis affixum.

Quidam purulenta tuſſiens, circa diaphragma ſiniſtro latere vehementiſſime doluit: Mortui diſſectio, diaphragma ſolito craſſius lieni firmiſſime annexum oſtendit. *Vide in de Phthiſi.*

OBSERVATIO XXXV.

Anatome Virginis latere dextro dolentis, quod illa ſon deprehenſum eſt, irritatum à pure ex abſceſſibus ima ventris eructato.

Virgo annorum circiter xvi. hebetioris ingenii, boni habitus, in orphanotrophio Genevenſi educata, de dolore capitis ſæpe querula fuit Menſe Octobri ineunte ann. 1677. de gravitate perinaxi & pubis conqueritur cum miſtione difficili, frequentique urinx interceptione: Mag. D. Dantand & Bailly Noſodochi Chirurgis peritiſſ. commiſſa, hic cathartere calculum invenit, quem ovum grande æquate aſſervit: Hinc præmiſſis præmittebat, eodem menſe exeunte, Lithotomix exponitur, quæ ab eodem Chirurgo ſuſcepta eſt feliciter, quanquam ob magnitudinem lapidis (ovum enim anſerinum æquavit,) cuiusque inſignem aſperitatem, ſemilioram eductio impleverit: Operatione peracta ſeprem dies excurrunt circa febrim aurgrave ſymptoma, vulnere pus coctum eructante: Octava autem de dolore lateris dextri conqueritur, ſed circa tuſſim, circa dyſpnoeam, comite tamen febre, quanquam miti. Ter miſſus illi ea de cauſa ſanguis, nullum vero medicamentum (quodvis reſpuens) ore aſſumpſit: biduo ante obitum, quatrduo ab invaſione lateris doloris, quinquaginta & ultra excrevit lumbricos vivos per os, unum per nates, ſequipedalis omnes longitudinis & craſſiſſimos.

Cadaveris aperiendi facta poteſtate: Corpus ſat bene habitum repertum eſt & ſucci plenum: Mammæ tamen flaccidæ, Pectus juſta latitudine donatum, ſed dimidia parte ſupra brevis intervallo quod mucronatam cartilaginem & umbilicum intercedit. Eo diſſecto 1°. Hydrops pectoris deprehenſus. 2°. Pulmones circa doſum ad livorem vergentes: Aperto abdomine 3°. Hepar bene conſtitutum, ſed imis lobis nigricans, à contactu puris in imo ventre fluitantis. 4°. Veſica fellis infra lobum jecoris pendula erat, pondere lapidum incluſorum detracta, è quibus tres nucem moſchatam minorem æquabant; reliqui n°. xv. granis piperis ſimiles erant, ſtavi omnes, & bilem colore referentes: reliqua cyſtiſ ſpatium occupabat amurca illi ſimilis quam depingit in ſua Praxi *Franc. de le Boë Sylvius cap. diſſero*: 5°. Omentum lacerum erat ima parte: 6°. Lien externa facie utrunque bene ſe habebat, extremus tamen lobus nigricabat à pure infectus, intus omnino puris, ſanguini ſarcinimum ſimilis: Maxima labes in meſenterio & circa id deprehenſa eſt, ubicunque enim manus adnoverentur, abſceſſus & pus deprehendebantur, à cuius præſentia vitata erant omnia circa fundum abdominis: Uterus illi innatabat, cujus cavitatem portio ſubiebat: Pars multa, ob ſupinum decubium, in pectoris cavum viam vi ſibi fecerat. 8°. Ren dexter ſolito major, prave conformatus & pene rotundus, abſceſſu quoque tentatus, pus enim inſer propriam tunicam & adipolaſa continebatur, nec non in cavo circa pelvim, quæ dilatata erat, ut & ureteris oriſcium. In eo Rene lapidem è veſica edu-

atque rudimentum accepisse verisimile est. Sinister debet erat magnitudinis & figuræ, intrus quoque purulentus: 9. Vesica urinaria contracta erat & retracta ad ostium, citra ulla phlegmone prægressæ notas, intus rugosa & exasperata à lapidis præsentia quæ quanquam non illæsa, è partibus tamen quas continet imus venter, minorem cladem passa est, quanquam ob vim illaram, & vicinarum partium vitium, deteriori loco res ejus esse debuissent: Mirum autem cum tanta viscerum corruptela, non infirmiori valetudine usam fuisse virginem, neque marcore confectam fuisse, quinimo succi plenam & rosam, integræque valetudine totis sex ante operationem hebdomadis fuisse.

Lapis è vesica extractus cineritii erat coloris, ovalis formæ sed aliquantulum depresso, asperitimus & scaber, In lateribus rubens quasi ex sanguine in calculum concreto.

SCHOLIA.

Comissæ tamen febres) Consideratione dignum quod observavit *Balsamus* Epid. & *Ephem.* lib. 2. p. 145. Quosdam laterum doloribus esse obnoxios, quibus dum febris adest, aut adesse debet, doler tunc lateris, eodem modo ac si pleuritici forent: frangente se febris calore, minus dolorem, quod arguit dolorem istum accidentarium esse: Mulier, aut, pergravis latus dextrum doler: dam sana est, de eo querula est lacte, fortassis quia pars hæc infirmior est aut hæret pulmo ad costam: Mirum quod contingit cum

febris increfcebat, quæ certe erat partim essentialis, partim symptomatica, tunc dolor erat, ut summam difficultatem respirandi afferret: Ergo non erat pleuritis, sed dolor lateris pro motu febris & humoris exacerbatus. An his scilicet venæ congesti? sed non læpius repetira, quia non tam his per inflammationem: aut impactionem, quam infirmitatem, ut quæ pars infirma est facile corpori coadulescat: maxime verò se se profert dolor in gravidis, ob compressionem valvularum à fœtu.

OBSERVATIO XXXVI.

Latus dolor ab Hepatis vomica excitatus.

Cum æger temperamento bilioso, xxxv. circiter annorum, corpore squallido, inflammatione Hepatis laboraret, Medicus quidam pleuritide excruciarî eum asseruit: deceptus quia aderat febris, pulsus durus, difficultas respirandi & dolor in superiore parte thoracis. Quibus signis, quasi veris pathognomonicis, calidis remediis usus est, me semper renuente, qui refrigerantia præscribi volebam ob igneantem Hepatis: Anatomicam enim sectio alias mihi annuebat indicationes: ex qualibet enim inflammatione, etiam minimi digiti, orti potest febris. Inflammatio suspensorio Hepatis, per consensum, cum sit membrana, potest fieri pulsus durus: Difficultas porro respirandi & dolor pectoris circa claviculam dextram, non magnæ erant considerationis, cum enim Hepar communicet cum peritoneo, indigne cum pleura, (quæ nihil aliud est quam vitalium partium peritonæum) mirum non est si ipso accenso, dolor circa claviculam sentiantur & difficultas adit respirandi. Aderant alia signa quæ si accurate ab illo enucleata fuissent, æger forsan viveret, sicuti dolor acerbus supra regionem Hepatis, calor immodicus, vomitus biliosus cum cardialgia, diarrhoea biliosa, postmodum dysenteria cum siti vigiliæque intolerabili, atque totius corporis emaciatione: tandem post xv. dierum spatium, magna puris graveolentis quantitas per alvum excreta fuit, quam paulo post mors sequuta est.

Secundo cadavere vomica in Hepate cum maxima puris coacervatione inventa fuit. *Dem. Panarolus Pentecoste 1. Observat. xxxvii.*

SCHOLIA.

In (æque cum Pleura) Quibusdam corporibus à natura datum est in Hepatibus quibusdam costis inferioribus copuleretur. Itaque laborante Hepate imago Pleuritidis representatur: Aliis materia quædam crassa & viscida in membranis pectoris colligitur, toto etiam thorace, unde dolor gravis, dyspnoea & ficta pleuritiscum nec punicivus dolor, nec febris incenditur, ut nec si illius membranis aut intercostalibus musculis impulsus est. Aliquando etiam musculi inflammantur, sed pulsus hic alius, nem-

pe mollis: dolor gravis est, non pungens, & omnia fere leviora sunt: Membranae quoque thoracem distinguentes si inflammantur, par negotiorum viarum faciunt atque lateris dolorem veniunt. Sæpe etiam inferioribus costis inflammatis diaphragma, atque hinc stomachus graviter laborat, magno periculo: Mors hoc anno 1551, in vere plurimos, & eos maxime qui vel temere vel negligenter curari sunt,

suistulit. *Hodlerus lib. 1. cap. 26. de morb. internis.*

OBSERVATIO XXXVII.

Lateralis dolor à Pustulis duabus, una in stomacho, altera in cavo Iecoris, sobole morbi Venerei, indultus.

Fuit juvenis qui maximis tenebatur doloribus dexteri lateris: Nullum ei remedium proderat: Postquam verò mortuus est, facta secandi potestate, animadversa est, cicatrix circa genita, unde facta conjectura eum morbo Gallico laborasse.

Aperto corpore, invenerunt quod morbo Gallico etiam interior totus laborasset. In Diaphragmate videbantur maximæ pustulæ: Ubi autem fuit dolor maximus dum viveret, ibi stomachus habuit cavæ manus instar pustulam, & in superincumbente cavo hepatis, similem aliam pustulam, ut una alteram comprimeret. *Ex Schedæ C. Gesneri.*

S C H O L I A.

Vide facta conjectura eum morbo Gallico laborasse Vidimus, ait, *Balsamus* i. Epidem. & Ephem. p. 7. Dolores lateris perpetuos, sed qui de nocte urgerent, nullis celere remediis: Cum remedium inopes esse-

mus, de lue Venetæ suspicio fuit, Tandem diæta & lina curatio procurata est. Quoties confectus remediis morbi non proligantur, ad quædam Galeni consilio est recurrendum.

OBSERVATIO XXXVIII.

Pleuritis à vermibus in imo ventre latentibus producta.

Fuit à nobis alias in observationibus nostris animadvertum, Pleuritidis quandam speciem esse, quæ in omnibus veram & legitimam, non autem spuriam æmuletur: Otta est à malignis & acribus vaporibus, ab inferioribus partibus sursum in pectoris regionem delatis: ex quorum virulentia & actimonia, Pleuræ inflammatio, nec non venarum erosio excitatur, unde sanguinis exspuitio, spirandi difficultas, febris & alia symptomata, quæ veram Pleuritis comitari solent, consequuntur. Ubi purgatio sanguinis detractioni longe latèque præferenda erit. Sed hujus rei veritatem cognoscent ii qui Ferrariæ in Xenodochio aliquandiu degerunt, ubi infinita Pleuriticorum cadavera quotidie dissecantur, in quibus viscera interiora, stomachus scil. & intestina, lumbricis & vermibus tota infarcta reperiuntur: Hujusmodi Pleuritides, quæ ab iisdem quibus pestilentes, ortus sui causam ducunt, *auxilium tale exposcant* quod facultatem habeat vermes expellendi & corruptionum incommoda tollendi: qualis est virtus & proprietas mercurii, rerum mercurialium, &c. *Guercetanus Pharmacop. Reffit. cap. vii.*

S C H O L I A.

Puella viij. annos nata laborare cepit tussis & febre, quibus successit lateris dolor, ita ut Pleuritica censeretur. Atrox f. die morbi tres aut quatuor lumbricos excrevit per chylerem, ac diebus sequentibus quamplures. Tum exhibitis medicamentis lumbricos expellentibus, tum pungente medicamento, & ita est curata. Unde patet vapores ex materia putrida (à qua lumbrici generantur) elevatos, dolores lateris & tussim, aliæque symptomata producere quæ pleuritidem mentiuntur. *Rivernus curaria i. Observat. lxxv. Formæ Galicæ cap. 13. libelli de Lumbricis.* Nos inquit puellam curavimus in qua cuncta spectabantur symptomata quæ pleuritide laborantibus solent evenire: dolus in primis adteræ punctio in thoracis dextra parte; tussicola quædam siccitas, vel levis quæ occasione commota, pulvis arteriarum duras, serræque haud omnino dissimilis ac recurrens, spiritus offendens, continens febribus. Hujus cum interdum videremus totum corpus frigidum, nonnquam calidum, quæ malariam alterius rubredine fieri, sumpto ad lumbricos necandos & educendos medicamento, statim plures eduxit atque incolumis evasit. *Idem à Balsamo observat. Epist. lib. 1. pag. 21.* Porro dolor erat circum latera, detrahebant auctor sanguis: dolores non concedebant, inopinato vermes caclusi sunt, dolores quieverunt. An vermes id facere possunt? ha pro-

sus, imo & innumeras doloris species excitate possunt in omnibus partibus, ac præsertim si ad ventriculum repant. *Helmontius*, referente *Gremio Arturæ*. lib. 2. cap. 1. §. 9. Vermes quoque Pleuritico dolori antea præbere censet, exemplo feminæ dolore punctorio detentæ, quæ sumpta purgatione peros rejecit vermem vivum oblongum, ille ait, in pectore non continebatur, sed archæus in stomacho propter vermem irritatus acorem produxerat, qui in pectore punctioem dolorem causabat; adeo stomachi archæus in omnes reliquarum partium spiritus innatos ita archæus dominatur, qualis illarum digestionibus præsit.

Auxilium tale exposcant Nocavi in centuriis Martini Rulandi inchoaram semper fuisse ab illo Pleuritidis curationem à purgatione, quam statim initio præmittebat, dilutam aqua ejus benedictæ, quæ semper vomitum aliquem levem proliciebat, ut ipse refert: hanc descrebit, licet obscuris verbis, capus basin constituit crocum metallorum, quem aqua ulmarie aut cardui benedicti (unde nomen est impositum benedictæ aquæ) diluebat. Qui quidem crocus, etsi omni sapore destitutus est, non caret tamen et inferiores purgandi viribus, levem simul atque utilem vomitum interdum excitans. Nec miror inter specifica illius remedia illud ab illo uti passim in Pleuritidis curatione præsertim pestilentiali: Si quidem in multis pleuritidis ea jugularis, etiam

senibus, quorum corpora post obitum aperienda curavi, deprehendi magnos interdum lumbicorum cumulos in venis collectos, ex quorum fordida & putrida materia, seu virulenta ac acris vaporibus potius inficiebatur ac incendebatur, unde constat quam

apae purgatio potius quam venæ sectio præscribatur in illis pleuritidibus. Hinc subtili iudicare crocum istum ætiallorum ejusmodi virulentis putrilaginibus abigendis maxime proprium & specificam esse remedium, &c. *Quærentium cap. 5. Defens. Hermet. Med.*

OBSERVATIO XXXIX.

Pleuritidis quidam fuit obnoxius, quod invenia azugæ unica esset valvula.

Primus post Amazum valvulas venæ azugæ detexi, & in omnibus cadaveribus privatum & publice demonstravi, atque in vena intercostali valvulam adhuc sæpius observavi: Quam thorax ad respirationis necessitatem perpetuo moveatur, ne sanguis in venam azYGON afflatum irruens Pleuritidem inferret, benigna parens natura ut huic incommodo prospiceret, tres valvulas tanquam ostiola in caudice venæ azugæ alternatim disposuit: prima est in exortu venæ, dux aliz directè oppositæ in medio caudice sunt affixæ, afflatum irruenti sanguini obstant, sed remeanti cedunt. Propterea non impediunt quominus materia pleuritica ab azugæ ramis in cavam refluat: Quod si *unica* tantum *adfit valvula*, ut semel mihi videre contigit, ejusmodi corpora Pleuritidis affectibus sæpissimè tentantur. *Riolani Anthropol. lib. 3. cap. 8.*

S C H O L I A.

Venæ *adfit valvula, &c.*] Hominum motum sunt valvule venarum: hæc si vel abint, vel quocumque de causâ obstruæ sunt, tunc in ea saltem vena, eaque corporis parte sanguinis motus impeditur, ubi obitaculum hujusmodi adest: Ita sanguinem inhibere valent anatomosæ, si vena quælibet cuilibet venæ vel arteriæ sociæ debite officio suo non adpreatur; id quod fieri potest ob solutæ unitatis, vel etiam cavæitatis, scil. obstruætionis, morbum: Si enim sanguis non in sociam venam & arteriam, ut decet, sed in habitum corporis effunditur, atque ita non solum sanguinis profusio, sed simul etiam fluxus inhibito fit, cum nec illa mitat, nec hæc recipiat sanguinem; sed sanguis, qui ulterius venæ sanguinem impellere debet, a debita aberrat via.

Quærentium materia pleuritica, &c.] Cum vena *azugæ* non ita emulgentibus intercedit communio: *Falsipus* in *Observat. Anat.* scribit ut plurimum unico ramo eam inseri in emulgentem, & hanc viam esse per quam materia pleuritica faciens nonnunquam com-

urina expurgatur, ita ut non amplius necesse sit credere illam per venam cavam & ventriculos cordis transmissi: contra hanc sententiam vide *Laurentium* lib. 9. *Anat.* qu. 12.

Si unica tantum, &c.] *Hippoc.* *De usu de Facult. anat.* p. 54. se nunquam in vena sine pari valvulas deprehendisse asserit, testem adducens Anatomicum peritissimum *Joh. Baptistem Conarum*.

Pleuritica effusio (sæpe tentantur) *Clar. W. Lam* in sua methodo *Med.* causam disquirens cur in Pleuritide juvet sanguinis missio, vena è directo aperta, eam in arteriis querendam sit, non in venis. Arteriæ quippe sanguinem in partes convectunt, revehunt venæ superfluum, ac quo celerius, eo minor inflammationis metus; celerius autem si desint valvule, quæ obices sunt & repugula consequenti *æspæ* sanguini. Alligetur ergo potius causa frequentis invasionis pleuritice, sanguinis qualitati, qui concretionis facilis causâ intra se gerat: Nisi dicas arterias venis ampliores: plus adducere quam hæc reducere valeant.

A P P E N D I X.

De Pleuritide ex Dorso.

Pleuritis ex Dorso affectus est ab Hippocr. nominatus, à paucis, quod sciam, observatus, à me semel; erat autem mulier gravida gerens septimestrem fœtū: dolor erat punctorius paulò infra duodecimam spinæ vertebam, dolor inquam insignis pertinens ad regionem Hepatis, febris assidua, tussis inanis, cum inflammatio ferè extra Thoracem esset, ut Pulmo serum ab inflammatione manans apprehendere nequireret, inter signa Pathognomonica erat dolor circum Dorsum: membrana affecta, non quæ collicis obtenditur, sed quæ vertebas cingit: inter signa demonstrativa, erant urinx planè vinosæ, ac si sanguis multus eas proluisset ac tinxisset, quia enim coarctatur Hepar, utinæ tales apparent. De ea Affectione ita Hippoc. lib. 3. de morbis. *In Pleuritide ad Dorsum dolet ipsum Dorsum velut ex plaga, spirat & acervatim spirat, statim spuit parca tertia aut quarta die, saniem meum subcurrentem, &c.* Et secundo de morbo. loquens de morbo Dorsali quem *nomosæ* vocat, qui aliquid affine habet, ita scripsit, *Dolet Dorsum & Inguina, tertia & quarta cruentam meum urinam*: Inflammatio itaque pertinet ad partes Thoracis inferiores, in eo ergo affectu duo symptomata rara comperimus, unum est mictio cruenta, vel quod præ calore & inflammatione, serum & *nomosæ* urinx appareat *nomosæ*, ob bilis mixturem quamplurimæ, vel quod reapse sanguis remiscetur ipsi urinx, facta translatione quadam ad vesicam. Alterum est, difficile spirare erecto corpore, quod novum est in morbis Thoracis, Hippocr. in Coacis metninit ejusdam Pleuritidis in quâ Dorsum rubet per erysipelas, à fluxu concitato per venam Thoracicam, per quam fit Pleuritis Dorsalis, de qua hic agitur, hæc à reliquis differt. Curatio mihi videtur maximè posita in sanguinis detractioe, eaque tautò frequentior & major esse debet, quò

quò magis poſita eſt in inflammatione per collectionem, & quod ſpes ſanitatís non ſit poſita (ut cæterarum Pleuriſidion) in larga & facili ſputorum eductione: nec enim alæ Pulmonum allidentes ad latera, exugere poſſunt mæſtiam phlegmones, reſudatione quadam corpus Pulmonis ſubeuntem: Nos iſti mulieri, etiam gravidæ, ſanguinem ſepties deſpſimus, & cum nobis religio eſſet toties evacuare, illa inſtabat precibus ut id auderemus, adeo manifeſta ex frequenti liberalique ſanguinis detractiõne allevatio conſequebatur, foribus litibusque aliquando adjuta eſt, aliquando ægreſcebat. *Tractatu peculiaris de eo morbo.*

OBSERVATIO XL.

§. 1. Dorſi dolor à Pulmonis ſiniſtri corruptione & Ventriculo perforato.

VIt maximis in Dorſo doloribus diu multumque divexarus, tandem nigra vomuit, de 3^a. vel 4^a. die vomitus repetens, interdum ræſes meſuras id quod exiit adæquabat: prius ille vomitus membranaceam cruentam particulam ſecum eduxit, unde mihi de perforato prope Lienem ventriculo exorta fuit ſuſpicio: Fuere in re Anatomica male informati apud quos Irritationem merui, poſthabitis utriuſque cultivatori, Bohemi unus, aſterius Boruſſi hſtoriis, malè de ſtomachi perforatione ſentirent: Vitali tandem aura privati illius ægriori cadaver ubi apertum, infima corporis regio omni labe carebat: In pectore verò ſiſtebat pulmo totus corruptus & putrefactus, citra qualemcumque ſetorem apparuit: Lobus ille ſpinæ dorſi firmiter adhæſit, atque per œſophagum paulo ſupra ſuperius ventriculi oriſicum, ruptum, liquorem illum nigricantem in ventriculum congeſſit, unde per intervalla vomitu iſta ſaburra prodit. *D. Valcamerus Med. Noribergienſis Annot. ad Obſerv. 29. Miſcellan. curioſ. ann. 1671.*

S C H O L I A.

Maxime in Dorſo doloribus Vilceſum internorum cauſa dorſo accumbentiam, majorum præſertim, & per ligamenta dorſo appenſorum, ſi ea diſtendant, aut in tumorem eleventur, aut alioquin ponderoſiora ſiant, trahendo & diſtendendo membri anas dorſi, quibus annexus, ejus dolorem, horum

mothorum fomitem, præcreavit. Quis Dorſi dolor admodum frequens, qui poſterius, aut veluti diſſuſionis ſenſum exprimit, in diverſis Hepaticis, Intellinorum, meſenterii, uteri (adde ventriculi) morbis, &c. *Placum Pra-*

æſus lib. 2. cap. 16.

§. 2. Vir Reverendus Febre aſſidua prehenditur, cui tuſſis accedit, difficilis reſpiratio, ſiccitas linguæ ſine ſiti, Dolor univerſi corporis, præſertim Dorſi, mingendi difficultas, &c. Reperta eſt corruptio Pulmonis in parte ſiniſtra verſus Dorſum vergente. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

OBSERVATIO XXI.

Dorſi dolor à carie vertebrarum inductus.

Nobilis vir, quia Venerea contagione infectus fuerat, & cum inſtar venenorum humorum lues iſta ſæpe de inſtituto adoriatur hanc aut illam partem, dolores ſentit implacabiles in tertio & quarto metaphreni ſpondyli. Nullis ſuperantur remediis, præ dolore interit.

Reperiti ſunt duo iſti ſpondyli carie ac rabo conſecti, hinc dolores, hinc mors: Avicenna Fen. 22. tract. 1. cap. 12. eam corruptionem Spinæ vocat *Ventofitatem ſpinæ*, quod talis corruptio ſit ab ichore: ichor vero & ſtatus malignus conſimilis fere affectus aſſerunt: diximus enim ichores & ſtatus dolorum maxime cauſas eſſe. *Ballonius Ephemer. & Epid. lib. 1. p. 83.*

S C H O L I A.

Venerea contagione infectus) Memorabile eſt præceptum *Balloni* conſ. 23. lib. 1. ubi proponit cauſam quendam doloribus atrocibus ad ſternum & ſpinalem meſallum divexat à lue venerea obortis: Cum quæſelas, aut ægrotum aſſiduos de morbis intercraneis, quod nil aut parum levari videatur à remediis, ſecuramus ad occulum aliquod; non quod à celo repetamus, ſed ad internas occultrale cauſas. Nam quoties de fugacibus morbis, aut doloribus potius, conqueſcunt ægri, aut de ſixis citum obſervant, ſuſpicari oportet aut latens venenum, aut reliquas epu-

luis, ſive ab hydiargyri, ſive à morbi ipſius maligna vi prout dicatur. In pluriſimis enim id nobis contigit videre, quos ſævi admodum dolores ſuſum deorſum, in omnemque partem trahant.

Ventofitatem ſpinæ) Ad menſum Arabum Ventus ſi ſtatus ſpinæ dicendus, quem aſſertum vulgus voce inverſa Spinam venoſam vocat: Severinus novo nomine Padanhi occæci, non ſpinam ſolum ſed & cætera oſſa invadens & carie exedens, quanquam id nomine primario gerat ſi ſpinæ infecta ſit. Vide de hæc morbo librum ultimum.

OBSERVATIO XLII.

§. I. *Dorsi dolor à Pulmonibus Dorso annexis, Vitiatis, &c.*

Viduus melancholicus diu conquestus est de dolore ventriculi, necnon renum & Dorsi. Pulmonum lobus dexter inferior versus Dorsum annexus repertus est. *Vide lib. 3. tit. de Inappetentia.*

§. 2. Georgius N. dolore continuo capitis, tum circa Homoplatram dextram affectus est, cum destillatione ad pulmones, &c. Pulmonis dextra pars propemodum absumpta erat. *Vide Tit. de cordis Palpit.*

OBSERVATIO XLIII.

Dorsi & Gulae dolor à pulmonibus in vicinia utriusque inflammatis.

Auriga subito in curru extinguitur: Illi prope gulam & Dorsum inflammatis erant pulmones, sicut & ipsa Gula. Unde vivus post cibum sumptum de dolore ibidem loci ingenti non immerito conquirebatur. *Vide lib. 2. tit. de morte subita.*

OBSERVATIO XLIV.

Dolor Dorsi ab aneurismate interno.

Mercatori dolor summus ad spinam dorsi, annum integrum laborabat. Quod alii quando lue venerea infectus esset, id attribuebant veteri morbo. Ter aut quater litus est, nihil malum quievit, tandem sursum deorsum ingens sanguinis copia est excreta.

Aperto cadavere, Aneurisma compertum est in divisione magnæ arteriæ ad ilia, qua parte spinæ incumberet. *G. Ballonius Paradigm. xiii.*

S C H O L I A.

Quod aliquando lue venerea, &c.) Cui familiares ejusmodi dolores, præsertim quatuor ejus speciei. Com jam invalesces lues, an *Fervens*, solidas parres, ossa, viscera, membranas ac nervos aditunt. In his jam vitæis excrementa multa, crassa quidem ac glutinosa pro partis coaditione, sed tamen maligna congestione accumulavit, quæ nonnumquam in tendones, sæpius inter ossa ac periosifica coadituntur hæc cum vel membranam ab ossa divellunt, vel cum maligna acrimonia ferunt, cruciatos cient implacabili-

les. Cleca regioem ossibus proximam, ut notat *Platerus præf. lib. 2. cap. de Habitu corporis dolore*, in media fere ipsorum latitudinis vel longitudinis possimum excarni: ut in tibiae maxime posteriore nudæ sedis longitudine; & juxta scapulas, homoplatram, & cubitum; in stemi item anteriore ossa sede, quæ in hoc solo affectu, cum aliter vix ab internis causis dolere possit, dolet, & proinde hæc lues etiam solo hoc signo quandoque cognoscitur.

OBSERVATIO XLV.

Omoplatarum dolor à putri materia in thorace contenta.

Dominæ du Pleffis ab acris fero dolores excitati sunt in Omoplati: ardoris & acrimoniæ sensus erat, & nil iuvabant remedia, imò ne opium: talis dolor viginti menses perseveravit.

Tandem cum Interisset repetita est collectio putris & olidæ materiæ in thorace, cujus ferum eos dolores faciebat in partibus vicinis, & ad Pulmonem est familiare. *Ballonius lib. 1. consil. 114. Jac. Thevart annot. 3.*

Id Pulmonem est familiare) Nec his solum sed & Hepaticis, notant *Ballonius consil. 77. lib. 1. Unus, aut, animadvertere oportet, quod ad therapiam & diagnosis facit imprimis. Omnis jecoratiis, i. e. quibus grandis Hepas, amplius, tumens & calidius, cum febribus magnis prehensur, maxima ex parte, tempore urgentis febris, dolores in claviculis & secun-*

dum omoplatas obortuntur satis vehementes: nam quemadmodum ineuntibus paroxysmis in tumescit & expanditur Hepar, contingens diaphragma, unde difficilis spiratio contingit, ita quoque dum est tumescit, in tumescencia est quedam, hinc tractui similis contentio, quo fit ut per communicationem vasa superiora afficiantur.

OBSERVATIO XLVI.

Dorsi dolor à vena curvæ inflammatione & dilatazione.

Aretius venam cavam inflammari scripsit, atque inde ruptionem pati: quod accidisse vidi. Non potest dilatar truncus venæ cavæ quoadlibet libera est sanguinis circulatio. *Kieselmann Encheririd. Anat. lib. 2. cap. 27.*

OBSERV.

OBSERVATIO XLVII

Dorſi dolor ab aneurifmate aortæ, dorſi vertebris adnata.

NOb. N. ex ſaltu & conſuſione Equi ferocientis, incidit in vehementiſſimum dolo-
rem Dorſi, cui ſucceſſit Tumor cum pulſatione. In ipſa Aortæ cavitate Tumor præ-
grandis repperit, ex arteriali ſanguine concretus. *Vide lib. 4. Tit. de Tumoribus.*

OBSERVATIO XLVIII.

Dorſi dolor à Liene calculis reſerto, Rene dextro lapide obſeſſo, Vtero lapide.

VIdua gravi dolore Dorſi vexatur, poſt ſir hydropica: Lien quaſi convolutus calculis
plenus conſpicitur. In Rene dextro aderat quadrangularis lapis: Uterus cartilagineæ
duritiæ. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

OBSERVATIO XLIX.

In virginis diuturno Dorſi dolore vexata, bini lapides in ſiniſtro rene reperi.

NOb. virgo Dorſi dolore diu vexata eſt, cuius nomine varia tentata remedia, Binos
lapides in ſiniſtro rene invenit. *Vide Tit. de Dyſmenæ.*

OBSERVATIO L.

Dorſi Dolor à ſero pingui infarciẽte muſculos humerales.

INcredibiles circum ſcopula operta & rachitidem dolores oriuntur à delapſu crudi ac ſeroſi
humoris per partes poſticas capiti, Et ſi mulieres maxime exercent. In Domina du Pleſſis
per viginti menſes perſeveravit, nulli cedentes remedio; Johanni Bellicano (qui laqueo
vitam finivit, calamitoſo ſupplicio infinitatem, ut verbo Tulliano uratur ſuorum ſcelerum
expiaturus) eos dolores ſæpe perpeſſo, cum corpus mortuum ſecaretur, omnes nervi &
ligamenta muſculorum humeralium, erant operta ſero pingui: Idem obſervatum in alijs
ſimiles dolores paſſis, quos nulla fete ars levaverat. *Quid hic capias conſiliis, quæ medendi
methodus? Gal. Ballaniſii Ephemerid. & Epidem. lib. 1. pag. 46. & conſ. 114. lib. 1.*

SCHOLIA.

A Delapſu humoris per partes poſticas capiti) Queritur
hoc loco igno modo generetur ille humor in
capite, & unde effluat, Qualis ſit, an ratione caloris,
an ratione frigoris, Et ut acer nitroſque eſt, cui
tam facile horreant. Hippocr. lib. de locis in homine
duplicem macram facit à capite oriẽtem & dolorem
exercentem, unum ab interno cerebri corpore, per
inſundibulum deſcendentem; alterum à tranſudatione
ſub pericranio in partes externas ſeſe protulientem;
Si ab interno capite eſt, mordet & dolorem facit; Si
ab externa parte, non mordet: Hoc tantum probabi-
le eſt, ſicut & illud quod ſcribit, Si fluxus muliebris
mordet, à corpore eſt, id eſt, ventre ipſo in quo per-
vius humor latet; Si non mordet, à capite eſt: Nam
in Maria Berthier (quæ jam annos aliquot capitis an-
teriora dolor, frigus ſe ſentire in iura coccoaria
narrat, Et uno ab hinc anno maſſiſſe ſentit fluxio-
nem à capite in ſcopula operta per collum, in meta-
phitemum & lumbos. Et eo humore fluente dolores
ſentit vehementes, & ſentis caloris & acrimoniz ad-
eſt: Si hic humor lubet artus & macabrorum at-
tenuationes, illam arthriticam reddit, ſed dum lubus
euenit fluit, nec in interiora capacitates ſeſe inſinuat
ac inſert, nonnum profundos dolores & arthricos
loſert) dolores capitis, & vicinitas locorum qui pri-
mum dolent, deinde tranſfundunt eandem dolorem
in partes contingentes, & ſignificat à capite humo-
rem maſſare, qui nitroſus eſt, maſus, effertus, & qui
quamcumque in partem irruerit, lux malitæ virus ex-
pandit, Tabern enim inſeret, & ea omnia quæ ab

Hippocr. lib. de Glandulis explicatur. Huiusmodi
humoris & generationem, & ſortem, & effluas
Hippocrates l. c. explicat, & ſæpe expetiſſima parent;
Si enim conſtat partes omnes internas ſæpe labefieri
ob nitroſum ſaltemque humorem à capite manantem,
cui humor qui in partes externas reſunditur, aut li-
quas ſubit, aut expellitur vi pellentis naturæ, & qui
cum eo qui interiora ſubit habet aſſinitatem, ſimilia
ſymptomata non progigni? Si conſideratur autem pec-
uliariter tale ſerum in quibusdam, & eo facilius quo
magis tempus & ær eſt idoneus ad ſalem generatio-
nem, ut autiſina conſtitutione, per corruptionem
aſquilita ſalædine & nitroſitate, Et ad id facit ſi calor
corporis eſt acer, corruptus, ſqualidus, talis enim
calor non actionem facit, ſed corrumpit potius: Atque
primum ejus malignitatis prima labes ab hepate eſt
alimentum enim, id eſt, ſanguis aliquando acrior eſt
& ieroſior, & tractu temporis dom majorem mali-
tiam acquirit, nam vitulentus ſi quodammodo: Ac
præter vitium in ſanguine, poſſeſt eſſe peculiaris diſ-
poſitio in capite, quæ effluat ut alimentum in capite
ipſo coarctatur: Et cum non videamus ullum ſta-
tionibus malignis opportunitatem (nili forte per totum
corporis habui diſſuſus ſit calor acer, & corrumpens)
qui non doloribus capitis frequenter exerceatur,
ſit ut propter impellentiam à dolore, & vim factam
parti, ſaculas partis debilitetur, calor infirmetur, &
pro nativo extraneus inducatur, imo & febriſ quæ-
dam capitalis inducatur, id eſt, calor extraneus, hecticus,
malus, corruptor ac alimentum depravator: Et ſic pertran-
ſit ſic

nisi sit generatio humoris, sit et potentes effluvia, & cum cum extra caput ille humor non educitur, tum vertigines, epilepsie, apoplexie quovis sunt ipsi: Et illa est vere diuturna causa morborum stans ratiq; periodo reducum causam *over* condidit Galenus 1. de diff. febrium. *idem ibidem*.

Ex Lymphæ, per vasa sua, in corporis habent distributa, & obliuata, hinc rupta, effusione in partes vicinas, produci censet quimodi dolores *fran. Syrmus de lib. prætoris lib. 1. c. 50.* Et Tumores quoque carnis humoris adscriptos, eos præsertim qui partem brachii superioris usque ad humerum ipsum occupant, & quandoque collum ipsam affligunt: Ad quos referet eos qui dolorem Ichthadicum mentiantur, atque incellum impediunt, in natis hærentes: Cuius præter, præmisis hydragogis & sudoriferis, hoc lina, *Æ. ungu. maris*, olei lumbicæ, ana *℞. luccini ℞. m.* Quod si inde vel solis integumentis augeantur, isto utitur *Æ. ungu. populi*, nervali, ol. lumbicæ, ana *℞. olei lilioli alb. ℞. m. Polvini*, scil. coxendicis, sciat Ballamo sulphuris terebinthinae, paucis ejus gutta partem illinendo.

Causa si fieri humoris. De natura, effectis vasculis, & noxa quas inferit partibus in quas deferunt, sic scribit *Bemartus* Theatri tabidorum Læticæ. xix. Nunc insipidarum, aut, aequum indigat microscopus, quantum mediocri proportionis ad sanguinis contemperationem utitur, quandoque supervacuum, si intra vascula coarctetur, totum gravat, ut & extravasatum patet; præsertim ispirabiles, si in eas *dele* aut copiose congeriantur; cæterum partem refert, quod ad rem nostram attinet, an lymphæ mites a vasculis suis designatis oriantur, vel an illis peracto opere destinata reducere fuerint, modo eas cum sanguine circulationem lubilis, & in majores cavitates per expressionem elutriatas inspillari comprobavimus, &c. In plethorice lymphæ tenuiores & sanguine emergentes primo tracheam copiosius aliebant, unde evanuit algos, subortebantur spuma tenaciora, pellicula, cum sereu laboriosissimo, a quorum congerie pectoralia perinatim inficere annotavimus: Omnibus plethorice corporeis postquam purulenta expurgata fuere, successit per dies aliquot lusus idæ ejedamentum, a quo cum premensus viscera valave naturalia, minus ubi natus ipsialia, minime vero si ejus mucro obliuata fuerit intestina: Quem mucum in insudibulo veterum sanguinem obturare, seuque meatum præcludere, atque in ventriculum & intestina regurgitare Doli dolores, vomitiones, tormena & ichthiam nonham pueræ pro certo habeo: Imo talium visciditatem vasculis moribus adhaerentem, non raro sanguinis reciprocationem præpedia videre est, quod semel in arteria, venosa ducta, infante tenario tubulu & vivis erepio observavi: In partes denique entimas particulares si inæqualiter diffusæ fuerint aque densabiles, tumores ardematosos continent: si vero in universas, leucopilegmatum & anasarcam cursum diducimus: In leu isemineo, vel si gignitio temperaturæ maribus, ut & in convalescentie illam collocatis, quibus scilicet sanguinis calor minus vigeat, incipit in toto hæc mucositas, ubi natus vasculorum radix perinatissima.

Id ubi maxime extitit. Id observavimus, ab *Baldano* loco proxime citato in *Maria Berber*, & in *droie N* que utraque dolubilis capitis est ubi nola, & in *droie N*. Et in his quibus corpora sunt macilentia & *droie N*, juxta illud, *Quæ rursus sunt calida, carat habent frigida*. Et quod notandum, ille milie-

res res, cum calore habent acrem, mordacem, multum, & tali humore abundant, tamen le ne miamum ligus perferre posse dicunt, & sibi petpetuo in rachide, & in occipite, quod parte anteriore est frigidus, sentium quandam frigoris, & *carat* sunt, perinatimque constitutum dicunt: Et si ab ea parte diffus humor, tunc in partibus remotis molestias excruciat: Cautum ejus rei evolvemus, Cum cerebrum peculiari morbo laborans, & veluti quadam febre sibi propria impeditur, non capli cum fructum ex alimentis quem capere debet, illud cæsumpit, unde pars aliqua jam sequestrata est, que continuos dolores, aut partem intermitten-tes committat: pars alia a cerebro valente pellitur fusa: Si nihilom taliamque quid habet *pura* per putredinem, sentum caloris & acrimoniae inferit, & sic putat sibi partes deus: Si qua pars minia frigoris & caloris, dum confunditur multo sanguinis, dum nervolum genus fieri & imbuit, sentum quoque frigoris inferit; sic pars & surge ea inæqualitas & vicissitudo caloris & frigoris: Imo si initio paroxysmum minimum appulsa exteriori acris frigidi, aut ipso humoris etiam calidi & beliosi, sentum hororis & frigoris inferit, quando magis id pellabit humor a capite labens, qui tametsi & caliditatem & nitrositatem habens, caliditatem intersecam habet, efficitur quia omne excruciatum retinet aliquid de ea parte ejus est excruciatum, cum cerebrum natus in frigidus, & a mirum si in isto humore sit aliquid interstis: & de rigoris & hororis locus est apud Hipp. 1. de morib. *Agor, an, in morbo sit ab externa &c. maxime* id sit cum *in &c. panta rursus fuerit sanguis, aut alia &c. hu aut atropis &c.* ut minus non sit in castoribus itepe horream aut rigorem: Humor autem a capite refluenditur ob *dis*, nam instar spongiam madefactam, que mox premuntur, cerebrum oppletum ab ambien e acie capitum, alias atque alias, in has aut illas partes, quod sit ob calorem aut frigus: Alia causa est vis capillaris quam in hac humor, qualitate aut quovis peccans: Accedit quod omne sersum & humor nitius sua mala qualitate prædix facile sibi viam querat atque parit: *idem ibidem*, Ubi plura lecta dignissima: confirmat exemplo *Bemartus* L. C. Martona, an, *atris 47. eufora*, at vero valerudina-ria, cui valcula omnia in hepate, sicut & melioris desinentia obtrata fuere, hororem in qualem aliquoties, insiditatem vero partis alieque semper perpessa est, qualem insiditatem aque gelide affligit: suppositionem alibi alieverat: Et licet libatam subducendo insiditatem, adhuc hoc symptoma quovis vero pyalimus aut diarrheæ supervenit, ad tempus delin, præmisis demum aliquot cathartics, quibus viscida copiose seclusa, postquam sudores in stupra tica multoties exaltati fuerunt, diæta paiva & luccioci convalescit.

Omnia nris & Hyematis. Notandum quod ait, *Galenus* ad partem 66. lib. 3. de acie. Frequenter in *afro*, morborum aut *atris*, *immensum* humor reborat: *carat* autem pars propria sua ratione missa non sit: *Prænotus* & *immensum* humor collectus *Agre* existantur, cum nec perfoliote, nec caupalmana, nec medicamento abstrahatur aut discutiatur, nisi prius attenuatus & in vaporem etolatus: Et quoniam lentus humor *Agre* quoque evacuat, & hæc humoris illius glutinosi consumaciæ dolorem tene obortum fover diutius que alie. *Jai. Therat Anat. 6. in consil. 3. lib. 2. Baldano*.

Quid hic caput vossibi, qua mendi mendi t) Tum ex Cello tum ex Hippocr. evocanda est harum *lin* nunt

nam medela : Primum quantum pectus aditum re-
turn humidarum (quoniam vulgo dicunt liquidiora
non convenire catarrhis) convellenda est ista opinio:
Quoniam ex Hippocr. 4. de morbis, quo plus hu-
midi sumitur, plus quoque pituita videtur in cerebro
(quod pituita fontem facit) accumulari & sic oc-
casio fluxionum (supeditari); Sic hoc expeditum: Pi-
tuitosis & præpinguibus frequenter eorum liquidarum
visus non quædam, ut nec illis in quibus humiditas mul-
ta, præsertim excrementitia: Ideo Hippocr. aph. 19. 7.
sorbis, fument convenire illis qui humiditas carnes ha-
bent, quia fumes siccat ex eventu, ait Galenus: At
catarrhi maximam partem humiditate multa abun-
dant: Imo cum catarrhus mollius morbi peculiare no-
men sit, sed morbidam excretionem significet, quæ
prout in has aut illius partes procumbit, ita varias
morbus qui inde sequitur appellationes sortitur: si
excessus sit humiditatis, quis dubitat quin sicandum
sit: At contra aliter faciendum est: Si excessus mul-
tus sit humiditatis, si cerebrum sit humidius, nemo
dubitat quin siccare non sit bonum, contrario con-
trarium opponendo: At quoniam nitrosa, acris, sal-
sa, subiles quoque sunt fluxiones & catarrhi; vel
quia qui à partibus inferis surgunt vapores in cere-
brum talem naturam habebant vel quia ob peculiari-
tatem in cerebro constitutionem, & malam diathesi-
talem nasciturus nascitur; vel quia hepatis calidius
proventum facit illius humiditatis per modum effu-
sionis & sublimationis, in hoc casu ab humectan-
tibus (etiam corpus videmus humidiusculum) & *visi* *est*
humiditas nam abstinere non oportet: Sed an in fluxio-
nibus istis & potiusque nitrosis tuto Balnea præscri-
buntur universalia? Præscribuntur ad contemperan-
dum non ad evacuandum; nam cum Balnea evacuent,
auctor Galenus, aph. 2. 4. si tantum in aquam egeli-
dam æger mittitur, nec elicitur sudor; temperatur

quodammodo humor nitrosus per coniem fusus, sal-
tem sub cutem diffundens, & dolores excitans partemque
labelactans: Quod consilium est Hippocr. 2. de mor-
bis, dum loquitur de fluxione muliebri ab humore nitro-
sitate & acibus ac nitrosis: Si ea quæ effluunt bilis
sunt: & lullago, & non solum internas partes, sed
& externas partes exulcerent, dictam transmutabis
& humectabis de fluxione: quam aquosissimam fiant,
& minime mordax, balneis multis calidis ureis
&c. Et *aitur* in fluxionibus & congestionibus humo-
rum acutum & mordacem nitur epistemicis, id est
ita quæ assilantur circumstantia, aut applicata vim ha-
bent mitigandi & moderandi humoris & ejus impe-
tum sistendi: Atque hæc omnia ad unguem tenenda
sunt, ne temere, quod alias magno ægrotum incom-
modo salutarium videmus, quietes quis de defluxio-
nibus conqueat, ad hidrotica recurramus, præ-
sentem valentia, ut est lignum indicum; nam ejus
usus sepe tam augens intemperiem quæ tam prava-
rum fluxionum auctor existit: Et ut concedam ebi-
citis sudoribus adjumentum aliquid afferri, plus tamen
incommodi causum augendo intemperiem omnium
malorum auctorem: Si simplex esset & absoluta humi-
ditas, quæque solum sua quantitate molesta foret, dif-
fusione ejusmodi humoris sanitas compararetur.

De tumendis cruribus ferro candente Hippocratis lo-
cus est præclarus lib. de loc. in hom. ubi de fluxione
quæ retrosum fit, Cum retro in carum iuxta vestigia
fluxus illapsum hydropem fuerit, sic malebunt, Caro in talis
inter venas crassa utatur, cicatrice quam transverse inde-
cantur, & quædamvisissimum utatur. Hoc autem fit ut
hiant emillia, per quæ educatur seram nitrosam
quod perreptando corpus totum, & sic sensum inle-
mando dolores intolerabiles facit, imo & ma-
ciem toti corpori concitat.

Balnea ista.

OBSERVATIO LI.

Dorsi dolor à mole pingui mesenterii principio adherente.

Virgini à casu tumor in lienis regione succrevit: accessit præter appetitum prostra-
tum & virium imbecillitatem, circa Dorsi medium dolor. Reperta pinguis quædam
moles in sinistro præcipue latere latrans & inextinctis incubans, xl. lb. pondo æquans:
Circa mesenterii principium alia quædam pinguis portio, hinc ille in dorso dolor. *Vide*
lib. 3. tit. de Hypochond. tumore.

OBSERVATIO LII.

Dorsi dolor pungitivus à trunco aortæ descendente offeso in regione diaphragmatis.

NOb. juvenis pugnacissimus diu de ardore cordis & Dolore quodam pungitivo ad
Dorsi spinam conquereretur, præcipue à leviori aliqua commotione: Illi truncus
aortæ descendens, circa septum transversum, ad minimi digiti longitudinem, totus
offensus erat, Cor autem pilosum. *Vide lib. 4. in miscellaneis.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI SECVNDI.

SECTIO V.

De Sputo Sanguinis.

OBSERVATIO I.

Hæmoptysis à Pulmonibus Sanguine nigro, liquido, cum sanie refertis.



HUIC LUSTRA. Comes sanguinem tussiendo expuerat : Dissecto corpore, ut an recte de abscessu sentissem iudicium fieret, Inventi sunt pulmones sanguine niger-rimo, liquido, cum aliqua sanie, citra propriam suppurationem redundantes. Hier. Cardanus Art. Curat. p. 294.

SCHOLIA.

CIRCA Hæmoptœm considerare oportet primum, è quibus vas, & quali eorundem affectione sangui eruptat, secundo, in quibus locis sæpissime deponatur: tertio, quot modis, ut per os excernatur, sursum duci aut ejici soleat.

Quoad primum, ex circulationis lege supponendum eire sanguinem, sponte erumpentem, omnino ex arteriis prodire: nam venæ, donec integræ manent, eum veritas cor reducunt, ac minime effundunt: quamvis inficiat non exant illas interdum à vulnere, casu, contusione, aliisque accidente violento, quod unitate solutas, sanguinem extra sinus suos dimittere: Verumtamen sæpissime sanguis, Hæmoptœm faciens, ab arteriarum oculis, reteratis aut dilapso procedit, & tunc in culpa esse solet, aut ipsius sanguinis dyscrasia, aut vasorum mala conformatio.

Utriusque horum variz sunt differentiæ aut species, quæ item ad sanguinis spumam excitandum diversimode concitantur: Enimvero sanguis quandoque tenuior, simulque acris existens, arteriarum oscula referat aut exedit: quandoque item crassior, & ad coagulandum aptus, cum à venis facis prompte excipitur, extravasatur: Propter hujusmodi sanguinis vitia, scorbutum aut febre pestilente laborantes, etiam qui venena quædam biberunt, frequenter in hæmoptœm cadunt: Nec minus ex vasorum culpa hic affectus exoriri solet, quarens nimium illa, vel tenebra nimis, vel gracilia, nonnunquam à motu violentiore, qui à ralla, vociferatione, saltu, aliisque exercitio vehementi dirumpuntur: vel in quantum ea laxa nimis & humida, quoad oscula sua dehiscunt, & sanguinem è circuitu erumpere sinunt: porro interdum quærens venæ à frigore contrahitur & contragatur cruorem non prompte trajiciunt, ille restagnans arteriolas distendit, & ex earum oculis erumpit.

Circa arterias, è quibus sanguis Hæmoptœm faciens erumpit, multum interest cuiusmodi illæ, ac ubinam loci consistat facies, præterquam enim quod spuri cruenti differentiæ insignes oriatur, juxta quod cruor vase percelli, aut magno, ac alterati, aut in pulmonis summmitate prope laryngem, aut in regione ejus media inter vasorum ramos majores, aut denique in

extrema inter vesiculas oibolares, consilio crumpi, insuper advertimus arterias sanguinem expuere solitas, vel ex earum numero esse, quæ è stipe pulmonari orlunde trachæ ramos ubique comitantur: vel quasdam ex illis esse, quæ originem suam aortæ debentes, nachez tunicam densa ramificatione obducant.

Quippe manifesto liquet ex harum, uti & glandularum, oculis humorem unguosum ad trachæ superficiem interioiem lubricandum exudare: porro quatenus ex illdem humor serofus alarim in asperæ arteriæ cavitatem destillat, catarrhum exoriri: Quapropter minime dubitamus asserere, etiam ex harum oculis reteratis, merum cruorem in ductus tracheales quandoque exudantem, in peresigua licet quæntitiæ, spumam cruentam parere: observavi plures sine tussi, aut pulmonum indispotione quavis, semel aut bis in die, spumam nram, forsan & alterum cruentam excrevisse quod quoties inguit, patientes in imo putare, aut summmitate pectus, quandam quasi destillationem percipiunt: inde statim merta libetum tracheallum contractione, sive motu velut cochleari, parum sanguinis fluidi, pumita permixti, ac minime spumosi expulsiunt, Cumque interdum per plures mentes talis affectio perdurasset, exinde nihil incommodi, aut quod phibitum inferret, aut minaretur, insequentum est, quod minime fieret si quædam ex vasu pulmonicis aperta fuissent.

2. Hæc de vasu Hæmoptoicis, eorumque in spuro cruento affectione diversimoda: Quod ipsi etiam loca in quibus sanguis extravasatus deponitur, hæc præcipue & fere tantum sunt Asperæ arteriæ, ejusque parium caviis interna: Quippe in hanc velut in cloacam, ductum quorundemque cæterorum recrementa quæque, aut superfluitates, per ultimos, qua licet, nature nixus, foras statim amandanda derivantur: Quod si in lobulorum interstitia sanguis extravasatus impingent, vel membrana ultima caudans in thoracis cavitatem decider, hic empyema, & illic sequenter abscessum creat: ut plurimum vero cruor, à circuitu pulmonari deciduus, varias spuri cruenti differentias producit, juxta quod nrdum

luum, vel superius intra laryngis cavatem: vel paulo inferius circa intermedios ductus tracheales, vel denique ulterius intra vesiculas orbiculares nascuntur: Prior affectus solummodo procedit ab aeternae cujusdam, quae tracheae truncum obducit, oticulis repletis; proximis quoadmodum forsitan ab hac causa, saepius tamen ab ipsius arterialis pneumoniacae apertis, aut disrupcia; quae vasa cum majora fuerint, sanguinis quantitatem saepe horrendam profundum, cohaesum expulsi, & totius pectus munitis, simulque ipsius tracheae fibris multum irritatis & valde contractis, copiosa & violenta exsiliu: Sin vero spuri crucenti (sarugo in ultimis vesiculis consistat, sanguis in minore quidem copia, sed cum rursus profunda, saepius iterata & valde molesta rejiciuntur.

3. Arque hinc (quod tertio erat propositum) excretionis & pulmonibus sanguinem differentiae: & multiplices spuri crucenti rixus sive modi innotef-

cunt: Nam cuor in laryngem exadans, post levem in genere inillationem, hucusque hujusmodi cruoris extravasatio in tomis comingeret evigilantibus haemoptiae via concilis statim ore effluit: quareus nimium tracheae fibrae morientes, etiam inter dormiendum constanter, sanguinem recens exillatum jampjam in fauces exitillat: Sin vero & vase majore, circa medios pulmones dehiscente, aut disrupto, sanguis (qui semper spumulosus est) affucim lo datus tracheales erumpat, ille mox tulli conctractis, exinde sursum cum impetu & copia ingenti efficitur, ut videantur affecti cruorem evomere potius quam exitillare: Quod si denique truxor ex valotum pleuribus; quibus vesiculae orbiculares cinguntur, erumpens in cellulas istas deciderit, inde per vices in quantitate minore, nonnulli per nullum profundum & saepius repetitam excretur. *Nullus operis posthumi sibi. ii. cap. 7.*

OBSERVATIO II.

Anatome haemopticae mulieris, cujus pars interna pulmonum pure referta inventa est, Mediastinum plenum sero sanguineo.

VIdua D. N. cum paucis induta vestibus e lecto in fenestram transilisset circa mediam noctem, illico correpta est magna respirandi difficultate, cum tussi, Spurio cruento, febre & faciei rubedine, &c. Aperto cadavere, invenrum est mediastinum plenum sero sanguineo: Praeterea inventa est pulmonis universa substantia referta materia purulenta & gravitate insigni praedita. *Vide tit. de Pectoris dolore.*

S C H O L I A.

Etsi in fenestram transilisset, &c.) Haemopticae causae procastiticae & evidentes multiplices & variae existunt: In priore censu habentur impuimus pulmonum indispotio haereditaria, uti cum ipsi debiles & teneri, cum pectoris angustia, originaliter fuerint: Porro illorum à tussi, emphyemate aut pleuritide praegressis mala affectio, & purulentum obstructio, aut mala conformatio, ad haemopticoe valde disponunt: ac ita porius, si tali disithesti sanguinis accimonia, sive dyscrasia, a mala victus ratione, aere insalubri, aut aliis modis contracta accesserit: Fluxus menstrualis, haemorrhoidalis, aut à natibus effluens suppressio, quovis fere ad spuriatum sanguineum inclinat: Secundoq; inter causas evidentes referri debent, impuimus caloris aut frigoris excessus, quippe cum sanguis supra modum effluat: aut transpiratio ejus per poros cutis impeditur, immaniter exinde turgescens, frequenter & va-

lis pneumonicis erumpit: hinc notavit olim Hippocrates, & etiamum vulgi observatio est, haemopticae saepissime in hyeme flante Bores accideri: Nec minus raro Theriacum usus multis, antea laetis sanis, hoc malum imulic: Quinimo hoc plures à vino, aut aquarum ardentium potu, ab ictu, lapsu, caclamitatione, vomitu, aliisque violenta rotius corporis aut pulmonum agitatione passim contrahunt: Porro venena quaedam, & juxta *Huurnum*, radii Lunares (cujus ratio non facile patet, neque fides constat) hunc Affectum excitare perhibentur. *Nullus l. 4.*

Pulmonis substantia referta materia purulenta.) A praegressa eorum inflammatione, cupis ictibus febris, dyspnos, vultus rubor, insilis: Observatum est, aut *Huurnius*, ex pulmonis phlegmone apertius erodi etiam vasa, maxime si cor ac hepatis incendio incanduerit, sed hoc omnino sanctum est:

OBSERVATIO III.

Sanguinis sputum ab Aneurismate Aortae circa dorsum, & rupturae Cavae.

ANno 1557. Vir Nobil. Leonardus Welferus ex Aneurismate interno obiit: Secto cadavere vena cava maxima reperta est: Ea rupta erat qua parte aneurisma ipsam attrigit: Cor magnum, sanum, plurimo sanguine abundans: In ipsa aorta dilatio non modica, ad palmæ magnitudinem, costis & dorsi vertebrae adnata, qua divulsa dimanavit sanguis tenuis, ruber, qualls esse solet arteriosus: Pulmonum nulla latio, licet zger copiosum sanguinem ante obitum exspuerit. *Vide libro quarto, tit. de Tumoribus p. n.*

Hæmoptysis ab inflammatione Pulmonum & Lateris dependens.

Vir sanguineæ & biliosæ temperationis in febrem assiduam delabitur, ejus cum diuturno rigore fuit initium, tussis, dolore pungente, Sputis cruentis &c. 7. die alba ea visa sunt, qua transacta rursus febris invadit cum rigore & Spultione cruenta nigricante uberrima &c. Mortui xiv. die secto cadavere, pars dextra pulmonum fuit inventa corrupta, nigricans, tanquam sanguis concretus, & ejusdem lateris etiam pleura male affecta. *L. à Fonte consult. 9.*

S C H O L I A.

Spulmones copiosæ & nigricantes ipsorum pulmonum caloris naturalis corruptionem confessam factam non mediocre indicium præ se ferunt: Cujus affectionis causa proxima est biliosi sanguinis ad pulmones defluxio, prava qualitate affecti; Remotiones vero jecoris intemperatio fervidior, mala dispositio

pulmonum & erotes exteriores: Neque aliterandum est, (ut aliter Medicus, quod materis noxia à capite prolaberetur) tam uberi sanguinis corrupti copiam inde prolabi, nam necesse fuisse aliquam gravem affectionem in capite præcessisse, in quo nulla est offensio. *Idem.*

OBSERVATIO V.

Hæmoptysis ob lobum Pulmonis sinistram scirrhosum redditum, trajectionem liberam sanguinis impedientem.

Inignis Theologus &c. *Vide hanc Observationem lib. I. Sect. 21. Observat. 7. illuc errore translatam.*

OBSERVATIO VI.

*Sectio Cadaveris Hæmoptoici. A Clar. Sylvio in Nofocomio Leidensi administrata
1664. Cujus pulmones multum sanguinis nigri & concreti
continebant &c.*

NOV. ij. die ante sex circiter hebdomadas cepit male habere Jacobus de Vala: Tussis correptus est & Sanguinem spuit, maxime lecto decumbens: Conqueritur de difficili respiratione: Quando plus potat magis etiam sanguinem spuit: Urina cruda: Sedimentum pleurosum: heri sensit dolorem circa lumbos, qui adhuc adeo continuat ut erigere corpus non possit: Cum primum incipeter male habere, per totum diem à laboribus incaluerat, noctu vero domum rediens à frigore læsus fuerat, unde primum tussis, quam post duas hebdomadas sanguinis sputum consequutum est: Jam tabescit & debilis sit: pro consolidatione vulneris, quæ promovenda cito, ne in ulcus evadat, utatur sequenti medicamento *℞. aq. plantag. ʒij. sanic. ʒi. acet. stillat. ʒij. sangu. drac. ʒj. laud. opiat. gr. ij. syr. myrtib. ʒi.* assumeret subinde cochlear: Nov. 12. melius in omnibus habet: dolores enim lumbares non sentit & paucum quoque sanguinis dejecit: Perget ulterius eo uti: Nov. 13. heri vespere edit lac dulce, unde noctu summis anxietatibus fuit pressus: Secunda nocturna sensit frigus: forsan paroxysmum febrilem habuit: Tunc vehementissime (durante frigore) sitivit, cerevisiamque frigidam bibit, quam tamen præ nimia linguæ & faucium siccitate non gustare, neque sitim illa extinguere potuit: A frigido sumpto adhuc magis anxius factus, vehementem cordis palpitacionem passus est: Malum hoc, unaque frigus fere per 5. horas duravit. *Die 14.* sitis non tanta fuit, ob usum posterioris mixturæ, (vide infra scholia) Pauciorum sanguinem exspirat: *Die 17.* melius habet: Iteretur mixtura 13. Nov. præscripta: Nov. 19. Hodie hora tertia pomeridiana assidens foco luculento habuit paroxysmum febrilem: Somnolentus tum fuit, sensitque gravitatem per universum corpus: & frigus, simulque tremorem, nec frigus, nec dolorem speciatim sensit in lumbis, sed tantum in ventre circa umbilicum, partibusque extremis inferioribus: duravit circiter per horam, nulliusque calor subsequutus: Multum jam sitit, sumpsit mixturæ aliquid, Non quiescit, semel dejecit: *Die 20.* iterum habuit paroxysmum post prandium: Frigus iterum in abdomine & artubus, sed & in regione lumbari, vehementius quoque fuit hesterno, perque duas horas duravit: Insequutus calor per horam permanens: Valde sitivit, utque sitim levaret comedit integram malum citrium: Nondum alvus hodie suo munere functa *℞. massæ pil. cochiar. ʒj. troch. alband. gr. v.*

refin.

refus. Gial. gr. 4. ol. gargaph. gr. ij. m^o. f. Pil. n. 5. affumer cras summo mane : Iteretur simul mistura 13. Nov. præscripta ; adde *laud. op. gr. 1. Die 21.* pessime habet, doloresque habet in hypochondrio sinistro, Non potest respirare graviterque anhelat : Nullum frigus sentit : A pilulis hodie mane assumptis, à meridie tantum semel sed parum deiecit : *℞. aqu. hyssop. petros. fenic. aa 5i. tinct. cinnam. 3℔. spir. 6 gr. viij. syr. fenic. 3j. m^o.* affumer subinde cochlear. *Die 24. Nov.* valde statim ab usu misturæ ab angustis & anhelationibus, à quibus videbarur suffocari, levatus est : continuabitur usum ejusdem misturæ : *Die 25.* conqueritur de tussi sicca, quæ per biduum illum jam afflixit, unde non quiescit, Item crura tument & quasi distenduntur, Non deiecit ; habet adhuc misturam, Pro Tussi *℞. massa pil. de Cynogl. 3j. f. Pil. n. viij.* sumat æger subinde unam : *Die 26.* Ante octo annos erysipelate laboravit in utraque tibia, à qua quidem nullam huc usque amplius molestiam sentit, rubor tamen permansit : Occupaverat rubor ille pedem quoque, sed ille colorem & cutim muravit : Nunc iterum pes dolet, supracae & infra ruborem illum pedes valde tument & splendidi fiunt : Non dolores tantos in pectore expertus est minusque tussivit, commodius quoque quiescit : continuabit in usu misturæ & pilul. de cynogl. Pro Erysipelate *℞. ag. plantag. sumar. aa 3iv. acet. sambuc. spir. vini vulg. aa 3ij. m^o.* lintea liquore illo repido madefacta circumponet pedibus & loco affecto. *Die 27.* heri vespere lac dulce comedit, & hodie mane, à quo & noctu & hodie pessime habuit : Non deiecit, unde abdomen valde tenditur ; Rubor ille pedum sensum minuit & in livorem abir ; Perget uti medicamenti præscripti : *Die 28. Novembr.* iterum pessime habet, difficulter respirat & graviter anhelat, imprimis si incurvet corpus, tum videntur ipsi partes interiores quasi infringi : Ter deiecit crassa excrementa cum torminibus in parte superiore abdominis : sanguinem rursus excrevit, hodie octies, sed parum singulis vicibus : Abdomen jam non distentum neque status emittit : Conqueritur se jam nihil commodi à mistura sentire : Iteretur mistura 21. d. præscripta, adde sangu. draconis 36. Obiit.

In Cadavere ejus dissecto 2. Dec. Liquor tenuis & serosus repebar in corporis habitu sub cure inter musculos & pinguedinem, unde ipsa pinguedo mollior & laxior erat : Omentum non tegebar inrestina, sed ad latera descebat : Intestinum crassum inflexum infra umbilicum erat : Color Intestinorum carneus & solito rubicundior : Inrestina crassa flatibus turgebant, tenuia non item : Tenuium tamen vascula turgebant, *quod fieri solet à doloribus* : Aqua in abdominis cavitate continebatur subflava & subsalsa ; initium nempe hydrops ; cui aliqua purulenta materia juncta erat : *Secinoræ* color subpallidus, *qui color fere ab aqua præsentibus* provenit : *Folliculus fellis* externe instar membranæ albicabat, nihilque omnino fellis continere ob ténuitatem videbarur : *Lien* satis grandis, & parti postica & vicinis annexus : color ejus pallidior justo, substantia firmior erat : *Pancreas* substantia satis elegans : Ductus illius magnus : Immissus in ductum liquor variis in locis pancreas non tingebat ; *Ex Thoracis* cavitate aqua copiosa valde effluat, clara, limpida, nec tam salsa quam quæ in abdomine erat : *Pulmones* costis annexi, imprimis sinister : Aqua illa ex dextro pectore promanabat : In sinistro pectore aliqua quidem aqua, sed pauca conspicienda erat : Color Pulmonum solito erat obscurior, lividior, substantia firmior & à flatibus distenta, Multum sanguinis in ipsa Pulmonum substantia hærebat interiore, qui nigricans & coagulatus illam distendebat, occurrentibus passim particulis durioribus, quæ sensim in apostemâ abire solent : *Die 3. Dec.* aperto capite cerebrum vidimus copiosum ac firmum, quod Cl. Sylvius post meridiem accuratissime demonstravit : *Die 4. Dec.* Cum absente Cl. Sylvio, ipsius permisso ulterius scrutaremur cadaver, deprehendimus in utroque cordis ventriculo materiam crassam, fibrosam, quasi carneam, Polypum vulgo dicunt, quæ in omnia vasa extendebatur in cor exeuntia : præcipue vero ex jugulari sinistra eduximus tres spiritus longitudine superantem : Erat autem illa materia in ipsis cordis ventriculis crassitie insigni, cui multum grumosi sanguinis adhærebat, annexa cordis carnis fibris, easque suis fibrillis amplectens : In medio continebat sanguinem grumofum, videbaturque minuscula vasa habere : In aspera arteria aperta materiam spumofam, puitosam, cumque paucio sanguine mixtam, qualem vivens sæpe excrevit : Humorem in pericardio copiosum, similem illi qui in abdomine repertus fuerat : In folliculo fellis bilem & substantia & colore vere vitellinam, paucissimam, eandemque aperto per incisionem variam ipso hepatis parenchymate, in plurimis ductus Hepatici ramis hærentem vidimus : *Renū* sinistri pelvis erat magna, extra ipsum renem propendens, ureter naturali longe amplior : Facta incisione in tibia Erysipelate affecta, vidimus substratam carnem integram, cute tantum læsa, à qua cuticula facillime separabatur : *Matthias Paisenius in miscell. cur. ann. 4. & 5. observ. 193.*

S C H O L I A.

Durante frigore sive &c.] Durante frigore paroxysmum facit; præstat ergo si tunc in membris sicis urgeat, scilicet fallere & subinde cochlear liquoris aliquis, in quo parva quantitate lapidis prunellæ solutus sit, capere, sed parce. Ubi ergo tales anxietates obveniunt, utatur subinde sequenti medica-

mento, *℞. aq. petros. fœnic. aa. ʒi. theriac. simpl. ʒss. lap. prunell. ʒj. syr. fœnic. ʒi. capiet subinde cochlear.*

Fructus color suppalidus] Qui color fere ab aquis præsentibus provenit, *syntu.*

OBSERVATIO VII.

Sanguinis spatum à Pulmone sphacelo infecto manans.

Cum tussi sanguinem excerni, modo pulchrè rubentem, aliàs pituitæ, puri aut sputo permixtum haud infrequens est: Nigrum verò atque spumofum ejici, ut concretis & undequaque porosus spongiam aut pumicem referte videatur, rarissimum, hujusmodi autem à nonnullis cum tussi rejectum, non ex vase aliquo rupto, huc ex pulmonis ulcere, sed ab ipsa pulmonis substantia ac parenchymate profusum suspicari fuimus, nec fecellit nos conjectura: Nam pictoris cujusdam, qui cum valida tussi hujusmodi sanguinem rejecerat, pulmonis pars quædam nigricans repetta sphacelo correpta, in qua magnus & profundus sinus, nulla interim sanie, nullo pure vel hanc vel reliquam partem occupante: atque ex hoc sinu sanguis corruptus, nigricans, atque cum eo siderata parenchymatis pars cum tussi rejecta: Similem & Ichthyopola quidam sanguinem expuit, cujus & pulmo eodem modo affectus fuit. Cerevisiæ coctor ejusmodi sanguinem cum valida tussi ter reddidit: in hujus autem Pulmone, plurima parte nigro, tres patuerunt sinus: Semper autem talem affectum incurabilem judicavimus, vitam tamen produci ad aliquod tempus posse, bona beneque instituta victus ratione, haud alicuium est: Pictor plusquam mensem supervixit: Cerevisiæ coctor bis evaserat, sed & in tertia expuitione subito perit, veluti & Ichthyopola qui & in sanguinis spato defecit. *Dodoniæ observ. medic. cap. 24.*

S C H O L I A.

De hujusmodi sanguinis spato sensisse videtur Hippocr. aph. 13. ʒ. Quicunque, aut, spumofum sanguinem expuere, is est Pulmone sit eductio: Nam qui ex vase disrupso, aut ulcere profundius, haudquaquam spumofus apparet: facit ipse Galenus in comm. scripsit se vidisse sanguinem plurimum bene coloratum exspui, quem, aut, ratio docet ex aliquo Pulmonis vase prodire, sed hunc spumofum fuisse non addit: Spumofus sanguis, veluti Hippocrateres, *ἀπὸ τῆς σπῆς*, naturam ac figuram ejus retinet unde abiecit, Pulmonis substantia laxa & porosa est, talis & sanguinis quem cum tussi profusum scriptissimus, cui parenchymatis partem conjunctam & commixtam fuisse facis apparet. *Mem.*

Talem affectum incurabilem] Hunc morbum semper curatu difficilem existere, communis observatio est: Cujus item ratio liquida patet, in quantum scilicet pulmonum munus in motu perpetuo consistens, continui soluti therapie, ad quam imprimis sedatio & quies requiruntur, omnino contrarium est: Cui etiam medelle impedimentum hoc majus secedit, quod moles pulmonaria non (ut prius abacur) parenchyma est, sed vasorum innumerabilem textura, sive tela admodum subtilis, cujus unitas si quando solvatur, impossibile propterea erit vasculorum disjunctionem fines rursus eire, aut spatium, uti in aliis partibus, eam aut callo adimpleri: At vero unicuique hoc superest, ut dum vasorum extremitates incongrue semper & imperfecte coalescant, sanguinis evulsio in parte affecta cessans, per aliam vicinam suppleatur; quod quidem raro sine totius pulmonis noxa aut incommodo succedit. *Idem l. c.*

Cum tussi sanguinem excerni &c.] Contradictio in adjecto esse apparet. Dysentia & Pleuritis in-

dolens: Hemoptysis sine tussi, utamen revera dari interdum talia observare novum non est illis qui praxin sollicitè exerceant: Anno 1669. fœmina 54. annor. hic loci Hemoptysin patiebatur, *ἀπὸ τῆς* excremens sanguinem spumofum & floridum, sine dolore, eam respirationem aliquo modo difficilem, sed, quod singulare est, semper abique Tussi: Eodem anno decensuam ætatem modo aliquoties excrevit sanguinem ad aliquot uncias, curata tunc à Medicis ordinatis, qui nullo hoc affectu mori vix credere sustinerunt, posse abique tussi & pulmone ita sanguinem mitteri, donec *ἀπὸ τῆς* si sequeretur eos convinct: curata à me est binis m. di. amentis & semine hyoscyami eum lap. Cancr. aliisque resolventibus & adstringentibus mixto: 1°. Tinctura catechu ad 60. guttas pro dozi propinata. Eodem anno vidua 48. ann. veniebat consilium petitura, eumque quid pareretur ex ea quærerem, loco responsi floridum excrebaret per os sanguinem & spumofum sine Tussi, sentiebat cum impetu quasi sanguinem urgere calum & ascendere: Curabatur Tinctura aniphratica Michaelis, Opulais aliisque, semper interpositis illis quæ sanguinem coagulatum solvunt: Circa eurationem enim methodicam hujus morbi, notandum est eas tunc Pergamenti 4. m. m. & 7. de comp. m. 47. 177. scil. sanguinem expucentibus quæ adhibentur medicamentis, miscenda esse tam calida, cum tenuium partium existentia, ut medicamenta adstringentia distribui melius possint, hinc v. g. mel admiendum monet: Invenit vultu, non adhibenda esse pro sistenda hac excretionem retentis crassioris substantiæ medicamenta quæ solum conspiciant, anæstetiam præcordiorum & respirationem difficilem patiunt, sed quæ simul liberum actui relinquant motum, & quæ simul sanguinem effervescentem refrenent: Deinde illud maxime observandum, ut

vel miscerentur, vel interponantur provide sanguinem coagulatum dissolverent, ne ex irremediabili & solo altiusgenitum usu sanguis resinetur, putrescat, & in ulcus phibiticum degeneret hæmoptysis, quo de conqueritur Rondelerius m. cur. mor. bus: Ad observationem superiorem addi potest distinctio: hæmoptysis duplici contingit modo, vel à *spasmo æstivo*, (simul & serotino), unica irruptione, ex sanguine & quasi effervescente sanguine, ubi læpe ad uncias aliquot

vel libram excerni potest. Et in hac specie ratio observatur Tussis, tanta enim non adest irritatio, sed sanguis lubricus sibi ipsi viam, per superius gustatæ sedana exitum: vel excernitur & quasi exassatur pedetentim ab erosio in pulmone valis, & ob salinas particulas tenaces Pulmonum Vesiculas stimulat, & inde irritatione facta Tussim producit eventant.

G. W. Allgong W. edels in misch. curis. cum 1671. observ. 43.

OBSERVATIO VIII.

Hæmoptysis ab aneurismate in Pectore, aperto per exsectionem.

Joh. Pauli homo ebriosus, circa 50. ætatis annum In aneurisma incurabile incidit: Anno 1640. circa Autumnum, cum supra modum inebriatus fuisset, postridie anxietate quadam pectoris correptus fuit, quam primo negligebat consueto more vivens: Circa initium sequentis anni, Tumor cum valida pulsatione, circa claviculæ sinistræ & sterni conjunctionem subortus est, qui ab omnibus judicatum est aneurisma insanabile, eo quod ab internis initium sumpserat: Medicina ea tantum adhibita fuit quæ sanguinis calorem mitigaret, & quantum possibile tumoris augmentum prohiberet: Sed omnia frustra, nam tumor in tantum increvit, ut exterius pugni magnitudinem multum superaret, & interius respiratori non leve impedimentum afferret: 12. Novembr. circa vespertam, per tussim incipit rejicere grumos nigri & concreti sanguinis, unde tumor multum imminutus fuit: Sed cum continua ea esset sanguinis excretio, summo mane vitam finit.

Cadavere aperto, in Thorace statim sese conspectui dedit dilatata aorta arteria descendens, cujus paulo supra divaricationem tanta erat amplitudo, ut duas libras sanguinis & ultra capere posset adeoque ille tumor ad latus asperæ arteriæ increverat antrorsum, ut cuti proxima esset ipsa arteria: Sed ea ipsa in loco sub aspera arteria exesa esse videbatur; simul & postica pars asperæ arteriæ, unde suprema ipsi nocte ea sanguinis evacuatio: Quæ tamen non confertim processit, uti plerumque in ruptione aneurismatis fieri consuevit: Ideoque videntur verisimile ob summam ægri debilitatem, sanguinem in tumore contentum refrigeratum atque concretum fuisse. *Osio Henricus observat. 27.*

OBSERVATIO IX.

Hæmoptysis à percussione Pectoris & contusione interna.

Rusticum Eques quidam ebrius in campo adortus, in thorace sclopeto petcussit, & in terram dejectum equo calcavit; unde dolorem protinus in latere sentiens, sanguinemque excrevit, post septimanas aliquot expiravit. Judice criminali Medicorum iudicium, an ab hac vi illata mortuus sit, inquirenti? Corpore aperto, internisquæ diligenter inspectis atque examinatis, talis ab illis sententia lata est.

Cum prius ante hunc casum minime ægrotaret, sed tunc primum cum læsus fuit, dolorem vehementem & perseverantem in illo latere senserit, sanguinemque expuerit; atque post apertionem pectoris intrinsecus conrusionis signa eo in loco apparuerint, sine dubio percussione illam atque idem ex calce equi, mortis causam fuisse. *F. Platerum obs. p. m. 785.*

OBSERVATIO X.

Anatome Hæmoptoici, cujus Pulmones summa parte obsidebat tuberculum crudum, è quo acris materia prodibat eos erodens.

DChrif. Hallerus, homo proceræ staturæ, ætatis 45. cholericus, laborabat destillatione tenui, aliquando salsa ad pectus & ad fauces, ita ut cum fluxus ille inciperet; aliquando per os ad pondus dimidix libræ effluebat, tandem incidit in spurum sanguinis copiosum cum tussi: Habebat etiam à multis annis Tuberculum circa furculam, in latere dextro pectoris, quod aliquando crescebat, aliquando decresebat, & mutabat interdum colorem: interdum enim album, interdum rubrum apparebat: Tandem tussiens in momento aperta denuo vena, vel potius rupta, in momento suffocatus est:

Secto ejus corpore, invenimus tuberculum crudum spongiz haud dissimile, adnatum pulmomi circa furculam, in latere dextro, quod ex materia tam acris erat natum, ut fere adiacentis costæ mediam partem consumpserat, omnis etiam sanguis redibat in pulmone collectus, cum cæteræ partes viderentur exangues. *Ex Joh. Hesi observ.*

OBSERVATIO XI.

Hæmoptoici dexter Pulmo tumidus à sanguine illic subsistente repertus.

Post sanguinis sputum in omnibus corpore, ad duarum librarum mensuram, ingens in dextro Pulmone sensus ponderis aliquot septimanarum decursu animadvertitur: rejecta materia flava, crassa, viscida, tenax, frustillatim tenui aquæ copiosæ innatans: Adaperto iterum vasculo hæmoptysis urgebat: Ea sine negotio sedata, continuabat excretio priori similis: Aderant indicia Hæmicæ non levis, putridæ intermixta, & Dyspnœa, dextro potissimum in latere: Sanguis nullus excrebatur, sed alba solum, tenax, viscida materia, viribus exhaustis anni quadrante elapso, suffocatus abibat ad plures:

Aperto thorace, dexter pulmo tumidus, adeo ut totam illam impleteret cavitatem: Inefflo Pulmone, in circumferentia sanguis spumofus crassus effluebat: Incisis & divisis bronchiis, alba ut materia fere tota referta erant, Ita illa effluebat puris speciem præ se ferens planissimam, qualem multis ante septimanis eiecerat: quam si extulsisse potuisset, nondum vitæ terminus adpropinquasset.

Alius Hæmoptysi correptus, & ab ea sine negotio liberatus, statim gravitatem pectoris sensit, & tensionem in brachio dextro, circa axillas molestam: Aliquoties sputo sanguinis suppresso, de eadem gravitate conquerebatur: Tandem illa gravitate pectoris vires sumente, dyspnœa febrique hæctica superveniente, suffocatus ultimum mundo valedixit: Nullum dubium si cadaver apertum fuisset, eundem deprehensum fuisse statum. *Rosinckius Dissertat. Anat. lib. I. cap. 13.*

S C H O L I A.

Dexter Pulmo tumidus] Dubium est an omnis sanguis per dictas anatomicas *vasa habita ad observ. 1.* transeat, an non etiam multi vasculorum sanguiferorum sinces desint in ipsam Pulmonum substantiam, in eaque s. teriole sanguinem effundant, venulæ vero ex ea rursus exoriantur, sicut sanguinis circulationem in plexu que aliis partibus fieri distinximus: Rem ita se habere videmus doctere rationes citatis locis allataz, Sed in pulmone repognat anopsia, qua ipsam parenchyma fere penitus exangue apparet, nec unquam quicquam cunctis ciliis diguonem in eius substantia reperiunt (et si horæ spacio sanguinis efflu vel novem libris transmittit) secus atque contingit in hepate, musculis aliisque partibus, multum sanguinis transmittentibus, in quibus copiosus sanguis extra vasa reperitur: Præterea iste sanguis extra vasa in vesiculorum substantiam effusus, partem vesiculas aciri recipiendo destinatas replet, sicque respirationi plurimum obest, partem Hæmoptyses hecquissimas pariet, quæ tamen valde rara sunt, & manifestissime contingunt cum ruptis aut erosis vasis sanguis in vesiculosam substantiam & bronchia profunditur, nec unquam sine huiusmodi valorum operatione evenire visæ sunt:

Fortè aliquibus mirum videbitur quod parenchymatis substantiam extinguam esse, h. e. sanguinem notabili quantitate in eo non conspicui, dicam, cum tamen sanguine, sicut aliæ partes, nutriatur: cum etiam Hippoc. 5. aph. 13. scribit, *Qui spiritum sanguinem extrahant, in eo pulmone eduntur*, cum denique

in suffocatis multum sanguinis in pulmonibus sepe reperitur: Respondeo ad 1. Nutrii pulmonem sanguine sicut arteriæ, venæ & nervi, qui ea transmittunt sanguine & spiritibus alimunt quod sibi conveniens est nutrimentum, atque etiam per invisibiles vias & arteriolas tantum recipient quantum ipsis necessarium est, sicut de nervis docuimus: Ad hæc, pulmonem etiam, & quidem præcipue nutrii eo sanguine qui per arteriam bronchiale, à *Dr. Ray.* repetitur, advehitur: Præterea distinguendum esse inter sanguinem paucissimum, quo non ita pulmonis perficitur, & copiosissimum qui toti corpori inservit, illud per invisibiles vias ad vesiculosam substantiam posse infundi, & viâ uspiam conspicui hinc vero, propter singularem copiam, nonnulli per manifestum conspectum transire, & Anatomicos, cum de utroque sanguinis per pulmones loquantur, de hoc, non vero de illo intelligendos esse: Ad 2. regeto Hipp. citato aphor. loqui de pulmone in genere, quatenus ex propria substantia, vasis & membranis constituitur, non vero speciatim de solius parenchymatis propria substantia: neque sic, cum dicit sanguinem è pulmone educi, illam intelligere istum sanguinem, non ea propria substantia, sed ex erosis vel ruptis aliquibus vasis sanguiferis, per substantiam decurrentibus erumpere: Ad 3. dico, qui in suffocatorum pulmonibus reperitur sanguis, cum non ex propria substantia, sed è vasis, propter impediendum circularem transitum ruptis effluisse in venulas. *Drembark. Anatom. lib. 2. cap. 12.*

OBSERVATIO XII.

Hæmoptysis à fluxione acris, trachea partem cum Pulmonibus erodente & Levem arteriam.

Lobum pulmonis sinistram cuiusdam erodebat ulcus, è rufis inveterata & fluxione salina Hæmoptysin inducente oriundum; quod levis arteriæ divaricationem lobo infertam una pereferat: Dissecto cadavere tracheæ pars terosa, cui cicatrix indurata fuerat varicosa: iobo vero pars adnata callosa conspiciebatur. *Bennetius Theatri Tabid. p. 95.*

OBSERVATIO XIII.

Exspuitio cruenta Vomica in Pulmone disruptionem fere præcedit.

Non pauci subito è vivis erepti sunt, in quibus non alia mortis causa comparuit quam repentina Vomica: disruptio in Pulmonibus: Omnibus sic affectis, multo tempore antequam vomica rumpetur, cruenta excreatio præcessit è Pulmonibus, eaque cum tussi &c. *Fernelius Pathol. l. 5. cap. 10.*

OBSERVATIO XIV.

Anatome Hæmoptoici, qui Phthisicus interit.

Henricus N. Phthisicus obiit: In dextro thoracis latere, ubi majorem dolorem senserat, inventa sunt fragmenta bronchiorum à substantia Pulmonum avulsa, cum sanie copiosa: Laboraretur longo tempore antea sputo sanguinis, unde hujus miserandi mali principium. Bronchiorum fragmenta & saniem copiosam, dum viveret, in magnâ quantitate ejicere consueverat. *Vide tit. de Phthisi.*

S C H O L I A.

Sputo sanguinè, sanum copiosum, phthisicus obiit:] Ex Tabes. *Aphor. 15. & 16. sect. 7.*
Sanguinis sputo puris sputum: Ex putis sputo,

OBSERVATIO XV.

Exspuitio cruenta, nigricans, ab inflammatione pulmonis dextri, cum pleura affectione.

Vir Illustr. febre affectus cum tussi, dyspnœa, dolore levi ad medium thoracem, cruenta exspuit nigra, uberrima. PARS dextra Pulmonum fuit inventa corrupta, nigricans: Ejusdem lateris pleura male affecta. *Vide tit. de lateris dolore.*

OBSERVATIO XVI.

Sanguinis & puris sputum sine Pulmonum offensa aliquando contingit.

Exspunt non semel statis temporibus quidam cum pure sanguinem, nec tamen Phthisici sunt, nec ulcus ullum in Pulmonibus habent: Hujus census tres novit Sala, quorum duo exspuerunt statis vicibus pus & sanguinem sine pulmonis ulcere, quippe sanati sunt & bene valuerunt, tertius adhuc vivit sanus: nam ex rupto abscessu inter thoracem per Pulmones quidem expurgata est materia, sed sine ejus læsione; quod in cadaveribus duorum dissectis eidem apparuit: Adest quidem in hujusmodi impedita respiratio, febrisque lenta, sed absterio pure & exsiccatio ista signa disparent. *Bartholinus cent. 4. hystor. 17.*

S C H O L I A.

Exspunt non semel] Hæmoptysis afflicti: Suis facis frequens, & mirum quod non frequentior existit: Cum enim conceptacula sanguinis, seu Pulmonum vasa, varie diducantur: & implicentur, ab æstivante in illis sanguine rapidiori; motu concitato, via fieri potest, quin per illas ambages & perplexos meatus non difficillime fiat com meatu, hincq; vasorum disruptio: ni sit aperiendi occasio præbeatur: In viventibus sanguinis exitum impediuntis vasculi interturbati coagulare est, quia in mortuis liquores injecti ægre meant & ubique fere cæspitant.

Sine Pulmonis ulcere] Vide Scholia ad observ. 1.

OBSERVATIO XVII.

Hæmoptysis ob Pulmones putres, corruptos, ulceratos.

§. 1. **D**ominus N. quæ phthisica obiit, cœpit de repente sanguinem exspuere & de pectore educere: Dissecto cadavere, inventi sunt pulmones putres cum ulceribus variis. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 2. Binos secui dyspnœa affectos: Uterque sanguinem cum paucis pure & frustulis Pulmonum exspuit: In utroque dexter Pulmo interius prorsus corruptus est. *Vide tit. de Dyspnœa.*

OBSERVATIO XVIII.

Hæmoptysis à Pulmonibus induratis, nigricantibus.

Nobilis N. cum febre incidit in pectoris angustiam, sequente sputo cruento: Cadavere aperto, in pectoris cavitate serum sanguineum copiosum aderat: Pulmones sanguine crassiore scatebant externis eorum partibus induratis. *Vide tit. de Febribus lib. 4.*

S C H O L I A.

E *Xrenis parvis induratis*] Ideo male petactis in patres refluas, male regunt. *Vide Scholia ad observat. 1.*
 locis sanguinis circuitu, hic ad alius pulis o mm

OBSERVATIO XIX.

Hæmoptysis ab acri cruore quo cor infarctum repertum est.

Illustr. Vir juvenis præviis cordis palpitacionibus, in nonnullas sanguinis sputaciones, & denique in syncopen lethalem incidit: Quid autem venarum anastomosis causavit quam hujusmodi producta ex viciata cordis digestionem obnata, vim cortosivam habentia, instar salium corrosivorum, ad quorum tyrannicam vim obrundendam archæus cordis cruorem copiosorem allaciebat: hinc grandius redditum, & cruore infarctum secto cadavere in conspectum venit. *Vide tit. de cordis palpitacione.*

OBSERVATIO XX.

Sputum sanguinis nigri à pulmonibus & cordis ventriculis eo refertis.

Dom. N. de Palpitacione cordis conquestus, cum dyspnœa, tandem per sputum excrevit sanguinem nigerrimum, crassum & conglomeratum, cum tussi molesta, unde respiratio facta levior; sed eo sputo plurimum aucto interlit: In eo inventus fuit cordis ventriculus uterque sanguine concreto distentus: Pulmo etiam totus sanguine multo refertus visus est. *Vide tit. de palpitacione cordis.*

OBSERVATIO XXI.

Hæmoptysis à cordis ulcere orta.

Die 3. Januar. 1634. vocatus sum ad filiam D. N. annos 14. natam, quæ antea per multos dies laboraverat vomitu pituitoso semel aut bis in die invadente, horis præcipue matutinis, cum cardialgia per intervalla affligente: Item patiebatur dolorem in summa scapula sinistra & summitate brachii qua humero committitur; Nocte insequente, quæ erat quinta à prima invasione, correpta est alvi fluxus & febre quæ tota die eam detinuerunt. 6. Sumpsit rheum pulveris. 3i. cum jusculo, & pluries deiecit, febris perseverat, nocte bis tantum deiecit, per duas horas dormivit: 7. alvi fluxus perseverat, sed minus frequens, ut locum dederit vixæ sectioni, qua missus fuit sanguis ad 3iv.: Hæc duo peculiariter à febris invasione notavimus, quod Pulsus sere semper erat intermittens, Et cum dolor prædictus in eadem parte fixus permaneret, neque ad thoracem ullo modo pertingeret, ægra tamen non poterat in illud latus, quod erat sinistrum, decumbere, quin statim cardialgia & tussi corripereetur; ita ut perpetuo super latus dextrum decumbere cogeretur: Tussis sicca eam infestabat per intervalla; status emittebat interdum supernè & inferne: 8. Eadem symptomata perseverant, præcipue cardialgia per intervalla recurrens, & pulsus intermittens inæqualiter: Somnus paucus: continuabantur cardiaca, sumpta & admota, tum vermes enecantia ac ventriculum roborantia: Urgente admodum cardialgia, exhibitus est Salis absynethii 3j. cum succi limon. cochleari, unde optime habuit per horas aliquot, sed symptomata redierunt, noctu urinæ erant crassæ & satis pallidæ. 9. Admorum fuit vesicans cervici, quo rursus cessavit: antea dolor humeri imminutus fuerat, & supra latus sinistrum melius decumbebat: Eadem die sumpsit medicamentum ex infusione 3i. Rheum cum hieræ picæ 3i. & syrup. de cichor. comp. 5j. quo valde purgata est cum fructu, & alvi fluxus perseveravit per aliquot dies, unde prorsus convalescere visa est, cum tamen pulsus continuo intermitteret in 3. 4. vel 5. pulsatione: Postquam à lecto surrexit, intermittens pulsus deiecit, manente tamen frequentia & ægra tussi premebatur, noctu præcipue cum difficultate spirandi: Quæ symptomata per longum tempus perseverarunt, ac præter difficultatem spirandi aderat per intervalla dolor lateris pungens, qui magis urgebat cum ægra in latus sanum decumberet, & contra gravior erat difficultas spirandi quando supra latus dolens decumbebat: febris perpetuo erat intensa, quæ omnia magnam suspicionem faciebant abscessum in sinistra pulmonis parte latentis. Tandem die 34. morbi subito correpta est *Sanguinis Sputo*, quem per tussim excrevit ad 3viii. circa meridiem; is autem sanguis erat satis crassus & non spumofus, quem ægra ipsa dicebat à capite descendisse: sequæ ante illius exclusionem, in faucibus percepisse titillationem, tum aliquid ejus mungendo per nares eductum fuerat: Attamen vespertinis horis sanguinis sputo redeunte, satis apparuit eum à pulmone ferri, erat enim totus spumofus, ejusque quantitas fuit ad lbj. Tum missus

missus fuit de basilica sinistra, exhibitus julepuse & aqua plantaginis & papav. rhoead. cum sale prunellæ & syrupo de rosâ siccis : utebatur tota nocte syrups violaceo, de rosâ siccis & de papavere simul mixtis, quibus Tussis sedabatur, excretionis reditus impediabatur & per intervalla dormiebat : Postridie mane iterata fuit s. m. ex brachio dextro, iteratus julepus, & multa alia remedia in hæmoptysi usitata, præscripta fuere in communi consilio habito cum D. D. Ranchino & de Lort : Sputum sanguinis rediit ad Æviij. circa horam 11. ante meridiem, continuabantur remedia & V. S. malleoli usurpara : Hora 4. vespertina redeunte sputo sanguinis copioso subito extincta est.

Dissecto cadavere, inventus est Pulmo colore albicante, costis undique & diaphragmati adhærens, tum etiam pericardio undique adhærebat, ut unum corpus continuum efficeret : Cor vero albicans visum est, & media sui parte scire, qua diaphragma respicit, exesum atque exulceratum, ut fibræ carnosæ semiputridæ fummis digitis avellerentur : Et animadversum fuerat frustula quedam carnea, hujusmodi fibris simillima cum sanguine per sputum rejecta fuisse : Ita ut verisimile sit istam ægram cordis substantiam sputum rejectisse, quod est valde mirum. Cum autem in capsula cordis nullus humor reperiendus fuerit, existimandum est materiam hujusmodi abscessum, seu ulcus, efficientem cum sanguine permixtam fuisse & per tussim excretam. *Lazarus Riverius centur. 1. observ. 87.*

OBSERVATIO XXII.

Hæmoptysis ab inflammatis Pulmonibus, subsequente abscessu.

Pleuritis à Peripneumonia hac præsertim nota distinguitur quod in hac sputum cruentum primis statim diebus & largius disfluit, si salubris præsertim futurus sit morbus, sed diutius & 40. etiam dies, ut observavi in Nob. A. de Garinois, qui à pulmonia & pleuritide complicatis convaleuit beneficio tam copiosæ excretionis cruentæ, ut quotidie linæritum & alterum lecto instratum tabo rejecto complueret : Præterquam quod enim è pleura tanta cruenti sputi copia rejectari nequit, abscessus in Pulmone relictus, sed de relictis quadriennio post in cadavere magni viri, à simili affectu recrudescente interempti, reperiuntur satis docuit. *C. Piso de morbis à colluvie serosa sect. 3. c. ultima.*

OBSERVATIO XXIII.

Hæmoptysis à sanguine melancholico è Liene & vasīs mesaraicis transmissa.

Vir 19. annorum constitutionis melancholicæ, hypochondriacæ affectione per aliquot annos mire divexabatur, maxime tamen de dolore hypochondrii sinistri conquestus est, tandem prægressa suppressione fluxus hæmorrhoidalis, quo aliàs cum levamine fovebatur, hæmoptysi bis intra semestrem spatium corripitur, qua etiam tertium redeunte purpuream cum sanguine vomit animam.

Impetrata licentia aperiendi cadaver, infimus venter 1. ad examen vocatus, in quo Lien quidem sat magnus, colore lividus & flaccidus : mesaraicæ, tam venæ quam arteriæ, tum & vasâ gastro epiploica, atro sanguine turgescit & quâ varicosa conspiciebantur : Ad Renes vero cum deventum erat, eorum sinister flaccidior multo & magnitudine inferior dextro reperiebatur : huc vero dexter in parte superiori extrorsum, cysti donabatur ad magnitudinem pilæ luforiæ, sero subflavescente turgida, qua dissecta, ac cum impetu promente humore, nulla via conspicua erat perquam vel excretio vel ingressus ferro pateret : quantum conjectura assequi licuit, videbatur dicta cystis ex membrana communi Renis conflata. Ad medium ventrem ubi deventum, in eo Pulmones sanguine nigro fermentescente turgescit & inflari comparebant : Talis etiam sanguis in Liene, & confinio venæ portæ ac dextro cordis ventriculo conspiciebatur.

S C H O L I A.

Hinc conjectari licuit ex fermentatione nimia humoris melancholici, massam sanguineam organo concitam, cum per consueta vias evacuatio non pareret, per ramum splenicum in Hepar, inde in cavam ac dextrum cordis ventriculum, exindeque per venam arteriosam seu arteriam pulmonalem facta vel anastomosi, vel rupturâ ad superiora regurgitasse, ibique ob copiam & viarum angustiam circulationem sanguinis impediri, undeque hinc vicio flammam vitalem extinctam fuisse. *Ex observ. Laur. Wolf frigit Medici Veneris, in mistell. curis anni 1670.*

De dolore hypochondrii sinistri &c. Bifaciam dicemus è Pulmone sanguinem rejici posse, uno modo loco hæmorrhagiæ, altero ad excretionem partis alicujus, in qua grave aliquod periculum crearetur : Invenitur quibus occluduntur viæ ad nates : Si sanguis non absorbitur in incrementum, loco hæmorrhagiæ è pulmone educitur sanguis innocuus, item & in quibusdam sanguineis, aut in morbis, hæmorrhoido loco : Altero modo sanguis expectoratur in Hepaticis & Lienosis : Lienosis per coeliacam, ut comigit filio Pizidii Pacienfis, Is sanguinem affatum expe-

thorace, omnia pene pulmonum vala repleta putabantur, & periculum tabis adesse putabatur: Tandem forte contingitur hypochondrium finistrum, percipitur pulsus in ea parte & palpitatio: tunc hic latere fontem mali putatur, & tractum ductumque sanguinis mancipit: consilium est leni, mulrum & valde repositum, cessant palpitatio & pulsus, item sanguinis rejectio: Credibile sanguinem & ipsium ibi compressum & conculcatum fuisse, & ob cruditates cacochymiamque veluti obsestum, unde succellisset necessarium aneurysma. *Bellinus anst. l. 2. Quod de filio illo Consulit dictum est, idem huic agro evenire potuit, ut illa sanguinis rejectio (suppressionem hæmorrhoidum sequens) non tam vitium pulmonum sequeretur quam copiam & oegalem sanguinis in præcordiis turgentis & propter affectiones melancholicas: Huc pertinet locus Hippocr. 2. Prothet. Inter Hæmopticoes evadunt quicumque dolores habent melancholicos & in dorso & in pectore: Quasi si minus laboraret & periclitaretur quam alii: Rejectio enim à Pulmone si sit tantum*

per anastomofin aut diapedesin non ita mala est, per diabolos omnino suspecta esse debet.

Cum sanguine venis anatem] Dubitandi ansam præbet Hippocrates, an excretio illa ventriculo tantum propria sit, non item Pulmonibus? Ille enim Coacac. Præoc. sect. 9. v. 36. *Qui spumofum sanguinem vomunt, dolere infra septum transversum non existunt, de Pulmonibus venant*: Sed adnotant *Mancini* commentat. adaph. 37. verbum vomunt ad omnem copiosam excretionem ab ore usque Hippocr. ad distinctionem Spulionis, quæ fit in paucâ quantitate: illud accomodando cum excretioni quæ fit per gulum, quæ fit per alperam arteriam: Qui sanguinem vomunt, i. e. plepo ore profundunt, interpretatur *Duret* in comm. in prædictam Coacacem præotionem: Id tamen consideratione dignum quod monet *Walus* in sua medicandi methodo, Tenacem pituitam pertinaciter diaphragmati aliquando adherere, quæ cû emetici ope exuberetur, hominem suffocet: Empyematicum pus ejusdem beneficio feliciter excludi afferit etiam *Franc. Sylvius de le Sue in sua Idea Med. Pract.*

OBSERVATIO XXIV.

Hæmoptysis à Iecore per fibras costis nothis annexo.

VIdi in hac Civitate Senatorem Clarissimum, quicum attoni se bre correptus spumantem sanguinem spuecet, falso judicatus est Pleuriticus, quia non à thorace sed ab hepate inflammato sanguinem spuebat, cum hypochondrii dextri dolore, & sine dolore lateris, tandem interit:

Dissecto hujus cadavere, inventum est fibris quibusdam connexum hepar cum nothis costis, ut inde vix avelli posuerit: *Duretus annot. in Holleri lib. 1. cap. 26. de morbis Int.*

S C H O L I A.

Iuvenis 18. annorum Iktero flavo per trimesse spatium antea laborans, demum curatus incidit in Hæmoptysin cum purulenta excretionē, dolore item à jugulo ad costas nothas in latere dextro acuto fete extendente, sibi que confusa symptomatica conjuncta, cujus vehementia inflammationis magnitudinem sequebatur, & noctu imprimis cum delirio & agrypnia exacerbabatur: Tullis etiam sicca cum dyspnoea aderat: Pulsus modo vehemens, durus, modo debilis: urina rubra, crassa, cum sedimento rubro: Hunc affectum Hepatis inflammationem, cum hæmoptysi ex ruptione alicujus valis in latere dextro, supleniorii hepatis, monstrabat locus affectus & cruoris per sputum excretio: At miretur quispiam, quomodo per

spumum & excretionem materia cruenta & purulenta posuerit evacuari: Sciendum per vala supleniorii Hepatis ad thoracem hanc materiam fuisse transmissam, cum dolos sese extendit: et ad costas nothas lateris dextri: similibi fœne est historia à Dureto superius narrata. *Frid. Hoffmannus M. p. m. 513.*

Hepate inflammata] Si vis explere utrum in parte quadam inflammatio adsit, an oon, applica topica calida: Si illa pars fœat, nulla adsit inflammatio: Sin autem non fœat, certo credas inflammationem adesse, & inde subsquentium abscellum, id quod multoties fui expertus cum *Lazar. Ruyss* centur. 1. observat. 51. *Idem ibidem* pag. 396.

OBSERVATIO XXV.

Hæmoptysis ob Sanguinem à Iecore in Pulmones transfusum, eo per totum dissentos.

R. P. Hieronymus Grifflus, ordinis Prædicatorum, juvenis optimo habitu præditus, In sanguinis sputum copiosum incidit, spumofum valde secundum totam substantiam, ita ut post concretionem totus cavernosus inlar spongiæ apparetet, ad differentiam sanguinis cum spuma, quam in superficie tantummodo conservat, una cum hypochondrii dextri dolore, Et dum sputi sanguinis curationi incumbere, idem fluxus repetit sæpius, concommitabatur etiam tussis vehemens, cum sputi pituitosi copia non mediocri, ita ut dum alii Medici huic curationi adhibiti, timentes tabem, humectare corpus, jam sanguinis fluxu sedato, tentarent, à sputi copia suffocaretur: Quapropter ego Coacac 360. sect. 2. autoritate permotus, ad Hepatis curationem me contuli *remediis communibus*, quæ hepatica medicamenta dicuntur, & inter ea Trochiscis cyphæos, quos singulo mane exhibui, à qua curatione adeo sublevatus est ut sibi sanus videretur: Quia tamen ante perfectam sanitatem frigidiori vento se exponens à febre magna correptus est, ea que continua cum siti, spiritandi difficultate, tussis, aliisque symptomatibus gravioribus, à qua 25. diebus spatium extinctus est.

Cumque

Comque aperto cadavere partes lesas inspicere procurarem, unum primo occurrit mirabile, quia ventriculus omnino vacuus est inventus, etiamsi antequam moreretur, spatio non ultra 4. horarum plurimum commedisset, videlicet ferculum ex pane contrito, tria ova, panem & carnes (erat enim per totum morbum vorax multi cibi, nec ab eo se continere poterat) sed & intestina fere penitus inanita erant: Hepar satis magnum erat, alioqui sanum; Pulmo totus sanguine repletus mirum in modum tumidus apparuit, ita ut non vasa tantummodo turgenter, sed per totam substantiam sanguis conglobatus scirrhii duritiem emularetur. Nulla tamen alia lesio in eo apparebat: Cor & circumscriptæ venæ sanguine mirum in modum repletæ inventæ sunt, & in latitudinem immodicam distentæ, imo & sinister cordis ventriculus sanguine repletus erat: Turgabant pariter venæ omnes, quæ per costas disseminantur; *Propter Martianum comm. in aph. 12. sect. 5.*

SCHOLIA.

IN summa totam malam in sanguinis pleocondine consistere videbatur, Ex quo in eam conjecturam deveni, Hepar atradictum omnino validam habuisse cum sanguificatricis robore, cujus gratia sanguinis copiam majorem producebat quam ei conveniret; Quem cum natura per pulmones ut antea excrevire frustra tentaverit, in ipsi pulmonibus conglobatus & coactiparus; putredinem sive seroventem contraxit, & febrem illam ingentem induxit, Ea qua forte servati potuisset si sanguinem denuo exspulset, aut sanguis in larga copia missus fuisset: verum morbi causa ignorata, nemo sanguinem mittere copiosum in emaciat corpore ausus fuisset. Hæc adnotare volui, ut constaret ab Hepate per medios pulmones sanguinem educi posse, cujus indicium erat: & ipsum & dolor in hypochondrio dextro, nec ob id filium erit dicte educationem à Pulmonibus fieri ut ab aphor. 13. sect. 5. docemur, *Quæ sanguinem spumantem inspando excreant, ut in Pulmone talis exulsi sit, Quem male interpretantur illi qui in sanguinis spumosi excretionem Pulmones semper afflicto esse exponunt: Eo enim aphor. docemur tantummodo cognoscere in universum per quam regionem sanguis excreatur, non quæ pars afflicta quando sanguinis spumosi sit excretio: Particulari vero id explicavi sect. 1. Coæcet. Piznot. 360. ubi ita legitur. Qui spumolum sanguinem vomunt, dolore infra septum transversum non ea lente, de Pulmonibus vomunt: Ex quibus quidem magna vena in eo nampitur. medium vomunt & in periculo versantur, &c. Ex paulo inferius, Qui sanguinem spumolum spumant, præcordium dextrum do-*

lentes, de hepate spumæ & moriuntur: Calus quidem à me bis observatus in pect. &c. item ibidem.

Remedia communibus &c.] Inter quæ recensentur Ligaturæ, quæ modo sanguinem compescant queruntur: quidam eas attrahendo id prestare volunt, eo quod pars ligaturæ intercepta tumeat, adeo ut etiam à copia irrucens sanguinis inflammetur, immo substat gangrena: Item, quod si collum deligetur scicis, venæ capitis intumescant: Si humerus ligetur, cubitus & manus valde tumeant, hinc dolor à vinculo excrucians attrahere creditur: Modus attractionis à veteribus tribuitur dolori, calori, fuge vocui: dolori, quatenus pendet à suis causis, intemperie calida & solutione concludi: hæc partem debilitat & repellendis à se humoribus imparem reddit, inde tumor partis contrahitur: At aliunde petenda intumescens ratio: Ex priori causa deduci non potest cur ligato brachio, infra ligaturam intumescant cubitus, manus & digiti: Non oritur ille tumor à sanguine, à corde in partes trans ligaturam copiosius per venas irrucens, sed ab impedito motu sanguinis restui per venas in cor: detectus sanguis ibi tumorem excitat: Ligaturæ sanguinis è naribus, ore fluentis morum sistunt brachii injectæ, non quod ratio doloris aut caloris tibiatur, sed quod sanguinem ex arteriis resumptum, ad cor per venas tendentem, quo ruinis tam cito ad dextrum ventriculum pervenit, retardet: hoc in fundamento jacet via ligaturarum, dum injiciuntur parti sanæ & sanguinem per venas ad affectam reducere in copia prohibent, & sic pars affecta ab influxu liberatur.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI SECUNDI

SECTIO VI.

De Expiitione Purulenta, Sordida, Empyemate.

OBSERVATIO I.

Expiitio varia à Pulmonum abscessibus educta.

NNO 1601. in tota Piceni regione &c. grassabantur anginx, pleuritides, tusses, thoracis dolores &c. cum sputo viscido, spumoso, crasso, raro, subflavo, suberuento, subnigro, rarissime purulento, &c. Sectis cadaveribus reperti sunt Pulmonum abscessus ex quibus multa materia foetens exibat. *Fide lib. 4. Tit. de Febribus.*

SCHOLIA.

Cum spura viscido, ipamase, crasso &c.] Quanquam Pulmones ut plurimum inflammatione, abfcessu &c. tentati sint, ubi ejusmodi spura apparent, observatum tamen aliquando ubi viscosa spura extant, nulla labe infectos fuisse Pulmones, nullamque in illis aut thorace inflammationem adfuisse. Quare *Durum* Coac. lib. 2. cap. 16. tit. 24. quando spura incerta, glutinosa, alba atque rosunda &c. expiuntur, docet quod necessario hæc pravitas & spuri condicio, opinionem faciat petulci humoris ab astu & ardore quo pars ipsa, unde spurum venit, conflagrat; Quæ causa est cur alibi de spuro rotundo in scriptis Hippoc. spura rotunda delirium indicant, Ad quem locum scripsit Gal. 6. Epid. Talem spurum causam materialem esse asserendum & leuorem humoris in bronchis pulmonum cumalate colligi: efficiens vero immundicam calorem: Quæ omnia si non nego ex decreto veterum & ipsius Hippoc. accidere pleuritis & peripneumonici, ita simillima his expuere spura prava febre essentiali laborantes, circa ullam pleuritidis aut peripneumoniam docet experientia: Ita Pythion. l. 3. Epid. p. 4. sect. 1. sexto die varia & cruenta spura expectoravit, cum nec peripneumonici nec pleuritis fuit; nec à capite malum esset, sed à dextra tantum materie, quæ non erat tanta ut inflammationem pareret: aut forte in pulmone congesta, sed quæ incendium non conciperet: Hinc Hippoc. aph. 47. l. 4. In febribus quæ non intermittunt, excretionis sanguinolentæ, liventæ, gravolentæ, biliosæ, omnes mala sunt: nomine & intelligitur volens notare non tam esse ma-

teriam thoracis morbosicam quæ exacerbitur, quam excrementum alium parium in pulmonem transmissum, cui per motum alienus color inductus sit: Sic cum incipiat in febre essentiali talis apparere mala apocremptis, non tam generico est, quam veteris excrementi collectio: Ideo dixi, in febribus non intermittentibus, ut declararet ratione præcisius cacochymia, & vi caloris humores funduntis, & per modum attractionis ipsius pulmonis à partibus inferis; aut per modum transumptionis & diapedesis, colligi in pulmone materiam alienam, quæ aut tussis, aut alio modo expectoratur. Errant ergo Medici qui eum talia spura vident statim pronuntiant aut pleuritida esse aut peripneumoniam: An forte hic incindiendus Thymus, ob vasa quæ ad hæc glandulas distribuit Erydiclissimus *Pharimus* Adenogr. cap. 16. ostendit? nam ex ejus sententia, ubiqueque vas excretorium peculiariter reperitur, non parandum est frustra conditum fuisse, sed speciali cuidam excretionis destinationi: Idem etiam humores observat. c. 21. de Glandulis maxillæ majorem esse quantitatem materie salivæ per hæc glandulas excreant, quam ab eisdem illis arteriis & venis, quæ ad hæc partes distribuantur, afferti possit: Notum vero eundem Thymum ex quorundam lucenetæ infestiorum cadaverum sectionibus, iustar spongiz ab excrementis corruptis humoribus intumescere: Hinc ratio patet cur pyralismus antichialis cietur, collo eundemque emplastro de ranis cum Mercurio, facilius quam per Zonam mercurialem.

OBSERVATIO II.

Expositio materie flavæ purulentæ à Pulmone fistulosis ulceribus scatente.

Quidam thoracis dolore laborans excernebat materiam flavam purulentam: Illi Pulmo dexter totus scirrhusosus inventus, fistulosis ulceribus scatens, In sinistro quoque erat ulcerosa colluvies. Vide tit. de Phthisi.

SCHOLIA.

Materiam flavam purulentam] Plurimum potius eamque materialem pus solum esse malum sanguineam, ceteros vero humores aut raras eas existentes esse adeo rebelles ut alteratrici resistant: Dicimus autem nos ex Galeno, non solum sanguineos humores in pus converti posse, verum etiam cetera excrementa corporis, quamvis majores eum difficultate: Galenus 7. aph. 38. ait quod flui in capite io thoracem, 10. diebus suppurati, et id phlegma est purum: Præterea Hippoc. & Galenus 1. Proth. 39. dicunt humores frigidos trachu 60. diem suppurari si locus calidus sit: In pedibus enim & brachiis, ob distantiam à fonte caloris nunquam in pus abeunt: Galenus 1. Prælag. 29. docet quando expectanda sit conversio humorum in pus, Si vires sint robustæ, & humores calidi, per excretionem fieri judicium: Si frigidi & vires robustæ per abfcessum: Si calidi & vires debiles, per abfcessum quoque judicantur: Ubi vero vires debiles & humores frigidi, illi vel moriantur, vel viz longo tempore intervallo humores concoquantur: Hinc colligere licet quando fieri possit pus, & quando non, 1. enim si fuerint humores calidi, & vires robustæ non fiet pus; ratio est, quia humores calidi transpirant, & vires fortes expellunt insensibiliter: Hic enim error notetur qui humoribus bilis, robusta existente viute, adspungunt suppurationis ex parte, fœcibus &c. quibus occluduntur pori, detinen-

turque acres vapores, qui ideo adeo effrenes evadunt ut partem exedant & gangrenam inducant: Si vero fuerint frigidi humores, & vires robustæ, per abfcessum expectanda erit crasis: Ex quibus quoque colligimus ex frigidis humoribus fieri pus: Non ergo solum ex sanguine fit pus, quia sanguinea massa non est sola & adequata causa materialis puris, ostensum enim ex Galeno purum in cavo thoracis posse suppurari: Ex *Saxovio* meth. vit. Err. l. 8. cap. ult.

Materiam flavam] Quæ non erat mera bilis, hæc enim in verum pus non abiecit, sed sanguine biliosus; aut bilis pinguis remota, quæ ut plurimum caret Pulmone.

Materiam purulentam] Empyematis materiam alid merum pus esse voluit, alii purulentam, qua in opinione est J. *Hurnius*, qui inter hæc & merum purumque pus distinguit, asserens hoc fieri, Ab humore nativis sanguine, &c. ab ipso sanguine aliquatenus corrupto, sed per ipsum caput: Item vero humores ex recrementis, vel defæcatis aut ibidem esse, qui à sanguine inter circulasandum alicubi præpedio & obstaculo proveniunt: Hinc observare est de abfcessu, qui per verum & laudabile habet, cum plerumque compactum, undique conelutum, & vel cysti, vel privatis quædam obvolatum esse: dein postquam maturatus & disruptus humorum contentum effudit, cito ac facile sanari: Verum abfcessus purulentum materiam præbens, nidum

sum non ita confusum, & parietibus circumseptum, sed pleniusque inaequalem & sinuatum obtinet, atque disruptus tantum potius quam pus effundit: deus ob periculis humoris excrementi scaturiginem ægri sanatur. Quanquam autem istam puris & materiei purulentæ distinctionem hand multum improbamus, atamen nec solummodo hinc, nec semper istud Empyematis causam conpositam esse statuimus. Quando hic morbus pleuritidis simplici succedens, ab apoplexia in lacte suppuro & disruptio

occurrit, sepiissime purum merumque pus est, quod in pectoris cavitatem decidens morbum istum parit: Si vero empyema Peripneumoniz soboles sit (nisi Pulmonis vomica intercedat) materies ichthiosa, citra phlegmones locum aggelis & postea mora, coctione crassescens, pulmonis unitatem solvit, & tandem membranam investientem perficiens, inque thoracem exundans, Empyema producit: Ista materia purulenta potius quam pus meum dicitur, *Idem Oper. posthumi lib. 1. cap. 10.*

OBSERVATIO III.

Exputio purulenta à Pulmonibus pure infectis.

Virgini foetens erat anima cum Purulenta exputione, citra tabem; hæc inopinata morte prehenditur: Pulmones illi pure scatebant, & nigrore erant tincti. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

S C H O L I A.

Foetens anima cum purulenta exputione] Adverte est attumque humorem, scilicet cum pus tota materiem purulentam iocidam insigniter foete, quandoque totum odore quovis retro prius immum esse: Quædam apostemata maturata & discepta pus facit, alia inodorata effundunt: Pulmonum vomica, quin & partium aliarum phlegmonis ita diversim labuisse sepius notavi: Materies purulenta è pleuritis ulceribus effluens grave olet, phthisicorum spura, quæ multo magis exilit, ut plurimum inodora sunt: Usitatum est à latere propter empyema perforato, materiem primo hand insuavem exundare, dein post duos aut tres dies, ære officium sepius subingressio, tum horrendo putuisse: quæ tamen putiditas post injectionem spiritus cujusvis vini, aut aromati, evanire brevi: Sed multi cæditi res effect singulorum huiusmodi accidentium, & alterationum rationes particulares designare, in quantum perexigua tantum puris, aut materiei purulentæ alteratio his foetorem inducit admodum: Cum particule sulphoreæ æqualiter coctæ, & salinis subjugant in mixto

continentur, grave olentia abest; quamprimum vero illæ solutæ avolare incipiunt, eorumque salinas, à quibus aculeantur] aserunt, odorem valde tetrum quaquaversus dispergunt: Quod autem ulteri putido, aut Empyematis sordo, locio vel infectio, cum liquore vinoso aut aromatico aliquoties adhibita, sæpe foetorem tollit, in causa est quoniam ulceria, haud secus ac testa parentis, lactea quodam quasi fermento liquorem contentum inquinant, adeoque foetorem imprimunt: cumque adeo à liquore bene temperato & potente, illud vas aut viceris fermentum eliditur, aut subigitur, deinceps foetoris ista propagatio cessat. Hinc sequitur indicium non semper malum, nec itaque valde bonum esse, si quando phthisicorum spura, & empyematicorum abscissus, cum vel sine graveolentia excrementum, quoniam utriusque generis casus quoddam salubres, aliosque funestos exituisse cognovi: Adhuc non certis indicium inde sumitur, quod phthisicorum quorundam spura aquæ injecta aquæ superant, aliorumque submerguntur. *Idem lib. 1.*

OBSERVATIO IV.

Exputio purulenta à pulmone sinistro omnino in pus resoluta.

Pleuritide quidam laborans, post 14. diem cum expueret sanguinem, in Xenodochium receptus est: ibi cum omnia incassum remedia tentarentur, *vix post dies 40. saniem ad dimidiam mensuram fere exspuit:*

Cum secaretur, *nullum apparuit vestigium Pulmonum in sinistro latere*, verum ad 28. bacalia saniei deprehensa: Diaphragma totum in illa parte conversum in saniem, una cum musculis intercostalibus inventum est: Si tres adhuc supervixisset dies, crepuisset per costas: mediastinum vero non erat læsum, & alter dexter Pulmo sanus & integer, colore & substantia conspectus est. *observatio G. Wolphii Medici Tigurini.*

S C H O L I A.

Saniem ad dimidiam mensuram fere exspuit] Quæri potest quæ ratio, etiam ab exiguo ulcere, tam multa in thoracem conflant, ut & suppurati ægri evadant, & ingentem puris copiam in dies expectarent, quam nulla fere alleviatio insequatur? Cause multæ sunt, & locus ipse vulneris depressus, si lateribus confectus, ad quem humores sumpere natura graves debantur, & ex circumpositis gravia omnia. 1. Infirma partis affectu retentis, si lateribus confectus, ad quem humores sumpere natura graves debantur, & ex circumpositis gravia omnia. 2. Infirma partis affectu retentis, tum ob fibrarum quæ in retentione contrahuntur solutionem: tum propter ambientis contactum, quo membri temperies evertitur. Quo fit ut quæ humida utrinque contineri non possunt, in locum medium defluant: 3. concoctio vitio solutionis oblecta, cum alimentum

assimilare non possit, excrementi angere copiam: Porro, ad imbecillum ex solutione locum, tam ob dolorem, tum ob calorem, confusio fit, & ex ipsa propter vacuum ab universo corpore colligatio: Ea ratio accedit, ut si quis per singulos dies rejecti puris quantitatem in quibaldam suppurationis collegerit, inter dum sex aut octo heminas, aut Galenæ, inter dum decem, atque etiam plures totam summam æquare inveniat: Cum ergo uncias decem hemina fere contineat, hemine decem puris, quod singulis diebus rejicitur, uncias centum perficiant: ex quibus parium affectatum summa imbecillitas, & è toto corpore colligatio arguitur: Refert quoque Nisalam, vidisse suppuratam

puratam ex ulcere, quæ quotidie libras octo puris expuerit, perseveranteque in ea copia sex dies *Jejunium comm.* ad aph. 5. *scilicet* Job. 6. *Cauter. Hippoc.* Adde rationibus adductis, pus, ut sic dicam, sui multiplicativum efficit, acque vicina quæque carnem tam languinem, in sibi similem substantiam transmutare: Ideo *Sanctissimum* in meth. vitandorum Errorum, monet Chirurgos ne totum ex abscisso, adhuc immaturo, pus profandam, quia inquit, id quod reliquies, abscessus partem citram concoqui, incidi; illique puris formam inducit: Materiam autem phlegmaticam suppeditant Pulmones, ob vasorum & sanguinis copiam illos permeantis, qui ab attractu virulentæ materię, ejus naturam prompte induit; hinc infecta massa sanguinea, circulationis ope totum corpus alimento defraudatur.

Vix post dies 40. Duriorem ac confirmatam Empyemam significant tertia lenta continuo insitans, quæ partim putrida partim hectica videtur; interdiu mitior, noctu vero vehementior: sudores multi, noctu

præsentium advenientes: tussis frequens & molesta, temporis vero processu maxillæ ruborem contrahunt, oculi conserti redduntur, uogua incutuntur, pedes inanescent & pullulæ circa pectus crumpunt, acrioris puris parte ad extremam usque cutem penetrante.

Nulum restigium Pulmonum in sinistro latere] Plazonius naturam Paravi medicabatur, in superiore dextro Pulmonis ala vulneratum, qui per itra hebdomadæ cum pure ipsam pulmonis parenchyma eiecit: Ex quo suspicatus ille absumptos dextros Pulmonis lobos: scilicet tamen usū vixit, sed cum difficultate spirans: Dextro etiam huc ventree corrupto hominem vixisse nadi *Hypocritæ* *testis* lect. 1. de fac. Anat. Idem *Plazonius* lecur canem cui Pulmo globulo sanguine plumbeo putuerat, illo dextro, cujus beneficio diu superstit: Quid igitur minus Pulmonis ulcera sanari, si purgula ipsorum vulnera curantur? *Rhodius* *cent. 2. observat.*

6. & 7.

OBSERVATIO V.

Exspitio purulenta ab Empyemate pleuritidis succedanea, & corrupto utroque Pulmonum lobo, in pus conversorum.

VXOR Limbolarii Textoris, nomine Cezeau, 36. annos nata, Genevæ obiit 7. Junii 1675. A sex mensibus utero gestans Pleuritide lateris sinistri corripitur, multaq; purulenta exspuit, nec tamen morbo defungitur, sed maxima materię abscessus latus occupantis parte in cavum thoracis decumbente, Empyema congeritur; si enim de latere in latus se convolveret, fluctuationem manifestam & ipsa & assidentes animadvertebant; quamobrem instituta, sed serius, paracentesis, proditque *puris fetidis* ingens copia, quam effusionem sequutum levamen, remittente pectoris gravitate, febre, dyspnœa, & aliis symptomatis, sed tandem ægra tabe conficitur. Triduo ante obitum brachium dextrum miro oedemate totum intumuit, quod admota candela pellucidum transparens erat: Humeri partem sylvestrem, juxta cubium gangræna quoque invasit, è qua tabum cruentum effluebat.

Apertum fuit, me præsentē, cadaver à Magistro Bailly Chirurgo peritissimo, facta per maritum secandi potestate: Referato Thorace, primo occurrit Tunica lobi dextri Pulmonis plurimis maculis varigata, rane cutem & colorem referens, parenchymate destituta, & diaphragmati arcu connexa: Lobus sinister totus pene in putrilagine abierat, per paracentesim eductam: particula enim solum superioris lobi superstes erat, & membrana, cujus aliquot simbriz exinde dependebant: 1. Pleura ea parte crassa erat, syderata, cui coherebant fragmenta membranae pulmones investientis, ut & diaphragmati, quæ adnascencia naturalis videbatur, non per fibrosos nexus, sed membraneos: 3. Cor solito majus erat, cujus vasa paucum sanguinem atrum, exustum & atrum continebant: 4. Pericardium pustulis plurimis erat exasperatum ab acrimonia puris, à quo exesum fuisset, nisi paracentesis prævertisset corrosionem. 5. Diaphragma duobus digitis solito elatius erat, in cavitatem thoracis à Jecore tumido, scirrhuso maxime, & utrumque hypochondrium occupante, compulsus, glandulis prætere a plurimis per extimam superficiem oblitum: Parenchyma dissectum aridum se exhibuit, sub fusci & cineritii coloris: 6. Pancreas pene totum consumptum erat, cujus Ductus solum cum membrana apparebat: 7. Adacta in brachii *spaculo infectam* novacula, caro putris & nigricans, tabo diffuens apparuit: Ulna & manus extrema, oedemate tumentes, lympham plurimam, limpidam dissectæ emiserunt. *Ex Observationibus propriis.*

SCHOLIA.

Puris *fetidi*] Hippocrates inter signa Empyematis fuselli prænumia, recenset specillum à pure velut ab igne coloratum, sive, quod sæpe advertimus & nonnunquam absque malo evenit, si specillum argenteum, lateris aperti officio indicum, ita in colore tanquam auro aut cupreo tingetur: Quod certe nihil aliud significat, nisi quod puris, aut materię purulente particule sulphureæ adeo exaltantur, & à mixtionis vinculo laxantur, ut facile abscedentes, corpori cuiuslibet alteri, & impurissimæ argenteo (cui affines sunt) alligantur: *Idem.*

Brachii partem spaciulo infectam] A transmissio è Pulmonibus puri & virulento ichore: dissecto enim secundam longitudinem humero, indagatisque vasis ad subclavia, illa, necnon Pulmonum, scilicet cum vena arteriosa, tum arteria venosa, atro & corrupto sanguine distenta reperta sunt: Cujus portio in infumam brachii partem delata, spaciolum illi induxit.

Lympham plurimam] Lymphædoctus plurimam pulmonum superficiem ambiens, qui humorem in his superabundantem continuo emanant, quem totam venæ revehere occurrunt; plurimus autem congeritur.

ut, quia nihil exterius per diaphram exhalat: His
vasis disrupsis aut obstrictis, ut pulmonum & pe-
ctusis hydrops, alique affectus enascuntur, sic
brachii edema illorum virilis debuit originem, eo
corrupta lymphæ, quam vasis pulmonum lacerata emi-
serunt.

OBSERVATIO VI.

Expositio alba, rotunda, à Pulmone tumente & viscido albo humore infarcta.

Vtrum Illustr. Infolita adorta est dyspnoea, cum dolore gravi universi thoracis, & spualis toto motui tempore albis, viscidis, spumosis, profluxu *rotundis*: Pulmo insigniter tumidus repertus, in hisque unus humor viscidus, albus, tenax ac purulentus delitescens. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

SCHOLIA

Pteropus rostratus Ubi (pota illa eam figuram adificasset, explicat Clariss. Dumerbion. Anst. lib. 2. cap. 12. Præter autem, ait, pulmonis substantiam totam vesiculosam esse, ducet etiam ratio, nam multoties spura rostrata, crassa & foetida, vomica, folliculi, vermes (sic ante paucos annos vermem vivum, magnitudine & forma bombycem majusculum retereferunt, sed inebrium, cum valida ruffi à muliere quadam capillum vidimus) calculi,

aliæque res p. n. in pulmonibus gignuntur, ut obser-
uationum scriptores exemplificauerunt, & nos quo-
que multoies in praxi vidimus, & cum tussi tejeta,
& post mortem in pulmone repeter: Quæ certe,
non in vasis gangliiferis, nec etiam in bronchiis
(suffocationem enim, althma violentam perpetuamque talim inducissent) sed necessario in hinc
vasculari gigni, ac longo tempore diuinci debe-
runt & pauerunt.

OBSERVATIO VII.

Expositio purulenta manans à bronchiis pure infarctis.

Corpus *œmule* albam, tenacem, viscidam materiam excrebat : Incisus & divisus mortui bronchii, alba ut materia fere rota referta erant, ita illa effluebat puris speciem præ ferens planissimam, qualem multis ante septimanis eiecerat. *Vide tit. de Tab.*

OBSERVATIO VIII.

Exputatio purulenta à pulmonibus maximo obfistis, sinistro latere purulentis.

Nobilis diarrhoea laborans, febre etiam affectus fuit lenta & continua, ac per tuſſim purulenta ejiciebantur: Pulmones mucō tenaci plane erant obducti: In latere ſiniſtro purulenti. *Vide lib. 4. tit. de Febris.*

OBSERVATIO IX.

Expositio purulenta ab apostemate in latere, cum pulmonis vicini inflammatione.

Studiosus sensit rigorem in latere sinistro thoracis; sequitur calor, tussis, &c. in-
 crescente morbo excernit copiosa purulenta: Inventum iugens in latere sinistro apo-
 plectica, quod pulmonem simul occuparat prægressa inflammatione. *Vide tit. de lateris*
dolore.

SCHOLIA.

Magna difficultas orta est. Quo transire, vel quibus vis materies spoto repleta à pleura ad ductas tracheales fectur: Alii hanc in cavitatem thoracis delapsam à pulmonibus tanquam à spongia imbibit: neque illi per membranas adnatas, quibus sæpe pulmo pleurae cohaeret, eum exinde late transficere putant: Verum quæque modus valde improbabilis, si non impossibilis videtur: primo enim pulmones specus thoracici contenta non exfugere inde coarctat, quomiam in hydropse, aut vulnere pectoris, quando pulmone tracto contingit, neque aqua neque sanguis omnino per nullam rejicitur, tametsi humoris huius aut illius copia sæpe magna habeat, quæ è thorace per sectionem aperto statim sponse effluit: Cæterum pulmosi membranas quandoque adnatis, ipsamque pleuræ annectere, ex observatio-

ne anasomica laris liquet; quinimo hac commensat
via materiem pulestantem, in latus translatam, ibidemque
per forasocellum ab arte vel natura excusantem,
cum ceteri saluati evacuatam fuisse: aliquoties novis
artem tales membrum, pulmonis cum pleura con-
iunctive, raro praestitum: inque pleuride, qui
moribus periculosus est, haud uberius indur unius aut
alterius dei proles esse possunt: Insuper, flect inqum
dum praesto sint coeci liti ductus, qui fortis admira-
bili natura infundit quiddam est pulmonibus velius
thoracis pomeria expositum, attem contra naturam
economiam videtur in corruptam, quarevis exterius
genium, locus ad nobilissimum hanc partem, quae
revera vix & caloris fons est, derivent. Dubium ve-
ro dicitur Clauiss. Dantl p. 101. m. 10. curius anni
seculi, Observe: q. 1. Miles, az, vulnereus gladio co-
sti, vulne-

to, vulnere penetrante per veras costas in cavitatem pectoris, non effluit sanguis multus, vulnus à Chirurgo consolidatur brevi tempore: Consolidatio vulnere ager incidit in febrem cum summa respirandi difficultate, vocatus sanguinem in cavitatem pectoris confluisse suspicor: v. s. primo omnium injungo, mitigans calor, melior respiratio: adjungo corroborantia, refrigerantia, pectoralia: lateri dextero emplastrum maintativum applico, per noctem augetur nullus, expectoratur dimidium pelvim plenum materiae purulentæ: Sanum se efficit deuto lacte, de sinistro conqueritur: Inspicio vulnus, tumorem animadverto, locum tenui quasi membrana clausum, qua aperta, exilit tanquam à vena secta purulenta materia: Ager sanitati restituitur: Cum materia expectorata in cavitatem pectoris inhaerere, per quas vias expectoratio materiei facta sit in inquisitione dignum: Toris hæc quaestio multos, præcipue cum non saltem materiam purulentam, sed de tutandam, referente *Tulpo* lib. 2. observas. 15. è cavitatem pectoris extricam fuisse certum sit: *M. A. Severum* lib. de Abcessibus diligentissime in has vias inquisitionem: idemque proseguens est in *Epistol. Bartholinæ* centur. 1. *Epist. 68.* ubi illi placuit hoc, cum ad motus perennis viam, tam ad pulmonis superni, tum diaphragmatis inferni complosum referre, sed hæc, quod ingenuè fateor, caput meum superant: Quæ veto de amantissimi sensu in ore, ab injectione amana percepto ex *Paræo* afficit, saltem à vaporibus, quibus perita sunt omnia, provenisse quis affirmare posset: In luto itaque ignominie tantopere hærentibus, auxillares manus nobis porrigit *Clariss. & ingreditissimus Hartmann* lib. de Generat. Anim. 3. p. m. 43. bis verbis, *Perforatio pulmonum à me inventa, hæud abscura & incerta est, sed in prænotis præfixim, patula admodum, adeo ut in struthocamelis meum plurimum repeterem, qui deguerunt mortui apices experirent, Et paulo post, duo vero dubitare licet, an non in homine, etiam dum vivit, air per sales motus in thoracis cavitatem penetrat: Quamvis enim alius Empyricorum pus, & pluriusmodi extraxerunt sanguis, alius effluat: In videretur pectoris (il-lasi utrum pulmonibus) air per vulnus foras erumpit: aut hujusmodi in cavitatem pectoris injicit, cum fructo redderetur? Hæcvero adimplatur *Clariss. Bartholinum* Anat. Reform. lib. 2. cap. 9. *Membrana unguis palmæ tenui, levi, poris multo insignita, qui poris, instat pulmone foli-bus, satis conspicuis: quos aliquando foliis alium post magni-tudine in viderem diffundendum observavi: hinc fuit thoracis penetrare potest, & per osium extra: Hinc sententia calculeum adjicit *Clar. Lindenius* Med. Phy-siolog. lib. 2. cap. 6. §. 136. *Perforationem talem mem-brana pulmonaria peculiare quid esse, & ea cognita nulli jam mirum videri debere posse, qua, qua præter naturam collecta sunt in cavitatem thoracis, inde absterberi, & per atri-um asseram expulsi, esse tamen istum abscissum potum dixerim nequam. & in casu extremo necessitas tantum: assem vero esse perspirantem aciem in eandem certitatem, quo circumfusi pulmonales huius refrigerari: Et ita lux tenebris nullis tandem affudit: Est enim in mortuis, suble-ventibus omnibus, possi illi non admodum sunt conspicui, tamen cum alibi (ut in pennacis certo constat) oculis patenti, non video qua causa commopus quis dubitare velit eisdem in homine existere, & natu-ram in extremis itis vix posse, cum saepe meos obfcur-itates necessitate salutis libi inquirat, ut è doctri-na de abscessibus luculentum evadit, ubi natura op-pressa sæpius vias plane turvas invenit, per quas ma-teriam ceti facinorosa deponit: *Hæc enim Clariss. W.****

stem: Superest tamen scrupulus, Si adeo pericula sunt vitæ, ac poris pervia est pulmoneis ambiens mem-brana, quidni semper, vel saltem ut plurimum, Em-pyricorum pus illuc tradatur, sed ad paracentesim confugiendum? An à natura concessi quibuldam illi poris, alius denegari? An quibuldam laxior ea, aliis adstrictior? An parvis crassities aut visciditas, etiam-nam copia, tracheonem obstat, adeo ut pulmones exsurgere illud non valeant? An facilius permeat pus in itis quibus pulmoneis lateribus proprius coherens? An dentius aut rarius illorem parenchyma diffusius aut facilius pus absorbet? An forte membrana, è pure prognata ab adsente calore, poros illos obdocit, non iteas ac pleuram ab eadem aliquando circumvestit quandoque compertum est, ac sperto ad puris edu-ctionem latere, nihil prodixit, obstantes spacia illa membrana, quod in milite, de quo supra, con-tigit?

Rigor, calor, infusio Inter Empyricarum signa illud est, quod eo afficit nocturnus potius quam diurnus cas-cerbariones patiatur: Causa verisimilis istius per-turbationis è exacerbationis nocturnæ à *Ballone* conf. 3. lib. 3. assignatur: In omnibus, aut, suppa-rationibus dolores ad noctem incidunt, id quod non tantum audendum dum pus sit, sed dum continere aliqua parte fovens febrem lentam: cum autem Empyricis, & præputa hæctica fibre implicatis, par-tes solidae sint ignite, non mirum si noctu calor in-creseat ratione ipsius diathesis, & quis non hume-dat (ideo calor hæcticus calci non dissimilis se pro-di) revocatur calor & spiritus intro, sic calor in-terierit, non solum qualitate sed & quantitate: Et ita dum revocatur calor ad centrum, distillatioque prohibetur ob noctis dominium, calor iste maleficus est, malignus, squallidus, non *serpulus*, nec manifestus *infusio*, id est, focum, locum, domici-lium apum & conveniens, & calor fixus non acci-pit fluentem istum calorem febrilem tanquam amicum & *invenit*, contemperantem moderan-temque, sic non bene convenit illi calori fluenti cum fixo, licet uterque in ægram conspiciat: Sic cum recurrat calor maleficus, & manifestus æque malum & perniciosum, dum augetur calor & do-lor, non sunt novæ accessiones febriles, sed *augens* caloris è exacerbationis quædam, non ob novi humoris motum, sed ob ignem novum par-tem solidam, seipsa factam *superadditionem*, i. e. igniorem: quomodo *Galen.* comm. in aph. 1. lib. 2. docet somnam aliquando obesse, ut cum humo-res, calor & spiritus revocantur intro, & augentur inflammationes & dolores, ita in Empyricis fieri so-let: Quærat autem quis, an pus suos habeat motus nocturnos potius quam diurnos: nam & in inflama-tionibus interna paroxysmus est nocturnus: & id non est proprium nec hæctici, nec empyrici, ut nocturnas molestias potius experiantur, quam qui aliis morbis implicantur: Unde mirari sumus cur antiquitas peculiariter quodam privilegio & præro-gativa exacerbationem nocturnam puri & purulenti assignaverit, Nec enim id novum est, nam & vene-re lae affecti, præterit ubi solidas partes invasi: & conspurcavit, nocte dolens magis, Et antichidi, de *invenit*, & *apud*, & *invenit*, denique multo maxima pars argocenturium: Pænetrationes ad-ductas, & hæc probabiles sum, & quia omnes fere morbi sub tempus noctis ingravescent, multis de cau-sis, parim quia ob adventus tempus nocturnum sit admirabilis quidam mutus & revocatio intro, il-

que contrarius morbi vigilium: deinde coctio fit nocturna, nec solum humorum naturalium, sed & contrariorum & febrilium: at dum pus fit, febris augetur & dolor: quare ratio & analogia de pure in abscessibus, in aliis morbis & febribus audiri potest, maxime autem id apparet in empycis: dolens enim pates solidæ, & augetur calor febrilis, qui interdum

in partes omnes expansus erit: Accedit quod inter vigilandum animus occupatur, & vigilium morbi sequitur. Et mens ipsa icte noctu recolligens tota in morbi & doloris cogitationem incumbit: interdum sensus ab innumeris objectis pelluntur, & ista ieiunia & illecebre trahunt animum: Vide Alex. Aphrodisium Probl. 116. lib. 1.

OBSERVATIO X.

Empyema Pleuritidis succedens ante decimam quartam diem.

Advertant juniores, quamquam Hippocr. observatione pleuritidis non ante xiv. diem ad suppurationem tendit, Nostra tamen observatione, non solum in juvenibus, sed etiam viris constantis ætatis, 7. vel etiam 4. id evenire, & evidentiter id detegi rigore & subsequente febre, ab illis diebus invadentibus & singulis diebus recurrentibus: Sic sane in Noh. adolescente rigor febrisque, 4. 5. 6. 7. usque repetentes prænnuntiavit suppurationem.

Diffectio autem eadaveris secundum intra septenarium morbi, in illo factam suppurationem ante perfectam fuisse demonstravit, cum universus thorax pure prægnans repertus esset: Quin memini me vidisse pus in thorace cuiusdam Sacerdotis, qui 9. die extinctus obiit, quod præpostero consilio purgante medicamento usus esset, neglecta v. s. & dilata in sextum, quo sum advocatus. *Carolus Piso de morbis ab illuvie feresa scilicet. in. cap. ix.*

OBSERVATIO XI.

Empyema insigne Sinistri lateris thoracis, nulla sui signa exhibens.

Suppurationum mortuorum secum in quo nulla pulmonis sinistri pars aderat, sed tota cavitas aqua & pure repleta erat: cum tamen per duorum mensuram spatium, quo tempore ab hoc morbo vexatus fuit, nullam respirandi difficultatem, & paucam tussim, sine ulla materię morbificę ejectione habuisset, Attamen scito corpore tota thoracis sinistri cavitas aqua purulenta referta erat. *Dom. Panarolus Pentec. 1. Observat. xlvj.*

S C H O L I A.

Nullam respirandi difficultatem &c.) Incipientis supputationis ista proponuntur signa ab Hipp. 1. Prognost. 1. Sipleuritide vel peripneumonia non expurgata, febris intensior evadat, dum enim pus coactur, febris intensior. Hippocr. Aphor. 47. 2. ij. Rigor, qui fit dum puris acrimonia partes vellicat membranas. 3. ij. Pusum & sensus gravitatis in partem humor enim in cavitate contentus magis gravat quam dum in partem substantiam effusus est: Addit Galen. 4. de loc. aff. cap. 9. fluctuationem, Nam ubi quis, inquit, affatim à decubitu transmutatur, idque maxime si ab uno latere in aliud se convertens defluere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri haud dubia conjectura est. *Hæc Galenus:* Quin etiam in his fluctuatio seipsum non haud obscure auditur, nisi puris crassities aut copia quæ totam thoracis cavitatem impleat, fluctuationem impediat: His etiam accedit Respiratio difficilior: quamvis enim rupto abscessu dolor lateris sedetur, & hinc diaphragma, & thoracis masculi liberius moveri possint, quia tamen pulmo à circumfuso pure gravatur, ut libere moveri non possit, & præterea quedam puris portio in spongiosa pulmonis substantia imbibitur, inde pulmo gravior redditur, bronchiæque à pure imbibito obstruantur, respiratio redditur difficilis: Ex illa etiam puris in pulmonem & bronchia transmissione spurum purulentum exocrit, quod etiam factum Empyema significat: non semper tamen puris excretio fit propter illius crassitatem, ob quam ad bronchia pervenire non potest. *Reverius præf. lib. 7. c. 4.* Aliquod diætorum signorum in illo Empyemate defuisse nihil absurdum erit, ut præcipua & pathognomonica desiderari, historia adquisitionem patit:

An auctoris suspecta fides? An illud Avertois monstrum in morbis sunt, à curatione ad diagnosis transferendum? Paucæ Tussis rationem reddere non adeo difficile est, quia vel humoris non insignis erat acrimonia, qui aëropoculensus referebat, vel quia à bronchiis maxime sensibilibus, precul aberrat, vel quia pulmonis pars sinistra destructa erat & corrupta: Nulla expulsiōis causa quoque non est obscura, Tum ob defectum sinistri pulmonis, ac viarum, bronchiorum nempe simul absumptorum, per quas humor extruderetur, absentiam. Tum ob humoris conditionem, qui aqueus, ac proinde expulsiōni inopertus, quod in thoracis hydropse manifestum: At unde respiratiōis libertas deducenda? forsan ab integritate pulmonis dextri, qui necessitatem ventilatiōis supplere potuit: A compresso tamen diaphragmate, incumbenteque illi gravi pondere, quin dyspnoea aliqua vel gravitatis sensus adfuerit, vix fieri potest, aliquis laborabit scribentis fides: Fluctuatiōis sensus absit ubi cavitas plena est, qualis refertur pectoris cavitas sinistra, percipitur si pars ipsam occuparet.

Thoracis sinistri cavitas.) Locum affectus distinguitur ex iis quæ habentur apud Hippocr. 1. Prognost. 21. Si Empyema, inquit, in altera tantum parte exstiterit, hos convertere ac discere oportet dolere in altero latere, & an alterum altero sit calidius, acque cubantem supra sanum latus interrogare, an videatur sibi onus aliquod delapsæ suspendi: si enim ita esset in quodcumque lato pondus sit, in altero suppuratio exstiterit: Quemadmodum si utrinque calor & paucus sentiantur, in tota thoracis cavitate pus continetur: Addit Avicenna etiam conjecturam, quam depromptit ex Hipp. 3. de morbis, Applicetur,

2 x 2 inquit,

inquit, lineam thoraci madefactam, secundum utramque partem, dextram & sinistram, citius exsiccat, illud quod supra partem, pus continentem, appositum est: Aliud denique signum, ab experientia nostra desumptum proponere licet, quod ab authoribus non fuit animadvertum, Quod nimirum in la-

tere affecto tumor ut plurimum oedematosus apparet, ex tenuiore materiae collectae portione in thoracis musculos residuante: Et quando in suspitione empyematis, huiusmodi tumor, aut inflatio cutis in aliter utro latere apparet, certo pronuntiare licet Empyema intra latere, & apertio lateris tuto fieri potest. *Riverius.*

OBSERVATIO XII.

Empyema pulmonum exulcerationem frequenter sequitur in Phthisicis.

PUls in Pulmonum exulceratione genitum, non solum asperae arteriae ramis illapsum exspuitur, sed & tandem quando ex corruptione Pulmonum substantia dividitur, in pectoris cavitatem influens, illicque sensum coacervatum, atque interdum magna copia congestum, Empyema producit, Quod ab exulceratione hac in phthisicis eo modo prodire Sectio patefacit, per quam in corruptione pulmonum puris semper aliquam saltem portionem, si non magnam, pectori adherere vel innascere deprehendimus. *Platerus pract. lib. 3. cap. 5.*

OBSERVATIO XIII.

Exspitio purulenta à fractura ossis cuneiformis, & sanguine circa id suppurato.

VIt delapsus ex altiore loco, die 4. exsiccatis prius sputis purulentis, obiit. Prope ossis cuneiformis medium sejugatum erat ejus fragmentum, & circumcirca multum sanguinis coagulati, è cuius putredine, pus prodiebat. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

OBSERVATIO XIV.

Exspitio frustulorum carneorum à cordis substantia ulcerata.

Filiæ D. N. (*vide tit. de Hamoptysi*) mortuæ cor albicans visum est, & media sui parte fere excisum, ut fibræ carnosæ semiputridæ avellerentur: Frustula quaedam carnea, huiusmodi fibræ simillima, per sputum rejecerat.

OBSERVATIO XV.

Suppurati pericardium totum fere corruptum repertum est, & cordis major pars exesa.

In suppurato, qui post diuturnam affectionem obierat, observatum est ferme pericardium totum corruptum fuisse, majoremque ipsius cordis, quod adhuc quidem, ob diutius scilicet putredinalem in eo aservatum calorem, palpitabat, partem exesam exitisse, ut quidem ulcus diutius tulisse facile credi possit: *Franc. Rota cap. 23. de Tormentar. vulnerum curatione.*

OBSERVATIO XVI.

Empyema lethale Pleuritidem sequutum, ob neglectum per paracentesin, abscessus apertionem.

NOvi duos lateris sectionem à Medicis præscriptam admittere nolentes, fatum obiisse, eorumque cadavera dissecui: Item binis aliis operationem istam adhibitam vidi, quorum unus convaleuit, alter tabidus interiit: Cujus tamen ratio erat, quod pulmonem insigniter viciato, & vitibus prostratis, lateris apertio serius facta nullum juvamen liti contulit, sed spiritus prius imbecilles depressit valde, eorumque corpus absumpsit: Ille, cujus aperiebatur latus, pulmonem satis firmum habuit, sed à Lateris abscessu in eum rupto, materies in thoracis cavitatem decidens, septum adeo comprimebat ut vix respirare potuerit. Chirurgus sine caustico, inter vertebam sextam & septimam scalpellum intravit, & carne penitus perforata cannulam indidit: Ichor cruentus primo effluxit, & dein per vices in modica copia exemptus, per triduum sine fœtore quovis effluxit; postea vero quories foramen aperiretur, odor teterimus expirabat per plures dies persistens, donec per injectiones ex myrrha & herbis amaricantibus, aqua & vino incoctis factas, & sæpius quotidie adhibitas, tandem extingueretur: quorum usu diuturno materia morbifica, & fœditie omni demum ablata, effluxus omnis cessavit; & denique foramine clauso, paries integre convaleuit: Illorum qui, cum Lateris apertionem admittere nollent, interibant, cadavera dissecui. In uno pus ab apostemate in pleura & musculis intercostalibus excitato, in eisque disrupro emanans, loci affecti & pulmonis contigui partem sphacelo affecterat, indeque diaphragma corrodens, & foramine in dextro ejus latere facto, in viscera ipsi ventris descenderat, ibidemque toto ductu ventriculi & intestinalium turriculæ exteriores, in quas materies purulenta descenderat corrosæ & discoloratae

lores apparebant: Et demum materies purulenta intestinum rectum corrodens & perforans, una cum excrementis per anum foras prodibat: Aegrotans robustus & medicina cuiusque impatiens, morbi huius tyrannidem per duos circiter menses sustinuit, sed interim febricula, Sitis, Inquietudine, ventriculi molestia, & crebra subversione, appetitum sepe continua miserrime affectus debebat.

Cadavere post obitum aperto, odor fetidissimus cloacam omnem superans per totam cameram diffundebatur.

Alterius ab Empyemate defuncti anatomie, non ita vastam materię purulentę diffusionem exhibebat: Illa quidem in latere nidum habuerat, unde in thoracis cavitate decidens, ibidemque congeniti ingesta, & continue pulmones immerfos polluens, febrem lentam, & quasi hecticam, à qua æger valde senex interit, excitabat. *Prüß Pharm. rat. p. 2. sect. I. c. 10.*

S C H O L I A.

Feblicula, Sitis &c.) Morbi huius prognosis tum ante, tum post sectionem intulitur: Prius determinat utrum latus aperiri debeat necne; item prædicat cujusmodi, cum vel sine apertione, morbi eventus futurus sit: Si Empyema tardius post primarium affectum, scil. non ante xxx. aut xl. diem, quando vires plurimum auctę, atque pulmones vitiani sunt, eorumque conformatio laesa, succedet, ac insimul si fibris velut hectica persistet, respiratio brevis ac laboriosa, pulsus debilis & celer, cum odore frigido, cumque diarrhoea velut colligativa, & crebris spirituum d. liquis, tunc empyici status plane deploratus sectionem minime admittit: Medicus tum si non lucuente mori, ne videatur occidere: Sio vero

è contra, post manifesta empyematis maturius facta indicia, pulmonum aut lateris molestia, nec non febris aliique symptomata remittent, atque pulsus & vitium robur constabunt, licebit tuto ad sectionem procedere, indeque successum felicem sperare: Sectione facta, si pus album, vetum, bene coctum, aut alias laudabile cum euphorcia exiit, & exinde pectoris gravitas & dyspnoea remittit, & ægrotans quoad alia pericula habet melius, de therapia minime dubitandum erit: Sio vero pus nullum aut maleum, si coctum, subcroentum aut fetidum ex latere aperto effluet, periculis inde salutaris spem concipere licebit.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI SECUNDI.

S E C T I O VII.

De Tabæ in genere & Pulmonari.

O B S E R V A T I O I.

Tabes non ob solum Pulmonum vitium excitatur, sed sepe Viscerum aliorum & Sanguinis sequitur.

QUOTIES vidimus à scirrho in Liene, Hepate, Pancreate aut mesenterio excitaro: ab Inestini cuiusdam, aut etiam Renis, Uteri, aut Vesicę ulcere, vel tumore cancroso, aut alias eacoeche, absque notabili pectoris aut pulmonis vitio, Atrophiam lethalem successisse?

S C H O L I A.

Phthises & Tabis vocabula propria significatione solummodo denotant Atrophiam, sive contabescientiam solidarum partium cum debiliatę vitium: Cujusmodi affectio quamvis sępenugeto à Pulmonum unitate soluta sive ulcere procedat, quandoque tamen sine horum vitio, aut mera sanguinis, aut præcipue iucci nervi culpa, totius corporis extenuatio sive contabescencia exoritur: Generales igitur huius morbi rationes exponendę sunt, & ostendendum quos modis, & quibus de causis humorum dyscrasie totius corporis atrophiam quasi tabidam inducere solent: Enimvero ipsa Tabes pulmonatis non proxime ac immediate à vitio illius

ulcere aut corruptione procedit; verum citius quatenus sanguis inde labem contrahens, & summe inquinatus, propterea virtutem suam ostensivam peritus amittit: Porro tum hæc, tum insuper *Liquor serosus* ob multas alias causas diathesio talem *Atrophiam* acquirit: Et primo quoad *Sanguinem*, sępenugeto advertere est quoddam sine tussi, & citra apparem in pulmone aut pectore vitium emacerescere; & in dies solite carorum molis dispendium pati: interea ut circa appetitum, digestionem, somnum, & fere totius functionis naturalis, imo & animalis economiam mediocriter habeant: arameo quasi alimentum receptaculo uique perforato infunderent,

minime nutritionem verum invitis omnibus dieteticis regulis tenum conturbantur. Cujusmodi affectus ratio formalis, live cojuncta, in numero tantum in eo consistit, quod sanguis insigniter depravatus succum alibilem sibi jugiter suffulsum, assimilare nequit, quare ipsum non modo protinus amandat, sed etiam soliditatem partium particulis delibat, quas in se rapient statim foras profundi, vel in diverticula egiit, vel evaporando absumit. Sanguinis depravationes, live status degeneres, Atrophiam inducere solent, vel in propria ipsius dyscrasia consistunt: vel ipsi aliunde, & quidem præcipue, aut à Visceribus, aut à Liquore Nervo etiam degeneri, communicantur. Propria ipsius dyscrasia triplex existit, juxta quod particulas Salino acidas, aut Sulphureas & summe acres, lupis modum exaltati & præpallente cæteris contingit: Enimvero cruor interdum ab indole sua genuina scilicet dulci ac volatili, in acidam facilius: prout in Scorbuticis quibusdam, melancholicis & cachecticis passim cernitur: Quaspropter succus nutritivus, perpetim in massam sanguineam assulsum, si quidem assimilari & partibus solidis apponi nequit, turpis brevi relegetur, acque vel protinus per urinam, aut sudorem aut diarrhoeam amandatur: vel intra carnes aut viscerum cavitates aggregatus, hydropem infert, cujusmodi Affectus, in malum statum evectus, effectus odiosior solet esse, quod cum aliquæ partes valde intumescunt, aliæ plurimum extenuantur: 1°. Porro subest alter sanguinis status & triplex, hinc plane contrarios, quando nimium iste supra modum calidus & sulphureus, proindeque immunitur semper est gravis, est et viscerum live accensione sua succum nutritivum absumit & nimis evaporari facit, adeo ut partes solidæ debito ejus peno defraudantur emacescant: Diaboli h. ic obnoxia vaia habent ampla & ex parte plurimum distenta, carnes vero emaciatas & præ calore induratas: quantum taliter affecti raro ad mortem ulque insubecunt, attemen citius coniescunt & plerumque brevius vitam finiunt. 2°. Sanguis non tantum ex propria indole, sed insuper ubi tabem aliunde, & præcipue à visceribus, vel iacuo nervo communicatam non raro tabificus existit: Et 1°, hoc viscerum culpa crebro accedit: hæc enim male affecta chylum, sanguinem convellendum, interdum hæc sine coquant, sæpe item pervariant, ac fermenta earum & heterogeneis inquinant: Intantum ut hæmatocis & nutritionis munera frustra curant. Porro interdum ob vaia chyli facta in eis obstructa, etiam multum comedant, parum tamen aut debito minus, in massam sanguineam coevellunt:

Insuper in coctionis visceribus nonnunquam tumores, abscessus aut ulcera contingunt, a quorum portulagine sanguis inter manendum infectus, reliquum ipsius massam contaminat ac operi nutritio ineptum reddit. Quinimo tumores, abscessus, aut ulcera atrofica vel canerosa in partibus externis, & præcipue in dorso contingunt, frequenter etiam talem asferunt. Quorum ratio facile patet, quatenus nimium in ejusmodi affectibus, tum succi nutritii copia ingens ad partem affectam per arterias advecta, ibidem vel tota impenditur, vel inde foras profundius, in tantum ut cæteræ quæque totius corporis partes debito peno defraudentur: tum insuper quod materies virulenta, aut valde incongrua, illis generis & aggregata in ventris refoberetur, quæ sanguinem tabo impuro inquinat, proindeque ad nutritionis munus obviandum proficius inhabilem reddit. Nec longe à visceribus & partibus solidis, sed insuper à succo Nervo sanguinis labes, (obquam & triplex existit) non raro communicatur. Si quando enim hic laeæ à crasi genuina, scilicet dulci ac volatili, in acidam degeneret, subinde è fibris ac partibus nervæ exandans, inque sanguinem restans, liquorem ejus præcipitat, inque fluore cogit, quibus omnis materies nutritiva ejicitur, & modo per urinam aut sudorem, modo per vomitum aut diarrhoeam profundunt. Cæterum ipse liquor Nervus interdum per se, ab indole sua desiccatus, & in crasi vitiosus, atrophiz causa existit, quod item bimis efficiendi modis fieri evenit: Enimvero succus iste plurimum vitiosus & degener, quæ rapidas & effluens evadit, proinde ut fibras tum nervum tum carnes non satis ædoret & spiritu animali irradiet: quaspropter ubique in solidis partibus, aut vitiosus moriva, sic etiam nutritiva deficit: Hinc aut totum corpus, aut membra quæpiam, vel partes ejus, paralyti aliquando affecta tandem emacescunt. 2°. Porro item notavimus plures febres lentæ (live & triplex à nobis dicta) laborantes, statim oblanguescere, & dein brevi tempore plurimum emaciari. In utroque casu ratio eadem aut analogia assignari debet: quippe ostensio alibi quod spiritus animales, una cum liquore nervo, eorum vehiculo, (qui tenuissimis istis masculinis est) humorem nutritivum ubique juxta partes solidas aggregatum, quasi semen fœmininum adstant, inque opus nutritivum quasi fœcundum reddunt: Id præsertim, si quando liquor iste Nervus, aut vapidus, aut depravatus sit, partium solidarum moles quasi sterilibus facta emacescet, p' illud Pharm. & p. 2. sect. I. cap. 5.

OBSERVATIO II.

Phthisis à pluribus pulmonum ulcusculis, Vomica in eorum dextra parte, &c.

Affectus de quo Sereniss. Princeps Carolus Fridericus Marchio Badensis, &c. præcipue conqueritur, est *Dyspnoea* quædam tum molestissima *Tussis*, quæ tum imprimis evenit quando corpus aliquot passibus ambulando & accelerando moveretur: Causa hujus mali proxima, seu morbus à quo pendet, tum nomen affectui impertiet, tum omnem curam & sollicitudinem Medicorum ad se trahet. Quoniam habitus corporis consumitur, Pulsus frequentior & celerior est, nec non manifeste purulenta tussi ejiciuntur, supervacuum erit inquirere num Tubercula cruda vel Lapilli in pulmonibus? Anne vero catarrhi ab bronchiâ tuentes hujus mali authores forent? etsi forte negari non possit Tubercula cruda hanc calamitatem præcessisse, & nunc catarrhos purulentæ per tussim ejectioni accedere: sæpe enim paucillum puris, multo sputo pituitoso pellucido involutum, conspiciuntur: imo his diebus vidimus uvulam elongatam, & fauces rubicundas à sero acri hæc loca alluente & exasperante: Potius operæ pretium erit indagare unde pus hoc proveniat, an ab Empyemate? num à vomica Pulmonum peculiari folliculo vestita? an vero à substantia eorumdem

eorundem primum indurata & tandem suppurata? Empyematis latentis suspicionem movere posset pleuritis S. P. mense Aug. anni 1673. affligens, quæ nec spûti ejectione, nec sudore nec aliter judicabatur, nam ab illo tempore tussis & dyspnœa inceperunt, magis magisque increverunt, & huc usque perdurarunt, verum licet hæc indicia suspicionem Empyematis probabilem reddant, neutiquam tamen illud evincunt: nam S. P. à mense Augusto prædicti anni, usque ad principium Aprilis anni 1675. obambulavit, equitavit, castra sequitur est & præliis interfuit, imo utcumque dyspnœa cum tussi post motum molestarer, illa tamen protinus cessavit, quando humi decubuit; adde quod in pectore nullus unquam tumor apparuerit, & utrique lateri, situ etiam humili incumbere valuerit, quæ tum præstare tanto temporis intervallo impossibile fuisset: quamprimum enim pus in cavitatem pectoris ex abscessu rupto stillare incipit, in dies augetur, & sæpe brevi ad insignem copiam cumulat, nisi exitus alicubi pateat: nam à congesta puris coluvie pulmonum distensio impeditur, & diaphragma deprimitur, unde summa respirandi difficultas vel orthopnoea subsequitur, & sæpe in pectore, ubi empyema est, tumor excitatur. Vomica apud S. P. intra pulmones potius latuisse, multa sunt quæ fidem indubiam faciunt, nam à Septembri prædicti anni, usque ad Aprilem anni 1675. semper difficulter post motum respiravit, & quamvis multum ac vehementer tussiret, ne gutturam quidem puris egerit, quod signum erat tum obstaculo cuiusdam in Pulmonibus, ob quod usus respirationis à motu aucto non sufficiens aër pulmones subire potuit, tum alicujus irritamini ad tussim inanem impellentis: hoc autem omnino vomica fuisse inde manifestum evasit, posteaquam S. P. thermas Aquisgranenses prædicto mense Aprilis bibere incepit, nam vomica hæc per aquam calidam, atonitis sulphureis imbutam, copiosius haustam, emollita, arque post in itinere rupta, pus tam copiose & affatim exspirat, ut uno atque altero quasi rivulo propulso, protinus novum puris effluvium è Pulmonum bronchiis fauces impleret, illudque sine magna tussi, vel leviculo impulsu, aut simplici screatu eliceret: Insuper S. P. Vomica hac maximam partem depleta, nondum finita cura facillime respiravit, adeo ut scalam concitato cursu scandere voluerit, quod ad hunc usque diem nondum licuit: unde firmiter credit, si post potum aquarum quieti vacasset, aut aliter valetudini suæ consulisset, quin integram sanitatem recuperasset: Vomica exordium præcipue adscribi potest porui frigida, & tunc corpore, cui S. P. nimium indulgit: nam à potu frigido superfluo sanguis subito coagulatur, unde portiuncula sanguinis grumosi intra vesiculas Pulmonum subsistit: adde quod natura sanguinem coagulatum & grumosum, præsertim in partibus principibus, peculiari folliculo quasi circumvallare solet, ne gravius damnum inferat: Interim cum ille sanguis non moveatur, ille in pus convertitur, quod sensim augetur: cum autem folliculi vasis peculiaribus dotentur, ex illis perpetim aliquid stillat, ut ex indole omnium tumorum cum folliculis constat, qui sæpe à minutissimis exordiis ad insignem magnitudinem excrescunt: An verò à mense Aprilis 1675 usque ad diem quintum Novembris, substantia pulmonum indurata, & cavernosa seu sinuosa evaserit: vel ut uno verbo dicamus, Num Pulmones cum labiis duris exulcerati sint, indagacionem seriâ postulat, arque in hujus notitia rei cardo verti videtur. Tale vitium Pulmonibus minatur inesse, dyspnœa post absolurum thermarum potum rediens, tussis vehemensissima, veri puris ejectio, febris lenta pulsus se prodens, habitus macilentus & lassitudo spontanea universalis. Confirmant idem compages corporis valde gracilis, scapulae alarum instar prominentiæ, proclivitas ad febres intermittentes, continuas & malignas, quarum omnium vehementiam non semel S. P. expetitus est: Licet autem in pulmonibus talis adsit labe, illa tamen nondum magna observatur: nam C. P. placide dormit, cetera ullum sterrorem aut sibilum inter respirandum, humili situ utrique lateri pro lubitu incumbit, expergefactus mane parum puris absque labore excernit, nec ad copiosiotem ejectionem post somnum stimulat quod alias phthisicis solemne est, postquam scilicet somni indultum aliquandiu à tussiendo quieverunt: Insuper color faciei vividus est, bene appetit, non sinit, nec sudat, utina prorsus naturalis est cum laudabili sedimento, habitus non valde emaciat, cutis nondum squallida & scabra, nec capilli desunt, vel à pastu corpus æstuat: Quæ cum ita sint apud S. P. ulcus detergendum ac consolidandum, & quoniam à pure inquinamenta sanguinis commiscerentur, quæ febrem consumentem efficiunt, ipsis occurrendum & tabes diligenter præcavenda erit: His indicationibus Deo Beneficente, congruis auxiliorum remediis satisfieri posse spem faciant ætas juvenilis, temperantiæ amor, & labe pulmonum nondum ad supremum gradum deducta, &c. Hæc consulebant Viri Excell. Dn. D. Ioh. Jacobus Wepferus & Bernardus Perzschke.

Posteaquam S. P. per aliquot septimanas remediis cum maximo emolumento usui fuisset, mihi

demandavis ut de valetudinis sua statu & medicamentorum effectu Dn. D. Wepferum certiorum red-
dam, quod sequenti epistola à me præsistum est.

S. P. Ampl. & Exc. Domine, Unanimi consensu inchoata cum S. P. medendi me-
thodus feliciter succedere viderur, nam febris lenta, hæclicæ prodromus, decrementum
sumit, tussis molesta imminuitur, materia per excretionem ejecta raro purulenta obser-
vatur, per duas noctes cum le vamine nihil excreavit, blande dormit, bene appetit ac con-
coquit, & urina semper laudabilis conspicitur, imo in brachiis carnem generari nuper ani-
madvertimus, &c. Dn. D. Ferzsch. 22. Novembrii 1675.

Plurima in literis Tuis occurrunt quæ optima quæque de valetudine S. P. in integrum
reditura pollicentur: plenius apud me gaudium evaderet, si quoque acclivia scandentem
facilius respirare intelligerem: hæc enim ratione persuaderer nullum impercrutabile vi-
riam in Pulmonibus latere, &c. Dn. D. J. Jac. Wepferus 30. Novembrii 1675.

Post transmissam Epistolam statim subsequente die S. P. catarrhus corripuit, unde ma-
jori cum difficultate respiravit, molestius tussivit, copiosius sed sine ulli puris notabili quan-
titate excreavit, & aliquoties capite doluit; Hæc omnia animum meum vehementer dis-
cruciant, nisi apud vos, isto hyemali tempore, catarrhi essent malum epidemicum, Eri-
git animum meum quod prædicta symptomata remittere incipiant, &c. Dn. D. Ferzsch. 3.
Decembr. 1675.

Catarrhos ab anomalia aëris ubique locorum plurimis infestos esse undiqueque auditur:
Symptomata remittentia apud S. P. bona quæque prænuntiant, eoque magis quia sputum,
russi molestissima copiose rejectum, purulenti inquinamenti expertus erat: Maius gaudium
evaderet si intellexero respirationem liberiores existeret, &c. Dn. D. Wepferus. 6. Dec. 1675.

Quatuordecim dierum spatio aliquoties aurumavit S. P. se circa horam nocturnam no-
nam paroxysmi febris tertianæ corripi, hinc prædicta hora sexies illum invisit, sed nullam
febrim tertianam observare potui, pulsus enim raro febrilis, urinæque semper laudabilis
erat, Quæ per tussim adhuc molesta & excretionem rejicit, pauca sunt & illis similia
quorum in consilio mentionem fecimus, imo aliquot noctes transiegit in quibus nihil ex-
creavit: Excrementa alvina sanorum similia semper apparent, si quando fluida redduntur,
biliosa, sed nullo chylo commixta observantur, &c. D. D. Ferzsch. 22. Decemb. 1675.

S. P. febris tertiana immunem esse confido, cum hæcenus nullæ febriles accessiones
à te deprehensæ sint, pulsusque & urina naturaliter se habuerint; quoniam vero in suspicio-
nem paroxysmi febris venit, procudubio aliquod symptoma passus erat quod illam pri-
mo movit: forte horrorem aliquem expertus fuit, qui sæpe evenit quando pus generatur,
quod in virgine nobili hoc ipso tempore animadverto: aliquot enim noctibus, ferme circa
horam ix. horrores perpeffa est, nunc purulenta expuit cum manifesto phthisis incremen-
to: meliora tamen sperabo, quia pulsus est naturalis, purulenta ejection non augetur, & S. P.
aliquot noctes citra tussim transiegit. Dns. D. Wepferus. 29. Dec. 1675.

Necessarium esse duco cursum morbi describere qualem post ultimum meas in S. P. ob-
servavi: Decem sunt dies elapsi quod S. C. cum in conclavi Principis Sybillæ commorare-
tur, circa horam secundam pomeridianam inopinato dolorem, fere per horas duas, pun-
gentem in parte lateris dextri passus fuerit, qui ex præscripto julepo cum aqua scabiosæ,
farsacæ & syrupo papav. rhocados parato, & ungu. Resumptivo Ferneli, cum spermate ceti
mixto eadem die disparuit: verum tussis molestissima mox supervenit, excrementaque
purulenta, compacta & subviridia, non sine aliqua virium jactura rejecit. Ad promovend-
um novæ hujus materiæ exitum, syrup. pectoralem Zwelferi: hedetæ terr. Quercetani: de
althæa Ferneli, & erysimo Lobelii præscripsi, ex quorum syrup. usu facillime expuit, unde
cum illis pergendum esse censeo: An autem nova ista materia ex nuper aperta vomica, vel
ex collectione recenti in veteri sinu vomica, cum per xiv. dies S. P. fere nihil excreaverit,
ortum trahar, iudicio Tuo accuratiori examinandum relinquo: ceterum intra prædictos x.
dies, per duos dies excrementa alvi liquida, biliosa & serosa reddidit, quæ fectorem into-
lerabilem sparserunt, &c. D. Ferzsch. ultimo Dec. 1675.

Sputum purulentum S. P. fuerit, tenuissimum, & consentientia prorsus compactum, non
nuper natum esse his indicis manifeste apparet; quod etiam confirmat dolor punctorius
ævisissimus excretionem præcedens, ipse excretionis modus cum vehementia junctus, &
debilitas illam consequens: An vero ex vomica recentem rupta prodierit, vel in sinu anti-
quo delituerit, & tussis violentia ex latibulo tali productum fuerit, certo definiri non potest.
Ex vomica rupta illud credidisset si sputum cruore tinctum fuisset: vix enim vomica est
cujus folliculus vasis capillaribus non donetur, &c. I. Jac. Wepferus. 29. Januar. 1676.

Prima continuatio Historie morbi. V. E. D. D. V. Vespero Autore.

S. P. habitum corporis macilentum die x v. Febru. præfens observavi, non tamen multo macilentior quam post abitum meum ultimum erat: ante meridie inveni pulsum minus frequentem, celerem & durum; post pastum vero frequentem, celerem, parvum; Tussis adhuc perdurat, & à pastu, corporis motu, extensione subita brachiorum, & diutius continuato sermone frequentior evenit quam mane & noctu: nonnunquam noctu post tussim statim indormiscit, ut mane se tussivisse ignoret. Sputum crassum mane, & quandoque interdum, post unum alterumve tussis actum facile succedit; vetum si ob titillationem quandam in faucibus ad tussim irritetur, ut post pastum & sermonem accidit, diu nihil & tantum mucus tenuis, spumeus cum magna violentia exploditur: Sputum hoc crassum, quod ex pulmonibus procedit, est consistentia crassius, viscidum, tenax, & in fila trahi potest, ac si in bronchiorum ramulis divisis portiones quædam condensatz, & deinde in caverna collectæ fuissent, quæ postmodum ceu in unum bolum conglobatz ejiciuntur: colore est subviride, luridum & turbidum, non foetet, at nescio quem dulcorem odoratum adversum spirat: hoc sputum quantitate non semper æquale existit, notavit D. *Perzsch* illud ab aliquo tempore x x i v. horarum spatii ad 3iii. zvi. ac 3ib. ejicere & ego observavi ad 3i. ultraque quotidie excreta fuisset: Quod sputum ob titillationem majore tussis violentia explodit, spumeum, tenuius & pellucidum est. S. P. etiam mucum viscidum, turbidum, crassum, album & copiosum crebro per nares emungit ac scretate ejicit: Quando se movet, quod raro amplius fit, difficultat respirat. Ab aliquot septimanis semper in hypocausto manet, plerumque decumbit & quidem indorsum, si in latum sinistrum recubet, magis tussire cogitur: dolet frequenter in latere sinistro, maxime inter costam quintam & sextam, quandoque etiam in dextro, sed parte altiore; dolet iste ab tactu exasperatur, quamvis locus affectus nec tumeat nec rubescat: profunde dormit ad plures horas noctu, & mane in multam diem, licet quandoque à tussi excitetur atque exspuat, mox tamen iterum indormiscit, ut plerumque se tussivisse aut exspuisse mane non amplius recordaretur, nisi sputum in vasculo conspiceret. Appetitus mediocris, quandoque satis laudabilis est: à cibo non gravatur, nec sitit ex quo lac sugit, nunquam diarrhoeam passus fuit: Fæces alvi sunt compactæ, subfusæ & subflavæ: urina crassior nunc est quam pridem, & coloratior cum satis laudabili sedamento: Sudavit nuper frequentius, nunc autem rarius sine notabili virium prostratione: capilli plane non desunt: Tactus non amplius tam calidus est quam fuit, nihilominus calor p. n. adhuc circa regionem atetiz in carpo observatur: die 18. Febru. cum noctu ob dolorem capitis in quiete dormisset, mane nares sanguinem laudabilem stillarunt.

Secunda continuatio historie morbi Eodem Autore.

S. P. die x^o. Maii rursus conveni, Facies erat pallida, subcineritia, macilentior, labia rubicunda, non tamen tam rutila ac nuper: habitus corporis tam macilentus apparuit ut vertebrae valde prominuerint, & quemadmodum in proverbio dicitur, costæ omnes numerari potuerint: Pulsus fuit frequens, celer, subdurus, tactui renitens: Respiratio decubuo non difficilis, anhelosa, aut interrupta est: In dextro latere inter costam 4. ac 5. à tactu doluit, tussis frequenter interdum & noctu; sputum ejecit ab aliquot diebus copiosum ad uncias duas, est rotundum, turbidum, subflavum, subviride, aliquando subfuscum, tenax & viscidum, non quidem summopere foetet, nihilominus tamen quandam adversum odorem spirat, qui tum imprimis animadvertitur quando repente ex loco liberiori aëri expositus adiecit, sæpe demum post iteratos tussendi nixus, & tunc quidem pleno ore succedit: Jam ab aliquot diebus non sine molestia erant nares obstructæ, circa os factum exulceratur, perpetuo decumbit, extra lectum diu persistere nequit: quando erectus in sella sedet, amplius ad tussim quam decubus stimulat, appetitus ab aliquot diebus prostratus rediit, impense non sitit, diarrhoea ab aliquot diebus valde molestia fuit: die 1. x. Maii vesperti alvum exonerans, ob diarrhoeam prope in leipothymiam incidit: die x. fæces adhuc liquidæ & aliquomodo pultaceæ erant, quibus frustula alba ceu fragmenta amygdalarum confusarum immixta erant: die x i. nunquam dejecit: die x i i. fæces naturales compactæ sed flavas absque molestia reddidit: urina ab aliquot diebus cito turbatur, clarificata crassum sedimentum retinet, quod etiam statim post emissionem observatur, dum adhuc clara est. Ob tussis vehementiam, statim post pastum invadentem, nonnunquam assumpta evomuit: Sudor nocturnus aliquoties molestus fuit, non sine virium dispendio: die x i. & x i i. Maii sudor sere nullus apparuit, posteaquam marie & vesperti spina dorsifequente linimento inuncta fuerit, *℞. Vngu. rosat. Mesnes, refrigerant. Gal. ana 3b. ol. violar. q. s.* Capillorum nullum defluvium advertitur: Naribus attracto lacte, cum succo semo

peruvii

pervivi & syr. violar. mixto plurimum mucii pellucidi è naso & faucibus proleptum fuit: Post pastum animadverti zelum pungentem, præsertim in vola manus. Jam diu *dextro lateri soli aut dorso incumbere* valet. Si in sinistro cubet magis tussite cogitur, nuper hæmorrhoidibus dolebat: XII. Maii roto die & noctu capitis dolorem sensit, inde XII. mulem sanguinis emunxit: Dum ad alvum solvendam surrexisset, ejecit citrà tussim solum siccum sputum purulentum, ac si bronchia pulmonum pure plena, & sursum unico hoc motu protrusum fuisset, quamvis nec vox rauca, nec respiratio cum sibilo observetur, nisi sinistro lateri incumbat, tota nocte dormivit & nihil tussi rejecit: die XI v. Maii, dum post lævis suctionem tussire & sputum purulentum excernere cepit, cui parum cruoris admixtum fuit.

Tertia continuatio historię morbi Eodem Autore.

S. P. die XVIII. Aug. denuo conveni, & non plus emaciatum observavi quam erat ultima vice qua ipsum reliqueram: Labra fuerunt rubra, pulsus frequens, celer & parvus, respiratio satis libera erat dum decubuit, unde clara & mascula voce loquebatur instar sui absque ulla raucedine: decumbere potest humiliter, non alte, facilius tamen in sinistrum quam in dextrum latus, sputum adhuc est turbidum, subflavum, crassum, aliquando fluidum & nonnunquam cruore tinctum. Urina habet sedimentum copiosum naturale: appetit egregie, ut duos pullos in pastu comedat, non multum sitit, fauces tamen quandoque exarescunt, quas aquæ pauxillo facile humectat: nates obstruunt frequenter ab exsiccatu mucos, alvus non est fluida, corpus non sudat: A decubitu non amplius excoriatur, quod imprimis emplastro de spermate ranarum præcaveatur: nates nonnunquam irritatæ sanguinem stillant: insuper observavi S. P. largiter comedere, nam in quolibet pastu assumit jusculi, confuso carniū & pane trito imprægnati, libram dimidiam: deinde edit pullum asinum integrum & elixum fere totum; quandoque simul cancos elixos, pulpam pomorum & pyrorum pasta farinacea infusam, placentulas & fustum panis quatuor unciarum pondere: bibit suum decoctum in pastu mediocriter, quandoque extra pastum sumit unum alterumve haustum: comesta retinet, & licet ob vehementiam tussis quandoque portionem evomat, illa tamen centesima vix assumptorum pars est, eadem exacte concoquit, ut ex fecibus & urinis laudabilibus colligitur: utcumque autem strenue comedat, habitus tamen corporis nulla incrementa sumit, & post pastum semper nunc plus nunc minus invalescit. Denique adverti spatio XXIV. horarum insignem quantitatem puris in pectore cumulatam fuisse, qua per validam tussim excreta, nunc cum dolore lætæris punctorio, nunc immixtis stris cruentis induci concedebantur, & per horas plures, etiam XII. à tussi liberius respirabat, ac mascula, clara & sonora voce, nonnunquam etiam cum quodam impetu loquebatur, sæpe citrà ullum ad tussim irritamen, quod ante sputum purulentum reiectum non licuit: Imo illo adhuc copiosiore existente, animadverti levicula ex causa tussim concitate, inera asperam artetiam stridere, respirationem difficilem efficere, vocem aliquomodo raucam reddere, & si nimis fluidum sit, suffocationem intentare, imprimis paulo post pastum, quo tempore semper pus fluidius comperi, nam longius post pastum maxime somnum protraherem, crassum est, & uni alterive impulsui à tussi promptius cedit, ac sine magna vi portio in globum compacta expellitur.

Superest ardua questio decidenda, num liceat S. P. Basilea Rheinhovium proficisci: Iter hoc summopere dissuadere videntur I°. vires debiles, quas impetinis prodiit difficilis tolerantia brevioris etiam moræ extra lectum, pulsus frequens, celer, parvus & habitus corporis valde attenuatus, inde ob motum & succussionem vix evitabilem spiritus magis disparentur, ut facile leipothymia, aut ob spirituum vitalium paupertatem periculosa syncope acceriri posset: deinde magna adest in sinibus Pulmonum post vomitum relictis, copia puris, quæ ab eadem corporis & pectoris concussionem commoveri, & uno impetu ad præcipientes bronchiorum ramos præcipitari & suffocationem intente valeret, denique aer in via varius non parum pulmones turbabit variæque sputum immutabit, imprimis hoc tempore autumnali, in quo semper anomalus est, cum è contra S. P. hæcenus aëri sicco, phthificis utilissimo assueverit, adeo ut vix sine manifesta noxa toleraturus sit aëtem humidum & uculosum, pulmonibus alias aggravatis nocentissimum, &c.

Sapientissimi Regum effatum & omnibus Christianis diligenter perpendendum Prover. 16. 9. reperitur, *Animus hominis excogitat viam suam, sed Jehova statuit gressum ejus*: Hujus veritatem proprio suo exemplo comprobavit S. P. nam universo apparatu itineris absoluto, excogitavit viam suam proxime Rheinhovium ingredi, sed præpotens Jehova statuit gressum ejus, cum enim 5. Octobris die circa horam 3. marutinam irritus tussiendo conatus longam

tus longum durasset, è rupto vase pulmonico *inopinata lethalis hæmorrhagia* successit, quippe uncias duas sanguinis floridi & spumosi per pulmonis fistulam tussiejecit, unde ex præsentanea suffocatione S. P. huius mundo vale dixit.

Impetrata superiorum venia, mane, ad causam morbi & mortis plenius & planius indagandam corpus evisceratum fuit: Aperto thorace, Pulmo cum impetu quasi profiliens, ibipendens in modum inflatus, universam pectoris cavitatem implevit, cuius tota pars dextra à lobo superiore usque ad inferiorem, sinistra pars autem ratione inferioris lobi tam firmiter pleuræ & colli annata erat, ut non sine labore illas separaverimus, quod factum S. P. cum Divo Ferdinando Imperatore, & Francisco primo Rege Galliarum commune fuit. Exemta Pulmonis compage, observavimus fere ubivis istam naturali sua textura, spongiosa nempe & rara, orbatam fuisse: Etenim tota illius superficies innumeris ulcusculis, instar acinorum, quos pro Marcelli Malpighii veticulis orbicularibus dilatatis agnovimus, obfessa fuit, intermedia saltem sinistra parte Pulmonis sana: In quibusdam cavernulis sanem recentem invenimus, in aliis plurimis pus fetidum colligebatur, unde dubio procul contigit quod S. P. aliquando à duobus vel tribus septimanis, citra ullam respiratoris difficultatem, & tussis molestiam, parum puris eiecerit, sedque tunc temporis extra jactum lethiferi teli positum esse sibi firmiter persuaserit. Porro cum multa cavernula in bronchia, sive fistula Pulmonum, aut asperæ arteriæ ramulos, manifestum aditum habuerint, mirum non erat aliquando post mediam noctem, ætius autem summo mane, pus compactum & globosum ad uncias usque duas à S. P. eiecisse fuisse, Etenim tale in prædictis asperæ arteriæ propaginitibus nimium dilatatis perspicue apparuit. Insuper in dextra pulmonis parte Vomicam, nuci moschatæ æqualem, pure fetidissimo repletam, nec non vasa Pulmonica ampliora & turgentiora, sanguinemque per pulmonem hinc inde dispersum notavimus, ut de vasculi pulmonici ruptura dubitandum non sit: Fistula Pulmonistum sanguine florido, tum grumoso repleta erat, unde causa elucescit cur ultimus naturæ agon nec per dimidium horæ quadrantem duravit: Cor nectaris vivifici fontem deprehendimus nulla singulari labe infectum, nisi quod parenchyma illius non ita solidum, sed propter morbi diuturnitatem paulo laxum fuerit: humor scrofulosus in pericardio copiosus erat: unde manifestum perpetuæ veritatis non esse sententiam illorum, qui statuunt humorem hunc pericardii in hædicorum cadaveribus exiguum reperiri. Aperto abdomine viscera principaliora, ventriculus, mesenterium, hepatis, splen, renes reliquæque infimi ventris partes, ab omni morbo liberæ inventæ sunt.

S C H O L I A.

Quæ propter ex prædictis elocescit clarior, quam radiis Solis esse solent cum sudum est, stupendum libum eorum cum pleura in dextro latere mortem S. P. acceleravisse, quum in istis validis accretionibus Pulmones rite se costringere, ac materiam purulentam in bronchia exprimere nequeant: vitæ enim eorum consistentem ope nervorum Pulmonibus ineffe accurate, ut omnia, demonstrat accuratissimus Anatomus Thomas Whistlæ in sua cerebri Anatomia cap. 14. cujus verba, lectu dignissima, utramque de vero Pulmonum morbo paginam absolutionis huic subnectere non ingratum erit. E cordis regionis truncum nervi parvi vago plures ramos insignes utrinque dimittit, qui in omnes quatuor versus Pulmonem lobes, trachea bronchia ac oesophagus juxta descendens ramiculæ diffunduntur, qui rami in pulmones abeunt, ubique per totas illorum compages arteriarum & venarum ramificationes, atque bronchiorum ductus effugantur: quos equidem sanguinis ac aeris canales in toto illorum tractu varie superfundunt ac circumagunt: Quædæquidam autem insignes nervorum ramificationes pulmonibus impendunt, moram ipsi operi ad immobiles singulas ac per se immobiles statuunt: Quippe receptæ opinio est illam Pulmonum receptaculorum à thoracis motu omnino procedere, ejusque dilatationi & contractioni necessaria quoddam dependentia obsequi, nempe potius dilatatum solum ritu aërem ambientem in tracheam cogere, qui in pulmones irrumpit ipsi inflet ac descendit, deinde eodem pectore vitæ subsistit, Pulmones ipsi pandere compressis aërem prout introrsum datus exspirare: Reverti utrumque existimant, diaphragma ac pectus musculi

respirationi multum conducere, tamen partes illas hoc munus solitarie persolvere, & pulmones rite passivos esse minime concedo: nam respiratio sanguinis ac cordis gratia principaliter insinuat, ejusque alius pro varia horum crassi determinari, & pro multiplici pulsus necessitate fere quatuor hora minuta alterari solet: ac verò ipsi pulmones sunt (ac minime diaphragma aut thoracis musculi) quos sanguis corde effluens pertransit, & juxta temperiem suam & pulsus tenorem continuo afficit: quare hinc concludere licet ipsos pulmones primo mutuum suorum instinctum concipere & prædictorum nervorum ope sese aliquantulum exercere, atque system & distalem moveri, easque juxta propria necessitas sensum designare: cum vero du fibra pro muta locali designatione desint, ideo diaphragma & thoracis musculi pulmonum receptu à respiratio succurrantur, atque horum sententia respiratio completa efficitur: cumque adeo nervi duplici generi nempe quidam à summa diaphragmatis & thoracis musculi infertur, alique à pari vago in pulmonum distributi organa respiratoris afficiant, proinde sit ut ipsæ respiratio alius per se alacris & rotundioribus, pro latius nostro aliquantulum sublevari, interrupti ac diversimode alterari possit.

Hæmorem hanc pericardii, &c.) Viri Clarissimi Dni Victoris Schneiders lib. 2. de catarrhis cap. 9. asserit se contrarium semper offendisse, pluribusque experimentis hoc verum cognovisse: Idem confirmant Viri Clarissimi Christophorus Majors, & Joh. Daniel Hortius: Ille quidem illiciter, ad ipsum datus, hic observat: Anatom. 7. hoc idem confirmatur. B. J. in casibus observat. 2. Observat. 100.

Respiratio

Resolutio primæ continuationis morbi) In Pulmonibus ulcus lætissimè viæ amplius dubitare sinebat spem purulentum, quod tussis rejiciebatur, respiratio difficilis à motu quocunque, dolor lætissimè præcipue similitudo decubitus in latera, maxime sinistrum, difficilior, pulsus febrilis, imprimis post primum, calor circa arteriam in corpore, & habebat universi corporis macilentus: Ulcus hoc sordidum fuisse demonstrant pus satis copiosum (nam per plures septimanas quotidie ejiciebatur à gl. à 3. b. idque non raro) turbidum, obcurum, viscidum, viscidum, crassum & globosum, non quidem fetidum, ut nescio quem dulcorem redolens: hoc porro confirmant respiratio difficilis post motum quemcumque, dolor usque ad costarum interstria pertransiens, qui ab attractu exacerbebatur, & denique febris lætis signa. Quomodo pus in Pulmone generetur, non ingendus est Arctius pulmonem imbecillis, seu Vulcanum corruptor, ut illum vocat Helmontius de *affinitate & tussis* §. 10. ut nescio quod peregrinum fermentum alimenta depravata, cum ejus generario commodè explicari possit, si ulcerum, maxime in partibus membranosis consistimus recte attendatur: Nimirum in ulcere pulmonum, prout etiam in aliorum partium ulceribus fieri solet, textura parenchymatis perventur, Vesicularum, ex quibus Pulmo componitur, membrana tenuissima, araneam tela similes partim crassescunt, & vel decuplo crassiores fiunt, partim pertumescunt, ut ex plurimis vesiculis minui una vel plures amplæ cavernæ resiliunt: capillamentis extrema arteriolarum extendunt & magis partia redduntur, ut plus succi nutritii in cavernas effundant; externa venarum capillaria & valvularum lymphaticorum oscula, vel obliterantur, vel non coherent amplius cum capillamentis valvularum alimentum afferentium, unde superfluum non resorbetur, sed in cavernis stagnat, & quoniam pus exulcerata semper inflammata & caloris p. n. prædita est, illud quod stagnat facit inspissatur ac lentorem contrahit, simulque turbidum, subviride & globosum existit, quia diutius intra pulmonem calidiores, plurimoque sanguine turgentes in cavernis detinetur, quod etiam foret si longiori mora his in locis subsisteret. Idem quia pulmonibus molestem est, tussim excitat, & quia cum ob illius copiam & lentorem, tum ob vesicularum crassescere, & ductulos abolitos aër sufficiens pulmones subintrare nequit, respiratio difficilior redditur, implem si usua auctus plus aëris postulet: Insuper quo prætor est succi nutritii, eo pejus & copiosius pus producit: Pus non evadit in hoc affectu, non solum propter erroris externos, sed etiam ob febrem lentam semper ejus comitem, imo ab ipso ulcere pulmonum: nam sæpe caperimus à cancro, scrophulis exulceratis, pædanthracace, & aliis ulceribus chronicis ac dyspeptis, totam massam sanguineam ita inquinari, ut quamvis cancer extirpetur, & hæc ulcera consolidentur, nihilominus alibi ulcera pessima notat, aut alii morbi graves emergunt, unde quo diutius pulmonum ulcus assiderit, eo difficilior curatu redditur: Hanc succi nutritii depravationem ipsimet Helmontianè agnoscere cogimur, dum in hoc, & similibus morbis, aurum horizontale suum aliisque panacæas commendat, quæ si laudem merentur, illam inde consequuntur, quia universam sanguinis massam emendat: quia enim perinde debet hæc dyscrasia acuta iustitiam quodam

ad locum affectum proficisci, & ibidem particulare hoc vitium propellere. An vero omne ipsum quod S. P. tussis rejiciebat, ex ulcere transilludat, interque illius cavitatem colligebatur? dubium mihi videtur: Valde probabile est tempore formæ multum ex succibus per laryngem ad pulmonem delapsum fuisse, nam mucum crassum, album, turbidum, aliquando erore mixtum C. S. tunc emungebat, tunc siccum prolucibat, & insuper profusum deormibat, ut etiam exasperationis noctu sæpe sæpius obliuisceret. Quia ulcus sordidum erat, & insuper tanto temporis intervallo massa sanguinea non mediocriter inquinata erat, unde habitus corporis etiam in ipsa lætissima cura adhuc nullum incrementum sumpterat, inde curatio difficilior reddita est &c. *Joh. Jac. Wesserus.*

Resolutio continuationis secundæ histeria morbi) Quamvis S. P. à principio Martii usque ad finem Aprilis parum, & quandoque per unam alterutrum diem nihil purulentum exspiroit, nihilominus tamen post intra prædictis lætissime obcurum est: non potuit, quia semper adhuc febris lente continuavit, cum totius habitus emaciatione & imbecillitate quadam, ob quam extra lectum diu persistere nequit: Pus tamen hoc non detinebat in cavo pectoris, nec in ulceribus in bronchiis apertis, nam post retentionem spuri à tot septimanis, respiratio non difficilior reddebatur, nec cum stertore aliquo fiebat. Potius credibile est vomitum aliquam deterpente ruptum fuisse, nam copiosior rejectio puris subito evenit cum raucedine, forti & vehementer tussi: non fecit, quia undique membrana coarctebatur, stertor autem non emanasset si vi quadam fuisset detentum, & liber aëris aditus ad illud parisset: Interea oportet labem in pulmonibus insignem fuisse, nam a. pus turbidum, luridum & crassum copiose ejecit, cum in habitus corporis emaciatione, languidissimis alimentis hædentes refecto, minus resistere debuisset. Deinde febris lente continuavit, ut ex pulsa, emaciatione & languore vitium apparet, ob quem extra lectum permanere nequibat. Color vividus faciei magis periclit, nam fere cineritius erat, & versus livorem aliquotem vergens, imo febris neper incrementa sumptisse videbatur, ut hoc probant sudores sæpe colligativi. Diarrhæa biliosa, cui pinguedo insuavit, cum urina tincta & turbida; fæte sudores, qui in hoc affectu plerumque funesti sunt, adhuc continuabant, nisi insuptione spinæ provisum fuisset. Narium obstructio à mucro exsiccat, debetur etiam calori p. n. quoniam ille à vapore calido è pulmonibus emissio inducitur. Cessante diarrhæa ventriculus rursus bene concordat: viscera sanguificantia etiam suum officium præstare, quippe sanguinem laudabilem generant, ut ex rariis hæmorrhagiis patet, quamvis negari nequeat illum calidissimum fuisse. Tandem cum omnes sensus vigere, crebro nulla noxa adscribenda erat, &c. *Idem pagina 198.*

Tertia Resolutio continuationis histeria morbi) Ex omnibus illis ita superque colligitur Simus Pulmonum exulceratos quotidie multum pus cumulasse & produxisse, tum ex chylis recentem sanguini adfecto, tum ex sanguine ipso: Insuper clarescit spiritum purulentum collectum pulmonibus molestem fuisse, & ad tussim valide stimulare, nec quietem concessisse donec maximam partem rejectum fuisset. Num autem portiones purulenti ex

simibor

finibus pulmonum ulcerosis refoverentur? valde mihi probabile videtur ex totius habitus consumptione, incallescencia post passum de virium languore, ob quem diu miram extra lectum tolerare non poterat, multo minus incedere valeret: non tamen

sanguini multum de pure permixtum fuisse credibile est, cum S. P. egregie appeteret, bene in ventriculo & intestinis concoqueret, venter in lecto apparet, & naturalia vesicæ & alvi excrementa redderet &c. *idem, pag. 289.*

OBSERVATIO III.

Phthisis à Pulmonum putredine, costis adherentium, cum ulceribus variis.

Mense Augusti 1553. cum Domina de l'Aubespine gravida esset sexto mense dimidio, citra vim ullam, citra destillationem, aut nullum antecedentem, coepit derepente sanguinem expuere & educere de pectore cum stertore; sed sine magno conatu: Tum temporis coepit & sanguis è naribus profluere ac interdum relabi in fauces, quum hac imprægnatione nondum fluxisset, licet venæ supra modum turgenter, essetque aliis imprægnationibus fluere consuevit: Exactis diebus quinque desit & constitit expulsiō cruenta, nullis tamen sicca derelicta est sine stertore, sine difficultate spirandi: In partu nullæ aut parvæ purgationes eruperunt, quæ postea syrupo de hyssopo proritatæ sunt, Quinto die à partu febris atdentissima exercuit biduum, cujus vi leviusculus lateris dolor obortus est: Hinc lenta febris non admodum manifesta perseveravit & in dextrum latus decubitus: Paucis hinc diebus gravis destillatio è capite procubuit in scapulam sinistram, simulque in extremum omoplætæ dextræ, & in eam sedem lateris quæ jam ante laborabat: Sexta tertio vena à medicamento, scapulæ & omoplætæ dolor desit; Perstitit vero in latere altero conjunctus, qualis etiam nunc perseverat, abhinc semper difficilis fuit dexter decubitus & respiratio etiam si nihil sanguinis emanet: Ex his constare potest primam sanguinis eruptionem, neque ex rupta, neque ex erosâ, sed duntaxat ex aperta vena factam, ob immoderatam sanguinis copiam, Idque in solo dextro Pulmone, è quo in dextro decubitu sanguis stillare percipiebatur: Accessisse postea destillationem, quæ dextrum latus occupans facta est doloris causa: ut idcirco complexus sit duorum affectuum, quorum unus est in Pulmone, alter in dextro latere: Præter hos affectus Jecur etiam calidius est & obstructum, cum levi dolore & tenientia: Ren etiam dexter interdum nephritico dolore fatigatur.

Supra descriptus affectus Dominam de l'Aubespine jugulavit, nam Febris lenta illam recessavit, repetitque lateris dolor, sputum cruentum, cum majore spirandi difficultate: Dissecto corpore inventi sunt Pulmones putres & costis adherentes, cum ulceribus variis, *Fernelius, consilio 21.*

S C H O L I A.

SEn Responsum ejusdem Fernelii ad disam hysteriam morbo, ab eo scriptam dum differendum illi esset cum alio Medico.

Sanguinem fervidum atque floridum jam aliquantica ex intervallis iussu rejectum, recte profecto estimatum est è Pulmonibus proditisse; Quoniam vero Generosissima Domina laborans, molli tenelloque corpore & Pulmonibus est imbecillis, atque jam dudum destillationi & tussi est obnoxia, vehementer est metuendum ne non modo reserata sed atiam exesa vena sit, (Nam vi rupta fuisse nulla conjectura allequi possum) Immo etiam cum postioris rejectionis à parte non obsecutus dextræ lateris sit exitus dolor, cum anhelatione & asperitate tussi, cumque sensu quidam gravitatis atque ponderis prementis, si præteritum in adversum latus ea devolveretur, nisi tum vera pleuritidis erai, non levis suspicio esse debuit & ulcerati Pulmonis & collectionis quæ vnicuique minaretur: His tamen malis ita pridem accurate ac sedulo adhibita accommodataque sunt artis præsidia, ut jam Domina laborans in tuo posita esse credatur, citra metum re-

cursum mali: Itaque in his persistendum esse duco remedia quorum usu & ope convalevit, maximeque in lactis & cremoris hordei usu: At nihilominus quoniam & periculosissima & fallacissima solent huiusmodi esse mala, & diu plerumque latere, simulata quodam specie bona valitudinis, dum aliquando occasione levi, aut etiam nulla recrudescant, observandum circumspectius nunquid pristinæ malignitatis sit in thorace relictum? Nam etiam tussi aliquando fatiget, aut lenta febris sollicitet, aut aliquantum difficultas sit respiratio, quæ multas spiritus duci nequeat: Huius quippe animadversione, præter lac matutinum, & vix rationem idoneam, ex usu fortasse videbatur quæ blande leniant & quodam robore pulmones expurgent.

Pulmones putres costis adherentes.] *Bronchum* Theatridi Tabidorum Exere. 16. adnotat Phthisin plerumque lethalem esse ubi Pulmones pleuræ accreverint: inducitur scilicet graviori respiratione & transpiratione pulmonum difficilius reddita.

OBSERVATIO IV.

Phthisis à Pulmone exeso, in quo sanies alba cruda, aquæ multa mista.

Puer ex Casalium familia, cum ob opes magnas de veneno suspicio esset, Dissectus habuit Pulmonem exesum, cum sanie alba, cruda, mista aquæ multæ: Perierat in 14. diebus ex febre: Symptomata non scio, quia non adfuit curationi: Constat tam longo

morbo absumptum: ut existimaretur, (sed falso) obfuisse ex recidiva: *Cardani lib. de casib. signis & locis morbor. Part. 3. n. 68.*

S C H O L I A.

Milla aqua multa] Exeris aut disruptis vasis lymphaticis, quæ multiplici serie Pulmonem superficie ambiunt.

Obfisse ex recidiva] Aliquando enim Pulmo caulce-

ratus callum contrahit medicamentorum beneficio: Sed sæpe accensens sanies, cicatricis specie imponit & induratus concedit, quæ decidua affectus iterum recedens.

O B S E R V A T I O V.

Phthisis grande & multiplex Pulmonum ulcus sequuta.

Sanguinem à pure liberabunt, præ aliis forsan medicamentis omnibus, quævis Antimonialia, tum diaphoretica tum purgantia & vomitoria: quæ non semel observavi, etiam in phthisi ac inveterato Pulmonum ulcere grandi, per alvum & urinas bonam puris quantitatem eduxisse, adeo ut ad plures tunc dies nullum tussis pus excerneretur: *Necum autem in Pulmonibus grande, ac subinde multiplex fuisse, manifestavit post obitum cadaveris à me facta dissectio.* Fr. Syvius Pract. lib. I. cap. 24. §. 10.

S C H O L I A.

Ratione causæ ulcus efficiens, ut plurimum catartici ferini, purgantia, etiam validiora pleurique præscribunt: Profecto versq; ulcere vomitoria

proferbantur, quod ab his illud irritaret amplificare, quæquam ratione copie puris depauperis, utilia fore esse possint.

O B S E R V A T I O VI.

Phthisis orta à scabie repercussa, ob quam Pulmones omnino corrupti, magna ex parte in scirrhum indurati sunt.

Joh. Georgium Virsungium adnotavit Monachum quendam Patavii neglectis universalibus, scabiem unctionibus intempestive depulisse, unde mox supervenientibus falsi humoris defluxionibus ad Pulmones delapsi, sanguinem per intervalla tussis rejecerit, tandemque accedente Hætica abierit.

In dissecto autem cadavere à se repertos Pulmones omnino corruptos, magna ex parte in scirrhum induratos. *Georgium Hieron. Velschium observ. Episc. gem. 85.*

S C H O L I A.

Scabie intempestive depulsa] Ejusmodi præcipientem & inconsideratam scabiei curationem in palpitatione brachii & Epilepsiam terminatam vidit Trincavellus l. 2. cur. cap. 6. Corticum frangulæ usum illiham laborum notavit Salomon Albertus apud Brendelium conf. 73. & hydropem G. Sæverusfeldius lib. 1. de Scip. Silex p. 75. convulsionem Zacutus 6. Prax. hist. obi. 19. Dolores articulorum Chiffonius observ. 59. Febrem continuam, cæcitatem &c. Sæmnerius ad 5. Pract. Paralip. 1. Quod vero Omnipotens Epist. 28. de juvene recenset, qui contra scabiem diebus canaliculis buæ lithargyrio rubeo inunctus, in spasum, dolores nocturnos, nauseam, sitim, alvique & vesicæ signilem cum perfrigeratione totius & glugivarum incidere, ad malignitatem noxi cupidam lithargyri, haud dubie hydrargyri & cinabai, nec etiam arsenico permixti, resecti debet. *Idem ibidem.*

Magna ex parte in scirrhum indurati] Claz. J. Jacobus Weysser Exercit. de Apoplexia p. 374. sit se in Phthisicis observasse Pulmonem induratum; Pectore, inquit, Jacob. Spærlin recluso, Pulmonesambo subditi & compacti erant, nondum tamen ad illam duritiem pervenerant quam alia in Phthisicis observavi: Cetero autem Pulmonum naturaliter levis est, rata, spongiosa similis & velut à spumoso sanguine concretæ: Levis est, ut facile collabatur, ut possit, atque in thoracis moribus promptissime obsequatur: Rara ac spongiosa est, ut folia instar sæpe inspirato cito & assatum repleatur, simidique vaporis viam munit ad efflandum & expirandum: Ubi ergo in scir-

rum indurantur, aut duri & compacti evadunt, neque facile collabi & molli possunt, neque thoracis motum consequi: hinc difficilis respiratio, hinc zite calor & incendium cordis & sanguinis refrigerari nequa, neque fulgines rite excludi: hinc circulatio sanguinis à corde ad pulmones, & ex illis iterum ad cor interruptur: hinc iacta Pericardium impetio chylus cum è ventriculo ad intestina, cum ex illis in lacteas destruitur: Hunc enim & Respiratiois usum adducit Vir Clazius, in suis Exper. Anat. ut hujas beneficio chylus ad intestina, & ex his in lacteas tradatur, mediane scil. diaphragmæ, cujus beneficio tota commoveatur hypochoidia: Inde totius Tabes, scabra hætica, propriæ pulmonis substantiæ corruptio &c.

Falsi humoris defluxionem ad Pulmones] Morbis facile afficitur Pulmo, & ut vult Malmus, membrorum primum est fensens: Molli cum sit substantia, materiam totidem diu sine lesione sustinere nequit: Notavit hoc olim Hippoc. Quiaque à puritate empyri redduntur, si intra 40. dies à quo ruptus fuit pleuritidis ventosa, pura materia non expulsa, in Phthisin degenerat, item l. 2. de morbis, si Pulmonum inflammatione detentus, dicitur quæ talia detentus creduntur, non purgantur, sed purum & purum in Pulmones remanent, suppuratus fit; Accedat à capite destillatione facile ob eandem causam rasset, asthma, erosionem & ulcus pulmonum excitant; Helmontius lib. de catarrh. deliramentis, hic est contrarius, Tussis & Asthma primum incipiunt, & continuato fermento perseverant, non quidem à capite distillat mucus, sed intra pulmonem

pulmonum genio per violatum loci fermentum. Vesum ce-
vera destillationes ad pectus à capite fieri facile cre-
det qui vel semel exinde collum expertus est: Ma-
teria autem viscosa non solum à capite destillat, sed &
è venoso genere interdum communicatur, ubi ab
aëre condensata subtilitate variorum symptomatum
mater: *Pelæ* quidam, teste *Cristone* in *Consil.* topico
querbat dolores podagricos, sed *Baro* quidam eo ulus
incidebat in asthma constante podagra: Dubio pro-
cul materia viscosa ex articulis venoso generi fuit

communicata, & ex eo demum Pulmonibus: Ita et-
iam *Philis* *Barbivolum* cent. 1. hist. 35. à toto subinde
venoso genere induci potest: Sanguis eadem vitium
non tantum corpus emaciât, sed & pulmones, quos
circulatione transit omnis, sive aut horum culpa, aut
cerebri, sua acrimonia irritat & corrumpit: Nimirum
cum pulmones molle habeant parenchyma, citius
per ceteris visceribus consumi queant:

Martin Meduna Phisolog.

pag. 245.

OBSERVATIO VII.

Phthisis à media parte Pulmonum consumpta & pure soluta.

§. 1. **Q**uidam longo tempore decumbens in Nosocomio Delphensi, ob vulnus in pul-
mone, eo tandem putrefacto à febre *Typhode* contabuit: cuius sectio post obitum
facile causam mortis aperuit, nam media pars pulmonis consumpta ac pure soluta specta-
batur: *P. Forestus* lib. 2. *observatione* 37.

§. 2. In altero vulnerato in eodem Nosocomio, qui ultra annum cum dimidio ibidem
decubuerat, in sectione ipsa tota substantia pulmonis adeo cum pure longo tempore ex-
creta videbatur, ut cor denudatum sine pulmone (dictum) spectaretur. *Idem ibidem.*

S C H O L I A.

Febres *Typhode*] *Atius* febres symptomatice quæ
sunt in visceribus ex erysipelate hoc modo dis-
tingui, in *Leipyrta* dicitur quæ ventriculo affectu
oboritur, *Typhodes*, quæ hepate: Si verò in pul-
mone erysipelas consistat, *Cymodem* vocat: *Fore-
stus* *Typhodem* veram nominat quæ hepate erysipela-
te obitello oritur: Notandum, quæ ex visceris alicuius
corruptione putredineque emergit, tectoris, Lienis,
cerebri, Pulmonis, interdum etiam Renis: *Typhodem*
Galenus cap. 1. lib. aduersus *Tyam*, eandem
cum *Helode* facit seu *Humida*, cum à prima statim
die ægri sudaret, sudoreque ipso aut nihil aut parum
juvantur: Ejusmodi febris symptomatice est, cujus
proxima materia & continens causa, non est in venis
majoribus, sed in parte aliquapam, è qua aut putre-
dinis quiddam, aut tetet putridusque vapor in cor
obrepit: Cujus duo genera, unum inflammationes
sequitur, quod & ipsam est multiplex: alterum, jux-
ta *Fernelium*, ortum duci è latente obstructione &
putredine, quæ visceri consumaciter adheret & impa-
ctaque est, adeo ut & ipsa visceris substantia labefa-
ctetur, putredinisque portio nonnunquam in venas

effusa sanguini permisceatur: Juxta leges circulatio-
nis sanguinis *Phthisicorum* febris sic excitatur, San-
guis dum Pulmones in circulatione sua totus per-
transit, hinc visceri plurimum morborum ideas saepe
imprimi, & vice versa, ab eodem male affecto eni-
dem recipi: quicquid imparum in cruoris massa
continetur, arteriarum extremitatibus veluti multi
efflorescentia ejiciuntur, quare cum natura debilius fa-
cta in superficiem corporis recrementa sua nequit
transfere, propterea bullitione eadem in pulmones
deponit: hinc insignis cacoehymia & morbi pleuri-
que chronici frequenter in *phthisin* desinunt: parit et
cum pulmone caro conubescit, sui calore ulcero-
so scians semiputida evasit, sanguis pertransiens
materia purulenta, aut rabido inquinamento infici-
tur, & proinde in continuam efflorescentiam, ob vel
non miscibilis confusionem concitatur, quare & fe-
brem assiduum inducit & succum alibilem omnino
perventit: Partio est de febribus ab ulcere aut ab-
scissu in aliis partibus concitato, hæc enim non se-
cus ac rabida Pulmonum constitutio saepe *phthisin* &
febrem hecticam accendunt.

OBSERVATIO VIII.

Phthisis à parenchymate sinistri Pulmonis fere omnino consumpta, &c.

H Anovix miles præsidarius, quadragenario major, purulenta tussiens, circa diaphrag-
ma sinistrum vehementissime doluit: levatus est expectorantibus, & diuicile se so-
latus pauper succo nasturtii aquatici & hederæ terrestris; accusavit quoque simul re-
num dolores, ardorem & cruentationem urinx: Tandem nonnisi spumofum sputum rej-
ciens, ventre primum inflato & sonante, ut *Tympaniticum* iudicasset, dein & pedibus tu-
mentibus, superiora consumptus, summâ sæpe & tantum non suffocante angustia, ob ascen-
sum muci aut feri in jugulum, sanguinea interim sæpe meicens, post 22. septimanas quibus
decubuit, sceletro faciem similimus, vtro *Asicide* obiit 1671. 16. Julii.

Aperto cadavere, parenchyma sinistri Pulmonis fere totum consumptum, bronchia ve-
ro relicta cum paucis parenchymate, & ipso pericardio firmissima cicatrice, seu callo, co-
stis adnata coaluere, ita ut propter diuturnum dolorem hoc latere compresso depressoq;
gibbosus altero latere factus fuerit miser. Diaphragma quoque solito crassius lienem fir-
missime affixum ostendit: In abdomine & thorace feri meraci & citrini multæ mensuræ
laruere, quæ adacto scalpello instar salientis fontis projectæ: Qui coalitus Pulmonum, post
vulnera multa, altero latere fere adhuc integro, forte meretur observationem. *Salomon
Reiselsius in miscell. curiosus anni 1673. observat.* 191.

OBSERVATIO IX.

Phthisis à Pulmonibus subduri & compactis, suprema parte exulceratis, & lateri annexis &c.

JAc. Spœrlin septuagenarius, ad carceres damnatus, in iis ultra 12. annos vixit; hinc cachecticus factus, anno vitæ ultimo mane inprimis, tussire cepit & purulenta exspuit, Tussis magis magisque crevit, eaque diu noctuque misere excruciebat: spiritum sub viride, turbidum, lentum, viscidum, rotundum, plane non foetidum, quandoque cruore tinctum ejecit: Paucis septimanis ante obitum, conquestus est de catarrho mane impetuoso ad pectus ruente & suffocationem intentante: febricitavit lenne, emaciabatur, non tamen ita corpus contabuerat prout in plerisque phthisicis observatur.

Pectore mortui recluso, pulmonum lobos superiores utrinque, maxime sinistram, accretos invenimus; ambo subduri & compacti erant, nondum tamen ad illam duriciem pervenerant quam alias in phthisicis observavi: Discissi in suprema parte exulcerati erant, ac cavernulas avellane capaces obtinebant, non tamen exacte rotundas aut æqualiter cavas, sed quasi laceras, ac si à mustela vel à glire frustulatim portiuncula avulsa, pulmones exesi fuissent: Pressa hac pulmonum parte, ex bronchiis spurum viride, minus tamen viscidum ac rufi rejecerat, prodit: Lobi pulmonum inferiores nec pleuræ accrevérunt nec quicquam puris continuerunt: In cævo pectoris serum subventum copiose redundavit.

S C H O L I A.

Phthisis quæ tandem prostravit atque lecto affixit, sero acti & moridaci etiam suam originem aliquomodo debere videtur: variis enim modis pulmones ad tussim vehementem & diu inancem stimularit, scilicet in pectoris cavitate effusum, non secus ac alias in pectoris hydropse fieri solet, externam tunicam continue vellicavit, cum sanguine arterioso per arterias pulmonicas in vesiculis & extremis bronchiorum ramulos exudans, aut per gloriem in asperam arteriam stillicavit, acrimonia sua internam bronchiorum tunicam, omnino sensu exquilito præditam, titillavit atque ad tussim prostravit, unde pulmones post multas lacerationes tandem pleuræ accreverunt: & quoniam accreti non amplius sive se contrahere, & liquorem imbibitum exprimere valuerunt, impuissimos superiores lobi induruerunt, inflammationem aliquam conceperunt, ac suppurati verè phthisis causa proxima evaserunt. *J. Jacobus Wiersema Exercit. de Aplepex. pag. 374.*

& 380. Vide lib. 1. sect. 15. observ. 3.

Cavernula avellane capax, interdum accidit foream unicam, aut forte binas in pulmones efformari, monente *Wiersema cap. de Phthisi*, pacienibus callosis circumscissis obductas, ita ut materies ibi collecta in massam sanguineam minime transferatur, sed quotidie tota, copia licet ingenti, expellatur: Taliter affecti, quasi tantummodo fontanellam in pulmone haberent, spiritum etiam multum & crassum, immo flavum & quasi purulentum omni mane, & aliquantulum in toto die rejiciunt, tamen alias satis sani degunt, bene respirant, comedunt & dormiunt, *Lamius*, aut saltem in modico corporis habitu persilant, & non raro persenescent: hinc nonnulli dicuntur Phthisin per 30. aut 40. annos habuisse: atque inveni alii cum minus tussiant aut expuant, incipit paucos menses in febrem hecticam incidunt, ac brevi in sepulchrum præcipitantur.

OBSERVATIO X.

Phthisis ab ulceratione parenchymatis pulmonis, ejusque bronchiorum obstructione.

CRebrior cadaverum perlustratio ulceris in pulmonibus Phthisicorum genuinam, non solum in parenchymate, sed & ipsius bronchiis ulceris sedem docuit, adeo ut hominem febre hecticâ consumptum, non citius de statione vitæ decedere, sed ejus miseriam tamdiu supervivere miraculi instar sit: Post sanguinis spurum in *Wiersema* corpore ad librarum duarum mensuram, ingentis in dextro pulmone sensus, ponderis aliquot septimarum decursu animadversus: rejecta materia flava, crassa, viscida, tenax, frustillatim, tenui aëque copiose innatans: Aperto iterum vasculo hæmoptysis urgebat: Ea sine negotio sedata continuabat excretio priori similis: Aderant hecticæ indicia non levia, putridæ intermixta, & dyspnœa dextro præsertim in latere: Sanguis nullus excrebatur, sed alba solum, tenax, viscida materia: Viribus exhaustis, anni quadrante elapso, suffocatus abibat ad plures:

Aperto thorace dexter Pulmo tumidus, adeo ut totam illam impleverit cavitatem. Inciso Pulmone, in circumferentia sanguis spumofus crassus, effluebat: Incitis & divisis bronchiis, alba ut materia fere tota referta erant, ita illa effluebat puris speciem præ se ferens planissimam, qualem multis ante septimanis ejecerat, quam si extussire potuisset, nondum virgæ terminus adpropinquasset. *Kolsinkius.*

S C H O L I A.

In *Wiersema corpore* Homines dicuntur *phthisici* & *phthisici* quoniam valetudo penes est phthisis, & *phthisici* etiam, quoniam natura virgæ sui in *phthisici*: huiusmodi sunt *phthisici* 1. alati scapulis, quoniam sca-

pulæ dorso crasse non adjacent, quia non habent dorsum, ut decet, *Wiersema*, sed pulsam inclinans ad *Wiersema*, & contra ceteri vicem ad *Wiersema*, quam tamen natura voluit esse *Wiersema*: Talem vicem confirmationem

namque referendam esse docet Hippocr. 6. Epid. p. 3. ad imbecillim vim effortandam: cujus imbecillam vim ponit in paupertate caloris nativi, ex parvi-

ta: cordis, quæ facit thoracis angustiam, sicut amplificatione amplitudinem. *Durum m. Cæsar. p. m. 292. & 310.*

OBSERVATIO XI.

Phthisis à trachea parte erosa, Lobo Pulmonum altero calloso.

Lobum Pulmonis sinistrum cuiusdam Mercatoris Londinensis erodebat ulcus; è tussi inveterata & fluxione salina hæmoptysin inducente oriundum, quod levis arteriz dyscraticationem lobo inferant una pereferat: Cul symptomata omnia, quibus phthisis consociata est, ingredebant, in pejus in dies ruitura: halituum denique & suffituum methodica intermiscela sanus evasit: Quæ integritate permansit per sex annos, quo temporis curriculum, meque annuente, *Hissania*, ubi commercium fecerat, vitam debebat incolendum: sub initium tamen autumnû oras nostras petenti, ab impedita pororum usuali *Lothamodis* fluxus concitator totum lobum, ut lateri adhaererat, replevit: cujus exaffluatâ sanies pulmonem ita perfudit, ut spiritus transitum brevi denegaret:

Dissecto cadavere, *trachea pars erosa*, cui cicatrix inducta fuerat varicosa: lobo vero parti adnata callosa conspiciebatur, reliquum pulmonis parenchyma computruit.

S C H O L I A.

T *Trachea pars erosa*] Lucenam arteriz vocalis membranam, per latus affluxus derafam, suffi- que non raro ejusdem animadversi: Halituum tamen & suffituum usâ regeneratam, ex quo convalescentes aliqui superant, binosque nuperime à phthisi diuturnioris corruptela, pulmones suffulcram re- teptantes hilce, aliis non prætermissis, ted integravi: Quorum unus ex febre hæctica per trisulium emat- eunt, cui derelicta tussis & durities quædam in media parte de mri lobi (quamvis è naturalis conjicere valui) avellane magnitudinem æquans, novâ verumtamen carne velutis & robore pulchro vigen: Alter jam superstitis, obesus, cui tussis horis diei diachicis non admodum molesta, sed in cæteris omnibus inculpa- tus. *Cbr. Remm. Theatri Tabl. Enact. 18.*

Trachea pars erosa] *Hippoc. l. de morb. intern. cap. 1.* Tabem consistit ab ulcere asperæ arteriz, cum humor mistosus & falsus, à capite fluens, arteriz affligitur nec tussî exteri potest: *Mem. 2. de morb. comendit* seruida quædam ulcricula in bronchiis asperæ arteriz posse reperiri: *Aëm. tetrab. 2. ferm. 4. cap. 64.* proficitur le multa quæmodi ulcricula juxta laryngem curavisse: Obijcit Hippocr. 4. de morbis, docuisse pulmonem, qui rarus & mollis, facile à carathro capris ulcerari posse: ventriculum autem, quod fit robustus & inflat curis, à pharmaco ulcerari non posse: Arteriz autem asperæ membra- na, cum crassa sit pari ratione ulcerari non posse, ob siccitatem & duritiem Resp. Ventriculum habere motum concussivum ad expellendum quod nocet, quo fit ut humor nosius in eo diu herere non possit, sed vel vomitu vel singultu excutitur: Arteriz autem eo motu caret, cum nec dilaretur, soloque spi- ritu vehementer per tussim excitato ad expulsi- onem rei nocue utitur. Hippoc. autem l. c. de Phthisi ab arteria aspera agens, hæc signa tradit, Tussim ini- tio siccam; hæc ipsum tuberculentum, postea pur- rum; Progressu temporis sanguinis multi expositio- nem, interdum post, interdum sub puris, adeo ut sæpe fauces conspicuas non sint, sanguine repleta, deinde purorum sanguinis frequentem expulsi- onem: succedente rigore & febris, dolorem ad sternum & infimam partem dorsi ac in costis: puris liquidis (pu- tum desinente hæmoptysi): *Esactis 14. diebus, hys- marum* ab arteria avulsionem: Causas & curationem vide l. c. & apud Gal. l. 1. c. 1. de loc. aff.

Suffituum methodica intermiscela &c.] Inter præstia

Evaporatiões & suffitus tanquam nobiliora, & qui- bus tussie in extremis angustis considamus, pen- sanda: Quæ sine circumstantiarum debita compari- tione summo obtinere vel incallum adhibentur: Non tamen inficior si crasin parvis species, nulla impedit hujus generis indicio; pulmones etenim aridiores & tenuiores hominem madore inereantur: humores nimisq; laxati illorum siccitate indurantur: potredine & viscositate obliniri levantur; amorum denique consorcio ulcera fovelescentia deteruntur, necnon novæ affluxuræ materiæ & in partes insignis vis molesque reprimuntur, similis semper in asthmais ser- vato scopo: Si vero intemperiem totius contemple- ris, nec ipsa lobis hæc medela contraindicasse videat- ur: suffitus quippe tenuissimæ essentia caliditatem ultra spiritalia hand exerceat, uti oportet variis li- quoris suffaricentia dispositum, propter superflui ge- nium proportionem & motum: propter partis susci- pieutis habilitatem & totius tolerantiam, variis hujus generis remedia conficere & in usum proferre neces- sario coactus fueris. *Mem. ibidem: Hæc autem admini- strationis regulæ sunt p. m. 141.* Suffitus & eva- porationes magis familiares sunt deregentes, qui vi- cibus intermedis in usum ducendi: deinde nobilio- res & sicciores, tandem collectica sentim usurpanda: postea milicibus vice communis aëris attracti res absolvenda: Evaporationes porissimum siccioris tem- peraturæ pulmonariis accommodantur, & in ipso sus- fufionum diuturnam adventu maxime prodelle cog- novimus: Cuiuscunque sint generis suffumigationes & halitus, penitus viceque ipsius aëris in partes spi- rituales suscipiantur, in conclavi aut cubiculo, clausis fenestris, ut ulterius omnis aëris frigidiore affluat, ibique diu perdetur æget, secus enim incallum exercentur: Prima suffituum in pulmones susceptio est laborio- sissima: peracta verumtamen detentioe (quod cito fit) facilius peragitur. Suffitus non statim ab etoso vulculo aut viceris parenchymate, submoventur, sed post dies 14. ad minimum à sedata hæmoptysi nec ante suffufionem periodicam qualemcumque ma- jori, circuitus patientis, sed elapso ad minimum bi- duo à peracta fluxione. Dum extraneis succis per- fundimur & replentur pulmonum parenchymata, suffitus fuictiores nequaquam usurpandi: leniorum vero usus eo tempore instanti non prætermittendus: *Evaporatiuum autem materiam & suffituum vide p. 181. & sequentibus.*

Difficilis vitam deperat inuoluntum] Huic consentiens Nubilis, & Excell. Dom. de Mayerne, Conf. adno-
zorum Tractatus de Arthritide, cura nostra edit.
Adi Volcan, aut Autantim, Monspelium, Lunellum,
Biertras: Paucis, fuere aere sicco, cujus calor em fa-
cile cit temperare domi, pio commo-
dis quas regio concedit: Galenus, Medicorum Magister,
Phibicus Tablas mitebat, non eorum curam re-
spiciens, sed ad defecationem ulceris & fluxionis, in-
spirato aere puro, vi siccandi praxidii, ac balsamica vi
plantarum illic oaleosorum imbrito: Ante aliquot an-
nos Nobilis nostras, phibicus deperat, me iubente
illuc concessit: pus cum sanguine spurbat, lectum
membrana Pergamentae vellitum macie referens: Is
incohans tedat nuptias conatit, plurimum liber-
orum parit. Vidi, quo ibi efficacia aeris ad Pulmonis
morbos innotescat, Nobilissimam quid ab accepto pro-
fundo in thorace vulnere bis sanatus est, fistula succed-
ente paracentesi in opposita parte facta, quae neces-
sario iura costas inliranda fuit: In Hispaniam is
migravit, ubi post quoqueconit moram oculula fuit
fistula. Partis redditis, climas frigido & humidis,
illa ipsoe reclusa est: Hispaniam vero repetens, ex-
taque ibi aequali morae, elissimus est: Hunc ibi cla-
rum esse debet aere omnia Pulmonis bronchia per-
meantem, recta cor impetientem, efficacius quivis
alio remedio, qualitatibus nativis vel adiectis, viam
suam exerceat.

Fluxum sanie] Spuria sanguine repleta, sangui-
nis tale perfusi progeniem, licet fluidiorum sit incen-
vum, tato tamen tubulosa vi sua incisiva viscerum
membranas, vel visorum tunica transillit rarus sum:
postquam vero sanguis ferum suum salinum, per tuni-
cas ut membranas pectoris protrahatur, totis instat
percolaverit, stimulo motum pulmonis contra-
ctum, nullum progenuit, a qua concussione & con-
tatione tubulosa frequenter invadeat & perleve-

ranre, patet recellit, per quas patet singulis sub-
limis, solis alperatit, talidem deponat, magis
inferare citius coarctum: unitalis particula videri
illara, non illico quati acus aut ter bellum patem
compangit & confodit, sed cum ei dia interdeti,
demoluit locumque rapit: cujus vis potius dissolutio-
quam incidens & compunctoria estimanda est: pati
quippe nimis profunde se inlinquas, quodammodo
per minima commicet ac cor pangit, & sic sub-
stantiam ejus in quendam conduicem, inter missio-
nem & confusioem mediam per ducit: in qua nemis
litate cum aliquandiu remanet, tandem dissolvit
& induta frigiditate dissolvit: Tali modo, praxi-
pitara, & subtiliori patris aditus liquoris salini, per
halicum foran extrahit, ac imonia etotum & dis-
solutionis periculum minuit: Imo si sola aciditara
vel tamillo tale perfusa, seu alicui sanguis, licet inque-
tes singula exteriores separata diffundatur, & grossos
calode parit & periclitat: Nec parcos observavimus,
quotum valorum pectoralium ora a tanguie
tugilece (in quo foran salis momentum deliquit-
rat) relecta facit: quos unia aut altera vene scilio
perianthi: Neminem quidem cui Pulmo etotus fuit
sit, sine sanguinis totius edulcoratara & reductione
curatum memini. Item Eberstanne 22. Clavus hac
ex legibus circalationis sanguinis demonstrantur,
Caula exulcorationis subllante Pulmonem tita tan-
guis biliosus, acimonia praxidius, Salinisque aromu
praxidius, erodendi vi donatis: hic a roto, mediante
circulatione, ad pulmones delatus & valis per osificio-
rum relectationem, totum aptionem aut racta-
tionem, illos erodit & exulcorat: Inde calor natus in-
firmior redditus, aliam succum nutritium in ali-
mentum non transmutat, sed in pus, hinc continus
puris ejectio: hinc totius macies, hinc singulis
furipiensibus Pulmonibus, curdque, tangulicatio-
nis organo, malam diathesim communicantibus.

OBSERVATIO XII.

*In Phibico fragmenta bronchiorum Pulmonum, ab eorum substantia avulsa reperta
sunt in dextro latere, cum plurima sanie.*

HENRICUS N. post mortem dissectus fuit: uterque lobus Pulmonum non tantum arte
costis adnatus erat, sed etiam inferius *diaphragmati*, ut sine laceratione inde avelli
non posset: In dextro latere, ubi majorem dolorem senserat, inventa sunt fragmenta
bronchiorum ab substantia pulmonum avulsa, cum sanie copiosa, qualia dum viveret in magna
quantitate extricare consueverat: Vix illi erat clausa, qualis Gallorum Africanorum aut Ca-
lectensium: Laboraverat longo tempore antea spuro sanguinis, unde hujus miseri mali
initium, quo etiam extreme extenuatus obit. *Jacobus Boninus observ. 2.*

S C H O L I A.

Vox illi erat clausa] Afflicta aspera arteria:
Phibis autem ab ulcerata a peragnetia memi-
nit Hipp. lib. 3. de morbis vent. 119. Si valvata sunt
arteria, tunc habet & sanguinem respicere rixit, & sanies
laesum sanguinem impleatur, & grossus erit, & delo sit
acum ex potiore ad dextum, & saliva viscosa multa, &
sanies fusa, & sibilus a rixit corrigi, & stridit sanies re-
lecta & pinguetum, atque hinc ad dies 15. pariter: Postea vero
spuri pus, & velat alicui vicini bronchia in Pulmone carile-
giosa, & rursus rixit, & sanies sanguis erumpit, & pulsa
pus crassum fuit, & sibilus fortius sit, & in pulmonem desi-
nit, & vocatur Pulmonis rixit.

Adnatus diaphragmati] Quod & observavit Paracra-
sus observ. 41. Peritocostic 4. in tubulato per laqueum
hominis, cui pulmones lipo adhaerentes inveniit, & si-
mul costis per villas credit id ex diuina incen-
tatione corrigisse, ob quam valvulosis redditis sit

rens, Afflicta vix nullam reperiri, qui postmodum
suffocatus membra recte in se habere disposita, sed
omnes in aliqua corporis parte morbum contrahere:
Cum teliqui qui brevi tempore caecetati franguntur,
membra sana & sine labe in Anatomia caduocant:
Morbus autem dispositionis in caecetibus coarctat,
causam rejicit in visis corruptionem vitam ossi-
fam, pravam dietam, alicui merore, vigiliis con-
duat, quae spuri tempore infirmitatem parit.

Sanies in magna quantitate extricare consuevit, & fo-
gula in dispositione tunc per vene arteriole singulos
ingens visorum humorum colluvies in pulmones
deponitur, & adeo insigni copia ejicitur, ut admi-
rationi sit, & opinionem dei elucens & potiora om-
nia in quidam impunitate faciente.

Cum sanie copiosa in dextro latere] Pus in pulmonem
exulcerationem gonitum, non solum in aspera arteria
sanos

ramos delacum expuirit, sed & tandem, quando ex corruptione substantia pulmonum, dividitur, in pectus cavitatem influxus, illicque sensim coarctatur & inter dum magna copia congelatum. Empyema producit: Quod ab exaceratione hac in phthisi

eo potissimum modo prædire scilicet patet, per quam in corruptione pulmonum pus semper aliquam portionem, si non magnam, pectori adherere vel innatae deprehendimus: *Pleura cap. de consumpt. lib. 3.*

OBSERVATIO XIII.

Phthisis à Pulmonis parte consumpta, vomitiis plurimis in residua.

SAra Mente virgo obiit anno 1639. Aperto thorace & abdomine, in Pulmone omnem mali causam deprehendimus, quippe in sinistro latere, magna ex parte, & potissimum versus costas & pleuram, consumptus videbatur, & nihil ejus reliquum videre erat præter putridas quasdam fibras, & puris terrecrini & virefcentis magnam copiam, qualem & ante per tussim ejicere solebat: Pleura autem eodem loco (quacum una concreverat Pulmonis membrana) solito multo erat crassior, sed passim inæqualis: lobus autem alius ejusdem lateris, qui pericardium & mediastinum respicit, adhuc restabat, sed naturali contractior, & distinctis particulis adnatis: Intus autem multas vomiticas continebat, alias pisi magnitudinis, alias paulo majores: & præter eas unam magnam, assernum ovum dimensione æquantem, fetido thore plenam, & membrana à virulentia nigrescente tectam: Pericardium autem, ut & dextrum latus thoracis, aquam aliquam continebat, subrubram & loturæ carniū æmulam, qualem etiam inferior venter continebat, mediocri quantitate: In reliquis quoad viscera naturali modo se visus offerebat: Abdomen, nisi lolummodo quod Hepar ut & Cor, subtilior essent flacidioris paulo, colorisque pallidioris: Dexter vero lobus pulmonis passim duris tuberculis inæqualis erat, & parenchyma purulenta sanie infarctum, non leves incipientis putredinis notas exhibebat: Dextrum vero crus tumore oedematoso & aquoso, sinistrum (quod tamen etiam nequaquam ejusdem experti erat) duplo fere superabat. *O. Henricus observ. 17.*

OBSERVATIO XIV.

Phthisis à Pulmonibus ulcerosis & scirrhis.

OLim petiitum est meum consilium pro adolescente Phthisi laborante & plane desperato: Præter tussim & dyspnoeam, non poterat supinus decumbere &c. Post obitum cadavere dissecto, pulmones fere per totum scirrhi, & in quibusdam locis ulcerosi apparebant: *Vide tit. de convulsionibus lib. 1.*

OBSERVATIO XV.

Phthisis à Pulmone sinistro intus repleto pure, sanie & scirrhis.

VIt Nob. multis annis phthisicus fuit & asthmaticus: Illi sinistri pulmones pleuræ & colitis adnati, interiora habebat plena sanie, pure & scirrhis. *Vide l. 1. tit. de cap. dolore:*

OBSERVATIO XVI.

Phthisis à Pulmonibus fetida, copiosa aqua plenis.

Phthisici aperto cadavere Pulmones tum consumi ceptos, tum copiosa, serosa, fetida aqua repletos distentosque deprehendi. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

OBSERVATIO XVII.

Phthisis à crudis Tuberculis totum Pulmonis parenchyma obsidentibus.

Cum tandem post multas miseras afflictiones, humanis miseris exempts fuisset David Garvis, cadavere aperro deprehendimus Tabificam mortis causam in Pulmone resedisse, quippe totum parenchyma minutis tuberculis, ex eruda viscida materia oppletum erat: Ex quibus tenuiori portio quod subinde resudasset, & evacuata fuisset per urinas, quod oculati fide deprehendimus: Nam inde respirabiles pulmonum meatus, partim infarcti, partim compressi liberam ventilationem calori virali cordis denegaverat: concurrente simul maligna putrida qualitate, ulcerum Pulmonum semper comite: Etiam cum nullum viscus sit adeo calidum humidumque & flacidum, quociens putredinem coarctat, ea insigne in & peculiarem malignitatis gradum induit ob cordis æstum, tunc ab intercepta ventilatione incrementum; quæ præcipua atrophie causa est, quia bonus sanguis ab Hepate genitus, prava illa qualitate infectus, in alimentum partium converti nequit: &c. Erat etiam Pulmo diaphragmati & pleuræ in latere dextro adnexus acutè: Lien præterea

præterea figura triangulari, tribus scissuris sive crenis in margine divisum erat. *Ortho Henrini hystor.* 21.

OBSERVATIO XVIII.

Phthisis à variis abscessibus purulentis in utraque pulmonis parte, ac pituita in iis concreta & lapidescente.

Juvenem dissecui in Nosocomio, cui in utraque Pulmonis parte variis abscessus purulenti; quin & variis locis pituita adeo in pulmone concreta cernebatur, ut calculi tangenti esse viderentur, imo perfectam calculosam duritiem non paucis locis obtinebat. Hic Tabæ quamvis consumptus, vixque hæreret ossibus, copiosam tamen aquam pericardio continebat. *P. Perini observat. anat.* 19.

S C H O L I A.

Copiosam tantum aquam] De aqua Pericardii vide multa tit. de Palpitatione cordis & Syncope.

OBSERVATIO XIX.

Phthisis à corruptis penitus Pulmonibus & in pus conversis, vasisque cordis in eos insertis, absumptis.

Puer quidam annos 8. natus de scala delapsus, sanguinem expuir sensimque coepit contrahescere, tussis perpetua eum molestante, per quam purulentam expuebat marcoriam: ex pulsu febrilis deprehendebatur hætica, absque calore magno, appetitu cibi nihilominus persistente: his sic menses aliquot durantibus, ad extremum marcorem redactus, ut scelcti, curæ saltem obiecti, formam exprimeret, in thorace ipsius, inter costas distentas & excarnes, coepit promiuentia quædam, in intervallo juxta septi regionem, in latere sinistro, sese proferre, ruberculi instar mollis, concoloris, quod pressum in thoracis sparium retrocedebat, remissum redibat, pectore interim admodum distento, unde illud pure repletum, ex corruptione pulmonum post phthisim, quamrupta ex casu vena pepererat, genitum, illicque exitum querere ubi tumor se offerebat, judicavimus; eoque magis cum & in dorso talis eminentia, inter costas appareret, costæque admodum ab invicem essent ductæ: Et cum nulla alia spes convalescentiæ superesset, extremum remedium sectionem judicavimus: Cumque & parentes consentirent, statimque à Chirurgo in tumorem, qui in pectore erat, scapello impresso, inde pus copiosum profiliit, adeo ut nisi fuisset inhibiturum, pelvin Chirurgorum implevisset: Verum ne vires conciderent, immissa turunda effluxus puris fuit cohibitus, & per vices, ad dies aliquot, postea pus emissum: cæterum cum promiuentia altera in dorso non subsideret, è medio tantum thorace pus effluxisse conjectimus, cum & tumor ille non in sinistro, sed dextro dorso latere sese offerret: qua de causa illic quoque cum aperiendum esse censuimus, quo facto non minor quam è priore sectione puris effluxit copia, ramdiu donec penitus sere è thorace repurgato pure, fluxus minueretur, viribus interim vitalibus sensim deficientibus.

Cum pectus post obitum sectione parefieret, Pulmones penitus sere putredine absumptos, & in pus conversos, vasæque cordis, quæ pulmonibus inserta fuerant, simul deperdita, & circa radicem veluti callo obducta oclusæque, succingentemque membranam prætumidam, atque undique pure, veluti pulte oryzacea subviridi, conspersam deprehendimus. *F. Platæni observ. lib. 3. pag. 733.*

OBSERVATIO XX.

Phthisis à corruptis Pulmonibus, pure thoracem & abdomen implente.

Quidam diuturno morbo è medio sublatu, cujus venter, qui in immensum excreverat, cum aperiretur, pure cadaverosi odoris in altum profiliencie, aliquot pelves æneas, quibus Chirurgi uruntur, implevit: quod & non minori copia, impetuque è thorace dissecto promanavit: in quo pulmones unius lateris, uti in aliis phthisicis, penitus absumpti & in pus conversi, non solum thoracem sed & universum abdomen repleverunt: quod ex thorace eo profluxisse, illud maxime quod nulla viscerum corruptio in ventre inferiore deprehendebatur, sed lobi hepatis, intestina, musculique epigastrici, cum mesenterio & omento, duntaxat denigrata nonnihil infectaque cernerentur, sufficiens comprobabat. *Idem ibidem pag. 734.*

OBSERVATIO XXI.

Phthisis à Pulmonum corruptela & in empyema conversione, ob male fluentis lochia genita.

Nobilis. Domina N. à partu non fluentibus, ut antea lochia, nec rerum non naturalium usu recte adhibito, incidit in tussim molestant, quæ sensim in dies cum pectoris dolore & gravitate exacerbata est, febrisque per intervalla vehemens eam invadebat: Ipsa aliquoties fuit detractus sanguis & purgatio instituta, sed cum ab urbe remota esset, non potuit medicorum consilio commode frui. In pejus sensim cum ruerent omnia, Luteriam se contulit, sed morbus adeo invalescebat ut hæctica brevi comitaretur, etiam variis usæ remediis, postque decem mensium spatium interit.

Aperto cadavere, pulmones toti purulenti inventi, adeo ut ne minima eorum particula scalpello divideretur, quin ex eorum substantia foraminulenta efflueret puris sortidi insignis copia: In his, juxta claviculas, deprehensus fuit sacculus pure repletus, exesa Pulmonum substantia productus: Ad costas utrinque adhærescebant Pulmones: Hepar amplum erat, æqualiter utriusque hypochondrii cavitatem replens, subalbido colore prædicitum: Renes quoad situm sibi invicem ex æquo respondebant, nec dexter sinistro depressoior erat, *Cassierus observ. II.*

S C H O L I A.

LObit à partu non fluentibus] Sanguis in utero retentus, corruptionis & acrimonie participes, per moram in utero, lege circulationis ad cor refluens, in pulmonum parenchyma depositus, ulcus & purulen-

tiam induxit. Adde. *utrinque* quæ partes genitales & spirituales intercedit, de qua *Hippocr. I. Epidem.* ob quam sanguis ab utero ad pulmones viam affectavit.

OBSERVATIO XXII.

Phthisis ab excoriatione Pulmonis producta per rupturam & erosionem vasorum, cum duobus conclusis vomitibus.

Hubert Pomble ann. 19. temperamentis sanguinei adulti, lanæ adornatione victum quæritans, militiæ incommoda perpeßus, atque humi cubare coactus, unde digiti in pede utroque gangræna affecti computruerant, ita ut in dextro omnes, pollice excepto, rescissi essent, & in sinistro omnes: Ab ea intemperie toto corpore concepta postea perpetuo cachecticus, cacochymus, querulus, & valetudinarius fuerat, & diuturna diarrhœa affectus, à viscerum cacopragia, indeque orta cacochymia: Anno 1636. in Julio, magno dolore & lumborum dorsique corporeus fuit, & paulo post febre continua & *tussis molestissima, à viscida pituita* contumaci irritamento, quam postea sanguinis sputum comitabatur, etosis & disruptis pulmonis vasis, ab acrimonia & copia sanguinis ex vena cava exundantis ac fursum proruentes, idque per dies septem, sed intercalares, ad 3vi. qualibet vice sanguine effuso: Postea autem sanguinem pituitæ commistum expectorabat, Tandem omnia in pejus abiere in fine septembris, & Novembris 20. tussim continua diarrhœa supervenit, ex resolutione facultatis naturalis in coquendo & retinendo, quæ ad mortem miseri usque perseveravit: *purulenta tunc materia viscida, simplicata exspuebat:* genæ macilentæ & per se pallidæ perpetuo purpureo rubore suffuse erant, etiam cum ab igne remotus esset: febris hæctica marasmodos universum vitale nequar consumebar: pulvis durus, celet, creber, Decembris 30: durissimus, vermiculans, ecelerrimus, creberrimus: diarrhœa incresecebat & perseveranter inquietabar; adeo ut miser noctu & interdium vix unquam somno frueretur: facies Hippocr. cadaverosa, genæ luridæ; ita miserrimus ægrotus omni vitali vigore expoliatus fuit, hæcticæ incendio, ulceris pulmonis edacitate & pravitate; nutritium humorem absorbente, & qualitate maligna vitali vigori adversa, humores partesque omnes imbuente, ac comitante perenni diarrhœa & contumacibus vigiliis, mens semper ad finem constavit: Obiit Januæ. 9. 1637.

Postridie cadaver dissectum, miserandum consummatæ ariditatis spectaculum: Pulmo arcte erat adnatus pleuræ undique latere sinistro, & toti pericardio ac mediastino in latere dextero, quatuor superis costis firmiter coaluerat, & quoque omnium reliquarum costarum cartilagineis apophysis, sed ab ossibus earum partibus ibi prorsus erat liber: membrana pulmonis ubique integra, & vasa per ejus parenchyma distributa admodum tenacia erant; plurimis robustis membranulis connexa: ipsum autem parenchyma in toto utroque lobo sive ala lateris sinistro, totum fere erat in pus crassum commuratum, & quantum de parenchymatis carne restabat, id erat induratum, coloris fusci instar carnis infumate, cinericii coloris,

coloris, & ubique ei carni, sicut & vasis, inhærebat crassum viscidumque pus, ita ut quasi guttuli lividis pallidisque marmorata videretur: In latere dextro thoracis, lobi utriusque parenchyma valde erat exsiccatum, non tamen valde contractum aut immutatum ob substantiam soliditatem: at ubi ala supra 4. costis supremis in latere dextro archissime coaluerat, ut separari non posset, pulmo erat suppuratus sicut in latere dextro: Existebat & in eadem ala, loco mediastino viciniore, vomica conclusa, qua discissa tetrum pus manabat: & ibidem in ala infera, vomica alia priore minor, æ qua pus crassum effluxit: Multa aquosa substantia in pericardio & thoracis cavitate fluctuabat: Cor flaccidum erat, ac in ventriculis aliquot nigri sanguinis striz: Abdominis cavitati plurimus aqueus sanguineus humor innatabat: Hepar magnum usque in latus sinistrum exportectum, coloris pallidi, exangue, sed in profundo dissectum, ubi majora vasa resident, crassum nigrum sanguinem emittebat: Lien manus magnitudinis, scissus paucum tenuem sanguinem emittebat: Renum parenchyma exangue: Vasa ventriculo & colo intexta valde conspicua, & per omentum excurrentia, cuius sola membranea substantia restabat, ejus pinguedine plane à febre & vi tabifica absumpta. *Orth. Heurnius observ. 4.*

S C H O L I A.

Talis à viscida pituita irritamento] Sputi ac Tussis quodammodo catarrhalis causa petraeo solitaria exiit, quia dum sanguis tracheam irrigans, fluxum passus, serositates suas glandulis (unde mox in cavitates ejus exsident,) ingerit, insimul & reliqua massa sanguinea pariter sua, serum intra arterias pneumonicas secretum, partem in sinus tracheales, partemque in lymphæduos insinuat, cujus diluvio pulmones quasi inundant, & valde irritant, in tussim & expuitionem ferre continuum clement: Cujusmodi tussis & expuitio dummodo moderate habent, & tantum sanguinis serositates superfluas excreant, sæpe in commodum potius quam nocuentiam cedunt: quoniam massa sanguinea, ipsique pulmooibus hoc ritu expurgata, symptomata ista ut plerumque cessant, & valetudo integrior exinde sequitur: Sive vero affectibus istis diu protrahitis, serosus humor utrobique in ductus tracheales depositus, & in dicta uberius aggestus, tandem versus putredinem aliter

incipit, propterea tum libera aëris reciprocatio præpeditur, tum sanguinis & motus & crasis pervertuntur, hinc tussis immanior, & respiratio fit difficilior: quinimo tota massa sanguinea, quatenus à rabo (quod venæ à pulmonibus excipiunt) possidetur, ab indole sua benigna paulatim decifens & depravatus, non modo serum lutescens, sed & tunc cum nutrimento (quem assimilare nequit) ex arteriis pneumonicis in ductus tracheales continue profundius, adeoque materie tabificæ mole in dies augetur, donec pulmonibus magis usque & magis oppressis & obstructis, atque sanguine plus inquinato, & ad quæcunque munia sua præstanda inhabili facto, tussis & sputum ingravescent, & cito mali moris evadunt: iniuper respiratio impedita, totius corporis languor & emacientia, functionum omnium debilitas, & denique febris hætica, & si sine ad mortem declinatio succedant

p. 111.

OBSERVATIO XXIII.

Pulmones in Phthisico pene consumpti, assiduo usu nasturtii aquatici restituti.

Hoc à Viro fide dignissimo acceptum habeo, ab aliis confirmatum, Ante plures annos rusticus, pus & sanguinem expuens, omnino tabidus, Chirurgum Bruxellensem consilii gratia adit: hic conspecto homine desperatæ salutis & tenuissimæ fortunæ, sine consolatione & ope non dimissurus, nescio quo instinctu suadet usum nasturtii aquatici: Discedit rusticus, qui mandato parens plantam illam coctam, crudam comedit; paucis, obsonii vicem semper tenuit: hinc tussis ac expuitio purulenta desinit, corpusque habitus evadit: Anno revertente Chirurgum sospes gratiarum actionis causa adit, qui ab ignoto quid à se velit querit: Rusticus præteritorum memoriam refricat, mandaro se sedulo paruisse ait, ac num in usu nasturtii ulterius pergendum sit inquirat? In stuporem actus Chirurgus, ædes intrare rusticum jubet, ac in secretoria deducit, vestesque exuere persuadet, exploraturus num habitus corporis vultui responderet: Pareat rusticus, cujus pectus acuto gladiolo, (stiletum vocant) perfodit: Exanimis thoracem aperit, naturæ miraculum contemplaturus: Reperit ille veteris pulmonis reliquias paucissimas & quasi vestigia; quæ desiciebant (per anacatharsin expulsa) restaurata & reparata, ac novum parenchyma regenerum: Moræ pertæsa uxor, præ foribus (inscio Chirurgo) maritum præstolans, pulsata, illum requitens: Negat Chirurgus quenquam admissum: facinus aliquod illa suspicata adit iudicem, qui explorari jubet ædes, in quibus cadaver reperit: Chirurgus tamen criminis remissionem obtinet, ob artis præstantiam & utilem finem sibi propositum, &c. *De Nasturtio aquat. vide supra observationem 8.*

OBSERV.

OBSERVATIO XXIV.

Phtisis à Pulmonibus lutulento humore scatentibus, unde insignis eorum gravitas.

PHthiſis hæreditariæ inſignæ exemplum præbet Illuſtr. Chaboriorum familia, in vallē Equeſtrium, Bernenſium ditione: Generoſiſſimus Dom. de Chabotes, prægreſſo diuturno languore, febre lenta, tuſſi, peſtoris oppreſſione, obiit 27. Martii anni 1647. Exenterato cadavere, viſcera imi ventris non multum à naturali ſtatu aberant, quanquam ob morbum protractum aliquanto ſicciora & contracta: Pulmones autem admodum vitiati erant, inſignis molis & ponderis, qui ſtaretæ impoſiti octoginta unclarum pondus ſuperarunt: humore lutulento, candicante cum aliquali flavedine, cirrà ullam exulcerationis notam; undique reſerti. *Ex communicatione Generoſiſſimi Dom. de l'Isle defuncti Filii, qui & ipſe Tabidus anno 1675. interii.*

OBSERVATIO XXV.

Phtisis à Pulmone interius omnino purulento.

ANno 1597. fœminæ peſtus aperui cui torus Pulmo intus purulentus erat, ita ut quacunq; eum rangeres parte, ſeu novacula pungeres, pus album erumperet, Hæc lenta macie ac atrophia conſumpta, ſcleron plane reſerebat: Reſerebat malum illud familiæ hæreditarium, ex quo fratres etiam obierunt. *Petrus Perivius obſervat. Anatom. 25.*

OBSERVATIO XXVI.

Anatome Phtifici infantis, cujus ſiniſter pulmo in pus reſolutus eſt, unde thorax eodem latere pure reſertus: Cum inſigni abſceſſu ſuperne illius regionis affixo.

AVI externa Tabem induci, etiam in corporibus ad eam minime vergentibus, luculentum hoc exemplo oſtenditur: Decimeſtris puellus, robuſtiſſimus, optime conformatus, filius Nobilis D. Henrici Favarger Neocomenſis, fidei nutricis committitur cum tota familia pluſtro impoſita, in villam paternam deferendus: quia aſpera erat via, ſcopulis obſita, metus fuit ne conquaſſaretur puellus, quamobrem equo huic cum noctric convehi viſum eſt, illa vero equitationis pertæſa, pluſtro quoque cum alumno ſe imponit; Eadem die querulus evadit infans, ſpiritus vix trahit, cum febricula tuſſit ac ad ræbem deducitur: Quod vero mirum, per tres circiter ante obitum hedomadas, manifeſta cordis pulſatio in dextro latere percipiebatur: Aderat tunc temporis Medicus Vezontinus d'Anxiron, quem puellum inviſere rogo, abſceſſum in thorace gerentem adeo inſignem, ut cor propria dimotum ſede in adverſam propulerit: (Hæc enim fuit mea conjectura, alluſione lateris ad pluſtrum omnem morbi hiſtoriam, quæ decimeſtris fuit, deberi): Rider ille, pulſum eſſe aſſerens arteriæ alicujus: Sed domum procedentibus occurrit famulus, puelli mortis nuntius, Ex parentum arbitrio cadaver diſſectioni eſſe deſtinatum, ſolamq; meam præſentiam deſiderari; omnia eſſe parata.

Aperro ergo thorace, è ſiniſtro latere fœtidiffimi puris & viridis, inſignis profluxit copia: Pulmonis ſiniſtri vix reliquæ aut veſtigia, imo ne membranz cingentis: Mediæ peſtoris ſiniſtri partem occupabat ingens abſceſſus, ſuperiori illius parti annexus, qui præ magnitudine mediæſtinum, pericardium ipſumque proinde cor in adverſam partem compulerat, quod me prior animadvertit dictus Medicus: Abſceſſus tunica denſiſſima, craſſiſſima, duriffima, adeo ut novaculæ diſſecantis Chirurgi acies reſuſa fuerit: Reliqua thoracis & abdominis naturaliter ſe habebant, ſi Intestina ſtatu diſtenta excipias, ob exhibitam me inſcio à matre frequentia cathartica.

S C H O L I A.

COrdis Pulſus in dextro latere] Sicut eſt Cor, quando baſin, exacte in medio, motus tamen magis in ſiniſtro latere perſentitur, 1°. quia in ſiniſtro ejus ventriculo ſpiritus vitalis continetur, & à ſiniſtris eſt arteria magna: 2°. quia mucro ſiniſtram ſpectat, ut diaphragmati cedat; ad dextram vero declinare non potuit ob venam cavam, ibi per medium

thoracem aſcendentem: Poſt diaphragmatis vulnus, ventriculum totum aſcendiſſe in ſiniſtrum thoracis laſus, reſert *Sæmnerus præſt. l. 2. parte 2. cap. 35.* Et cor cum capſula depoliſſe in dextrum laſus, ubi virus poſt acceptionem vulnus jubebat obſervare pulſum cordis.

OBSERV:

Phthisis ab abscessibus in utroque lobo Pulmonis parte superiore genitis, Sinus ingentes relinquentibus.

Ruforum morbos pravæ esse indolis notat *Ballonius* libro 2. Epidem. & Ephem. atque cautum esse medicum jubet in eorum curatione: Revera quidam eo capillitio donati humores pigriunt virus quoddam redolentes, quos cum purredo aggreditur, veneni naturam ii respiciunt, adeo ut commoti à rufis ira percitis, eadem patiantur symptomata quæ toxico infecti: Saltem in eorum moribus aliquid singulare reperitur quod cautelam requirit, hinc natura hoc veluti signo eos insigrire voluit, quasi, Noli me tangere: Hircinus odor à quibusdam emissus virulentæ humorum index est: Meæ curæ commisit filium suum sexennem Dom. Gras mercator Genevensis, eo capillitio insignem, vividi ingenii puerum, cui ab incunabulis volæ manuum & plantæ pedum æstu perpetuo cum squallore pruriebant: Phthisicum habitum gerebat, non secus ac mater, quæ qua nocte puellus obiit, gravi hæmoptysi laboravit, quam sanguine illico emissio liberavi: Sui juris erat infans, diæta qualem operabat, semper usus; Si parentes probam urgent in spasmos agebatur: Sexro ætatis anno hæcticæ indicia se produnt, cui se putrida, horis vespertinis exurgens, & ad matutinas se porrigenis, adjunxit: Quæ indoles fuit puelli ad alimenta, eadem & ad medicamenta, ad quæ male se habebat, solida solum appetens, panem domesticum & fructus; unde facilius tabem contraxit, vel maxime quod lac, ratione putridæ, concoquere non posset, prompte enim in nidorem abibat: Balneum, imo ne semicupium, ne pedum quidem lavacrum unquam admittere potuit: Bimestri ante obitum purulenta manifeste expuere cepit, tum parens auscultare mihi cepit, ac credere malum in pulmonibus hospitari: Hæctica, quæ aliarum more, miris esse debuit, temperiei ratione ardentem æmulabatur, contrectari enim artus, etiam extra putridæ invasionem, titionis instar candentis manus urebant: Quindecim ante obitum diebus singulares effudit urinas, quarum superficiem obducebat cremor colore variegatus, Iris multiplices colores referens, ac paucis post diebus, prægressa per aliquot horas insigni jectigatione, pus merum & copiosum affarim, quasi per vomitum effudit, quod bonis ægri rebus factum credidit parens, revera facilius fuit respiratio: Interrogatus respondi abscessum, quem latere jam pridem prædixeram, disrumpit esse, superstes esse ulcus, sui natura incurabile & ob infans morositatem; Tandem marasmo torrido consumptus, pedibus tamen cedemate tumidis, 27. Julii anni 1677. interiit.

Concessa secandi venia, imus venter sat bene constitutus apparuit: Jecur pro ætate magnum, cystis fellea omnino inanis: Ren sinister insignis molis, sed extraordinariæ figuræ, quatuor enim constabat lobis, quorum qui superior cæteris extabat: Dexter totidem constabat, sed leviter scirrholus parte convexa: Apertus thorax mali mineram detexit: Purres enim erant omnino Pulmones, costis & dorso annexi: Uterque lobus, parte superna, ulcus immane ostendebat, pugnatum utrinque admittens: Cavitas cruore, sanie & pure grandinosa, topi æmulo referta erat: Aqua plurima limpida pericardium implebat, Cor magnum sed flaccidum; cujus sinus ætérino, crasso & multo sanguine repleti erant. Sectio à perito Chirurgo M. Mauriæ, facta est.

Puelli mater Martio sequente Phthisica obiit, lethum accelerante partu qui in procinctu erat: In malum incidit tum ob *sympliciter pœmâticæ*, tum ob contagium à puello, quem in ulnis perpetuo habebat, semper accubuum.

SCHOLIA.

Urinæ quarum superficiem etc.] Colliquationem solidarum partium indicare et voluit plerique cussam illam simumæ urinx instatantem: De generatione ejusmodi cremoris sic statuit Eruditissimus *Wridus* Interdum urinis quæ aliquandiu steterint, cremor quidam supernatur, veluti cum Tartarus aquæ incoquantur: hujusmodi cussa albicans, in superficie solis conerescens, vulgo pinguis & adiposa creditur, ac pro solidam partem colliquamentum habetur: quare talem urinam excremæ solis, statim abadi de quasi depuratorum pronuntiantur: Verum tamen ista concretio tantum salina est, quæ si igni admoveatur, minime liquatur, sed in substantiam cussaceam inducitur: Quinimo & hoc, & reliquarum utinarum in crusta-

menta, sunt veluti Tartarus coagulatione quadam in eis productus: talis autem concretio omnino dependet à particulis salis fluidi, sive acrofi, cum aliis talis fixi, aut alkalis combinatis: etenim in quovis tubero, ubi salium utriusque generis commistio, seu sponte Naturæ, seu *hæpæm* artificiali procuratur, crystallationes & coagulationes diversimodæ excitantur, quare locum quivis, cui cremor iste innascitur, aut crystalli in lateribus vasis concrescunt, indicat sanguinem à natura dulci & balsamica (qualis à sale volatilissimo dependet) in acidam & corollivam & principii salini fluorem & fixitatem deiciscere: Astutus in quibus reperiuntur solen (ut *Sepius* observavi) sunt spumæ sanguineæ, ætophia & dispositio hypochondriaca.

OBSERV.

OBSERVATIO XXVIII.

Phthisis à Suppuratione Pulmonis post peripneumoniam Pleuritidem sequutam.

Ioh. de Neef annorum ætatis 35. celebs, admodum teneræ nativæ constitutionis, gracillius ac glabræ cutis superficiei, temperamento sanguineo in bilem proclivi, anno 1696. in Maio pleuritis in latere sinistro apprehendit. Venæ sectio, dum vigeret occasio, neglecta fuit, ideoque humor ferociens ex pleura in pulmonem metastasin fecerat, in eo peripneumoniam faciens, ad quam in hoc corpore magna erat opportunitas, ob arctum utriusque partis connexum: Causam tanti mali iudicamus fuisse pestilentem malignam qualitatē, quæ in illis ædibus locisque vicinis adhuc nidulabatur: unde humores furiosa violentia inflammati his partibus impacti erant: quippe pestilentem aculeum cum haberent, pro indole ejus veneni cor impetebant, cujus robore repulsi in locis proximis imbecillioribus confederunt, ibi violentam peripneumoniam, cum larga sanguinis expectoratione efficientes. Tandem transit morbus in Pulmonis empyema, & postea in miserabilem exurationem, nam ipsam pulmonis substantiam expuebat. Ingenti hoc tabifico pulmonis morbo, comitante symptomatica hæctica marasmo febri, & ante mortem bimestri spatio, perennibus vigiliis, ac perseverante diarrhœa, omnes vires expolientibus, tandem Dec. 20. ejusdem anni placide exspiravit, nullo torum qui in eodem conclavi aderant, mortis ejus agonem animadvertente: Mens perpetuo usque ad fatalem horam constabat. Erat totum corpus aridum & exutum, muscoli plane exhausti & arefacti.

Dissecto cadavere, in pectoris latere sinistro deprehendimus pleuram involatam, pulmonem autem undique firmiter adnatum pleuræ costisque ac pericardio: Membrana pulmonem ibi vestiens integra erat, qua dissecta, magna cavitas & cloaca se ostentabat, nam in singulis illis sinistris pulmonis alis, sive lobis, una continua empyematis vomica existebat: parenchyma torum erat eliquatum, in pus crassum, album marcidum, cujus majorem partem æger tussii acerba ejecerat, nam noctu & interdum irrequiebili ea vexatione exagitabatur: Sola vasorum majorum & membranularum ea connectentium, arida & exanguis substantia supererat, quæ ad similitudinem rarioris retis & texturæ cõformata spectabatur, quibus invicem hærebat crassa ea purulenta materia, tenaci pituitæ commixta, sicuti in lacubus videmus interdum algam retibus piscatoris hære: In latere dextro thoracis, uterque pulmonis lobus plane liber natabat, nullis membranularum retinaculis ulli parti annexus, foris integer & naturalis constitutionis, sed cum eum attingeremus, ut explorarem an non alicubi vomica aliqua delitesceret, duritiem in profunditate lobi ejus superi animadvertimus: ideo facta sectione, deprehendimus in parenchymatis medittullo vomicam conclusam, eamque non exiguam, qua dissecta multa purulenta materia profluebat: Ab ingenti hac pulmonis corruptela, spiritibus vitalibus & toto sanguine depravatis, indeque partium totius corporis labefactato temperamento, earum vitali vigore consumpto, ipsarumque substantia colliquata, & tum inde, tum ex defectu naturalis facultatis in alibili succo coquendo & retinendo, perenni alvi fluore comitante, adeo omnia viscera exaruerant, ut dissecto hepate, liene, renibus, nulla sanguinis gutta deprehenderetur: Dura ab ariditate erant omnia, sed hepar præcipue, quod valde erat magnum & æquabilis siccæ constitutionis, sine ulla scirrhi faxea duritie: Pericardii substantia & color, sicuti & membranarum mediastini, naturalis constitutionis erant, sed nulla prorsus pinguedine vestita: Dissecto pericardio, copiosior aqua subluxa spectabatur quam naturaliter consuevit. Cor per transversum dissectum nullum prorsus sanguinem profudit, nisi postea paucissimum cum instrumentis insertis vasorum procursum scrutaremur, nam tunc ex aorta & cava parum sanguinis in cor defluebat: substantia autem cordis bonæ erat constitutionis, vasaque ejus coronaria sanguine distendebantur. Omentum omni pinguedine destituebatur, ita ut tantum nuda esset membrana vasis intertexta, idque etiam auxerat ventriculi & intestinorum coctionis infirmitatem: Ventriculus parvus erat, totoque ejus fundo, seriatiim secundum longitudinem, plurimi à portæ vena rami gastrici & gastroepiploici inserti manifeste conspiciebantur, qui per omentum eo protenduntur & intestino colo quoque implantantur: quippe omentum colon ventriculi fundo annectit, unde earum partium summa est sympathia, tum ob eam connexionem, tum vel præcipue ob eorum vasorum communionem, unde fecibus in colo restagnantibus ventriculi appetitus & coctio destruantur. *Otho Heurnium Observat. 1.*

SCHOLIA.

Vomica (conclusam) Empyemati & peripneumoniae nonnihil affinis est. *Pulmonis vomica*, utpote cujus materies morbilica semper pus merum est: quod tamen sine febre aut phlegmone, imo sine tussi immo et, aut spuito, tacite ac velut improviso in pulmone generatur, & non raro malum hoc non prius se prodit quam patientem interimit: Galenus hujus meminit 1. de locis aff. Apud autores qui medicinarum systemata & praecepta scripserunt, mentio ejus raro aut vix omnino occurrat. *Nespius* lib. 2. cap. 10. affectum hunc ita describit. *Vitium hoc letet inter initia ita clanculum ut vix ulla sui proferat indicia, praeter tussiculam primoficam, mox humidam: qua aliquandiu committente, tribuitur difficilis spiritus, defuit anima & emersit paulatim corpus, licet interim nec pus nec sanguinem pra se ferant spinae: sed si remper nec opinatus vomica, occidit distam ac fatidam hunc.* Ita inaequum solet contingere, ut cum novi plures qui ex pulmonis vomica, intemem orta, macerata, & demum rupta, pus copiosum & fetidum exspuissent: cumque tale spuitum per multas hebdomadas, imo menses quotidie excrementis, debiles adeo & velut tabidi evaserint, tandem medicamentorum ope, cum ulcus detegeretur & siccaret, integre convalescere: Hic morbus, si raro formalis & causa ejus conjuncta inquinantur, revera est Abscessus alicubi in pulmone genitus: cujus materies, etsi heterogenea, & naturae inimica, haud tamen ab initio nimis acris aut irritativa exstiterit: Quippe cum primum haec à sanguine secreta, alicubi in pulmonis sinu, foras intra cellulam quandam velicularem deponitur, nec tussim excitat, nec inducit febrem: postea vero

cum sensum aucta, vasa sanguifera vicina comprimit, quin & ipsi sanguini juxta transeuntis effluvia inclinata soluntur, proinde febricula, cum inquietudine quadam & maiore succedit. & tandem illa ad plenitudinem aggesta, & diuturna coctione in pus sincerum macerata, cystin, live nidum suum pus valde distentum rupens, quaquaversus expandit. Quod si ad puris exitum via non patet, statim sanguis se immiscet, ipsumque aut venenat, aut à circuitu praepedit, vel in ductus tracheales confestim iterans, simul plurimos eorum implet, adeoque infarcit, ut acri pro sanguine inspissando aditus sufficiens denegetur, & illico flamma vitalis expiraret: sin vero materies illa exitum inveniens, & paulatim in tracheam influens, inde solum coarctaret fessi & eripui possit, propterea vix inducit, & therapeutae opportunis & spes conceduntur. Vomicae Pulmonalis materies proxima merum pus est, quod sapissime insigniter fœret, eoque differt à spuito quod in peripneumonia aut phthisi ejicitur: Undenam vero materies illa ab initio provenit, & cuiusmodi indolis, anequam in pus maceretur, finis determinare non licet: quoniam morbi hujus semina secreto solita, & clanculum adula, originem procul oculum ducunt: quapropter causae ejus procatarticae live remotiores latent: quomodo dum incipit & accrescit, neque per signa ulla phaegomonica dignosci, neque prognosis institui possit, anequam idis ferali se prodit, sed tota ejus res in insidiis est. *Wissu pharma. rat. et med. p. 2. sect. 1. cap. 10.*

OBSERVATIO XXIX.

Phthisis à vomica totius Pulmonis.

Pulmonem exulcerari novum non est, inquit Fernellius, sed totam ejus substantiam in pus converti, & nihil aliud quam pus esse, & sola membrana Pulmonem succingente contineri, ut in cavitatem, ea minime rupta defluerit, id rarum esse existimo: Idem ramen mihi, praeter exemplum à Foresto propositum, in Nobil. Juvene D. Joh. Bampfild. x. xij. annos egresso, proceram staturam, gracili corporis habitu, temperamento sanguineo, Nobil. matre Phthisi jugulata, fato: Hic ex erroribus in victu commissis, imprimis vero violentis exercitiis, & nocturnis comestationibus, à gravi catarrho neglectum habito, incidit in violentam & diuturnam tussim, noctu maxime assilientem, cum spuito rotundo, postea etiam virulento, ex albo virescente, subsequeute sanguinis spuito copioso, cum anorexia, & febris continua lenta, putrida, circa vesperam exandescente, accedente totius corporis extenuatione, atque carniū omnium. In hoc curando varie pugnavi, sed frustra scilicet acri quibus desperata salus est, ut Galenus ait, nullum neque auxilium neque tempus est opportunum: Siquidem extremis & pedibus calore languescere tumensibus, superveniente etiam diarrhoea, miser hic juvenis morte praematura, magnum sui desiderium reliquit.

Aperto post mortem corpore, visi sunt Pulmones, non tantum cum membrana, costas succingente, sed & ipsi pericardio undique adnati, & toti suppurati, manente intra tunicam ipsius Pulmonis pure, ad ipsam usque mortis horam. Quia pellicula perrupta, magna copia puris effluere incipiebat, adeo quidem olidi & fœtulentis, ut vix in conclavi, in quo sectio instituta, utut suffitibus factis, permanere potuerimus, De cetero nihil notatu dignum invenimus. *Frid. Lesius lib. II. Observ. xi.*

S C H O L I A.

Causa neglecti haberi) Ab humore salio vel aliquo acro a cerebro defluente, pulmonemque erodeute vel exedente eos exculecari, cuiusque possimam phthisis causam esse plerique censent, quod tamen tam facile vix fieri posse hoc: comprobare videtur quod innumeris quibus ejusmodi defluxiones multis temporibus molesta fuit, tussimque concitant, tamen minime sunt phthisici, juvenelique frequentius quam senes, quibus de fluxiones magis consuevit fuisse, in hoc malum incurrant. A defluxionibus tamen, tum quia tussim promovent, haeque aliquando venae tupsiam pariant, tum quia multoties pulmonum interiora irritando, eos successu temporis ledere possit, phthisin interdum

tuborini posse existimat *Platerus praex. lib. 3. cap. de consumptione: Devenit Theatri tabularum p. m. 79.* multos marcitos fere confectos vidisse se ait, quorum sanguinis universi systema tale scaturit, quique fluxione periodica mitioni, spumam mura condram per biennium aut triennium effluite per extremos arterie pulmonice, venose dictae, succulos, quibus tamen pulmonis erosio non accessit, Ex inter eos Londinensem mercatorem in sceleron propemodum mutatum, cui liquor salinus tandem a pulmone refluus tam effusus, ut chirones volis manuum turpissimos, ulceque excedentia pedibus & talis insulerit, salva adhuc nerva pulmonum integritate.

OBSERVATIO XXX.

Phthisis a Pulmonis duritie, plurimis parvis steatomatis confisi, Tuberculis parvis scatentibus, Ulcere in sinistro lobo, Vomica plurimis, &c.

Anno 1663. d. 7. Junii L. Joh. Van Horne secuit cadaver masculinum Phthisi defunctum in Nosodochio Academico Lugdunensi. Pinguedo abdominis prorsus erat consumpta, & nil nisi membrana carnosae apparebat, Omentum magna sui parte erat consumptum, Ejus usum, praeter communem & vulgarem, esse putabat, quod fir suspensorium sive mesenterium coli, quod sua gravitate deorsum tenderet, nisi suspenderetur ab omenti rabula inferiore. In cavitate abdominis aqua cruenta copiosa reperiebatur. Plurimae glandulae in mesenterio conspiciebantur, aliae pisi magnitudine, aliae ad magnitudinem fabarum. Pulmo valide annexebatur pleure: Aqua subruenta copiosa in cavitate thoracis continebatur. Ductus Pancreaticus & Biliaris intervallo duorum transversorum digitorum distabant ab invicem, ubi fiebat insertio in intestinum tenue, quod a multis annis in homine se non vidisse alebat. Lien erat exiguus, & naturalem habebat figuram instar plantae pedis, colore erat satis sano, ad hepatis colorem accedente: Hepar quoque moderatum erat nec in magnitudine excedens. Vesicula fellea flaccida erat & bile fere inanita. Capsulae atrabilariae egregie apparebant, quia alias pinguedine valde obducuntur: semel tantum in illis reperit humorem nigricantem instar atramenti. In pericardio aqua subruenta satis copiosa continebatur, cui purulenti quid erat permixtum. Sinister cordis ventriculus valde erat flaccidus, & pauca carne constabat: Membrana pulmonis exterior insignis erat crassitici & veluti concreta pituita. Pulmonum parenchyma, quod alias flaccidum & spongiosum esse solet, duriusculum erat, & multis quasi granulis instar steatomatum, quae aliquid sebacei continebant, refertum: Tuberculis pure scatentibus totus Pulmo obsitus erat, & in sinistro lobo ulcus manifeste cavitate sese prodebat. In dextero etiam lobo *vomica erat* longe majori cavitate, & minores plurima per totum pulmonem. Passus fuerat aliquando fracturam costae, quae per callum iterum coalescerat: Serosus humor subruentus & subfalsus in ventriculis cerebri continebatur. Ex Observationibus D. Joh. Henr. Brechfeld, In Artibus Medicis Bartholini anni 1673. Observ. xiv.

S C H O L I A.

Vomica erat insignis & minores plurima per totum, &c.) Pulmonis vomitarum causas & generationem, curandique methodum hanc tradit P. J. Faber Univers. sapient. lib. 3. cap. 3. Vomica est Pulmonis abscessus, seu Tumor parvulus & exiguus, ab excrementis virulentis & malignis ipsius Pulmonis ortum dicens, quae ad partem aliquam pulmonis detruduntur & sepaantur, ibique, ne cordi & viis spiritibus noceant, membrana tenui obducuntur, sub cujus tegumento punctum & virulentiam adeo magnam & malignam qualitate acquirunt, ut tandem sumptu munita, virulentum illud pus & malignum per totum pectoris spatium diffundatur, & cor perat & inficit, viamque suam & calorem initium obruit & extinguit, unde sequitur repentina mors: (Signa ex Febrilio desumpta) Signis apparentibus sic succurrendum est, Purgandum imprimis est corpus nostra purgatione anrimoniali: nec cassum tutiori & meliori medicamento posse uti adversus crudelem & tantum hostem quam solo hoc medicamento; quo ter aut quater est

utendum per tres aut quatuor dies: Summo mane, jejunu ventriculo danda sunt grana 6. aut 8. animonii nostri praeparati cum vino pauco, & post tres horas propinandum est pulcum optimum buyto alteram ut melius fiat alvus: Purgato deinde corpore utendum est oleo vitrioli vel sulph. cum pauco sps. Terbinth. ad guttulas x. vel xii. uniuscujusque propinandum & cum syrupo violae permixtis, Et sic curatur vomica, vel enim evanescit, vel nuptius sine lesione, quia malignitas majori ex parte purgatione nostra evacuat, quae nullo alio medicamento evacuari potest nisi solo animonio purgato vel sudorifico, quo sudoribus elicitis, in tuto est ager: Oleum etiam animonii robrum mirum est in curatu vomicae sc.

Preparatio Animonii P. J. Fabri.

℞ Animonii & Mercurii sublim. ana. reducantur in Aikool, & imponantur retortae vitreae ad destillandum levissimum calore: Gummi seu liquor crassus eg. effusus rectificetur ter aut quater. Deinde permisceatur aqua communis, clara & munda; Pulvis qui praeparatur

Bbb 2 piganar

pulvis in fundo albissimus, lotionibus multis aquæ communis edulcoratus donec nullam habeat acrimoniam sed dulcis penitus & insipidus sit: Hic pulvis erit Catholicus Chymicus summum, quo uti poteris ad curationem omnium morbosum: supra & infra purgat sine ulla læsione. Dosis ad gr. xv. in vino rosæ pulcilo: Pulvis hic albus si permiscetur æquali quantitati salis petri in sigillisq; fortis ambo comburantur, iter aut quater iterata cōbustione simili, postquam lotionis aquæ communis salis petri subtilata fuerit acrimonia, & iterum edulcoratus pulvis, tunc fiet expurgatus sudorificum, cujus dosis ʒi ex aqua caduci bened.

Mores plerumque per totum thoracem Fernellius Pathologie lib. v. c. cap. vomituum in Pulmone hunc tradit generationis modum, Vomica Pulmonis est abscessus exiguus & puris in Pulmone quadam parte collectio, quod membrana propolisque cysti ac deo concluditur, vix ut quicquam de se terram in cor exspiret: Hac frequens est in Tabidis, sed & plerumque

sine tabe fit, cum sanguis ex aperta, rupta aut excisa vena, in parvam quandam pulmonis regionem secedens, illic putrescit, lentissime murmur in pas, ac per summum succedens sibi cystim efformat: *Alia signa hac affert*, Latens profecto & in primis obdum est vitium, læpe nec laboranti nec Medico notum: quo laborans ipse nec consuetu munia intermitte, nec le morbo teneri putat, eandemque intus sui nesciens inrus gerit sub pectore. Sic affecti sublivido fere sunt faciei colore, etique linguae lentore quodam est oppleta, maxime cum longe à cibo abstinat: & corporis agitatione, aut potu calidioris utinis facile tingitur, & polsi citatur, citra tamen ullam sperandam difficultatem: Interdum vero post concitiorum corporis motum pilula parva, & globali inflatu pisi exigu redduntur & pulmone, membrana conclusa, nec coniecti digiti pus reddunt fœtidissimum, quale è cavo putridoque & carioso dente interdum expurgatur: Exemplum vide infra sit. de morte repentina ea eodem Fernellio,

OBSERVATIO XXXI.

Phthisis à parte sinistra Pulmonis Tabida, incolum dextra; Puris ingenti copia in thorace.

VXOR prædictis Carmeli annos nata xxi x. nata Patre pulmonico, qui Tabidis inerat, eo fere anno extincta est quo & Pater, adeo magna est vis morborum congenitorum. Fuit tempus cum suppressi fuissent menses ob causam manifestam (nam ægre mariti morbum ferebat) ubi ceperunt fluere belle satis habebat; Tandem quæsta est de linguae rubore & siccitate, juncta siti insigni. Pulmonum ardor erat & *ipsonum vultus* aliquid, concepit, peperit; A partu subtiliterunt lochia, *Febri, dolores lateris sinistri: circa vespem febri recedebat*, ja& abunda, ægre spirans, frequens spiritus: animam actura videbatur; febris mane (ut in morbis fere omnibus accidit, favente quodammodo aurora) remittebatur, *inequalitas erat calor & frigoris*: Ille status dies pene xxx. perstitit: nullo juvabatur remedio, licet decies aperta vena fuerit: tandem mors: Non erat gravis spiritus, *Non multum iussibat, & nihil materia spuo excrebatur. Facies ejus fere index erat affectionis pulmonicæ*, nam tota sæpe erat velut subalbida, & illi, quos Hippocr. *ἰσχυρὸς* vocat, latine Excoctos dices similis. Et hæc facies aliquando rurgidula est, & familiaris iis qui sunt aut suppurati, aut quibus piruita putri fœtcent Pulmones: Sed & genarum alias erat rubor fugax, & sæpissime *ignes sacri in faciem involabant.*

Aperto cadavere omnia sana occurrerunt præter pulmonem, Pars sinistra Pulmonis fere magna sui parte tabuerat & tabo infecta erat, sana reliqua substantia. *Purulenta materia* continebatur illa thoracis parte, æquans sua quantitate tantum quantum dox pintæ Parisienses complecti possent: Tamen fœtor non erat. *Ballonius consil. iij. lib. iij.*

S C H O L I A.

Febri) Cum olim igni sylvarico (qui herpes dicitur) partes faciei occupare laboraret ægra, quæ sequuta est febris, non puris & erysipelatis dicebatur: Ut enim tumores contra naturam differunt, ita & febres, quarum quædam sunt anginoæ, ut synochi impetres: alia bilioæ, in quibus potius alterationi quam vacationi locus esse debet.

Circa vespem febri recedebat) Hippocr. p. 60. lib. 2. progn. inter Empyrematicorum signa ponit febrem non remittentem, quæ interdiu minor, noctu vehementior est. Id nos in nostra ægra vidimus & in Lucio Equite (ut æque enim consimili morbo consumptus est & cum iisdem symptomatibus) exacerbationes maxime nocturnas, dyspnoeam, motum præteritum suffocationis, denique desperationem: ut in singulis affectionibus nocturnis de exequiis potius cogitaretur quam de exequendis Medicorum præceptis: Et tamen singulo quodque mane, ubi materia defœbuerat, & calor remissus erat pene uterque restitutus videbatur: causa autem verisimiliter istius perturbationis & exacerbationis nocturnæ esse videtur: In omnibus suppurationibus, (agitur enim de Empyricis) dolores ad no-

ctem incidunt, id quod non tantum audiendum dum pus fit, sed dum pus continetur aliquo parte foras febrem leniam: Cum autem Empyricis, & propterea hæc febri implicitis, partes solide ignis sunt, non mirum si noctu calor increseat (non ob alimentum, ut vult Gælenus,) sed ratione ipsius dyspnoæ, quod tamen non vult Gælenus, & quia non humectat (ideo calor hæc calci non dissimilis le prodit) revocatur calor & spiritus intro, sic calor increcit non solum qualitate sed & quantitate: Et ita dum revocatur calor ad centrum, distillationeque prohibetur ob noctis dominatum, calor ille maleficus est, malignus, squalidus, non *ἰσχυρὸς*, nec nanciscitur *ἰσχυρὸς*, i. e. focum, locum, domicilium aptum & conveniens, & calor fixus non accipit fluentem istum calorem febrem tanquam amicum, & *ἀνταρτίον*, moderantem contemperantemque, sic non bene convenit illi calori fluens cum fixo, licet uterque in ægrem conspiret. Sic cum recitat calor maleficus, & nanciscitur æque malum & perniciolosum, dum augetur calor & dolor, non sunt accessiones novæ febres, sed *ἡδύμενος* calor & exacerbationes quædam,

non ob novi humoris eorum, sed ob ignitam naturam solidam partium seipsa factam ignisorem, quomodo Gal. in aph. lib. 2. docet formam aliquando obtinere, ut cum humores, calor & spiritus revocantur intus, & augentur inflammationes & dolores, ita in Empyicis fieri solet. Quare autem quia, an pus motus habeat nocturnos potius quam diurnos: nam & in inflammationibus interius paroxysmus est nocturnus, & id non est proprium nec hecilia, nec empyicis, ne nocturnas molestias potius experiantur quam qui aliis morbis implicentur. Unde mirari sumus cur antiquitas peculiaris quoddam privilegio exercebatur nocturnam puri & purulenti assignaverit, nec enim id novum est. Nam & veneris hae affecti, praefertim ubi solidae partes in valet & confusae, nocte dolent magis, & arthritici, & inter alios, & anasarca, & catarrhi, denique multo magna pars egrotantium. Praeter dictas rationes sunt & hae probabiles: quia omnes ferre morbi sub tempore noctis ingravescent, partim quia ob adveniens tempus nocturnum sit admirabilis quidam motus & revocatio intro, motus quidem plane contrarius morui ipsarum vigiliarum. (Calor enim naturalis verum Solis heliotropium est.) A. Cofitio fit noctu, non solum humorum naturalium, sed & contrariis & febilibus, ut dum puri subieci augetur & dolor. Quare ratio & analogia de pure in abscessibus, in aliis morbis & febribus audiri potest, maxime autem id apparet in Empyicis: dolent enim partes solidae, & augetur calor febrilis, qui interdum in patres omnes expansus erat. Accedat ad eas rationes, quod inter vigilandum animus occupatur, & vigiliis animus morbus sequitur, & mens ipsa sese noctu recolligens tota in morbi & doloris cogitationem incumbit, admirabilis enim motus est intro inter dormiendum.

Non multum suspicet & nihil materia fuit excreta (Cur cum tanta materiae purulente in thoracis capacitate contineretur, non multum tullebat, & nihil materiae illius videretur excreatione educabatur?) Galeus part. 6. lib. a. progn. res omnino assignat causas ob quas pus in thorace contentum non excretaur, Puris lentorem & crassitudinem, membranae pulmonem ambiens densitatem, facultatis in agrotante infirmitatem: Addendum unum puto: pura pulmonis finistri excreta & corrupta erat, quare illud purantia collectam copia non follicitabat facultatem ad excretionem sui: facultas enim valida erat, membranae densitas non impediebat, (nulla enim ea in parte erat, ut pote consumpta) pus non erat adeo spissum crassumque. Dicam mea conjecturas. Pulmo non sentit, habet enim corpus aliud, si aliquis sensus inest, ob membranam inest, at hae tabuerat, ideo non poterat esse sanus instrumentum, ideo vallicatio & punctio non sentiebatur nisi in membranae collis subrepta & succincta, unde dolor percipiebatur acutus, sed polmoni non erat recipiendus: pura enim pulmonis afferta, pus in latere sinistro contentum non exugebat, ideo non expectorabatur, nec tullebat, quae irritamenti & calcaris inflat esse posset. Alia conjectura, crassior pars illius puris, aut puria pituita, obducta erat patietibus & thoracis & pulmonis reliqui, & sic impediebat quomodo materia collecta in capacitate thoracis pungeret & irritaret, unde Tullia moveretur, Quomodo videmus plerisque cum rulli (quae est calcaris inflat ad depurgandum coepus pulmonis) quantitatem aut puris, aut pituitae videri, omni maiorem fide excrevisse, & postea sani satis vixerunt, & cum tabuissent parva bonum corporis habitum & compa-

recuperarunt.

Ignis sacri in faciem involabat (Ex doctrina Hipp. didicimus de maculae, & ulcerae, & ignes sacros in orici quibus Pulmonem corpus in temperie laborat.

Purulentia materia continetur (Cur toties dictum est puris, aut Puritae puria & videri? Quid illud est puris aut pituita videri? An idem sunt, an longe distinguuntur? Dico ego puritatem purrem totam, & praefertim admixto fero puri & bilioso, ut id quod excretaur virulentum quodammodo fit & subviride, idem facere fere quod & pus: Sed in hoc differunt quod pus est malum ut signum & ut causa: ut signum, quoniam abscessum & inflammationem syltophicae praefertim declarat, unde confumpcio partis pulmonis sequuta est: ut causa, quia nisi exeat febrem lentam fovet, rigores inaequales affert, & corruptum pariam, & cum manet & contagio vicinam. Ista vero puria puris, & equaliterem natura & lavorem, multa est ut causa, quoniam afficit pulmonem ipsum moxa, nisi exitum habeat: sic in tullebus cum puria excretaur, & spiritum album est semper, & quia non videretur: hac materia initio bona erat, puria enim & proprium erat capitis excrementum, sed per moram, & putredinem quandam & vitorem acquisivit, dum cumalata in parte non haberet suam naturam, comita erat quidam videri, ut loquitur Theophrastus, quae putredinis & gravis odoris est causa: Ac praeter moram istam, & videri, & distillationis carentiam, observari debet quoque esse quoddam, quibus ob proprietatem quandam puria omnia fere qui in eorum corporibus gignitur, habet aliquid videri, unde quantumque in partem incurrit, favitiam suam manifestat, dentes totidie & suis alveolis radicibus erasit distulbat, cheradicos tumores mover: eadem si in pulmones irruit, exulcerat, afficit, denique in putredinem eisdem pulmones resolvit: excreta est Pulmones eadem materia habet aliquid insuave & aspectu horrendum: Vulgus putat esse pus, saltem pene eisdem habet effectus quos & pus ipsum: In ista agra, tanta materia quae aperta cadavere iuventa est, pus non erat meo iudicio, sed pituita videri, quae speciem abscessus prae se ferebat: Si enim verum pus fuisset, unde tanta copia, cum argumenta apostematis non percellissent: Sed uno fere anno antequam excrevisset, erat illi ingens sira, lingua sicca, febri nocturna, calor acutus & mordax, inappetentia, facies colore subalbido, (vulgo de tantis casibus de pueris videri) nisi quod male fugaci quodam rubore suffundebatur, in facie crebro ignes sacri & volantes, quae omnia male affectorum Pulmonum signa erant: Sic a longo tempore fovebat illud malum & collectionem malignae pituitae, quam si tulle irritata excrevisset, ab eo periculo videri afferta, et tulle non erat: Et nec cui mirum videatur hoc de ista puri pituita commentum, adducendus est Hipp. tanquam pro nobis fidelissimus, Finit, requirit lib. 2. de morbis, suppurati nonnulli si pituita de capite dalapsa ad latus agglutinata fuerit & putruerit: tunc enim latus ut plurimum inflammatur, & partur eadem quae & ex pleuritide suppuratur: Id quod si alius alicui agro accommodari potest, hanc nostram agra accommodandi est licet enim suppressa fuissent locbia, & dolor lateris sequutus fuisset, non tamen credo per anadomen sanguinem id tamen mali peperit: sed data occasione, & ob partum, & ob suppressum sanguinem, malum quod ante signa aliquot sui ediderat, nunc sedit, & sciendo seipso sit detectum.

Addam hic differentiam puris & purulenti, Græci *πῦρ* & *πυρρὸν*. Hipp. lib. de alimento eam distinctionem assignat, *πῦρ τὸ ἐκ σαρκὸς, πυρρὸν τὸ ἐκ σπυγμάτων*, i. e. pus ex carne, purulentum & puri simile, ex sanguine & alio humido: Ex carne autem pus fieri ait, quod suppuratio non videtur fieri sine erosione partium carnosarum capacitas in qua pos sit, unde ex carne erosa pus surgit in consensione est procutanda suppuratio, quia nulla caro nova generari possit antequam consueta caro in pus vertatur, Ex *σπύγη* aut pus exire ex vulnere infescente, quod corrupte carnis in pus conversionem sequatur novæ carnis generatio. Contra Hippoc. *ὅτι ἡ γὰρ ἑλκὺς videtur, ex sanguine pos fieri ratus, quod in phlegmone in abscessum abeunte, sanguis extra vasa effusus in pus vertatur*, At Hipp. ex carne pus verum aut fieri, materiam vero puriformem ex sanguine & alia quidam humiditate: Et vix in phlegmone suppuratio fit sine carnis erosione, id sinus indicat post puris evacuationem: & sanguis extra vasa fulus & calidior, bombardam & calidam carnem quam attingit, corrumpit, ex qua carne, si natura robusta fuerit, verum pus nascitur, cui non raro admiscetur aliquid *πυρρῶν*, ex humoribus & sanguine extra vasa effusus: Notandum autem est etiam ex Hippoc. humores sæpe *σπυγμῶν* esse, ut in pus non vertantur, unde p. 24. lect. 3. Epidem. dicebat, *σπύγη non erat puri similes, sed alia parva*, i. e. non verum pus fiebat, nec ab humoribus, nec liquoris carnibus, nam corrumpebantur ossa, nervique decidebant. Ergo Hippoc. distinctio *πυρρὸν* & *πῦρ*, de pure & purulento statui debet. Nos autem distinctionem à duobus fontibus derivari docuimus, A priori quidem, ex sententia Hippoc. A posteriore fonte ex parte humorum, nam quidam sunt qui facile suppurant & à natura reguntur: alii non suppurant, sed aut in corruptum quid, aut ichorem, tabum & sanicem convertuntur: nam cum sanguis laudabilis ad partem afficit tumoremque facit, suppuratum laudabile procuratur: si humor malignus, graziarum natura non admittit, sed ut humor est heterogeneus, ita pus quoddam *εμπέμπει* & *ἐκσπυγμῶν* dictum gignit, unde varicellæ, exanthemata, carbones, cithymata, herpes à maligno sunt humore, unde in iis pus verum gigni non potest: qui enim humores toto genere contra naturam sunt, sunt conditioni incipaces, corruptio enim in parte fit. Ut ad agram reditus fiat, ista clavis & copia purulentiæ materiei, pus non erit, nec erit consumptio (saltem magna & æqualis copia humoris) corporis ipsius pulmonalis: nam si pus fuisset venam, & præcætesis ulcus pulmonis, oportuisset præcessisse magnum alium, magnæque consumptionem corporis ipsius pulmonis. Ergo à sanguine erat *πῦρ* & *πυρρὸν*, ut Hippoc. loquitur. Vnde videmus ex thorace vulnerato, aut non vulnerato, (idque post cadaveris sectionem) ingentem copiam alias pituitæ purulentæ, alias saniei erueret, in conspectum venire, quæ materia propterea non est pus verum: aliquando excernuntur quidam *σπυγμῶν*, & id fit dum dilescipit & aliquoties caro ipsius Pulmonis.

Inæqualitas caloris & frigoris Vicissitudine caloris & frigoris malum esse non dubium est, præsentem in acutis, nam significat hoc extinctionem caloris naturalis, qui uniusmodi cum sit, partibus omnibus blandè assignat, & dominium febrilis caloris, qui cum extenditur ad partes, eas calfacit: cum ad centrum revocatur per modum inflammationis, eisdem partes deservens, ex evenit refrigerat. In acutis itaque malum hoc. Nec mirum si in acutis tantum meruero, ac si quis velit in omni morbo eam refrigerandi & calfa-

ciendi vicissitudinem perniciosum esse, quod non ita est, nam ex Hippoc. 4. aph. 40. *ὅτι in toto corpore mutationes, ut si corpus refrigeretur & modo calfacit, aut calor mutatio fiat, longitudinem morbi significat*. Aliud enim est illa vicissitudo longitudinem morbi significat, aliud periculum: nam in acutis periculo non vacat; in moriosis morbis longum fore morbum significat, nam de focum multiplicem significat, & materiam *σπυγμῶν*. Sed dubietur an malum quoque sit modo calorem acutissimi febrilis, modo temperatum? Solemne est in multis febribus, præsertim phlegmaticis, calorem aciem apparere, & eandem temperantem præsentem febre, hoc tamen malum non est, nam aut vacietatem tantam materiei declaret, aut calor in materia viridi oppressione, nequeuntis emicare: Nec malum quoque significat in febribus cum eadem junctis, in quibus sæpe observavimus modo emicationem caloris, modo ejus teporem: Item fieri potest ut calor naturalis modo superet febrilem, & contra fiat, hinc acrimonia perceptio, hinc tepor, & tamen hoc vacat periculo, sed his sic fatisset: Cum de vicissitudine agitur, videndum quod corpus, quæ morbus & qualis vicissitudo, ac frequens an non. Nam in biliosis corporibus, in quibus calor totus acit est, non est expectanda vicissitudo caloris acris & moderati. Sed si morbus perniciosus est, pro moderati caloris perceptione frigoris sensu percipitur: brevi enim calor blandus, in quis est, extinguuntur. Sed in corpora *σπυγμῶν*, quæ sunt, in febrili, mellebri, frigidi aut temperant humoribus scitente, non est quod expectemus extremas partes refrigerari, ut in aliis corporibus biliosis fit, nisi forte diutius ægrotent, tunc enim refrigerium apparet, itaque quod apparet vicissitudo frigoris in biliosis & emaciatiss, idem esse potest à moderati tepidique caloris sensu: A materiei enim vapor effectus, qui cum puris sit, sensum acrimoniæ affert: cum calidus, caloris sensum: quod autem abolire & per se frigus non apparet, id facit conquisita febris: At continua est, dicitur, in biliosis: Verum, sed duo consideranda sunt: Vnum quod in biliosis incendium inextinguibile facile revocat calorem diffusum ad ipsum centrum: Item, non sunt humores moderati in quibus fuvetur perperno febris. Sic videmus quadratos semper calere hyeme, nec multum calere æstate: Si eos macilentosque hyeme algere in æstiva, æstiva ardere, algere autem in his æstiva, quoniam caro multa non est que sit pro velamine & præsidio adversus frigus ambientis: In iis qui pluviosi sunt & finceto morbo corripuntur, sensu frigoris non apparet, sed tepor quidam, ut modo incalcescant, brevi tepent, quod satis malum est signum, in iis, præsertim si vicissitudo ista sit frequens, linam consuetum narque declaret, putris materiei copiam, à qua modo essent vapor, modo non essent, idemque contingit quod in simo portente, nam dum ter maligæque vapor effertur, sensu febrilis acrimoniæ, cum non effertur, febrilis calor tantum tellat qui partes calidas reddit: Ergo dictum est de corporum malicia & de vicissitudine. Nunc de morbo. Cum acutissima & maligna est febris in corpore calido siccio, brevi perfrigerationem extremarum partium affert: cum autem maligna est febris, in partium imbecillitate summa potiora & humorum prævitare, nec acuta hæc est, acutiei vim habens in calore, sed toto genere maligna, minuat aut pas oider, aut abscessum alium morbo imparem, aut pustulas, (quod contingit & die Sileno & tamen ita). Interit non in partes exime algere, præsertim si corpus cauum sit (quod impellit caloris à sanguine & spiritu facile in extremitates) sed febris

febris perleveram, teporis & acrimoniae sensum exhibens, tandem cum calido sudore corpus rogit; Ita enim videmus quosdam interire cum perfrigeratione partium & sudore frigido, & ut coneligitur fucis & emaciationis, cum toto febris tempore non sudaverint, aut leviter tantum, sine ulla perfrigeratione, cum universalis sudore, multo, calido, occideret; Atque ita minime opinor nobis multo innotuerit: quoniam non vident ullam partium perfrigerationem, quam in aliis quondam observaverunt, Nos autem observavimus illam partium perfrigerationem in motu, cum corpus licet calidumque est, calore igneo & acriter in eis observatum est quibus in partibus internis conceptum est incendium, nam & cum sudore frigido moriuntur, & cum summa partium schidione. *idem corp. 45. lib. 1.*

Causa ejus turgida. Phibiscosorum alii summe extenuantur, quibus scilicet corpora solidiorum alimen-
tamen consumuntur, aliis tument sin pedes, aut facies, aliquando totus habitus: Ab eadem corruptione id

fit, sed diversitate, Nobili viro tabido & phibiscosia stipe oriundo paucis antequam moreretur diebus, totus tunc habitus intumescit ac si hypofasciis laboraret, sed quod minus fuit, tumor erat fugax, unde hoc loco sanguinis Hepar tabescens huius malignos generabat: *idem lib. 1. Epid. pag. 51.* An causa potius referenda in huius est peccore elevatos? annotat enim in biliosis faciem subalbidam & turgidulam familiaritatem esse illis qui sunt aut luppurati, aut quibus pituita potius sentent pulmones. Sic in illis quibus impenit calens, malorum tubar apparer.

Dolor lateris fissus multi Pulmonosis levi de causa dolores lateris eadentur pleuritidem mentientes, An hic ad sedationem doloris frequens V. Si minime, cum tantum aut fluxus sit, aut febris exigua, sic scitio non confert; nam si cum dolor oritur levis sit, laedes plurimum, nam latera tandem debilitantur, & hoc nocet. Si inflammationis sit suspicio, id quidem agendum, & protinus ad anodyna confugiendum. *idem lib. 1. Epid. pag. 18.*

OBSERVATIO XXXII.

Phthisis à pulmonibus scirrhosis, ulcerosis, &c.

A Mulleri 4. ann. cum 1666. mense Decembr. cursu fatigans & calefactus fuisset, ce-
levisiam absinthio medicaram bibit homo biliosissimus; diebus sequentibus strenue
potui litans, sensit dolorem thoracis circa sterni dextram partem, qui ad eaput extendebatur,
cum tussi & excretionem materis flavæ, purulentæ & respiratione difficili: Vi morbi
vere anni sequentis oblit, irritis medicamentis.

Inveni, dissecito sterno, Pulmonem dextrum totum scirrhosum fistulosisque ulceribus
scatentem, adnatum pleuræ, diaphragmati, & mediant hoc, hepatis. Sinister quidem ali-
quanto erat integrior & spongiosior, nihilominus communicata & cum ipso erat ulcerosa
colluvies (sternor vero omnis aberat) & adnatus quoque erat hic lobus Pleuræ: cor erat
flacidum, & venæ ejus exteriores turgabant sanguine: Aqua in pericardio flavescens &
pauca: sanguis in utroque ventriculo nigerrimus. Hepar totum adnatum diaphragmati,
ex pallore flavo rubescens, nigris interstinctum maculis, ex parte etiam adnexum costis.
Lien pariter adnatus, colore quidem probo, magnitudine eximia in rotundum declinante:
Vesicula fellea parva, quod, qui hominem noveramus, mirabamur: Ventriculus & intesti-
na integriori constitutione in præ se ferebant: Totum denique corpus exsiccum, exan-
gue, aridum, *exulans &c.* D.G. Wolf. Wedel. in miscell. curiosis anni 1671. Observ. 233.

OBSERVATIO XXXIII.

Phthisici Pulmo inteneratus repertus est, visceribus naturalibus illaesis.

Cum apud Bristollenses Medicinam facerem, qua urbe pensili *Tabes frequenter grassatur*,
nonnullos sputum subdulce levi conatu expectorantes, spatio trimetris fatiscientes &
totaliter enervatos vidi. Horum vero quosdam, non omnes, tussis vehementior aliquo-
ties corripuerat: ex profuso tamen vitali nequæ deflorescentes & arecentes, strigosi
periere.

In quotum unico, detectionis causa dissecito eadavete, licet sanguinem aliquoties,
peracto salino pyralismo, exussierat, & Pulmo ubique inteneratus tonum amiserat, uni-
versa spirabilia, necnon viscera omnia naturalia, quoad sensum sana comperta sunt: *Ben-
nestus Theatri Tabidorum Exercit. 23.*

S C H O L I A.

NE à quovis inter mirabilia dignum censemus,
qui ineptitudinem sanguinis nimis attenuat ad
nutritionem animadvertit, aut sanguinem totius,
nimis à calore intenso liquorem & subulizatum, per
levium arteriarum oscula, æque ac per narium exi-
liora vascula in earum hæmorrhagiam ad æmperiam
exanimatum compexerit: Deficiente quippe leto con-
diente & contemperante, glutinosioræque ac magis

ac magis rorido succo moderate calido, dulcedinem
ac unionem conciliante, ut tota naturæ æconomia
corrumpi necesse est. Sputum hoc subdulce in omni-
bus quos vidisse memini, pyralismo diuinioci, & ut
plurimum salino, præcedenti, fuit consecratum.
Idem sputum igni admoerit, sicut succus omnis
nutritivus, in gelatine albicantis consistentiam per-
coquitur.

Subdala spiritus, &c.) Spitorum omnium materia pro continentis, ex quo nascuntur, varietate, diversificatur, lavisque diversa indota emergit: Nec solum sanguinis iterum, ejus magis fusile ejctamentum, cum redundaverit, aut divortium fecerit, in pulmonum capacitates transitarum perfuit, sed totida aliquoties substantia, adhesionem & nutritionem partium designata in os offertur: Sanguis tamen prius aquoso fuso contemporaneo defraudatur, unde incalciscit, cujus caloris excessus glutinosam ejus substantiam aliquando in pulmones, aquarum inundantium irrigatione laxatos & nimis incoeratos deponit: illique duntaxat accidisse credidi quibus ipse salus in angusto sita fuerat: Natura enim avide hunc succum amplectitur, donec perfecte soluta ejus compage vis allectrix & assimilatrix potestas deperierit, *Item ibidem.*

Spirum.) Spiritus Tabidorum naturam & differentias persequitur Idem ab Exercit. 16. ad 24. Spiritus naturam, aut Exercit. 15, à quo pectoralis suum contraxere periculum, ejusque motum venali consilio est: Quod nihil aliud est nisi liquoris particula à sanguinis massa, per vascula præsertim arteria pectoralis, in pulmonis capacitatem per infusionem translata, quæ motu pulmonum coarctativo, Tussi dicto, in tracheam, iterum tandem, amporum vel cujovis adminiculo in os, ejctionis ergo deducta est: Sanguis itaque se habet pro ratione nutrimenti, spiritum vero pro ratione sanguinis. *Spirum alium spiritum: Exercit. 18.* aquosioris magis fluxilis, in pulmonum aut fascium capacitates exaudæ & ibidem agnitæ productum indicat: Quod vero à capite per cerebri infundationem inspissatur, nisi in succibus elaboratum diuque retentum, minus candidum, magisque mucaginiosum, nec in bullitas abire, unde raro aut nunquam lœdine pulmo: Si tamen spumescens, partium motum, æstum, & aëris insufflationem contulisse tenet: Si sincerum prodierit hujusce generis spiritum, interea solummodo sudatione effusum videtur, spiritum aut partium motu frequentiori concitatum. Idem, inter exercitia multiplicat spiritum spiritum, in illis præsertim qui ad corporis peripheriam nihil aut parum propellunt, observat. *De Spiritu Subdala pellicula densabit. Vide Exercit. 19.*

Latorum Spirituum materiam à laticæ forsan bilefcente Exercit. 20. deducit: sed laticæ ante secretionem ita debiliat ut sapore saltem eminentiori spoliata sit: Bile enim, seu particulis amariculis omnis sanguis perfunditur, quæ pro coadimento ei affligitur, quod vetu saporem amittant, causam reddunt, quod non solum massa sanguinea universim perfusa fuerit, sed per partium paucenchymata & membranarum poros percoleatur: per hos enim meatus angustissimos non transiit illa substantia in qua amor habitaverat: *Spirus fulvior, ferrugineus & fulvior, Exercit. 21.* Non ab illis que spiritum natum olive acerbantur, ortum ducere ait, sed ab allaris, & aliquoties à proprio visceris aut vasculi succo inquilino, à liene fortio tanquam in pectus infusio primario profecta & fabricata: quorum quæ in sanguinem recepta circulationis beneficio extrusionem subeant: Spiritus ejusmodi à liene manans historiam affectu, Mulierum, cum impleto catan ho, cujus lien teris vaporibus ita sufficit cerebrum, ut inde quavis aurores destillaverit spiritus ferrugineus, facium æstu ad eam consistentiam cocti, ut telorum stantiarum speciem adimbraverit, cujus postlunculum catan ho calidus in arteria partem superiorem aliquoties de-

truse sit, Referatis tandem & detectis lienis vasculis pæta est tumultuaria, delius caratibus & spui commemoratis prævenit, *De Spato Salus rde supra 9.2. cap. 9.*

De Spato canoso & cinereo seu parulento, Vide alibi.

Qua arte Tabes frequenter grassatur) Ad phibit in duccendam sanguinis & pulmonum vitium concurre, scilicet aut conjunctum, ostendit: Hic causis merito accensetur altera utique communis, & tamen prius est in secula, cum utraque maximam necessitatem habens, quæ nimium est Aëris inspirati conditio live temperies: Enimvero nonnullis phibitis tanta est hujus influentia, ut morbi causa aëris in quo degunt incongruitur quandoque fere in totum adscribas, & pro oratione cœli aut soli mutatio certis quibusque remediis præfatur: Hinc nutritionum plures sufficere, aut tabidi, vitales Gallia regiones gregarum petunt: alique interitum, quibus trans mare currere non liber, aut licet, & fumosis, acibus statim in rus, tanquam ad certissimum refugium festinant: propterea quidem villa omnes prope Londinum, quæ aëre claro & perfato gaudent, phibiticorum quasi totidem nosocomia habent: Verumtamen à tali locorum mutatione haud ex æquo javam recipiunt, multi enim aut Galliam, aut villas rusticas petentes, ibi sepulchra potius quam sanantem inveniant: quoniam Londinum haud statim à phibitis omni bus relinquendum est: novi enim plures tussi ac phibiti obitantes, multo melius in hoc aëre fumoso quam ruri valuisse: Ita propterea ejusdem morbi sanationem, dum alii hanc urbem quasi barbarum vitæ, alii hanc tanquam ad asylum confugiant.

Horum rationes ex Respirationis doctrina elucidantur, omnium ostendimus sanguinem pulmones pectantem, & quod accensum sit vitalitatem, & quod motum suum ab aëre nitroso inspirato plurimum pendere: unde sequitur hujus tenorem ad illius crasso ita proportionari debere, ut sanguis intra pectora modice accensum, clare & vigeat, tum sine fumo & saligne, tum sine flamma nimis incensa effluat: proindeque vasa pneumonica satis libere, abique remota ut recementorum depositione trajiciat: quam ob rem aër humidus palulit ac minime perfusus cum nullo salubri, ita sufficiens plurimum infusus exiit: E contra aëris serenitas amittit, sole ac venio moderatis gaudens, ut canis salubris, ita phibitis quibusque amicus deprehenditur: Quod alias aëris inspirandi conditiones, nonnulli nullum evitant, aut amittunt, degeudo in locis montanis ac apricis, ubi Atmosphaera impendens, vaporum quotumcumque crassiorum fumorum & excoleorum expens, particulis nitosis abundat: nam quorum sanguis crassus & exulentis sulphure impotens sciret, ad hunc rite accensum, & ad facultatis accensione absumens, aëre perenni & maxime nitroso opus est: Si modo pulmones haud nimis teneri fior, sed firmi tatis & robusti, asperiores ejusmodi particulam appulsi ferunt: E contra qui sanguinem tenuem & subilem, facile dissolubilem, aque sulphure puriore, sed preterea prædium, simulque pulmones teneros, molles & tenuis tationis valde sensiles obtinent, aëris nitrosi & asperiores impatiens, crasso ac imprimitis sulphureo maxime gaudet: Quæ his vile est utris fumosis auram pinguem & hebetiorem haurire, quæ nimis sanguini pinguem & renouit sulphur (quod aliquoties delicti)

aque ac nitrum præbent, quæque constitutionem subtilem ac nimis distillabilem nonnulli instillat ac figas insuper & pulmonis substantiam, siue texturam nimis sensilem & rariorem haberet, & contra aeris acris & improporionati occurrus muniat: Profecto crebra experientia sua liquet aerem crassiores, modo etiam sulphureus fuerit, phthisicis quibusdam

(ne dicam omnibus) valde benignum existere: communis observatio est regiones istas, ubi ignes ceipice nutrantur, & odorem valde sulphureum spirant, Tabem rarius infestare, quinimo loca ista phthisi obnoxia, aut ea laborantibus maxime salubria, & non raro sanativa existere. *Willa Pharm. tom. cap. de phthisi.*

OBSERVATIO XXXIII.

Phthisis ab Ascessu, scirrhosa duritie & corruptela pulmonum dependens.

Juvenis strenuus, annos natus 29. Nobilis Jacobus d'Andrion, Genevensis, militari cohorti in Gallia Præfectus, cui venatio in delitiis, illi adeo addictus ut cibi sumendi oblivio caperet, omnem aeris inclementiam ejus gratia sustinens, anno 1676. hyeme rigidissima, dum planitiem glacie obductam transgreditur supinus cadit, occiputque graviter offendit; hinc hæmorrhagia ex ore & naribus bihorii spatio tam effusa, ut pene exanimis deduceretur: Enormem sanguinis profusionem capitis debilitas consequitur, frequenti in subditas partes distillatione, præsertim in oculos, se prodens, ubi excitata primo ophthalmia, postea deforme palpebrarum *enormis* consequitur, quamobrem cervix setaceo, me jubente, transfixa est: cujus beneficio levior factus affectus, omnino delendus, si sibi consueto exercitio temperare, aut insignes aeris injurias declinare valuisset: Sed continui in dicta errores, & gestandi setacæ tædium, defluxionem in pulmones præterea accersivere, quam tussis, salina hæmoptysis puris sputum, ac Tabes tandem lethalis anno 1673. excipiunt.

In defuncti cadavere sequentia annotata à Castrensi Chirurgo, ad mæstissimum parentem, ob primogeniti Filii jacturam Nobil. Dom. d'Andrion, Senatorem Genevensensem & Exconsolem integerrimum transmissa: Ego subsignatus, Ex mandato Generosissimi Dom. Colonelli d'Andrion (*Defuncti Patruelis*) aperui corpus Domini Jac. d'Andrion, cohortis militaris Ducis, ut pateret certa obitus causa, Et primò in cavitate Thoracis feri copia falsissimi reperta est. Secundò, Abscessus insignis in pulmonibus. Tertio, Iidem Indurati, sicci, ubique pene putridi: Adeo ut, me judice, phthisicus obierit, morbo jam pridem obfirmato: Cæteræ partes integræ & illæse erant: Dabam Bommeliæ, v. Marti mensis, anno 1673. *Sæcui Chirurgus.*

OBSERVATIO XXXIV.

Phthisis à Suppuratione omnimoda pulmonum.

Pulmonem exulcerari novum non est, sed totam ejus substantiam in pus converti, & nihil aliud quam pus esse, & sola membrana succingente pulmonem contineri, ut in cavitatem ea minime rupta defluerit, id rarum esse existimo: Id equidem *evenit* d. de Abbenbrouk, qui cum longo tempore catarrho acri in pulmonem illapso, Tabæ consumptus decubisset, variis afflictus symptomatibus, potissimum arthritide & gonagra, renum calculo & pulmonis vomica, varia sunt præscripta dum & hædica consumeretur, Ego quoque accitus, sed runc nihil nisi ossa pelle obducta restabant, unde factò prognostico quod moreretur disceffi.

Eo annum 38. agente mortuo, invenimus pulmonem nihil aliud quam vomicam esse, & renes calculo infarctos: Hepar quidem integrum sed flaccidum, nullo abscessu corruptum (quod conjecterat Medicus, ad quem ægri lotium delatum fuerat, quia per unum aut alterum diem sanguinem per alvum ejecerat) ita ut forte ante mortem organum sanguificationis ex debilitate sanguinem retinere non potuerit: Pulmo enim plane suppuratus & putrefactus membrana integra existente, maculis tamen plumbæ & cœruleis interstincta: quam ipsemer digitis cum attingerem, perrupta membrana, tanquam vomica magna, pus insit olei amuræ erumpebat, valde fetidum & corruptum: adeo ut totus Pulmo nihil aliud quam purulentia esset, quæ & mortis causa censenda erat: *P. Forestus Observat. 21. lib. xv.*

Eadem historia fusius exarata.

Illustr. Dom. de Abbenbrouk, Oeconomi Regis Hispaniæ, cum x. die Febru. anni 1655. 38. ætatis suæ anno è vita discessisset, xi. die sequenti in aliud cubiculum gratia incensendi corpus ejus delatum est: Cùmque omnia ad condituram parata forent, præsentibus multis, cum incisio fieret, prius à me facta adhortatio est ad omnes ut diligenter omnia inspicerent;

inspicerent, mihique testes forent de membris laxis & illis, & palam protestatus sum quod occasio mortis non ex genu tantum, seu arthritide fuerit, sed potius provenerit ex catarrho prolapsio ad pectus, deinde ad pulmonem procedente: Et ideo nos inventuros pulmonem vomica infectum, ulceratum corruptumque, ventriculum vero ratione longitudo morbi flaccidum: Rens calculis obstructos, cum & ipsos longo tempore per urinam reddidisset: Inventuros quoque vos Hepar illatum, ita & Lienem, Neque in ejusdem visceribus aliquid apostema: Cerebrum quoque illatum deprehensuros, cum Ill. Dominus omni tempore morbi mente constiterit, Intestin tamen humidum nonnihil, catarrhi ratione.

Hæc cum protestabundus dixissem, singulatim ostendo omnia viscera nutritionis, scil. Hepar, quod membrum erat illatum, sic etiam Lien, tum Intestina belle se habebant & ventriculus similiter, nisi quod is parum flaccidus erat, ut de eo prædixeram: Rens dein inflexi, & ut per medium inciderentur mandavi, & invenimus, omnibus spectantibus, repletos fragmentis lapillorum, quos Chirurgus in copia extrahebat: Deinde iussi ut Chirurgus transiret ad membra spiritalia, ossa pectoris percussens, quo facto statim fætor horribilis apparuit, ex ipso pulmone corrupto prodians, ut in cubiculo præfætor permanere non potuerimus; at ego sudariolum aceto infuscatum ad nares cum ligassem, manique arripere ipsum pulmonem, ac omnibus spectandum præberem, adeo putrefactus erat ut levi compressione per digitos disfluere, exeunte materia corrupta, adeo purulenta & foetida ut ex odore ipse suffocari videretur: Antequam autem comprimerem ipsum pulmonem, membrana sua totus coherebat vomica instar: Erat tamen tota membrana maculis plumbeis cuticleisque interstincta: Sed cum manu artigissem, perupta membrana & vomica, materia corrupta & foetida ac fæculenta exibat, quæ præcipua mortis causa erat, ut prædixeram, nam pulmo ita ulceratus in continuo motu, ineurabilis erat: Cor autem ejus magnum erat, multa adhuc pinguedine oblitum, quod Viri magnanimitatem declarabat; robustus enim erat, unde etiam ad extremum consumptus, tunc prius à vita discessit cum vix sanguinis exiguum in corpore permaneret: Unde minus admiratu dignum videbatur Illustrem hunc Dominum in morbo chronico tamdiu vitam protraxisse, corde semper resistente, adeo magno minimèque consumpto: Quoad cerebrum, albissimum illud invenimus, lactis instar, omnino illatum, humidum tamen ut prædixeramus, ex catarrho: Ultimo apertum est genu, quod instarum erat, nullo tamen pure exeunte, sed sanguine crasso bilioso, adulto, cum multa nigredine sub sinem affluente &c. *Forstius Observat. lib. xxix. observ. xxiv.*

S C H O L I A.

Illarum omnia) De ejusmodi purulentia per spumam exclusa sic judicat C. Bonnetus Theatri Tabidorum Exercit. xxiv. Inter omnia, aut, ejusmodi spumam minus spirituosam, magisque fæculentam est cinereum & cænosum, argillæ cujusdam liquidioris speciem præ se ferens; verum phibiscorum pus minime tenax, caloris deficientis seu cadaverationis juvenis indicium & symptoma: Cætera omnia aliquatenus per calorem subiguntur, figuntur & alterationes lubeunt: hoc solummodo in suo qualistatuo copioso stabulans, nisi mole sua pressus, vix expectoratur, extrema sane sordidit & naturalis dissolutionis productum: Deploratæ sortis invalidis, quos ultima symptomatum syndrome ad sepulturam fere perduxit, tantum advenit argillosum hoc ejusmodi: Quorum etiam cadaverum pulmones inter dissicandam in amurcam fœdulentem mutati conspiciuntur.

Invenimus pulmonem nihil aliud quam vomica esse &c.)

Hæc vomica totum pulmonem occupabat, differens à vomica de qua *Ferrius* pathol. lib. 5. cap. 10. quod neque cystin habeat, neque tam exigua sit, neque sine tæbe; nam hæc æger peribiscus erat, non sine ulcere ipsius pulmonis, cum etiam pus cum plevia quotidie exiret; quod quidem ulcus suppurationem totius pulmonis induxit, manente intra pelliculam ipsius pulmonis pure: sed dissecto corpore pellicula petrupta nil nisi pus effudit olidum, in quo loco, in quo sectio fiebat vix permanere potuerit.

Idem ibidem.

Nulla medicamenta juvant) Inter hæc usitata emplastra cephalica, quæ in pluri opem insignem præstare, non quod seri in pulmones defluens catarrhum sustant (uti vulgus opinatur) verum quia cerebrum corroborando succi nervosi crasin prius

visitaram restituant: *Widius Anat. veter.*

lib. cap. 20. De ejusmodi fœtu vide plura ibid.

§. 2. In pectore Christophori Richteri purulentia adeo copiosa inventa, ut pulmonum corruptorum & exulceratorum residua particula in pure quasi natarent: *J. Dan. Forstius observat. anat. vii.*

OBSERV.

OBSERVATIO XXXV.

Phthisis à consumptione maxime pulmonum partis & in pus resolutione.

NOS Patavii aperuimus matronam quandam, diu tussi & angustia pectoris, ut & phthisi divexatam, in cujus sinistra thoracis capacitate ingentem copiam purulentæ, nec non admodum sæculentæ materiæ, pulsus mistar liquefcentis reperimus, exigua saltem pulmonum substantia superstitē. *Georgium Grafeccium Exam. theatri microscop. tract. de pulmonum vitio.*

OBSERVATIO XXXVI.

Phthisis à mensuris refluantibus & in pulmones refluentibus, unde illorum corruptela, cum multiplici viscerum naturalium vitio.

VIRGO annorum 33. cum ante septem menses delassata ex arduum suarum repurgatione vehementius incaluisse, ad sitim calorēque mitigandum, assatim potaverat lac frigidum ebutyratum, idque ipso tempore solemnī profluvii menstrualis, ac deinceps sæpe potavit: Inde lethalis morbi origo exorta est, quippe cum vasa omnia sanguinem ad uterum menstrualem deferentia tunc laxata & aperta essent, largiter recepere frigus illius lactis, indeque adeo fuere constricta, ut postea nunquam menstrua fluxerint: Restagnans igitur materia mensuris temporibus, cum ageretur à partibus omnibus, partim invasis subsistebat, partim pulmoni impingebatur, & denegata ventilatione corrumpēbatur, adeo ut parenchyma pulmonis inde corruptum fuerit, multaque materia purulenta, crassa, viscosa, ibi in vasis & foraminulentis parenchymatis meatibus sensim erat collecta: Ab illa pulmonis pravitate vapor putridus per cor communicatus fuit omnibus abdominis visceribus; eorumque tonus & temperamentum destructa: Attestabantur hepar pallidius, lien minor ad hepatis proportionem: Pancreas non suffusum colore rubicundo sed pallido admodum: Testis sinister totus aqua impletus, dexter autem propemodum scirrhosus: uterus admodum contractus & siccus, adeo ut vola manus comprehendi posset: Febris Tabifica aderat, & sæpe etiam pus exspuebat: *Otho Henricus observat. viij.*

S C H O L I A.

PHTHISIS in malicibus ob menses suppressos, vel saltem imminutos, sæpius se animadvertisse ait *P. Salm. comm. in lib. 1. Hippocr. de morbis 5. 34.* qui ad partes superiores repositos, thoracique aliquod latius occupantes, primum dolorem diurnum in eo ceciderunt, postmodum putrescentes eas suppurationes reddiderunt, unde & puris spatium & phthisis tandem successit: Hoc ea ratione est factum quod thoraci cum utero maximus est consensus ob vasorum communionem, de quo *Hipp. & Galenus 1. Epid. 1.* Eam suppurationis & phthisis speciem non cito terminari, sed per annos quandoque perseverasse observavit, hæcque omnes ex hisce morbis petisse novit, nisi vel à principio ea arte curata, vel naturæ beneficio ob copiosam mensium eruptionem ab his vindictæ fuerint: A lochiorum imminuta vacatione idem contigisse observavi anno 1672. mense Novembri in vidua quadam nomine *Charone*, quæ phthisi jam propecta opera mea usa est, ac intra semestrem obiit: Ab eadem lochiorum suppressione peripneumoniæ, cum thoracis sinistri hydropis, obortam observavi anno 1673. in *Aurifabri uxore*, *Psyllæ* vocari; Intestina fuit paracentesis, sed alio loco quam decuit, unde aqua non illico, sed tercio demum die assatim exi-

lit, fermentatione scilicet & ebullitione sero inducta, à paroxismo tertianæ, continuæ sociæ: unde 8. die à sectione interendum illi fuit. Hinc *Karstius* genitalium cum thoracis partibus elucet.

Foramulentis parenchyma moribus) *Galenus* *Acutelem* damnat quod tunicam pulmonum statim foraminibus perviam: revera in mortuo animali, ubi frigida omnia contrahunt, pori illi visum effugiant: ac illi in pulmone felis, si folle attollitur, facile deprehenduntur: In homine quoque levibus foraminibus pleni: Si arescant, cuius universa arctata patentibus poris cernitur. Vide de hac pulmonum membrana *Scholia ad Observ. 9. sect. 6. de Expiratione purulenta.*

Præternaturalis mensuralis) Primos puellarum menses natura maligniores esse, atque exitiales magis fieri ubi circa primos typos impediuntur, nec expedire excernuntur, probant *Caselli Melitæ*, virginibus in delictis, qui illa degustatis sæpe in tabiem aguntur: Proinde non mirum si a mœnium cohibitione, eorumque in pulmones anadrome, ob virulentiam pulmones erodantur & corrumpantur, hinc pluribus incurabilis sequatur, quod vidum ibi sibi familiam deinceps constituit languis menstrualis.

OBSERVATIO XXXVII.

Tabes à pulmonis totali fere putredine, costis adnatis sinistro latere &c.

IN renibus *Ferdinandi Imperat.* calculos multos compererunt Medici, sicut & in vesica, & dum viveret interdum xxx. sine dolore ullo, cum ardore exiguo emingebat: Non tamen hoc morbo consumptus obiit, sed majoribus causis, Nam dum Medici, postridie à morte, intestina arque viscera eximerent, Omentum aliqua ex parte corruptum, ac

sine

sine omni adipe, sicut & intestina & stomachum deprehenderunt; & pulmonem magna parte putridum ac graviter fixentem, cum pituita & sanie, ita membranis pectoris in sinistro latere adherente, ut difficulter avelli possent. *Gesnerus cap. 12. Fossilium.*

S C H O L I A.

Cerebrum nimis illasum) Quod tamen læsionis notam exhibere debuisset, cum catarrhis frequentibus obnoxia fuerit ea matrona: Hinc collige phthiseos causam non semper è cerebro esse accellendam, nec copiosum spiritum ex eo fonte manare; quod ex Anatomica luce ostenderunt vici Clariss. *Schneiderus, Roeslianus, Wesserus, Welfius & alii*: Nec obstat Hipp. auctoritas, qui lib. 1. de morbis pituitam à capite fluentem copiosam, quod expellitur, spuci, & diarrhææ succedentis, originem esse vult: Satis est ex pulmonibus uberis illas expectorationis causas repetere, æque læsæ illorum concoctrice adscribere, quæ male commissum alimentum conficiat, ac in purulentam illam materiam convertat: Idem illis contingit quod intestinis in dysenteria, in qua profunditas multus humor mucosus & albus, qui nihil

aliud est quàm extremam eorum præternaturalem, lætæ facultatis commutaticis soboles: Sic ulceratæ articulis ichor plurimus effluit, qui non aliunde quam à parte affecta, viscoso alimentum proprium subigente, proficiat: Hippocriti cerebrum fons & metropolis est pituitæ, et dubium an quod phthisici ex pectore extrudunt sit pituita; si ipsi qui ab eo fonte salte pituitæ originem deducunt, pulmonis erosionis cause, falsedinem aliunde quam à cerebro repetunt: Ea potius in massa sanguinea quærenda, atomis salinis inquinata, qui pulmonem molle parenchyma facile alterant corrodunt; Sputum, sanguine tectum, sanguinis sale perculsi progeniem agnoscit *Remmius* theatri Tabidor. Exercit. xxiij. negans quempiam cui pulmo erosus fuerit, sine sanguinis totius edulcoratione & reductione curatum fuisse,

OBSERVATIO XXXVIII.

Phthisici pulmones intus purulenti, externa facie sani apparebant.

Anno 1629. aperuimus eadaver Nautici focii, ex phthisi mortui, ejus pulmones substantia & colore externe sani apparebant, quibus tamen dissectis exiit pus copiosum, viride ac fetidissimum, & dexter pulmonum lobus costis adnatus erat. *Bontine Med. Indem. Observat. 4.*

S C H O L I A.

Dexter pulmonem lobum costis adnatus) Id notandum in plurimis quos aperuimus, nunquam sinistram lobum solum adnatum vidimus, sed vel utrumque, vel dextrum: Ratio, ut ingenue fatear, me later, nisi

forte quia in dextro latere tantum vena szygosa, sine pari est, quæ in pleuricide rursi valida cupa, hanc amorem à se rejicit, unde etiam in dextro latere pleuritides exquiritæ magis oñuntur. *Idem.*

OBSERVATIO XXXIX.

Phthisis à vomitis in sinistro pulmone, Hydropes sinistri thoracis &c.

Franc. Minningen juvenis eadaver examinavimus: In abdomine nihil non naturale deprehensum: In thoracis autem sinistra parte omnis mali causa latebat, quippe in sinistra ejus parte totus fere pulmo aquæ innarabat: qua exhausta velicæ aliquot insignes, simili aqua turgentes, ad pleuram & diaphragma se offerebant: Similem & aquam citrinam pericardium continebat: Dexter autem pulmonis lobus totus diaphragmati, plenæ & mediastino adnatus erat, aliquot habens vomiceas parvas, lenro ichore turgidas: In thoracis autem dextri cavitate humorum nihil reperiebatur, ut quæ tota pulmone replebatur. *O. Henricus observat. xviii.*

OBSERVATIO XL.

Phthisis à pulmonum corruptela cum Thoracis hydropes.

Diversi sunt morbi quos pectoris hydrops comitatur, utpote catarrhi, peripneumoniz, pleuritides, tabes & hydropes: quare hujus aquæ collectionis in pectore non una semper est causa, sed multæ varizque esse videntur: ut ex sequentibus intelliges: Anno 1563. autumnio, cum per totam fere Italiam rasset, peripneumoniz & malignæ pleuritides, epidemialium morborum instar grassabantur, æque multos occidebant, inveni in omnibus quos secui, quasi totos pulmones sanguine media ex parte putrido repletos, turgidos, æque mirum in modum induratos: id spatii quod pulmones non replebant, aqua loturæ sanguinis non dissimili plenum fuit, capita etiam magna aquæ limpidæ copia repleta erant: Alio tempore deprehendi in phthisicorum thoracis capacitate dextra, quæ majori ex parte his malis obnoxia est, pulmonem vel corruptum vel absumptum, eumque in ea capacitate aqua plena natantem: Haud dubio in his enartatis casibus, partim humiditas ex cerebro defluxa thoracem replet, partim per substantiam vasque pulmonum tenuior in pulmonibus collecta transsudat, æque hanc hydropis speciem excitat. *Coiter libello observ. Anat. & Chirurg.*

S C H O L I A.

Humiditas ex cerebro defluxa thoracem replet) Illustrat Bartholinus cap. vij. Tractatus de vasis lymphaticis, multorum in corpore accidentium causam redditur expeditiorem ex notitia illorum vasorum, atque illustrem plane in hydrocopia generatione nobis vim præstat: his obstrictis, quando liquor tenuis à partibus non separatur, urici vult anasarcam vel leucophlegmatiam: Quando impeditur per hanc transitu ad venas hic coagitur, Alciatidem excitare; vel quando ob tenuitatem tunicæ, à copia vel liquoris acrimonia, vel incumbentibus gravioribus rumpuntur, corrumpunturque, in cavitates vicinas, seu abdomen, seu thoracem effluere aequum, maximè morbi causam: Retentivum sequitur P. Barthelemy in præxi lib. 1. cap. 50. Glandulosam, air, lympham imprimis ab ea, quam à moleculis aliisque partibus, ex ipsius animabus ed delictis & superfluitibus ortum habere credo, distinguo, cum qua tamen confusa, per eadem vasa lymphatica pergit ad ductum lymphæ chylæque communem, ac per unicum thoracem delatum, ideoque thoracicum dictum, donec tandem exoneretur tota in venam jugularem axillaremve sinistram;

ubi sanguini conjuncta descendit cum ipso per venam cavam ad dextrum cuius ventriculum: Hic lymphæ, per vasa lymphatica ductumque thoracicum, motus, leditur, quoties 1. in totum tollitur aut impeditur quodammodo. 2. alio defertur: Tollitur si rorant ob vasa lymphatica obstricta ab ipsa lymphæ viscidioris, in ipsis coagulata à frigore externo, postquam prius calore magis fuerit soluta & fortassis prius nocte, unde stagnabit tunc in vasis suis lymphæ: Alio defertur, quoties ex obstrictis his vasis ligam. & magis magisque coalescat, ita ut eandem vasa rumpantur, hinc ipsa effunditur aut in partes vicinas, aut in cavitates adjacentes, nec amplius per vias utaras debilitate defertur: Ex hac lymphæ per laterales thoracis lymphaticas ab externo frigore, ut dictum, obstrictas, hinc ruptas, effusione, nonnunquam *Hydropem thoracis* ortum habere arbitror.

Humiditas ex cerebro defluxa) Ex aquæ lymphæ copia in cerebro reperta, dubium an rectè deducatur causa hydrocopia thoracis, cui nec inde repetenda est causa hydrocopia abdominis: Seri tantum, vel lymphæ redundatiam in toto vel vasis exinde inferre liceat: Qua via enim è capite in thoracem migret serum non ita prout est ostendens, atque succedere facilius est quam probare: Lavium arreptum obstricti, & languenti calido naivo, ac Jecori in coctum tracto adscribit Sallus de affect. part. cap. 20. vel pulmonibus & Jecori refrigeratis: Probabilis *Simmeri* lib. 2. præxi primam mali causam statuit sanguinem serolum, à Jecore dextro Cordis ventriculo & pulmonibus communicato.

OBSERVATIO XLIII.

Phthisici pars sinistra pulmonis cava ad instar fistulæ irruentia, Substantia autem conglobata & arida, cum empyemate thoracis & aliis vitis viscerum naturalium.

Quidam annor. 46. ex phthisi diuturna obiit: Secto cadavere invenimus sinistram pulmonis partem cavam ad instar fistulæ, Substantiam autem ipsam conglobatam quasi & penitus arefactam: Cavitas pectoris tota purulenta erat, Hepar ex parte exsangue & asseris instar durum: Lien totus contractus & vix unius digiti longitudine: Testiculorum alter in magnam molem creverat, durus, qui incisus aquam fundebat citrinam, ut in hernia aquosa: Membrana, quæ aquam continebat, erat plane cartilaginea & quasi cornea; ipse enim testiculus sua propria ab hac diversa cingebatur: In ventriculi interna parte apostema copiosum fuit continebat, Intestina felle perfusa: Omentum totum membranosum & pellucidum sine ulla pinguedine: Mesenteria nigro sanguine turgida: Cordis dexter ventriculus, ob sanguinis copiam, cui humor viscidus & albicans admixtus erat, una cum auricula sua, folio duplo major conspiciebatur. *Ioannes Fadrictus Rumlertus observ. med. lit.*

OBSERVATIO XLIV.

Phthisici pulmones omnino absumpti à puris acrimonia reperti.

§. 1. **P**uer xvij. annorum phthisi triennio oppressus, consumptus obiit: In thoracis dissecta regione pulmones non sunt inventi, quoniam forte præ tabo laceti, suppurationi, à purisque acrimonia laniati, & ab adurenti calore absumpti sunt, ita ut præter mucilaginem quandam asperæ arteriæ adnatam, nihil amplius pulmonum loco conspiceretur. *Zacutus præxi. admir. lib. 1. observat. cix.*

§. 2. Non semel pulmonis parenchyma æquali attritione ita dissolutum conspexi, ut in putrilaginem, limi quandam speciem præ se ferentem redactum videbatur. *Bennettus Theatr. Tabid. Exercit. xxvj.*

Phthisici pulmones dextro latere omnino absumpti.

Laborabat quidam veraphtisi, ac pus copiosissimum rejiciebat, Tandem multis frustra adhibitis moriebatur, Agnata ipsius pro muliercularum more, hoc & illud prætendere: Ego indignabundus me eadaver adaperiturum, & sedem morbi investigaturum recipio, si qui in dextro latere pulmo fuerit repertus, malam à me fuisse institutam curam confessurum: Consentit tandem agnati, & in illorum præsentia thoracem primum aperio, atque dextrum pulmonem plane consumptum invenio, exiguo saltem quopiam, instar minutissimæ spongiolæ exsiccata, residuo, sinistro prorsus illæso: Abdomine hinc secto, hepat lividum quodammodo apparebat & aqua, sed non admodum copiosa, circa hypochondrium dextrum reperiebatur. *Phil. Salmuth. cent. j. obs. xiv.*

S C H O L I A.

Pulmonem consumi facile conjiciebam ex copioso pure, & dextrum quidem, ea denegaro in sinistrum latus decubito: Cùm enim ratione decubitus illius, compleretur quasi pulmo sinister sanus, atque sic thorax minus dilatarsi posset, pulmo autem dexter tanquam affectus, officium non faceret, difficultas respirandi aderat summa, & quasi suffocatio imminens: E contra si in dextrum cogeretur latus, si quoque pulmonem affectum, sinister pulmo, utpote sanus, movere suoungebatur libere, unde & libera respiratio: *Idem.*

Dextrum pulmonem plane consumptum invenio, &c.) Non arbitror illi pulmonem dextrum plane fuisse consumptum, sed spongiolam illam fuisse integrum pulmonem, sanguine secluso quo alias intumescit: Nec vi hujus exsiccationis mors subsequuta, quia sinister pulmo prorsus dicitur illæsus: Ad illam quoque siccitatem pulmo hæc Galli, de quo *Blasius* cent. 2. observ. 21, ut aspera arteria cum pulmonum vasculis fidem instat conspiceretur, & dubio procul ad nativam faciem proxime accessu, si texturam prope coalesceremus, quæ tamen ut actioni subserviret commodius, moderate lubricanda est, & irriganda sanguine è vasculis, & aëre vel liquore è bron-

chiis: ut spongia per naturam sicca imbibit aquam pro usu commodo, ita spongiæ similis pulmo, rarus & foraminulentus humorem haud moleste fert, sed aliam post aliam inascentem eo usque permurare solet donec ad asperam arteriam deveniat: Certe quicunque partis compositionem prestissimè novisse vult, ab alienis & heterogeneis liberare tam debet, quæ visum effascinant: Ita ex hepate & liene, vel bacillo vel alia arte sanguinem exprimimus, ut rectius utriusque visceris sectura eluceat: Idem per morbos exsiccantes tabificos efficitur, ut non ideo Hippocrati l. 2. de Diæta, ad animæ sapientiam exopiet attenuationem & arefactionem pulmonis: Quo enim pulmo augetur magis, si ve aëre crasso attracto, si ve sanguine transeunte si ve stagnante, eo maius detrimetur homines capiunt animo & corpore, ut prima texturæ pulmonis simplicitas obducatur: hinc fibræ laxantur, veficæ implentur & omnia vasa distenduntur, unde inflatio pulmonis, corruptio, inflammatio & illas morborum: Quanto vero vel octingenti propiores sunt pulmones, vel sicciores, tanto facilius textura artificii plena innoscit:

Thomas Bartholinus Tract. de pulmonibus

lib. 2. pag. 37.

OBSERVATIO XLVI.

Phthisis à consumpto pulmone parte dextra, vomica & hydropo thoracis eodem latere, vasculis omnino purulentis &c.

Sartor quidam Patavii asthmate diu laboraverat, tandem medicamentis utitur, sed frustra: imprimis verò in sinistrum latus cubare non poterat, & pulsus semper erat formicans: De causis symptomatum cum Dom. Valthero varie pugno: moritur tandem subito.

Cadaver aperio, & in thoracis cavitate dextra heminas aquæ reperio, ad minimum duas, h. e. lib. xv. pulmone ex ea parte prorsus consumpto, ut ne tantum de ejus substantia restaret: Aderat simul vomica instar ovi gallinacæ: Vasa erant plane purulenta: pulmo interim sinister integerrimus, & pericardium plenum aqua, unde pulsus formicans extiterat. *Salmuth. cent. 1. obs. 13.*

S C H O L I A.

DE causis variis pagus) Crucius de quæ. cent. iv. pag. 403. meminit Tabis cuspidam asthmaticam, quæ oritur absque ullo pulmonum ulcere: cum infarctis asperæ arteriæ ramis à glutinosissima pituita, respiratio læditur, sequiturque totius consumptio: cuiusmodi Tabem se curasse ait in virgine purgationibus blandis, ac decocto ex salis, chioa, vilco quer-

no, modico suffragis, cum simplicibus thoracicis & cephalicis: alii quoque prædictis: In alio exemplo suspicio ejusmodi Tabis potuit oboriri, sed decubitus in sinistrum latus impeditus, affectorum una parte pulmonum signum certum exhibebat, ut patet ex ichthiosis ad superiorum histioriam.

Phthisis à pulmonibus pure ex flatu, citra ulcus, tumensibus, maculosis, Iecore impenso magno ex scirrroso, Liene vitato, &c.

ANNO 1675. 23. Januat. obiit Vir Generosus & Nobiliss. Dom. de l'Isle, ex Illustri Chabotiorum familia natus, Patre satis phthisico, exptellam propensionis in Tabem ideam & characterem gerens: assidua tussi fatigatus, phlegmata crassa creberrime expuens, macilentus, strigosus, acerrimi vir ingenii & iudicii, gratiorum musarum felix alumnus, diæte regulis nequaquam adstrictus, Tandem ætatis annum agens iv. è vivis excessit in Dominio suo de la Chaux, bihorio Laufanna dissito; ubi apertum cadaver, quæque in eo reperta à Chirurgo, ad me transmissa sunt. Quandoquidem sic visum superis ad cælum evocare Dominum de l'Isle, die Sabbathi 23. Jan. anni 1675. præeunte magno virium languore, febre lenta comite, tussi & pectoris oppressione, consanguineis, gravibus de causis, cadaver dissectari placuit, quod postridie ab obitu factum est: Pulmones tumidi insculi inventi sunt & repleti partim humore lutulento, è parenchymate vel leviter compresso exeunte, partim flatibus: Exteriores eorum membranz distinctæ quasi maculis sublivescensibus, assis magnitudinem æquantibus: Lobus dexter præ aliis erat vitatus, nulla interim præsentè ulceris nota: In dextro Thoracis latere præ aliis circiter duodecim fluitabant, ac verisimile est multo majorem copiam repertum iri, ipsosque pulmones adhuc magis turgidos, nisi paucis ante obitum diebus ejusmodi humores in pedes, tibias & brachium dextrum, quod ideo intumuit, natura excussisset: Aperto autem imo ventre, ventriculus, Renes & Cystis fellea nullam insignem labem præ se tulerunt: At veto Jecur in extraordinariam molem excreverat; parte præsertim dextra, quæ costas attingit, nigra omnino erat, dura, imò scirrrosa: Insolitam quoque figuram exhibuit Lien; decur enim illi naturalis longitudo, quæ in crassiem & magnitudinem abierat, cæterum subtilitæc durissimæ & scirrhosæ: Intestina ad livorem aliquatenus tendebant: Nulla pene erant Epiploï vestigia; Pancreas duas membranas sibi incumbentes referebat; feri præterea in imo ventre jampridem conclusi mediocritis copia inventa.

S C H O L I A.

Brachium dextrum quod intumuit.) Ex quorundam sequenti observatione, si subidis, hecticis, longo morbo maceratis, brachium intertutum, aut crus intumescat; vel macula aliqua fedetur, instantis feri hoc est prælagium: Id à me annotatum anno 1677. evenisse Julio in Nobili maritona: quæ tabida ob vitiatum pulmonum, lienis & uteri (in quo canceris

dispositionis molia argumenta) xv. ante obitum diebus, quem procul abesse sibi fingeat, insignem habuit maculam in femoris dextri parte domestica, cum malleoli utriusque tumore ædematoso: Odo ante mentibus Aëtica fuerat, me accuratè liberata; sed integre salutaris. avida Empirico se commisit, qui lethum acceleravit.

OBSERVATIO XLVIII.

Phthisis à vitio Pulmonum pure in sinistro latere scatentium; sanguine congesto in dextro lobo; post suppressionem mensium: Ventriculi glandulis serosis circumseptis &c.

ANNO 1666. Maii 15. aperiebat Dom. Franc. Sylvius foetminam trium & viginti annorum, quæ phthisica præcedente vespere cum vomitu sanguineo ipsam effuderat animam. Hæc 10. Maii in Nosocomium Leidenfè delata conquetebarur se ab 18. mensibus menstruis carere purgationibus, quæ ipsi à terrore fuerunt suppressæ: Anhelosa jam fuerat ab octo mensibus & asthmatica; tussiebat etiam valde, & per tussim ejiciebat phlegmata crassa & purulenta: Pro temperandis humoribus sequens præscribebat decoctum D. Sylvius frequenter sumendum ꝑ. rad. apii, levissimi ʒi ʒj. ras. ligni gaiaci ʒiij. passularum mat. mund. ʒiv. coq. f. a. ex aqua pura & colat. ʒxxx. in qua dissolve ꝑ. de s. rad. ʒij. ag. theriac. simpl. ʒj. m. cum autem de amatore decocti quæretetur, jubebatur saepius lambere saccharum altheæ; Sed sequenti mane etiam ab hoc, ut & ab omnibus medicamentis, abhorrebat, quod ipsam pro signo funesto habebat Sylvius: nihilominus tamen hoc confortans alterans, præscribebatur decoctum creberrime assumendum, ꝑ. rad. apii fenic. ʒi ʒj. scorzon. ʒij. passul. mat. mund. ʒiij. f. decoctum cum ag. pura, in colat. ʒxxv. dissolve ꝑ. syr. rubini, de hyssopo ana ʒj. m. Ab hujus decocti usu phlegmata quidem commo dius dejiciebantur, valde tamen purulenta erant, unde exigua spes salutis: Usq. fuit hoc decocto per triduum, ex quo fatis concessit.

In cadavere sequentia notabantur: 1. Omentum peritonæo ubique fortiter ad hærebat. 2. Hydatides plurimæ circa omentum, quarum una ex pluribus compacta erat; materiam continebant subacidam. 3. Circa ventriculorum glandulæ conglobatæ quasi scro-

phulose erant, circa quas multe hydatides. 4. Bili flavescebat, unde minus actis erat: Pulsus debilem hinc derivabat Sylvius. 5. Hepar flaccidius & frigidum peritonio annexum: hydatides quoque plurimæ hic erant. 6. Intestinorum exterior membrana abrafa erat. 7. Colon versus pubem descenderat, contenta satis erant liquida. 8. Testiculi plane æquales erant. 9. Pulmo collis undique annexus, luridi coloris & distensus, quod causa respirationis difficilis: 10. Dexter lobus durior & firmior, sinister mollior erat. 11. Ex dextro lobo aperto sanguis profluebat copiosus, stagnans ibidem propter obstructions: Causa hæc fuit Asthmatis & vomitus sanguinei, quo animam ipsam effuderat. 12. Dextra cordis auricula duplo maior sinistra. 13. Sinistro in latere pulmo purulenta materia & foetida repletus erat, simillima illi quam cum phlegmate ægra excernebat. 14. In parte pulmonis superiore cavitas apparebat satis ampla: Tales cavitates in omnibus Phthisicis se reperisse referebat Sylvius. 15. Glandule pulmonis pus continebant. *Alardus Hermannus Cummeus in miscell. curiosis anni 1673. Observ. 116.*

OBSERVATIO XLIX.

Phthisis à corruptione omnimoda pulmonum lateris sinistri, purulenta dextrorum, cum Lienis scirrho.

NOb. matrona ob hæticam ab ulcere pulmonum, Lienisque scirrhum cum moreretur anno xxxvij. Pectus incisum aqua repletum inveni, pulmonesque in sinistro latere fere absumptos: dextra eorum portio superstes purulenta conspiciebatur: Cor nimia quantitate excedebat, ut tam magnum adstantes summe admirarentur: In pericardio erant 3v. aquæ, quod memoriam mihi refricavit sumæ Galeni, v. de loc. affect. & illius quam phthisi mortuam ante annos xvj. Marpurgi secui: In phthisicis scil. magna copia aquæ hic se colligit, cum tamen in naturali statu vix drachmam unam aut alteram continere soleat pericardium: *Bartholinus* in hæticis exiguum credit, contra *P. Fascius Castellus* nostram observationem confirmans, hanc aquam per æstum febris hæticæ in tantum adaugeri scribit, ut ea distensum pericardium totam cavitatem occupet: forsan ob bonorum corporis humorum atque adipis cordis consumptionem: Adipe cor pene erat destitutum, quod ob calorem p. n. nec colligi nec coire ibi poterat, Quoad venam cavam, venam arteriosam, aortam, & arteriam venosam, ante cordis dissectionem nihil notatum dignum occurrebat: decenter quoque habebant nervuli, vasa coronaria & lymphatica, à frequenti potu adhuc serique copia ex parte conspicua: Sinistra auricula major apparebat: dextra: Inciso corde, deprehendimus valvularum semilunarium circumferentiam ossilem, quam pro osculo extraximus: In sinistro ventriculo papillæ carnez tres eminebant: Septum foreis videbatur instructum, sed non pervisi, ut ut sedulus inquisiverim: Lien erat scirrhosus, appendice ovum columbinum æquante instructus: Hepar contra magnum & floridum: Ventriculus & Intestina omni fere humore destituebantur, mesenterium vero atro succo repletum erat: Ipsa defuncta siccioris fuit constitutionis & calidæ, corporis habitus macilenti, crobris capitis distillationibus obnoxia, nec semel febribus tentata: Ante tria lustra à petechiis liberata, hypochondriacas molestias & lienis tensiones non raro postea passa: Suppetias his tulit spuræ penultimæ costæ, in dextro latere è casu ante biennium lesio, succedensque tussis vehemens, cum catarrhis prolixis, pulmonumque calida intemperie; quæ mala tamen, cum obviam ivissem appropriatis, remisissent ad tempus, donec thermis Wislænsibus, me non suadente adhibitis, catarrhi, tussis, anorexia, & hypochondriorum tensiones reverterentur, hæticæque superveniens finem vitæ imponeret. *I. Daniel Hofstius observat. Anatom. viij.*

OBSERVATIO L.

Anatome Phthisici, cujus pulmones lividi, flaccidi, exsucci: cordis auricula dextra sanguine nigro distenta, necnon ventriculi: præter alia vitia Thoracis, Incoris & Renum.

Vicentinus Architectonicæ militaris magister, pulmones habuit nimio vini potu debiles, unde Tussis & suffocationis metus: accedebat hydrops pedum non abdominis, qui digiti imprimendis vestigia servabant: Varia tentata ad pectoris expurgationem ferique evacuationem, sed operam lusinus: Aucta enim respirationis difficultate, scarificationeque pedibus lividis, ærtia inde hebdomada ad plures abiit.

Apertum cadaver affectos locos nobis prodidit manifestis: 1. Cordis auricula dextra adeo sanguine fuit distenta, ut capacitatem neutri ventriculorum cederet, sanguis ipse niger

erat, crassius & grumofus, qualis in utroque ventriculo repertus, quanquam in sinistro rubicundior 2. Pulmones lividi, flaccidi, sine sanguine, fæci magis quam humidi 3. Dexter pulmo atctiffimo nexu costis adhærens 4. Inter membranas pulmonum, pleuræ, &c. mucus quidam albus inventus : Serum quoque copiosum in thoracis cavitate, in muscibus externis & visceribus : 5. Jecur lividum & scirrhum parco sanguine conspersum : Lien major solito, flaccidior, sanguine nigro plenus, magisque quam hepar sanguificationi idoneus 6. Ren dexter in ureterum orificio grandem calculum continebat acutum, sed glabrum, pollicis magnitudine & crassitie, aliisque alibi minores & arenulas infinitas, quæ causa est quod in dextro latere æger fuerit decubitus : Nullam tamen ucinæ difficultatem experiebat, sed dolorem tantum in inguinibus : Dolor à calculo magno : Urina promptè fluxit, quia sana vesica & sinister Ren sanus. *Thomas Bartholinus cent. ij. hist. xxxij.*

OBSERVATIO LI.

Phthisici pulmones spongiosi & levissimi, cum pure copioso in vasis eorum &c.

JANUS Laurentii ann. 30. *habitu pinguisculo & atletico*, temperamento calidiore, annis ab hincbinis in phthisin venit, tractuque annorum in tantam totius maciem ut vix ossibus hæreret : A primo vero morbi tabifici insultu vox intercepta fuit, ut præter affirmandis particulam effari nihil posset, nutuque solo necessaria peteret : Ante semestris spatium obortus illi tumor infra mentum, durus, quo impedita fuit solidorum deglutitio hinc solis potulentiæ vitam protraxit, donec penitus interceptis loquendi reliquiis è vita migraret.

Emaciatum corpus dissecuimus, ac in aperto thorace pulmones spongiosi, pluma leviores, ex parte costis connati, externa facie colore nativo tincti, disseci vero per medium parum sanguinis continebant, cuius vice purulenta materia, alba, sincera expressis vasis extillabat : In aspera arteria nihil heterogeneum visum, nec ullum istius tumoris vestigium apparuit, unde verosimile est à flatibus excitatum fuisse : Cor magnum satis, sanum & sanguine abundans, vasis cornuarii tumentibus : In pericardio copia aqua natabat, fusca, quali colore venæ quæ cordis cernebantur : Pinguedo sub universa cute parvior, sed flavescens : In abdomine viscera sana pleraque & patum à naturalibus defectentia : Omentum fere consumptum : Intestina flatibus repleta & vacua : Ileum hinc inde nigricabat, qualis esse solet color illorum quos malignitas aliqua jugulavit : Hepar, si colorem fuscum excipimus, nihil monstri alebat : Vesicula fellis plena, sed obscurior : ventriculus sanus capaxque, Lien luridus, Pancreas incorruptum, sed pinguedine oblitum, in quo duo vasa Lymphatica se produnt : *Thomas Bartholinus cent. ij. hist. ij.*

S C H O L I A.

HABITU *pinguisculo*) Clar. Bartholinus cent. 2. hist. 14. meminit phthisicos sine tabe, in juvenes, temperiei corporis calidæ & humidæ, qui pleuritide ante annos sex defuncti, soluta per suppurationem inflammatione membranae, spumæ expuit purulentum & tam fetens ut adstantes posset inficere, cum tussi vehementi, sed sine dolore, cui periodicus miscetur sanguis; febris adeit, à prandio & cenæ ingre- vescentes : Cæterum, quod communem phthisicorum sortem excedit, corporis habitus iuvalefcit &

caerensior in dies evadit, Consilium super hoc affectu J. Dom. Sala, duas dabit rationes, cur more phthisicorum non consueverit corpus, quod 1. naturalia viscera optime sint constituta, ut nutrimentum copiosum corpori subministrant, largiorem eorum cibum possintque & appetit & facile concoquunt. 2. Firmior corporis constitutio tam cito aut cedere phthisi aut dissolvi necit : hinc laetandum cibo & potu per annos plusculos abstinentes, ob robur corporis non consueverunt, imo animalia pinguescunt.

OBSERVATIO LII.

Phthisis à consumptione omnimoda partis sinistræ pulmonis, cum cordis vitio.

DIU lassam animam anhelantemque spiritum circumtulcrat bajulus Hastidens : Otta nuper contentione à socio vapulat : Decumbit sed sine vulnere, Rediit ad onera 14. die, & sub onere deficiente spiritu occumbit, Alter, à quo vapularat, in jus trahitur.

Cadaver exenteratur, nullumque in eo vulnus, contusio nulla observatur : Hinc phthisi consumptum vero simili conjectura divinavimus : Pulmo enim sinister corruptus erat rotundus, scatebaturque pure foetidissimo, Tunica excreta pleuræ adnata : Sana pars superstes pendebat libras quinque civiles : In corde adiposa frustula oblonga lumbricorum instar cernebantur : Auricula cordis dextra sex digitos transversos longa diaphragmati accreverat : Hepar sine lobis rotundum magnæ molis diaphragmati adhærebat : Lien ponderosior solito : Omentum vesiculæ fellis arcto nexu implicabatur : *Th. Barthol. centur. v. observ. vij.*

OBSERVATIO LIII.

Phthisis à vitio pulmonum exsanguinum, ficcorum, contractorum, cordis flacciditate & partium naturalium affectibus.

THOINAS Gualther Anglus cum Tabifico morbo extinctus esset, in ejus cadavere deprehendimus nullam prorsus in visceribus vitalibus & naturalibus structuræ mutationem, nisi tantum in pluribus flaccidiorem constitutionem, & in nonnullis densiorem ac sicciorem: Multa aqua citrina thoracem & abdomen implebat, ex dyscrasia ventriculi hepatisque genita, pulmones exangues, sicci & contracti; & in dextro latere archæ adnati, cor flacidum & exangue; sed in auricula dextra deprehendimus viscidam renacem sanguinis pituitosi & adusti copiam, quæ ultra naturalem magnitudinem eum distendebat: In abdomine omentum invenimus prorsus extensum & omni pinguedine spoliatum à febre tabifica, ac manifestissime divulsæ duæ ejus membranz cavitates mediam ostentabant: Conspectimus & manifestè vasa per omentum decurrentia, ex gastrica vena, fundo ventriculi inserta, & ab ejus venæ origine multa etiam vasa colo inserta: unde ex autopsia colligi poterat quam facilis & quam opportuna, validaque esset inter colon & ventriculum sympathia: quod attestatur prostratus appetitus, dum fæces in colo restagnant, & per eorum vasorum commercium, vapores in ventriculum protumpunt: Lien densissimæ erat complexionis, coloris valde nigricantis & prorsus exanguis: Attramen vas brevè ventriculi lateri sinistro insertum evidenter conspicebatur: Hoc supra naturam leni aderat, quod ovi columbini magnitudine appendix ipsi subtus adhæreretur, exiguis simul quibusdam excrescentiis ei ad latera assidentibus: Hepar exangue erat, valde densæ & compactæ structuræ, in sua substantia omni colore rubro destitutum: certum indicium ex temperamenti defectu enata atonia hæmarosin prorsus labefactam fuisse: Pancreas densum & compactum erat, coloris cinericii, cæterum in figura & magnitudine naturaliter comparatum. *O. Heurnium observat. xiiij. Bartholinus hist. 76. cent. ij.*

OBSERVATIO LIV.

Phthisicorum quorundam pulmones frustulatim discepti ab humore acri fuerunt.

QUOS phthisicorum acris & inæqualis perdiderat deprædatione, horum pulmones, præsertim lobos, frustulatim laceratos, & quasi forice demorfos apertò cadavere deprehendi: Acor in sanguine redundans (quod melancholicis maxime solenne) non tantum totius intenerationem, unde facile ab externis injuria, sed carnis omnis musculosæ innutricationem efficit. *Bennettus Theatri Tabidorum Exercit. xxij.*

OBSERVATIO LV.

Phthisicis pulmones non solum suppurantur, sed etiam alterutro latere penitus absumuntur, diu vita superstite.

PHTHISICIS non tantum pulmones suppurari, sed penitus quoque in affecto latere absumi, & in pus liquidum, subviride, fixidum, aliquando inodorum converti, in omnibus quotquot ego secui, deprehendi: In quorum numero cum aliquibus viventibus adhuc (quibus tuberculum in costarum intervallis prominens, iudicium empyematis præbebat) pectus aperiri curarem, purisque maxima copia efflueret, tandem illis è medio sublatis pectorèque patefacto, nihil penitus de pulmonibus illius loci superesse, sed omnino deperditos calloque aliquo vasa cordis, quæ huc pertinebant, & arteriarum ramos obturata, succingentemque illius lateris membranam tumidam, purèque crassiore hinc inde, velut pulve oryzacea, subviridi conspersam invenimus: Quod & in aliis multis post obitum exploratis eodem modo se habere invenimus: In quo casu hoc præsertim admiratione dignum, multos qui hoc affectu laborabant, præter mareorem corporis & tussim, nullis aliis gravioribus accidentibus divexatos, nihilominus tamen, paucos etiam ante obitum tempore, libere adhuc respirare potuisse, nihilque ipsis in functionibus naturalibus atque vitalibus edendis, nisi quod omnia erant imbecilliora, decessisse. *Ex Felicis Plateri Observationibus.*

*Tabes à putrefactione suiſtri lobæ Pulmonis, Dextri vitio, Ventriculi extenuatione
& contractione, Epatis ſiccitate, Grandi calculo in veſica, Rene
uno corrupto, Altero ſeri copia diſtento, Cordis vitio, &c.*

Iuvenis cuiusdam annos 25. nari, arte dulciarii, cum ſatis debita perſeſſiſſet, poſt diſtinctam, eamque valde moleſtam illius quod præ ſe ferebat corpufculi conſtitutionem, ex dyſpnœa, inarſino & veſicæ calculo, cadaver ex juſſu aſſinum diſſectari curavimus: quo in mœla ſupra natiuitatem inodum admirabilia conſpeximus: Primo, thoracis in cavitate ſiniſter Pulmonis lobus ſuccingenti membrana una cum dextro ita tenaciter adhærebat, ut ad medias putrefactus & ſumma puris quantitate reſertus: ſicut & dexter ejuſdem lividus plane & pondroſus, vix & ſumma cum *ſumma* avelli poſſent: Duplo majorem ſolito ſubſtantie molem Cor natum erat: media quinimo in ſua ſubſtantia, alba glandula digiti pollicis magnitudinem excedente viſitum. Quod vero mirum viſu, ita *extenuatum* & in ſe contractum præ cibi *ſumma* ventriculū conſpeximus, ut cyathi unius haud admittere poſſet menſuram: is vero mera bile portacea, cui pituita juncta, & parietibus ventriculi renaciſſime adhærente, plane reſertus erat, ut cavitas adimpleretur: Ulterius, erat Heparexanguis & retorridum, debitam quantitatem excedens, cui inteſtinum colon firmiter anneſcebatur per ligamenta quadam, ſicut & reliqua inteſtina peritonæo. Ad corruptionem Renem dextrum plane vergere dixiſſes, ita ex livido albicabat & carnis mollioris erat, ne ex attractione in fruſta abiret, plus juſto naturalem magnitudinem ſuperabat, arenolis, iſſque tenuibus, ſicut & ſero multo reſertus erat: *Peram aut ſacculum arte fabrefactum ſiniſtrum renem judicaſſes*, huius enim ſims & figura valebant, ſed ob ureteres inde oriundos & veſicæ implantatos, ob valvulas in interna cavitate magnopere dilatatas, & naturales quodammodo referentes, ob copiam ſeri ibi contentam (poſſum enim & abſque veritatis fūco aſſerere ultra menſuram Genevenſem cum dimidia ichoris adſuiſſe, h. e. ad uncias xlvj. aut l. ad minimum) renem ſtabiliſſes. Ultimo tandem in veſica urinaria repertus fuit calculus iſſiſſime magnitudinis, cuius moles in extractione circiter pondus novem unciarum æquabat, jam cum per quatuor menſes exaruerit, uncias ſex ad implet. *Ex obſervationibus Petri Hildani Medici Genevenſis apud Fabricium Hildanum ſententia. iv. Obſervat. l.*

S C H O L I A.

Ita extenuatum ventriculū, &c.) Ventriculū hoc modo contractū fuſſe caſiſſimū eſt, præcipue in calculoſis, qui ut plurimum continuo ſubundi ſunt evulſumque potius ingurgiant, ex quo ventriculus labefactus & relaxatus, potius dilatare quam ut poſſit retrahi, *Hildanus ſidem*. Summam vero ventriculi tunicarum extenuationem obſervaviſſimus in Dom. Robarti Pharmacopœi Geneveſis pœiſſimo, qui ex ejus Eryſipelate obiit anno 1694. Cum enim Chirurgus qui anatomiam inſtituit, in gratiam Medicinæ candidatæ novaculam ventriculo admoviſſet, parum adfuſit quin ſubſtratus digitoſi ſimul diſcinderet. Similem tenuitatem notare licuit in ventriculo Dom. Girard Neocomenſis, qui ex vomitu atque bilis diuturno obiit, tennex enim adeo erant iſſicæ ut vix chartæ emporæ crasſiſſimæ æquarent.

Peram aut ſacculum ſiniſtrum renem judicaſſes) Renem ſiniſtrum in formam peræ aut ſacculi dilatatum fuſſe, admiratione non vacat: Id tamen ratione calculi qui proculdubio valvule ureteri ſiniſtri adpæbat; aut, quod magis rationi conſentaneum eſt, aditus erat, viamque urine obſtruxerat, acciditſſe arbitror: ad renem enim & ureterem cum continuo urina deſlueret, neciterius progredi poſſet, paulatim & ſubſtantia renis, & ipſius membrana una cum uretere, in formam ſacculi aut peræ extenſa atque dilatata hæcunt. Si enim nonnunquam in hydrocephalis, non ſolum ipſa ſubſtantia cerebri una cum membranis, veram etiam cranium ipſum mirum extenditur dilaturaque; quanto quæſo magis id in rene fieri poſſet! *Hildanus ſidem*.

OBSERVATIO LVII.

*Phthiſis orta à pulmonibus putridis, materia ichoroſa per totum inſarctis,
Renem vitio, &c.*

Vir ill. Convulſivis moribus admitandis diu fatigatus, tandem Phthiſi extinctus eſt: Illius Pulmones ſterno, coſtis & ſepto undequaque adnati erant, ſine ulla ſere diſtinctione loborum, una tantum compages carnis ſpongioſæ, putridæ, & materia ichoroſa per totum inſarctæ videbantur: Inteſtinis majoribus extreſcentiæ quædam carneæ, inſtar auricularum maris adnæſcebantur: huiusmodi cum plurimæ fuſſent, ex utroque Inteſtinorum coli & recti latere, ad certa quaſi ſtadia, inſtar ramorum arboris, gemellæ prodibant. Simile quiddam in Tabido olim reperi: Renes culpa non vacabant, nam in medio dextri cavitas ingens, à pelvi diſtincta, aqua limpida impleta conſpiciebantur: Sinifter valde extenuatus & abſumptus. *Vide lib. i. Tit. de ſpſmo.*

S C H O L I A.

Phthif.) Causas vide in historia l. 1. Sect. 15. Ob-
serv. 1. *Encephalia quadam, &c.* Vide causas ibidem.

OBSERVATIO LVIII.

*Phthifis pleuritidem sequuta, à Pulmonis dextri parenchymatis consumptione, Sinistri
pericardii, Pericardio pustulis exasperato, Iecore scirrhoso, &c.*

VXOR N. post pleuritidem lateris sinistri Tabida interiit; Tunica lobi dextri pulmonis sola superstes erat, parenchymate consumpto: Sinister totus fere in putrilaginem abierat: Pericardium pustulis plurimis erat exasperatum. Jecur tumidum & scirrhosum, Pancreas consumptum, &c. *Vide tit. de Exspitione purulenta.*

OBSERVATIO LIX.

*Phthifis à Pulmonum corruptione, Vasorum Cordis consumptione, Pericardii &
mediastini exulceratione.*

TAbis causa est Pulmonum exulceratio, eo usque progressa ut putredo inde sequatur, qua corruptos pulmones ex parte aliqua, vel etiam penitus in uno latere, & in pus conversos deprehendimus. Vasis cordis, quæ illi cum pulmonibus sunt communia, similiter cum pulmone illius lateris deperditis, & circa cor veluti abjectis, & callo illic juxta radices oclusis & obliteratis. Tantamque sæpe corruptionem fuisse, ut & mediastinum pulmonis dividens, ipsūque pericardium cor obvolvens, ea infecta fuerint. *Platerus Pract. Tomo 3. cap. 5.*

OBSERVATIO LX.

Phthifis à Pulmonum ulcere & eorumdem flacciditate.

IAm nos consultatione pro III. Com. unanimes decrevimus ipsam phthifin non solum, sed & Phthoc, h. e. cum pulmonum exulceratione, affectam fuisse, ex ea interitum illi ominati, prout certe contigit; Neque hæsitatio locus dari potest de idiopathica pulmonum affectione; cum eo sdem duplici nomine, nimirum & prima, ex phthifi ulcere, ob prægressam sanguinis excretionem; & secunda, ex flacciditate eorumdem laborasse deprehensum fuerit: licet de primaria hæserit scriptor, aut secundaria affectione, quod uteri tumor præcesserit, à cuius suppuratione cum dolores, & proinde febres obtinuerint, illum propterea III. Adstantes neglexerunt. Attamen Pulmones non ab utero, sed à capitis distillatione, Sanguinis sputo, nec non à venoso genere labem contraxisse putamus: uteri namque tumores, abscessus & ulcera, licet nonnunquam Tabem inducere possint, non tamen pulmones facile adeo inficiunt; quod num hoc casu forte contingere potuerit, inquirendi locus foret, nisi alia manifesta causa pulmones afficiens prægressa fuisset: Mala autem naturalis conformatio & immedicabilis, à nobis in aliis observata, defunctam prædictis Pulmonis affectionibus idoneam facilius & obnoxiam reddidit Caveant interim. Consanguinei superstites à domestica, & præsertim cubiculi ejusdem suppellectili, ne à Phthifi infectis miasmatis labem ducant. *Raymundus 10. Fortis cent. 2. consult. 36.*

S C H O L I A.

Ex flacciditate eorumdem) Quæ secunda species Phthifis Hippocr. ubi Pulmonum caro laxa, ob jugem caratui humiditatem flaccescit, à cuius corruptela facile corrumpitur.

OBSERVATIO LXI.

*Anatome puella cuius Pulmo sinister consumptus, cum insigni Iecoris magnitudine,
ventriculū ad inferiora deprimente.*

Ella Sexennis post lentam Tabem, doloribus hypochondriorum & prostrato appetitu viribus fracta expiravit.

In dissectæ cadavere Hepar fere universum occupabat abdomen, ventriculūque adeo ad inferiora depresserat, ut quasi ab œsophago videretur separatus. Pulmo sinister consumptus.

S C H O L I A.

TAbi dederat occasionem Pulmo sinister consumptus: Neque enim ex salute hepatis dependet nutritio, sed à cordis Pulmonūque sano statu: Cor sanguinis officina, per Pulmones vero universus sanguis

singulis circularur, ex quorum vicio hoc detrimentum capir: Pondere igitur hepatis incrementis, ob impedimentum circulationis depressus ventriculus, cibos vi-

ce necessarios respicit. Th. Bartholinus Hist. Ann. 71. Cnt. 7.

OBSERVATIO LXII.

Phthisis à Pulmonum lobo utroque, sinistro præsertim, corrupto, Præcedente vicio ventriculi, Intestinorum & Pancreatis.

Wilhelmus Leychli, Luis Wallensis, quindecim circiter annorum, ex orphanotrophio, ubi quotidiano vacabat labori, morbo periculose decumbens, mense Junio anni currentis 1677. in 1000 Fopon, sanitatis, si ita Deo iussu videretur placuerit, recuperandæ ergo adductus fuit. Ego, tunc temporis, cum adhuc curæ ægrorum inhierem, vocatus, vidi hominem facie ex sub atra pallescentem, Sitis vexatum intem, Pulsu præditum celeri, debili & inæquali, difficultate spirandi pressum, de spūto sanguineo purulento & magna appetitus præstratione conquirentem: Anxius tum hærebam, cum meliora edoceri neque ab ægro, neque ab adstantibus potuerim, utrum pleuritidem præcedentem æger passus fuerit, necne: Tandem vero cum doloris pungitivi in latere se vestigia nulla unquam sensisse asseruerit, verum spūto sanguineo cum tussi, quod jam purulentum evadat; ab aliquo tempore vexari confessus fuerit, eum ex Peripneumonia Phthisicum jure arbitratus fui: hinc præscriptis primo potionibus vulnerariis, addendo croci essentiam cum balsamo sulphuris anisato, & aliquor guttis spiritus urinz, vel salis armoniaci, post decoctum pectorale antipthisicum, conservam roborantem & adstringentem, addendo ea quæ putredini resistunt, in usum vocavi: verum cum & hic, quod alibi fieri solet, docta prævaluerit arte malum, æger vitæ hujus misellæ afflictionibus fessus, spiritum creatori suo reddidit.

Antequam occasionem cadaver hujus ægri lustrandi mihi exhibitum arriperem, placuit prius ab Excell. DD. Rothio, Orphanotrophii Medico ordinario, sciscitari quonam morbo primitus affectus fuerit, vel quanam symptomata ipsi in Orphanotrophio adhuc degenti præcipue infesta esse cœperint: Qui per alium me certiores reddidit, se in misello hoc corpore jamdudum affectionem scorbuticam metuisse, & jam ab aliquot septimanis phthisicum eundem auguratum esse: Quibus ita exploratis operi me sectionis accinxit.

Linteamentis, quibus demortuos obvolvi & honestas stradet, & Scriptura jubet, ablatis, ecce Ventrem infimum tumidum omnino, de quo nec æger conquestus unquam, neque nos talem ullatenus vidimus vel observavimus: unde statim ingentis feri copiz suspicio mentem nostram, neque frustra, cœpit. Involucris hinc infimi ventris dissectis, cum Epiploo, quod putridum erat, deprehendimus hepar præternaturalis omnino magnitudinis, parit curvæ & corruptum & putrescent, una cum vesicula fellea, quæ, uti in cæteris, gelatinam referebat: Succus tamen effluens subater erat & viscidiusculus, parum spumolus: In hypochondrio sinistro Lienem invenimus tumidum, flaccidum, corruptum & quoad interiorem substantiam nigricantem: Pancreas sub ventriculo vidimus maximum, glandulis insignibus & duriusculu superbiens: Mesenterium observavimus gelatinosum omnino, maxime quoad extremitates, quibus intestina cingit: Gelatinosus hic humor fere intestinalium cellularum externam faciem planeungebat, ipsamque Mesenterii substantiam tantopere occupabat, ut difficile fue rit omnino, vel vasa vulgo dicta mesenterica, vel, quod plus est, glandulas detegere. In ipsa hujus ventri capacitatis ingens extitit feri copia, quæ, integumentis discissis, qua data porta fugam dare cœpit, non tamen ita foetidum, uti in nupero, cujus Tibi historiam scripsi, spirantis odorem: Cætera hujus ventris satis rite habebant: Thoracis examen aggressus, diaphragmæ superatæ, multum aquei humoris à thorace erupit, neque facile fuit Pericardium à sterne, cui firmiter coharebat, absque ruptione separate. In Pericardio aquam adhuc copiosam reperimus, quæ autem ruptione facta, per viam thoracis apertam, ad inferiora vergebat: Pulmonum lobus uterque putridus erat & corruptus, magis tamen sinister quam dexter: Uterque pressus materiam reddebat purulentam. Ex literis D. D. Joh. Jacobi Harderi, Philosophi & Medici Basileensis, d. 15. Sept. anno 1677. datis ad Clar. DD. Joh. Conradum Peyer Medicum Schæpbuzanum.

S C H O L I A.

Rem jam pensarem proutconque velim, in aitiologia hujus casus institueroda, videretur in hoc ægro primus peccasse Ventriculus, Intestina cum suis glandulis & Pancreas: post hæc Cor præcipue cum suis partibus ancillantibus: Minus vero demum ex copia feri acris & corrupti in thorace stagnante pro-

venisse autumo, Cùmque æger nec de tamore ventris ullo unquam querelas moverit, neque Medicis orphanotrophii ordinatio, neque mihi quicquam horum observare licuerit, æconomiam vitalem potius politer in hoc laborasse constar, cujus vicio hydrope pectoris suam videbatur lumpsisse originem, copiamque

feri aggregata, & ad inferiora regurgitante Ascitem produxille; Taceo quod hic multum conduecit lymphæ acrioris copiosa in glandulis accumulatio, ob sanguinis ritam exaltationem, & œconomia vitali turbata, letum. *Idem.*

Balsamo sulphuris anisato) Ulcerum, apostema con-
sequentiū, mundiciem ac consolidationem con-
sistite ait *Franc. Sylvius Praxl.* v, cap. 40. in correctio-
ne putis acidi codentisque ulceræ parti adhærensia,
atque sanguinem ipsi nutriendæ dictum ex parte sal-

tem consumpenti ac in novum pus ventantis: Quem
in finem laudat Balsamum sulphuris cerebithinum,
anisatum, &c. imprimis ratione olei aromatici, ad-
eoque sale volatili oleoso abundantis, a quo spiritus
acidus in pus luitans, quin sanguinem in pus in-
dies corruptens, non tantum obtrundit, sed insu-
per mitigat emendatque ita, ut affluens sangui-
nes prius consumptas reparet brevi, con-
solidationemque ultimam
expediat.

OBSERVATIO LXIII.

Phtisis à putredine Pulmonum intra 24. dies interimens, cum intestinorum vitio.

IN Hieremia Tonforis seruo multa observanda fuerunt, Primum est lentiginosus & rufus.
Ea corpora tetra quadam bile abundant, & qui humor dominatur & morbum facit, vix
coctionem admittit. Sedari non potuit febris: hemicanie erat obnoxius: ejus ergo gua-
lacio usuf fuerat, & decoctum hoc siccitatem & squallorem summum induxerat, febris assi-
dua, xi. die dysenteria à pravabile, Non est allevatus, Mactuit omnino, & tandem In ma-
ciem adductus ad diem xxv. interiit.

Pulmones sunt deprehensi putres. Intestinorum corpus vitiatum erat. *G. Ballonius Epist.
& Ephem. lib. ii. pag. 245.*

S C H O L I A.

Rufus) *Idem ibid. p. 205.* observat Rufos morbis adoriuntur, magis formidolosos esse, circa quos
vix liberati, eo quod humor in his abundans ha-
bet aliquod virulenti: Atque morbos quicunque eos
medici prudentiores cautiisque
esse debuit.

OBSERVATIO LXIV.

*Phtisis à Pulmonis dextri consumptione, integra sinistri inchoata, Empyemate
thoracis, &c.*

Jacobus Cobier, lanificio victum queritans, initio hujus anni in morbum acutum thoracis
inciderat, cui medicinam non fecit, ex quo materia morbilica tetenta Pulmonem labe-
factavit. In tussim, dyspnoeam & cachexiam incidit, Et quia pauper erat, in nosocomium
delatus est: ibi malis gravescentibus in ista miseria ultimates mentis decubuit, Et licet ad-
hibita essent commoda medicamenta, tamen in Phtisim & summum gradum heclicæ
incidit.

Defuncti cadaver dissectui: Pulmo dextri lateris pleuræ validissime erat adnatus, ipsæ
pleura supramodum crassæ, ut facile conicere fuerit hic morbi initium & specum fuisse: Nam
totus ibi Pulmo fœde consumptus erat, & vix præter vasa & filamenta quid restabat: Thoracis
cavitatem fœdissima sanies implebat, cui similem aliquot septimanas ante obitum rejecerat.
Sinister Pulmo etiam aliquantum corruptus, aqua spumosa impactus, & exiguis aliquot vo-
micis refertus erat: Cor simul cum suis vasibus exangue & pericardio firmissime passim ad-
natus erat, adeo nihil prorsus ibi liquoris residuum: viscera naturalia non aliter à statu na-
turali declinaverant, nisi quod omnia læcida, pallida & sanguine destituta, & Omentum
fere consumptum. Totius vero corporis extrema cernebatur macies, adeo ut de car-
nibus nihil præter filamenta testaret, ipse & ante obitum vivus æger & appareret. *Orth.
Hearnius histor. xxvii.*

OBSERVATIO LXV.

*Phtisici infantis pulmo dexter & hepar sphacelo affecta reperta, ventriculus
corruptus, &c.*

Pæcipue notæ Infans maximo cum parturientis conatu in lucem editur, itant tertia
hora post puerpera moreretur: Summo quoque ipsius conatu, ut circa suturam coronalem,
quandiu viveret, cranium elevatum magis appareret, Licet vero optime lac sugeret,
prorsus tamen non accrescebat, unde & pro heclico curabatur.

Sed septima septimana extinctus est, secabatur, atque pulmonis lobus dexter, ad axillam
vergens, niger plane reperiebatur per quinque tubercula uigra. Hepatis quoque lobus
superior lividus & nigricans. Ventriculum, cum paululum propter sectionem instituendam
distenderent, rumpebatur ille cum maximo fœtore. *Ph. Salmon. cent. 1. Observ. 14.*

Nutritionis vitiatæ causæ facile apparentur hinc: Totum quoque corpus conspiciebatur lividum, ob conatibus forsitan reliquis: Causæ hinc patent cur fœtus difficulter edidit ferme moriantur, quod nimi-

rum omnia per compressionem quasi contenduntur, contrita autem necessario corrumpuntur. Vide Hipp. de vulneribus. Non abs re ergo foetui foret si infansibus ejusmodi sperma cœci exhiberetur, itemq; nutritibus.

OBSERVATIO LXVI.

Tabes à Pulmone purulento, Pancreate scirrhuso, aliisque partium naturalium vitiis.

Ante annum Magistratus in mandatis mihi dedit, ut pauperculam Joh. Pfeiffer curandam susceperem, in qua tot erant morbi complicati ut ne quidem Æsculapius ipsam à morbo liberare potens fuisset. Corpore demortuo viscera sic constituta reperi. Agebat autem octavum annum, & ab ipsis incurabilis morbis obnoxia fuit: Quod ipsi partim ob pravam victus rationem accidisse credo, cum marex vinolenta fuerit, quotidie se vino onerans, & infantes à teneris solo pane & vino ut plurimum alens: hinc viscera tum in ipso utero, tum etiam post partum labefacta & velut rosta fuerunt, imprimis hepar, quod præcipua fuit causa malorum, ut patebit ex sequentibus.

1. Hepar, etsi color externus utrunque laudabilis esset, interius tamen siccum, aridum, & velut semicoctum erat, quod arguebat maximam calidam intemperiem adfuisse: Hinc sitis illa inexhausta, qua à teneris affecta fuit.

2. Ex hac potro intemperie calida Hepatis sequutum fuisse cerebrum humidissimum verisimile est, ob vaporum multorum ascensum ad caput, ita quidem ut cranium à teneris, copia vaporum & humorum frigidorum paulatim aliquomodo extensum fuerit, & proinde caput proportionem corporis aliquantum excesserit. Maxima illa humiditas cerebri insuper Spinam dorsæ, omnisque ex ipsa prodeuntes nervos, continuo adeo irroraverat, totumque corpus tam lubricum effecerat, ut à quatuor ab hinc annis ne suffukris quidem incedere, imo vix in sella sedere potuerit. Articuli omnes, uti & ipsa ossa, adeo erant mollia ut nonnulla ad instar ceræ tractarentur, imprimis claviculæ & costæ, ubi ossi pectoris annectuntur. Spina dorsæ à continua ista defluxione humorum ex capite, adeo erat emollita & lubrica facta, adeoque vertebræ erant relaxatæ, ut figuram hic adjunctam repræsentaret. Prima incurvatio sinistram partem pectoris occupabat, hinc *angustia pectoris & respirandi difficultas*. Altera incurvatio è regione hepatis erat, & ita quidem ut ren dexter incurvationem aut angulum spinæ occuparet, sinister vero nonnihil versus musculos abdominis deprimeretur: Ex hac potro incurvatione spinæ omnes corporis partes velut in globum ita contraherantur, ut vix puerum trium annorum adæquaret.

3. Cæterum ob maximam illam humiditatem cerebri, & defluxionem humorum frigidorum ad nervos, præcipue ossis sacri, non tantum sequura fuerat imbecillitas crurum, sed & sphincter vesicæ adeo relaxatus fuerat, ut à quatuor ab hinc annis urinam retinere non potuerit, sed continuo urinæ stillicidio laboraverit: quare vesica, cum à tanto tempore urinam non colligeret, retineretque, & proinde velut inutilis esset, plane in se contracta, rugosa & velut scirrhusa inventa fuit, præcipue circa ipsius fundum. Non tantum autem ab aliquo tempore incontinentia urinæ laboraverat, sed & plerumque excrementa alvi involuntarie effluerant: imo & ipsum intestinum rectum frequenter simul prolapsum fuerat, & ita quidem ut difficulter reponi posset.

4. Lien plane erat sanus: Splenica quidem veia maxima: hinc appetitum illum continuum & comedendi aviditatem provenisse credo: Lien enim cum claffiorem chyli partem sine ullo impedimento ex venis mesaraicis continuo traheret, & proinde humores acidos copiose ad ventriculum mitteret, facile bulimia sequi potuit: Etsi autem cibum multum appeteret, plurimumque comederet, *exigua tamen sequuta est Nutritio*, quin potius de die in diem magis fuit *Extenuatum corpus*. Queris causam: in promptu est. Corpus enim illud carnosum quod venæ portæ substratum est, *Pancreas* vocant, adeo erat *glanulosum ac durum*, ut chyli in venis mesaraicis alteratus ad hepar pervenire non potuerit: Est & alia causa hujus Atrophicæ, videlicet cacochymia maxima, juxta aphor. 10. 2. Impura corpora, &c.

5. Ventriculum quoque imbecillum habuisse arguit flatuum copia: quatuor enim ab hinc annis abdomen in modum tympani extensum fuerat, idque à flatuum in intestinis retentorum copia, qui illis adeo tenaciter adhaerebant, ut purgationi nequiquam cederent, Et post mortem acie scalpelli perfoctis intestinis vix efflarent. Nec solum intestina flatu distenta erant, sed & ipse quoque ventriculus.

6. Renes secundum naturam erant : ureter verò dexter magnitudine naturæ modum multum excedebat, & crassitie minorem digitum fere adæquabat : E contrario vero sinister valde exilis repertus fuit, Neque ad vetricam descendebat, sed sub emulgente dextra venam cavam ingrediebatur. Ren itaque dexter ut amborum renum officium faceret necesse fuit.

7. Substantia Pulmonis materia purulenta erat imbuta, præcipue ex sinistra parte, ubi ob spinæ incurvationem compressa, ideoque magis livida quam in dextro latere conspiciabatur, & initium sphaceli ibi fuisse color præ se ferebat : Hinc *anhelitus* foetidus, hinc *Tussis* gravissima, qua per dies aliquot ante obitum affecta fuerat : Putredinem porro hanc quod tam placide *expiraverit* causam fuisse certus sum.

8. Pericardium permagnum & aqua turbida repletum fuit : hinc palpitaciones cordis quibus frequenter laboraverat : Sed, quod annotatione dignum est, diaphragmati, & quædem in medio ubi nervosum est, tam tenaciter & mediante callosa materia annexum erat, ut illud nonnisi novacula separate potuerim : Hinc pectoris angustia & respirandi difficultas, qua à teneris annis affecta fuerat, provenisse parer : præternaturalis enim connexio illa, pericardii dilatarionem pectoris non admittebat.

9. Ab incurvabili aurem lorium sine difficultate & conatu reddere non potuerat, quia scilicet nervi ossis sacri adeo relaxati fuerunt, ut etiam sphincter vesicæ officio non fungeretur & urina involuntarie efflueret : Hujus difficultatis causam in excretionem urinæ, connexionem illam præternaturalem pericardii cum diaphragmate fuisse non est quod dubitemus. Ad faciliorem enim excretionem excrementorum haud parum facere diaphragma Anatomici testantur : In excretionem enim excrementorum, cum anhelitus retinebatur, diaphragma viscerat, quæ sub ipso sunt deprimuntur, excrementa quoque propellit. *Febrilius Hildanus cent. vi. Observ. lxxiv.*

SCHOLIA.

Pancreas erat glandulosum de durum) Ab hac duritie atrophie causam deducit, ob interceptam chyli spissitudinem, Richardus Lower Tract. de corde c. 5. p. 214. ac verisimiliter censet ab humore è Pancreatè in duodenum secreto, chylum pro faciliore transitu magis dilui & attenuari : quippe cum glandula illa reliquis omnibus affinis sit, ejusdem cum iis substantiæ & texturæ, æque humor omnis è glandulis quibuscumque separatus similis omnino, & velut lymphæ tenuis sit, eisdem usus interire censendum esse : Quocirca uti glandulæ circa os & fauces consunt lympham suam inter masticandum exsillant, quæ cibos perfundunt & emolliant, quo facilius in ore volucoratur, & deglutiendi aptiores reddantur, sic absurdum non videtur existimare magnam illam glandulam eo loci consutam esse, æque ductam, Witsongianum dictam, in intestini aperiti, & lymphæ inibi secretis descendenti chylo miscetur, quo angustius laquearum canales promptius inear, & magis libere & expedite transierit. Ex si quidem chylus in vasis lacteis, aut ob crassitiem, aut liquoris potuerit inopiam (qui pro vehiculo esset) aliquando stagnare & concretescere, & proinde illa vasa penitus oppletæ & infuscate apertæ sit, prout in Canè, cujus Pancreas obduatum semel observavit Clar. Lower, ideo glandulæ in mesenterio passim quoque consutæ videntur, ut similes præteribenti chylo lympham affundant, quo tenuior & diluatur (qualis tempore nictæ glandulæ mesenterii apparent) continuo evadat : Ex licet in aliis pancreata usum

lymphæ hæc incurrere possit, cum tamen tantum periculum sit ne chylus intra micuros & capillares istos ductus subsisteret, & crassitie suæ sibi ipsi viam obstrueret, aut longiore mora concretescere possit, ideo præcipue à summo conditore cautum esse videtur, tum ut lymphæ è Pancreatè in intestina transmissa perfundederetur, quo facilius in lacteas transeat, tum ut in media inter intestinalia & receptaculum viâ, eadem tenuissima lymphæ iterum in glandulis mesenterii separata dilueretur, quo reliquum cursus sui stadium versus commune receptaculum absolveret.

Quod tam placide *expiraverit*, &c.) Id sempissime in iis qui ex inflammationibus imè ac mediis ventris (quoticumque sphacelum abeunt) moriuntur, observare est : Cum primum enim putredo majores arterias ingreditur, statim veluti syncopæ corripitur homo, statimque & sine violentia exstinguitur, non secus ac lumen oleo deficiente : Putrida enim ac maligna ille vapor spiritum vitalem suffocat, temperamenrumque cordis destruit : Quibus à partu secundina in utero putrescit hoc modo moriuntur : imò & qui ob gangrenas externarum partium vivere desinunt. Qui sphacelo cunctos laborant, ut plurimum moriuntur quam primum putredo genu prætergressi fuerit : ac sphacelo scroci affecti diu superstites vivunt, quia cras circa genu longe majores habet arterias quam scroctum, ideo per eas citius vapor malignus ad cor ascendit quam ex scroto, etiam cordi magis propinquo. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO LXVII.

Tabes à multiplici vitio partium imi ventris & thoracicarum.

Puella annorum circiter sex secta fuit : Cum toto viræ curriculo morbis fuisset obnoxia, præsertim vero tumoribus oedematosis circa articulos manuum, quibus apertis ossa corrupta inveni, nulla tamen fere materia aderat : Dein palpiratione cordis & asthmae divexata, tandem atrophica periit.

Abdomine

Abdomine aperto, Omenti pinguedo absumpta erat, intestinum cœcum, non lambri-
ciforme sed crassum, ex meris glandulis rubentibus compositum, duorum scilicet digitorum
latum, in quo nihil nisi mucilago: Mesenterii glandulæ scirrhusæ, Hepat à naturali
magnitudine recedebat, ut quod plus justo magnum esset, Ren sinist. dextro multo ma-
jor & durior: Ventriculus chylo vacuus, sed flatibus distensus. In thorace verò Pulmo-
nes à convenienti colore recedebant: Pericardium distentum aqua refertum, Cordis au-
ricula dextra prætumida, cui inerat materia quædam alba, membranosa, crassa, oblonga,
In ipso autem dextro cordis ventriculo, materia pinguedini similis. *Ex observ. Cass. Balthini.*

OBSERVATIO LXVIII.

*Tabes à vitio Pulmonum flaccidorum, Hepatis scirrhosi tumidi; Omenti glandulosi
ex parte corrupti, Renis dextri putridi, sinistri glandulis obfiti &c.*

IN cadavere exenterato Nobil. C. A. B. hæc reperta, 1. Omentum glandulosum & ade-
ni bus undique refertum, adeo ut nulla ex parte membranofum appateret, crassum val-
de & tumidum: in parte dextra, circa regionem hepatis, putrefactum & lividum. 2. He-
patis parenchyma scirrhosum, tumidum variisque maculis nigricantibus & griseis distin-
ctum. 3. Vesicula fellea humore nigerrimo & bile atra, materiaque quadam tartarea, sabulo-
sa & friabili turgescerebat. 4. Ren dexter rotus erat corruptus & putridus; sinister glandu-
lis ovi columbini magnitudinem adæquantibus undique obfitus & quasi obvolutus: Pul-
mones toti flaccidi & variegati. 5. Partes circumjacentes proxime Hepatis gibbam parterem,
ut & renem dextrum putridum, plane erant corruptæ. 6. Cor, Lien, Uterus, Incestina &
reliquæ partes naturales. *Timani lib. 6. Epist. 8.*

OBSERVATIO LXIX.

Phthisis à Pulmonibus corruptis, ulceratis, Hepate torrefacto, Liene pene absumpto &c.

IN Anatomia Chr. Richteri, cui mense Aprili, anno 1637. præfui, notavi sequentia, O-
mentum & Mesenterium penitus fere erant absumpta: Lienis quoque exigua portio
aderat, nigra sanguinis congelati instar: Hepar insolite magnitudinis conspiciebatur, colo-
ris tamen ex parte plumbei, & in sinistra parte nigricantis, atque insuper affatum & tor-
refactum quasi: Vesicula bilis continebat nigricantem materiam, grumofam, atque ali-
quot lapillos lentium quantitate: In abdomine collectam videbamus aquam citrinam:
In utero vero purulentam, adeo copiosam, ut Pulmonum corruptorum & exulceratorum
particulas in pute quasi nataret: Venæ pliténicæ pure instructæ, Cor flaccidum erat; In
pæctica rdio drachmæ tres aquæ. *1. Daniel Hoffm. obs. 7.*

OBSERVATIO LXX.

Phthisis à vitio Pulmonum corruptorum & in tabem solutorum, Mesenterii glandulis obfiti &c.

IN cadavere Illustr. Comitissæ de Hodis &c. ad condituram exenterato hæc reperta. 1.
Totus corporis habitus excarnis, musculique omnino inacie confecti. 2. Omentum hu-
more bilioso per totum suffusum & tinctum. 3. Ventriculus & intestina flatibus distenta;
cum multo seroso humore, unde pridie ante obitum de abdominis tensione conquereba-
tur: 4. Mesenterium glandulis maximis & nigris obfutum, à quibus quædam avellanas mo-
le superabant: dissectæ quædam serum flavum continebant, aliz humorem nigrum & fer-
tidum. 5. Jecur coloris quidem erat naturalis, concava autem pars bile obducta: substantia
laxior & mollis, vasa nequaquam obstrueta; Cystis fellea & porus biliaris bile intenso
flava repleta, quamquam non omnino obstruerentur. 6. Lien naturali multo major, lon-
gior, crassior, maculis variis flavis, viridibus, nigris confusus, durus, qui dissectis pro-
fundè humorem melancholicum foetidissimum, acidum spirantem. 7. Renes maximi: in
dextro erat calculus oblongus, uno extremo reni infixus, alteri vretetis orificio: vretet
uterque sabulo crasso scaterebat: Sinister quoque Ren lapide avellanam æquante occupatus
erat: Color utriusque ad nigredinem vergebat. 8. Velica urinaria parva erat, mucem mo-
lescentem vix superans, paucum locum sed foetidissimum continens. 9. Uterus angustus,
durus, nigricans, sero cruento repletus: vasa ejus exilia, complicata & intorta. 10. Pul-
mones pene omnino putres, consumpti, quorum superstites erant solum summi lobii: adeo ut
amplius respirationalis munus obire non valerent; quæ potissima videtur obitus causa. 11.
Cor admodum parvum, flaccidum & tabidum: In vasis & ventriculis ejus nihil p. n. re-
pertum. 12. Collum erat durum & scirrhosum, ut & lingua, quæ nigra: In capite omnes
partes, tam continentes quam contentæ, sanæ. *Balth. Timani lib. 6. Epist. 7. Naturæ*

Tabes à Pulmonum infigni corruptela, Omenti putredine, Mesenterii & Pancreatis distrahione, Hepate scirrhoso, Liene duro, Rene dextro calculoso, insigniter tumido & ad gangrenam verrente &c.

CELSI. Princeps melancholicus, gibbosus, scorbuticus, octo diebus ante mortem correptus febricula lenta, cum virium resolutione, ob defectum prohi sanguinis & spirituum carentiam: Omentum foetidissimum & putridum sese obtulit: Mesenterium nigris varicibus undique circumseptum, cum Pancreatē, induratis multis magnisque glandulis, impervio: Hepar parvum, nigrum, scirrhosum, Ren dexter major capite puerili duorum annorum, in quo calculus 3½ reperitur: Infra hunc abscessus magnus, pure plenus, in medio ventre dux hydatides ab humero usque ad septum transversum: Pulmonum erat insignis corruptela: (lib. I. tit. de melancholia.)

OBSERVATIO LXXII.

Phtisis, à Mesenterio scirrhosis tumoribus obfessa, Abscessu in Pulmone dextro, cum scirrhis & steatomatis per totam eorum substantiam.

SOLENT nausea & cibi fastidium comitari Tabem, vidimus tamen puerum 14. annorum, squē circa 10. annum paulatim in Tabem incidens, 4. sequentium annorum spatio ita laboravit ut penitus extabefacta fuerit, appetitu tamen vix unquam imminuto, nam comederat & bibebar non parcius quam si sana fuisset: exercitia puerilia non dimittens, nec decumbens, nisi at 4. aut 5. septimanas ante obitum.

Cadaver disseccans, reperi mesenterium undique repletum steatomatibus, tumoribus duris atque scirrhosis, præcipue autem circa vasa & venas quæ ad portam protenduntur: Circumcirca venam Portam tumores scirrhosi inveniebantur multi, quorum alii ovi galinacci, alii nucis & castaneæ magnitudinem æquabant: Hinc chylum per mesenterium & Portam ad hepar pervenire, & per reliquum corpus distribui non potuisse, indeque Tabem ortam fuisse certum est, hanc quoque ob causam excrementa quotidie bis terve, liquida & chylo mista exercebat: In Rene dextro lapis erat magnitudinis & figuræ hic depictæ: Hepar undique sanum erat, stomachus & splen s. n. plane se habebant, quæ causa fuit appetitus integri: In dextro lobo Pulmonis abscessus erat putridus & foetidus, in quo continebatur pus membrana conclusum, ad libram unam & semis: & erant steatomata multa & scirrhi undique per substantiam Pulmonis, Cor flaccidum & plane extenuatum erat. *Fabritius Hildanus cent. I. observ. 70.*

SCHOLIA.

OBSERVAT prudentes *Hildanus* in puella Tabē extenuata Mesenterium repletum fuisse undique tumoribus duris scirrhosis, atque steatomatibus repletum præcipue circa vasa & venas, quæ ad venam Portam protenduntur; addit & lacteas, cum adhuc *Hildanus* ignoret: ut appareat Tabem fere impoiandam esse valis mesenterii compressis, potius quam mesenterii substantiæ, in qua glandulosi tumores exorti carnei magis sunt quam humorescales, quomodo in *Vallengeri* anatomie animadvertit *Wasthous* cap. 11. Adnographiæ. *Bertholius Tract. de Hepate* eximio pag. 666. Fateor in Mesenterio scirrhus, tumores, lapides ma-

tos, Accrophiaz occasionem præbuisse: sed in glandulis præsertim hæcile, & vasa chylica compressa illorum inapacis fuisse: Quod si alienus à sanguine matente humor, substantiam mesenterii ipsam inter membranas occupet, natura id se repugnet; unde varie ille velicæ *Efferingero* memoratæ apud *Hildanum* lib. I. observ. postea. p. 2. aqua plena: vel lapidosa durities apud *Paracelsum* Pent. 5. obi. 19. à tartarea materia; vel purulenta materia ac fortide collectio, quam inter duas mesenterii tunicas in hypochondriaco observavit *V. Cæsar* observ. *Anatom. Chirurg. misc. p. 121. idem Hildan.*

OBSERVATIO LXXIII.

Phtisis à Pulmonis grandi vomica in latere dextro, pure viscido totum Parenchyma obfidente, Vomica plurimis in sinistro, & Pericardio aqua dysento, Cordis, Hepatis vitio &c.

HERMAN Stas annor. 22. diu de anxia asthmatica constitutione querulus cum fuisset, tandem ipsi finem vitæ fecit febris rabifica, symptomtica: Postridie cadaver apertum, in quo miserandam Pulmonis constitutionem deprehendimus: nam lateris dextri ala, superior & inferior, empyemate infecta erat, ita ut in superiore *ingens vomica*, pugni capacitate existeret: circumcirca autem undequaque, ipsum pulmonis parenchyma pure viscido, tenaci erat oblitum: ita ut vasa, quæ multiplicia per pulmonem decurrunt, viscida ejusmodi purulenta materia impleta essent, haud fecus ac videmus rete piscatorium, in locis.

locis palustribus impuris, interdum rotum alga impleri: Sed præterea multa tenuis puris copia aderat teterrius odoris, quæ aperta vomica distillabat: Exterius autem *arctissime Pulmo adnatus* erat costis, ipseque alæ inter se firmissime copulatæ, adeo ut Chirurgi manu multo conamine avulsio facienda esset: Sinistri autem lateris alæ liberæ erant ab omni annexu, sed intus etiam exiguæ quædam vomicæ passim dispersæ erant pure impletæ: foris autem color hic *prope naturalis* erat, sed latere opposito luridus: Pericardium aqua valde distentum erat, & cordis auricula dextra ad magnitudinem ovi anserini intumuerat, op-
pleta sanguine nigro crasso, & valde renaci lenta pinula, quantum vola manus comprehendi poterat: Hepar coloris erat valde pallidi, & consistentiæ flaccidioris paulo quam naturalis: Lien infra magnitudinem naturalem erat, flaccidus, & in inferiore superficiei luridus: Multra aqua citrina, coloris pallidioris in abdomine innatabat: *O. Hæurnius obs. 11.*

S C H O L I A.

Arctissime Pulmo adnatus] Hoc frequens est in asthma-
maticis à pînua vilicida, quoniam illa per poros
pulmonis foras protrusa sibi in membræularum tenui-
cissimarum consistentiam à loci calore excoquitur.

OBSERVATIO LXXIV.

Phtisis ab apostemate in infimo sinistro Pulmonis lobo consistente.

Phtisicus Leidæ secabatur, ventre coincidente, emaciatis artubus, prorsus tabidus: Viscera interiora, lien, hepar, cor, à naturali facie nihil recesserant, ut sani esse hominis iurasses: Pulmo sinister integer, sed costis adhærens: Dexter vero pulmo contretatus fœtorem emisit & materiam purulentam: prope diaphragma enim ingens latebat apostema in pulmonis infimo lobo, quo manu sectoris disrupto, maxima puris fœtidi effluxit copia: Vivum qui inviserant, pus quidem per sputum observaverant expuisse, sed parcius & sine insigni graveolentia, nondum enim ruptum fuerat apostema. *Th. Bartholinus centur. 5. observ. 76.*

OBSERVATIO LXXV.

Phtisis à Pulmone dextro corrugato, flaccido, cum puris ac feri albi collectione in thorace eodem latere.

Anno 1662. in dextri lateris Empyemate aquoso, ex pure ac fero albicante simul collectis constante, reperimus in Nosocomio Academico Pulmonem dextrum corrugatum, lividum, flaccidumque, ac meo quidem iudicio Tabè confectum; quod ambi-
ti aque purulentæ adscribendum censebam malum. *Franc. Sylvius Præfex. med. l. 1. c. 24. §. 8.*

S C H O L I A.

Contabescunt Pulmones vel sui, vel sanguinis putrisve culpa: Et sanguinis quidem culpa, quando idem putulentus evadit, maxime in pleuritide in abscessum abeunte, atque pus suum, vel immedie, vel sanguine mediante Pulmonibus communicant; unde tamen non Pulmonum tantum, sed universi corporis subsequi solet Tabes: Pulmonum vero culpa contingit Tabes, quoties à causa ipsa externa vel interna, inepti redduntur assimilando sibi debite sanguini affluenti, quod non semel observavi evenire Interne ab ulcere, Externe ab Empyemate: utrobique à pure corrupte, non tantum sanguinem qualemcumque ad ipsos delatum, sed ipsam eorum substantiam, ut amplius ullo nequeant nutiri. *Idem §. 5. 6. & 7.*

OBSERVATIO LXXVI.

Phtisis ob ariditatem Pulmonum, inductam à fistula thoracis.

Vidi ex fistula thoracis Pulmonem summam ariditatem contraxisse, adeo ut in ex-
tremum marasimum exaruerit: Hoc evenit Illustri Virgini Franciscæ Egmondianæ Comitiſſæ: Præcesserat sputum fœdi puris cum exiguo sanguine. *Hæurnius de morbu Pello-
ris cap. 7.*

OBSERVATIO LXXVII.

Plurimorum purulenta expuentium Pulmones aridi reperti.

Ex communicatione Viri Excell. Dom. Stoffelli, D. Medici & Cellissimorum Principum Wirtembergensium Ephori habeo, Chirurgum qui Suecica Castra anno 1634. sequutus est, quamplurima cadavera condituræ gratia exenterasse, hominum qui dum vi-
verent purulenta & pus copiosum expuebant, atque in omnibus pulmones aridos & ex-
succos invenisse, defraudatos scilicet alimento, quod totum in putrilaginem illam abiit, Ex
ipsius autem Chirurgi ore didicit.

OBSERVATIO LXXVIII.

Tabes à Pulmonum squallore, costis & diaphragmati adnatorum, Caruncula in cordis sinu sinistro &c.

Juni die 13. anni 1676. dissecai cadaver filii D. de Villes Machæropæi, qui Tabidus Jobit; præsentibus aliquot Medicis & Chirurgis, Pulmones nativum colorem fervebant, sed sanguine & omni humore destituti, costis maxime coherentes, vertebris & diaphragmati præsertim, quod vj. divellendum fuit quo ab illis abscederet: Cor exsuccum cujus uterque sinus sanguinis expertus, Sinistro innata erat caruncula majorem fabam æquans: Jecur fat rite constitutum, nisi tunica ambiens lucipientis corruptionis notas dedisset, alias naturali majus: Vesica fells concludebat humorem oleosum & nigricantem: Lien erat exilis & aridus: Pancreas Virsungii, glandulis atheromatibus similibus scatebat: Universum mesenterium sisdem infarctum, sed cartilagineæ duritiei: Ileo quoque intestino adnatæ erant plurimæ exiguæ glandulæ pilis similes: Colon sacibus admodum adustis infarctum, glandulis quoque asperis coopertum: Prædie ante obitum colicus dolor graviter vexavit cum ischuria omnimoda: ideoque vesica ad molem capicis infantis intumuerat, lotio distenta, odoris & coloris experte, quod compressa pubis regione totum per colem exiit. *Ex communicatione mag. Stephani Dentand Chirurgi Genev. peritissimi.*

S C H O L I A.

Illes adnata &c.] De similibus adnascendis in Phthisicorum intestinis vide Scholia ad observ. 1. sect. 11. lib. 1.

OBSERVATIO LXXIX.

Tabes, Rachitidis comes, à Pulmonibus quasi tartaro gypseo refertis excitata, lividis, exsuccis &c.

Genetosis. D. Thomas Moore, ternam prolem habuit, quos altero mox à nativitate anno, vix vitali aura hausta, abstulit atra dies & funere merfit acerbo, uno eodemque mortis genere jugulatos: Hi omnes in lucem editi, videbantur vegeti, vivaces & bono corporis habitu præditi: Instante veto dentitionis tempore, languescere incipiebant: apprehendebantur in principio molesta tussi & spirandi difficultate, incrementum in dies fumentibus; Caput paulatim in majorem molem accrescebat: membra externa flaccida & quasi pendula apparebant: Ossium epiphyses in carpis & talis protuberabant; in costarum cartilaginibus nodi conspiciebantur: Venetæ turgescerebat, pectus extenuabatur, totumque corpusculum atrophica contabescerebat: ut facile ex his colligere poteris, eos novo & veteribus incognito morbo, quem Neoterici *Rachitidem*, seu morbum spinalem vocant, quod spina dorsii maxime in hoc morbo afficiatur, laborasse: His ab interitu redimendis, si fieri posset, parentes nullis parcerent sumptibus, sed inexorabiles erant Parcæ; secundo post primum, & tertio post utrosque vitam abscindentes. Parentes de futura prole præservanda solliciti, ut in causam morbi diligentius inquirent, ultimo defunctum aperiri cutantur.

Quo à me dissecto, Hepar justo majus, ut & pleraque in abdomine viscera, non tamen male colorata; intestina vero flatibus turgida & multum distenta apparebant: In Thorace vero, sterno sursum flexo, Pulmones conspiciebantur lividi & exsuccis, membrana vero eos ambiens admodum erat aspera & inæqualis, innumeris profuberantiis seu tuberculis, verrucis perquam similibus, ubique respersa; quibus apertis, inveni in illis tartarum quandam gypseum, calcis instar friabilem, per totam Pulmonum substantiam sparsum: In capite nihil culpabile occurrebat, nisi quod cerebrum videbatur aquosius: Placuit Deo pluribus liberis hunc generosissimum Virum postea ditare, qui emissariis impressis, & aliis Pulmonibus dicatis præservati, optima fruuntur valetudine, *Quod si frequentiores essent de mortuorum dissecciones, forsitan non tanta hominum multitudo à Libitina absorberetur. Fridericus Lofius observ. 3. lib. 1.*

S C H O L I A.

Rachitidem &c.] De hoc morbo vide Section. ultimam hujus libri.

OBSERVATIO LXXX.

Anatome Phthisici, in quo Pulmonum tunica maxima crassities reperta est, hepar, lien, diaphragma, intestina invicem coherentia.

IN Phthisico dissecto à Clar. *Francisco Sylvio*, observavimus summam Pulmonum tunicæ crassiciem, digitorum medium æquantem: Hepar vero, lienem, diaphragma & intestina inter se arctius coherentia, omentum denique penitus carnosum. *Thomas Bartholinus cent. 2. observ. 76.*

S C H O L I A.

Summam tunicæ crassiciem] Quæ naturaliter tenuis est, levis, poris multis insignita, inflato follium Pulmone satis conspicuis, atque notante *Johanne Walsæ*, pilis majusculi magnitudine in vivorum dissectione; per quos sanies thoracis penetrare potest & per tussim exire. Ejusmodi crassities in Pleura observata est à *Riolano* in his quibus inflammatione fuit affecta.

OBSERVATIO LXXXI.

Phthisis à Pulmone innumeris pustulis scatente, mediastino putrefacto, Et vitiiis variis viscerum naturalium.

ANno 1666. puer 12. annorum, post plurimarum hebdomadarum decubitus Phthisi exstinguitur: Aperto thorace mediastinum putrefactum frustularum apparuit: Pulmo albicans innumeris pustulis undique scarebat, quæ discissæ crassum pus fundebant: In Pericardio ultra decem cochlearia aquæ citrinæ fluctuabant: Cor flaccidum, omnique sanguine vacuum conspiciebatur: Reserato abdomine, in Hepate & Liene, præter insuetum pallorem, etiam plurimæ pustulæ albicantes observatæ, quæ discissæ glandularum substantiam amulabantur: Intestina solis flatibus distenta innumeras habebant maculas lividas & luridas. *Observat. Georgij Segeri.*

S C H O L I A.

IN Hepate pustula quæ glandularum substantiam emulabant] *Marcellus Malpighius* Tractatu de Hepate, Torum Jecur docet multiplicibus constare Lobulis, qui Glandulosi coagmententur globulis, ad quos terminentur omnium vasorum afferentium ac efferentium, venarum Portæ atque Cavæ, Arteriæ hepaticæ, Nervorum, Ductusque bilarii hepatici, quin & radia-

cum ex Folliculo fellis propagatarum extrema, Quibus positis aut concessis, Pustularum ejusmodi glandosorum generatio adscribere videtur interceptioni alicujus liquoris in dictis glandulis, sanguinis, lymphæ, bilis aut succi nervi, ob vasorum quorumpiam dictorum obstructionem; qui dentes in pustularum formam eas intumescere fecit.

OBSERVATIO LXXXII.

Phthisicus, à spūto sanguinis, Pulmones dextra vel sinistra parte tument, cum viscido humore in vesiculis eorum contento &c.

Illi qui Tabè moriuntur ex spūto sanguinis copioso, monstrantur molem vel dextri vel sinistri Pulmonis insignem: quæ etsi primo intuitu nigricans apparebat, penitus tamen cultro dissecta, omnes istas vesiculas non dilatas, sed mucilagineo humore, viscido & albo refertas exhibuit, quæ causa ut nonnisi ægri toto decubitus tempore exspuant: unde de transmeatu istarum vesicularum hæreo nonnihil. In ulcerosis autem, cum ad supurationem & corruptionem devenitur, cavitas oritur quæ ex pluribus absumptis cellulis amplior redditur: Et hæc si exsiccare posset sufficienter, è vita non tollerentur tot Phthisici: *Bartholinus centur. 4. observ. 73.*

S C H O L I A.

Bononiz diligenti sectione animalium deprehendit *Marcellus Malpighius*, Professor, Pulmonum substantiam nequaquam esse carnosam, sed aggregatam quid ex levissimis & tenuissimis membranis, quæ extenæ & sinuatae pene infinitas vesiculas obiculas & sinuosas efformant, quæ talem habeant situm & connexionem, ut ex trachea in ipsas, max ex una in alteram partem sit aditus, & tandem desinant in continentem membranam, quæ & ipsa retis formam habeat, fibris variis retium instar distincta: quæ deprehendit esse anastomoses vasorum pulmonariorum. *Mem. centur. 3. Epist. 82.* Non dubito quin variæ in Pulmonibus demonstrari possint vesicæ, & quidem

modo non uno: in exsiccatis enim (si prius *Malpighii* exemplo omnis eluatur sanguis quam exponuntur siccandi) plurimæ, ubi dissecti fuerint lobi, conspiciente veniunt cavitates sine omni controversia: dissecantur enim simul plurimum venæ cum utriusque arteriæ ramuli, quos omnes manifestis cavitatibus domos nulli non manifestum: Quod si vero etiam antequam liceant, aëre pulmonum distenduntur bronchiis, quot quotque in dissectione videre licebit cavernas? Sane cum asperæ arteriæ extremitates sine numero per totam pulmonum substantiam dispergantur, stat eisdem violenter distendente, innumeras vesicularum, si dividantur, speciem

D d d j

exhibe-

exhibebant : Sed ideo statuendum Pulmonum parenchyma ex pusis vesiculis consistere non videtur necessarium : Quid quod ne quidem inde sequatur vel solius asperæ arteriæ extremitates in vesiculas desinere, ut de extremitatibus venæ, arteriæ, lymphaticorum nihil addam : Quantum in arido canis pulmone microscopium mihi revelavit, præter totiusmodi diffusionis vasorum foramina, & minutissimorum filamentorum sine lege currentes myriadas, nihil omnino conspiciebatur ; nullæ rotundæ membranae vidiq; vestigiæ caverulæ, nihil plane vesiculæ oomine salutandum : Nec ipsa ficentis Pulmonis illæ superficiei vesicularum sub microscopio olla exhibuit indicia, aderat protuberantiæ, sed illæ ut magnæ, ita & inæquales, nec in medio tumentes, nec in am-

pliu orbiculares, adeoque vesicularum oomen minime tuentes : Absit tamen ideo ingeñosissimæ viri experimento fidem detraherem, quod mihi semel iterumve idem tentari non successerit, viam forte non eandem ingredientem : *Nicolaus Stenon Epist. ad Bartholinum 55. cent. 4.* Recte monuisti plurimas lymphaticorum cæcævas hic spectari : Ita enim res se habet, ideo humidissimus Pulmo : Accedit fauciū & garruræ consensus, quæ multum humiditatis Pulmonibus affundant : Non membrana interior modo spongiosa est asperæ arteriæ, sed in externis cartilaginibus vesicularum more expanditur, suntque quadrangulares & sexangulares earum figuræ, ad suboculos vesiculas ordinatæ. *Barthol. cent. 4. observat. 57.*

OBSERVATIO LXXXIII.

Phthisici utraq; Pulmonum pars liventibus maculis variegata, & pleuræ anoxa inventa est; cum hydropo dextri thoracis, offe in corde, aliisque vitiiis viscerum naturalium.

Rusticum valetudinarium & toto corpore emaciatum, tevera phthisicum aperui : In aperto cadavere hæc observata, 1. In Epigastrio aperto prope lineam albam, heterogenea inter peritonæum & musculos livescens excreſcentia erumpebat : dissecto vero peritonæo satis valido, mediocris feri copia, non graveolentis effundebatur. 2. Omentum usque adeo tenerum & contractum, destitutum omni propemodum pinguedine, nullis refertum glandulis, ut duriuscule tractatum fatisceret illico. 3. Hepar prægrande & florido nonnihil colore : vesicula fellis distenta seroso magis quam bilioso ichore : 4. Lien pugni in modum contractus, prætumidus, fæculentissimo sanguine refertus, oppido scirrhosus ; Pari constitutione Pancreas, sed subalbicans adhuc. 5. Ventrículus valde contractus, vix duarum librarum potulentæ materiæ capax : Intestina explorata, pellucida, nihil præter aquosa continebant. 6. Thorace aperto, non minor forosorum vis, imo major quam ex aqualiculo ubertim scaturiebat, sed non ex utroque latere : observabatur enim dextram thoracis partem, & sinistram abdominis pecus habere : Nam quamvis tam dextra quam sinistra pulmonum pars hinc inde livescens maculis variegata pictaque esset : tamen sinistra horum libera, libero motu moveri potuit, dextra vero penitus dextræ pleuræ annata firmiter erat, ita ut vix digitorum manuumque opera à pleura divelli posset. 7. Spatium quod inter pulmones & diaphragma vacuum interjacet, in sinistra quoque thoracis parte vacuum, sed in dextra serosis limpidis liquoribus scatebat. 8. Cor tam erat vastum ut sæpe in bobus non majus sit aut ponderosius, cuius dextra auricula pyris, volemis longe major : Sinister ventriculus nondum dissectus insolito durior ad tactum erat, hinc suspicio nata istius loci cartilagineum delitescere, similem iis quæ in cervorum cordibus reperiuntur, Nec spes fessellit, nam ad radicem aortæ cartilago triquetra, & propemodum cordis picti figuram repræsentans, vel liræ Y inventa fuit : Spongiosum vero nonnihil est os & friabile, calculis nonnullis per urinam excretis haud absimile : 9. Pericardium ne guttulam quidem serosi humoris continebat : *Tb. Bartholinus hister. 50. centur. 1.*

OBSERVATIO LXXXIV.

Anatome Phthisici cujus Pulmo & Iecur pustulis obſta erant.

§. 1. **C**ontigit anno 1546. ut duo filii Laurentii Gadii morerentur ex simili fete morbo : ad tertium autem adoleſcentulum vocatus, qui & ipse eodem morbo laborare videbatur iudicio parentum & domesticorum, cum jam fluxu ventris & tussi, & summa Tabæ detineretur, judicavi celerrime moriturum, Itaque cum alii quatuor filii & ipsi eodem morbo detineri viderentur, terribus pater, quasi de veneno suspicabatur : At ego verecunde petii ut cum mortuus esset, qui jam graviter laborabat, liceret corpus dissecare ut aliis proficeretur : Annui pater dissecuimusque :

Inveni in Iecore pustulas, sicut cicericis grana, candida rotunda ; In Pulmone quoq; alias, & partem oblongam, lividam atque fuscā : Ex quibus conjectura assequuti sumus non esse venenum, curæque modum : Itaque hac ratione servati sunt omnes qui superficiei erant filii, & nunc etiam vivunt, curatio autem fuit cum refrigerantibus & humectantibus, & usu sacchari rosacei assiduo. *Hieron. Cardanus curat. admod. n. 10.*

S C H O L I A.

Conjectura affligenti fœtus cum modum] Epiſtæmodi enim puſtule æſtuantis interius bilis erant ſoboles, quarum generationem Plato in Timæo ſic exprimit; *Quæcumque in corpore inflammantur ardentique, à bile ſæva id habent: Cum enim ſera exhalat, reſerrens enim generat tumores, quibusque emittit: Incluſa gignit mor-*

bos exurentes pluriſimos: Biliſ ideo, ubi cum ſanguine fervet, bullæ & tenues veſiculæ excitantur: ac quod in habitu corporis concingit, idem quoque viſceribus accidere pluriſimi adnotant. Hinc indicioſius emergit æſtum viſcerum compeſcendi, temperandi, proveniuntque bilis præcavendi, geniam educendi &c.

§. 2. Nobis contigit ut in Filio Gadii diſſecto, cum ut phthiſicus haberetur, ſi quidem & tabidus, cum maxima tuſſi & febri lenta obierat, In eo tamen nullum ulcus in Pulmone fuit, ſed in ejus ſuperficie Tubercula quinque, ni fallor, ſanioſa, & portio livida, fiſca, velut igne exuſta, Et in Jecore alia tubercula illiſ ſimilia. *Idem lib. de ſignis, cauſis & loc. morbor.* pag. 3. n. 67.

OBSERVATIO LXXXV.

Tabes à Pulmonibus lividis & pituitofis humoribus imbutis, poſt hydrargyri ſin.

Mercurio crudo in lue venerea, aliſque affectibus externis, extetius applicato utôq; cum fructu: Interim tamen caute cum ipſo agendum eſſe hoc exemplo patebit: Quidam dolore articularum, propter deſatigationem corporis ex longo itinere, fame & inopia laborans, quum Lauſannæ ab Empirico unguento ex Mercurio inunctus fuiſſet, paulo poſt plane extenuatus naturæ conceſſit:

Ego cadaver præſente Medico diſſecui, & ipſius Pulmones lividos, & pituitofis humoribus imbutos; cor vero molle, flaccidum & exangue inveni. *Fabritius Hildanus Operum* pag. m. 914.

OBSERVATIO LXXXVI.

Phthiſicorum quorundam Pulmones lapides & calculos continentes.

Anno 1591. G. Fallopius juvenis cujuſdam viri corpus ſecuit, qui adverſa valetudine diuturna uſus, Tabæ paulatim conſumebatur, de anhelo pectore & quotidiana tuſſi præcipue querens, donec tandem placide ex hac vita migravit:

In ejus Pulmone quatuor lapides offendit, nullum faba majusculi minorem, latos non-nihil & tuberoſos, cinereos & ſubduros. *Fentmannus lib. de Calculis.*

§. 2. Haber adhuc meus collega lapillum fabæ magnitudinis, à ſe exemptum ex ſiniſtris Pulmonibus cujuſdam adoleſcentis phthiſi demortui, qui jam diu Tuſſi vexatus, prope annos tres inceperat Tabæ marceſcere, qui tandem interit: lapillus eſt laxe qualis, aſper, non admodum gravis, pallescens atque ovalis. *Wierus lib. 3. de præſtig. Daman. cap. 2.*

§. 3. Ego lapidem in Pulmonibus genitum vidi, atque meis manibus exemi in Hoſpitali Piſano, cum corpus ad ſepulturam delatum eſſet, cujuſdam adoleſcentis qui Tabæ intectierat. *Solenander ſeſſ. 5. conſil. 16.*

§. 4. Mulieris cadaver ex Phthiſi mortuæ incidi, In cujus Pulmone copioſas arenulas cum aliquot lapillis inveni. *Fabritius Hild. cent. 2. obſervat. 29.*

APPENDIX.

Phthiſis orta à vermibus Pulmones depaſcentibus.

Deſperata Phthiſi diu preſſus vir Nobilis, tandem fatiſ ceſſit: Ex ore naribusque deſuncti corporis Innumeri prodierunt vermiculi, rubro capite, quos ex pulmonibus corruptis emanare ſuſpicor, vel veſica ſingulari, cui in vivo homine incluſi fuerant: Fetalis arca conceditum cadaver iſdem vermiculis ſcatebat, cunctis ſtupentibus. *Thomas Bartholinus hiſtor. Anat. 46. cent. 1.*

OBSERVATIO LXXXVII.

Tabes à corporibus albis, pituitofis, fibroſis, in vena cava repertiſ, Veſica calculo & Renum ſuppuratiõne.

Jacobus Knoll adoleſcens 17. annor. laboravit à pueto calculo veſicæ, à cujus cruciatibus, accedente renum ſuppuratiõne, macie conſectus, vicibusque pene ex haultus è vita exceſſit. Cum juxta alia imum ventrem ſcrutando, ac duplicis veſicæ ſpeciem contemplando, venam cavam diſſecuiſſem, corpora alba, pituitoſa ſeu fibroſa, cavitatem earum ſere implentia reperi, qualia in diu decubuis & à morbis chronicis ſublatis ſæpius vidi: Statim cogitavi talia quoque ſinus cerebri occupatura, cum quod uni majorum vaſorum obtingat,

alterum ab eo raro immune existat : Aperui itaque sinum rectum, in alterutro laterum occurrit corpus sive pituitosum sive fibrosum, certe non adiposum (prout quidam hæc corpora nominare solent) candidum, lentum, tenax, crassitie fere digiti majoris, circa torcular maxime, & tantum non totam cavitatem implens : In cavitare hac tenacius erat quam in vena cava descendente, ubi ad levem attactum rumpebatur, secus ac alias de his pituitosis corporibus observavi &c. Totum hoc corpus pituitosum ex sinu tertio extraxi, cui haud ægre omnes ejus appendices succedebant, adeo ut plurimæ spithamæ longitudinem superaverint : præterea in ramusculos & filamenta, ad numerum prope vasorum divisibiles essent : Similia corpuscula pituitosa, in utraque carotide interna, prope infundibulum, notabilis magnitudinis, aliquotusque sursum scandentia inveni, non tamen tantæ longitudinis atque erant in venis tertii sinus, quod ceu fracidiora minusque tenacia forte abrumperentur : Adolescens autem hic nihil unquam apoplectici passus est, at sæpius convellebatur : *I. Jacobus Wepferus Exercit. de Apoplexia.*

S C H O L I A.

Etsi ad Tabem inducendam, & diuturni velicæ à calculo cruciatus, & renem exulceratio facere possunt, præcipuam tamen causam corpora ejusmodi fibrosa fuisse verisimile est, quæ sanguinis comæatium, liberumque ad partes nutriendas appulsum

impediabant : Infelicia hæc cordis germina, ut vocat *Clar. Wepferus*, læsorum nutritionis organorum clausa indicia dedere, sicut anadossi necitatis vivifici & succi alimentarii impedimento facere.

OBSERVATIO LXXXVIII.

Phthisis non Vlcera tis Pulmonibus, citra sanguinis aut puris sputum, cum vitio cerebri, pancreatis &c.

Scribentium omnium calculo comprobatum est Phthisis Pulmonis ideam & diorsinum esse ulcus ipsius : Ego vero monstrabo brevi citra exulcerationem extare, languore scilicet & marcore, i. e. putrida quadam laxitate tacto pulmone, quod fit ubi mucore pituitoso ac semiputri diu multumque alluente distabunt, ut scilicet folium longo lentoris immaceratu flaccescit. De qua re ita Fracastorius 2. de morb. contag. c. 9. *Verum & illam quoque passivum Phthisin satis proprie appellare, qua corruptis putrefactisque pituitis ita pulmonem affecit, ut si non ulceratus est, at flaccidus tamen & putridus jam reddatur : quippe salis dissolutionibus quorundam, vidimus interdum partem pulmonis sinceram & nullatenus visatam &c.* Ejusdem rei meminit *Lacerius* comm. ad aph. 13. sect. 2. *Coac. Hipp.* Quo Phthisis vitio, atque aliis mire multis abscessibus enectum vidimus illustrem virum Marcellum Sachtetum anno 1629.

Penetrantia corporis ejus invidentes, primum Alentis officinæ statum enarremus : Omentum & mesenterium adipe nulla perfusum, utrisque vero color fixulentus atque subcroceus : Intestina squallentia, coloris janthini, & quasi fistula inflata fuissent, præturgida : Pancreas semicirrhosum : Jecur plerisque maculis distinctum, quas cultro discissis nonnihil penetrare compertum est : Lienis aliqua particula lato quodam collo candidiore notata : Vesica propemodum ostracose carnis instar obdurata : Parastatæ cyrfoides ac vesicæ *omphalocephalæ* exhaustæ ac viæ : Sub Pectore Pulmones submucidi, fuscis quibusdam maculis affatim respersti, neque enim ulla ex parte cinerei, quem his secundum naturam habentibus colorem tribuit *Hippoc.* lib. de Anat. Circa cor nullus omnino adeps, quem tamen visceri proprium atque essentialem asserit *Columbus* 7. rei anatom. Sed ipsum viscus, præterquam usus ejus poscit, flaccidum & marisupil pellicei modo in se recidens : Pericardium inane conceptaculum, neque enim vel ullus aquæ mador observatus est, dignus effatu. Cerebrum inculparum quidem sincipite tenus, nisi quod in ventriculis anterioribus excedens multitudine repertus humor tenuis ac pellucidus : Illud equidem existimant quamplurimi, malorum fortasse cunctorum capitis principium, quod rubore suo purpureo desloratus ac dilutus emicuit choroides plexus, quem in quadriduanis alioquin, ac serius etiam tractatis cadaveribus, nitidiorem, ac si dicere licet, vividiorum ac lactiorem semper offendi, argumentum scilicet prævalentis aquosi coinquinatæ sanguinis, quam fantiem antequam vocabant : ubertatem autem ejus humoris inde cognovisses, quod distenta turgentiaque eadem vascula, varicosis quibusdam eruptionibus ac toris identidem subfultare vidisses : Sunt hæc quidem magna, sed hoc longe maximum, Nempe fe obtulit nobis ex infima calvaria, basin cerebri residuum eximentibus, qua nervus auditorius in exculpæ offis auriculæ forulum excurrit, quantus minoris hirudinis aut millepedæ ductus est, hinc atque hinc, sed dextera major, fibra sanguinea aut sanguinis concrementum, quod cum auditotio nervo oblique pergens ad antedictum foramen finiebat : Hanc nobis rem

cui

eum admiratione inquirentibus, quid aliud videretur quam Bdelia Hippocr. lib. 2. prorrh. memorata, prorsus non fuit; de qua re dilerte *Murillus Cagnatus* lib. 2. var. lect. 2. Hæc quidem circa cerebri partem anticam, cæterum postica pencephalon, quod suæ prænaturæ firmitus & compactus est, ut pote nervorum similiter propagandorum principium, molle nimis ac flaccidum, fibris velut diffuentibus constans, humore nimirum, quo plurimo scatebat, confectum: Mittit quod colore ferne pullo atque sublivido, quale hæcenus nullum videre obtigit, etiam non pluribus quàm tribus ab efflato spiritu horis eviscerari eorum à nobis. *Severinus de Abscessibus sect. 2. cap. 36. pag. 269.*

S C H O L I A.

Corruptus corporis habitus & grandi macie torridus; lacertis excussus vigor, coloris amissus decor; multiplex ac varia corporis universi divexatio; proclivitas ad summam juvenis, corrupturam & chylosi & anadiosi & hæmatis sunt peccata: Quæ omnia partim invexere gracile mesenterium & omentum; partim scirrhotodes pancreas, partim inquinatum hepatis parenchyma, ostia atque & collis obductus lien: Quo congruit illud Hipp. 6. Epid. 3. ventris torpor omnium confusio, vasorum immunditia: Hæc interanea cum aberrant à suo tramite omnia, initium tamen morborum pancreati refero, qui alimentis in omne corpus distribuentis primus emissor est & janua: Sive, quod *Fernelus, Angerio, Varolio* placet, limosi sanguinis locus purgatorius & feminis; Sive, quod *Proculianus* visum est, calidum & humidum elixatio cibis ventriculo, per subjectam vasculum diploma vaporatum: Aditipolaræ *Riolani* qui 2. Anitropog. Pancreas ac inebriatam & scirrhotodes factum, truncum poræ constringit, anadiosisque chyli intercipit &c. Quæ hæmatis eluvies de supremo capite ac subditi choana in fœces & tracheam, & inde ad Pulmonem delapsis, corrupta jam & emarcida, spongiodens horum substantiam hic affectis, ut non ulcerosum quidem ipsam, sed flaccidum putidumque reddiderit, quæ Phthisis ad ungorem ea est ratio quam primus explicavit *Præcæsternus*: Ex quo Phthisis contagio, plene non longi quoque contractum est postremo & cordis & vitalium omnium viscerum detrimentum. *Arterius ibidem*. Pulmones autem sine ulcere & hæmoptili consummatam phthisin parere, quandoque flaccescere monet *Mercurius* To. 2. conf.

43. plures quoque ab omni, ab abditi pulmonum labæ, sine dellillatione aut sanguinis sputo tabidos evasisse tradit *Fernelus* de part. morb. & sympt. l. 5. cap. 10. *Narrat Rhodius* cent. 2. obs. 8. obscurum D. Sals juvenem, cujus majores phthisi omnes perierant, absque cruoris sputo, præterquam paulo ante mortem: *Gal.* lib. 4. cap. 9. de loc. aff. Rarus quidam casus recenset in quibus phthisici evaserunt, nulla prægressa hæmoptili, aut suppuratione aut catarrho aciei: Quidam et, humorem repente expuit, liquidæ bili in colore perquam similem, medium videlicet inter flavum & pallidum, ac nulla acedine infectum: atque ita quotidie magnam ejus quantitatem expuit, deinde suborta febricula tabescere incipit, adeo ut purulenta sciret: postea trachu temporis, quatuor videlicet mensium, triguum cum pure cruorem rejecit, atque sic aucta febre magis consumebatur, ac iterum magis expuebat, adeo ut magnam sputi quantitatem redderet, donec tandem tabidos interiret. Eiusmodi Tabes plenamque vitiosam Pulmonum constitutionem sequitur, ob quam proprium alimentum in corruptum elam abir, à qua vicissim ejus substantia alteratur: Ea diathesis à primo ortu, semineque parentum labe inquinato originem trahit, unde phthisi morbis hæreditatis annumeratur; ita ut vidu illud *Assest*, inevitabili fœto, quidam familiæ ad interitum deducat: Id autem malignæ culpam venenæque qualitat, non ulli primarum, imputandum est, cujus ratione contagio in alios transferretur: Concedendum tamen flaccidam & mollem pulmonum substantiam, atque adeo corruptioni magis obnoxiam, ad ejus affectus productionem concurrere.

OBSERVATIO LXXXIX.

Phthisici Pulmones aridi, scirrhis pleni, citra puris aut sanguinis sputum sunt reperti.

Quinquagenarius, longo corpore & collo, facis opportunus rabi, tussicula, flatibus, pituita, tres annos laboravit: Audiebatur quasi aqua fluctuans ad diaphragma & ventrem: Alii vitium lienis causabantur: Purgationibus, decocto gaiaci & aliis vexatus, nihilo melius habuit: Subrabidus, male coloratus: Tandem decretum est, desperantibus Medicis & ægro, ut aperiretur thorax, primum cauterio potenti, deinde culrello, nam propius admoda aure, intelleximus materiam diaphragmati insidere, non esse in ventre: Itaque inter 4. & 5. vertebra aperta via est: Effluxit pus multum, crudum: quinque post diebus mortuus est.

Dissecto ægro, inventus Pulmo aridus, scirrhis plenus, syderata pars membranæ succingentis & costatum: Venter inferior integer: Nunquam pus expuerat neque sanguinem, Laboraverat longo ante tempore, ut fere triennio, pleuritide. *Hallerius libello propr. observ. 16.*

OBSERVATIO XC.

Phthisis ab ulcere Pulmonum citra sanguinis sputum.

Vxor Leonardi Pissensis Medici duos fere annos Phthisica vixit, Ea dissecta inventum in suprema parte Pulmonis, quæ primis costis subjicitur, ulcus in quo vix castanea includi posuisset: hæc nunquam sanguinem expuit, quod extra vasa Pulmonis ulcus consistetet. *de anni. Argentarius comm. 3. in Ariem parv. Gal.*

S C H O L I A.

Hinc collige non omnes qui Tabes pereunt semper sanguinem exspuere, Et eos qui id faciunt, non semper cum tussi enim resistere, sed solum cum ulcus in profundioribus pulmonis partibus est, ubi majora sunt vasa quae sanguinem continent: Deinde nota, Quod scribit *Galenus* per tussim rejici quae in pulmone continentur, egerit consideratione, Alit enim multis in locis, per os quaedam ejicit cum sola expulsiōe, & haec oris aequae palati affectus ostendit: Alia vero per excretionem, sive, ut vulgus vocat, Rascationem, & haec facium morbos praefacit: Alia vero cum levi tussi, quae sunt indicia haec alperae anetiae, quae in cervice constituitur: Alia vero per tussim veram expui, & haec signa esse Pulmonis lēsi: atque hoc indicio ulcera pulmonis à perdictis partibus ulceratis, aut sanguinem effundentibus, per sanguinis spumosi ipsorum distingui praedicat: Verum id ma-

gnifico malo didici aliter aliquando fieri: Nam uxor mea, aetatis 20. nata, cum Piliis una cum illa degerem, spirante Austro, qui in eo loco frequentissimus & vehementissimus est, ex destillatione à capite, mane, cum adhuc in lecto esset, sanguinem exspuere coepit, & ex eo non leviter terretur: Sed cum ego *Galenus* doctrina instructus illam hortaret ut nihil vereretur, propterea quod sine tussi, cum levi solum rascatione sanguinem facillime emitteret, melius sperare coepit, nec postea unquam sanguinem expuit, sed pituitosum humorem primum, deinde pus, & haec cum tussi & febre, quae statim ab initio invaluit: atque cum his malis, quae orta sunt in autumno, circa finem Maji exspiravit, nec passus sum illum dissecari: Perierunt in eadem civitate duae aliae juvenes foeminae, eodem malo affectae, Sed uxor *Leonardi Putschii* Viri. Vide hystoriam superius.

OBSERVATIO XCI.

Phibitis à syderatis Pulmonibus citra sanguinis aut puris spatum.

Ingenua virgo annum agens supra 14. brevi morbo, (ut multis videbatur) sublata est: ante biennium tamen altum ducebat spiritum, solitudinem afflictabat, & facies totusque habitus pallore albescebat: Ante duos menses dum sejusdem fratrem, lento quoque morbo confectum inviseremus, à matre fuimus rogati ut istius pulsum exploraremus num febricitaret: quem languidum & inaequalem, sed sine calore febrili observavimus: Ideoque ubi vultum pallescentem paululum sumus contemplari, & de ætate sciscitanti, venit in mentem mentrua forsitan instare, quae dum ob viarum angustias, naturae *ἐνδωμης* impedita referre laboraret, sanguis ab iis insciebatur, & levia illa symptomata suscitabat, uti solet contingere non raro in virginibus hujus ætatis: quare his obiter dictis, discessimus, rem altius indagaturi si malum protraheretur, aut symptomata ingravescerent: Sed his utrinque vel neglectis, vel oblivioni datis, post duos menses serio vocati, morbum multo graviorem repetimus, ut quem apostitiae & febris continua comitarentur, & sub noctem intenseretur, sine calore mordaci & sensibili *ιμμεγροσ*: vires praeterea dejiciebantur, narium pinnae inter expitandum expandebantur, nec tamen insignis dyspnoea aderat: nulla sitis, non rubor in genis, non vigiliae: decumbens non nihil tussiebat sine spatu: cor vero crebro & valido motu, continuo sub noctem recrudescente, tangenti palpitabat, ægra non sentiente, urinæ crassæ, albæ, adiposæ, cum enazemare vel hypostasi ejusdem conditionis, divulsæ: nunquam deliravit, nullam noctem duxit insomnem, nequidem ultimam, in qua placide & sine agone expitavit:

Ergo propter istius morbi inopinatum eventum, & quod etiam 13. alii ejusdem generis, ante vel circa pubertatem defuncti essent, consilium fuit cadaver aperire: quo nudato, latius utrumque, ab alis ad costarum notharum ultimam, maculis latis & rubro liventibus, & sugillationem referentibus, erat conspersum: Viscera in abdomine contenta sana visa sunt, solo jecore non nihil plus solito nigricante, & ventriculo perexiguo, bile porracea intincto: Ubi in Thoracem deventum est, ab utraque ejus cavitate incisâ confertim aquæ virosæ magna effluxit copia, ad ℥ivj.: mirum quod orthopnoeam, vel saltem dyspnoeam viventi non invexerit, aut fluctuationem non prodiderit: Pulmones syderati inventi sunt: praeterea in eorum ambitu puncta passim albescentia cernebantur, quæ levissimo tactu disrupta, pus & tabum eructabant: Imo lates vasa omnia & cavitates puniceo colore affecerat: Pleura musculis intercostales virore erant perfusi, non diaphragma: Sed Pericardium lege vicinitatis erat exsuccum, putrefactum & suo humore privatum, cor & cerebrum sana. *Hervicui Ruffini observ. 3. ad L. Riverium.*

S C H O L I A.

EX his decretum fuit hanc labem à primo ortu duxisse originem, sive à femine sive à sanguine: Exempli firmitatem rem maxime comprobant: Isti ab externis causis affectus iste in virgine derivasset, potius dugetur Pulmonum, non universi fuissent labefacti: nam non peccaverat illa in victu, aut aliis

rebus non naturæ libris: deinde mors placida corruptionem in subitanea & temperamento sensim & per progressus factam fuisse, non à causâ violenta: atque etiam cum nunquam tussisset, ex eo patet neque fluxionem, neque congeriem humorum vitiales pulmones: Secundo tales affectus, ut à parentibus nemo deduci

deduci debent, ita & facile posse communicari est concedendum: & vulgo compertimus in familiis labie ejusmodi infectis, plures simul vel succedere pari

animo corripi, imo & aliquando ad quorundam sextamve generationem protrahi, & in extraneos, qui librum consuetudine fruuntur, proterpere.

OBSERVATIO XCII.

Tabes inducitur à Tumoribus duris Diaphragmatis radici infixis.

Tumores duros diaphragmatis radici infixos nonnumquam deprehendi, qui sensim Tabes laborantes consumpserunt citra ullam delirii speciem. *Fernelius Pathologia lib. 5. c. 11.*

S C H O L I A.

Citra ullam delirii speciem] Lib. 1. Titulu de Delirio, ostendimus Diaphragmatis inflammationem citra delirium contigisse; ut minus mirum sit ad Tumores frigidos non subsequi.

OBSERVATIO XCIII.

§. 1. Tabes à pure supra Diaphragma congesto.

Vulneratus quidam male tractatus, duobus vulneribus externe occlusis, sanie collecta in ventre & paulo supra Diaphragma, Tabes tandem consumptus obiit. *Vide l. 4. ris. de vulneribus.*

§. 2. Juvenis inter 6. & 7. costas vulneratus, sequitur febris, gravitas in parte, tandem Tabes: Ingens inventa inter thoracem & pulmones puris copia. *Ibidem.*

OBSERVATIO XCIV.

E Phthificis si sunt restituti, quibus vel callus in Pulmonibus contractus, vel agglutinatus est cum pleura pars exulcerata.

Quibus Pulmo exulcerationem passus est, postea vel medicamentorum ope, & praesertim longo laetis usu, callum contrahit, ut non raro fieri solet, & à Galeno confirmatum fuit: Vel quod verisimilius, pars pulmonis exulcerata ita coalescit cum membrana pleura, ut agglutinentur Pulmones ipsissimè costis; prout alias observatum ab authoribus, ipse oculata fide in aliis restari possum, cadaveribus dissectis: hoc enim in casu sanies non apparet, cessat febris, instauratur caro, vires convalescunt, durat tamen tussis, adest aliqua spirandi difficultas, eaque major quando usus augetur, vel ab exercitio vehementi aut valida inspiratione: Imo tunc interceptitur etiam motus tussis excitatus, velut si singultus superveniret. *Ben. Sylvaticus consil. 41. cent. 2.*

S C H O L I A.

Exulcerationem] Item, ut audio, in Anglia familiaris est paracentesis thoracis ad phthisis curationem: Infunduntur decocta vi detergente, mundificante, agglutinante, traumatica praedita; sic plurimi sanies restituntur, quod medicamenti facultas integra illuc & sine ambagibus pervenit: Utus est si ulcus superficiem pulmonum afficit, non item si intimum, & circa bronchia aut vasa interna.

Callum contractum] Sepe infidum, ob verendam ca-

tastophen, quia tum in thorace, (monente *Jesuitae* comes. 2. in coac. praedita, ad aphor. 5. sect. 2. lib. 6.) tam frequentius in pulmone atelectens sanies, & calore in crustam versa, circumscripta falso conditae imaginem nobis imponit, donec ab thoracis motum, & par-tis molliem, levissima occasione excussa crusta, ulcus recrudescere animadvertimus, majore quam ante periculo.

OBSERVATIO XCV.

Phthifici cito succumbunt, si Pulmones pleura adnascuntur.

Exremos egere dies omnes pene Phthifici quibus lobi alicujus advenit adnascenscia: Quibus vero pulmonis universum fere pleura accreverint, ut in plerisque, citius occubuerit: Quod ex morbi collata perennitate, & ex dissectis hujus generis strage possundis dilucidatur. *Bennetius Theatri Tabid. Exerc. 16.*

S C H O L I A.

Discordes sunt *Silvaticus* & *Bennetius*, quanquam uterque ad *ambagibus* provocet: Ad conciliationem dic, & Phthifici, quibus adnascenscia pulmonum cum pleura contigit, eos evasisse quibus ulcus superficialium fuit, extrinsecum solum pulmonum partem

afficiens: Quorum intimam substantiam corruptela aut virum simul invasi, ens peremptos fuisse: Quibus Pulmones universum fere pleura accreverunt, eos citius occubuisse, ob magnitudinem ulceris, universum pulmonum ambicum depauperantem.

OBSERVATIO XCVI.

Puris sputum Phthiseos pathognomonicum non semper est signum, Nec ulcus pulmonum semper sequitur.

Puris sputum Phthiseos non semper pathognomonicum est: Nota mihi est Matrōna quæ singulis Mensibus semel puris sputo laborat, adeo ut æpissime ad libras tres puris foetidissimi rejiciat; bene inierim se habet, & formosa est, neque etiam tussis vexatur, nisi quando peridodicum hoc imminet puris sputum, menses tamen parce fluunt: Judicent nunc Eruditi an semper puris sputum signum phthiseos pathognomonicum existat: Ego sane in ea tum sententia ulcus pulmonis tabem non esse, nisi longo temporis tractu degeneraverit vel in vomitum vel in empyema: Inspectio variorum hoc morbo mortuorum & dissectorum cadaverum aliud me docuit: Vide Hippocratem lib. de Nat. hum. de iis qui purulenta expuunt sine febre, Quam excretionem familiarem ait esse iis qui multum sanguinem congeriunt, & stato tempore non excludunt. *Alhardus Hermannus Cummius in miscell. cur. anni 1670. observ. 94.*

S C H O L I A.

E Go in ea sua sententia etc.] Hæc desumpsit ex P. Barbette Praxis lib. 2. c. 2. Saepè autem Phthisis alios Pulmonis affectus consequitur, impuimè empyema, vomitum, pleuritim, peripneumoniam, quatenus pulmonis unitatem solvant, vel totum labe-

stant, ac simul sanguinis remperiem vitiant:

Puris sputum non semper Phthiseos pathognomonicum] De Sputo purulento sine Phthisi, vide eadem. 2. consult. & Responsion. medicinalium R. I. Erit consult. 37. & 38.

OBSERVATIO XCVII.

Insigne Pulmonis ulcus citra dolorem & tussim.

ANno 1533. quendam secui, & in substantia Pulmonis, in parte sinistra, ulcus magnum concavum & putridum, ad quantitatem multo majorem quam sit dimidia pars coracis unius ovi gallinacæ cum sua profunditate, in qua cavitare fuit sanies multa & prava, deprehenso, cum tamen iste, quem bene novi, nunquam conquestus sit de aliquo dolore, neque tussiverit: *Nic. Massa in Introduct. Anat. fol. 57.*

S C H O L I A.

F Erastus Parhol. lib. 5. cap. 10. Vomitum in pulmone generari ait aliquando sine Tabæ, quum sanguis ex aperta, rupta aut exesa vena, in parvam quandam Pulmonis regionem secedens, illic putrescit, sensimque mutatur in pus, ac per summa lacerans sibi cystin efformat: Fieri ergo potest ut ejusmodi vomica citra incommodum aliquando gesserit, Tussim non inferens, quia ob cystin nihil exhalat: neque Dyspnoeam, quod procul ablin à tracheæ ramis insignibus; neque Pulsus mutationem, quia arterias leves non comprimit; Tandem vero dirumpatur & in ulcus abeat, quod in exemplo allato suspicari licet: Contra, observantur ipse, in Pulmonibus foveam unicam, aut forte binas efformari aliquando contingit, easque circumcirca patentes callosos obrinere, ita ut materies ibi collecta in massam sanguineam miol-

me transferatur, sed quotidie tota, copia licet ingenti expectoretur: Hi satis sane bene degunt, bene respirant, comedunt & dormiunt, *Compa.* aut saltem in modico corporis habito perstant, & non raro perseverant: Hinc nonnulli dicuntur Phthisim per 30. aut 40. annos habuisse, Vivit apud annos Senatoris usque quinquaginta quinque annos prætergressa, pleuriam liberorum mater, è quibus unus ante biennium phthisico obiit: Illa habitu phthisico ab annis plusquam viginis mere potulenta capui, selesion referens: Et quamquam à cæteris in pulmones crebro decumbentibus, præter frequenter ex Lienæ aggrinationes, sat to saepe facit proxima, nostræque cura libera, periculo tamen semper di singitur, ut in illam quædam queat: quod eam multatorem de qua Hippocrates. *Quinquaginta mortua est.*

OBSERVATIO XCVIII.

Pulmones citra insignem doloris sensum dimidia parte fere consumpti.

Vlcera Pulmonum ab erodentibus humoribus induta, sine dolore existunt, licet externa tunica etiam erodatur, quod publice in theatro anatomico ostendimus annis 1660. & 1663. in duobus corporibus, quibus adeo ulcerosi erant pulmones ut vix dimidium visceris superesset, qui tamen homines de nullo insigni pulmonis dolore unquam conquesti fuerunt, Illud ipsum quoque in plurimis aliis à nobis demonstratum, & in phthisicis quotidie conspicuum est, in quibus non solum interiorem substantiam, sed frequenter etiam exteriorem pulmonis membranam, sine eximio dolore exulcerari per autopsiam & experientiam novimus, Adhuc vulnera pulmonem transeuntia æsthi membrana sit persossa, sunt tamen sine eximio pectoris dolore, & quicumque in iis adest dolor, illum duntaxat in pleura & musculis perferentem ægit. *Diermerbroeck Anat. lib. 2.*

OBSERV.

OBSERVATIO XCIX.

Tabes à complicatis Pulmonum & Intestini ventris affectibus.

§. 1. **C**Adaver D.N. febre lenta mortui & extreme exsucci sectum, In quo Omentum corruptum, Ren dexter gangræna correptus, Sinister lividus, Hepar durum, tuberosum. Intestina decolorata, Mesenterium consumptum, Pancreas scirrhosum, Pulmones purulenti, Cor aridum, &c. *Vide lib. 4. de Febris.*

§. 2. Puella varia affectionis hysterice symptomata passa, Marcida interit: Hepatis convexum, Intestina crassa, livida, & gangrænosæ erant: Vasa omnia spermarica, Testes, semine turgabant, Uteri orificium lividum, Pulmo sinister vitiatum costis adhærebat. *lib. 3. tit. de Hysterici affectibus.*

§. 3. Fœmina de Tumore ventris querebatur, cui summa accessit corporis tabitudo: Jecur lapidosum inventum, Pulmones dimidia ex parte corrupti, Inter peritonæum & intestina binæ vesicæ. *Vide lib. 3. tit. de ventris Tumore.*

§. 4. Paupercula diu doloribus in abdomine, quod etiam inunxit, vexata emaciata interit. Peritonæum lacerum & erosum erat ab ichore bilioso. Duæ repetitæ moles globosæ mesenterio adhærentes, pustulosæ vesicis luxuriantes. Hepar flaccidum lividum, Pulmones sicci cum lituris gangrænosos. *Vide Tit. de ventris Tumore.*

§. 5. Domina N. per aliquot annos senili contabuit cum dolore ad hypogastrium, &c. Pulmo aliqua parte erat inflammatus, Hepar viriatum, Uterus corruptus & quasi gangræna affectus. *Vide tit. de Febris.*

OBSERVATIO C.

Anatome Pueri Marasmo extincti, cui Hepar justo majus, Abscessus prope venam cavam, Pulmones nulli.

QUatuor annorum puer Marasmo extinctus obiit: Animi causâ à me secatur cadaver; cujus hepar dum inspicerem, erat supra modum magnum: Habebat Abscessum prope venam cavam, circa partem gibbosam pure circumquaque obductam. Lienem boni coloris & integrum. Omentum nullum, aut vix conspicuum, Pulmones, mirum dictu, nullos; quorum loco erat vesicula membranosa statu repleta, venulis exiguis nunita, originem fumens ab ipsa arteria aspera, quæ refrigerium afferre videbatur cordi. *Fontanus lib. 1. Respons. & curat. Medicin. lib. 1. p. 55.*

S C H O L I A.

HÆc ad Clar. Plenum scriptum *Fontano* 16. Decembri 1698. Ille vero in responsoria sua iudicat vesiculam illam membranosa Pulmonis loco fuisse, quæ quia ab aspera arteria originem fovebat, aërem externum recipere poterit ad cordis refrigerium: quia tamen non satis copiosum aërem cordi subministravit, neque satis libere cor à suis fuliginibus expurgeri possit, hinc in marasmo incidit ille juvenem suspicatur *Nempe*, intentio scilicet, nimium cordis calore, atque per prope corpus exsiccat: Ego grande observationibus *Malpighii* hinc mirabor subsidium: Vesiculam à primo ortu naturæ finxit, sicut eadem in omnibus est prima Pulmonum substantia, & ab aspera arteria propagavit, ut continuato ductu & tramite receptus aer huc traiceretur; ex observatione *Hartii*, ad quartum mensem membranacea Pulmo in foru permaeret, sine sanguinis assuptione. Non igitur hoc usque erravit Natura, sed quia propter vasorum pulmonariorum exilitatem circulationis cursus fuit interruptus, quem per pulmones ad cordis conservationem esse necessarium est probatum, hinc marasmo data est occasio, ad cuius etiam infortunium plerique inferioris ventris viscera corrupta consueverunt. Similis est huic historia à *Zacuto* ex *Nempe* adducta lib. 1. Prax. adm. Observat. 100. quanquam male sub illorum titulo referatur

qui Pulmonibus destituntur, ræspice enim hic & ibi Pulmo adsuit, sed Pulmonaria vasa imperfecta fuere, quibus vesiculæ nudæ debebant nutrimentum largius secedere: Puellæ illi trium annorum, diuturna quartana laboranti, Pulmones visi sunt *Nempe* adeo contabuisse, ut nullum illorum appareret vestigium, sed tantum membrana plene purulenta materia: Quo vero euryore scire posuit contabuisse Pulmones? Mihi sit verosimillius, præter membranaceam vesicam, nullos unquam in infante adfuisse Pulmones. Suspicionem auget quod nunquam vel de tussi fuit conquesta, vel pus expuit: Purulenta materia à sanguine provenit, & vasis Pulmonariis male affectis, quæ per cor expurgari solebat, deinde corde cum vira cessante in membrana pulmonica fuit collecta. Nullus dubito quanta tales Pulmones in subiecto illo fuerint de quo *Fabr. Henselius* lib. 4. de diss. respir. cui desisse credebantur Pulmones, ut utrinque quid porius substantiæ pulmonicæ analogum videretur, hoc proculdubio membranacea vesica erat pro pulmone, idque per naturam, nam quæ stagnabat materia in thorace pos non erat, quasi ex emphysemate, sed aqua veluti lactea, siue ex ductu thoracico Pecquetiano per Cor adveniens, siue ex genere lymphæ nostræ, cuius vasa serosa, hinc inde per pulmonum superficiem prosperantia, observavit

Eccè depinxit:

depinxit *Olav Rudbek* Tab. 1. fig. 1. Itaque pro insolitis hactenus admirati fuimus, per ordinarium Naturæ consilium explicare possumus ex novis suppositionibus, quæ cum beneficio magnam faciem accendit aliis phænomenis licet, quæ Medicorum ingenia vexantur? Aperius jam liquet quæ fuerint vesiculæ illæ per totum tejedæ, de quibus *Frey* lib. 14. Observ. 16. in Schol. Imò vesicæ aqua replete, veluti piscium, de quibus *Athenæus* lib. 2. ex *Orthes*, & vesicellæ colore, magnitudine & forma typrini piscis similes per scærum à tabula muliere Gaulliana rejectæ apud eundem *Athenæum*: Facilius jam ex vesiculis detectis, quæ loco Pulmonum spira rotunda seu globosa, de quibus Hippocr. 6. Epid. & in Coac. 61. & conglobari possint assequimur. *Galenus* in comen. 6. Epid. causas recensens, loci caliditatem pro elictrice, humorum crassitudinem atque tenuitatem pro materiali, & fibræ Pulmonum pro loci confectionis agnoscit: Propterea scopum ferit *Jasur* comen. in lib. 5. sect. 2. Coac. 61. formam rotundam contrahi, quod cum glutino-

sis humores in aspera arteria colligitur, atque ibidem multas horas moratur, eandem cum illa formam sequitur, siquidem ipsæ quoque globosæ est & in orbem circumducta: Ex vesiculis vero suscitata rotundæ facilius globosæ hæc explicabimus, in quibus per crassum, quasi in fusaria officina, & instrumento ad globulos ulitro, in globosam rotunditatem efformatur. Et quia vesiculæ, à primâ conformatione rotundæ, eo modo variâ signatâ acceperunt quo favi apum & lux, angulosum prout quandoque excruciat, ita ratione in sibilis pulmonum globosum reddunt, quæ *Aristot.* in mechanica, omne quod sensim circum circa consumitur, rotandum effici perdidit. In istis cavernis condescere apte possunt *Granula* & *Calculi*: mora enim ad horam concretionem requiritur, quam vasa negant, quam bronchia non concedunt, quam denique solæ membranæ naccæ vesicæ largiuntur. *Aristot.*

in *Tract. de Pulmonibus*

lib. 2. pag. 52.

OBSERVATIO . C L

Tabes à Cordis vicio, quod exsiccum, Pulmonum multiplici lésione, Hepatis duritie, Pancreatis scirrbo, Mesenterii glandulis tumidis, &c.

Vxor Jac. Bagolle paulatim morbo admodum intricato correpta fuit. Nunc enim palpitatione cordis; nunc dolore & torminibus ventris; interium tamen appetitus non multum prostratus fuit, ita ut pro more alimenta sumeret, quibus tamen parum nutrebat: Tussicula quin etiam & dyspnœa laborabat. Cum circiter annos 14 vitam hanc calamitosam vixisset, ac scelerati fere instar extenuata esset, paulatim stupore & frigore, in sinistra manu, præcipue circa extremitates digitorum, correpta est; symptomata tamen hæc ab initio tam exigua erant, vix ut percipi possent, nec aderat tamen minus inflammatio, imò nec dolor ullus: Interea tamen extenuitatem digitorum, & tota manus paulatim, & (quod mirandum) absque dolore sphacelata & penitus emortua est. Ego tribus septimanis post inceptam sphacelationem digitorum vocatus, brachium ad cubitum usque, simul & digitos, carbonem instar nigros, frigidissimos, & ita extenuatos, ut ossa vix tenuissima cutē obtegerentur offendi; nullâ tamen, ut dixi aderat inflammatio neque dolor, imò nequidem in loco illo in quo calor natus nondum penitus extinctus fuerat. Porro etsi per exigua recuperandæ sanitatis spes superesset, rogatus tamen, ut brachium amputarem, quia malum adeo lento tardoque gressu incedebat vix ut percipi posset, visum ante operationem corpus præparare: Postea brachium supra cubitum, & quidem in parte sana, feliciter & fere sine dolore ac sanguinis profusio abscedi, vulnus brevi digestum quidem fuit, adeo ut laudabile pus appareret, nullominus circa xi. post brachii abscissionem, gangræna denuo truncum invasis, ita ut paucos post dies & vita discederet.

In cadavere hæc notari digna observavi. 1. Abdomen serofi humoris plenum & extensum erat. 2. Mesenterium hæcæomatosis multis fovebat. 3. Sub Venâ Portæ, & quidem in ipso Pancreate, scirrhus admodum magnus conspiciebatur. Hæc principium & præcipuam causam hujus morbi tam diuturni, tamque gravis fuisse rationi consentaneum est: quia enim venæ Portæ subjacebat, facile impedire potuit quominus chylus ad hepar perveniret, totumque corpus nutrebat, hinc viribus paulatim prostratis, & calore nativo diminuto, sanguinem optimam & laudabilem generare non potuit. Quare in juventute, & ante nuptias, debilis, pallida & palpitationibus cordis obnoxia valde fuerat: in matrimonio tamen melius se habuerat & proles aliquot habuerat: Circa annum vero 1600. symptomata omnia ingravescebant, ita ut continuo de dolore ventris, & quidem ea in parte, in qua scirrhus invasimus, conquereretur. Supervenerunt item dolores ventriculi & capitis, cum totius corporis imbecillitate, tussis continua, palpitatione cordis & appetitus

appetitus imminutione: Itaque corpus ita sensim extenuatum fuit ut ossa vix cute obtegerentur: Attamen interim dum ita laboraret puellum genuit, qui hoc anno 1608. bene se habet.

4. Hepat durum, pallidum, ac si elixatum fuisset, apparebat. 5. Pulmo dextra parte materia purulenta ac foetida; sinistra vero humore seroso imbutus erat. 6. Per totam Pulmonis substantiam scirchi plurimi, colore lividi, in quibus materia nigra atramenti instar, contenta fuerat, conspicebantur. 7. Lapides plurimi hinc inde per pulmonem, diversâ coloris, parvitamen omnes, reperiebantur. 8. Cor sanguine plane exhaustum, extenuatum, ideoque valde diminutum & parvum erat. 9. Arteria venosa in monstrosam amplitudinem extensa erat, humore seroso impleta; à quo quia simplici constat tunica, ita dilatata erat. *Fabritius Hildanus cent.ii. Observ. 89.*

OBSERVATIO CII.

In Phthisici quibusdam ex sanguinis sputo, Pulmones post inflammationem scirrhosam duritiem contrahunt.

Muller quædam ex copioso sanguinis sputo à Pulmone regurgitante, diutiusque affluente, tandem in phthasin lapsa est, tabescens & pus graviter olens copiosum expuens, cum ponderis cuiusdam sensu in parte dextra, difficilique super sinistram decubitu: id quod in dextra thoracis vomica pus acervari significabat, pulmonisque dextram partem affectam, ut cujus non fracta modo vena fuerit, sed inflammationis deinceps concitatae suppuratio facta sit, ac tandem quædam in scirthum conversio, *Vide talem Pulmonem, ob infarctum pus, duritiem, in Xenodochiis per anatomen observavimus. Ingratius in consilio pro Fistula Pectoris.*

OBSERVATIO CIII.

Phthisis universalis, à purulentibus omnibus visceribus naturalibus & vitalibus, salvis solum renibus liene & ventriculo.

Cum Christina Pickia, triginta novem annos nata, Gregorii Jetken Pistoris Thoruensis coniux, per tres fere hebdomadas male habuisset, & de Tumore abdominis cum continuo dolore conquesta esset, se gravidam esse à quibusdam mulierculis persuaderi passa est, Inque isto errore hucusque permansit, donec malo in dies increscente, Georgium Grunach Chirurgum ad se vocavit, qui ei oleum anodynum cum chamæmelino mixtum portexit, utque eo abdomen cum dolore tumidum quotidie inungeret, iussit, hoc facto, in somno, ab inundatione nocte, sc. 21. Junii anno 1674. materiz purulentæ fere dux libræ per umbilicum effluerunt, natura sibi in ipso umbilici centro parvulum foramen efforgante, & abdomen à congesta ista materia vitiosa liberante, non sine magno fectore viriûmque insigni prostratione: Ego eadem die, hora pomeridiana ad eam vocatus, offendi cibilem, in abdomine autem, circa regionem hepatis, duritiem aliquam cum dolore animadverti, urina nonnihil erat tincta, pulsus parvus & debilis, pectus purulenta sanie plenum, quam tussis crebra prodidit, quæ omnia atrophis artuum, præsertim superiorum, comitabatur. Appetitus cibi integer adhuc erat, Sitisque nulla eam infestabat, singulis etiam noctibus placide dormiebat. Sed à 14. Junii durities ventris disparebat: Chirurgus interim canaliculum plumbeum subtilissimum semper indidit, perquem dies noctesque coctum pus copiose effluere solebat, superimpositis emplastris idoneis: Ego ipsi primum corroborantia præscripsi, Deinde ob materiz Purulentæ in pectore contentæ copiam, expectorantia. Die 26. Junii puris quantitas valde imminuebatur, abdomine quoque naturalem formam acquirente, sed post deligationem vultusculi à Chirurgo mane hora 7. peractam, horrorem quandam percipiebat, tum etiam circa noctem subsequenter semper calorem p. n. aliquot horarum: A meridie puris quantitas major erat, abdomine ubique molli, pus autem per vasa umbilicalia foras erumpebat, in quæ etiam Chirurgus instrumentum ad mediâ digiti longitudinem immittere potuit, ad latera vero, in carnem musculosam nullatenus. Unde facile cognoscere potuimus pus illud per venam umbilicalem, tumore mox concidente, ex hepate originem habuisset. Hinc venæ umbilicalis sectionem Anatomici periculosa esse demonstrant, cæu videtur est apud Riolanum Fil. Enchir. Anatom. lib. 3. cap. 15. in cons. med. Ideo etiam Epomphalia medicamenta admodum umbilico purgare manifestum est: Scitum etiam ex Hippocri. Abscessum ventris umbilicum esse terminum. Sed & aquam hydropicorum interdum per

umbilicum erumpere, ejusque affectus esse graves hinc patet. Sic nos in presenti casu coctum pus per abscessum umbilicalem usque ad mortem fluere observavimus, natura scilicet illud undiqueque ex visceribus putridis foras expellente. Postmodum ulcus in manilla sinistra unum, alterum in sinistra natum exoriebatur, donec tandem totum corpus atrophiam consumptum sceleton representabat, & tum misera illa die 29. Julii, hora media octava matutina placide obiit.

A meridie hora media prima, cadavere à Georgio Grunach, Chirurgus, aperto, inventum pus & sanies foetidissimi odoris, in vasis umbilicalibus, quæ ex hepate ulceroso scaturiebant & per umbilicum stillabant. Hepar duritie & ulceribus tumidum, quinque libras civiles cum semisse ponderabat. Peritonæum, Mesenterium, Omentum, Pancreas, omnia plena puris, & vix non consumpta: Intestina etiam aliqua ex parte corrupta. Lien, Renes & Ventriculus bene constituti erant: Uterus purulenta materis plenus & ulcerosus: Caro musculosa circa regionem Hepatis eidem adhaerebat: Diaphragma, Mediastinum, putrida. Pulmones à pure consumpti, maxime in sinistra parte, ubi nihil de parenchymate pulmonis conspiciebatur, imo pleura sinistra tota consumpta erat. Dextri autem lateris superior pulmonis lobus nonnihil adhuc de substantia pulmonis habebat, flaccida tamen & ulcerosa: Bronchia pulmonum, quæ adhuc salva erant, usque ad principium asperæ arteriæ versus palatum, pure sequebant. Cor saluum sed flaccidum, ejusque capsula humore vacua: totum corpus plane consumptum. Hinc (exceptis liene, renibus & ventriculo) præsentem affectum Phthisicos universalis nomine appellandum censemus. *Simon Schultze in miscell. cur. anner. 1674. 75 & 76 p. 85.*

OBSERVATIO CIV.

Phthisici ventriculorum cordis ostia à carne concrecentia pene obturata fuisse reperta.

IN quodam Oxonii Tabac extrincto, & paulo ante obitum leipothymia frequenter obnoxio, observavi dextri ventriculi ostium usque adeo à carne concrecentia obturatum, eamque ram arctè inter fibras tricuspidales impactam fuisse, ut penitus anseritus aditus in ventriculorum pro influxu sanguinis vix restaret. Quin & sinister ventriculus pari fere modo obturatus fuit, ut ægre ostium cordis recludi digitis potuerit. *Richardus Lower Tract. de corde cap. 2. p. m. 136.*

SCHOLIA.

SI Cordis systole, qua liquor sanguinis conquassatur, nique, & ad ventriculi lacina & vasorum parietes alliditur, paululum diutius elanguescat, succus ejus nutritius in partes secedere, grumescere, & gelatine in modum incrassari, tandemque intra fibras cordis hinc inde penderet implicari, & ipsi ventriculorum parietibus accrescere, & à cordis actu indurati locupit, eique quantitatibus mole sapenumero augeri, ut utramque cordis cavitatem fere impleat, motumque ejus multum diminuat. Atque hoc in Tabidis, cachecticis, scorbuticis, tñlenos & similia tena est) ventriculorum cordis; & vala omnia sanguiferia chylo coagulato infarta & fere repleta esse; prope in pluribus hujusmodi defunctis, & longa ægritudine acutis, præsentem si sub isto languore in lecto decubuerint, sæpe observari; Adeo ut mirandum foret Cor nullo modo contrahi, aut reliquum sanguinem adhuc fluidi, ad vitam & calorem in partibus conservandam, in vasis istis præsentari potuisset: Quin & hujusmodi concretiones usque adeo in carnem mu-

tatas vidi, ut phanims venas & fibras in illis advertebam, quas cum in fibrilla diss. casem, sanguinem non aliter quam si pars aliqua corporis incidere ut, recentem efflueret: cujus coagula innis hæc ratio esse videretur, quod cum cordis motus diss. elangueret, & simul æger lecto alius sit, ex plama & æquali isto corpori situ, sanguis lento fluxu delatus, ob motus illam tardietatem & moram (præsertim cum succus nutritius in sanguine admodum glucosus sit) lenim concretis, & pro cordis & vasorum continentium figura, varie configuratur, unde pro cordis Polypo, verime & serpente interdum habitus est. Hinc constat quanta cum multitudine exercitia & agitationes corporis ad salutem conferant, nam quo sæpius in corde languis conquassatur, ad vasorum parietes alliditur, in habitu corporis à coactione musculorum agitur & concutitur, & denique per poros corporis utitur, eo magis aërenum, & à signariis nobis illis liberari necesse est, in quas aliter pars sanguinis nutritia la-
tis prona est. *Idem.*

OBSERVATIO CV.

§. 1. Tabes ab ulcere Pulmonis non semper inducitur.

VLCUS Pulmonis Tabem esse non admitto, nisi longo temporis tractu degeneraverit vel in vomitum, vel Empyema: Dissectione enim semper contrarium reperi in eadibus hoc malo extinctis. *P. Barbette Præceptis lib. 2. cap. 2.*

SCHOLIA.

S C H O L I A.

Phthisis est consumptio humoris nutritii. Pars affecta, interdum quidem Pulmo est, sed non eo quo vulgo putatur modo, ut ex causis patet: Primario pectusque pariterum Ventrículus, Pancreas, Glandula lactea, &c. Pulmo per contentum. Causa est 1^a. Ventrículus male chymum digerens. 2. Succus Pancreaticus male se miscens bili; Unde 3. chylus crassior male transcolatur per Glandulas mesenterii lacteas: Evidet inde 4. quod chylus crassior pars in glandulis lacteis hæreat, non transcoleatur, illas indaxet, sic ut nonnulli serosior illius pars per ductum thoracicum perveniat ad cor. Intestin. veticulæ tam orbiculares quam sinuose pulmonis, noviter à Malpighio invenit, ex legibus circulationis sanguinis, replentur lymphæ, quæ in illis crassior fit, aëthelationem causat atque talem, vapores ascendentes angustas invadentes. (Differentiæ Phthisis) Prædictos Tabem in tres species divido, 1. eaque præcipua, est illa quæ provenit ex glandulis mesenterii lacteis, lymphæ crassa, vel, ut alii loquuntur, pituita obfusa, quæ

sic in causa sunt ut minima affluunt ciborum pars perveniat ad cor, corporisque partes reliquæ, maxima vero illorum pars pereat per alvum: Secunda est, quæ prosper sanguinem, & in illo lympham serosioriem, tussim excitat continuam, dum per pulmones circulatur cum succo nutritio ad Cor: Tertia species illa est quam antiqui ulcer Pulmonum vocaverunt, provenit ex lymphæ crassa in veticulis pulmonum supradictis diutius hærente, & circulationem sanguinis impediende: ipsa primum albicans & levis fuit, postmodum crassiora fuit, tandem aliquando fuerit & sic possent; Hæc quoad Qualitatem, Quantitatem si peccaverit hæc lymphæ, vomitum pulmonum observabis, vel Empyema. *Indicationes Curative*, Lymphæ crassa incidenda & abundans leniter & per episcapho evacuanda: Hoc addo, me contra omnium forte scriptorum prædictorum sententiam, aciditatem perari felicissime usum: Ratio patet ex præscriptis, dulcia acidis non temperata cum multis albis observari, ægris semper, ad minimum plerumque obfuisse.

§. Phthisis definitur solet, quod fit Totius corporis intabescencia ab ulcere Pulmonis orta, verum minus recte, quia plerum ab hoc morbo defunctorum cadavera aperui, in quibus Pulmones ulcere quovis immunes, Tuberculis, aut Lapidibus, aut materia Sabulosa per totum confisi fuerunt: Nam exinde *Sanguis*, si quidem in præcordiis *ne libere circularetur*, nec ab aëre nitroso satis animari possit, cumque interea à propriis rectementis in pulmone depositis continue inquinaret, sæpe vitiosus & *afectus* factus labem arcescit. Quapropter Phthisis definitur melius quod si Totius corintabescencia à mala Pulmonis conformatione orta, *Willis Pharmac. Rat. part. 2. sect. 1. cap. 6.*

S C H O L I A.

Sanguis *figidus*, &c.) Ostendere oportet quot modis, & ob quas *phthisis* humoris serosior, live (ut vox populi sonat) catarrhalis, è massa sanguinea in in Pulmonum veticulas, alioque Ductus tracheales deponit solet: Circa quam indaginem unicuique obvium est concipere causam mobilissimam è binis partibus consistere, simulque in vitio esse, hinc sanguinis materiem noxiam ad thoracem mitemis dyctasiam, ac inde Pulmonis eam facile luscipientis inbecillitatem, live *anxia*. Quoad prius, observatione sua vulgaris constat massam sanguineam particulis incongruis, scil. vel copiosis degeneibus, vel alienis illuc aliunde diffusis referant, propter eas expurgandas effervescente, quodque lecerendum est, cum per alias vias haud facile amandatur, in pulmones infundere, sique (si forsan constitutionis debilitas fuerit) penitus alligere.

Phares & diversimodæ sunt sanguinis dyscrasie, & affectiones quibus liquor ejus in compage solutus, & quasi fusus, seu & succum nutritium non debite intra se continet, quin has aliisque humores rectementitios à se perpetuo amandant, uti interdum in alias partes, ita sæpius in pulmones deponit.

1. Sanguis inter dum lætissimè accenscentis, sensum depravat, tandemque ab indole genuina verius acerosam deliciens, & in compage solutus, serosiorat fuit, & facile nimis abscdere aptus) ex arteriis tum pneumonicis, tum trachealibus in ductus tracheales infundit. Ita quibusdam videntur esse scilicet aut bis in anno, sine ulla causa manifesta, tussis gravi ac molesta cum spumo copioso albi, quæ tractu quodam temporis (postquam sanguis faculentis & rectementis expurgatis crasiam suam recuperat) sponte cessant, & deinceps valens firmior & diuturna succedit: Per hujusmodi tussim sanguis *phthisis*, novi quidam se-

pius in die, & præsertim omni mane spumam instar atramentis nigricans, cum levi tracheæ nias excernere solitos: quo affectu cum per plures menses constanter laborarent, post tussim graviores occasionaliter contractam, cum spumo multo ac flavo, deinceps prioris illi atrato prorsus immunes evaserunt: Cujus ratio est, quod tussis immansur cum expulsiõe copiosa per aliquot dies persistens, faculentis istas atrabilas è sanguine prorsus expurgat, quinimo & sanguinis temperiem immutat seu potius dyscrasiam tollit.

2. Liquor Nervæus non raro degenerat factus, & cum lymphæ copiosa è fibris, & partibus nerveis in sanguinem redundans, uti viscerum & renum affectus periculosos, ita quandoque tussim immanem & valde molestat infert. Hujusmodi Tussis modo catarrhalis est, quatenus lymphæ ista massam sanguineam transgressa, per arterias in pulmones deponitur modo Spasmodica, quatenus nervos & fibras ad pectus movendum destinatas à latice isto occupantur, inque motus convulsivus irritantur: ab utraque causa, aut separatim aut conjunctim, evenit quod cerebri & nervosi generis pathemata graviora tussim molestat frequenter accendunt, vel in eam commutantur.

3. Præter sanguinis & liquoris nervei vitia, sæpe tussim exaltant, probabilis est interdum hoc malum emitti propter Lymphæ ductus qui ad pulmones spectant obstruotos, cum enim hujusmodi vala quæ plurima per pulmones oblique disseminantur, quorum munus est quicquid Lymphæ per arterias ad præcordia advehat, & pervenas haud statim reducibilis, superfluum est excipere, & ad Ductus thoracici truncum convehere: si forsan acciderit hos ductus, à materia vilicosa obturatos vel compressos, aut à frigore consipatos officio suo minus defungi, necesse erit rece-

Ecc 3. *menet*

menta illae aquosa, ab emiliaris solius exclusa; aut in sanguinem regurgitantes effervescantiam ejus clere, aut in Trachea ductus suffusa tussim excitare.

4. Nec tantum humores praediti, quatenus sanguinis crasin aut motum pervertunt, vel impediunt, tussim; (quae saepenumero Phthisicae praecursum est) verum insuper Evacuaciones quatuor solae aut solennes suppelle, aut praepediunt, noxam pulmonibus frequenter impediunt, fluxus mentitus aut haemorrhoidalis obstructus, haemorrhagia nasium affluens si forte cessat, fontanellae oclusae, pulsus, scabies & exanthemata repetitula, Thoracis labem non raro assequuntur. Si quando putatio copiosa glandulis oris sponte delituit, vel medicina curatur, postea nonnunquam tussis Tabifica succedit, quae vulgo dicitur idem Rheuma, quod modo ex capite in fauces & guttur deorsum, postea exinde alius in pulmones descendit; cū revera nihil aliud hoc fuerit, quam quod sanguinis ferofitas quaedam supposita, per arterias cephalicas in glandula oris deposita, postquam illuc excluseretur, per arterias pneumonicas in pulmones intraret.

A propriis secretis, &c. Praeter dictas evacuationes privatas & periodicas, vel extraordinarias, quarum suppressiones ad tussim & phthisin inclinant, occurrunt aliae generales & constans, videl. Transpiratio insensibilis, quae inhibita vel suppressa, plus ac saepius quam ceterae omnes illius mali occasio aut patens esse solet: Quippe effluvia, per poros cutis evaporare solita, intus cohibita sanguinem fermentant & clo praeverunt, inque ferofitates fundi & praecipitari faciunt: quae cum alius massae sanguinae secretis statim in pulmonibus deposita, tussim molestant, & non raro tabificam accendunt: hinc vulgaris observatio est frigoris, quo pori contrahuntur, susceptionem, sive per auras gelidae assilunt, sive à pluvia aut fluxu madefactionem, sive vestis depositionem aut alio quovis modo fiat, quamvis nimis ad affectus thoracicos disponere.

A mala Pulmonum conformatione. Illae sunt praecipuae causae & occasiones, quae ex parte Sanguiinis quoquo modo depravati, & propterea materiam noxiam in Pulmone deponunt, occurrunt. Sequantur aliae ex parte Pulmonis, quae nempe hoc viciis ad tussim aut phthisin promptas contrahendam disponunt, cohaesimodi imprimis sunt haec tres, videlicet 1. Mala pectoris conformatio. 2. Pulmorum innata debilitas, sive haereditaria ad Tabē dispositio. 3. Thoracis morbi praecedentes, aut sui valvula vel plaga, pleuritidis, peripneumonia, empyema, haemoptoe, vasculis & morbillis, cum quibusdam aliis; 4. his addatur Aurae quae inspirant incongruas: Quoad Pectoris conformationem, res ita habet, videlicet, ut Pulmones itaque lateri recti, & de labe quavis phthisica immunes in officio suo diu conserventur, oportebit eos motu usque regere agili, & quasi velis plene expansi, hystolae & diastolae reciprocações validas obire: in eum nempe finem ut aer ubertim inspiratus ad intimos quoque ipsorum recessus adveniat, & exinde statim una cum effluviis & fuliginibus omnibus, quae respiracionis vice, maxima ex parte regerantur: Quandoquidem vero lapsu modum Pulmonum actio à thoracis, tanquam machinae motiva conformatione plurimum dependet, necesse est propter malam hujus fabricam respiracionis minus in multis deficere: Sunt autem Pectoris male conformati duae praecipue species (nempe Gibbositas & Scapulae velut Alarum) propter quas plures in phthisin proclives repeniuntur, quarum ratio est, quod in

tali utraque pectoris vel depresso vel oblonga figura; neque Pulmones spatium ita liberum amplectuntur, obtinent, neque musculi motiva ita fortiter contrahi possunt ac in pectore quadrato.

2. Pulmonum innata debilitas, sive haereditaria ad tabem dispositio, adeo frequens & vulgo notabilis est, ut cum aliquis in phthisin proclivis reperitur, à quibusque statim interrogetur an non patens ejus tali morbo obnoxii fuerint? Huius plerumque pectore angusto, & collo oblongo praediti, & conformationis valde tenerae, à levissima quavis occasione tussim contrahunt. Auram nec gelidam, nec humidam ferunt: horum nonnullis habitatio in urbibus, ubi aer crassus & fumosus inspiratur, valde infesta est: E contra aliis in eadem affectionem proclivibus, plurimum amica, (cujus ratio alibi adductur) Illis omnibus venis Borealis fere semper inimicus, utpote qui tussim frequentem, item haemoptoen, pleuritidem, aut peripneumoniā excitare solet, scilicet, vasis Pneumonicis aut Thoracicis exinde coarctatis, quae interitum sanguinis, ob transpirationem impediunt, & effluvia intra massam ejus cohibita, turgido magis & actione facta.

Enivero à diathesi ad phthisin haereditatis in his duobus potissimum consistit, videl. 1. quod partes sanguine acriter & elastico praeditae, *gymnasia* uberoctem exigunt, quae si forte minus conceditur, materies evaporare solita in Pulmones imbecillies recludat: Dein 2. si quidem vasa pneumonica nimis laeva & tenera existunt, serum aliquo sanguinis recementum, intra massam ejus solutam haud rite continetur, vetum & illa, & nonnunquam ipsius cruciatis portiones quoddam in ductus nacheales erumpere sinunt: quorum fibrae motices cum insuper debiles fuerint, quod in civitate infirmum est non statim foras eliminant, quin ibidem commorati & putrescere, demumque in tabum, & pulmonis & sanguinis coarctum, degenerare possunt. *idem.*

Ab aere pulmoni. Quando tussiae puro diu continuata, & sensum aucta, humor copiosus & massa sanguinea in Pulmones deponitur, ille imprimis veficulas tracheales subit, & tandem implet & nonnulli descendit, & quibus cum quolibet mane, per expirationem tunc uberius habitans, fere totus effluat, exinde pro brevi tempore thorax gravamine immunis. de respiratio magis libera videtur, paulo tamen postea sanguis sero aut lacteo portiole replectitur, novam materiem pulmonibus sustundit, proindeque rursus & cibo, aut somno, veficulae repleuntur, atque humorum affluxu in dies adfecto magis distenduntur, amplianturque, tandemque lateribus duorum foras aut plurium disruptis, multae hic illic veficulae in unum quasi lacum efformantur, intra quem materies tabifica copiosius aggelia, ibi si quidem haud tota fluxione rejiciatur, putrescit, proindeque & pulmonis cui insidet substantiam consumit, & sanguis pertranscendit inquinamentum puridum infundit. Forea ita in pulmonibus facta, in dies augetur, & saepenumero plures simul ac diversae locis cadunt, atque ob magnam humoris in his aggelii & putrescentis copiam pectoris gravitas, velut onus sentitur, respiratio magis impeditur, insuper à Tabo uberius in massam sanguineam suffusa crebra hujus effervescencia, necel martellum dispendit, porro his ac aestus, inappetentia, sudores nocturni, & totius corporis inarbecencia oriuntur: Caterum cruci à pulmone inquinatus, hanc affectionem recipiote, vid. à proprio tabo magis plethi facit: quippe languis venosus unoquoque circuitu materiem istam putulentam accipiens, eam mox arteriofo tradit: Unde cum neque per dispirationem, aut diversum

tatis

lati amandati queat, tandem per arterias pneumonicas ad pulmones refertur, ubi rursus à sanguine secerat, ubique in tracheæ namque veficulis, tum ductus minores infundatur, ita demum ut tota Pulmonum compage impleta, & foræ five ulcera deinceps in placcibus locis efflorescant, & sinus reliqui omnes

ichore spumoso inferantur. Idem.

Ulcera quæ immunes) Supra plurima Tabis exemplis adducta sunt à tuberculis, grandine, calculis, aliisque extraneis oritur, circa ulcus: ab eorundem acidemæ, aliisque vitis,

OBSERVATIO CVI.

In Phthisici Cerebro, claudis auctoris credito, nihil vitii deprehensum est.

Nuper hominis Phthisico morbo defuncti corpus incidebatur. Ego auctor etiam ut caput quoque aperiretur, cum ad unum omnes qui huic sectioni intererant, persuasissimum haberent infundum illum ex diuturnis cerebri distillationibus contractum fuisse; Ego oculis statim ad *Infundibulum*, subinoro cerebro, transferebam. Sed hoc erat *mundum* aspectu, nec stilla quidem ibi plenior hærebat. *In ventriculo quidem plene aqua, quam naturaliter debet, inerat, nec guttula humoris exstillabat oppressione Glandulæ Piruitariæ. C.F. Schneiderus l. 2. de Cataractis cap. 15.*

S C H O L I A.

Infundibulum est mundum] Invenitur qui omnem cerebri pituitam in hanc viam confundi putant, ut *Vesicula, Fuchius, Falverius*. Hoc vero Infundibulum, inquit, latum est superius, tum meatum in ipsum desinentem gressu, tum dextra sinistrique venterculi caput, quæ insibi desinunt, excipiendoque gratia: In id etiam capax adeo huiusmodi infundibulum extructum est, ut si quid pituitæ humoris super calloso corpore, aut in sinibus in ipso lacibus colligeretur, id facile in Infundibulum, pie meningis beneficio illabi posset. Sive namque à posteriori, sive ab anteriori calloso corporis parte huiusmodi humor defluat, tempore in clausam meningem, quæ cerebri basin investit, hincque in colum prolabitur: quod (quo declivius sentit) eo angustius redditum, pituitam omnem excipit, eamque per exiguum quoddam in tenui meningis lacinulum foramen rejicit, in commemoretur glandulæ centrum procumbere sinit: Neque ullus eam ad nates meas deducit, cum per eas pituita secundum naturam minime excreti solet, sed in materiam duntaxat exuperantia, ut in cortex. *Idemque Falverius*. Ex quo intelligi datur omnem fere pituitam tetroculum manare: Si igitur tanta humoris vis quotidie confunditur

in Infundibulum, quam facile illa tunica offendi potest? quam facile cunctos meatus oppilabitur? aut etiam delinuetur? Pituita quam varii coloris est quam varie ego illa hunc meatus transiendo inspicitur? Nunc quam multa cerebra inspicuntur? at nunquam tunc reperitur infundibulum, nunquam dilectur: Formæ denique hujus meatus reclamabit, & hujus officii rationem omnem excipiet: In tertio ventriculo notatur meatus, qui est per angustum, hunc apertus insit fieri ampliotem, & mox in sinulum terminari, quem quoque ob id vocant *Infundibulum*. Quo igitur consilio natura exiguum, & mox capacem, & tandem iterum angustum fingit canalē? Si hic meatus de tertio ventriculo hanc humorem, eius initium, initat consilium ostendit, debet esse magis laus & amplum: Quare cum hic meatus pertinet ad Infundibulum, hæc cavi infundibulo vix assimilari potest: Id quod etiam D.D. *Warshawski* fere deprehendit. Videmus ergo hanc membranam ad humores trajiciendos maxime ingratam esse. *Idem.*

Ex diuturnis cerebri distillationibus, &c.] Vide Scholia ad Observ. 3. Sect. 17. lib. 2.

OBSERVATIO CVII.

Tabes ab obstructione venæ cavæ prope cor.

In cadavere Phthisici Lugduni observavit *Lazarus Meyssnerius*, Medicus Lugdunensis per cerebri, venam tantum cavam prope cor obstructam. Hinc acutus ille vir Phthisin ab ureteribus & renibus deditit, quam in se solis curavit diuretice, ut de octo hyperici, &c. Non facehato, quod credie dissolvere potius sal pulmonum illorumque unionem. *Thomas Bartholinus centur. 7. hislor. xxxv.*

S C H O L I A.

Phthisin à toto subinde venoso genere indici plane sum certus: Sanguinis enim vicium non corpus tantum emaciatur, sed & Pulmones, quos in circulatione transit omnis, (sive aut horum culpa aut cerebri) sua acrimonia irritat & contemnit: A quoconque tamen vicio Phthisis dependat, Pulmones tamen in plerisque phthisicis tandem depravatos observavi. In

terdam parenchyma plane vidi absumptum, solis vasculis remanentibus: Nonnumquam tanto pore scærent ut calcis instat sine friabilis. Subinde ita madidos invadit & exsiccatos, ut vix instat diffringi poterint:

Sæpe costis vix tam firmiter adhaerere ut motus reciproci cessaverit. *Idem.*

OBSERVATIO CVIII.

§. 1. Tabes à Cordis exsiccatione & defectu humoris in Pericardio.

Casimiri Marehionis Brandenburgici, ob mærores & vigilias, humore qui involucto cordis continetur, exhausto & exsiccat, cor exedum & exsiccatum pyri tosti faciem representavit, &c. *Melauchton lib. 1. de anima.*

S C H O L I A.

DE phibili cordis mentionem faciunt *Plinius lib. 19. cap. 5. natur. histor.* & *Plinius secundus lib. 4. cap. 1. de re med.* Contra phibilin, aut, succus raphani adhibetur, qui si ulus potest tenuitate tubilli ad imi corporis lineamenta cor penetrare: *Aegyptii* enim Reges, quibus erat studium corpora scrutari mortuorum, & causas valerudinum oculata fide recognoscere,

in corde ipso nasci ejusmodi vitium prodiderunt: Quomodo autem succus raphani, calidi & sicci temperie, ejusmodi affectui medela esse possit obicunum, Nisi recurras ad cordis obstructions, hincque impediam sanguinis circulationem, quam liberam reddat, referatis fumena vi penetrandi obstructionibus, ad qualitates ocululis deveniendam erit.

§. 2. Nuper Illustr. Romani corpore, qui ad diuturno morbo divexatus, defecerat, nulla prorsus cordis portio, sed ejus tunica tantum reperta fuit; quod nimirum ab immoderato calore illud penitus jam absumptum erat totum. *Bernard. Teleseus rerum natur. lib. v. cap. xxviij.*

§. 3. Si desit aqua in Pericardio, cor sensim contabescit arfactum, ut in pluribus observatum. *Riolanus Encheir. lib. 3. c. 4.*

S C H O L I A.

Quem defectum Riolanus marasmi causam statuit, *Hylmerus* verius pro effectu agnoscit.

OBSERVATIO CIX.

Tabes ab ulceribus cordis excitata.

§. 1. **I**N quodam qui sensim contabescens & liquefscens de medio sublatus est, tandem tria ulcera in corde reperi, non parum cava & fordida, multo ante jam tempore contracta. *Fernelius lib. v. cap. xij. pathol.*

§. 2. Venetis dum cadaver quoddam secaremus, quod fuerat hominis qui ex diuturno morbo tandem mortuus est, invenimus parvum sub altera auticula cordis ulcus, quod videbatur antiquum, aliquantulum profundum, purulentum & sordidum: Quodcumque autem illud fuerit ulcus, sive ex aliqua vomica fuerit, sive ex erosione, sive ex putredine, videtur rationi consonum quod si hac pettulerit diu, possit etiam scitrum aliquandiu ferre. *Trincavellius lib. vij. cap. xi. de rat. curandi &c.*

§. 3. Vit quidam paulatim longi temporis tractu omnino emaciatus, tandem obiit, In cujus dissectione Inveni magnam ulcus, quod non solum cordis capsulam, verum etiam substantiae cordis magnam partem exederat, usque dum tandem penetrasset in sinistri ventriculi cavitatem ægrumque sic occidisset: *Dominicus de Marchettis Observat. Medicæ Chirurg. xlvij.*

OBSERVATIO CX.

Tabes à pericardii affectu.

Galenus in Simla & Gallo, in ambiente cor tunica, invenit tumorem ob quem in Gdies emaciati videbantur: In Simla tumore repertus est humor, in Gallo nihil humoris: Galenus semel vidit hunc morbum in scelis animalibus dictis, Ego tet observavi: Hi animi deliquio, cordis palpitatione, pulsu duro, parvo, nulla præcedente tabitudinis causa, syncope oppressi vitam ducebant & accedente febricula consumpti sunt: In uno dissectio apparuit in hac tunica duriusculus tumor, nucis avellanæ parvi magnitudinis, non perfecte callosus, quo disrupto, ichor quidam emanavit citrinus: Hic catetro-ni instar ad extremam maciem reductus, nullis unquam auxiliis levare potuit. *Zacutus prax. adm. lib. ij. observ. cxxcviij.*

S C H O L I A.

Hic affectus tacus, chronicus, cognitui difficilis, Hexialis est: quo correpi sensum se sine sensu febre lenta oppressi contabescunt: Ab humore enim in hac membrana impacto, tumoremque committente, retento & putri, ob viciniam tamam cum corde, jugis tenuisque concitatur febricula, quæ tandem totum colligat & absumit: licet enim cordis involutem inter partes ignobiles reponatur à *Galenus 7. anat. adm. c. 12.* id tamen intelligendum si solum afficiatur cetera cordis offensam: Si autem hæc cordi communicatur, ob difficultem curandū aditum, atque ob gravia symptomata subsequencia, ægrum mat-

cescere potest: maxime quia hanc tunicam si semel humor penetrat, ægerrime elui potest; qui licet tenuis sit, tractu temporis a calore cordis crassescit, & induratus sit resolutioni contumax; & si à natura vel arte tentetur suppuratio, humor effusus supra cor, illius ignem subito extinguit, & inopinato ægri occumbunt: Et si res bene succedat, ulcus fit inmedicabile quod ita ulcersum pulmonis, corpus tandem colligat: His pressis angustiis salus modum curationis se ignorare facietur: Eo tamen ordine esse curandam hanc tabem quo pulmonis tuberculum in obitv. III. cenfeo. Vide *solum* de aff. omiflis c. 7.

OBSERV.

OBSERVATIO CXI.

Anatome Phthisici in utroque cordis sinu carunculas habentis.

ANNO 1608. Basilæ in dissectione phthisici cuiusdam, præter alia ex utroque cordis ventriculo, carunculæ quædam albicantes interiorius, exterius colore rufillo emergebant, figura pyramidali, peculiaribus fibris in ipsius ventriculis radicatæ, per vasa cordis ramulos suos dispergentes, digiti minoris crassitie, longitudine fæqui palmæ: In phthisicis & hydropicis haud raro ejusmodi reperiuntur. *Th. Bartholinus Epist. 4. cent. 1.*

OBSERVATIO CXII.

Atrophia in Bove, ab Abscessu in corde & Tuberculis in parenchymate Hepatis.

ANNO Bos in ædibus meis macabatur 1650. macilentus, sine Omento pingui: Cor multo adipe obfictum: in dextri ventriculi pariete medio abscessum habuit pomi magnitudine, duobus folliculis inclusum, quorum exterior crassior cartilagineus, interior tenuior, ex quo sæcto serum cum impetu effluebat: Nulla tamen vomica cum ventriculo cordis communio, sed folliculus interior pedunculo pariete externo alligabatur: Cor igitur abscessus paritæ & alios tumores, secus ac visum *Galeno lib. 1. de loc. aff. c. 5.* quam non plane negasse, sed diu durare posse pro *Galeno* respondeat *Saxonia*: In Hepate ejusdem Bovis, à parenchymate separato, observavi circa portæ ramos tubercula cum venillis lata & capacia, in quibus præter externam tunicam interior folliculus conspiciebarur: In aliis venis capillaribus, circa anastomoses, crassa quædam & tuberosa erat caro, tendinosa & fibrosa; Hinc quia sanguis non potuit libero cursu per anastomosis ferri, Atrophia successit. *Bartholinus hystor. 32. centur. 2.*

OBSERVATIO CXIII.

Tabes ab ossiculo in medullæ cordis.

ILlustris Baro Hungarus, *Casparus Horvath*, habuit fratrem in Polonia, qui per aliquot annos phthisicus, cum à Medicis Poloniæ curari non posset, prognosticis relictus est:

Eo anno 1649. mortuo, Medici causam incurabilis morbi ac mortis scire cupientes, sectione aperuerunt pectus, & in medullæ cordis, admodum arefactæ, inveniunt ossiculum forma amygdalæ, Er, quod stupendum, genuinam & expressissimam in ossiculo illo demortui effigiem, Exspicari autem non potui an sculptura an pictura effigiem representaverit &c. *Observatio Samuelis Spilenberger, Medici Hungari, in miscell. curiosis anni 1671. Observat. 40.*

OBSERVATIO CXIV.

Tabes à tumoribus scirrhis in pericardio, Simia & Galli; Qui affectus analogice ad homines referri potest.

Simia quædam cum emacari in dies videretur, eam tamen, necessariis nostris negotiis impediti, secare in tempore non potuimus: post mortem vero, reliquis partibus omnibus illæsis, inventus est in ambiente cor tunica tumor p. n. humorem in se continens, qualem pustula (Græci hydatidas vocant) emitteere solent: Atque in Gallo quoque vidimus aliquando cordis tunicam hujusmodi scirrhuso tumore affectam, perinde ac si plures crassæ membranæ involutz, altera alteri fuissent, verum in eo nihil humoris continebatur: Unde verisimilis conjectura elicitur, homines etiam similibus posse affectibus infestari. *Galenus l. 5. c. 1. de loc. affectis.*

OBSERVATIO CXV.

Atrophia ab infarctu auriculæ & ventriculi dextri cordis.

PUELLA 140 vitz tempore morbis fuit obnoxia, tandem cordis palpitationi, asthmati, & atrophia perit: In cordis auriculæ dextra erat materia alba, crassa, In sinu dextro materia pinguedini similis. *Vide lib. 2. tit. de Palpit. cordis.*

OBSERVATIO CXVI.

Tabes à scirrho Hepatis abscessibus plurimis referti, Lienis, Pulmonum vitio.

NAtarui indulgens puellus, dum undis marinis nimium credit, ab iisdem per infortunium abripitur, merfúsque profundo ægrè à focilis inventus, defertur in litus, & inter frequentes rotantium manus oborta vomitione, salam aquam copiose rejiciens, eripitur quidem morti subitæ, sed æger tamen domum refertur, & anicularum suafu, facculis arca marina plenis calentibusque obruitur, potissimum qua parte Hepar delitescit, quod de illius partis regione conqueretur: Sed cum jamdiu sacculorum nullus finis esset, ille quidem lectum deserit, obambulâtque cubiculum languidus & pallens, verum ignoto amicis morbi genere paulatim contabescit: Tandem huc translatus mihi committitur, animam ægrè trahens: Ego re expensa ostendo conclamatum esse, hepar ferventibus arenis perultum, sanguinis motum illa parte non parum sufflaminasse, eoque ex coacervatis ibi humoribus scirrhum Hepatis natum, meo quidem iudicio jam immedicabilem: Quid fit? biduo post expirat puellus, & quidem xxiv. horis ante convulsus.

Rogor ab amicis, saluum Hepar suspicantibus, ut aperto cadavere mortis causam indagem, profuturum id fratribus reliquis, etiam temperamenti imbecillioris, ut sibi rectius prospiciant: Itaque resectis integumentis, dum Hepar intentius contemplor, naturali longe maius duriusque ostendo, atque ostendo astantibus non tantum viscus durissimum, sed & parenchyma ejus mille abscessibus minoris refertum: Erant autem abscessus illi, non fluido pure distenti, sed duro alboque, quale fere in elephantiarum suum carne quandoque videmus & abominamur: Nec immunis ab eodem malo Lien, circulatione sanguinis luem in diversa transiente: Pulmo superna parte maculis nigris flavisque hinc inde versicolor, sive aquamarina illuc quoque novam calamitatem deportante, sive catarrhis ex capite sensim in pulmones destillantibus: Notavi enim sæpe alias in pulmonibus mortuorum, quos catarrhi infestaverant, nigricantes illas pulmonum maculas, vera vel præsentis vel brevi sequentis corruptionis argumenta. *Olav. Berrichius observ. 95. in Actis med. Bartholini anni 1671. & 1672.*

OBSERVATIO CXVII.

Tabes sequuta Hepatis inflammationem, abscessum ac gangranam.

FAmulus N. per annum dolore hypochondrii dextri laboravit, ac totum corpus Tabes absorptum. Hepar fuit durum, magnum, albicans circa ventriculum, gibba parte circa costas nothas, nigrum, exustum plumbeum, in æsthiomenon commutatum. *Vide tit. de Febris.*

OBSERVATIO CXVIII.

Tabes à putrilagine Iecoris indurata.

Ictericus cum lenta febre & torius Atrophia, de duritie cum dolore in jecoris regione conquerebatur: Substantia Hepatis fere tota absorpta erat, in putrilaginem & purulentiam conversa. *Vide lib. 3. de Hypochond. dolore.*

OBSERVATIO CXIX.

Tabes à vitio Hepatis scirrhosi etc.

CAtarrinx N. pedum insignis erat tumor, macie reliquum corpus occupante, de dolore in dextro latere conquesta. Hepar nonnihil grandius erat, in cujus medio parte macula alba, tactu cartilagini molli similis, totum parenchyma penetrans, cum pluribus aliis minoribus &c. *Vide lib. 3. tit. de Hypochond. dolore.*

OBSERVATIO CXX.

Phthisici Iecur profunde candicans repertum.

SÆCUI Phthisici cadaver, qui aliquot mensibus ante obitum ab omni cibo abhorrens, à solis porulentis, sc. nunc vino aqua diluto, nunc pura puta fontana vitam sustentabar, cujus hepar revera profunde candicans & quasi dealbatum, cætera molle nec magnitudinem minus apparuit.

SCHOLIA.

Hepar candidius erat, ob sanguinis paupertatem in sanguinis vas. Nam febris multum depolebat, & ob inappetentiam consumptus non restituebatur, imo solo vino diluit & aqua vitam sustentans. *J. Jac. Wissem Dissert. de Apopi. p. 390.*

Canduius J. Hepatis labilitas nuper concreto sanguini, limillima est, colore rubra, vocaturque *myxoma* i. e. affusio, quum in fortu nihil aliud esse

videatur quam sanguis innumeris venarum furculis circumjectus & altissus: Non enim è sanguine primum, sedus atque alie partes constituta est. Etiam color ejus in embryo albescit, sanguis jam intra vasa purpuriscente, mox flavescit, ac denique subredimem indat: In quibusdam animalibus perperis album flavum aut viride apparet.

OBSERVATIO CXXI.

Tabes Pectoris, Rachitis Anglis dicta, à Iecore supra modum aucto, ortum ducit.

Pectoris Tabes dicitur, non quæ intra pectus sedem habet, nam Phthisis pulmonaria eo nomine comprehenderetur, sed in qua ipsa pectoris crates viciatur, cujus origo est à Iecore supra modum aucto, adeo ut defectu spatii, à pectore mutuetur quod ipsi deest, unde id viciatur. *Vide supra observat. 77. & sectionem ultimam hujus libri.*

OBSERVATIO CXXII.

Tabes ab Hepate viciata, non sanguificante, In thoracis cavitate compulsa.

Quella annos 14. nata hydropes prius affecta, post tumore abdominis ob ejus abscessum, tandem interit.

Aperto cadavere, inventum Hepar colore flavissimo; adhærens peritonæo undique & diaphragmati, ac mole sua mediam thoracis partem replebat, ut ipsi cordi omnino esset vicinum: Hinc summa macies in toto corpore, quod marasmo confectum videbatur, idque ob vitium Hepatis sanguinem non generantis. *Vide lib. 3. tit. de Tumore abdominis.*

OBSERVATIO CXXIII.

Tabes à vitio Hepatis verrucis obsiti, Mesenterii & Intestinelium cum vermibus copiosis.

Montispessuli Virgo 18. annum ætatis moriebatur, quæ per integrum annum Atrophia laborarat & à Medicis diversimode tractata erat: Aliis vermes subesse existimantibus; aliis verò intemperiem partium nutritioni inferientium: Pater defunctus cadaver aperiri petiit à Facultate Medica, *DD. Ginchardus* dum secat, aperto peritonæo summus fœtor ab adstantibus non sustinendus, nates eorum ferit: Partes ergo naturales, tanquam facultatis læsæ, pertunduntur instrumento, Tum aliquot millena verticæ circa Hepar, mesenterium & intestina reperiuntur, illaso Liene, Pulmone & Corde: Omnia quoque intestina repleta erant vermibus, & quidem lumbricis longioribus, ut etiam secundum longitudinem intestinalium binj & terni simul juncti ad tactum deprehenderetur: Plurimari ob intolerabilem fœtorem non licebat: Tanta vero corporis erat siccitas seu ariditas, ut etiam in tanto ætatis flore matrimonio lphabilis fuisset. Hoc sane loco, licet utriusque recte fenserint, dum & vermes adfuerunt, & vitium partium naturalium, attamen novum hoc erat verrucatum spectaculum: Fœtor ille proculdubio ex illuvie putrescente, & materia vermibus, ex qua, præbente. *Phil. Salmon. cent. 1. observ. v.*

OBSERVATIO CXXIV.

Tabes à pure sub vulnerata Iecoris fibra collecta.

Licet impeterritus injecturus vincula audacissimo cuidam nebuloni, ictus fuit bipennis in infima Jecoris fibra: cujus exstillans sanguis in pus conversus, coniecit ipsum in lentam febriculam: Utique tam vehementem universi corporis Marcorem, ut conficeretur ante diem xl. Quo cadavere, jussu Prætoris, dissecto, invenimus sub vulnerata fibra plurimum graveolentis puris collectum: Ex cujus fœtore insurrexit proculdubio, quæ ipsum consumpsit febris; plaue ad instar eorum quos pessundat lenta Tabes. *Nicol. Tulp. prim. lib. ij. observ. xxvj.*

S C H O L I A.

Credidit *Clementius* Crispa serrari non posse cui Jecinoris. Porre percussa, utique vix ad tantam tem. pervenire cui crassum ejusdem visceris vulneratur: Sed plagam minus exitalem ubi mucro non descendit ad grandes venas: Ex minoribus effunditur quippe minus sanguinis: atramen licet tunc, occidit, tamen ipsarum vulnus hominem facile, namque effluit ex parte declivi plus sanguinis, & dissipatur

impulsus calor locinori necessarius quam ferendo su sine evidenti incommodo calida sanguinis officina: Ac proinde non de nihilo est quod *Galenus*, (alibi diligens observator) nullibi locinorum affecit abscessum locinoris fibrarum fuisse tantum: Nisi forte in comm. in aph. lib. 6. sed refert illud aliorum duntaxat animadversiones, quibus etiam manifeste fides derogat. *Idem.*

OBSERVATIO CXXXV.

Tabes à Jecoris substantia exesa, plurimisque lapillis in cysti fellea.

Cum Nobiliss. virum *Valentinum de Hols. &c.* Per integrum fere annum *Atrophia* laborantem, tandemque lenta *Tabe* extinctum secarem: In hujus vesica fellea lapilli plusquam ducenti fere, partim quandranguli, partim cineritii, partim subulavi, & auro quasi micantes reperti sunt, Jecorisque substantia plane exesa: De dolore verò gravativo dextræ lateris nihil unquam conquesta est. *Greg. Horsium lib. xv. observ. xlvij.*

OBSERVATIO CXXXVI.

Tabes ob Renes Jecori affixos.

Renes ambos Jecori affixos vidi, & manu abstraxi mea in Hieronymo N. qui in magno æstu, valde sitiens, exhausterat in frigida quadam cella, uno spiritu, ptregrande poculum vino albo frigidioris plenum: Mox ab eo haustu sensit *præcordia sibi quasi collabi*, incipiens tulisse tussicula inani, difficili, insueta, quam nec libera esse libralis, imo nulla fere sequebatur expulsiō, corpus sensim *marcescebat*, de pectoris angore & spiritus impeditōe ac cohibitiōe subinde conquererebatur: Consulti Medici, alii post corporis evacuationes præscriberant dilatatantia, lenientia & expectorantia: Alii, incidentia, extenuantia & detergentia. Nonnulli arrestantia ad catarrhos sistendos: Nihil autem iis proficientibus, tandem transacti duobus annis & aliquot mensibus, moritur æger.

Cadavere aperto, inspectisque thorace, pulmonibus & corde, nihil monstri, nihil fere vitii deprehendimus: sub Diaphragmate verò, cum renes investigaremus, invenimus eos, præsertim dextrum, Jecori per membranas peculiare, quibus vestiebantur, quasi adnatos, & ita affixos ut vi quadam fuerint manu avellendi. *Ex Martini Holiæ affixi Med. Observat.*

S C H O L I A.

Hæc res omnibus nobis rara & mira videbatur: ætum verò sursum traxi renes, an deorsum prolapsam fuisse diaphragma disputarum fuit: Equidem in ea etiam & adhuc opinione, ob nimis relaxatum & quodammodo resolutum (ex frigido illo & magno haustu) Diaphragma, propendisse omnia que ab eo pendere viscera, ut sic leuor quasi renibus incumberet (à quo tamen vi caloris hos etiam nonnulli attrahi forte potuisse non negavimus) & successu temporis narivam, que nonquam ostiatur, genuisse membranas illas quibus vestiti Renes Jecori agglutinantur. *Idem ibidem.*

Præcordia sibi quasi collabi) Hippoc. lib. de dietæ Acut, ait, Quibus in more possum est bis die cibum capere, si forte illi non prandere, iuxerunt sunt, jacent, & ad omne opus timidi, stomachi mortu tentantur.

tur, *Viscera sustinendi videntur, &c.* In Græco, *απὸ τοῦ θανάτου τὰ ἐντοῦτοι ὀρίονται*: Iste autem *απὸ τοῦ θανάτου* non aliunde est quam ob collapsum stomachi habitum, qui cum inermi visceribus est cujusdam sulci loco: viscerum enim repletio est viscerum rectitudo quadam, unde fit ut quidam squalido habitu & melancholico, cum tulerunt abstinentiam unius diei aut plurium, existiment (sua quasi viscera peudere, & mult Medici frustra eos medicamentis sollicitant, cum potius adjectioni studendum sit: Quo pertinet illud lib. 3. de artic. Si febri continua non prebendit cum, cui facta est costa, satius est cum non inanire: inanire enim est *ἰσχυρὸν* moderata repletio vennis diæctis cocturum est, evacuationem autem *σπασμὸς* facit, & *σπασμὸς* dolorem.

OBSERVATIO CXXXVII.

Tabes ab infantis lapillis in fellea vesica contentis, & Jecoris substantia exesa.

Jam diu est cum Nobil. N. lenta tabe extinctum secarem, In hujus vesica fellea lapilli plusquam ducenti reperti sunt, Jecorisque substantia plane exesa. *Bernardus Stiebertus ad Greg. Horsium in observ. l. 4. Obs. 47.*

OBSERV.

Tabes à defectu omnimodo Bilis in Vescula fellea.

Magnopere olim mihi læta placuit hæc tua de Bile sententia, & exinde animadvertere copii in promiscuum triviale Medicorum vorum, quod apud suos, quos misere divexabant, ægrotos, iugeminare, soliti fuere, dum Bilem educendam esse dicebant, urinam omnem de corpore Bilem educeremus. Verum quid inde mali eveniet? Id nempe quod plurimi, qui adempto præcipuo coctionis condimento omnem in cibo capiendi appetitum amiserunt, dehinc cachectici, tandem hydropici demortui.

Tres occubere uniparenti filii, omnes tandem Marasmo tentati, ultimum dissectioni meæ commisit mæstus ille genitor: Nullum revera nec vel vestigium ullius Bilis in vesicula adinventi, illius cæteris omnibus visceribus: Hinc culpam omnem in digridiata illa congesti medicamenta, crebrius illis defunctis adhibita: Hunc enim errorem illos errate sæpius deprehendi, ut à vehementissimis quoque purgantibus non abstinerent temeraria illa ætate, adeoque præmature committant funeri corpusculum longiore dignissimè dicta. *Anonymus ad Gothofredum Maebium in huius Fundamenti Physiologici cap. xv. §. x.*

S C H O L I A.

Idem olim à Fernelio fuit observatum, qui ait in Vesicula non aliam morbis causam comparasse quam quod folliculus omni bile exhaustus fuerit: Ubi vèto hæcenus fuit incertus: Multi inutile excrementum dicunt, verum natura tam non ad intestina remota, ubi chylus ultimam admittit manum, sed potius ad exhalantia, quæ scybalis fæciola continentur, de stimulo pro excretionem præparatis opus habebant, obligaret. Quamobrem, cum iusta bilem cum chilo in intestinis, & interdum in ipso ventriculo miscetur, necesse est usum aliorum in chylicatione præstabit, Exaltimamus autem ejus uti esse, 1. Coctionem præpare. 2. Coa balsamicum quoddam condimentum chylum à putredine vindicare. 3. Secretionem chymi à scybalis de ipsum digestionem promovere. 4. Excretionem intestinorum stimulare. 5. Addunt quidam ut toti corpori calorem largiantur; Sanguinis de humorum mixtum juvet, coque à putredine præcervet: Non defunt testimonia quæ hos usus firmant: Mundus in Anat. à delectata bilem ad stomachum pro roborenda virtute digestiva venire: Author lib. de Anat. vivorum, Cylus, inquit, tres habet meatus, unus dirigunt ad stomachum, quo transmittitur cholera in ipsum stomachum propter digestionem conservandam: Lapi ideo deprehenduntur ut vocatissimi: Remex Vesali, cui bilis ad ventriculum deferebatur, voracissimus erat, furtus ventriculi, mox se in mari non obnoxius: Porus choledechus licet raro ad ventriculum abeat, cylus tamen felles contactu suo cum ventriculo nonnulli communicantque: et ea ratione calcescere potest: Hæc elogia bilem excrementorum fidei impromptu censu eximunt, & inutilissimi succi, maximeque ad vitam necessariis humoris civitate donare videmus: Tanquam entia obest ut secundum Aristot. & Plinium quidam humanum absque bile inventi fuerint, ejusque absentia vitæ longævitate causari queat, ut potius ea ejus defectu hominem nunquam diu superstitem habuit, sed vel hydropticum vel cachecticum è vita emigraturum e credimus: Hæc omnia, ut puto, evincunt Bilem haudquaquam excrementum esse inutile, sed ad coctionem primam expediendam & abfolvendam

summe necessariam: Hinc videmus naturam hac in parte iam providam esse, ut nunquam omnem bilem de corpore per porum choledechum communem, teletet, sed semper aliquid in vesicula, ne nunquam illud condimentum chyli balsamicum defuit, reponat: Communis est medicorum sententia quod bene constitutum Hepas bonum appetitum pariat, quod Argemæus & Gemma arctianus: quare usque isti homines bene comedunt & digerunt: Certe quia hepatis bene constitutum bilem educit indubitablem, primæ coctionis complementum infert vitæ: Nullum quoque dubium ipsam quoque hæmacosin, cum in corde tum in hepate, bile stali alime si piam: Bile illa nimirum videtur quasi flos sanguinis: Unde chylus mixtus cum sanguine in corde maxime hujus beneficio fermentari & deinceps in sanguinem mutari videtur: Demum chylus quam facit in intestinis contrahit, abeat in venter humorum de nutritionem ineptos, expientia firmat: Bile tempore intervenit hæc omnia præcavet judicium est facillimum, Quo fermentum bilis non pertingit, inquit Helmont, ibi lumbicos est patia: Secretionem autem nullis ab inutili bile promovet, neque expulsi calcar addi, nemini dubium: Colon ad hepatis regionem ascendens interdum fellis cylis adnectitur, ejus contactu bileo colore tingitur, teste Highmore: Coli autem expulsiorem à tali vesicula sua simul stimulari credibile: Ultimam usum, Toti corpori calorem largiri, Sanguinis omniumque humorum motum juvare, non admittimus, nisi de ea particula sanguinis, quæ à calore cordis ea exaltata, ut in regressu per hepatis in bilem abire queat: Illa particula, quæ actu quidem nondum est bilis, proximatam potentia ut prima occasione in convenienti loco bilis fieri queat: mixta adhuc sanguini extra omne dubium tales vires obtinere potest: Hæc potest reparari pro bile alimentari, quæ si plus julto in sanguine commoletur, non sufficiens ab hepate debiliore coctione separetur, antum ad ebullitiones & incensionem febiles dare potest: Ea qui natura abundans, temperamenti sunt cholericæ & marialis. *Idem videtur, ubi vult pira de ejus generatione & differentiis.*

Tabes à Glandulis mesenterii & collis scirrhis.

Puer annorum xij. dissectus fuit Basileæ anno 1672. Julij 24. à D. D. Glafero Anato-
mæ Professore: Contraxerat tumorem in glandulis thyroideis, qui pulveribus conspici-
tus decrevit, sed rursus sensim accrevit in magnitudinem: Ante biennium doluit ca-
pite, vertigo obrepfit, dolor in cervice sinistro latere obortus, simul in pollice, eodem
latere applicatis oleis sedatus dolor: obortus tumor pone aurem sinistram, glandulas
jugulares occupans cum dolore continuo: usurpata remedia necessaria ex turbith cura
zinzibere, decocto guaiaci, pulvere ad strumam: Chirurgus manum aperuit, unde efflu-
xit sanguis cum aliqua sanie, tumorem per semiannum gerens: cæpit tussicula iufestari
sicca, pauca excrevit, in dies macilentior factus hædicus oblit.

In dissecto cadavere, glandulæ mesenterii, quæ esse debent albæ, friabiles, repertæ
sunt rubræ & siccæ, illis similes quæ in collo erant, exulceratæ & putridæ, alias quoad
magnitudinem & figuram similes naturalibus: Glandulæ quæ cartilagini scutiformi adiace-
bant, quoniam magnæ, loquelam impediabant: Magna & multa vasa in eas inferebantur,
ut & nervorum ramuli: in hoc puero satis densæ erant, sed nulla reperiebatur in illis
caseosa substantia: Jugulares glandulæ dictæ, erant dispositæ secundum longitudinem ju-
gularium venarum & musculi mastoidei, quæ erant nigre, racematim dispositæ, lividæ,
putridæ, humore fetente & maligno scatentes, usque ad clavicular protensæ, in quan-
titate figuræ naturalis: Parotis conglomerata, alias glandula maxillæ posterior dicta, mir-
rens ductum salivalem superiorem, erat omnino alba & bene constituta: Ibi vidimus Spi-
nam ventosam &c. *Ex communicatione D. D. Mangoli Medici Basiliensis.*

S C H O L I A.

PARS affecta sunt Glandulæ: Affectus Scirrhus;
Causa continens, non pituita aut melancholia,
sed nutrimentum glandularum: Scirrhus dupliciter ge-
neratur 1. à iure & nutritio depravate nutriende glandu-
larum (glandulæ enim iterum à trahendo recipiunt nutri-
mentum sanguineopituitosum) Juvenis disposi-
tionem strumam obinebat, unde nutrimentum
humore hoc maligno imbutum, glandulas depravatè
nutrivi. 2. Ab excrementis humoris, cum enim
glandulæ, quæ chylum debent transmutare, acido
suo humore privantur, tunc cæcus remanet, chy-
lus subtilior transiit: *Puer per biennium tumorem scirrhi*
viscera in dies serum malignum magis accumulavit,
hinc major cacochymia facta: Doluit caput, vertigo
obrepfit, humores è capite rejecti se infinuaverunt in
glandulas, hinc facta fluxio in partes intercosticas
cervicis & simul in articulo manus dextræ, unde
nutrimentum ibi viscosum, eo humore scrophuloso

imbutum, partes excrevit, & peperit tandem fluxio-
nem externam, transudant humores per periostium,
unde musculi pollicis extendi non poterunt, & fluxio-
ne ad partem debilem facta, humor calorem in-
ferum glandularum excitavit, unde livida evasere:
Humor emiculus egit pertingendo ad alterum latus;
ei odendo autem eum fecit ulcus: Item humores
glandulas mesenterii adscendunt, non quod sint causæ
scrophularum, ut vult Riolanus, sed ob causam com-
munem, humores scilicet malignos; succedunt fe-
bris hæctica & levis tussis, tero acti eodente pul-
mones 1°. ob distillationem à capite per fauces 2°. quia totus sanguis in transitu suo sensim necrosus in
pulmonibus efficit, sine manifesto abscessu: sensim
enim humor ille malignus pulmones putrefecit, ut
tota substantia viscosa fit, putrillosa: Non enim requi-
ritur ut pus exsurgat phlogisi, qui serum solum al-
quando rejiciunt. *Item.*

OBSERVATIO CXXX.

Tabes cum anorexia, vomitu & diarrhæa, à Scirrho pancreatis & glandularum mesenterii.

Puella placentis, libis, regantis, aliisque hujusmodi in butyro fixis cibis ultra modum
capius se ingurgitavit: Exinde cum male se habere inciperet, mater ex consilio mulie-
cularum multa quidem adhibuit, sed omnia frustra: Tandem ingravescente penitus ma-
lo, me quoque 21. Janu. 1673. in consilium vocavit: Offendi puellam satis debilem, & à
calore p. n. extenuatam plane, cibum quoque nullum appetentem, crebro vomentem, &
diarrhæa gravi laborantem: Morosa insuper erat, atque à medicamentis ita laboraret,
ut quæ & qua ratione ei sunt danda, tardiosæ curæ haud postrema fuerit pars: Licet ve-
ro sub vix initium calor plane remiserit, vomitus quoque & dejectiones non adeo cre-
bro infestant ægram, quia tamen extenuatio corporis, & appetitus vitiumque prostratio
sensum in dies augebantur, solam mortem horum malorum unicum futurum remedium
facile licuit colligere, revera die 1. martij placide obdormivit ægra.

Post mortem Chirurgus refravit abdomen, Sed ecce in isto viscera omnia ipsūque
Hepar, quod alias in julto majorcm excreverat magnitudinem, apparebant sana: Solum

PANCREAS

Pancreas induratum erat omni ex parte & plane scirrhosum : Glandulæ quinetiā mēfenterii hinc inde viſæ ſcirrhoſæ, atque in eam auctæ erant molem, ut magnitudinem nucis juglandis longe ſuperarent. *Georgii Segeri in miſcell. cur. Anni iv. Obſerv. 87.*

OBSERVATIO CXXXI.

Tabes à Lapillis minutis venas meſaraicas obſtruentibus.

§. 1. **I**N venis meſaraicis etiam materiam ſabuloſam nonnunquam contineri conſtat, Hæ ſi à Tartaro ſic obſtructæ ſunt, ut nihil à ſtomacho per parvas illas obſtructiſque venas permeare poſſit, omnia in ſtomacho *ſeſſa* manent, nihilque ab hepate attrahi poteſt, nec ullum cibum ſtomachus poſcit, unde tandem corruptus appetitus, Tabes & decrementum membrorum totius corporis oriuntur : Er homines magnis in *deliquiſ animi* ac languoribus evaneſcere ac morte obire coguntur, ut ego Francofurti ad Oderam in duobus Fratribus, valde doctis ſtudioſis, qui Dregeri vocabantur, vidi : hi tali etiam morbo onerati, ſine omni tuſſi, toti evaneſcebant, ut nihil præterquam cutis & oſſa in illis appareret.

Cumque Medici horum deſunctorum corpora diſſecare juberent, lapilli minuti in venis meſaraicis jacentes, qui venas meſaraicas adeo obſtruxerant ut nihil tranſmeare ponerit, inveniebantur : Nihil itaque, præter admirationem, illis erat, nec ullus inventu erat qui veram aliquam cauſam hujus morbi indicare potuiſſet : Deinde quarro anno præterlapſo, tertius quoque frater, Licentiaſ Theologiae, juvenis admodum, eodem fere ex morbo vitam cum morte commutabat, cui tamen ægrotanti febris aliqua à tartaro nata erat : Ex tali etiam obſtructione venarum meſaraicarum paroxyſmi calculi, ut febris frigore ac calore, ut peſtis, pleuriſis, ſacer ignis, aut alii ſimiles morbi, qui omnes Tartarei ſunt, & ex obſtructione calculoſæ materiæ oriundi ſunt : Hic bene obſervandum eſt omnes ejuſmodi morbos paroxyſinos Tartari eſſe, quod etiam prima in origine dyſenteriz, igniſque ſacri, quoad partem, cauſa eſt. *Obſervatio Johannis Henen.*

S C H O L I A.

DE generatione horum lapillorum hanc author nunc ſerunt ſententiam : Aterius materiam ſabuloſam nonnunquam in meſenterium invectum,

at Venæ eam non hauriunt, non reducunt, ſed faciunt reliquias. *Schneideri lib. 5. de Catarrh. cap. 7.*

§. 2. Francofurti ad Viadrum duo fratres contabuerunt & mortui ſunt, In ſeſſione reperiſſunt lapilli parvi in venis meſaraicis, qui impedire chyli tranſitum : Tertius frater etiam quadriennio poſt ſimili morbo mortuus eſt, niſi quod hic initio febris laborabat.

S C H O L I A.

Vtinam ſeſſiones anatomicæ crebrius admittentur, proſpecto eligo tante in rimandis cauſis morborum abſtutis oculis noſtris non obſervaretur : Tabis caſum an quiſquam Lapides meſenterii eſſe dixerit, nescio : interea tamen obſtructio venarum læſæſum, qua hic intelligo, quid aliud procreare poteſt niſi corporis atrophiam & conſumptionem? denegare ſcil. illi eſca & nutrimento ſatis copioſo & conveniente. *Chryſophorus Baſilius in miſcell. curſ. anni 1672. obſerv. 307.*

OBSERVATIO CXXXII.

Tabes à meſenterio tumore affecto circa exortum, Tuberculo in corde etc.

Benjamin Vallenger generoſus, annum agens 32. ex lapſu ab equo circa regionem lumborum contuſionem paſſus eſt, Poſt biennium per vices, circa locum contuſum multum doluit, variæque ſequuta ſunt ſymptomata, nempe dolor colicus ſæpe recurrent, urina pauca & ejuſdem nonnunquam ſuppreſſio (verum abſque arenulis & calculis) frequens vomitus, dolor iſchiadicus : quibus acceſſerunt tractu temporis, difficultas ſpirandi, tuſſis continua & violenta, totiuſque corporis macies : demum corpore extrema tabe conſectò, ſuppreſſæque per tres diès expectoratione, obiit.

Aperto abdomine, Hepar floridum apparuit, ut veſica biliaria fere vacua : ventriculus & inreſtina ſatis ſana, niſi quod hæc ſtatibus diſtenta & in larus dextrum propulſa : Lien aliquantulum juſto turgidior, ut & Pancreas : Renes flacciduli, alioquin ſatis quoque ſanæ vetereſ & veſica tum à calculis, tum à grumis aliſque materiis obſtructivis liberi : Meſenterium (abſumpta à tabe illius pinguedine) tranſparens, cujus propterea glandulæ admodum conſpicue erant, ſed juſto flaccidiores : Partes huc uſque à ſtatu naturali parum recedebant : Verum circa meſenterii exortum *ingens apparuit tumor*, qui inreſtina in latus dextrum, ut dixi, detruderat : Tumor hic ab appendicibus diaphragmatis ſuperne, ad os coccygis inferne, ad renem utrumque lateraliter, ad umbilicum uſque anteriùs protendebatur, & vertebriſ lumborum fibroſa connexionē firmiter adhære-

bat : Involvebat autem in sua mole magnam arteriam , venam cavam , vasa erup-
gentia , plexus nerveos , tenes succenturiatos & glandulas lumbares : Longus erat
pedem unum , latus sex pollices , crassus quinque , pendeat circiter septem libras : In
frusta dissectus , glandulosus apparuit & carneus , magis quam humoralis . Aperto thorace ,
pulmones utriusque numerosis tuberculis , varix magnitudinis , instat eortyledonum vac-
carum , albidu coloris , substantie glandulose , ejusdem generis cum tumore abdominis
prius descripto , seatebant : quorum unum majusculum exactum uncias duas pendeat :
Adeo tubercula hæc pulmones usque obfidebant , (nam centrum ad minimum numero
erant) ut primo obtutu ex illis solis eos constare putares . Lobi insuper pulmo non plu-
ribus in locis pleuræ adnascebantur , à qua difficulter separabantur . Anterior pars cordis
unico consimili tuberculo infestabatur . Dexter vero ejus ventriculus grumoso sanguine ,
instat gelatinæ refertus visabatur . *Varikon. Adenograp. cap. xi.*

S C H O L I A

Cetera casum propostum dubitari possit , Num
consensio ex lapsu fuerit origo symptomatum
post biennium supervenientiam ? Ratio dubitandi
est , quod æger ipse occasione hæc molorem originem
adscripserit , neque aliam ponere ejus causam com-
minisci : ac contra urgeri queat temporis intervallum
interprimam consensum & symptomatum erupcio-
nem : Nam qui fieret ut hujus æmuli feminium tamdiu
desinere , nulloque symptomatum fasciculo se pro-
deret ? Ad hujus difficultatis decisionem , primo (cich-
dium scrophularum facile ostii posse à nimia fibrositate ,
cassitate ac visciditate succi nutritii , quoniam ob
hanc ipsam causam si succus difficulter omnibus
corporis partibus ex æquo disperatur , & conse-
quenter alicubi redandat , facillime prima tumoris
flamma jacit : hoc ipsam confirmat ex bilioria
data , Sanguis enim in dextro ventriculo contentus ,
ut dictum , gelamine instat erat : Nec dubium quin succus
nutritius consimili vicio laboraverit : Quamvis enim
hi succi plane diverti sunt , magna tamen inter illos
consimilitudo ex plurimum intercedit , quod nimirum
rejectione pars alimentii partium spermaticarum , &
nervis per glandulas in venas transfunditur , adeo-
que sanguinem qualitatibus suis nonnulli inficit :
Quin & idem testatur vici cæcibaries , & vita à vino
& venere abstinentia , quæ ut sanguinis , ita & alimen-
ti spermatici robur ac fibrositatem augent : Secundo ,
Advertendum est scrophularum frequenter tardi incre-
mentum esse , verum in magnam molem demum ex-
crescere , tarde inquam & pedetentim augeri : hinc
evolvere potuisse ut scrophula ista per biennium sepe ,
ad eam magnitudinem non acceleraret , qua cæteris
partibus magnopere incommodarent : hoc ex eo con-
firmatur quia humores non erant (quæ cito augen-
tur & frequenter rumpuntur) sed carnosæ , quæ mo-
se aliam catenam paulatim incrementum tumorem .
Tertio , Attendendum videtur in aliis fere omnibus
corporis partibus consensiones scrophularum facillime suc-
cedendi aniam præbere : Nam consensio quoquo-
modo sanguinis quando incensibilis , indeque
ebullitionem , ob difficilem ejusdem transiitum per par-
tium habitum promovere apta nata est : Hinc jubent
Medici consensum quam primum v. a. succutere : ea
enim non tantum ebullitionem supprimi , sed & in-
cassata attenuat , adeoque non tantum imminenti-
bus inflammationibus ac tetricis conditionibus peticulis præ-
caverit , sed & crassorum tuberculorum , scrophula-
rumque , (tumorem nempe tetricioris moris) suppu-
lationis in antecessum prospicit : His positis , infer-
re licet potuisse consensum hanc primæ originis
scrophularum prædictarum occasione præbere : Eas
quoque , quoniam scrophulae per se morbosæ non
erant , nihil statim damni cæteris partibus ab initio
intulisse : verum tracta tempore in magnam molem

auclæ , ex compressione præsertim vicinarum partium ,
gravissima illa symptoma produxisse , scilicet dolo-
rem colicum , vomitum , detractionem intestinorum extra suam
sepem , siccitatem absque acualis : similitur dolorem
lumbarem & ischiadicum rerum & veterem com-
pressioni tribuimus : Dyspnoeam & tussim compres-
sioni pulmonum ab adeatis glandulis : Totius demum
maciem , partim impeditæ distributionis succi nutritio-
ni , ob compressionem plexus abdominis , partim de-
fundationis partium & conversionis alimentii in prop-
rium augmentum : partim denique febræ hectice à
difficultate spirandi oritur .

Ingens apparatus tumoris Tumores mesenterii sunt duo-
rum generum , laticiosi & humores : rarissime , quod
cavitate carui , statibus diffunditur : Tumores , in qui-
busque parte , tres præsertim causas agnoscunt , ni-
mirum materie affluxum ad locum tumorem , ten-
sionem ejusdem impedimentum , & infarctionem : ubi nul-
lus est materie affluxus , quicunque alius tumorum
causas staueris , vix fieri potest ut tumor inde exci-
tetur : scilicet corpus motuum quantum libet li-
tibus verberato , pars tamen consensu in tumorem non
attollitur , quia omnis humorum affluxus in defen-
sis cessat : In vivis vero , quolibet levissimæ con-
tusionis tumorem afficit , arteriis nempe sanguinem ad
partem consensum impellentibus , qui ob permeabi-
litate partium ex consensione jam impeditam penetra-
re nequit , adeoque partem necessitate implet , in-
farctit & in tumorem attollit : Cum vero affluxus ad
mesenterium tribus modis contingat , nimirum vel
per arterias , vel per venas lacteas , vel per canales
aquosos , facile constat nam tumorum genera huic
parti accidere posse , tumorem nempe Sanguineum ,
Lactæum & Aquosum : Sanguinei nomine non hic
intelligi illum quem phlegmonem præsertim vo-
cant , sed ex quoque humore in massa sanguinis
contento constatum : Appello autem hos tumores
sanguineos ut distinguantur ab istis qui ex lacte , sive chy-
lo vel lymphâ oriuntur : Tumores qui sunt ex san-
guinis affluxu , majores longe ac periculosiores sunt
illis qui ex lacte sive chylo producuntur : Etenim san-
guinis affluxus per arterias valde impetuosus est : Ille
autem qui per venas lacteas fit , imbecillius parumque
efficax : Puto sanguis affluens multo fervidior ac fe-
rior est , lacteus succus temperatior ac mitior :
quæ lactei tumores admodum ciles , sunt & forte
nonnum ab aliis animadverti : In vivis autem dis-
tinctionibus , ligatis venis lacteis , inter commune re-
ceptaculum & mesenterii glandulas , observavimus
chyliticum obstruere , glandulasque , ad quas ve-
næ ligatæ spectant , non nihil intumesce . De Tumo-
ribus canaliculorum alibi : Tumores sanguinei
vulgo dividuntur in Sanguineos proprios dictos , in
Biliofos , Prurifcos , Melancholicos & Scrophulos : Nos

dividimus in Tumores cum & Sine inflammatione; Tumores cum inflammatione, putredinem quandam materię in parte tumida impetue arguunt: Affectus Medici Practici inflammationes has esse causas directarum febrium, præterim Semihetiarum: Degeerant quoque inflammationes itz aliquando in gangrenam, quod Iouberius observav. in Ronderetii uote: Tales etiam inflammationes frequenter accidisse in male curatis dysenteris iidem testantur. Tumores sine inflammatione & putredine febrili ad-

modum varii sunt, omnes vero tardius augescunt morboſque plures chronicos constituunt: Aliqui eorum plures annos durant priusquam sese evidentius suis indicis prodant: neque tamen vehementer interea ægratos excruciant, lo mulis vero non di-
gnoscuntur ante obitum abdominisque apertionem:

Genera horum tumorum præcipua hæc sunt,

Abcessus, Siccocomata, Acheromata, Melicerides, Strumæ, Scirrh. *idem ibidem.*

OBSERVATIO CXXXIII:

Tabes à mesenterii & mesocoli abscessu.

Puer 10. annor. dissectus fuit die 20. April 1664. Omentum exhibuit putrefactum; prolapsum ad vesicam, & tenaciter intestinis & peritonæo annexum; Mesenterium quin etiam putrefactum & fere consumptum, potissimum versus os pubis, ubi maxima erat puris copia, coloris æruginosi: Intestina plurimum tumida, ad colorem plumbeum vergentia, at ubi pus stagnabat, nigricantia: Lienem tumidum valde, Hepar boni caloris, sed arctius peritonæo annexum: maxima vero aquæ copia potissimum redundabat in cavitate sita inter lienem, ventriculum & intestinum colon: Universum corpus macie consumptum: Urinæ toto morbi decursu apparuerunt bonæ: Circa pulmones maxima materiez pituitosæ copia exuberavit: Aqua tandem è corpore sectione evacuata, statim concrevit. *Raimundus Io. Fortis Consili. 37. cent. 3.*

S C H O L I A.

Puerum ex abscessu insignis magnitudinis furo cessisse, pro certo est habendum, cum materiez purulentæ copia in abdomine, secto cadavere, apparuerit, coloris plumbei sive æruginosi, ex sphacelo tandem abscessu: Hunc autem in mesenterio & mesocolo potissimum sedem habuisse existimandum, ut pote materiez capacissimis, tum quia eadem magis cæteris partibus potest facta se exhibuerunt; putredine quin etiam & corruptela ad omentum diffusa simul cum ipsis putrefactum: Aquæ vero vel feri copiam redundare ubi tumet Lien, qui fons aquæ ab Hippocr. nuncupatur, mirum non est, prout nec nova & insulens macies toties, tum quia febriculis diuturnis abscessum comitantibus supervenire consuevit: tum quia dum Lien fluitat, corpus totum contabescit. Scrum vero concretum, cum humor alimentalis sit, novum non est: prout pulmones in morbia diuturni vel affici, vel materia carthali impleri, quotidie ex Hippocr. observamus. Ad horum vero morborum causam indagandam, licet præteritorum commemoratione opus esse videatur, ni-

hilominus conjectare nobis licet puerum à nativitate viscera ostentia imbecilla sortitum fuisse, à quibus crassus & crassius productus fuit sanguis, adeoque copiosus ut Lien, licet eodem turgens, massæ sanguinæ deficienda impar, eundem inutilem & noxæ molestem, decubitu eria venas, & ad jam dictas partes distulerit, qui vel in cavitatibus hærens, vel infectus, corruptionem & putrefactionem adeptus, ipsis quoque partibus eandem impresserit; quæ quoniam cæcis naturalibus ignobilioribus sunt, ideo non febri insignis, nisi primis diebus dum pus consciebatur, sed lenta, corpus paulatim forte absumens, successit: Quibus, sicut curationem adhibuisse nobis omnino impossibile videtur, ita neque antihæc præservationem; tenella enim ætate robur visceribus onellari, sine præcedenti totius expurgatione omnino non potuit, quæ quam difficili negotio perfici possit cuilibet palam est, tum ob pusillum reluctanter, tum quia revera hæc ætas & sanguinis missionem & purgantium medicamento-
rum vim difficillime tolerare possit. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO CXXXIV.

Tabes à mesenterii abscessibus ejusque consumptione.

Sæpe hic (In Indiis) sine manifesta causa ægri tabescunt ac emaciantur, febre nulla, vel saltem levissima se huic malo iungente, sine magno sensu doloris, gravitas tantum quædam sentitur circa umbilicum ac hypochondria: Hoc malum præter obstructionem viscerum; sæpe causam latentem habet in ventis mesaraicis, vel in ipsa mesenterii substantia, quæ sæpe insignem abscessum patitur, quod in dissectis cadaveribus non semel observavi: Imo reperi aliquando totum mesenterium absumptum, attemen intestina cohærebant, ac porius inter se confundebantur, nullo ordine, tenuibus pelliculis seu membranis adnatis: Ita miseri mortales ad extremam maciem perduciunt jam magis scelerata quam corpora carne vestita dici possint, absumpto calore nativo vita excedunt: Notabile in hoc malo est, plerumque adesse βάλανον ac appetentiam caninam, cui se lienteria conjungit, unde cibi, nihil aut parum immutati & incocti, per al-

vum ejiciuntur: Taliter affecti, et si plerumque desperati, temperate calidis anodynisque, moderateque calidis deobstruentibus tractandi. *Bontius Medici Indorum Observ. xi.*

OBSERVATIO CXXXV.

Tabes à Mesenterio scirrroso, compressione venarum Portæ & Cavae, aliisque viis partium naturalium & Vitalium.

PUella circa XI. ætatis annum 1°. in febrem Ephemeram, mox in hecticam incidit. Hinc cum spatio trium mensium doloribus totius corporis, ariditate linguae, tussicula, deglutendi difficultate, sudoribus, frequentibus præcipue noctu & dormiendo, vexata esset, tandem plane Extenuata obiit.

Cadavere aperto 1. Intestina vermibus plurimis infarcta videbantur. 2. Mesenterium scirrhosum & hinc inde materia gypsea, uti quoque circumcirca venam portam, refertum fuerat; hinc chylus ad Hepar permeare ac distribui non potuit. 3. Hepar diversis locis, tam in parte cava quam gibba, steatomatibus scatebat. 4. Hepar mediante materia gypsea tam tenaciter diaphragmati adnatum erat, vix ut avelli posset, hinc anhelitus difficultas & tussicula. 5. Circumcirca venam cavam tamascendentem quam descendentem, moles materis hujus gypsee, ad magnitudinem pugni, tenaciter adhaerebat, ramisque comprimebat. Hinc extenuatio corporis, sanguis enim per corpus pro sui nutritione distribui non poterat. 6. Substantia Lienis materia hac gypsea undique scatebat. 7. Thoracis vacuum aqua limpida & nonnihil flavescens plenum videbatur. 8. Pulmonis substantia materia purulenta imbuta, uti quoque steatomatis, nucis vel castaneæ magnitudinem excedentibus, hinc inde referta apparebat. 9. circa exortum asperæ arteriæ, ex pulmonis substantia, moles steatomacum carne permixta, ovi magnitudinem excedens, inventa est, quæ tam asperæ arteriæ quam oesophago adhaerebat. Hinc anhelitus, vocis & deglutendi difficultas. *Fabritius Hild. cent. i. Observ. xlv.*

SCHOLIA.

Hinc inde materia gypsea) Lymphæ scilicet sic concretæ originem debens: Observavi enim *Barbani* in Praxi, cap. de Hydropse, tam per gradus ejusmodi crassitiem tandem adipisci: Constat certe talem concretione obstructionum sobolem esse. Obstructio autem vasorum mesenterii, juxta *Vartholomæum* loco ante cit. quinque modis coarctari potest, *Primo* in ipso aditu sive lactei in orificio venarum lactearum, Tunc enim chylus ex intestinis non attractus, unde appetitus depicitur & frequenter chylus ipse, ut in leienteria sit, per anum evacuat: venæ lacteæ interim foris atque humectatione chyli delinunt, tractu temporis exarcescunt, simulque totam corpus tabe conficiunt. *Secundo* in transitu ejusdem per mesenterii glandulas, post ejus ingressum in has venas: tunc primum nutritio diminuitur, quam tandem atrophiam consequitur. *Tertio* in transitu sanguinis ex arteriis in venas, per earundem glandularum substantiam: hinc si obstruantur sanguinis per has glandulas decursus, illæ proximus intumescunt, sanguine suffunduntur, atque adeo impediunt chyli permeationem & diminuant nutritionem efficiunt. *Quarto* in canalibus aquosis vel lymphæ ductibus, quos si contingat obstrui, quia valde fragiles sunt, facile tum-

escunt, & aquas suas in abdominis cavitate exspunt, unde hydrops ascitis certissime consequitur, Sin vero vasorum horum membranae tenaciores fuerint, ita ut dissolutionem notabilem absque laceratione fecerint, in vesiculas quidam aquas turgidulas attolluntur, quas hydatides vocant, & peculiarem ascidie speciem constituunt: quælibet autem vesicula inter binas dictorum vasorum valvas quamproximas efformari consingit: quia vero aqua, nec proclum, propter obstructionem, nec retroitus fluere potest, ob valvularum interceptionem, intestina intumescunt in figuram orbicularem, utpote capacissimam, quæ figura in hydatidibus vulgo cernitur: Hydatides istæ hinc longe diversæ videntur ab illis quas per meatus urinarios, & anum quoque externi aliquando observamus *Quinto* in Nervis, Si enim obstructio aliqua in illa contingat qui ad ipsa intestina deferuntur, sequitur horum resolutio & stupor, ut in paralyti graviori frequenter ulvenit: Sin in illa tuncum reperitur qui ad glandulas mesenterii distribuitur, causatur diminuta saltem nutritio: aque extenuationem, atrophiam omnium quoque partium spermaticarum, pernimente interim constitutione vitali sanguis & lactis valida.

OBSERVATIO CXXXVI.

Tabes à glandulis Mesenterii tumidis orta.

Puer octennis ab alio quodam puero baculo circa lumbos percussus, aliquot dies post male habere cepit, & septimanis aliquot præteritis, licet tempus vitæ ultimum cibo sufficienti nutrieretur, Tabes consumptus obiit: Huic licet nec tussis molestæ esset, nec febris laboraret, nihilominus à quodam tanquam phlegmone fuit tractatus. Quare potentibus mortis causam scire cupientibus, & me ut cadaver aperirem rogantibus, ipsorum voluntati satisfactus, cadavere deundato ventrem infumum turgidum reperi, & utrinque circa umbilici regionem ad tædum tendentem: Et quia nec tussis, nec febrem ipsi molestam

molestam fuisse intellexeram, illico necdum cadavere aperto, adstantibus significavi causam mali in mesenterio latitare: mox ventre aperto, glandulas mesenterii non solum tumentes, sed etiam scirrhasas reperi, & ita conglobatas, ut duorum pugnorum magnitudinem superarent: In thorace verò & pulmonibus nihil penitus vitii occurrit.

S C H O L I A.

Causam ergo Tabis harum glandularum scirrhum censui: Nam glandulae hae, quae ramorum venarum portae & arteriarum coeliacarum divaricationibus intersecae sunt, magnitudinem patrem non obtinent, sed proportionem in magnitudine cum distributis propaginibus servant: Harum tamen maxima ad ipsius mesenterii centum, ubi vasum magis collecta sunt, & vasorum prima distributio fit, quarum unus tum ut vasa fuleant & dividant, tum ut eorum compressionem ab aliis partibus inhibeant, ne chyli distributionem inhibeant: Sic ubi hae & elasticiores & duriores redduntur,

contrarium faciunt, sua enim magnitudine & duritate venas comprimentes, chyli in venas melancolicas & Hepatis distributionem & transitum praepediunt, ut sanguis ea copia, quae pro omnium partium nutritione requireretur, in hepatis venas conditi non possit: Et prout sensum glandulae hae & auctae & induratae, angustior chyli transitus relictus est, siquae sensum tabescente caput, usque dum transitus praepeditus fuerit, & sic necessario ob alimentum defectum, partibus tabidis redditus mors succedit. Ex *Observat. Clariss. Caspari Bauhini*.

§. 2. Si Glandulae, quae in mesenterio plurimae sunt, aliqua de causa intumescant, ipsae vasa comprimunt: Et imprimis hoc praestare potest Glandula illa insignior in centro mesenterii, quae primae vasorum distributioni addita est, & qua tumore laborante totius corporis *Narcorem*, ob impeditam chyli distributionem sequutam fuisse observatum est. *Sennertium Praef. lib. 3. part. 5. sect. 1. cap. 3.*

OBSERVATIO CXXXVII.

Tabes à Mesenterio lapidosa.

IN quodam juvene atrophia consumpto Mesenterium totum lapidosum inventum fuit: A qua vero causa oriri possit, cum calculi oriri possint à calore & frigore, Nos existimamus à calore id contigisse. *Dem. Panarolus Pentecoste F. Observ. xix.*

OBSERVATIO CXXXVIII.

Phthisicorum Pulmones saepe integri reperi, male vero affectum orificium Ventriculi.

AN verus *Lindannus* qui existimat ea quae tussi in Phthisi rejiciuntur, saepe culpa ventriculi fieri, Eo quod in Phthisicorum corporibus pulmones integri, male vero affectum orificium ventriculi observatum ab eo sit? *I. Th. Schenckius cent. iv. Epist. Bartholinus 72.*

S C H O L I A.

Certe si Phthisis propriè simatur pro Pulmonum culecere, seu corporis extenuatione à vicio Pulmonum, quomodo vitata est Medicis ea vox, quò in culpa sunt Pulmones, dubitari non potest, Et toties secta à nobis Phthisicorum cadavera, & ab aliis, restant. Si vero de quavis atrophia corporis laxa significacione sumamus, saepe tamen efflorescent Pulmones, vitio alibi in visceribus naturalibus latente, praesentem in ventriculo, primae officinae patrone: Apud nos Tabidi hoc anno quam plures comparuerunt & satis sancti sunt, phthisici vero plerique fuerunt ex vitio Pulmonum, quod ex signorum omnium syndrome indubie scimus: Uxor sola famina Tabida fuit, & pro phthisica iudicari, etiam ex spatio putulento: in qua tamen id singulare fuit, quod sine tussi aut siccata, spumam illam à ore colligere sat copiose, post somnum, seu nocturnum seu diurnum: nec tamen dubitare possumus quin ex pectore prodiret, nam capite non dolebat, bene cibum appetebat, nisi salivalem vasa ipsorum hoc effuderint. Ex ventriculo

advocarem, si illius laesi alium indicium exaret: Ventriculus in Tabes pus effundit & per fauces exemit, quemadmodum ex pure foetor duos ventriculi membranos collecto asthma vidit C. *Pis. de serosa coll. p. m. 396.* Foris in exemplo à *Clar. Lindano* allato, pulmonum robore pusculenta materia ad abdomen fuit detrusa, & quia moram nullam fecit in Pulmonibus, his salvis ventriculo insecit pus: Id ut credam, inducor exemplo pueri Phthisici apud *Plenum* lib. 2. *Observ. p. 437.* cujus ventriculus tribus foraminibus exesus fuit, septumque foramine amplo pectus ad pusculis copia & acrimonia, quod ex thorace in abdomen deflueret, has partes & musculos quoque abdominalis ad superficiem cutis erodit: Vixi vice versa ventriculus per pulmones tussi rejecti pendente, singularis adfuit partium conformatio, sicut in avium genere, ubi per parentes ductus transitum fit & pulmonibus ad abdominis cavitates. An talis fuerit homo Phthisica *Lindani* divinare non possum, *Sec. Th. Bartholinus Epist. 73.* Vide supra *Observ. 103.*

OBSERVATIO CXXXIX.

Tabes à Glandula pyloro adnata.

Vidit Ioannes Prevotius in cadavere glandulam, minoris avellanis magnitudine juxta pylorum, internæ ventriculi parti adnatam, quæ membranâ oblongâ pendula nectebatur: hoc sane corpore in pylorum incidente facile, chyli exitus omnino præpediti & varia symptomata oriri potuissent, quod ab apostemate in fundo ventriculi, transitu omni in duodenum paulatim impedito, corpore atrophica consumpto, observavit *Camerrum G. Hieronimus Velschius Observ. xl.*

OBSERVATIO CXL.

Tabes ob ventriculum corrosum ab usu magisteriorum corallorum & perlarum.

E piscopum Uratillaviensem magisterium Perlarum sæpe bibisse, atque demortuo tunicas ventriculi nigras & corruptas apparuisse testatur *L. Hofmannus: Librevins* aliquot exemplis demonstrat Magisterii margaritarum & corallorum, quæ tamen humidiori nativum instaurare creduntur, usu multos in Tabem incidisse, plurimos vita privatos esse, tunicis ventriculi & intestinis acrimonia plane erosis. *Fabritius Hild. centur. vi. Observ. lxxxix.*

OBSERVATIO CXLI.

Tabes ventriculi syderationi succedens.

Jac. Gallus conqueritur de dolore ad umbilicum. Solemnis erat excretio materiæ purulentæ per anum: post liquida & esculenta vomitu rejiciebat: Interit plane emaciatus æque sphacelatum corpus esset. Aperto cadavere ventriculi facies extima erat vermiculata, facies interna corrupta & putris. *Fide tit. de Ventri dolore lib. 3.*

OBSERVATIO CXLII.

Anatome Tabidi post philtum exhibitum, In cujus ventriculo massa dura reperta est.

Baro quidam filium Bononix habuit, qui accepto Philtro totus contabuit ac tandem mortuus est.

Postquam corpus sectum est, massa quædam dura, cornu similis, in fundo ventriculi inventa est, quæ Patri postmodum transmissa fuit: Pater in memoriam Filii demortui, cochlear sibi ex ea massa fieri curavit, eoque frequenter in mensa uti solitus fuit: Accidit autem forte fortuna aliquando, ut cochlear istud embammati ex nasturtio aquatico, cum aceto confectio, impositum dissolveretur, Hioc Nasturtium aquaticum viribus non vulgaribus contra Philtro prædium esse facile conjicere possumus.

S C H O L I A.

Eodem præsidii genere alius quidam Nobilis usus est, atque ex simili morbo testis: Omnia Philtro esse inter se varie differant, hoc tamen habent commune quod humorem efficiant melancholicum: quæ igitur medicamina humorem illum clementer evacuant, & spiritus tristes recreant, indubie in tali

affectu proderant plurimum. *Petrus Monetus Epist. 23. lib. 7. inf. & Epist. à S. Ioh. eluterum.* Exempla curationum affectionum à Philtro exhibitio vide apud *Phil. Salerni* Observ. 70. cent. 1. *Henric. ab Heris* Observ. 11. *Mart. Rudand* curat. 91. cent. 3. *Joh. Hirtman* num. Para. Chimiæ. p. 60. *Joh. Estren* curat. 94.

OBSERVATIO CXLIIL.

Tabes nata à Tumore scirrhoso ventriculi pyloro proxime adhærente.

Rusticus ranam se in ventriculo habere credebatur, In vomitionibus eam ad Gulum usque ascendere, ac exterius eam, ad regionem ventriculi manibus seprehendere dicebat: Interim dormire se, appetere, sed emaciari: Sed anno elabente vir ille mortuus est Macie confectus: Aperto cadavere, tumor scirrhosus, ovi gallinacæ magnitudine, ventriculi pyloro proxime adhærebat. *Fide lib. 3. Tit. de Melancholia.*

OBSERVATIO CXLIV.

Tabes à corruptione omnium viscerum, solo corde salvo.

Georgius Gebhardus variis morbis & longo cruciatus detentus per 13. annos, vix ægra trahens membra, vehementer contabescente universo corpore, frustra hinc inde consultis Medicis, tandem obiit.

Dissecto corpore solum Cor illæsum reperi, cæteræ partes erant fætidæ & putrefactæ, Ventriculus inanis proterus erat, omni chylo destitutus, nec ullam aliam humorosam in se continens materiam, & consequenter occlusus quasi & parvus. In vesicula felle, & meatu ejus choleram ad intestina deducente, obtulit sese massa quidam nigra, specie vitæcorum lapillorum, qui pileis & eorum fasciis & redimiculis, ornatus gratia annecti solent, adeo quidem ut bilis reciproco gradu, propter obstructionem, spinam dorsû perforando; ad pedes deflueret, ubi concitravit ampullas ac vesicas ovi columbacei magnitudine, vel etiam majores, tantum ardorem ac dolorem moventes, ut mirum sit quod non singulis horis æger in syncope incidere, quibus apertis nihil nisi cholera ichori commixta exivit. Menses necretum à tinctura istius cholæræ undiquaque putridum erat. In renibus deprehendi materiam calculosam satis multam, præcipue autem in sinistro, ubi apparuit lapis haud exiguus, ita ureteri acuta sua cuspidè insertus, ut omnis urina ad vesicam transitus sit interceptus. Pedes illius magis quam in leproso squalidi erant. *Ex Joh. Fabri Observat.*

S C H O L I A.

Adeo ut bilis propter obstructionem, (cuius) remedium Pechol. lib. 6. cap. 8. vix ullam se animadvertisse Atrophiam asserit, in qua viscera præter intemperiem, obo multa quoque humorum, præsertimque biliosorum, colluvie scæterent, ac eorum plerumque copia distenderetur: Hæc igitur causa quoniam naturalem spiritum & calorem proterit, vix ut utilem

sanguinem gignat, in Atrophiam præcipitur. Per hos affectus, aut, tamen si alimenti copia suppetit, & venæ multo humore turgent, corpus tamen non alitur, quia is humor caloris & substantiæ bonitate, sæpe etiam fibris, quibus contextus, destitutus, partibus neque adhibere neque assimilari potest.

OBSERVATIO CXLIX.

Tabes à depravata constitutione viscerum omnium naturalium.

Lia Euvouts annor. 59. tandem Tabifica febri & alvi fluxu consumpta obiit. Ad eam ventriculi infirmitatem postremo devenerat, ut nihil alimenti aut medicamenti sustinere posset, sed illico omnia vomitu rejiceret.

Cum cadaver aperiremus, deprehendimus Hepar flaccidius foris pallidum, intus prorsus exangue: In lobi sinistri parte supera, juxta diaphragma, steatoma callosum, ovi columbini magnitudine: inferius arte coalescat cum ventriculo, Omentum plane erat consumptum, omni pinguedine illiquata à febris perenni calore: Colon erat admodum angustum, sed vasa, quæ per omentum colo & fundo ventriculi inferebantur, calami anserini amplitudine erant. Lien pallebat, palni magnitudinem non excedebat, flaccidior & exanguis, Vas breve, quod ex liene ventriculo implantabatur, in duos ramos amplitudinis calami anserini divisum erat. Ventriculus flatu potius turgebat, pylori substantiam callosum steatoma obfidebat, non tamen via in intestinum inde occludebatur, nam etiam digiti insertionem admittebat: Pancreas totum schitrosum fitmter pyloro adnatum erat. Vena Porta steatomate calloso premebatur, superius inferiusque à pyloro & pancreate, Pulmo pallidus lividus maculis sparsum oppletus erat: Pericardium aquam pallidam vix cochlearis quantitate continebat: Cor erat flaccidum, foris pallidum, intus exangue. Pteris nucis juglandis magnitudinem non superabat, sicut solenni naturæ ordine in ejusmodi angustiam contrahi solet, cum menstruo sanguine non amplius humectatur. *O. Heurnii Observ.*

S C H O L I A.

Atrophie causa mortifera constitit in maligna hepatis viscerumque omnium naturalium intemperie, cum etiam interceptione nutrimenti ex venæ portæ compressione, quippe hepar infirmum, præcreant sanguinem prævum & aquentam, reliqua viscera, & eos ipsum ita infirmaverat, ut sanguinem quem ad nutrimentum officiumque suum recipiebant,

nec talem qualem recipiebant conservare, nec etiam in melius mutare possent. Unde deficient vitali vigore in toto corpore, lenta febris exorta misere miseram attriverat & tandem exterminat: hinc tandem tanta ventriculi infirmitas ut omnia vomitu expelleret. *Idem.*

Tabes à Glandularum lactearum lumbis non vitio.

D Est illi Glandulæ nostræ patet unde pendeat atrophia partium, præsertim thoracicarum, quæ ex glandulis lacteis chylum sugunt: Premitur subinde Receptaculum lacteum, & æquidam chyli remoratur, obstruitur, & inflammationes alioq; tumores patitur: Vidimus id in cadavere humano, in quo ad Atrophiam omnia, excepto hepate sano, vergebant, flaccidis pulmonibus & marmoris instar variegatis, bubonibus in inguine, gangræna in pede, & aliis pessimi habitus indicis, Sana erat altera glandula lactea, rubra altera, quasi inflammata & phlegmonodes: unde hepar quidem sanum & multæ mesaricæ lacteæ, ærhoracicæ lacteæ non ita plenz aut tumentes chylo, *Thomas Bartholinus Historia Anatom. de lacteis Thoracici cap. ix. §. viii.*

S C H O L I A.

P Resistit usus Glandularum lactearum est, ut ex lacteis mesenterii venis chylum excipiant aliquem, cumque nonnihil præparent beneficio calidorum vasorum vicinorum, arteriæ venæque, & breviter præparatum ad thoracicas aliasque partes protrudant. Considerari ibi chylum sensus docet, illamque recipe-
te ex lacteis mesaricis, pressione illarum innoteceat:

sensum denique promovere, ramificatio lactearum exinde producantur facit fidem: imo compressio mesenterio, & vulneris lacteis in thorace, vel ligatis, vel digito adactis, chylus illic vel prodit, vel in tumorem rolli vicinum mesenterio locum

*Sec. Vide illarum hysteriam sup.
yn. doli libri.*

OBSERVATIO CXLV.

In quibusdam morbo consumptis Pancreatis tunica à parenchymate abscissæ visæ est.

P Ancreas membrana tenui succingitur, quæ in morbis humorum affluxu crassior facta, ab ipso Pancreatis corpore abscedit, ac veluti saccum quandam constituit, ut in corporibus morbo consumptis sæpius à nobis observatum. *Biolanum Anthropogr. lib. 2. cap. 14.*

OBSERVATIO CXLVI.

Atrophia in puero à Pancreate scirrhus.

P Ancreas ad instar aliarum glandularum Scirrhus omnino evadere posse dubitare desii, postquam in puero ix. annorum, Atrophia extincto, illius constitutionis id reperi: Hoc tamen addere convenit, non omnes ejus partes æquali ratione induratas fuisse, cum tres quatuorve adhuc extarent, incertino vicinissimæ, vix à statu naturali recedentes. *Gerardus Blasius Observ. Anatom. p. 127. Observ. Med. 23. parte 1.*

OBSERVATIO CXLVII.

§. 1. Mæcies à lumbricis longissimis in Rene repertis.

C Alculis Renes domicillum præbere quam frequentissimum, tam rarum Lumbricos hic colligi: In vito maciata ulnæ, & quod excedit, longitudinem habentes duos aliquando reperi: coloris erant rubicundi, quasi ex annulis plurimis affabre junctis constare videbantur. *G. Blasius Observ. Med. 12. Parte 6.*

§. 2. Juvenis à puericia dolore renem erat oppressus, tandem Tabidis vitam finit: In utroque renem cavo vermes sunt inventi. Vide l. 3. tit. de Lumborum dolore.

§. 3. Renem hunc illum in canibus substantia sua non solum privari, verum & lumbricis sæpe plurimis variisque, loco consumpto se exhibentibus, repleri, frequens Anatomis: At in homine talia evenire rarissimum: vermes duos, ulnæ ad minimum longitudinem habentes, rubicundioris coloris, aquoso liquore scatentes, similes omnino iis quos in caninis renibus reperi diti, unica tantum vice in emaciato senè reperi mihi concessum. G. Blasius Observat. Anat. p. 125.

S C H O L I A.

Gignunt vermes ex materia excrementitia & putrida, chylifera, fecali, purulenta aut pituitosa, sæpius in intestinis, aliquando intra aures, caput, pedes, uterum, in ulceribus & vulneribus sordidis. Multi è neotericis dictis partibus Renes annumerant & vesicam, quod fidem meam superabat, lonius enim etiam testimonio plurimorum esuditotum, quibus id

impossibile judicatum, quod amara omnia, salia, acida & acida à putredine vindicent, nedum eam incurant, & proinde vermium generationi inopiam: quare absurdum visum eos intra dictas partes posse subsistere, quia renem ope transcolatio fiat feri actis & salis, cujus vesica alveus est & receptaculum: Oculis tamen fidem facieotibus negare iniquum

quam fuisse Admirationem fustulit consideratio varietatis leblastiarum heterogenearum, ob quam in olivis & nucleis periculis, amaritie insigni pumiditatis, reperitur; in intestinis & aurbis, amarum bilem continetibus. Imo viridulum vegetabile, acutum intelligo, putredinis omnis inimicum, ejusmodi vermium productionis epistolum fuit anno 1649. quo tempore acetum potentissimum, quod terram subigen & fermentans in tuncorem attollebat, vermiculis scatebat deprehensum. Indicium pestis subsequens universam Galliam Narbonensem vastans: Vermes excretos per vigam vidit Dom. de Sillol, Medicus

Mont'Elimienensis, à puero quinque annos nato qui cum veribus pluribus diebus laborasset & febre ardente, fugaci ichuria coarctatus fuit; subsequente postmodum cum urinis lumbis pedalis longitudine excretionem. Postidie similibus veribus affectibus, similem eiecit vermem: modus ciliis, per apertum de patens penis canalem, admirationi non erat illis, qui animadvertens ejusmodi animalcula per foratis intestinis, quo liberiore scire fuerant, per inguina eusse, per umbilicum, & per epigastri fistulosa ulcera. Idem ibidem.

OBSERVATIO CL.

Atrophia à verme in altero Renem, & Calculo in Lumbis.

ANno 1595. Ernestus Archidux, Belgicarum Provinciarum Prorex, obijt nocte intercedente xx. & xxi. mensis februarii die, anno ætatis xlii.

Ejus cadavere aperto, Cor, Pulmo, Jecur nihil virili præ se ferebant: In lumbis tantum mediocris magnitudinis calculus repertus est, Et in Renem altero vermis oblongus & viscus, qui visceris illius parenchyma adeo erosit, ut parvo tempore Princeps emarcuerit totus, hinc superesse diu non potuerit. *D.M. Janseus Mercurii Gallo Belgici Tomo 2.*

OBSERVATIO CLI.

Anatome Canis Atrophis confecti, cujus renis sinistri parenchyma vermis depascebat.

ANno 1610. Montspelli, medicinx aliquot candidati, canum frequentes dissectiones instituebant, indagaturi insignium vasorum propagines & ramificationes, ab illis non abimiles quæ hominibus insunt. Occurrit forte canis leporarius, macie omnino confectus, quem trucidare misericordie esse crediderunt; securi ab adipe vasorum distributiones non occultatum iri: Venæ Emulgentis insertionem in Renem dextrum inquisitur, vix novacula renis superficiem attigit, ecce exiit vermis prodigiose magnitudinis, qui convolutus totum parenchymatis exeti spatium adimplebat, cujus ne minima vestigia apparebant. *Jacobi Corvilliaris Observationum Særo Chæurg. Gallicæ editarum §. viii.*

OBSERVATIO CLII.

Tabes à corrosis duabus vertebribus Lumbaribus.

Quidam in Lumborum dolores incidit, ac totus Emaciatius interijt. Illævis renibus duæ lumborum vertebrae corrosæ sunt tepertæ. *Vide tit. de Lumborum doloribus lib. 3.*

S C H O L I A.

TAbes Dorsalis est nostro hoc sæculo nomen unisum, hanc Hippocr. ejus mentionem facit, & morbum hunc ex profecto tractans duplicem ejus speciem assignavit, sc. unam ex immoedia venere, & alteram à destillatione in spinam docti: Quod ad posteriorem hanc spectat, sæpius observavi quidam dolore circa Lumbos, imo interdum in toto Dorsio miserrime vexatos fuisse, qui cum aliquandiu ita laborarent, postea Gibbiæ Claudii evaserunt, ac ultimo in toto corpore, excepto capite, insigniter contabuerunt. Cujusmodi affectus causa proculdubio in hoc consistit, videlicet quod impræmixtus humor, sive materies quædam incongrua & morbifica, cum sacco nervo per medullam spinalem descendens, in nervorum vertebralium ramos incurtebat, proindeque ab initio ob

fibras vellicatas, dolor fere continuis exoritur. Dein ob quidam à fibræ carnis solutis, oppositè vehementius contractæ spinæ vertebrae quasi dum contorqueant: & denique, si quidem spiritus animales nervos & fibras ad unumquemque & membra pertinentes hanc uberi facili copia actarent, ob nutritionem frustratam totius corporis emarcescentia succellit. Profecto, cum Liqueor nervæus, & spiritus animales à spina dorsali in totum corpus hanc plene & libere dispensantur, proinde maior sæpenumero oritur: hinc abscessus & ulcera circa lumbos vel os sacrum excitantur, quoties liquor nervæus absumunt nimis, aut profundant, Atrophiam in toto, aut saltem in partibus inferioribus inducunt. *Tb. Will. Pharm. tom. 1. par. 2. §. 1. c. sup. 5.*

OBSERV.

OBSERVATIO CLIII.

Tabes à Tumore musculi lumbaris lateris dextris adnato, cum annexis steatomatis, atheromatibus, meliceridibus.

Iuriconsultus Parisiensis sicca tussi vexatus, Macie universali affectus & diarrhæa diurna, post repetitas purgationes & venæ sectiones me accersiri jubet. Eum attente considero, & post colloquium aliquotusque protrahum, decumbere jubeo quo latera, dextrum præsertim, commode pertractare liceret, suspicatus aliquid in jecore vitii. Admotæ manûs, indolentem tumorem percipio nucis juglandis magnitudine, (sed forti digitorum impressione & profunda, proque partis sensus tolerantia) infra costas nothas in jecoris regione. Prognostico emissio, asserui tumorem illum ad capitis magnitudinem perventurum, imo majorem, quod eo loco situs esset, quo intus nequicquam reniteretur, ad extra vero augmento prohiberetur à caligatum cingulo & thorace. Ulteriorem sanguinis missionem prohibeo, eo quod iudicaretur vitam tamdiu productam iri quamdiu sanguinis penuria non adesset. Opinionem & prognosticum meum impugnarunt venisectæ, qui imaginatum esse tumorem objiciebant, iteratisque venæ sectionibus ægrum vexabant. Post dies quindecim iterum advoco, atque ægrum in deteriorem statum deductum video, tumorem auctum & digitis palpatibus manifestum, globuli sphaeristerii magnitudinem æquantem. Mortem prædico, Chirurghi vero revocati, agnito tumore, Sanguinis missionem perperam iterum instituunt, sed paulo post mors succedit.

Apertum cadaver fuit à Riolano Chirurgo, qui solus, consultatione habita cum tribus Medicis ac duobus Chirurgis ampullatis, contendebat tumorem neque mesenterium neque pancreas obsidere, sed musculorum cuiuspiam viscera colligantia adnata esse, si enim, ajebat, situm in pancreate aut mesenterio obtineret, ad motum corporis huc illuc nutaret, illius inclinationem sequutus, alvi excrementa cohæberet, quæ liquida & inconcocta dejiciebat æger: Obviavit ergo illi secanti se obtulit tumor pendulus, & annexus lateris dextri musculi lumbaris, magnitudine capitis vitulini, cui plurimæ adnatæ erant cystides, aliæ materia puli simili refertæ, aliæ sebacea, aliæ lardum, aliæ mel referente, aliæ erant duræ, variæ consistentiæ & coloris ab invicem secretæ. Torum corpus exangue erat, sed plurima aqua reperta, ad mensuras duas Parisienses. *David Lagneau lib. de Sanguinis missione p. m. 385.*

S C H O L I A

Tumor annexus musculi lumbaris) Ubi situm habet Receptaculum Pecquetianum dictum, Glandulas Lacteis Lumbares vocat Cluiff. *Bartholinus*, quoniam situs est infra centrum mesenterii, circa lumbares vertebrae, inter earundem musculorum fascias: non profors medium lumborum locum servat, sed subinde ad dextrum deflectunt in homine. Ab hoc nomine compressum fuit dictum Receptaculum, vel Glandula Lactææ, unde intercepto chyli transitu Atrophia orta est. A compresso Receptaculo Atrophiam par-

tium dedecit laudatos *Bartholinus* cap. 9. *Traet. de Ductu Chylifero*: Unde, *at*, Atrophia partium, præsertim thoracicarum, quæ ex glandulis lacteis chyli surgunt: premittitur subinde Receptaculum lacteum digito chyli remoratur, obstruitur, & inflammationes aliisque tumores patitur. Ad hocian Tumore ille incrementum fuit p. n. ipsius Receptaculi, quem pendulum fuisse narravit, annexum musculis lumbaris lateris dextri: Cystides annexæ, ipsæ Glandulæ lumbares, quarum chyli varie crassiores sunt?

OBSERVATIO CLIV.

Atrophia ab inflammata altera glandularum Lumbarium, cum Pulmonum vitio.

Atrophia partium, præsertim thoracicarum, quæ ex Glandulis lacteis chylum surgunt, ex harum vitio nasci potest. Premittitur subinde Receptaculum Lacteum, & digito chyli remoratur, obstruitur, & inflammationes aliisque tumores patitur: Vidimus id in cadavere humano, in quo ad atrophiam omnia, excepto hepate sano, vergebant, flaccidis pulmonibus & marmoris instar variegatis, bubonibus in inguine, gangræna in pede & aliis pessimi habitus indicis: Sana erat altera Glandula lactææ, rubra altera quasi inflammata & phlegmonodes. *Bartholinus Tit. de Ductu Chylifero cap. 9.*

OBSERV.

OBSERVATIO CLIV.

§. 1. *Anatome canis, Tabidi à rupto ductu Thoracis, chylum in venas subclavas vehente.*

Quia nonnulli in eodem cum veteribus errore versantur, venasque mesaraicas chylum ex intestinis excipere confiderent statuunt, Ipse ut hac de re certior fierem, seferam aliquando impendi operam, atque non uno experimento tandem mihi constitit totum chyli penem nulla alia via quam per ductus chylicos in sanguinem infundi: Si enim curfus ejus per vasa thoracica impediatur, animal qualicunque cibo satiatum intra paucos dies fame penitus interibit, quod in duobus canibus, diverso licet modo-expettus sum: Alterius enim thoracæ dexteri lateris intra duas costas inferiores aperto, digitum immisi, & ungue velut in settam secto, commune receptaculum tribus horis à pastu valde turgidum perfregi & laceravi, ut chylus in cavitatem thoracis exitu dato, transitus ejus in ductus chylicos penitus interciperetur: quo facto & confato vulnere, animal hoc cibo, quantum capere voluit postea satiavi:

Cum autem intra paucos dies exspiraret, & à me statim disseccaretur, ventriculus atque intestina valde repleta, quin & venas lacteas chylis plenae inveni, nihil autem ejus in toto ductu thoracico apparuit, verum in eo pectoris latere, in quo commune receptaculum disruptum est, duæ libræ chyli tepetæ sunt: Unde certo constare arbitror ob præpeditum chyli per ductus thoracicos transitum, animal hoc, ventriculo licet cibus referto, utcumque fame perisse.

§. 2. Quod ut certius redderem, alium canem simili modo, sed in adverso seu sinistro latere, intra 3. & 4. costam superiores, perfodi, qua in regione ambo ductus chylici in unum plerumque truncum coeunt, qui deinceps ex latere œsophagi inferiore, ubi musculus subitrato incumbit, versus venam subclavam sub communi pectoris tunica incedit: Immisso itaque per vulneris orificium digito, ductum istum pariter diffregi, quo disrupto chylus in cavitatem lævi pectoris exire, ulterius veto penetrare neutiquam potuit: quare vulnere ut prius curato, canem per paucos dies bene pastum detinui, ex quo tempore elanguescere cepit & paulo post obiit.

Cum autem thoracem ejus disseccarem, claustrum filud pectoris, ubi ductus iste disruptus fuit, chylis penitus repletum & pulmonem lateri isti agglutinatum inveni; Quo autem certior forem canalem istum usque adeo petruptum esse, ut nihil chyli ulterius deferre potuerit, aquam è siphone in ductum chylicum inferius injeci, verum ultra quam canalis iste petruptus fuerat, penetrare non potuit, sed in cavitatem pectoris tota exiit: Claro satis argumento chylum per venas mesaraicas non intrare, neque ullam aliam dari viam qua sanguini misceatur, cum animal ex transitu per vasa thoracica impedito tam certo intecteat: Quia & hoc denique ante omnia confirmat chylum in venas mesaraicas non influere, quia si sanguis ab animali ita tractato post diem unum aut alterum adimatur, nihil chyli in illo apparebit, licet paucis antea horis optime pascus fuerit, quod aliter omnino fieri debuit, nisi influxus ejus hoc modo prorsus interciperetur. *Richardus Lower Tract. de corde c. 5.*

S C H O L I A.

Hinc colligit Vir Clariss. Hepatis patrociniū neminem posthac debere luēpere, ut ipsi sanguificationis munus possimino alteratur: Experimento inlupet consciens ut Chylus nulla alia via, nisi per *Ductus Proprius* sanguini intulatur & commisceatur in postum credatur: Quemadmodum enim doctib. istis disruptis chylus omnis in cavitatem thoracis effluit, ita si ductus iste in lævo pectoris latere (orificio ubi prius factus, immisso digito per horam comprimitur, chylus, quia alius in sanguinem transitus non datur, commune receptaculum, quin & vasa lactea omnia in mēterio, atque ipsa parte ventris, ab hac obstrukcōne adeo turgescunt & distendantur, ut nunquam clarius aut perspicue magis ostendi possint, liquidum jucundissimo spectaculo constat quales eorum fabrica, valvulae, anatomotēs, quam variè præterea meandri eorum fuerint & quam densa serie eorum intestinorum ambirum & inspecticem perreptent, quam infra Receptaculum multipli-

ci ordine dispositæ, non secus ac uniones in puellarum monstruibus ingeant; Quin & observatio dignum ex obstrueto hoc ductu thoracico, chylum in vasa lymphatica, tum in pectore ubique & abdomine disposita, renitentes licet valvulis, adeo insinuari & retro urgeri, ut primo fortan intritu incautus imponere, & *Ductus Isti Rursus* adesse inuadeat: licet revera non allundat hoc excoit, quam quod uccus ille albus propria via præpeditus, in vasa illa regurgitat, non aliter fonsa quam ab inundante mare flumina in alveos suos repressi irruenti ætibi locum cedunt: Atque ideo uti resisteret mari flumina in eum intra ripas suas subdunt, ita remora ista compellens, & chyli in sanguinem introitu resistunt, cuius iterum in ductus thoracicos refluunt, & in vasis illis lymphaticis vultum sui velligium post se relinquit.

Ubi ubi chylus ulterius deferri etc.] De chyli per venas lacteas motu læto, & morbis inde sequi solis vide *Spirum de lē Pratt. lib. 1. cap. 17.*

§. 3. Illustr. Baro circa medium dorsi vertebram sclopeto laceratur: Post 14. dies observatus in linteis copiosus albicans humor, corpus in dies Tabescebat: Pulmones juxta vulnus insignem putredinem conceperant &c. Vide lib. 4. tit. de vulneribus.

OBSERVATIO CLV.

Tabes ab ulceratione muscoli mastoidei ducta, cujus pus per venam jugularem ad dextrum cordis ventriculum penetraverat: A Liene indurato & magno; Hepate consumpto bilioſaque materia reſerto, Pancreatē magno & ſcirrhoſo &c.

Puer duorum annorum erat macie ita confectus, ut vix hæreret ossibus: Ad latus sinistrum, in musculo mastoideo exulceratio erat, quæ usque ad ipsam jugularem venam penetraverat, eamque cortodendo sic extenuaverat, ut puris subtiliori materia percolasse per eam videretur: non exiguum namque ejus copiam sanguini permittit in dextro cordis ventriculo, corde alias sano & integro, inveni; quam, ut dixi, transcolatione eo pervenisse suspicatus sum: sed unde puris ejusdem crassiusculi, bene cocti, copia, item magna è regione in dextro latere, ad eundem musculum, Intus & foris sanum, penetraverit, ego divinando assequi non potui: Lien præterea induratus erat & magnus, pendebat enim uncias septem & tres uncie quartas: Hepar contra, consumpto fere parenchymate, non nisi quinque uncias & quadrantem ponderabat: bilioſa id plenum erat materia, quæ propter obstructionem ductus communis in illum redundaverat; *bilis interius drachmas undecim* (magnum pro ea ætate pondus) exæquabat: *Pancreas magnum* erat & scirrhosum, quod in chronicis morbis sæpe contingere observavi: Succus ejus tam acidus, ut in duodeno bili admixtus, tamen adhuc insigniter eum saporem retineret: hac aciditate sua ita ventriculum & intestina perederat, ut dum inflare ea vellem, ad minimum distensionem rumpebantur: Non immerito igitur Clar. Fr. de le Boë Sylvius in Praxi sua plurimorum morborum causas refert ad hanc succi illius aciditatem, Th. Kerckringius observ. Anat. 65.

S C H O L I A.

Pancreas magnum & scirrhosum] Atrophiz causam inde quoque deducit Riolanus Anstrop. l. 1. cap. 15. Pancreas venæ portæ truncum firmo amplexu comprehendit, unde fit ut multo humore inebriatum, aut scirrhodes factum, truncum Portæ costringat, quod chyli affluxum intercepti, qui in mæstacis sanguinis sudimentum adeptus, cum non possit ad Hepar permeare, rubefactus reſtuit ad intestina, unde sensim coepit contabescit suo genio defraudatum.

Lien induratus erat &c.] Communicat traditur substantiam Lienis esse concretum quoddam corpus sanguineum, fulcimen præbens vasis per illam decurrentibus, quod levi attritione facile in fluxum dissolvitur: Verum hanc opinionem penitus destruit Malpighius, qui hujus visceris mysteria microscopiis accuratissime perſcrutatus, scribit lib. de Liene cap. 4. totum Lienis corpus esse membranarum congeriem, in cellulas & concrementos efformatam seu distinctam, ac non esse corpus tam densum ac describitur, sed rariorum: Cognitionem istam singulati artificio coſtitutus est, Lienem scilicet per ætatem & raram spiritum ad magnam inordinatam inflando, & sic inflatum exsiccando: ita enim dicit conspici posse totam lienis molem ex membranis finibus seu cellulis, tanquam favis quibusdam esse congeneratam: Illarum autem cellularum ortum, varietatem ac mirabilem figuratorem, ibidem legendum, eleganter & lauto sermone describit. Idem in Lienis substantia primus observavit multas glandulas notari dignas; de quibus citato lib. cap. 5. agit: Profecto malum debemus oculatissimo Malpighio, qui maximas cognitionis Lienis tenebras suis Microscopiis discussit, ut usus ejus anachas dubius, tam plane innocuat. De Diemerbroeck Anat. lib. 1. cap. 18.

Lien induratus. Hepar bilioſa plenum materia, Pancreas ſcirrhoſum &c.] De horum viscerum eſſentia ad anatomiam naturalem hæc commentus est J. C. Clar. cit. tit. 1. 16.

De actione Hepatis & Lienis, atque de usu Bilis, Succus Pancreatici & Lymphæ discrepantes sunt opiniones, Cum autem nemo tantorum Viscerum dignitatem & Succorum necessitatem perceperit, tandem tempus erit ut quæ tot sæcula in obscuro lauerunt facia in lucem proferantur, ut pote ex quorum cognitione maximum toti medicinz lumen conferti, malorumque morborum obscuritas & ignotas causas clarissime innoscere possent ætatem est.

Actiones Hepatis, Lienis & Pancreatis conspirant in unum finem, & sanguinis atque chyli fermentum simul præparant, in cuius conficiōne horum trium officium necessario concurrere debet, cum unum sine altero negotium hoc absolvent nequeat.

Sicut farinæ triticeæ aqua tepida subactæ fermentum admiscetur, ut per illud crassiores ac terrestres frumenti particule dissolvantur, & spirituosæ particule in terrestri illa compage coſopizæ atque occultæ latentes attenuentur ac suscitentur, sicque tota panis massa, attenuatis istis spiritibus jam perſusa, levior & concocta facilius evadat, ita etiam Chylo & sanguini venolo fermentum admisceri necesse est, quo spirituosæ in illis latentes particule attenuentur ac suscitentur, sicque tota massa ad hæmatosin & nutritioem aptior fiat.

Illud autem paucis Fermentum (ex cuius cognitione facilius ad fermenti, sanguinis chylique noticiam pervenietur) communicat confusum ex farinæ aliqua quantitate, quæ subligitur cum aqua tepida, eique admiscetur aliquantulum salis de aceti, atque in loco tepido affertur, donec spiritus salis subactæ a calore nonnihil volatiliscentur, & massæ fœminæe particulas pervadant, eisque dilant ac separent, sicque totam massam subacidam & fermentantem efficiant: Tunc hujus fermenti acidi pauca frustula, magnæ massæ fœminæe tepide subactæ immittit, totam massam fermentantem facit: Nam fermentacæ illæ particule

culæ se per totam massam explicant, omnesque partez facinoræ particulas incidunt, attenuant, spiritusque in his latentes dissolvunt. Nostræ etiam flores cerevitiæ fermentantur (qui valde acris & spirituosus est, magnamque vim fermentaceam redolet) fuliginæ massæ admiscetur: Alii forte alio utuntur fermento, Sed omne fermentum, qualecumque fuerit, constat ex rebus subtilibus, subacidis, acerbis & corrodenibus, moderato calore suis seu liquidis, ac nonnihil volatilibus: quæ si effiorescentes ac densiores sint, cum lentius dissolvantur, earumque vis se tardius exercet: debent etiam longiore tempore fuliginæ materiz admixta esse, antequam illam fermentent, sicut in primo fermento descepsio contingit, quod per multas horas, & sæpe per totam noctem admixtum esse debet ut operationem suam convenienter exercat: Si vero per quandam sulphuratum particulatam admisionem, spirituosus ac volatilis magis sint, citius fermentant, ut videmus in flore cerevitiæ, qui unius horæ, aut sesquihoræ spatio, illud opus absolvit: quippe spirituosiores acies particulas, cum in hoc à materiâ, cui inhaerent, liberiores sint, atque hinc magis penetrantem vim habeant, citius operantur, & crassas fuliginis particulas brevi dissolvunt, spiritusque latentis citius succedunt, quod adhuc fortius peragunt si paululum mellis isti fiori admiscetur: Sed horum nihil perficietur sine calore moderato, ut pote quo salte particule ad modicâ subaciditatem qualiterem, & aliqualem volatilitatem deduci debent.

Eodem modo se res habet in chylo & sanguine venoso, qui si ante hæmaturon non attenuetur & præparetur per admixtum fermentum conveniens, tunc in corde non facile spirituosum, id est, spiritus in his consopiti latentes non facile dissolvuntur à crassiore & ferocia materiâ, sed consopiti manent, atque sic constituitur sanguis crassus & aquosus, ad corpus alendum, parteque corroborandâ parum utilis, unde tunc corpus totum fit languidum, & actiones naturales atque animales male procedunt.

Hoc autem chyli & sanguinis fermentum conficit Hepar, cui tamen fermento hepatico speciem pro chyli, è ventriculo primus effluens, præparatio, in intestino duodeno admiscetur succo Pancreatico.

Materiæ æque hepatis illud conficit, est sanguis venosus, è venâ gastricâ & mesentericâ per portam in illud influens, cui immiscetur liquor acris, subtilis seu subacidus, in liene ex arterioso sanguine per arterias, & ex spiritibus animalibus per nervos influentibus (hos spiritus saltem sanguinis particulas à sulphureis magnâ parte separare ostendimus lib. 2. cap. 11) constituitur, qui per ramiu splenicu in portam, sicque una cum dicto sanguine, cui admiscetur, in hepate deferretur: Atque mediante isto acris & corroden te succo, per hepatis speciem suam seu coctionem, spirituosus, cum sulphure tam salis, in isto venoso sanguine latentes particule dissolvuntur, attenuantur, ac simul etiam nonnihil acris & fermentantes sunt; earumque tenuissima quædam pars, instar aquæ limpidissimæ ac tenuis, mediâniibus glandulis conglomeratis, in cava hepatis parte præcipue suis, æ reliquis crassiore sanguinis massa secedens, per innumera lymphatica vascula ex hepate deferretur ad varias venas, angustiorum venosorum velius correndum in præparatura: ac maiore sui parte fertur ad vasa chyliifera, ut in illi chylo influenti necessarium præparationem ad fermentationem in corde futuram inferat: In quem eundem finem etiam fermentatæ quædam, saliva ab ore, ut in saliva subacidave lymphæ & glandulis acillarum, linguarum aliisque variis, eodem deferretur, &

nonnihil succi pancreatici tenuioris ex intestinis, una cum chylo vasa chyliifera subit.

Sicut autem in cerevisiâ fermentantem plurimi spiritus jam succiantur cerevisiæ toti permiscetur, eamque spirituosam, foveæ & apram faciunt, quæ ab affluentiâ ventriculi facillime attenuant, coqui & digeripossit: sic etiam modis aliis spiritibus crassioribus magisque viscosis cerevisiæ particulis intricari inhaerentes, cum illis ad superficiem ascendant, & bullientes, seu potius fermentantes ac spumose cum strepitu è vase erumpunt; quæ spumosa materiâ saporem amarissimum, nonnihil acrem, quasi levi aliquo dulci sapore permixtum habet. Cerevisiæ florem vocamus, suo bilem, eamque colligunt, ut illam novæ cerevisiæ rursus admiscant, ita quoque in Hepate negotium procedit, & fermentaculi spiritus acerbos, crassiores ac viscidiores sulphureis succis admixti, (sulphur enim viscidum est) & validius ebullientes seu fermentantes, cum ob illum succorum, quibus inhaerent, viscositate glandulis conglomeratis, ex quibus vasa lymphatica subire nequeant, & ob acrem ebullitionem à sanguine separantur ac recedant, segregantur cum succo cui inhaerent, & amaritudinem induunt, ac bilis nomine designantur: Quæ bilis, mediâniibus glandulis acinis, per porum biliarium & vesicularum tellis, paulatim ad intestina defluit, ut in his una cum succo pancreatico permiscetur crassiori massæ, nempe alimentis in ventriculo coctis, & jam ad intestinum defluentibus, ut illam quoque effervescente faciat atque hic partes tenuiores chylum constituentes, à crassioribus dissolvat ac separet, æque in attenuet, ut in angustia vasorum lacteorum oculo impelli commode possint.

Eum in finem delabitur hæc bilis per ductum cholidochum in intestinum principium, scilicet, in duodenum, ibidemque statim commiscetur cum succo pancreatico eodem defluente, æque sic massæ alimentariæ in ventriculo coctæ, ex eoque jam elaborati mox admiscetur, eamque efferverescere facit: Et quia in primo introitu acior est, atque integras vires obtinet, & propter succi pancreatici acidi admisionem, mox ad ebullitionem parata existit, hinc in isto maximam facit efferverescere, unde lacteus succus massæ in ventriculo coctæ inhaerens, maxima parte in intestino jejunio promptissime separatur, ac per innumera lactea vascula (quæ majore copia huic quam aliis intestinis irradicanatur) citissime propellitur ad receptionem chyli, sicque intestinum illud plenius vacuum & jejunum reperitur: in sequentibus autem intestinis, ob dissipatum in principio tenuissimos fermentaceos spiritus, paulatim citior & minus efficitur efferverescencia, ac tardior chyli tenuioris æ reliquis massa separatio, atque hinc illa etiam pauciora obtrahunt vasa lactea: Denique residuum istius fermentacæ materiæ (cujus subtileiores partes & vires per longam efferveresceniam in intestinis tenuibus factam plurimum perierunt) in crassis intestinis alimentorum crassis fecibus immixtum hærens, quia lentæ jam resolvitur, eadem quoque & tartorem, idque nonnihil longiore mora, in his fermentativam quandam efferveresceniam facit, quæ facultatem laborant emovendo & actionem reddendo, intestinis molestiam infert, æque sic ad rejectionem irritat: Et quia tunc fit illa efferverescencia, hinc etiam raro sunt istæ irritationes ac faciem dejectionis, ita ut homines communiter non nisi semel aut bis in die alvum depellant: Atque propterea illud residuum fermentum majorem aut minorem acrimoniam obtinet, hinc in fecibus citiorem aut tardiorum, necnon majorem aut

minorem fermentativam effervescentiam facit, unde tunc crebriores vel majores defectiones succedunt.

Utrum dicta Bilis magis acris & fermentacea evadat, non potius tota minor ex hepate per portum bilarium recta profuit in intestina, sed bona ac remiore sui parte ex hepate per radices felles deferretur in folliculum felleum, in eoque aliquandiu sublitit, ut ex istius loci proprietate per moram illam acres spiritus in ea magis succulentur & exalantur (sicut fermentum panis per moram in loco tepido majorem acrimoniam acquirit) atque hinc in cysti nonnulli effervescens ad intestina deitatur.

Sanguinis autem venosi, è quo fermentum in hepate confectum est, superflua & maxima pars, quæ in bilis aut lymphæ naturam mutari non potuit, nec debuit, fermentacea fermenti confecti qualitate abunde perfusa, in venam cavam profuit (quod fermentacea, atque in primis biliosa qualitate sanguis ex hepate in cavam profertur perfusus sit, liquet si in recentem occiso animali mox hepate à cava abscindatur, & tunc ex eo effluens sanguis colligatur, atque spiritus omenti affundatur, statim enim aeruginosus evadit, quod in nullo alio sanguine contingit, atque sic lactem est admixtum biliosum fermentum detegitur) cui desuper è venis subclaviis occurrit à lymphâ præparatus & attenuatus chylus, vel eo absente solus lymphæ liquor, subclaviarum venguntur permixtus, atque ita simul dextrum cordis ventriculum sentim ingrediuntur, in eoque ab præviam illam convenientem præparationem seu attenuationem, præiur in spirituosum hâlium sanguineum dilantur, sicut pulvis pyritus admozo igne protinus in flammam accenditur.

Utrum spiritus ille sanguineus perfectior existat, & diutius in vigore permaneat, statim pulso cordis è dextro ventriculo per pulmonarem arteriam in pulmonem propellitur, in eoque ab inspirationis frigore in liquorem rursus condensatur, ac per venam pulmonarem dehit in ventriculum cordis sinistrum, in quo iterum dilatur, (sicut spiritus vini secunda distillatione rectificatur) summamque spirituosam sanguinis rectificationem adipiscitur, atque sic in aortam propellitur, ut ab ea per minores arterias omnibus totius corporis partibus communicetur, atque vivificet & nutrat: A qua nutritione qui tandem residuus est sanguis, maxima jam spirituum copia privatus, minores subit venas, ab hisque ad majores, & tandem ad cor iterum deferretur, ut in eo de novo attenuetur & spirituosus evadat: Quia autem in isto circulo sæpe sanguinis partes consumuntur in nutritione partium, quæcum etiam substantia à colore continue dissolvitur, hinc necesse est ut sanguini venoso ad cor redeunti, idemdem admisceatur novus chylus in sanguinem mutandus, qui locum consumpti suppleat, atque sic via nostra constituat in tali continua nutritione, qua deficiente mox immineat, & brevi deficiente oleum lampadis nostre vite, sicque extinguatur.

Quærit jam, unde acres illæ, calidæ, & fermentacæ particule in nostro corpore oriuntur? Respondetur, ex sulphure & sale: prima emotio est à sulphure, sed primata acrimonia ex sale, qui præter sulphur omnibus alimentis est innatus, nihil enim edimus quod saltem in se naturaliter non contineat, quamvis alia plus alia minus salis habeat, Sulphur dissolvit, saltem, et omque ad fusionem deducit; hic solutus & attenuatus, acrimonia sua omnes alimentorum particulas corrodit, pervadit, dissolvit, sicque ad spirituum in his latentium educendum disponit, quæ operatio est fermentatio, sine qua homo vivere non potest, & cum qui debili aut vitata homo vivere, &

Utrum hæc fermentatio feliciter procedat, non naturæ instinctu salis naturalis, qui alimentis inserti, admiculum adipiscitur, scilicet, saltem maximum, quem elocentis rebus etiam admisceamus: In eundem sensum etiam durioribus cibis sæpe acris & spirituosus est sulphurea quedam pro condimentis totemum admisceat, ut comata &c. non raro etiam vinum generosum, nam sulphurei spiritus salis permitti, crassas huiusmodi particulas potenter dissolvit & pervadit, atque ad iterum fusionis, sicque ad fermentandam energiam exaltat: Quæ chylificans operatio plurimum adjuvat, partim à saliva, quæ desuper ab ore fluit ad ventriculum, & fermentativa qualitate jam donata est; partim è fermento peculiari, quod ex chyli aliqua parte, post ejus coctionem, & maxime partis ad intestina expulsionem, in ventriculo residua, & plicis porisque tunice interioris infusa, in illicque accedente, conficitur: Atque hic per primam illam fermentationem, spirituosiores & utiliores alimentorum partes è crassiore materia cremoris forma excutit, & chylum nomen assumit.

Ex hoc chylis multis salis sulphureæque particulis, ab alimentis desumptis, donato, per novam fermentacæ præparationem à bile, fuso pancreatis, & lymphâ iudicem, conficitur in corde sanguis, qui è ipse salis chyli particulas, sed magis attenuatas, & sulphureis exaltis permixtas in se continet.

Ex hujus sanguinis, ad lientem per arteriam splenicam, & ad pancreas, aliisque multis glandulis per peculiarias arterias defluens, particulas salinibus, saluæ spirituum animalium separatis, in lientem & diutius partibus iterum conficitur ut fermenti materia per sanguinem venoso & chylis, majore sui parte ulterius ab hepate in fermentum perfectum excoquenda.

Atque ita ex alimentis interit fermenti prima origo est, quod deinde variis coctionibus magis magisque attenuatur, & in fermentum subtilius in corpore nostro mutatur:

Hepatis autem, Lienis & Pancreatis veram actionem esse fermentum dicto modo conficere, ex eo patet quod ubi viscera hæc bene valent, quæque munere convenienter sanguinem, totum etiam sanguinem melior & spirituosior sit, atque hinc corpus vegetum & agile existat, omnesque naturales & animales actiones laudabiliter & bene procedunt; At contra, ubi viscera hæc male se habent, innumeri morbi ex sanguine chyloque male fermentato exoriantur.

Succus acer, subalius, ac subacidus, ut dictum, in Liene conficitur ex sanguine arterioso, per magnam arteriam splenicam in hoc viscus copiose impulsio, qui à copiosa spirituum animalium per nervos affusione, atque etiam ab liquis visceris proprietate mox immutatur, in eo qui prædominantur spiritus sulphureus, obsunditur, huiusque subacidus, & salis acidusque in eo latentis spiritus in ædum producit, salique particule à sulphureis nonnulli separata prædominium capiunt, atque hinc fit quod sanguis feridus ac subacidus per arterias in lientem influat; sed potius exiit ad sulphureo ferore cum dulcedine, subalius seu subacidus è liene per ramum splenicum de labatur ad hepate, unde Lien eodum etiam subacidum quid supit, Eodem modo hæc res procedit, sicut cum in vase aceto, seu in quo acetum seivatur, acetum ex vino conficitur, quippe deponitur id loco subspido; in hoc aliqua parte evacuatam via vinum generosum & bonum (ex debili enim vino aut vappa non coquitur bonum acetum) subinde modica quantitate infunditur, quo facto mox à salis & acidis particulis, in aceto prædominantibus, huius & suffocatur

affluatur vini sulphureus & dulcis spiritus, & quæ in eo latent salis acideve particule ad aceti aciditatem funduntur, modice liquefactum, attenuantur & in ædem producuntur, sicque vicum indit ætorem & fit æctum: Ita etiam sanguinis arteriosi sulphureus spiritus, partim à spiritibus animalibus per nervos affluantibus, partim ab acidis & inialis succis in Liene confectis ac contentis, figitur & suffocatur, atque prædominium suscipiunt quæ in eo sunt particule salis acideque, postea admittis demum novis sulphureis, sanguini venoso inhaerentibus, ab hepate in perfectum fermentum seu chylum mutantur.

Quod autem hæc primaia fermenti ab hepate perficiendi materia in Liene conficiatur, ab experientia aliquomodo confirmari potest, quippe si Lien bovis, porci, aliterve masculi animalis in frustra concitatus, in aqua leviter tepida maceretur, & postea hujus aquæ paululum passet facinere (subacta) admisceatur, eam diluat & fermentare faciat, band aliter ac si flos cerevisiæ, aut aliquod aliud panis fermentum admixtum foret: quam operationem adhuc feliciter exequitur, si ei minimum quid aceti admixtum fuerit.

Jam vero si hæc Lienis actio non bene procedat, oriuntur morbi duplices: alii à subalio, seu subacidum succo nimis callo & fixo: alii ab eodem nimis tenui & volatili: Nam quando sub salis acideve succi in Liene non satis attenuantur & liquantur, etiam pauci spiritus fermentantes ex his alteris possunt: quando nimis attenuantur, tunc impropria modum acres, corrosivæ & copiosi spiritus ex his educuntur, atque pro horum diversitate diversi morbi exsurgunt:

Si Lien debilis sit, vel suo, vel alimentorum vicio, aliæ quæcumque de causis, tunc subacidus qui læso excoquitur succus, non satis liquatur, attenuatur aut volatilizatur, sed crassus & tartareus seu terrens manet, magnæque copia in Lienis veticulosa substantia & vicinis partibus, ob crudam viscositatem cumulatam, tumidumque & magnum Licorem facit: quippe in eo latent spiritus non convenienter liquantur, sed in angustia in Liene & circa Lienem subinde aliquantulum effervescent, totum Lienem quique contina distendit, & mille fluxus cum (sibi), tuglus, ac molesta reosione, hypochondriaci famulati exiit: Quæ mala etiam plurimum augentur à prava dispositione Pancreatis, ex sanguine vitiosis Lienis succis inquinato, ac per arterias ei allato, contracta: cujus actione succum suum etiam male coquit, nimiumque ex subalio acidum vel austerrum relinquit, qui partim in ipso pancreate graves obstructions, officii hujus varias vias, pignit: partim in intestinis & fluxus, in his innotam effervescentiam facit, chyloque pravam subacidam qualitatem imprimi, ob quam ad coagulationem, seu fixationem proclivis evadit, nec satis convenienter attenuatur: Unde tunc in abdomine à chylo crassiore & fixiore remanente, à quæ ad ulteriorem fusionem minus preparatur, plurimum generantur obstructions in vasis lacteis quibuscumque, in mesenterio & glandulis mesenterii, in illis quæ magna crudorum & pravorum humorum sabura cumulantur, à copia copia & corruptione mille morbi succedunt, qui vulgo melancholici appellantur, & à Liene orti traduntur, sed quomodo ab eo generentur, non satis fuit explicandum: A sanguine autem, de defectu efficacia & convenientis fermenti (quod ex Lienis succo & sanguine venoso lo hepate præparari modo dictum) & spirituum non satis copiose genitorum, ipso nimis manente, totum corpus languidum ac torpidum redditur, multique morbi oboriuntur: Quippe crassus & non satis spirituosus exitiens,

partesque salis, crudas, vicidiasque admittas habens, in hepate, aliisque variis abdominis viscibus, humores coagulando, obstructions & fistulas facile patit: In corde non satis dilatur, sed crassus in pulmonem impulsus, in coque ab inspirato ætæ adhuc magis inestillat, ægre per angustissimos ejus meatus transiit, hinc pulmonem infensum & bronchia compressione angustata, difficilem respirationem facit: In corde ipso, propter particulatum inæqualitatem, molarumque difficilem dilatacionem, producit Pulsum inæqualem, & nonnunquam intermittemem: In cerebro, propter crassum minutum ductus & inordinatè trahens, facile furoribus, capitis gravitatem: cumque ipsius cerebri naturalem constitutionem laedit, & imperitiam aliquam acrimoniam nonnihil vellit, etiam leduntur actiones animales principes, imaginatio & radicium depravantur, Memoria immittitur, deliria, vigilie aliæque similia incommoda innotescunt, & fit vera melancholia: Si vero crassus illud subacidum (sibi paulo magis caletur, & facile, sed non satis spirituosum evadat, tunc sanguis subacidus & austerrum diathesi acquiescens est in Scorbuto: atque tunc ab illius acridine lancinantur nervosæ partes, petiostea dulent, molliora partes eroduntur, læpe etiam in uestigia graves torquentur, & ulcera in cunibus oboriturum curam ducentia, Ad hæc ineptus sanguis fit ad nutritionem, atque inde totius corporis lenta Atrophia procedit: Diæta quædam talis particule in Renibus nigritibus coagulatæ, & à iero separtæ, in calculo concrevissent; in articulari vero separtæ, & tendinibus partibus alligatæ, easque cortodentes, faciunt acerbos dolores arthriticos, ac tandem majore copia cumulatæ, nodulos tophos: Atque hæc & similia contingunt, si fermentatus succus lo Liene nimis crudus & crassus conficiatur.

Si vero idem ille succus nimis tenuis, spirituosus & acer conficiatur (quod etiam fit vicio Lienis, alimentorum &c.) tunc alii morbi hinc procedunt: In sanguine magnum ferocem, cum aliquam acrimoniam conjunctam, excitat, qui in cerebro, ob continuam irritationem, spirituum animalium celerem atque inordinatum motum, vigilias, delirium furiosum & maniam facit: Anticula leviter coagulatus inhaerens, arthritidem vagam generat, coque accl ipsi in una parte, ob suam tenuitatem dissipato, facile in ius dolor oboritur in alia parte, cui aliæ quedam ejus particule forte adhaerent:

Lien scitiosus, obfistens, aliæque quæcumque modo viciatas, pravam incum fermentationem generando, mille quoque gravia mala inducit: Hæc omnia, aliæque similia actionem Lienis satis manifestam reddunt.

Hepar biliosa plenum est materia &c. J. Item etiam Hepatis actio ex morbis ab eo procedentibus clarescit: Si Hepar frigidum quæcumque de causis fuerit, & dictum Lienis succum, per ramiu splenicam allatum, commodè digerere, ac tam admittit sanguine venoso, eique inhaerere in sacco sulphureo, ut convenienter fermentum convertere nequeat, tunc nullam sit bona fermentatio: Chylus non ita coquatus, nec ad fermentationem in corde suum salis bene preparatur: sanguis venosus minus crudus feratus, neque in corde satis spirituosus evadit, sed attenuatur (obstamato in aquam vaporem, qui in vasis & mollioribus partibus in liqorem aquæum laxatur, & totum corpus iero replens languorem facit, cui multa tris addit, ob erodentes alias particulas isti iero inhaerentes, nec satis bene sanguini mistas, quæ tunc

cum succis & salivalibus visis deheosibus, ac tunc similiter subfalis, ad fauces & oesophagum delatae, siccæ vellicatione continuis suum faciunt:

Si vero hepatis sit caliditas, & hinc debilis, tunc & sanguine sulphureos & olaginosos spiritus exhalando, nimis copia eos sufficit, à quibus vis subacidi succi & liene venientis, multum obnuoditur, atque fit prævum fermentum generatur, quod inflammationes, putredines, febres, aliosque calidos morbos à omnia vitiosa fermentatione ortos in corpore producit, multumque bilis copiam generat: quæ bilis, si ob pauci succi acidi admissionem mitior sit, tunc lictus fit: si vero acrior fuerit, à multo falso acidove & acris splenetico succo cum eo excocto, tunc cholera, diarrhoea biliosa, dysenteriam, aliosque similes morbos producit:

Hepar oblatum aut sciechotum, cum fermenti boni generalis & distributionem convenientem non faciat, etiam plurimum crudum, multo-

rumque morborum à cruditatibus ortorum causa est.

Pancreatis succus tam acutus est. J. Quoniam sit fermentum qualitas succi Pancreatici, & quales morbi à Pancreate male habente oriuntur. Vide lib. 3. m. de Inappetentia, ex eodem De Diemebriac.

Ex modo dictis, addit Vir Eruditis, abunde jam patet quam necessariam conspiciantem habesit Hepati & Lien, & quales quaque morbi ex horum viscerum utroque vel alterutro male affectu exoriantur: quantum verosimile etiam sit Lienem & corpore hominis eximi posse, permanente vita & sanitate: Liqueat etiam quam male secunda publica coctio in hepate, liene & pancreate fieri dicatur, cum illa necessario fieri debeat in corde: Nam fermentum modo dictum non generatur nisi ex sanguine, atque tangit debet primo confici in corde antequam ad hepate, liene aut pancreas perveniat possit: Secunda igitur publica coctio fit in corde, tertia in hepate, liene & pancreate.

OBSERVATIO CLVI.

Atrophia partium inferiorum, ob defectum succi nervi nutritii.

Illuſtris Matronæ, affectibus spasmodicis obnoxia, membra & partes inferiores, juxta ac ultra dolorum causas confixæ, plurimum contabuerant, ut crura prorsus emaciata apparuerint: Interim facies, cervix & brachia satis plena manebant: Hujus celebri compagem, quæ limpida inundabat. Vide Historiam lib. 1. sect. 13. observ. 7. ex Wallis Anatom. cerebri cap. 10.

S C H O E I A.

Succum nutritium per nervos adactum, cum D. Giffius & W. Arbuthnot coſtituit Vir Clarissimus: Explicatis, aut cap. 1. lib. de Sideribus, in fine, sanguinis infra vasa conditi natura & analysi, adhuc confiderationem meretur succus nutritius & sanguine suppeditatus, & pro nutritione solidarum partium & ceterorum massæ secretis, itaque (quo melius assimilaretur) solutis rosis adactis: Etenim nervi, membranae, tendines, ceteraque totius corporis solidæ partes succo quodam alibili perfunduntur: Hujus vehiculo spiritus animales potius corpora nervosa ad tensionem inflant, aque motus & sensus actiones expedit obsequio: Etiam humor iste solidis partibus appositus, itaque assimilatus, molem & accretionem laugit: Hujus originem, exortum & dispensationis modum alio loco exquirat: A massa sanguinis suppeditari aut, ac circulatione quodam (uti videtur

probabile doctissimis D. Giffius & W. Arbuthnot (postquam nervosas partes itaque ceſit, quod iustitiam, & quasi pauperius factum, per vasa lymphatica ad sanguinem reſeruat: Nutritium autem hunc succum nervos vehere absolute negat de Diemebriac)*, ob angustiam pororum in iis, quæ ita est ut nullus visibilis humor eos permeare possit: 2. quod his testis nullus succus exprimitur. 3. quod nervus in corpore vivente liguus aliquo vincolo, nulla in parte inuſcat vel deſumſcat: quibus adjuſque experimentum Regneri de Graef cap. 1. lib. de succo Pancreatico, qui denudato in cane nervo illo notabili ad cura postiora tendente, eoque per medium transverſum diſciſſo, in phialam illum inſuſit, nec tamen 4. vel 5. horum ſpatio vel parvam humoris colleſcit:

* Vide plura lib. 6. Anatom. dicti de Diemebriac cap. 11.

APPENDIX.

Atrophia à Lymphæ inopia inducſta.

Non hydropis tantum, in cavitatibus si abundet Lympha, sed Atrophix, si alibi deficiat, causa hinc repetenda, Hinc sicci, & Lymphæ inopia laborantes, ad atrophiam, marasimum &c. proclives: Utrumque in Hydropse ascite plerumque evenit: Nupero exemplo Ascitici rem illustrabo: Vasorum salivalium ubertate spūto moleſto urgenre, tandem exſiccantibus uſus est, tædio spūti limpidi: Hinc ſuperiora Atrophia inſatit, defectu Lymphæ, quam quoque accerſivit potus in prandio abſtinentia, lymphæque copia in abdomine coacerſata hydropi ſuccieſſit, qui abdomen diſtendit, pedes, ſcrotum, ſumma macie faciem peduſque & manus occupante, quia omne nutrimentum, quod ex lymphæ ſuppeditari gelatina ejus indicat, in tumidis partibus ſubſiſtit: Et quanquam natura per ſcrotum & pedes magnam quotidie lymphæ copiam excernat, ſpes tamen decollavit valetudinis, quod nova feri materia ſemper regeretur, cui vires impares videntur. Th. Barthol. 1. de Hepatib. exanth. causa deſſer.

OBSERVATIO CLVII.

Tæbes dorfalis inducſta à pituita ſacram Fiſſulam ſubeunte, & medullam opprimente.

Tæbes dorfalis, ſeu *phthiſis morſus* duplex eſt Hippocr. altera ab immodica venere, l. 2. de morbis, Altera vero à deſtillatione in ſpinam dorſi, lib. de Glandulis, comitem habens

bens dolorem continuum, cum marebrem insuperabilem; Dolorem autem hic parit acida pituita, dilacerans magnopere vel membranam, quæ spinalem medullam proximè cingit, vel ipsos nervos inde oriundos: Sed si obstruantur venæ aut arteriæ, sive à lumbris, sive à cervicē huc delatæ: vel obstringens frigus, à nimia venere illis impressum: Sive ob prolapsum crudioris pituitæ (cujus maximam copiam equidem aliquando illic confexi) eripitur ægro non modo consensus inter superiores inferioresque partes, verum redditur præterea sterilis, propter interceptam decidui seminis materiam. Neque marcescit solum ipsa spinalis medulla quæ obstruitur, sed contrahescit utique cum illa corpus univèrsum: communicato paulatim malo, hinc per nervos cerebro, illinc per arterias cordi, uti per venas Jocrinori: Quorum nobilissimorum viscētum functione evidenter læsa, torpet necessario corpus, marcescit animus & consumitur miserabiliter homo:

Samueli Verspretio elevabat impurus lien rot vapores versus cerebrum, ut inde destillaverit iterum plurimum acrioris pituitæ, primum quidem in occipitum ac cervicem, sed mox inde in spinæ medullam, & porissimum in lumbos, ilia, ac coxæ articulum: Quatum partium immanis dolor excruciatum ipsum tormento tam inde fatigabili, ut amisso omni colore ac degere, incidit in lentam febriculam, consumens ipsam morte adeo tarda ac misera, ut ante ejus accessum non semel exoptaverit languentem emittere animam & reluctantem expuere spiritum: quod etiam in hoc morbo observavit Author lib. de Glandulis: Sed ferendum fuit quod non licuit mutare, præsertim labe hac jam penitus infixa, quamur cesserit vel temporis vel remediis etiam convenientissimis: Argumento certe evidenti pervicaci sacræ hujus fistulæ tabi, auxilia medica esse, non solum infirma, sed, ausuri dicere, nulla. *Tulpius observ. lib. 3. observ. 24.*

S C H O L I A.

AN forte rectius hæc Tabes Succī Nervi vilio vel inopie adscribenda? Eum multi adhibuit, præsertim *Glyst* & *Ustil*, *Lewer* nec solum sanguinem ac unicum esse humorem qui in corpore animato distribuitur, sed latèrem ab eum a capite per nervos ubique per totum dispensandum requiri, qui aliquatenus (schem nutritioni confectat: Plures aut *Clay*, *Ustil* *carverii* *Anat. cap. 20.* sunt rationes quæ in huiusmodi humorem cerebro ac nervoso generi inesse, & per totos eorum ductus scaturire, declarant. Noli enim spiritus animales pugnari emanantes in talis vice, qui illis pro vehiculo est, fundarentur, ipsi non essent coniugui, neque animæ tenui livæ *seruæ* cōnectere & continuare possent: 2^o. Succī nervuli diffusionem, tendunt partimque nervosorum vulnera & abcessus, quorum utraque ichorem reuunt, & excisioni meræ sanguineæ promissu absumunt exadant, restituti videntur: Nec minus è gangliis & convectionibus strumosis hoc arguere licebit: Inter dormiendum prædictus humor in cerebrum ac nervos uberius influere eorumque meatus obstruere solet, idoque et vigilantes, quo illius reliquie discurrant, occasionem ac pandiculationes crebre superveniunt: Quod veto obijciat ejusmodi humor non adesse, quia talis è nervis diffusilis effluere non percipitur: Quodque item nervi ligati non, uti antea & venæ, suprà ligaturam innumescunt: Referre licet quod liquum in nervoso genere faciens valde tubilis & spirituosus sit, qui quæ à luctu & corrugatione circa litas partes, quando asperius tractantur, habita, interceptis facile evaporare ac dissilari poterit: Tum præterea observare est

in quorundam animalium caecis, quibus succus iste adhuc viscosus, nec ita facile diffusibilis, existit, eorum nervos majores, si visculi commingantur, supra ligaturam innumescere. *Pala plura l. 1.*

Duplex est Hippocrati, altera ab immodica fœmie] Eam sic describit, Dentalis tabes, *menis*, ex spirituali medulla oritur, præcipue vero recensita ipontos & libidinosis corrupti: febri sunt experies, bene comedunt & colliquantur: Quod si ita affectum periculis, asserit sibi videri ex insuperabilibus partibus a capite velat formicas in spicam demitti, cumque utinam aut sterius reddit, semen geostale copiosum & liquidum ei prodit, neque generatio fit, & inter dormiendum, cum uxore dormiat necne, veneris ludibria patiatur: Cumque alias tum præcipue per locum ad quam iter fecerit, aut cunctaretur, anhelosus & imbecillus evadit, capui gravatur & aures sonant: Hic tempestis progreditur vehementibus febribus corpus perit ex leipyria febre. *Hæc Hippocrates*: De duplici hac Tabē vidē lib. 3. tit. de Gonorrhœa: Hæc dum scribo neogamam juvenem præ thumibus habeo, metacorem atomacarium, cuius nomen patre eo, hac Tabē detentum, quæ post profusum narium hæmorrhagiam emerit: Nullum vero signorum & symptomatum recensitorum ab Hippocrate detideatur, si copiam g-nitatis feminis effluens excipias, quæ ab anecdicis hæmorrhagia acia est: libidinem uxoris aperuit, quæ n. c. lassata viro, nec satia recessit: Imptem huic esse ostendunt habitus macilentus & strigosus, adeoque facilis & proclivis in tabem transitus.

OBSERVATIO CLVIII.

Tabes à Glandulis scirrhoris per totum corpus sparsis.

Puella propter Glandulas in toto corpore scirrhorides per Atrophiam mortua. *J. Sylvius in appendice isagogæ anatom. varior. corpor. dissectorum.*

S C H O L I A.

Glandulas in Naturales & Adventicias divisi *Ustius*; Hæc à sicpo nervo originem ducere censet, ubi contingit nervi turgentis & repleti

extremitatem, effundere materiam chloam in carniū interstitia, materiam sic effusam statim formationem molit, & primo sive cytham sive amiculum,

involvatur, effingere, à nova vero materia constituta cap. 37. *Marsilius Malspighius* substantiam cutis habere eorum sanguinem. Vide *Epistolem Adenographiam*, sit Glandulas plurimas.

OBSERVATIO CLIX.

Mulieris Tabidae abdomen pinguedine infarctum repertum est.

Venit mihi in memoriam apertio Virginis in Nosocomio Leydensi, quæ cum macie contabescens occubuisse, proscripta ad ferrum Dom. Sylvii, abdomen ostendit farctum pinguedine, visceribus interea proximis nutrimenti inopia fatiscientibus & contractis. *Olavi Barriichii observat. 92. Aitler. Bartholini ann. 1671. & 72.*

OBSERVATIO CLX.

Tabes ab ossium apostemate nata.

Ateor plerosque Medicorum ignorare ossa, quantumvis solida, quasi phlegmone & apostemate quoque corripisse, Quicquid enim aëritur, crescit, augmentatur aut influxus recipit, id quoque putrescere & apostemate aliquando turgere fatemur: Proinde *Avicenna & Galenus*, suo periculo edoctus, apostemate quoque distendi asserunt: Et Hippocr. empyemate os sacrum corripuit quocumque novit, cuius putredine & incredibili doloris tyrannide duos, *N. Warmhauser* in Neoburgo, & *Ioh. Castnerum*, afflictum & diu maceratos tandem contabescere & mori hisce oculis vidi. *Langium Epist. 42. Tom. 1.*

OBSERVATIO CLXI.

Tabes à causa abdita, salvis pulmonibus existentibus.

Joh. le Fuzeliet Tabida morte-natus, eo modo, eoque morbo & eodem tempore interiit quo ejus mater. In pulmonibus nihil commemorabile reperitur quod mortem attulerit. Mirum quod ante mortem ei contigit; Decem antequam è vivis excederet diebus tumidum corpus fuit, Tumor fugax erat, repetebat ex intervallis. Unde hoc? Leucæ videbantur esse, Tale quid in morbis funestis contingere solere agnovit Hippocr. 2 proth. Leucæ, ait, oboriuntur (supple in morituris) in morbis funestissimis, cuiusmodi est Phthisis. *Ballonius Parad. 39.*

OBSERVATIO CLXII.

In Tabido arteria cruralis sanguine destituta reperta est.

Kenisolem, sive omnimodam vasorum inanitionem contigit mihi evidenter videre in emaciato ex succi, ac vere æquæ eunuchi cadavere: Cujus arteriam cruralem offendimus, ut extrinsecus summe duram, sic intus asperam, inæqualem & omni sanguine destitutam: Eam autem inaniverat septuagenaria senectus. *Tulpium observat. lib. 1. cap. 44.*

OBSERVATIO CLXIII.

Tabes à lumbricis truncum venæ portæ obsidentibus.

Anno 1562. In mulieris cujusdam consistentis ætatis, quæ ad tantam maciem redacta erat, ut vix cute & ossibus hæreret, corpore quatuor lumbricos teretes spithamæ unius longitudine, in ipsum truncum venæ portæ se insinuasse, ac toti corpori alimenti aditum obstruxisse observavi. *Ex observationibus Adriani Spigelii.*

OBSERVATIO CLXIV.

In Phthisici corpore reperta Bronchii particula ossea.

Phthisico in corpore, 6. Maji 1675. invenimus Tracheæ per Pulmonum substantiam distributæ particulam aliquam digiti longitudinem habentem, quæ ossæam non solum duritiem adeptæ, sed & coloris ejus cuius ossa solent esse, h. e. candicantis erat. *Gerardus Blasius observ. med. 6. Part. 6.*

OBSERVATIO CLXV.

In Phthisici capite minimum cerebri aderat.

Si vasa cerebri male afficiuntur, aut sanguis transit in noxium, aut deficit, cerebrum vitiatum & quasi consumitur, Et hoc est quod vulgus tradat senio confectis minus, plus junioribus esse cerebri: Ego etiam in cujusdam Phthisico morbo mortui capite, minimum cerebri aliquando inveni. *C. F. Schneiderus lib. 2. de Catarrh. cap. 2.*

OBSERV.

OBSERVATIO CLXVI.

Tabes in Phthysicis ossa etiam ipsa attingit.

Vidimus in tabefactis & consumptis ossa ipsa adeo manifeste nonnunquam macerata; diminuta exsiccataque ut non apparerent eadem quæ prius. *Ioh. Baptista Montanum comm. in 2. Fern. 1. Avicenna.*

OBSERVATIO CLXVII.

Tabes varios & multiplices imi ventris affectus sequuta.

§. 1. **M**iles post inflammationem hepatis & fluxum hepaticum, tandem ad extremam Maciem perductus est: Inveni loco hepatis solam membranam ipsum investientem. *Vide lib. 3. tit. de Dysenteria.*

§. 2. Sectus quidam diuturno morbo undique absumptus, Cujus Jecur omnino putridum ac purulentum fuit. *lib. 3. tit. de hypochond. dolore.*

§. 3. Quidam post tormina in Tabem incidit, Erosa intus viscera ostensa. *lib. 3. tit. de Dysenteria.*

§. 4. Quidam patiebatur vomitum, singultum &c. tandem Tabidus obiit: In cavitate ventriculi nihil vivi invenio, sed saltem liquamen subcruentum: Pylorus totus erat exulceratus. *lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

§. 5. Quidam cachecticus, vomitu correptus, Tabidusevasit: Hepar fere totum erat putre, vesica fellis vacua, Porus choledochus præter modum laxus & apertus, Renes flavo colore tincti, parenchyma eorum lividum. *lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 6. Mulier ascitica tabefacto corpore interit, Jecur putridum est inventum: Inter peritonæum & intestina vesicarum strues. *lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 7. Mulier post intolerabilem ventris cruciatum macie confecta est; Hepatis cavo tumor adnatus erat, ovum asnerinum mole æquans. *lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 8. Adolescens querebatur de stomachi & hypochondrii dextri dolore, tandem in Atrophiam incidit, In vesica fellis aderant 22. Calculi. *lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

§. 9. Puellæ febre, nimia appetentia, secretionem per alvum superflua, hinc macie insigni affectus fuit: Hepatis insignis erat magnitudo, quod scirrhosum, ut & Lien: Glandule per totum mesenterium sparæ scirrhosæ. *lib. 3. tit. de Diarrhoea.*

§. 10. Nobilis stranguria primo, post & febre correptus ad Tabem deductus est: In vesica repertus calculus ovi gallinæ magnitudine: In rene dextro alius: In sinistro abscessus suppuratus. *lib. 3. de urinis p. n.*

§. 11. Mulier deglutiendi difficultate laborans, tandem Emarcuit: Inventus ad os ventriculi scirrhus: Mesenterium ex scirrhis constatum, Omentum durum, Hepar scirrhosum, sicut & Pancreas refectum. *lib. 3. tit. de Diarrhoea.*

§. 12. Coniux N. diu inturgidum gestavit ventrem, cum totius corporis Consumptione: In abdomine, ultra mensuram aquæ, inventus est tumor insignis & latus: *Vide tit. de ventris Tumore.*

§. 13. Vetula plane extrema obiit: cuius Hepar omnino putre, Intestino colo & fundo ventriculi tenacissime adhaerebat scirrhus. *lib. 3. tit. de Hypochondr. tumore.*

§. 14. Mercator scisquianno conquestus est de deglutione difficili, (*vide tit. lib. 3.*) tandem marasmo consumptus obiit: Tribus ab ore ventriculi digitis, œsophagus à cartilagine obturatus erat.

§. 15. Antonius N. cibum emanducatum incoctum rejiciebat, unde ad Tabem deductus. Inventum est ventriculum ita junctis oris ad imam ejus partem occalluisse, ut nihil ad inferiora transiret potuerit. *Vide lib. 3. tit. de vomitu.*

§. 16. Quidam quotidie vomitum patiebatur & in atrophiam incidit: In stomacho interne circa pylorum herpetem inveni. *Vide tit. de vomitu lib. 3.*

§. 17. Quidam obstructione alvi laboravit, cum vomitu nutrimenti, tandem contabuit: Repertus ingens abscessus stercoratus circa fundum ventriculi. *Vide lib. 3. tit. de vomitu.*

§. 18. Puella consumebatur & dolores patiebatur circa umbilicum: Peritonæum eo in loco, quo dolores patiebatur, à sero acri & bilioso erosum fuit. *Vide lib. 3. Tit. de ventris dolore.*

§. 19. Joh. N. à tribus annis nil nisi liquida sumebat, cum dolore abdominis: Factum erat colon cæcorum & prunorum nucleis, cum globulis plumbeis &c. Sic ex dissectione defuncti

defuncti, per macie sceleton tereotis, apparuit morbum veneficio non fuisse adscribendum. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 20. Uxori N. insignis erat ventris tumor, ad atrophiam tandem deducta est: In abdomine repertus tumor ingeas, qui exemptus libras 56. pendebat; Omentum in eam molem excreverat. *Vide tit. de ventri tumore lib. 7.*

§. 21. Nicolaus N. vehementissimis abdominis doloribus correptus est, sequitur rotius Consumptio, In Mesenterio sex tumores tunicati deprehenduntur. *l. 3. tit. de ventri tumore.*

§. 22. Quidam post multos & longos dolores tandem in hydropem siccum lapsus est: Glandulae Mesenterii plane aruerant & tabuerant, unde nullum ex alimeoto fructum percipere poterat. *Ballonius Epid. lib. 2.*

§. 23. Vir diu querebatur de doloribus circa regionem ventris, qui tandem eum Tabes confectum deseruerunt: Inveni binas Mesenterii glandulas in magnam molem auctas &c. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 24. Artifaber laborabar dolore circa ventricululum, ac tandem marasmo confectus interiit: Repertus est ingens scirrhus, totum Pancreas & Mesenterii partem occupans, pylorum ac jejuni principium ambiens. *Vide lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

§. 25. Michael N. Quartana laborans in Atrophiam incidit, Lien triplo major erat, flaccidus, sanguine nigro insuacatus. Circa ejus arterias glandulae erant multae, quae comprimendo ductus angustabant &c. *Vide tit. de Febribus lib. 4.*

§. 26. Juvenis in Lumbis & veotre dolores perpeffus Pancreas habuit turgidum & extuberans, sordido pure ac pimita infarctum, Cujus pondere oclusis vasorum ductibus, corpus emaruit. *Vide tit. de Febribus.*

§. 27. Vir Nob. nephriticus tandem ad summam maciem perductus est. In dextri renis pelvi calculus grandis, sioliter subulo praegnans &c. *Vide lib. 3. tit. de Lumborum dolore.*

§. 27. Joh. N. post febrem, dolores nephriticos sensim extubuit: Ren sinister lapide obsessus: alter iusto minor & pene collapsus:

§. 29. Vidua N. nephritica, macruit multum: An verum illud à renibus febres marasmodos cootingere. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

§. 30. Puer veotre dolebat & urinas cruentas emittebat; ac tandem consumptus obiit; Renum sinister torus arenulis refertus cum duobus calculis. *Vide lib. 3. tit. de urinis p. n.*

§. 31. Celeberr. Heurnius Ischuria affectus est, & licet urinam postea reddiderit, tamen nonnulli cum cruciatu & stillatim, donec prorsus emaciatus obiit. In vesica septem sunt reperti calculi insignes. *Vide lib. 3. tit. de mictione difficili.*

§. 32. Uxor N. acutos passa dolores in abdomine & circa inguina, tandem Tabida moritur. Vesicam invenio sphacelo correptam, in qua calculus magnus & alius minor. Uteri ligamentum latum dextri lateris erat ruptum, unde uterus inclinabat valde. *Vide lib. 3. tit. de dolore Hypogastrii.*

§. 33. Mulier se utero gestare credebat, tandem post 16. menses emaciata interiit: Uterus mire erat distentus, In cujus capacitate interna massa quaedam carnea inerat. *lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 34. Uxor N. factum mortuum quinque menses retinuit, successit Febris, Tabes &c. Foetus computruerat cum involucribus & ipso utero. *Vide lib. 3. tit. de Partu difficili.*

OBSERVATIO CLXVIII.

Phthisis ortum trahens ab exesa Epiglottide, unde pulmones flaccidi laxique evaserunt.

ARISTOTELES sublata Epiglottide, & aëre continuo sublapso cecus fuit fieri Phthisin: facit autem huc historia & observatio in Turonensi viro, cui per Syphilidem exesa epiglottide, dum descenderet cibus aut potus, vitæ discrimen per plures annos fuit: Cum autem liquida perpetuo fuerint ipsi voranda, excocto post obitum cadavere, modica & foemnis inventa in pericardio fuit aqua, pulmonibus admodum flaccidis laxisque, defecato insuper colore. *Marcus Aurelius Severinus, Collegii Anatomici pag. 10.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI SECVNDI

SECTIO VIII.

De Palpitatione, Tremore, Dolore Cordis.

OBSERVATIO I.

Palpitationis cordis variæ causæ sectione cadaverum deprehensa.

EXCITARI potest cordis Palpitatio a *Tuberculo*, *Abcessu*, intemperie calida, *Sanguine* multo obstructionem faciente, *Vermibus*, subita vacuatione, Imprægnatione, *Inflammatione*, *Aqua tunica inclusa*, ac *humore putri* & male olente plena, *Lapidis*, venenosa qualitate, spirituosio halitu, sive ab internis sive ab externis: Ventriculus cordis, sive in substantia, sive in pericardio, sive arteriis causa constat; Sive accidat extrinsecus, ut uterò, hepate, liene, ventriculo: E quibus causis nonnullas in dissectis corporibus hoc morbo peremptis exploratas habuimus: In cuiusdam *Pericardio aqua visa*, In alio *abcessu in vena arteriosa*: In aliis *pericardium statu dysenterico*, qui tandem solet in aquam concrelescere, nisi cordis calore dissolvatur. *Scoliographum ad cap. 29. Hollerii de morbis int.*

SCHOLIA.

Causa noxia aut per essentiam est, aut per consensum, Per *Essentiam*, aut in *ventriculo*, aut in *substantia cordis* subsistens: In ventriculo vapor sive halitus elevata ex materia putrida vel non putrida, acrimorodisci, purulenta, venenosa vel non venenosa, In *substantia* ut sunt *abcessus*, *ulcera*, *erysipelata*, *calculi*,

tumores duri: Unde alias diximus *arteria aut* *coronaria* *qui per vasa sua tenuia tenentur*. Causæ per consensum sunt aut in *pericardio*, aut in *Pulmonibus*, aut in *corde*, ut *ventriculo*, *intestino*, *jejunis*, *mesenterio*, *intestino*. *Saxonia Pizicci. Pyæth. part. 2. cap. 1. §. 3.*

OBSERVATIO II.

Cordis Palpitatio ab ejus inflammatione inducitur.

IN Britone quodam, in Collegio Triquetico jacente, Inflammatio cordis Palpitationem induxit. *Hollerius ibidem.*

SCHOLIA.

Erysipelata & Inflammationes Galenus non negat fieri posse in corde, negat tamen diu durare posse, cum statim ad interitum d. ducant: Sed si cor subiectum est suppurationibus, putredini, abcessibus, ut experientia sæpius comprobavit, necesse est præcessisse inflammationem, cui omnia illa succedere solent. *Saxonia ibidem.* Quod ait Galenus 2. & 3. de Prælag. ex Pullibus, cum ejusmodi tumores in corde oriantur, concitati adeo vehementia animi deli-

quia, statim inter initia, ut hominem omnino interimant, Id puto esse intelligendum quando in internis partibus & penitioribus oritur is tumor: alioquin enim memini lectum fuisse cadaver hominis ex diuturno morbo mortui, cui inventum parvum sub altera cordis auricula ulcus, &c. Sed extenuæ, imo extenuæ partes, non sunt tanti momenti sicut interior ejus substantia & ventres. *Trunculus Detul. comandi lib. 6. cap. 13.*

OBSERVATIO III.

Palpitatio cordis ob ejus ventriculum dextrum sanguine concreto refertum, Ejusdem Auriculæ summæ auctum, & Pulmones cruore extravasato inflatos.

Theologus insignis, postquam Palpitationi cordis per crebras vices, modo sponte, modo occasionaliter obnoxius digesset, tandem ea continue dies & noctes cum gravi Dyspnœa affligi cœpit, & deinceps intra paucos menses à morbi assidue aruit fatum obibat.

Cadavere aperto, cordis sinus dexter mox sanguine concreto tumidus apparuit: cujus item auricula in immensum aucta & extensa, cruoris grumosi copiam ingentem continebat: Contentorum horum ratio statim apparebat, videlicet, quia Pulmones summe obstruati,

obstruēti & cruore atro extravasato, & ubique stagnante infarcti, sanguinem ē ventriculo isto jugiter explodendum haud admittēre potuerint: *Wallis Pharmacop. Ration. p. 261.*

OBSERVATIO IV.

Palpitatio cordis ob arteria magna truncum mox à cordis egressu plane offeum redditum.

N OVI senem cerevisiæ fortioris ac vetustæ, nec non vinorum potui crebro à multis annis affuetum, prædicti morbi insulsi crebros pati solitum: Cujus postea altomachi sphacelo cum vomitu quotidiano, spirituum languore, aliisque symptomatis defuncti cum cadaver aperiret, Deprehendi arteriæ magnæ truncum mox à cordis egressu plane offeum, seu potius faxeum, Ejusque latera valde compressa fuisse, ut rima tantum relicta sanguis vix per dimidium, quo debebat, torrentem effluere potuerit: Proinde ut huic causæ palpitationem cardiacam, ei sæpius molestam, transferberem. *Idem ibidem pag. 264.*

S C H O L I A.

C ORDIS Palpitatio adeo vehemens & immanis interitum exiit, ut non haud tactu manifestissimè percipi, verum & oculis conspici possit, imò interdum ad distans quoddam audiri possit: At vero hic motus quamvis ad sensum ita multiplicem perceptibilis sit, attamen rationi nondum constat quæ pars ita moveatur, ut quovis pulsu suo pectoris lateris linsitum exiire faciat: Omnes uno oee proficiuntur partem ita motam & fortiter evibeam, ipsummet Cor esse, Sed interrogò utrum tota cordis compages, aut aliqua pars ejus ita exiit, & solam vibrationis suæ sphaeram transgrediar? Si dicatur corpus ejus totum ita effieri, alligari vellem an hoc in systole ejus, aut diastole hat? certe non prius, quia dum cor contrahitur, in ipsa patet molem ejus quoad omnes suas partes minui: Nec magis in Diastole dicatur, quoniam in eo statu cor ad orbitum & magnitudinem capimodo natum alem & ordinem redit, inque eo aliquantulum manet: Hinc ū quidem cor juxta vibrationis suæ, quantumlibet auctæ aut imminuæ, leges adeo palpitare & exiire nequit, (quod etiam amplius coostat, quoniam in paroxismo febrili, ubi vehementissime pulsat, non exita salu & cor percurrit,) olim suspicam fui ipsum, durante affectu illo, motum convulsivum & ordinato placē divertum obtinere, quo nempe velis membrum spasmodice agitatū, cor potius totum elevetur, & de loco suo moveatur: Attamen neurologia plenius intellecta, ab hac sententia statim recessi, quia certum est cor à nullo alio muleulo, præter suas ipsius fibras motices, quoquam attolli aut effieri posse: Quapropter super hac re magis cogitanti, demum animo occurrat, quod dum cor ad sanguinem, & finibus suis excludendum contrahitur, atque mucro & latera undiq; concident & propius adducuntur, si tamen sanguis illico totus quaque systole penitus ejici & eliminari nequeat, necesse erit valorem radices ad lumen implere, & plurimum exensum impetu quodam exiire, dein propius reversionem luc factam, totam cordis compagem valde concutit: Profecto à tali interdum causa aliquid illud oritur ex observatione Anatomica *Theologi caput primum* adducta, confirmatum vidi: Quapropter dum cor exclusioni ejus totali summe adlaborans, unaquaque systole juxta coram & medietatem intus contrahitur, & quoad magnitudinem dimittitur, Basi ejus ob sanguinem ibi coactum, æt in transitu hæcentem, aut reverberatum, valde impletus exuberat, atque prout Auriculæ molem magis tumida amplius evibet & laus attollit.

Verum enimvero haud solummodo ab hac causa cor palpitare constat, quia morbus ille non semper constans & perpetuus est, sed plerumque vagus, ac

incertus per vices quasdam infestat, & deinde sponte aut remediis utrum cessat: Porro nonnulli quorum Pulmones suis lais, & ab eade quavis immanes lung passim incellit:

U t emque tamen, licet morbus iste à causis diversis exorti possit, in his tamen omnibus eandem usque afficiendi rationem esse judicamus: Videtur enim quod cor solummodo palpitat, quatenus in systole ejus, dum conus & latera simul contracta angustantur, basi cum valorum radicibus ob sanguinem illic aggestum, & nonnullis hæcentem aut repulsam, ampliata extumescit: Revera sanguinis centum hac loci nonnulli præcedit aut repulsam inde constat, quia dum cor in latere vehementer & finissime vibat, arteria in capto plerumque languide & debilibet pulsat, utpote sanguinis vivum nonnulli exillem convellens: Cum itaque illius morbi causæ conjuncta, sive ratio formalis, omnino in sanguinis circa basin cordis, & valorum radices remota, & aggestione consistat, inquirendum sequitur quomodo, & ob quas alias causas epulmodi affectus producti soleat.

Super his, ut cordis catas sive proprias fibrarum mortales non multum culpeamus, vii um hoc posuissimum, & maxime ex parte, aut *Sanguini, aut Vasis cordis appressis* impetandum videtur: Præter ratio satis constat, in quantum sanguine aquoso, atque ad effervescentiam aut accensum minus apto præditi, aut virgines chlorosi laborantes, atque viri aut mulieres, cachectici, huic morbo plerumque obnoxii reperiuntur, & initium ejus à corporis motu quovis citatione fere constanter pati soleat: Cujus causa est quod cruor, siquidem particulis legnioribus & non siccis adivis conitans, ē cordis finibus non libere & expedite ejiciatur, si d partim in his late retidet & facile Ragnat: Idcirco quovis à corporis motu illud ubertius infertur, ut penitus ejus totus quaque systole eliminari nequeat, cor summo nilin laborans basin suam & valium radices, & vix ultra propelli, obli cum aggeritur, & paululum consistentes partes continens extumescit hæc, palpationem cardiacam una cum dyspnœa infert.

Prius etiam tam aff. ctio illi hæc quoddam sanguine prætervido, & prompte suis accendi aut fermentescere apto prædisponemur infestat: Plerique enim passioi Hypochondriacæ, hysteriæ aut alias spasmodicis malum obnoxii, hoc malum frequens & familiare est: quapropter in his casibus, anexas cordi appensas in culpa habendas melius suspicamus: Quo pacto itam obstruēti, sanguinis ē cor de effluam liberum impediens, cordis Palpitationem inducat, historia modo de *Theologi citata*, ostendit: Porro valorum illorum occultationes, & infusiones illis modis exiitæ, eandem effectum producere possunt.

Cæterum

Ceterum probabile est pathema istud à sanguine, intra cordis sinus de vasa appensa gurguliente, ac in finita quasi carnes concreto interdui procedere.

Verum insuper his, si quidem Palpitatio Cardiacæ affectus alios spasmodicos igitur comitari solet, etiam suspicari licet illius causam quandoque mere convulsivam esse, Olim in Neurologia nostra, ex observata: ionibus anatomicis ostendimus nervos & propagines nervæ fere innumeratas, in pluribus locis, ac præcipuo in basi cordis, arteriarum iunctorum completi & circumligare, quorum usus & actiones ejusmodi fuisse posuimus, ut diversimodi sanguinis æstus, fluxus & refluxus, imo interdum stagnationes, propter vehementes metus, timores, gaudia, tristitias, aliosque affectus excitari solent, propterea contingant, quatenus si vilius illi nervi vasa hæc sanguifera vasæ stringunt, comprimunt, aut forsitan aliquando penitus occludunt. Porro hæc multum improbabile est, ob vasa ista spasmodice affecta, & paulo diutius conficta, ita ut sanguinis de corde exitum liberum præcipiant, palpitantis cordis infusus nonnunquam excitari. Profecto tum hæc, tum altera istas cordis palpitantes causas merito impuimus. Verum circa efficiendi rationem à sententiis ista paululum recedere vitium est. Postquam enim Nervorum actiones & usus exactius perpenderam, deprehendi tandem ipsos, eorumque propagines, nihil omnino trahere aut constringere, sed totum hoc negotium omnino à fibræ carnis perniciatque nervos solimodo in has partes mortales, non subinde palpitantis copias, insuper de morium obeundorum instantibus convehere: quæ pariter manus erga fibræ membranas pro sensibus peragendis exequuntur.

Dum itaque serio perquirerem quibus vibus totidem nervi, per valorum tunicas differantur inserviant, demum reperi Arterias istas proprio manere, pariter ac alia præcordia, se contrahere ac dilatare, atque pro motibus illarum tum naturaliter, tum pathetice abundans, & spirituum copias, & instantibus rationes per nervos istos deferri. *Enimvero ex Observationibus Anatomica plene constat* Arteriz cuiusque tunica mediam esse plane musculare, atque fibræ carneæ (cujusmodi sunt ventriculi, intestinorum & quorundam aliorum viscerum) per totam constare: Quæ fibræ annulare, deus velut capilla, membrorum ferit, Arteriz ductum sive Tubum ubique cingentes, proculdubio systolas suas proprias & diastolas, æque ac Cor ipsum obineant, quæ propter impulsus, dum fibræ cardiacæ, & dein hæ arteriæ succedunt & feratim contrahuntur, necesse est sanguinem à meca una ad alteram rapidissime propelli. Quare haud proterus de nihilo est quod Medici quidam etiam Arteris facultatem Pulsificam attribuerunt, quippe multum improbabile est merito cordis, tanquam emboli impulsu sanguinis circumum peragi. Quanto verisimilius est arteriam intoro ductu suo, à fluxu cuiusque sanguinis retro aliquatenus contractam, ipsam usque prostram per rivulos licet minores, & sparsim magna angustia offeret juxta hunc itum ordinatum, sanguine æqualibet circumpellendo, arteria constantem systolam & diastolam vicea habere videntur: Quæ licet celeres admodum, & lectu oculi clivus, successive tamen per omnes tubi arterialis partes peraguntur. Ceterum vero cum adversum æquabilem sanguinis cursum, juxta passionum impetus diversimode hoc erumpit & perturbat, necesse erit tantummodo ita fieri, quatenus arteria (propter instantem per nervos ad fibræ morientes darum) variis in locis subito conficitur, fluxum sanguinem aut sistunt aut eripiunt, aut prostram impetuosius adigunt: In Timore, Tristitia subita, Pudore, Amore aliaque pathematis, animi constipationem, aut confusionem magnam indocentibus, probabile est Arteriaz Aortæ

truncum à fibræ istis subito & diutius confictis, adeo contrahi & coarctari, ut sanguis æque tantum, & non nisi per minutas positiones & cordis sinibus exitus. Quamobrem ab illo ibidem æggesto & stagnante, gravamen ingens & oppressio magna statim sentitur: Deinde si huc sanguinis remora cordis ad sanguinem ejiciendum pulsatoris foris & vehementer superveniat, necesse erit ob atrocem quæque systole in cordis basi ejectam, ubique percussam, partes eas plurimum distendi, proindeque palpitacionem cardiacam inferri.

Quemadmodum autem vehementes animi Passiones affectum istum fere quilibet accersant, ita hypochondriaci & spasmodici dispositi, insulsum ejus de levi qualibet occasione, imo interdum sine ulla causa manifesta subeunt. Eundem in quibus nervi splachnici & cardiaci materia morbosica sæpius obideri solent: proinde ut illa ob plenitudinem aut irritationem commota, spiritus istum partium & vicinarum incolas frequenter in spasmos & contractiones inordinatas adigat, passim accidit propter nervos arteriarum cardiacarum radicibus inferos, à tali causa affectos, etiam vasorum hominum fibræ spasmodice affectæ & contractæ eo, quo dictum est modo, palpitacionem cardiacam excitant: quo citius nervi cardiaci à causa propinqua aut remota à materia morbosica, aut in capite juxta originem nervosam, aut circa præcordia aut hypochondria subsistente irritantur, inque ipsarum varii generis agnoscitur, alibi à nobis ostensum est, (*Vide lib. I. Tit. de Convulsione*.) Unde palpitacione cardiacæ, quoties eadem etiam spasmodica fuerit, causæ deduci possunt.

Quod spectat ad affectus hujus Therapiam, si quidem causæ ejus variz & multiplices existant, etiam curatio diversimoda institui debet. Cum itaque supra declaravimus Cordis Palpitacionem, vel à sanguine, vel ab Arteriarum cordi appensarum vitio procedere; & utraque horum varias efficiendi rationes innoverimus, restat unicuique aptum medendi methodum accommodare. Primo igitur si quando hic morbus à sanguinis vitio procedat, intentio Therapeutica primaria erit sanguinem nimis aquosum, & accendi & fermentescere inhiabere, ad meliorem crassitatem, ejusque principia activæ depressa aut diminuta evadere aut augere: in quem finem medicamenta spirituosæ, item talina cuiusque generis, sulphures & imprimis chalybeata conducunt. Quinimo hoc referri possunt quæ in pica, leucophlegmia & scorbuto frigidiore præscribi possunt. 2. Cordis Palpitatio & crebris & multo immutatur, ab arteriis coarctatis in vitro habentibus exoritur, & tunc illarum culpa aut *Obstructio* est aut *Æstus spasmodicus*. Prior iste morbus plerumque continuus, & non raro incurabilis existit, præsertim vero si à Pulmonibus tabidis, aut arteriarum radicibus propter tuberculum, aut excrecentiam aut ossem semioptletis aut coarctatis excitatur. Cujusmodi causæ si quando subsunt, & perfecte dignosci possunt, frustra esset eam sublationem moliri: quin potius id unice agatur, ut levamine quodam per hypnotica subinde procurato, egrotantium vita, cessante paulo diutius protrahatur. Ceterum non improbabile est Arterias interdui à concretionibus polyptosis ibidem, ac interdum intra cordis sinus proptinxi solitis, magna ex parte impleri, proindeque sanguinis exitum liberum & totalem impediri: hujus vero diagnosis non difficilis, ita curationem vero minus raram posuimus. Quando illius suspicio est, maxime ex usu videntur fore medicamenta salina, & ex his tale volatili aut acido prædict exhibenda: eadem vero non simul, sed quodam temporis spatio hæc, quibus non juvenibus deinde hæc altera expectari licet. 3. Palpitatio cordis sæpiissime affectio convulsiva est, & à simili causa, & efficiendi ratione

Hinc qua pariter et alia hypochondriaca vel asthma-
tica produci solet. Cujus item curatio per remedia
simplicia/modica pariter tentari debet, quorum vere de-

lectus sub discrimine quodam, juxta quod morbus in
intemperamentis aut calido aut frigido contingit, in-
stauratur.

OBSERVATIO V.

Cordis palpitatio à bile retorrída in arteriis effusa.

Hujus tanta vis est, sæpe ut sit animadversa thoracis vicinas costas effregisse: sæpe &
has quæ supra mamam sunt de propria sede depulisse. Sæpe etiam arteriam foras dila-
tasse in aneurisima contracti pugni magnitudine, in quo & tactu & visu conspicua erat pul-
satio, &c. Hujus causam omnem vetetes vel in sanguinis exuperantiam terulerunt, vel in hu-
morem copiosorem pericardio infixum. Cæterum in illis quos modo exempli gratia recen-
sui, Palpitationem peperit retorrída bilis, quæ alias sponte vacuari consuevetat, in arterias
effusa. Hanc in duobus, qui à valida pilæ exercitatione repentina morte sublati sunt, illic de-
prehendimus in topi nigri speciem concevisse. *Fernelius Pathol. lib. v. cap. xii.*

S C H O L I A.

Dilatasse in aneurisima Quod intrinsecus in magnæ
arteriæ aliqua sede, in pectore, jugulo, hypochon-
driis, vel etiam in ipsa cordis auricula, quæ valde
amplius porosit, natum, non minus quàm exterum
Aneurisima perpetuo pulsantem sensum in eo loco,
ubi est, mover, illiusque palpitationis quæ tamdiu
durat, hominem; tandem cum scisci, causam aliquan-
du esse, scitio nobis, si in illis qui hoc morbo exin-
guuntur institueretur, sicuti à quibusdam observa-
tum est, sine dubio parefaceret. Ex copia autem san-
guinis arteriis hæc profusici potissimum, satis pa-
ter, *Galenus* quoque eo quod omnes sanguinis emissione
sanari vel juvari scilicet, etiam videretur innuere: Quæ
& pulsatio eo major sit, quo sanguis, & spiritus illi
confusus, arterias implentes fervidiores existunt,
Qualem sanguinem summo ex calore velut retorrí-
dum deprehendit *Fernelius*: quem nos sanguinem
biliosum fervidumque præcipue, nunc inquinatum
& imparum, in vas mesaraicæ collectum, majori-
busque arteriis infusum esse sic demonstramus,

Quod ejusmodi focus, qualem in venis mesaraicæ
frequenter nasci docuimus ab esculentis potulen-
tiisque, sicuti ex venæ portæ ramis in cavam tran-
sitas, sanguinem illic accendere & contaminare
solet, ita quoque in mesaraicæ arterias, singulis
venis mesaraicæ annexas, quandoque se infinuat,
indèque in majores arterias perlatius, illarum san-
guini confunditur, & cum eo undique, etiam ad
cor usque diffusus, sic illas implet modique enarra-
to afficit: eoque facilius quod arteriæ hæc mesarai-
cæ, propagines sint magnæ arteriæ, venæque me-
saraicæ à vena cava minime putescantur, ut illi
nisi intermedia hepatis substantia contineretur:
hincque adeo frequens hic affectus virginibus, causa
suppressionum mentium, cachectici, melancholia
hypochondriaca laborantibus existit: in quibus
uri venarum & arteriarum sanguinis plenitudo vi-
tiumque cachexia & melancholia, sic cordis &
arteriarum pulsationi occasionem præbet, *Placem
prænot. lib. i. cap. xi.*

OBSERVATIO VI.

Palpitatio cordis a hydatidibus in ejus membrana enatis.

Nos in cordis membrana in palpitationi subjectis ægris observavimus hydatidas. *Ro-
fskius Epitomes meth. cogn. & cur. lib. 2. p. 2. cap. 1.*

S C H O L I A.

Hydatida Sive pustulas aqueas, vesiculis ab em-
plastris vesicatoriis excitatis non absimiles, af-
fectus familiares; quæ forte eveniunt quod vasa
lympharum recursum destinata, officio, ricè non fun-
guntur, quos si ut pars lymphæ in transitu hærens,
exudet in cavitatem ab initio perexiguam, efforma-
tam in membranosa parva substantia. Verisimile
autem eundem liquorem continere quem Peri-
cardium, ab urina multum dissepantem, quan-

quam cum ea conuenire plurimi velint: insipidus
enim est hic liquor aquosus, non acris aut salisus,
limpidusque ac nullo colore infectus: urina autem
nec tenuis adeo, nec sine colore in sanis: adde hæc
visciditatem umينو expertem lympham autem plus
facile obtinere, quippe quæ corpore exempta ope
caloris externi in gelatinam concrevit: unde veri-
simile est lymphæ ductus quosdam adesse qui eam
in pericardium deferant.

OBSERVATIO VII.

Cordis Palpitatio à corpore carneo & membraneo, auriculis cordis annexo.

Dom. N. palpitationi cordis diu obnoxius fuit: In cadavere dissecto occurrit corpus
carneum, membraneum, cavum, auriculis cordis annexum & unitum parte superio-
re, paulo minus corde ordinatio. *Videat. de morte subita.*

OBSERVATIO VIII.

Cordis palpitatio ab Ulcere & Abscessibus in ejus substantia.

§. 1. *F*emella quædam scabie enormi affligebatur, & dum remedia adhibita non proficeret,
ad thermas relegata est, ex quibus hydropica rediit, atque tandem morrem subivit.
Aperito cadavere omnia viscera sana, in Corde ulcusculum repertum. *Oswaldus Gremb:
Arbor. int. & ruin. lib. 2. cap. 1. §. 8.*

S C H O L I A.

S C H O L I A.

Aque pericardio contentæ usus est, ut si aliquid ex digestione subalcereur, hoc quanto citius aqua illa (quæ jaceo dicitur) eveniret: quod si autem productum pettinacius impingatur, tunc aqua copiosius affluit, ut scopo naturæ satisfaciat: hinc non ob copiosius collectam, sed propter peregrinos hospites,

in cadaveribus invisibiles, Palpitatio cordis indicat. Arque hæc sunt causæ occasionales, non tantum palpitatio, sed aliquando etiam ulcera in ipsa substantia cordis, quod dicitur
formellæ obliqui. *idem*
idem.

§. 2. Archidiaconi hoc morbo interempti corpore dissecto, Abscessus in cordis substantia inventus. *Foresius lib. 17. Observ. 1.*

§. 3. Excitari potest cordis Palpitatio à tuberculo, Abscessu. *Hallerius.*

O B S E R V A T I O IX.

Cordis palpitatio à lapidibus in eo contentis.

§. 1. **N**uper in N. corde, qui hoc morbo frequenter corripitur solitus erat, veluti lapillus quidam niger repertus fuit. *Thom. Erasmus in consil. Scholtzei, consil. 103.*

S C H O L I A.

Similis in aliorum quoque corporibus reperta esse adicit *Prostratus*, quandoque hos non tam palpitatio quam Tremore (qui à palpitatioe alia est affectio, & imbecillitas iohannes existit) laborasse judicet. Est enim, ut Palpitatio motus visus expultricis cordis, quæ molestiam inferentis expellere contendit: hinc pulsus sunt majores solito, & veluti cor saltem videretur, licet vehementer laesum accedit. Quoniam non ab imbecillitate cordis palpitatio nascitur, ut quidam male judicavit, sed à facultate valida, nocentia pellere conante. Summa igitur causæ hujus mali res cor gravans, vel qualitate vel quantitate. Plerumque à spiritu fluctuante proasali hoc symptoma, quoties nimirum à substantia halitosa cor inflatur & distenditur, multa probant. Nam & repensiva invasio, &

cita solutio, dolor etiam subito accedens & deficiens, oculorum obnubilatio, aurium sibilus, partis alicujus motus tremulus id satis declarant. Quibus etiam addi hoc potest, quod fere illis accidit frequentius qui fluxum sunt plenique, sicut virgines quæ non recte purgantur, gravide, icterici, splenici, melancholici, cachectici: Omnes hi propter vitiosos humores, fuliginosos vapores facile accervant, qui in aëstis cordis vicinis, aut in ipsis cordis sinibus inclusi, virtutem expultricem incitant ut motum talem edat. Consensu curatio, quæ vacatione aut dilcussione status perficitur. Hinc est quod magna inspirationes malum hoc brevius & lenius reddant, præsertim si quis corpore retortum restitutum sic inspirari, &c.

§. 2. Quidam audacissimus latro, palpitatioe cordis frequenter corripitur solitus, rostræ fuit affixus. Nos hujus cordis visendi cupidi, pulsans adhuc incidimus, ac in ventriculo ejus dextro tres reperti lapilli, ciceris magnitudine, coloris cineritici, oblongi, pondo unius drachmæ, &c. *Zacutus præf. admir. lib. ii. cap. xxi.*

§. 3. In Imperatoris Maximiliani secundi corde secto. Inventi sunt tres lapilli, quantitate pisorum, unus interim major altero, colore rubiginoso: Frequenter vero cordis palpitatioe gravi afflictebatur dum viveret. *Wierus de præstigiis Daemon. lib. 4. cap. 16.*

O B S E R V A T I O X.

Cordis Palpitatio ob polypum auriculæ dextræ annatum; Alium item in aorta.

Hentici Schrafferi Belgæ aunorum 50. cadaver Hamburgi à M. Kirshento Anatomico & Medico insigni apertum anno 1651. in quo sequentia notabantur publico dignissima. In dextro cordis ventriculo repertum est concretum, seu Polypus ingens, qui annatus erat dextræ auriculæ in parte superiore versus cor, & extendebatur sinuato ductu in ipsam capacitatem dextri ventriculi, ubi pariter adhaerebat parieti inferiori, implicitus valvularum cuspidibus. Porro progrediebatur sursum & exibat per venam arteriosam, in cujus truncum & deinde ramos tripartitus, sive distinctus in tres ramos, porrigebatur. Rami illi rursus in alios multos furculos, & tandem filamenta definebant. Circa exortum duos prope digitos erat lata hæc concrecentia, longa spithamam unam & tres circiter digitos. In auricula sinistra inerat alia concrecentia, sed vel nullo modo, vel plane leviter adherens: In cavitate auriculæ pars erat latioꝛ referens concretum sanguinem, proindebatur autem in arteriam venosam, ubi candicabat, distributa similiter in aliquot ramos, inter quos erat res potioris (qui rursus in alios minimos dividebantur) inserti in ramos minores arteriæ venosæ: In aorta reperiebatur alius Polypus ejusmodi insignis, cujus pars latera sive basis sita erat in divaricatione trunci, ubi etiam adhaerebat firmiter, sibiq; peculiaris quidam sinus, instar sphaeræ dimidix vel vesicæ effectus fuerat, in quem una & major ejusdem exuberantia inferebatur. Hic appense erant duæ quasi radices, quarum una in arteriam dextram immitebatur, altera eaque bifida in carotidem sinistram: Basis erat subrotunda; instar

cucurbitulæ balnearum, & in longum extendebatur versus Cor, ita ut illum non ingrederetur, sed ingressum aortæ in cor attingeret: In fine erat appendicula: Longitudo totius quasi quinque digitorum: Omnia vasa cordis, ut & auriculæ, erant ampliata, miræque dilatata, imprimis caudæ arteriæ aortæ: præterea in vasis illacis ejusmodi vitia sunt reperi-
ta, ut in sinu cerebri falcato, ubi per totam prope longitudinem effusa videbatur concretio alia, quæ, in primis versus posteriora, in duos ramos diimebatur, in plurimos furculos similiter & multas appendiculas distinctas: *Observatio D. Ioelæ Langelotii, Archistri Gæ-
serpiani.*

S C H O L I A.

Quamvis non expressus affectus à quo interem-
ptus æget, quem vel syncope cardiaca, vel mor-
bus atonicus occupare potuit, non secus ac Mor-
bum illam Bazium, de quo *Walp.* lib. 1. *Observ.* 17. non
dissimilem Polypum corde gestantem, verisimile ta-
men prædictum indelinenti cordis palpitatione affli-
ctum fuisse, quandoquidem id onere fatigatum, om-
nem conatum ad illius excussionem adhibet: Recte

enim *Clar. Syrm. de la Roi* Pr. Med. lib. 1. cap. 15.
Palpitationis cordis causam puro esse, quicquid ab-
que intermissione ipsam ad sui contractionem inop-
dinatam, & quandoque simul vehementem, apertam est
incitare, sive illud intra cordis ventriculos aut in ejus-
dem substantia conuearur, sive extra Cor exilient,
ipsam tamen ad tempus aut temper continuo vellat,
morder pungere.

OBSERVATIO XI.

Palpitatio ab irruente affatim in cor sanguine, ut septum ipsum disruptum fuerit.

Vix per quas humores & vapores tum ex licne, tum utero ad cor deferuntur, olim
designabantur Arteriæ, Nunc novi concilii Anatomiz decreto, Venis hoc imponitur
jugum: cum reduce sanguine promiscui humores excrementitii cor petere possunt: Irritatio
incipit primo in auriculas & ventriculum dextrum appulsa: augescit in sinistrum ventri-
culum delapsa, sive viam capessat per pulmones sive per septum: Irruptio hæc nonnun-
quam adeo vehemens est ut septum ipsum disrumpatur, cujus tragici casus exempla suppe-
ditavit. *Harveum Ralsinkim. Epist. meth. cogn. & cur. lib. 2. part. 2. cap. 1.*

OBSERVATIO XII.

Palpitatio cordis ob substantiam carneam in ejus sinistrio sinu contentam.

Dom. Pet. Prevotius, celeberrimi illius concionatoris & Theologi, Petri Prevotii Ge-
nevensis filius, obiit 26. Martii anni 1672. annu ætatis agens circiter LV. lampridem
cordis palpitatio illi molesta erat, cum asthmate, herniosus præterea, necnon de molestia
& pondere conquestus in dextro hypochondrio. Paucis ante obitum diebus colicis dolo-
ribus cruciatus fuit, cum adstricta alvo, ab incarceratione intestini in Scroto: Cum maxime
urgebat cordis palpitatio (cujus leipothymia sepe comes erat) juvabatur venæ sectione.

Aperto cadavere, in thorace Pulmones putridi reperti. Lobus dexter ima parte dia-
phragmati annexebatur, mediante cartilagineo corpore, semidigiti crassitie, cordis figu-
ram exprimente, trium digitorum, parte summa, latitudine, ima in conum abeunte. Dia-
phragma sutum & ad mediam thoracis partem, à tumido flatibus colo, compulsum erat.
Abscessus a dextra, quinque digitis infra Jecur, intra duplicaturam peritonæi, pure fetidore-
fertus: Jecur putridum, instar fungi friabile ad minimum digitorum contactum: In scroto
pars illi devoluta erat cum Epiploo, præter aquæ copiam. Cordis autem ventriculus dex-
ter continebat corpus quoddam concretum, rubens, liberum, neque parietibus annexum,
avellanæ magnitudine.

OBSERVATIO XIII.

*Palpitatio cordis sanguine atro repleti, extraordinarie magni, ob corpus album in arte-
ria magna contentum, Partis valvule consumptionem.*

Puer 33. annorum temperamenti sanguineo biliosi, passus est post magnum haustum frigi-
dæ in calore, continuam cordis palpitationem per aliquot annos: accessit Phthisis &
Hæmica.

Mortuo aperto, non tantum Pulmones accretos, ulcerosos, purulentos reperi, sed
etiam cor stupendæ magnitudinis conspiciebatur, plenum & extensum sanguine atro & ni-
gerrimo: Et ut istam copiam sanguinis bene perpenderem, incepti à vasis, versus cor pro-
grediendo, ejus apertionem, ubi in artetia magna, ad longitudinem unius digiti, à cordis
sinistri ventriculo, in sanguine saniam à corde extruso, particulam quandam albam instar
unguis minimi digiti inveni, quam tanquam ibi plane præternaturalem cum acceperim,
erat

erat friabilis instar arenæ, & cum ulterius versus cor progrededer, in ortu arteriæ inveni mediam valvulam lunarem, usque ad substantiam arteriæ plane consumptam & disperdita; & illam partem, ubi arteriæ adharebat, etiam friabilem in similem arenam, sicut alteram particulam arteriæ sanguine repletam, nullum vero pus. *Ex Observ. tob. G. Greiflii Medici Viennensis.*

OBSERVATIO XIV.

Cordis Palpitatio ob corpora extranea ejus ventriculos occupantia, & vasa adfita.

§. I. **D**OM. de Becheran initio mensis Novembr. 1646. ad me venit, & de Palpitatione cordis ab aliquot diebus ipsum infestante conqueritus est: Pullum illius constrictans, illum in æqualem invencio omni genere inæqualitatis, ita ut statim in memoriam revocaverit historiam Antipatri apud Galenum, quem ipse censuit habere obstructions in lævis arteriis, vel crudum Tuberculum: Nulla erat tunc temporis respirandi difficultas, & æger munia consueta obibat, neque ulla remedia nisi diebus festis usurpare volebat: præscripti statim *vena sectionem iteratam*, ac postmodum purgationem, à quibus meliuscule habuit. Post x. vel xii. dies iterum conqueritus est de eodem affectu. Varia præscripti remedia attenuantia & incidentia citra satisfactionem, quibus tamen non usus est variis districtus negotiis: Tandem initio mensis Decembris decubule, cum difficultate spirandi laborare inciperet & tibiæ inflatæ apparent, & tum temporis remedia præscripta usurpavit cum iterata V. S. quæ cum per dies xii. continuata nihil opis attulissent, sed malum perpetuo in pejus rueret, convocatum est consilium aliorum Medicorum, quorum sententia fuit esse alvæcum similem illi, qui recensetur à Gal. 4. de loc. c. 8. Et ita incidentibus atque attenuantibus remediis esse oppugnandum: Variæ remediorum formulæ in hunc finem præscriptæ, sed æger perpetuo in pejus ruebat, summa difficultate spirandi laborabat, & pulsus nullus apparebat in carpo: adnota tamen manu supra regionem cordis, palpitatio sentiebatur frequentissima, debillissima & inæqualissima: aucta etiam erat tibiærum inflatio, ut jam etiam crura invaderet: Remedia præscripta fuere prioribus similia, quibus addita sunt cardiaca interna & externa. Biduo post æger ad extrema redactus videbatur: Suffocatio ingens aderat, & pulsus in brachio nullo modo, in corde vix percipiebatur: Eadem die morturus putabatur: Cucurbitulam apponi jubeo regioni cordis cum scarificatione, cujus beneficio *Zacutus Pr. adm.* Obs. 133. lib. 1. quendam ægrum à desperata cordis palpitatio liberaffe se testatur: meliuscule habuit, & nocte insequente cæpit excernere per sputum sanguinem nigerrimum, crassum & glomeratum, cum tussi molesta, unde levior respiratio fieri cæpit: ad expectorationem juvandam utebatur frequenter syrupo de tussilagine, cum quarta parte oxymel. simpl. & juseculum Galli veteris cum pectoralibus: His remediis per quæriduum continuatis, æger in eodem statu remanebat, sanguinem continuo nigrum & crassum excernens: 5. die à sanguinis sputo, 4. Janu. 1647. exhibui elixir proprietatis ad gutt. xii. cum tantillo vini generosi, à quo levamen percepit æger, & tota nocte facilius fuit anacardialis: die 6. iteratum est elixir, & juseculum galli veteris, verum inde non melius habuit, sed aucta in dies spirandi difficultas, & sanguinis sputo etiam plurimum aucto, die 8. interit.

Aperto cadavere, inventus fuit *cordis ventriculus uterque sanguine concreto repletus* ac distentus; tum etiam totus Pulmo sanguine multo repletus visus est, unde caloris nativi suffocatio contigit. Præterea in sinistro cordis ventriculo inventæ sunt caruncule rotundæ, substantiam pulmonis emulantes, quarum major ad avellanæ molem accedebat, & arteriæ aortiæ ostium præcludebat, unde pulsationis defectum in arteriis contigisse puto. *Roverius cent. 1v. Observ. xxi.*

S C H O L I A.

PAUCIA ante ubito diebus causa hujus morbi procaruncula mihi relata est, quam æger nunquam retulerat, terror scilicet insignis, quo ille graviter affectus fuisset, dum Arelare Monspelium petens, su per Rhodanum eum familia sua in naustagii periculo fuerat: Hinc conjicere licuit à terrore sanguinem retrahentem fuisse magna copia ad cor, ut ab eo regi non posuisset, sed in ejus ventriculo concreverit: ac deinde eo onus grave excutere continuo tentans, motus illos palpitantes, tremulos, & inæquales ediderit: Tom sanguis per venam cavam jugiter ascendens, liberum aditum ad cor non inveniens, ad Pulmonem refluxit: cuiusque implevit. Illas autem carunculas genitas fuisse puto à sangui-

ne redundante, quem caler insignis ventriculi sinistri excoxerat, & in hujusmodi substantiam mutaverat. Caruncula similis & multo major inventa fuit in dextro cordis ventriculo militis occisi. Ille tamen ante bona fruebat valitudine, quia caro illa patieribus ventriculi ex parte adharebat, ideo venarum osticia non occludebat: Hinc patet sanguinem in cavitatem aliquam effusum in tales carunculas posse converti à calore coquente, quod aliis exemplis probati potest: hoc fit instar omnium & notissimum, quod plerumque mulieres, præsertim steriles, dum menstrua patiuntur, carunculas exiguas cum sanguine frequenter excernunt: quod quidem in calidiori temperie pendit magis con-

tingit, quia huiusmodi accedens, exiguae sanguinis porcionculae excoquantur & in ejusmodi canaliculas commutantur. *Ideu.*

Vnde sicutem dicitur) Galenus omnem Palpitationem juvari venae sectione auctor est, §. loc. aff. Et qui Galenum interpretantur ideo locum sectioni venae dant, etiam posito quod causa frigida palpitationem inducat, quoniam aut minuat plethora, aut obstruendo V. S. liberetur, aut revellatur cutis materiei fluxuosae: Supponit enim Galenus a crasso vapore palpitationem fieri omnem oriri, ideo non est dubium quin & ad divertendum revellendumque cutem phlebotomia conferat. Sed an audacter, ad imitationem veterum, sanguis mittendus? nequaquam: Nam eorum qui palpitationi sunt obnoxii ita comparata ratio est ut si *hæmorrhagia* fiat, ut sæpe in phlebotomia ipsius & purgationibus operantur & moriantur: Quod cum calamitosum sit, prudens est Medici inspicere na suspicionem sub: at ejus ut oculis quem sua fore percipiat, &c. Quod ad V.S. ad leipthymiam usque, videtur ea nocens esse, quod palpiatio, ut annotat quidam in Aculanum, dispositio quædam media sit inter pulsum & debilitatem & syncopen, &c. Sed *Arulani*, ut acutus & optimus auctor, unam tantum rationem asserit quæ nos inducere possit ad tam leucantiam & copiosam sanguinis effusionem, ut pote cum in sanguinis copia & orgismo, & ad cordis arcum raptus metuitur, ne deterente apostema in corde percipiatur, & mors proinde subita incuteretur: aut etiam si inflammationis subitæ sint argumenta, quæ ipsius palpit. causa sit: In isto enim casu, quoniam insignis & subita refrigeratio requiritur, ac brevi tota ipsa regio inflammatur, nullum præstantius remedium in V. S. aliq. conferre & copiosam. *Galenus consil. 109. lib. 1. Vide Septimum lib. 6. Aneur. 167. & seq.*

Ventriculus utroque sanguine grossissimo repletus) Palpitatio cordis, leipthymia, syncope quomodo à concreto sanguine inducatur, & quomodo huc concretio fiat, analogia ducta à chymicis liquoribus ad corpora soluta humores, ostendit. *G. Walsinghamus Wilelmus* in Miscellaneis curiosis anni 1671. Observ. 197. In Chymicis, *id.* liquores varii secum confusi non invicem semper se subeunt, sed prout particula variis figuris motibusq. & proportionibus inter se invicem prædita, & consequenter symbolice vel asymbolice existunt, ita vel si destituant modo, vel amicabili coitu junguntur, vel in aliud ens morantur. Hoc modo elegans experimentum fecit *Olaus Bartrubius apud Boribolum* in Epist. de Herede defuncto p. 83 qui sanguini canis arretio, in quinque diversis vasculis posito, quinque diversis liquores miscuit, acetum, oleum sulph. jovis solutionem, aluminis, Spir. vini & spiritum salia ammoniaci, & accurata inde productos affectus adnotavit: Certum est à subeuntibus sanguinem humoribus varie à laceratis corpore ipsius crasi, varioque in-

da seclitate morbos: Et inter alia producta non leve est *grossifera sanguinis*, quæ si contingat, accedente nimirum sanguini concentrante fixantique tali liquore vel vapore, certissimum est rursari anioniam ipsius, & dari leipthymiam & syncope, si in gradu majori id fiat, sin. minori, expellitur cordis ad motum illegitimum irritatur, palpiationem tremoremque inducit. Hoc ipsæ tantum concentrata fixusque leviter sanguis *hera*. Exc. de gen. an. 70. p. 193. Tunc talia quæ coagulationem hanc impediunt, sumunt profum: hinc Costalia, oculi cane. perle, cinnaabaris & lapis bezoar. profunt, item succa citri, mixtura s. aliæque. Illud enim mirum est, & peculiariter discursum requirit, quod acida sanguinem fluxilem & tenem coagulent, crassum vero & coagulationi deductum resolvant: hinc & externe in dictis cordis infirmitatibus acetum & acida sumunt profum: 1. quia ob salia volatilia subito penetrant ad cor 2. una stimulant naturam, quæ inde ad se reddit, 3. Quia resolvunt sanguinem, quibus non inconcinne additur à nonnullis. 4. Quia abeunt spiritus quasi figunt: Hæc addo, Viri III. hypochondriaci, cum alia elim symptomatibus, vertigine præsertim afflicti, tum hæcenas aliquoties Palpitationem cordis passus est, tantam ut ad 30. aut 72. horæ non raro duraverit. Imminente malo, si leviter instillatissima digesta vel minimam excesserit (alias potius proficua quam noxia cibus) fenit eor quasi consilii ab elaris ab hypochondriis humoribus. Quia dubiet à consilii humorum, & misant inde in sanguinem deducit, coagulationem alii attentari, unde cog palpiet? Bini alii hypochondriaci, aliter juvenis, aliter 35. annorum, dolente hypochondriorum vixit, syncopen aliquoties de subito experit, cum ipsi præ, pallore, & *hera* *hera*, solare solvuntibus & præcipitantibus talibus testibus hæcenas nihil tale patiuntur. Assertit nosit veritatem dilucidant siue sanguinis, quæ juxta Platonem in sanguinem deductæ & sparæ sunt, in mediocrem tenuitatem & crassitudinis habitum consequatur, neque propter caliditatem, cum ipse sit lubricus, ex raro corpora defluat: neque si crassior sit, ad motum fiat ineptior, atque egre per venas fluat & refluat, Harum si natura consideratur, quod (quæ etiam Platonis verba sunt) à bile aliisque humoribus cum puro sanguine mixtis, ex ordine facile dimoveantur, cum ex hypochondrii Sylviana, variis morbos, tum hunc ipsum tremorem, quem Plato nomineretur attingit, oriri posse manifestum est: Vide locum integrum elegantissimum in *Plat. Tomes p. 545. Hæcenas Wilelmus* Cujus sententiam de grossifera sanguinis à certis liquoribus deducta firmat *Kerlingem*, in Observationibus, qui Polypos aliæque corpora in corde & vasis non raro reperta, similem generationem habere asserit. Videtur inferius, Quæ de fibræ sanguinis ex Platone asserit, ad egiem in eum locum comment. *Wilelmus* consil. lib. 3. conf. 40.

§. 2. Puella annorum sex toto vitæ tempore morbis fuit obnoxia, dein Palpitationi cordis & asthmatis, tandem atrophia perit.

Huc inventa auricula cordis dextra prætumida, cui inerat materia quædam alba, membranosa, crassa, oblonga: In ipso cordis ventriculo dextro materia pinguedini similis. *Observ. Clar. Gajjar. Bauhini.*

SCHOLIA.

Materia quædam alba) De hujusmodi corporibus, cordis sinus & vasa obstruentibus. vide obs. 36 lib. 1. sect. 1.

§. 3. Illust. N. nonnunquam cordis palpitatio vexabatur, Cor in utroque sinu substantiam quandam obtinebat oblongam, teretem, mollem. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 4. Cum

§. 4. Cum de rebus p. n. in corde repertis agatur, & de cordis palpitatione, non omit- tendum putavi quod in militis præfidiarii uxore observavi quæ post *dissectum*, ex nimia sub- sequuta hæmorrhagia diem suum obicit: cadaver fere *dissectum* fuit, quædam sanguinis grumefacti reliquæ uteri parietibus ad hærebant, viscera non ita bene morata erant, pul- mones variis vomitibus & abscessibus erant repleti, alter pulmonum lobus lateri ad hærebat, & in altero cordis ventriculo portio materiæ membranose continebatur, quæ partim etiam in vena cava contenta, crassioris & oblongi lumbrici similitudinem nobis exhibuit: Hæc scemina cordis palpitationi erat obnoxia. *D. Puerarius in Observat. Selectis ad Thoma Bur- net Thesaurum Medicinæ prædictæ lib. 3. sect. 58.*

§. 5. Vir annorum 27. gracilis corporis habitus, temperamenti calidi & sicci, quatuor annis laboravit cordis continua palpitatione, cuius remedium unica fuit sanguinis missio: verum symptoma recrudescente, tandem syncope correptus interit, corde palpitante non infuso proprio, sed circa diaphragma lateris sinistri valde demisso.

Aperto cadavere, eor maximum apparuit, solum unam continens cavitatem, seu ven- triculum, in quo 3xvj. sanguinis nigerrimi adnumeratæ sunt: Cordis corpus totum erat emaciatum, arteriæ præ pondere elongatæ & conniventes, ita ut sanguis spiritalis mo- tu cordis non potuerit amplius expelli ad arterias: Loco dextri ventriculi vena cava ascen- dens in ingentem elevatæ tumorem: Dicite jam, Si ambo ventriculi cordis necessarij sunt, an in uno præparentur, & in alio perficiantur spiritus? *Antonius de Pazzis observ. xl. miscel- lan. curios. anni iv.*

§. 6. Observatum est palpitationem cordis mulieri, melancholia hypochondriaca labo- ranti, post molestias multas contigisse: Mors.

In *sinistra cordis sua pars humoris melancholici* reperta est ibi veluti concteta ac ferme- nata: Atque ita spiritus oppressi congelative sunt, eorumque incitatio & motus repressus. *Carl. Ballonius Paradegmate 109.*

S C H O L I A.

Pars humoris melancholici in sinistra cordis sua) Ed de- ducta a liene & hypochondiis: In hoc sympto- ma propensius esse qui hypochondriaca melancholia laborant, annotat *Frasium*, & quibus lien bilis ære

copia in gescit: unde etiam circa lienem & pancreas conspicua & molesta percipitur arteriæ pulsatio: At non solum tetro aëreque vapore inde elevato, sed ipsa etiam menter parte, humore scilicet, melancholico.

§. 7. In ventriculis cordis interdum varia p. n. generantur, sanitatis haud parva impe- dimenta, quæ tamen in ægrotantibus à Medico ulx sciri aut cognosci queunt, Frustrula adiposa, ac quasi carunculas molles & albicantes, magnitudinis circiter semini ovi, inter- dum majoris, non semel in his invenimus & spectatoribus demonstravimus, scilicet in morbo sublati cadaveribus: Inter alia mense Octobri 1665. secuinus & demonstravimus cadaver juvenculæ circiter xxij. annorum, quæ vivens diu conquesta fuerat de summa cordis anxietate & palpitatione, ac leipothymias sæpe passa, sicque tandem extincta fuerat; in quo cadavere etiam tale frustum adiposum, dextrum ventriculæ fere replens, & aliud parvum in sinistro ventriculo invenimus, atque diligentiori examine instituto, animadver- timus illud non fuisse corpus aliquod ex sanguinis coagulatione genitum, sed revera cor- pus adiposum atque firmum, quod digitorum frictione non dissolvebatur: Hicque mor- tis causam fuisse judicavimus, nullam enim aliam in toto corpore invenire potuimus: nec illa vivens deullo alio malo quam de prædicta maxima cordis anxietate, & palpitationi- bus ac leipothymias sæpe recurrentibus conquesta fuerat: quam ob causam imperiti do- mæstici illam sæpe levi epilepsia sine convulsionibus, vel hysterica passione laborare judi- caverant.

§. 8. Mense Decembri 1668. in alia juvencula ejusdem ætatis, simile adiposum corpus, satis firmum, magnitudinis semini ovi gallinacæ, in dextro ventriculo invenimus. *De Die- merbroeck Anatom. lib. 2. cap. 6.*

§. 9. In Mercatoris cupisdam dissecto cadavere, vidi dextrum cordis sinum, cui vena cava inferitur, interiore sui parte durum, exasperatum undique & quodammodo squamo- sum, ut inferna manus mea squamarum scabritie offenderetur: quo in loco continebatur frustum condensati humoris pituitosi, lenti, albicantis, longitudine digiti medi, crassitie pollicis, aut amplius, sanguini immersum, quod medullam cruris bovill calefactam substantia & forma referebat: Laboravit palpitatione cordis diuturna, ex qua & mortuum narra- bat ejus Medicus qui ine ad sectionem adduxerat. *H. Smetius Miscellaneorum lib. x. initio.*

§. 10. Carnosas excrescencias in cordis dextro ventriculo vel sinistro repertas fuisse in his qui Dolorem cordis & synopen passi fuerunt, & pulsum intermittentem habuerunt, refert *Vesalius Anat. l. 2. c. 5.*

*Cordis Palpitatio à tribus calculis in ejus septo inclusis, Cum cordis
extraordinario incremento.*

Nicolaus à Sonnevelt circa xij. ætatis annum ex febre quadam acuta evadens, aliquandiu valetudinarius vixit: nam exinde fere per sexennium diversis malis obnoxius vixit, diuturnæ lienis obstructioni, crebris ex naribus hæmorrhagiis, cephalalgia, multis catarrhis & tumoribus strumosis in collo: Ad 18. ætatis annum cæpit bene valere, sed morosus valde manebat, qualis in adversa valetudine semper fuerat, circa xx. annum crescente robore à patruo ipsius, qui pannis præparandis operam navabat, ad idem opificium delegatur: Ubi mox à suis commilitonibus ad crebras comportationes invitantibus cæpit rursus male habere: Primo in crebras cordis anxietates incidit, postea in leipothymias & inde cordis palpitaciones: Cibi potusque erat avidissimus, sed comestum sæpe regerebat, unde debilius sequura ipsum decumbere jussit: Tum prædicta mala quotidie augescere, atque Palpitatio tanta suborta fuit, ut in vehementiori animi commotione *ab adstantibus audiri posset*; quod ipsum tum valde dolorificum erat: xx. Decembr. 1641. è vita decessit & cadaver apertum fuit: In abdomine quidem omnia naturali modo constituta reperiiebantur.

Sed thorace aperto inventum fuit cor bovino non multò minus, quippe communem magnitudinem quater circiter excedebat: Increverat autem æqualiter fere circa substantiantiam & cavitates, ipsique substantia naturaliter solidior: Sed in villis septi intermedii, tres calculi reperiiebantur, pili circiter magnitudine, non admodum adhuc solidi, sed arenacei & novaculæ cedentes: Pulmones satis bene habiti, sed utrique lateri paulum fibrillis quibusdam adhærentes, quod ob angustiam pectoris à cordis incremento ita contingisse videtur. *Onho Heurnius observat. xxviij.*

S C H O L I A.

Ad *adstantibus audiri posset* Palpitationis tantam aliquando esse vim alteri *Fernelius* cap. 12. lib. 5. Pathol. ut sæpe sit animadversum thoracis vicinam costas effregisse, sæpe & eas quæ supra mammam sunt de propria sede depulisse: sæpe etiam arteriam foras delatare in aneurisma contracti pugni magnitudine, in

quo & tactu & visu conspicua erat pulsatio. *D. Magnus*, Medicus Parisiensis cum *Fernelio* observavit effectus vi palpitationis costas, sed illas costas longe ante abcessu ventris fuisse; alioquin incredibile esset historia. Cuidam tanta palpitatione contigit ut vehementer deliraret manus pectori applicata.

OBSERVATIO XVI.

*Observanda in Cadavere Comitis Belcarrensis, Palpitatione cordis ab albo & spisso liquore
in Pericardio, Calculi duobus juxta ventriculos cordis etc. laborantis.*

Ventre hujus Nobilis dissecto compertum fuit Omentum esse macrum & parvum: Hepar valde magnum, Splen etiam magnus fuit, repletus nigro spissoque humore: Stomachus ejus & viscera omnia vacua, coloris crocei, distenta solo vento: Vesica felleis tumida humore nigro: Renes repleti specie sanguinis grumosi: 2. In Thorace lobi, i. e. extremæ partes pulmonum, erant integri, sed malo colore, in sinistra parte nigricantes & cærulei, in dextra albicantes, cum tubere subflavo sub uno loborum. 3. Pericardio dissecto nil aquæ istius apparebat cui cor solitum est innatare, ejusque exterior superficies, à basi usque ad verticem, non erat plana sed asperissima: Cum scilicet dissectum est, quantitas albi inspissatæ liquoris effluebat, & infra basin, inter dextrum & sinistrum ventriculum, duo lapides reperiiebantur, quorum alter magnitudine æqualis erat amygdalo, alter erat duos digitos longus & unum latus, habens tres auriculas vel crispas angulos: Et in orificio dextræ ventriculi erat materia carnosa pinguis: 4. Torum corpus erat sanguine destitutum, æneæ & emaciatum, colore nigro & subcæruleo. 5. Cranio aperto tam cerebrum quam cerebellum erant secundum proportionem corporis magna, & ex eo plus sanguinis effluebat quam in ambabus aliis Regionibus visum fuerat. *Ex Actis Philosophicis Societatis Anglicæ anni 1665. pag. 145.*

S C H O L I A.

Nuda adest descriptio vitiorum quibus affecta fuere interiora viscera illi. Comitis morbo quo interit non designato, nec symptomæ ullo notato: Et quanquam vel de Apoplexia suspicari fas sit, ob

copiam sanguinis in cerebro: Vel de melancholico affectu, ob magnitudinem splenis, nigro ipsius humore suffusi: Palpitationem tamen cordis illi. Comiti familiarem fuisse censemus, quod calculos duos juxta

juxta ventriculos, cor cetera impedimentum sustinet vix potuerit; impedimentum præterea ab humore in pericardio contento: quo confertè porulè humor niger in Lienè conclusus, cupis cum corde maximè per arterias commercium. Contingit vero aliquando præsentibus causis Palpitationem cordis non accidere,

quâ longo tempore agri decubuerant, atque ob quietem tranquillè sanguis cursum suum præstis. Experientia enim cognitum hæcædicitur cor, si quieti degans, raro palpitare: à qualicunque vero motu, maxime in acclivium ascensu, vehementer concutit.

OBSERVATIO XVII.

Palpitatio ob cor cruore infarctum & intumefactum.

Præctici observant palpitationem cordis in syncopen transire, quæ tandem repentinam mortem causat, uti contingit illi. Viro juveni, qui præviis palpitationibus tandem in nonnullas sanguinis sputationes, & denique in syncopen incidit: qui cordis defectus nullis cedens remediis, in florida ætate vitæ filium præcidit: Quid enim venarum anastomosis causavit quàm hujusmodi producta, ex vitiosa cordis digestionè obnata, vim corrosivam habentia, instar salium corrosivorum, ad quorum tyrannicam vim obtundendam, archæus cordis etiam cruorem copiosorem alliciebat: hinc grandius redditum, & cruore infarctum secto cadavere in conspectum venit: Quandiu *isti sales & fermenta aliena*, tanquam peregrini fures non occiderant per remedia exaltata, aperta, subtilia ad quartam & quintam digestionem cuncta, palpitatione cordis non abigitur: imo etiam his quiescens abactis, si cordis fermentum imminutum fuerit, nisi per appropriata restitatur, vel male habens corrigatur, nulla erit spes curationis citra recidivam. *Observatus Grembs l. 2. c. 1. §. 8.*

SCHOLIA.

Quid venarum anastomosis? Si ex sanguinis ebullitione & redundantia Palpitatio fiat, signa plenitudinem demonstrantia habent apud Galienum libro de Pleuritide, quæ sunt differentie venarum totius corporis, rubor faciei, vitæ crapulæ dolica, cibaria sanguinem accumulanti, suppressæ sanguinis evacuationes ex utero, hæmorrhoidibus, nailibus: Dicebat *Artemides*, Qui ex languidi redundantia in hanc palpitationem incidunt, ab illis ventris juvant, qui nocet si à materia pituitosa producatur. *Sæmnia in Prædict. Prædict.*

Ex vitiosa cordis digestionè/Hæmores hi in corde generantur ob cordis languificationem lesam: Tum enim quod in chylo erat ut palea & furfur, rite non leparatur, nec ex ætate in excrementorum receptacula deponi potest, sed crebra circulatione ad fontem redit. *Rafsimus Epist. medic. cogn. & cur. l. 2. p. 2. c. 1.*

Isti sales & fermenta aliena Hanc *Germæus* & effervescentiam agnoscit *Clar. Sydenh. de le Boi. Prædict. l. 2. cap. 19.* Quamvis æt, cordis palpitatio, animique deliquium grave, ortum habet nonnunquam ab humoribus una cum sanguine ad eon delatis, ac vitiosis effervescentiam producentibus: abiguntur tamen eodem sæpius producti ab hâcibus acerbis à tenui intestino, ob eundem visiolam ibi excitatam effervescentiam elevatis, & tum ad ventriculi superius orificium & gulam, tum ad cor, per lacteas venas ductumque thoracicum deductis, & sanguinis effervescentiam contrahantibus, cœque irritantibus: Inequalis autem ejusmodi effervescentie causam refert in inæquali nunc Billis, nunc Lymphæ, Liquorificæ ex intestinali Triumviratu productis, alioquinque forsâ hæmaturum, sanguini admixti solutorum, ac nondum illi satis perspicuorum, quantitatis altetur (sanguini juxta: *Legatur caput intum. ut & 35.*)

OBSERVATIO XVIII.

Palpitatio à flatibus pericardium distendentibus.

§. 1. IN quibusdam pericardium flatu distentum vitium, qui tandem solcit in aquam concretescere, nisi cordis calore dissolvatur. *Schotsographus ad cap. 29. lib. 1. Praxis Hofferii.*

SCHOLIA.

Nicolaus Magnus, & nomine & re præ ingenti excellentia magnus, à xix. ætatis anno palpitatione laboravit, Narrat se tum palpitationem incipientem sensit, cum ætas undeviginti annos contingeret in umbellæ Philophorum Xysto disputeret: Nam cum aliis aliud soler contingeret, non mirum si in ea contentione quidam in epilepsiam incidant, in palpitationem illi: Atque ab eo tempore ex intervallis ea palpitatio repetere solet, eamque ex stomachi cruditate originem habere credit: Nam flatibus erumpentibus levatur plurimum: & cum accessio adest, necessarii illi decumbendum, obliuendumque à cibo & potu: exactis horis aliquot, sedox manus toto corpore, allevatur, cibum capit. *Ballonius Paradigmat. 74.* Sed quamquam hujus palpitationis causa verisimiliter in flatu regenda videatur, Si tamen medicis cor accensendum sit, eisdemque affectibus ac illis pareat, Spasmodicum quid illi contingisse probabile est, à vehementi spirituum animalium in cerebro congestione, atque hinc in nervos cordis explosione, unde hujus inordinatus & concitior motus: Si idem spirituum impetus & agitatio intra cerebri confinis subsistat, Epilepticas tantum accessiones invectur, quod multis contigisse dum acius in rem aliquam ludent, cum animo voluerent observant.

§. 2. A flaribus pericardium distendentibus Palpitatio plerisque incidit: *Pericardium flatu multo distentum* deprehensum est: Et is flatus in aquam aliquando concrevit. *Ballonius Prædigu. 96.*

S C H O L I A.

Signa quibus Palpitatio à flaribus inducta dignoscatur, affert *Hollerius*, exemplo Præsidis Rothomagensis, qui ab incurre ætate ad annum 55. quo obiit, palpitatione cordis tenebatur, ac præsertim à somno meridiano, & ubi acutius tibiis decussatim complicaret: Senfus quidam erat tremulus ad carotidas: Pul-

sus parvus vel nullus: Solvebatur paroxysmus edito ructu, crepitu, clythere, dolore in mediis claviculis exciatio, deinde in fronte, vel tussi suis violenta natura: Idem mulieri contigisse ait, reppererunt Medici in utroque Cor esse calidum, frigidiorum ventriculorum sic vapor exciabatque calor diluere non poterat.

§. 3. Ego hujus affectionis sedem non in ventriculis tantum, sed etiam in pericardio, & intra membranam Cordis parenchyma circumvolutam contineri existimo: Quod in pericardio, & ratio & Galeni autoritas comprobant: Si enim palpitatio in omnibus quæ distendi possunt partibus fieri potest, quid obstat quo minus cordis etiam capsula huic obnoxia sit: præsertim cum ibi adsit materia quæ in flatum resolvi possit: Unde *Hollerius* dictum se vidisse scribit cadaver cuiusdam palpitatione laborantis, in quo hæc capsula cordis utroque instar inflata erat. *H. Saxonia Præcl. Pract. cap. 1. part. ij.*

S C H O L I A.

Materia quæ in flatum etc.) Hypochondriaca affectione occupari Palpitationem ut plurimum obnoxia tunc, Singulare exemplum mihi obtigit anno 1664. in Nob. Maxima annos 38. nara, quæ perpetuo querula, læmationes & molestias in omnibus corporis partibus persistentes, tandem cordis palpitationem, sibi alias familiarem, adeo vehementem experta est, ut costarum fracturam minaretur: Ad quam accedens, cordi, inquit illa, manum admove, jamque dubia tibi non erit morbi mei gravitas, (verbis enim simul & herbis crebras querelas mulcebam) ac omni generosis remediis proximus illum impugnes, statum brevi imminuer, Coram vero auspicatus sum ab enemate molliente, quod illi adstrictior esset alvus: mox alterum carminans injectum, à quo minor multo affectus: Exhibita & hæc posio ℞. Syr. cortic. citri, tubi ladii, gayophyll. hort. ana. ʒʒ. Syr. de Kermes ʒij. margar. præp. ʒj. aq. meliss. pæoniæ, scabios. calendul. ana. ʒʒ. aq. napæ ʒʒ. ol. cortic. citr. gut. iij. Admotum cordi Epithema ex Theriaca & de cons. hyacinth. aceto sambac. dissolutis: Hora citius desistit immanis illa palpitatio, ut plura moliri prædicia necesse non fuerit. Vide Schol. ad Observ. ix.

Flatu distentum) Causa Palpitationis cum plarime sint, necesse erit eas distinguere: Flatus & vaporem præfacit facilitas accessus & recessus: Peculiariter vero dum flatus palpitationem facit, universum corpus refrigeratur, pallescit, vinctum aures, vertigine caput torquet, & in aliis quoque partibus palpitationes sese produunt, in facie, ciliis, superciliis, cute denique tota: In flatus venit, & solvitur affectus ut plurimum eructatione aut crepitu: Vaporem similiter palpitationis auctorem ostendit aurium tinnitus, vertigo, suffusio, quandoque oculorum, facies rubicunda, mox pallida, pulsatio venarum, oris amasitudo, exetemea biliosa. *Saxonia in Præcl. Pract.*

Intra membranam etc.) An intra eam membranam & cordis parenchyma ea possit fieri flatus collectio quæ palpitacioni excitanda sufficiat, dubitacionis locus est, Nullus enim ibi videtur flatus locus ob arctam membranz adhesionem: Non omnino tamen impossibile esse flatum ibidem collectum indicat eadem passio in cute familiaris, subjectis partibus tenacissime adherente: Quod si flatum summa penetrandi vis perpendatur, divellendi distendi, minus mirum adhuc videbitur.

OBSERVATIO XIX.

Palpitatio cordis à vermibus Pericardio conclusa.

Quemadmodum cordis motus ab aquæ incremento omnino supprimitur, ita ab aliis hujus capsulæ incolis valde irritari atque perverti nonnunquam solet: Quippe sæpe numero Vermes intra capsulam hanc geniti arrosione sua magnas cordi aliquando molestias faciunt; atque cordis tremore, anxietate, pulsu sæpe intermittente, dolore pungeute & syncope se produunt: Quam symptomatum & animalium catervam carapasmare & folliis cinare, tanacetii & absinthii vulg. aceto vini albi acerrimo incoctis, & cum mithridatio mixtis, regioni cordis bis applicato penitus dissipatam vidi. *E. Lower Pract. de Corde p. 107.*

S C H O L I A.

Vermes difficulter cognoscuntur & raro exacte, nisi à morte, quæ plerumque subita est: Si præ-

dicta symptomata adsint, & exhibita cardiaca frustra sint, de ejusmodi verme suspicio incidat.

OBSERV.

OBSERVATIO XX.

Palpitatio ob adhesionem pericardii cum corde.

ADhæſio pericardii corpori ipſius cordis Palpitationem inducit, quod in duobus hydropicis obſervatum eſt. *Gulielmus Ballonius lib. 1. conf. 109.*

S C H O L I A.

VT ſimplex non eſt uſus aque pericardii erga cor, ſurgendo quippe illi inſervit, & ab externis injuriis tuetur: ita oec uno modo illi officiæ accidit: Si cut enim aque copia obutum notamentum inſert, ſic ſi hæc proſus deſicit, ac tunc adeo cordi accedit, ut ipſi tandem undique adhæreſcat: Hinc cum diaphragmæ accreſcat quoque, cordis motum cum illo confundi & committi necelle eſt.

OBSERVATIO XXI.

Cordis Palpitatio à variis Pericardii affectibus producta.

§. 1. **T**Res vidi Palpitationi cordis obnoxios, In uno diſſectio apparuit in hac tunica (pericardio) duriuſculus tumor, nucis parvæ avellanæ magnitudine, non petſectè calloſus. *Vide tit. de Phthiſi.*

§. 2. Virgini cor cerebro & valido motu, continuo ſub noctem recrudescere, palpitabat: Pericardium repertum exſuccum, putrefactum, & ſuo humore privatum: Cor ſanum. *Vide tit. de Phthiſi.*

§. 3. Cordis involuclum, Pericardium vocatum, continet unum aut alterum viſcidæ aut rubicundæ alicuius aque cochlear, cum ad ſaciliorem motum viſceris nunquam quieſcentis, tum ne præ nimio æſtu facile exandefcat ſons calor, qui inſtar Solis vitæ imparititur corpori univerſo: Aqua autem vel copia nimium exuberante, vel calore à ſtatu naturali decidente, exoritur protinus vehemens cordis palpitatio, cujus indefatigabili motu fatigat nobile hoc viſcus excurte quod quacunque ratione ſibi moleſtum eſt, cuius voti niſi reddatur compos, & ſe & corpus perdit univerſum Stephanum, Jonam juvenem vegeti corporis, deſatigatum impenſe ex pedeſtri itinere, corripuit inopinato quaſi inſultu acutiſſimus laceris ſiniſtri dolor, cum ſpiritu difficili, ac ſumma cordis palpitatio: quorum ſymptomatum imperum, quum nec ſanguinis detractio, nec roborantia ulla infringereut medicamenta, actum fui de ipſius ſalute, ſuccubuitque ſub pondere viribus nimis gravi, contraxit non tantum febre hæctica, verum etiam hydrope, abdomen uſque eo exrendente, ut necelle habuerit tandem ſub ſudore frigido; vitam cum morte commutare.

Quorum ſymptomatum graviffimorum ergo, ubi diſſecaretur cadaver, invenimus Cor flaccidum, ac juſto maius: aquam vero pericardii exuberantem ad xv. cochlearia: quæ ipſius copia produxit proculdubio Palpitationem cordis: Pulmotorum erat viriatuſ coſtiſque accretus: vena ubique tumida, omentum putredine infectum: uti venter cum cruribus aqua citrina repletus: Cavendum itaque obnixè à nimia deſatigatione, quæ tantum mali corpori dat. *Nic. Tulpii lib. 4. Obſerv. 19.*

S C H O L I A.

AD ſaciliorem motum) Quomodo aqua illa pericardio inchoſa ad lubricandam cordis ſuperficiem & ſaciliendam motum valde inſervit, ita non nunquam evenit ut nimia copia cor opprimat & inundet: quum enim in cordis hydrope involuclum illud implemum ſit, & latera ejus ab incumbente undique aqua eo uſque comprimantur, ut pro excipiendo ſanguine ſatis dilataſ non poſſint, tum poſſus valde diminuiſ, donec tandem inundante magis aqua protuſ ſupprimatur, unde ſyncope & mors ipſa ſuccedit: Pari tunc hoc fieri videtur ac in hydrope pectoris, ubi palmo ſatis diſtendi non poſſet, quia cum cavitæ thoracis aqua tepleret, pro dilataſione pulmonum nullum reſtat ſpatium, unde morbo iſto affectis difficiliſ, & tandem nulla reſpiratio ſupet eſt, licet ſummo conamine ſpirituſ attrahere conentant: Acque cum aqua iſtaſ pericardio cõtente nimia copia cor diſ motui adeo officiæ, ut ipſum tandem obruat ſupprimatque, veſiſimile eſt cordi palpitatioſi ſuccedere porioſ, quam concitatuſ hunc cordiſ motum ab illa irritat, quod quidem eo magis veſiſimile eſt

quod affectuſ iſte ſanoſ & improviſo ſæpe, aliſſique de cauſis exoritur, & nullo ſigno aut inditio adventuſium denuntiat. *R. Leaver Traſ. de cordi cap. 2. pag. 103.*

Cujus indefatigabili motu &c.) Quem convulſivum ſtatuit idem Leaver l. c. p. 128 Depravatuſ aut, Cordiſ motuſ in paſſionibus, veluti iſta, gaudio, terrore ſubito, quum ſpirituſ animales nimia & pluſ ſolita copia, aut majore impetu cordi advoſant, moeumque ejus maxime cotrapiunt, & horrendiſ aliquando ſubſultibus exagitant & convellunt: Quem aſſumum, quum non ſatis forſan perpendereut, diminuto vocabulo Palpitationem auctoreſ paſſim nominarunt: At revera cordiſ muſculus, uti eadem cum cæteris muſculiſ actioneſ peſſicæ, ita ab iſdem morbiſ hand immunuſ eſt; quippe ſpſmo & motuſ convulſivo æquo obnoxioſ eſt & ſæpiuſ multo ſentatuſ: In Palpitatione enim ſic dicta (qui motuſ convulſivuſ vere eſt) cor tam violenta ſyſtole ſæpenuſero cotripitur, ut ipſuſ coſtaſ loco ſuo moviſſe aſque perſeſſiſſe notum ſit: quin & aliorum ſpſmuſum morbo ab iſſo m

cauſit

causis excitatur & periodicè recurrit; Et ut sic correpti occasionem plerumque à subito terrore vel ira accipiunt, ita simili quavis de causa in eisdem affectibus denuò incident, à qua primo excitati sunt: ubi enim spiritus semel in tumultum & confusionem acti, impetu nimis in cor delati fuerint, deinceps potius ob levem quoscunque occasionem pariter irascunt, eandem viam & choream affectabunt, & simili spasmus cor correpiunt, prout videre est in iis qui palpitatio- nem sic dicunt obnoxii sunt. *2. Levem tract. de corde c. 2.*

Cornelia febre Palpitationis ardori febrili succedens causam reuertit *Pag. Sect. 5. lib. de morbis à Sero c. 2. ad vasorum illius exsiccationem præter naturam, unde quoadmodum convelluntur: Cum nempe cor fibris carosis nervi ostique quodammodo conlect, & carnem musculosam alium quæbeat, moveatur autem ab anima sentiente in oio ab electione, certe ut quid, cur non tremor in id cadere possit?*

§. 4. In corpore cuiusdam Gorzenfis oppidi incolæ, Jacobi Lorei, jampridem Palpitatione laborantis & spirandi difficultatæ, repertum Pericardium immanem in tumorem elatum, pluribus libris aquæ distentum. *Carolus Piso de illuvie serosa sect. iij. cap. ij.*

SCHOLIA.

SI Serum sensum à particularibus vasis tunicanam Cordis (pericardium intelligo, & propriam Cordis tunicam) cæliens, sive inter cordis parenchyma tunicanque propriam, sive in amplum pericardii spatium vacuum gillat: eaque copia congeratur tandem quæ oneri sui cordi, & libertatem in eo se movendi denegat, haud dubie sane difficilis & pertinax ab hac causa palpitiatio cordi accidit, quam oio solom sensus agri, sibi cor veluti in aqua innatare ac moveri sentiens declarat, simulque morbi diuturnitas; quippe cum hæc aqua haud facilem exitum habeat, & viam, minime reterege possit, ob densitatem autem & repertam membranosi corporis facile digesti non valet: Nec mirum distendi posse eam membranam sensum, sine sensu, in eam amplitudinem; cum olim observatam membranam tenuis in eam amplificationem longiitudinem, quæ universam abdominis capacitatem, servata tamen figura, coarctaret, & xiv. libras puris, exco parenchymate & suppurato contineret, nec ab eo pondere per aliquot annos comminutionem amisisset: scil. natura membranae est ductilis & extensibilis in omnem dimensionem: Atqui cum Palpitatione potissimum succrescat, aut à sero in vasis se infundente, & inde in cordis sinus de subito insiliente: Aut in pericardio contento, vel propria ejus tunica: Illam quidem causam subito indicat insulens, pulsatio arteriarum in temporibus, fontus sibilusque

aerium, oculorum caligo, & repentini dolores, & sensus flammæ diversis pervagationibus partes: quam conjecturam confirmat tempestive & coultitudo viciorum, ad calorem & siccitatem prona: cujus indicia præcipue sunt gracilis habitus & capillamentum nigrum: At verò Palpitationem ab aqua in capsula cordis, tunicaque propria contenta, arguunt cum scolis suffocationis cordis in multo humido, tam pulsus non adeo magnus, vehementis & concitatus: Si quidem cor non potest libere spariari in obstructa capsula: tum vero affectus continuus pertinacisque, ob causas ante memoratas, & fibrilæ hædæ speciem referens: Si quidem & aqua loco cordi adeo vicino concludi & quiescere minime potest, quin tandem putorem contrahat, & verò cor eam putredinem ferre nequit, quin vicissim recalescat p. n. Coincidant autem ejusmodi causam, Tabes corporis & spirandi difficultas: tabes quidem, eaque sine causa manifestata, fibrilæ scil. illius & fese imperceptibilis comes: Spirandi autem difficultas, quæ à parva scet corporis motu non medioeriter augeatur: quia nimirum parvus pulsus & impedius minime viui sufficit, ut crebriat respiratio sit compensanda, aut potius quia Pulmoni non est liberum in hoc affectu respirare quantum usus exigit. *Cornelia videri.*

§. 5. Georgius Benedictus Pharmacopola, quinquagenarius, scirrhus hepatis, obstructione splenis, & venarum mēaraicarum: item dolore continuo tum capitis, tum circa omoplatam dextram, nec non destillatione ad Pulmones, tussi & nonnunquam Palpitatione cordis aliquot mensibus vexatus est.

Mortui cadaver incidi, & inveni pectus plenum serosi humoris: Pulmonis dextram partem propemodum absumptam: sinistram non mediocriter inflammata, & pleuræ costisque mediante callo quodam firmissime adhaerentem: In Pericardio ultra libras quatuor saniosi sanguinis & materiz purulentæ Inveni: Nullum tamen indicium solutionis continui, neque in ipso corde, alioqui externa sui parte leviter inflammata, neque in pericardio; nec patebat via ulla per quam materia & aqua illa serosa ad pericardium percolata fuisse videretur: Id tamen ex ipso nonnunquam audivi, quum æger esset, percipere se interdum ad partem colli utramque, qua carotides arteriz ascendunt, frigidissimum quendam humorem ex capite delabentem ad pectoris regionem. *Fabritius Hildanus cent. 2. observ. 43.*

SCHOLIA.

PEnspere ad partem veli utramque) De effluui feci à capite in partes subditas per venas jugulares, colli

interibus edicis, Vide lib. 2. sect. 1. observ. 1. in (scholis. Et sect. 28. in fine §. 3. ex Rich. Leove.

§. 6. Ad sui contractionem crebro vel continuo vellicatur cor, tum à quocunque acris, una cum sanguine ad ipsum delato, sive illud sit acidum, sive salsum lixivium, sive ex utroque mixtum, quale salsum est muriaticum, Tum à quoque halituoso vel flarulento in cordis ventriculos penetrante, ipsiusque patietes aliquantum, non tamen nimium expli-

cante, & ita quidem ut iterum queant contrahi, Tum ab re cordi externa, in pericardio puta contenta, ipsūque rodente ac pungente: Sic offendimus ante triduum in pericardio humorem salūm & acrem, à quo tam pericardii quam cordis membrana erat erosa excoarāquo. *Fr. Sylvius Praxet lib. 1. cap. 26. §. 26.*

S C H O L I A.

AD *sui contrāctionem* Palpitationem cordis pro motu ipsius convulsivo habendam censio, cum re vera sit motus cordis inordinatus, sicut et sequuntur *sape vehementer*: Nam non semper adeit notabilis vehementia, unde gradibus non parum differe solet cordis palpitatio. Causam puto esse quicquid abique intermissione ipsum ad sui contractionem inordinatam, & quandoque simul vehementem aptum est iocitare: sive illud intra cordis ventriculos, aut in ejusdem substantia continetur, sive extra cor eductis, ipsum tamen ad tempus aut semper continuo vellicat, mordeat pungere: Quicquid ex veolis & auticulis effunditur in cordis ventriculos, & ac mox iterum ejusdem contractione expellitur in arterias, sic quidem aliquando pulsus majoris potentiorisve causa, non item palpitatio, ad quam producendam opus est ut ejus causa cordi adhæreat, vel inhaereat, ipsumque continuo ad ad sui contractionem inhaereat, quæ proinde fiet tum inordinatam, inaequalis, ac subinde simul vehemens.

Tum à quocunque autē ori. Examinatis ita quæ tum Ego in ægris palpitatione cordis laborantibus observavi, tum ab aliis Medicis notata vidi, judico ut plurimum illam ortam habere ab Humouribus Flatibusve multum viscosis, ac simul acerbis, ad cordis ventriculos delatis, & in ipsis hærentibus, atque ipsum ad inordinatam inaequalitatem sui contractionem

continuo irritantibus: Hi humores atque flatus frequentius ex renal infestis deficiuntur ad cor, sive sponte ob viscosam effervescentiam commoti eo propellantur, sive ob corporis motum concitiores, maxime in ascensu, vel Animi affectum gravem, sive ab externa causa, aeris puta æstu, aut frigore acrij alimentis dulcibus acidive; Remm quatenus obesse potenti, eoque mox flavi nunc ingesto &c. similiterque ad effervescentiam, Haliūque tam glutinosos quam acres producendos, & ad cor transmittendos adigantur & ingentur.

À quocunque delatū vel flatulento Hinc est quod ita plethorice affectionis hypochondiacæ speciebus tam frequens familiarisque sit cordis palpitatio: Hinc est quod tum sæpe circa febrium interminetium initia, urgente adhuc aut temerente frigore, ut & in eandem vigore, æstu existente summo, palpitatio sentiant cordis molesta.

Tum ab re cordi externa Præter notatos humores flatulūque observari sum aliquando in cordis substantia Tumores carnei, aut excrecitiæ ossæ, cartilagineæve, quibus palpitatio ad motum ulique conjuncta non immerito adscripta fuit. Vermes in pericardio reperi, cor pungendo, vel humore acris mordendo, palpitatiois æstus causa esse possunt, ut & vulnus cordis insitum. *Nem. ibid. cap. 35.*

§. 7. In Johanne N. post morbos complicatos mortuæ cadavere, Pericardium permagnum & aqua turbida repletum inventum est: Hinc palpitationes cordis quibus frequenter laboraverat. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 8. Puellus cordis palpitantibus detinebatur, pericardium aqua lutescente bilioso, foetida erat distentum, cui cor innatabat: Cor plane exsuccum, ut & alia viscera: *Vide l. 3. tit. de ventrii tumore.*

§. 9. Puellus cordis palpitantibus afficitur, pericardium humore bilioso, luteo, foetido repletum erat, cui cor plane exsuccum innatabat. *Vide lib. 3. tit. de ventrii tumore.*

§. 10. Palpitat cor per se primo, quando causam habet intra se; aut pericardio conclusum: Sexagenario cuidam cor vehementer palpitabat, interfuit, in dissectione observavi capsulam plenam aquis. *Riolanus artis medendi particul. sect. 1. tract. 2.*

§. 11. Puella palpitatio cordis & asthma vexata obiit: Pericardium aqua distentum erat, cordis auricula dextra tumida, cui inerat maretia quædam alba, crassa, oblonga, membranosa &c. *Vide tit. de Phthisi.*

§. 12. Contingit aliquando circa pericardium tumores & inflammationes fieri: Si crudus tumor vel tuberculum fuerit, palpitatioem vel tussiculam facit: Si verò inflammatio, eadem symptomata erunt quæ in peripneumonia, & hac nota discernuntur, quod minori anhelandi difficultate laborent, & minus levantur frequenti & multa expectatione: æstus maximus & febris maxima in tali affectione esse solet: Nos hanc affectionem deprehendimus in Nob. & Generoso viro, cuius cor erat obductum seroso humore verso in saniem quandam ob partis illius inflammationem: Et ne decipiaris, sentium quoque dolorem in lateribus membranae hyeozocotæ consentienti: Ipsi pericardio rarissimus est hic affectus, à quo pauci evadunt, quem nemo adhuc, quod sciam, annotavit. *Rondeletius de dignoscendis morbis cap. 21.*

OBSERVATIO XXII.

Amajore copia humoris in Pericardio non excitari Palpitationem, nisi alia accedat causa.

NOravimus majorem copiam istius liquoris non facere Palpitationem, quod tamen ex Galeni sententia communiter tradunt Medici: Nam in omnibus iis, in quibus post mortem in Pericardio humoris istius aquei majorem copiam reperi, antea dum morbo vivi-

rent, nullam omnino cordis Palpitationem, ne quidem in Anglo quodam cujus pericardium liquoris turbulenti, aquei coloris, ad minimum duas libras continebat, sed contra pulsum languidum ac ratiorem inveni: Neque etiam à copia istius liquoris tanta fit pericardii angustia, (et si id vulgo prædicetur) ut cor se in eo moveri libere nequeat, atque hinc palpitet, sed contra semper animaduertimus pericardium hinc adco latum laxumque reddi, (ut in prædicto Anglo) ut cor in eo multo facilius moveri possit quam in paucò liquore: Ita ut huius liquoris copia palpitationem minime faciat, eaque potius excutitur à quovis liquore, etsi paucò, dummodò præter ordinem plurimum & raptim dilatari, vel acrimonia, putredine, aliâve vellicante qualitate cor infestare, idque ad tam molesti hostis depulsionem incitare possit. *Diemerbroeck Anat. lib. 2. cap. 5.*

OBSERVATIO XXIII.

Palpitatio cordis ortum ducens à corporibus extraneis occupantibus Aortam arteriam aut alia vasa Cordi annexa.

§. 1. **C**alculum ubivis locorum in homine reperiri certum est, Sed in arteriis qui inveniretur, equidem hæcenus inveni neminem; ac proinde operæ pretium facturus videor, si ejus exemplum hic inferuero: J. Arminius, Pharmacopolæ minister, ob adversam valetudinem, frequentibus medicamentis à puero magis imbutus quam adjutus, devenit tandem in tam vehementem cordis palpitationem, & irrequietum agitati visceris impetum, ut verberantis ictus distinctè nonnunquam audirentur præ foribus conclavis, in quo id temporis decumberet: Quibus accessere frequens animi deliquium, præcordiorum angustia, spiritus difficultas, pulsus intermittens, urina nunc flava, modo nigra, modo cruenta, vel muco aut arenulis pectusa: Sed ulterius proserpente morbo, incidit quoque in anorexiâ ventriculi, cum crebro vomitu, Jecinore indurato, abdomine intento, cruribus tumidis, & tanta aquæ copia ut necesse habuerit ultimum obire diem.

Quorum symptomatum ergo ubi dissecaretur cadaver, Inventum Omentum putridum ac cruentum, sed Jecur magnum & plurima pituita refertum: at reliqua viscera ita parva, ut Lien vix dimidiatam manum, Ventriculus vix intestini jejuni, & Vesicula felle vix articuli digiti æquaret magnitudinem: Vesica urinaria erat admodum cortugata, & præ torrido æstu plane nigra: In Pancreate vero omnia dura: at in pulmone nihil non aridum ac maculosum: Cor contra magnum & amplum, sed sine pericardio ullôve vel minimo illius vestigio: Intestina vero innatabant aquis, ut Pulmo bilsææ: In Rene dextro latitabant plures calculi, partim rubri, partim nigri; quos inter unus, cæteris major, obtutabat integre vreticis principium: At prope renem sinistram, dedisse nobis in conspectum inauditum illud calculi genus, quod à loco cui inhæsit, lubet vocare Arteriale: insidebat quippe firmiter illi arteriæ aortæ ramo, qui vergit ad *glandulam Enstachii sinistro reni oppositam*: Disrupta autem caput ipsius (ita appellamus rotundam excrescentiam illius calculi, quæ cum angustiore collo, haud male refert caput implumis pipionis) arteriæ tunicam, lætante reliquo corpore in dilatata ipsius fistula: sed ita ut vulneris oræ minime liarent, verum contraherentur tam arcuè circa ipsius collum, ut vix guttula sanguinis potuerit illinc effluere: at vero protuberans hæc pars, quam caput vocamus, ut reliquo calculi corpore fuit durior, sic discepavit quoque parum à silice, sed quod delituit in arteria, erat molle: foris quidem ob adusti melancholici fucci miscellam, nigrum, sed intus albicans ac concretæ pituitæ simile: at capitis color fuit ex flavo cinereus, ad instar lapis bezoar occidentalis: totus autem lapis referebat ad amulum implumen aviculam: sed lanci impositus ponderabatur drachmas duas. *Nic Tulpius cap. xxvj. lib. ij.*

§. 2. In femina asthmatica & cordis palpitatione laborante, corpora pituitosa ulaz longitudinem superantia ex aorta extraxi. *I. Jac. Wesperus Exercit. de Apoplexia pag. 197.*

§. 3. Callum cuidam in arteria magna, loco cordi proximo, natum observavimus: Multis hic annis cordis palpitationi obnoxius crebro fuerat: Sex vero ante mortem mensibus, in sinistro carpo pulsum tam exiguum habuit, ut nullus sæpe apparuerit, ac sæpe sentiri non potuerit: Fuit palpitante corde: difficile admodum huic porum admittere, sic ut vix unciam simul bibere potuerit: In pectoris spatio sublatis coloris humor collectus quoque fuerat. *Dedemam annot. ad cap. 3. Benvenuti.*

OBSERVATIO XXIII.

*Cordis Palpitatio ab insigni carnis excrescentia, cordis figuram referente;
inter Aortæ caudicem & Venæ arterialis radicem.*

Reverendus N. jugi rerum cœlestium contemplationi addictissimus, statim à primis Runguiculis perpetua, sed quæ in dies, prout ætate proficiebat, cresceret, palpitatione laborabat; cùmque xlii. annos, natus esset, multaque medicamenta frustra admovisset, morbi longitudine & fastidio, vel potius impatientia victus, se tandem veneficæ mulicræ curandum, vel potius enccandum tradidit; nam sumptis 3. aut 4. potionibus; nihil tamen proficientibus; ad colocynthidos, ellebori nigri, cataputæ seminis decoctum devenit, unde subortæ convulsionem quæ ad mortem comitatur fuit.

Cadavere aperto, singula intestina iutus & extra observavi; maxime vero ipsum ventriculum valde magnum; namque in eo crudi humores, plurima & copiosissima pituita vitrea fuit reperta, & medicamento paulo ante assumpto commixta & confusa: Aperto autem thorace, pulmones turgidos & flatibus plenos offendi, quibus per mediam membranam separatis, cor ipsum valde magnum, neque naturaliter formatum apprehendi: atque pericardio dissecto, ecce inter arteriæ magnæ caudicem, & venæ arterialis radicem, in cordis basi, talem excrescentiam repeti carnis, quæ unciam unam cum sex drachmis libraret, & aliud corculum representaret: adeo ut unica fuerit perpetuæ palpitationis causa, mortem tamen non tulit, sed potius ejusmodi potionum assumptio: Eam autem excrescentiam summa qua potui diligentia liberavi, vino lotam & mundatam exsiccavi; quam adhuc reservo. *Ex G. Garnerii Einsheimensis Poliatrici observationibus.*

OBSERVATIO XXIV.

*Palpitatio Cordis, & Saltus circa ventriculi regionem,
ob Situm illius mutatum,*

Filius Parci Typographi adolescens, cum frequenter utraque manu terræ innixus, ut pueri lusum causa facere consueverunt, corpus in altum erigendū rotaret; cœpit cordis palpitacionem & pulsationē vehementem in sinistro latere, circa ventriculi fere regionem, sentire, quam à corde eousque propendente proficisci, sectio post mortem; sed & quod capiti innixus, cor denuo ad superiora ducebatur, fati declarabant: Nam asciticus factus; cum mortuum eum aperirem, *Cor, relaxatis involucri & vasis illius, quibus suspenditur, subdissecto, & mucrone suo, succingenti tunicæ, circa septi regionem, deprehendi affixum:* Dein & præter reliqua, hepatis, lienis renūque vitia, asciticis consueta, etiam in medio cordis dissecto, os tribus articulis constans, cavūque & arenosa quadam materia repletum inveni. *Felix Platerus observat. lib. ii. pag. m. 636.*

S C H O L I A.

Cor situm mutasse multi attestantur, ita ut pulsus dextro latere adventaret: *Cordam* in arte parva ait ut plurimum lethale esse cor in dextro latere pulsare, involutus enim inde cordis quasi dislocatio & in dextrum latus detrusio, vel magnam quid p. n. quod languore sinistro ventriculo dexter propellere annitatur. Periculosi & funesti etiam quandoque esse præludium tibus finit histotis; pimus eodem die, alteri post aliquot dies, obiit, tertius adhuc infans, & ex casu egrotans, convulsit quidem, sed nonnulli postquam gravissime agrosset: Et nos vidimus munculum puerum, cui ab abcessu in sinistro thoracis latere, cor ad dextrum latus fuit de-

trusum in quo pulsus deprehendebatur, qui & tibi multo post tabidis interit: *Notat tamen Rulandus animadversionibus ad Rastinum, Catharina Medica Læderij XII. Rege Christianissimi Marti, & eisdem quod dragcoario, latus thoracis dextrum pulsasse, vixisse tamen sanitate illibata.*

Cor relaxatum involaris &c.) Observandum quod monet *Alex. Benndum lib. 3. cap. 11. Anat.* magnam esse in cadaveribus cum viventibus positæ cordis diffinitionem, exemplo allato cuiusdam pugionis ictu interempti, cujus dissecio pectore, rursusque per vulnus pugione adacto, mucro neque cordis neque pulmonis vulnere respondit.

OBSERVATIO XXV.

Cordis Palpitatio & Tremor, ob vermem illi affixum.

§. I. **P**riniceps quidam valetudinarius, cum ex cordis causationibus multo tempore gravissime affligeretur, à Medicis suo pertinaci malo remedium quaerit: qui variis leatissimisque medicamentis frustra subsidium quaerebant: Accidit ut & Medicinæ Tyro

quidam, qui Principis Medico familiarius innotuerat, eodem casu cognito, inter alia quodae tefeteret, comprisse sese superioris ætatis conscriptorum consiliorum Medicinalium lectione, Vermis quoddam genus cordi nonnunquam innasce, quod nullis remediis, præterquam unius allii, ejusdemque manæ sumpti, usu cederet nec carceret: quod remedium, quia vulgare, atque ob id Principi viro, cui pretiosa & exotica potius expectabantur, neglectum est: Principe igitur morbi diuturnitate & sævitia tandem devicto & mortuo, mortis causa ab idia investiganda fuit.

Difsecto cadavere, deprehensus est vermis albus, præacuto rostelllo, eoque corneo præditus, cordi adhærescero: Quem Medicus vivum ex allii succo in mensa figuratum coniecit circum, fera circumquaque tependo misit se contorquet, & ne circumum conlingat cavet: tandem vero allii vi & nidore victa concidens, circulo adhuc conclusa moritur, unde non tam morbi causa legitima, quam certa & indubitata remedii vis manifesta innotuit. *Ioh. Hebenstreit libello de Pesse.*

S C H O L I A.

Vermiculos & in corde & in capsula ejus gignit affectu *Hartmanni* Pt. Chymist. cap. 3. Cognoscit aut ex puncturis & doloribus cordis, tum ex lumbri-

cis excretis vel nou excretis: Diagnosticum est convulsionem.

§. 2. Cognitum habemus Treviri virginem diu multumque de cordis tum Dolo re tum Tremore conquestam, & inirum in modum tortam & excruciatam fuisse: Remediis quæ ad robur cordis alias sunt, frustra tentatis, tandem ægra moritur.

Secundo ad veri indagacionem corpore, vermiculi in corde, mali hujus tam funesti causæ deprehensi sunt. *Ex M. S. Stockeri.*

S C H O L I A.

Virginem) Morbum virginis familiarem esse ait *Hartmannus* loco citato: *Mellius* refert mulierem rusticam palpitatione cordis & inflatione ven-

tris ac si quæret gereret laborasse, Vermibus quamplurimis exclusis non valuisse: Sæpe insolentia symptomata siferunt vermes.

§. 3. Valerudinarius quidam Palpitationi cordis per intervalla quatiēbatur: Inventus est vermis cordis dextro ventriculo adhærescens. *Vide tit. de Syncope.*

S C H O L I A.

Valerudinarius) Alexis Pedemontratus, qui lib. 1. lectet, proponit remedia contra vermes cordis, in morbo quem Lunaticum ipse vocat, hæc signa ponit, non modo palpitationem, sed tremorem totius corporis, leipodynamiam & synopen, totius corporis pallorem & refrigeracionem; ludorū en-

pionem circa thoracis & cervicis partes. De Lunatica autem pulsione censet *Brannius* eam non ex vermibus in pericardio nasci, sed intestinis genitā, & in ventriculo ascendentibus, ostificūque ejus molestantibus, quod *Wepf* appellatur.

OBSERVATIO XXVI.

In Palpitatione cordis obnoxii arterie magna tunica admodum dilatantur.

§. 1. **V**Num circa Cordis Palpitationem à me observarum omittere nolo, & est quod his in cordis palpitatione laborantibus, propter insignem admodum motum aortæ arteriæ, tunicæ dilatantur, unde veluti à subitanea morte cotripiuntur, quia sanguis spirituosus veluti præceps in tunicam hanc, pericardium dictam, fertur, à quo cum cor laxari nequeat, systolem atque diastolen faciente, perquam & recipit & expellit, suffocatur sua munia facere nequens. *Hippol. Boscus de Facultate Quæst. lect. 4. p. 41.*

§. 2. Dom. de Vaujour annos natus xx. cum palpitatione annos aliquot laborasset, assumpto castia bolo eodem die interit, Quod his contingit qui ea palpitatione molestantur Omnes arteriae evidenter in singulis fere partibus palpitare videbantur.

Aperto cadavere, adco omnes cordis valvulæ & magna arteria distenta visa est, ut cor triplo, aut saltem duplo amplius videretur. *G. Ballonius Paradigmatæ Lxxij.*

S C H O L I A.

Assumpto castia bolo eodem die interit) Turpis vero est calasmatis Medico ægrom eodem die qua assumptu pharvacum purgans, imetire, inquit *Hipp.* Hinc patet omnes in palpitationi obnoxii à vehementioribus purgantibus abstinere, ne humor communis aut vapores acritatem in cor levis idque opprimat: Castia autem quamdam lenitatem, eoque nomine commoda videtur, hoc in casu incommoda est & noxia

Boedelius notat quasdam affectiones catalepticas ejus usū contingisse, & eorum usū qua illam recipiant: quoniam caput facile formis replet & ventriculum subvertit, cujus osticio cum corde magnus consensus: *Ballonius* l. 7. de virgin. & mal. morb. asserit mulieris & leipodynamiam & tortiones alvi usū castiæ exituras; Imo & quidam Romachi subvertiōem ventriculorum enim quid habet & virosum, quod ventriculo molestum est.

Omnes

Omnes arterie palpitare &c.) Palpitatio habet varios locos & causas, quique variz sunt differentiæ. prima est quando motus est solius cordis tantum, non etiam arteriarum, quæ nullam subeunt mutationem in pulsu sed apparet tantum in cordis regione : Alia est quando simul cum corde omnes etiam arteriæ moventur, temporum, jugulares, universi corporis, ut etiam oculis dependentur : hujusmodi motus est triplex, 1^o, mixtus quidem, qui etiam in Remissis scribitur, cunctas dilatare & frangere potest : secundus magnus simpliciter, & hic percipimus in corde & arteriis : tertius parvus : Quæ habet tantum cordis motum, si ex statu contento, non in ventriculi cordis, sed in pericardio : hic potest elevari & deprimere pericardium, nec tamen arteriæ moventur : ratio est in promptu, quia non consistit in ventriculi cordis : Hanc speciem ubique vidi Hollerum scilicet in cap. de palp. scilicet quendam differtentiam inventam, cui pericardium in

motum ore elevarum & distantum erat. Alia differtentia est illa ubi Cor simul movetur cum arteriis, quæ fit propter motum vehementissimum illum, quando dilatauntur costæ, qui motus non fit à statu, neque à facilitate expulsiæ : neque enim habet tantam vim, sed fit ex bile tenacida & eruita ad cordis substantiam confluentem & impetum facientem : comparatur hæc, ubi affusum afflictiis, pulveri rosmontionum, qui accensus movet & propellit objecta : ita etiam illa potest cor & propinquant partes propellere : hinc in illis inventa tenacida billa : Sin vero motus sit magnus, celer & frequens, sine inspiratione tamen, est motus facultatis expulsiæ cordis, irritantæ ad expulsiorem noxii : Hujus lenientia fuisse Arabes omnes & Gal. lib. 6. de di. bus decret. cap. 1. ubi scilicet non esse operationem, i. e. secundum asturum, sed afficere

Chronem, l. c. præter naturam. H. Sarracina Pambis lib. 2. cap. 8.

OBSERVATIO XXVII.

Palpitatio cordis succedanea, vel comes variorum affectuum vasorum illi adstrictorum.

- §. 1. **E**xcitari potest cordis palpitatio à plurimis causis : In quodam vidi genitricem ab abscessu in vena arteriosa. Scholiogr. Hollerii ad cap. 29. lib. 1.

SCHOLIA.

Excitari potest à plurimis causis) Quas perstringit Balthasar consil. lib. 1. cap. 15. desigando, aut in eade ipso affectionibus causa est, & tam periculosa est causis : Aliquando à partibus vicinis est, aliquando à remotioribus, ut ab Utero, à maligno ribianum Ulcere : Tuberculum in corde, Abscessus item affectionis causa esse potest : Multus Sanguis obstruendum faciens, Intemperies calida, Vermes cor vellicantes, Subita evacuatio : Impregnatio : quemadmodum enim mulieres quædam venereis affectionibus prehendi solite, cum utero conceptu iis liberantur & miraculo absolvuntur, eduo vero factu repetunt, ita quoque pregnantem mulieres infolentes morbo possunt invadere : Præter causas memoratas, Inflammatio, Aqua tunica cordis inclusa, item si tunica aut Humorem putrem & male olentem in se continet, aut Lapillos, pulmum indurcit, item venenata qualitas, spirituosus aut crassus Halitus, vel ab arteriis, vel à corpore Cordis, aut à Pulmone, aut à Liene aliæque parte, aut propinquitore aut remotiore elatus : Constructio major, Ductibus intenes, & doctum, præsertim si magna Arteria perperam ipsam prematur : A luccentis puribus lignis clatus vapor, Ductus & attractio Spiritus Auræque pestilentis : Ad hæc pericardii corpori ipsius cordis : Mucus per quendam colligationem in cor illibens (unde vulgo dicunt quodam repente interire quod adeps colligatus in cor influxit) Ac tum, cum colligationis modo mucus ille in cor labitur, falsis illud creduntur agri : Si palpitatio nem ut inflammatio aut erysipelas committit, febris ingens, pulsus durus &

velut ferras : Si à venenata aura inferne in cor supergenet, fugax est malum : Cum venenata aura in pestilente itatu, præcepit viciis omnium lapus est : Cum à mucro per modum colligationis in cor supergenet, arget sit anhelosus, parva & densa spiratio est : Videmus palpitantem afficere ob aneurisma in li or : quæ si in corde ipso aneurisma sit, lethalis est affectus : Quæ palpitatio lyncopen veram præsentem habet, intansibilis est : Quæ ab adheziis pericardii lethalis est : Quæ à colligatione, intansibilis quoque est, item & ea quæ à venenata aura est : Atque inter ceteras palpitacionis causas una & communis & vulgaris est, intemperies frigida ventriculi & jecoris calida : Dum enim ventriculus non bene suum officium facit, & secundum coctionem tantquam correctionem & emendationem sui prima non agnoscit, jecur calidius sapie crudius alimentum, hinc anachymaleon proveniens melius, obstructionem illas, & ab istis obstructionibus palpitandi occasio, Quod hypo. hondriacis solenne est, cachecticis & virginibus fœditate coloris infestis usu venit.

Vena arteriosa) Vena, arteriosa vulgo dicta, severa Arteria pulmonaria est, non modum lubrificata, & iis reliquis similis sed & pulsi : hæc ampliundine per modum æqualis venæ cavæ, æque hanc multo minori officio è dextro cordis ventriculo egrediens, in dextram similiterque pulmonum patienti bitido ramo ingreditur, propagines suas quoque venarum dispargens, sanguinemque è vena cava ad cor admissum ad pulmones transmittens.

- §. 2. Repertum est Romæ nuper in Beato Philippo Nerio Sacerdote, qui sæpius in palpitacionem cordis incidebat ex vehementi extasi, cor valde amplum, & Arteria quæ ducit in Pulmonem duplo latior naturali : Eidem dux costæ mendose in laree sinistro abruptæ à suis cartilaginibus, folles intar elevabantur & deprimebantur dum palpitacionem pateretur : quo remedio divinitus servatus est ne extingueretur, usque ad annum octuagesimum. Andreas Casalpini Casopri artis Medica lib. 6. cap. 20.

SCHOLIA.

Artetia que ducit in Pulmonem) Alias atetia venosa vulgo; Neoterica vena pulmonaria est, cujus officium sanguinem per arteriam pulmonariam pulmonum substantia infusum, ac cum

aëre per asperam arteriam ingresso commixtum suscipere, atque ad sinistram cordis ventriculū transminere.

§. 3. Joh. Fabri circa 50. annum cœpit ægre respirare, cum molestissima cordis Palpitatione: Prima arteria sub corde, ex magna ad caput sub corde ascendente orta, maxime dilatata erat. *Vide l. 4. tit. de Tumoribus.*

§. 4. Uxor N. Sæpe palpitatione cordis vexabatur: Huic cor sanguine plane exhaustum, extenuatum & parvum erat: Arteria venosa, quia in monstruosam amplitudinem extensa erat, humore seroso impleta, qui, quia arteria hæc venosa ex simplici constat membrana, eam proculdubio in istam amplitudinem extendebat. *Vide tit. de Respiratione Lesâ.*

SCHOLIA.

Ex simplici constat membrana) Huic & cæteris Pulmonum valis quatuor tunica à se invicem distinctas assignat Oculatissimus Virgilius *Opera postumi selt.* 1. cap. 1. Primum & externam fibris nervis, & ali-

quatenus muscularibus constare ait: Cui secunda & tertia, Vascularia & Glandulosa subternantur: Quartam & ultimam plane muscularem statuit: *Vide locum citatum.*

§. 5. R. P. 10. aut 12. annos pulsationem p.n. in sinistra thoracis parte passus est; post suffocatus obiit. Apparuit membrana interna arteriæ magnæ, prius quidem laxata, postmodum vero disrupsa. *Vide tit. de Suffocatione.*

OBSERVATIO XXVIII.

Palpitatione cordis diu fatigatus cavitatem Pectoris aëre humore refertam exhibuit.

§. 1. **I**N Cæsare nostro, postquam cor supra xx. annos palpitare sensisset, sancte demortuo, supra duas mensuras aquei humoris, in cavitate pectoris relictas, cum quidem natura diu per urinæ meatus plurimum auxilii sibi tulisset, conspeximus: Iste vero naturæ motus ut ad extremum impeditus fuerit, nequeo præ summo dolore cogitare: Est autem usitatum in nostra scientia hanc affectionem, sicut Divinus Hippocrates docuit, Pulmonis Hydropem appellare: In ventrem quoque aqueus humor (id quod ab Hippocr. monemur) jam consuebat, & sæpe monuisse me, si longior morbus fieret Cæsareni hydropicum futurum. *Crato in erat. de obitu Maximiliani ij.*

SCHOLIA.

Aquei humoris in cavitate pectoris) Aliam accessisse causam probabilè est, ut verosimile eundem humorem in pericardio superfluum fuisse; alias familiaris esset palpitatione cordis is qui pectoris hydropem laborant, quod tamen perpetuum non est.

Natura per urinæ meatus) Diuretica palpitationi

cordis obnoxia, ubi ex crasso sanguine cor huiusmodi morbo laborat, prohibet Sepialius, ut & diaretica, quod hæc exhaustant serum sanguinis, huncque crassiorem reddant: In ea vero quæ ab humore aëre & seroso ortum ducit, nihil est quod facilius viæ huius morbi evincere possit.

§. 2. Virgo brevi morbo sublata est, ante vero cor crebro & valido motu, sub noctem recrudescente, tangenti palpitabat, ægra non sentiente. E thorace mortuæ inciso aquæ virosæ copia effluxit: Pulmones syderati inventi: labes vasa omnia & cavitates affecerat: Pericardium erat exsuccum, putrefactum & suo humore privatum. *Vide tit. de Plebisi.*

OBSERVATIO XXIX.

Cordis palpitatione ab aqua in Thorace & Pericardio contenta.

SI Palpitatio fiat ex aqua in pericardio contenta, patientes referunt se sentire cor in aqua quasi natare: Ego vidi Clar. Marcellum, qui cum hydropem thoracis ex congesta ibi & in pericardio aquæ magna copia (id quod sectio ostendit) laboraret, sibi cor quasi in qua natare videri dicebat: accedunt pulsus molliores, spiratio frequens, non sciunt ægri, oculi sunt concavi. *Henc. Saxonia. Pract. part. ij. cap. 1. §. v.*

OBSERVATIO XXX.

Palpitatio cordis ob corpus membranosum cordi superpositum, mole & figura cor referens,

IN cadavere Domini Lud. Saladins, Juriscons. Genev. (qui subitanea morte diem ultimum clauserat) disrupsa vena cava & effuso sanguine in pericardium & cordis dextrum

ventri-

ventriculum, inde plenis manibus in grumos concretus educabatur) aderat corpus carnosum & membranofum, cordi naturali fuperpofitum, mole & figura aliud cor referens, quod venarum varicofarum erat velut tomentum & fulcimenrum, quas undequaque corpus illud circumambiebat, Et quia venæ aderant valde varicofæ, & dilatio arteriarum libera ab illo præternaturali corpore impediabatur, iudicavi nimium fanguinis fluxum caufam fuiſſe dilatationis venarum, & per diapedeſin exſtillantem ab illis fanguinem materiam illi carneæ ſubſtantiæ ſuppeditaſſe, quæ paulatim venis adnaſcens molem illam tandem formavit, quæ tandem contracta putredinis rudimenta, tum venæ cavæ tum ipſi cordis ſubſtantiæ affricuit, ut ideo venam putreſcentem facile diſtrumpi contigerit, ut inde mortis ſubſtantiæ, & languoris functionum animalium & vitalium cauſam arceſſere non fuerit difficile. *De cordis etiam palpitationibus conquerebatur ſæpius D. Puerarium in Obſerv. ſelectis, additis Theſauro medic. Præſt. Thomæ Barnet. lib. 3. p. 345.*

OBSERVATIO XXXI.

Palpitatio ab aneurifmate Lienis.

V Idimus palpitantem affectum ob aneurifma in Liene. Quod ſi in corde ipſo aneurifma ſit, lethalis eſt affectus. *Ballonius lib. 1. conſ. cix.*

S C H O L I A.

Aneurifma in Liene) Ardorem eſt Palpitationem cordis per conſenſum partium inferiorum inductam ab idiopathica diſcernere, ſæpe enim contingit ut quanquam Cor intra ſe cauſam continet, per periodos tamen redeat affectus, ut cum ſerum Pericardio incluſum organiſmo cietur, aut ſtatus accedunt: Notatu dignum quod refert *Ballonius* Epid. lib. 2. de muliere inſigni cordis palpitatione laborante, cuius cauſa Lienis impotabatur, quemquam intra ſupra thoracis concladeretur. Notandum, ait, quod contingit uxori D. Goillon. Illi dolor obortus eſt in mamma ſiniſtra, ab aliqua ſuppreſſione lactis, ut conſpicere aſt, Tumor erat, diſparuit, ſaltem nil foris eminebat. Non deſiſſe dolere illa pars, quamvis nil foris conſpicuum: Macreſcebat in dies, nil proficiebat, languebat, Palpitatio

cordis inſignis, unde ea oriſcitur dolebant: A liene repetebant illam, Accerſus D. Duretus mali originem alius repetit & rimatur, Omnis Palpitationis Cardiacæ cauſam, ſot in oppreſſione, aut in excuſſione ponit: Illa eſt cum malum in corde ipſo eſt, aut circum cor: ut cum uenia aquoſa inter pericardium crevit, aut cordi pericardium adhaereſcit. Hæc, excuſſio, cum aliunda eſt: Aliqua erant argumenta mali non naſcens & oriens à liene. Sequabatur ſigmo ut in thorace & corde cauſa mali foſet. Tandem collectum eſt parte interiore abſceſſum latere, qui niſi aperiretur mortem repentinam eſſet accerſiturus: contra multorum opinionem ea parte ſepicum admoveatur: actis aliqua ex parte caniculis, pus manens molum, miſaculo convaluit.

OBSERVATIO XXXII.

Palpitatio cordis à corruptione omnium viſcerum, ventriculo intus viridis, in quo materia cineritia; Pulmonibus flaccidis exulceratis, Corde livido, in quo cruor niger, &c.

Juvenis ab amico exceptus, domum redux, poſt exacerbatum capitis dolorem, evomuit, palpitationes cordis, convuſiones, &c. ſequuntur; ſequenti die ſubito moritur. Omnia viſcera principaliora corrupta inventa; ventriculus intus coloris viridis, in quo materia quædam cineritia: Inteftina gangrænoſa, flatibus turgida, & vermibus dimidiis cubiti ſcætentia. Pulmones hinc inde ulcerati: Cor lividum, contractum, & cruore quodam nigro repletum, &c. *Vide Tit. de Dol. capiti.*

OBSERVATIO XXXIII.

Palpitatio cordis à vitio Teſticuli ſeminei orta, &c.

Vidua D. N. aſthmate, febre, &c. correpta, die 4. morbi acceſſit magna Palpitatio cordis, & in utroque hypocondrio, quæ fugax fuit ſed in corde permanebat, & inſtar mallei violentè percutiebat. In defuncto Teſticulus ſiniſter exigui ovi magnitudinem æquabat, colore nigricante, cujus ſubſtantiæ erant velut gangræna affecta, &c. *Vide Tit. de Peſſorū dolore.*

OBSERVATIO XXXVII.

Cordis dolor ab ulcere in eo excitatus.

PUella annos XIV. nata non poterat in finistruin latus decumbere quin statim cardialgia & tussi corripeteretur. Dissectio cadavere, Cor albicans visum est, & media fere sui parte, quæ diaphragma respicit, exesum atque exulceratum. *Tit. de Hamaptyh.*

OBSERVATIO XXXVIII.

Cordis compressus dolor ob pericardium pure scatens.

IACOBUS RUANUS, plastris feno onusti ruinam in se passus, de pectoris dolore, nec non de quadam cordis compressione conquestus est. Pericardium scatebat pure sanioso, cui velut immersum eot magna sui parte, ad utramque potissimum auriculam vilesbatur. *Vide Tit. de Pectoris dolore.*

OBSERVATIO XXXIX.

Cordis ardor perpetuus in quodam cui cor pilosum, et truncus aorta descendens circa diaphragma ossus.

NOB. JUVENIS pugnacissimus per plures annos de ardore cordis & dorfi dolore conquirebatur. Huic cor undequaque pilosum, Et truncus aortæ descendens, circa septum transversum, ad minimi digiti longitudinem totus erat ossus. *Vide l. 4. in miscellaneis.*

OBSERVATIO XL.

Cordis Tremor ab osseo corpore in eo contento.

IN quodam diuturno Cordis Tremore à medio sublato, osseum quid vel cartilagineum in corde deprehensum fuisse intellexi. *Platerus de Functionum lesionibus cap. xi.*

S C H O L I A.

TREMOR cordis affectus à Palpitatione ejus distinctus, imo divetus existit: In eo namque ipsius fibræ carnes sive motrices per se allici, nec prout in alio ista parietate, causa motrix in sanguine aut in arteriis cardiacis consistit. Cordis Tremor optime describi potest, quod sit casuum ejus convulsio spasmodica, seu potius trepidatio, qua nempe fibræ motrices celestine, ac tantum semicontractæ systolæ & diastolæ vices occurrunt, verum abruptas & quasi dimidiatas efficiunt, proinde ut sanguis per minutissimas tantum portiones, cum cordis sinibus inferri, tam ex his efficiat possit. Quandoquidem hæc affectio sit musculi cuiusdam, scilicet cordis motus convulsivus, ad pleniorum hujus motuum hæc refecti debentur quæ abbi de motu musculari, itemque de parietarum convulsivis differimus. Ne plura repetendo tædio fuerim, verbo tantum adnotet utrumqueque motum duobus Tendinibus & vitæ carneo consistare: atque contractionem inde peragi quatenus spiritus animales à fibris ditiisque tendinosis in carneas profluunt, quas dum inflant & tumesciunt, propterea decurrant & contractivas reddunt: motu autem finito, spiritus in tendines redeunt & fibræ carnes laxantur. Cùm hinc motiva sit duplex, scilicet *spontanea & motu naturalis*, in priore advertimus spiritus à tendinibus in fibras carneas per appetitus Imperium evocari, atque intra has in additione manere donec illius aura dirimantur, deinde vero in tendines revertere quiescere, donec rursus foras jobentur, hinc ut illorum motus & quietis tempora sint inæqualis, incerta & pro libitu nostro varie determinanda: In functione mere *Naturalis* multo secus habet, quippe spiritus animales à tendinibus in

carnes perpetuavict, sive constanti reciprocatione effervant, & contractione brevi facta, mox ex his illi resiliunt, ac ita vicissim: ad quem modum eot ipsum, arteriæ & respiratorii organa, quoniam ventriculi & intestinorum fibræ carnes, illi propter obiecta sua alias determinentur, per systolas & diastolas perennes agitantur.

Juxta hunc ritum ordinarios, functionis variasque motivæ munia peragunt: quæ tamen juxta quod spiritus animales, motuum illorum executores varie alliciuntur, diversimode perverti aut perturbari solent: Enimvero satis manifesto liquet motus cuiusque contractivi, à quoqueque muculo obandi, instigatum à Cerebello aut cerebello, juxta appetitus jussum, juxta naturæ indigenam per nervos convicti, vid. spiritus animales intra horum ductus laxantes, juxta impressionem à capite radiam exerciti, ac in tota serie commoti, mox alios tendinibus incolas extulcunt, inque, motus analogos eodem pari fere modo ac si quicquam pulveris pyrii scissus per funem ignavium ad ditans agerentur: Quando igitur spiritus isti tum in principio, vid. intra *symplicia*, tum in via, scilicet ductibus nervis, tum in fine, vid. intratendines confusi, recte ac ordinatim habent, motus cuiusque ab Anima aut Natura requisit instigatum illi formant, illi convehant, atque tandem exequantur: Sin vero spiritus ad functionem motivam destinati, intra quantum distanciam paratenaturaliter affecti, in *motum* redigantur, propterea statim in membris, aut musculis respectivis motus convulsivi excitantur. Quo riu ob causam morbosam, juxta originem nervosam in capite; quo item propter eam abbi intra ductus nervos confusum, membrorum,

membrorum, aut viscerum, aut præcordiorum affectiones spasmodicæ exoriri solent alibi satis fuit declaravimus; vid. in quantum spiritus intra nervos scutentes, à causâ quadam p. n. & vehementi excitati, ac velut cæstro quodam perciti, dum in has aut illas partes irruunt, motum ciendotum signis injuncta & falsa deferunt, necesse erit in his vel illis muscularis aut membranis, contractions aut distensionis violentis ac convulsivas accieri: Varias hujusmodi affectionum species & rationes formales Jo Spalmologia clare designavimus. At vero quod illic prætermisimus, atque ad rem propositam spectat, nunc insuper adverterimus dari alia Spasmodicorum genera, quæ sine presenti, aut magno vi humida aut nervorum vitio, ob spiritus animales ipsorum tendinum incolæ potissimum, ac fere tantum in culpa existentes, oriuntur.

Affectionis hujusmodi singularis & velut privatæ, duæ species observandæ occurrunt: una satis vulgo nota est, in qua spiritus injuncti sæpe è tendinibus perfiliunt, atque fibras carnes valde ac moleste intantes non solum ut facile recedunt. Altera, licet minus notabilis, tamen frequenter occurrit, in qua scilicet spiritus musculares, neque intra tendines, neque intra carnes diu permansere possunt, verum summe irrequieti, ex his in illos de vice versa, appetitu vel morâ inviti, excursus recurrentque suos valde crebros, sed debiles utque & inordinatos faciunt. Sæpe his affectionibus spasmodicis (quoniam à Medicis plerisque fere ingrati manent) eorumque notitia ad cardiacæ passionis naturam & causas rite explicandas plurimum facit) operæ pretium hic duco, quamvis extra rem propositam, & quasi in diverticulo pauca subjungere.

Prior iste affectus (qui proprie *viæ* atque Idiomaticæ tum nostro tum Gallico la *Crampa* appellari solet) plerumque exoritur in quantum spiritus animales injuncti, è tendinibus, scilicet aut uno, aut simul utroque, in musculi ventrem sponte perfiliunt, unde pro more solito mox regredi possunt. Verum diutius intra carnes manentes eas valde intant & summe contractivas reddunt, dein siquidem alii musculi hisce neque cedunt, neque in contractione conspiciant, pars rigida & cum summo dolore incensa evadit. Hujus causâ est marces quædam heterogenea & corruptiva, quæ per ductus nervos uno cum succo eorum in musculos descendens, & spiritibus coherens eisdem elasticis simulque obtinatos reddit, proinde ut intra fibras tendineas contineri nequeant, sed spatia ampliora desiderantes, in carnes excursant, ibidemque, donec de feribit eorum tumor, permoneant.

Ad posteriorem istam motus consilivi speciem proprie spectat *Pulsio* live *Tremor Cordis*: Porro ad hunc centum referri debet Affectus satis vulgo notus & plerisque familiaris; Nempe ut ignotam musculi cujusdam privati, puta in Labro, Genu, Labris aliique membris, subsultum live Trepidationem valde crebras & æquales patiuntur, quæ forsâ postquam per duo aut tria minuta pertransierint, sponte cessant. Non ita pridem per literas, è Gallia huc missa, consulebat pro Viro quodam illustri, cujus musculi omnes in toto corpore ejusmodi subsultus seu veluti trepidationes fere perpetim exercebant, adeo

ut carnes exteriores ubique cæssantes spiritus cordis vibrationes live pulsus ad amussim amolantentur.

Hujusmodi Affectum, uti & Tremoris Cordis, ratio formalis in eo consistere videtur, quod spiritus animales ad musculos quosdam pertinentes, interquiescit, ac velut cæstro perciti, è tendinibus continue in carnes profiliunt reditque, adeoque perpetim vice excursus suos recurrentque litem à interea cum exigua tantum copia effluant, ut fibras carnes hanc plene inflent, in illoque minimo tantum spatio morentur, minus moventur, creberrimos licet, tamen nonnisi debiles & valde minutos edunt; in tantum scilicet ut membra & artus à musculis ita perpetuo agitati, hanc loco moveantur, & cor, dædane tremore ejus, utat celestiter concussum, tametsi vis de ne via sanguinem circumspellere queat, uti plane constat ex pulsu parvo ac veluti tremulo, atque vitium omnium facillentia.

Quod spectat ad pathemaram istorum causas, vid. conjunctam & procatarticam, à quibus tempe spiritus musculares ita insalubres sunt, five vim istam defuboriam acquirunt, videtur quod materies quædam heterogenea & elastica, cerebrum & ductus nervos transgressa, demum in musculos eorumque fines tendinosos defertur, ubi spiritibus subinde accrescens, eos irritat valde ac velut cæstro quodam afficit, proinde ut nullibi consistant, verum huc illic continue discurrent, atque in eam partem dubia aut omittant aut non strenue præstant.

Tremoris cardiaci causa communiter in Lienem rejicitur, Etenim vulgo supponitur: ab hoc viscere obstructo, aut alias perperam habente, vapores reptos ad cor elevati, qui ipsam ferientes, adeo concuti & trepidare cogunt, imo veluti quodam rigore afficiunt. Opinioni huic fides, aut saltem probabilitas inde additur, quod hypochondriaci hanc passionem cardiacæ obnoxii reperiuntur: Quâvis & quanta Lienis in præcordia fit influentia olim declaravimus. Ex dictis satis liquet sententiam istam, receptissimam licet, de corde à vaporibus affecto erroneam esse. Quod autem pro Lienosis, etiam hystericiæ vulgo haberi, Tremore cordis si passim insistantur, in causâ est magna ista alius, ac intima communicatio quam nervi splachnici cum cardiacis habent, adeo ut non solum partis onus affectio alteram facile in consensum trahat, verum quando materies spasmodica nervorum ramos ad lienum aut viscera imi ventris pertinentes incedit, raro abest quin eadem patitur nervos ad præcordia spectantes occupare.

Quod spectat ad Therapias rationem, quandoquidem hæc affectio sit mere spasmodica, idcirco remedia non cardiacæ, quin potius cephalicæ aut *sedativa* indicantur: ut rem paucis comprehendam, in morbo illo tria remedia sunt genera maxime proficua esse solem testacea, chalybeata & sale volatili prædita, &c. *Wid. Pharm. Ration. p. 170. ad 275.*

Ex prædicta doctrina constat, quæ hic vocat: *Clas. Placitus Tremorem cordis*, Palpitationem fuisse, quandoquidem Cor proprio affectu laboravit, ob presentiam scilicet alteri cujusdam aut casualis corporis in ejus substantia. Atque hanc palpitationis speciem pertinere ad vasorum cordis appensorum vitium: Vide Scholia supra ex eodem *Wid. ibid.*

OBSERVATIO XLI.

Cordis tremor à Pericardii inflammatione.

Quidam acuta febre prehensus est cum thoracis incendio, Syncope, cordis Tremore; &c. Sectio palam fecit adfuisse Pericardii inflammationem: *Vide tit. de Pectoris dolore.*

S C H O L I A.

Si timor aut abscessus cor aut pericardium occupat, semper inaequalem & inordinatam deprehenderis pulsationem, cum respiratione difficili: Si calidus timor fuerit, necessarius febris adest lethalissima, quia experientia didici cum inflammatio totum invadat Cor, non poterit transire naturalem diem, Lictor febre acuta prehensus intra 12. horas exspiravit: Cor illius erat duplo majus quam in sanis, cum venis tumens & inflatis ad digitum crassilem. Potest fieri ut circa mortis discrimen, aliquando infestetur cor inflammatione pericardii & exigua; id quod ulcera &

abscessus manifestum faciunt, Totum autem cor sustinere inflammationem diutius nulla ratione potest. *Saxonia.* Inflammationem autem sequitur purulenta materiei collectio, Hujus in pericardio existens signa sunt febris acuta, cum dolore circa partes thoracis: hac enim cessante; si subsequatur palpitationis, longoque perduret tempore, si pariens coartabatur sine manifesta causa, suspicandum ad supurationem pervenisse inflammationem, abscessum discipum, purisque ibi factam collectionem. *idem.*

OBSERVATIO XLII.

Cordis tremor à feri è capite illapsu in nervum Cordis.

Adolefcens non potuit in lecto decumbere supinus, nec caput vel minimum inclinare, quin illico cordis Tremor sequeretur. Cranio aperto, feri copia intra omnes ventriculos fluitabar, qui dum capite reclinato in quartum ventriculum, supra medullas oblongatas caudicem prolaberetur, in nervos sexti paris Irruens, dictum Tremorem faciebat, &c. *Vide Tit. de Syncope.*

S C H O L I A.

Si ex cerebro ortum ducat Palpitatio cordis, ait *Saxonia Praef. Pract. pati. 2. cap. 2. §. 6.* indicia non decernunt laborantis cerebri, melancholia, vel epilepsiae: Notandum duntaxat monet Palpitatioem aliquando

fieri ex solo oervorum vitio, nulla apparette laesione in cerebro, thorace, musculis. Quod observavit in Fratre, quem solo theriacae usui, principio spinulis medullae adhibuit, in integrum restituit.

OBSERVATIO XLIII.

Cor in dextro latere pulsans, eo depulsum ab abscessu in sinistro thorace contento.

§. 1. **P**uellus x. mensium rabidus obit: ante obitum cor in dextro latere pulsans manifeste percipiebatur. In summa thoracis sinistri parte deprehensus abscessus densissima tunica donatus qui magnitudine sua mediae altum, pericardium & cor in adversam partem depulerat. *Vide Tit. de Phthisi.*

§. 2. Nobilis melancholia affectus proprio se confodit Gladio: Vulnus sanatum, &c. Vulnus per pulmones & diaphragma penetraverat, ventriculus totus ascenderat in sinistram thoracis latus, & cor cum capsula de sede sua depuleta in dextrum latus, ubi vivus observari cordis pulsationem jubebat. *Vide l. 3. Tit. de vomitu.*

tior soli fere cordi, quatenus muscularis est, totus circumfusus sanguinei negotium attribuentes, circa auctoris parum solliciti fuisse. *Quæ* 7. admin. anat. c. j. dicit quod unaquaque Arteria coultur duplici tunica, quibus possunt addi tertia & quarta. Et 3. de fac. nat. c. 11. dicit, Quod arteria habet tunicas hæc ventriculus, & quod interior tunica habet fibras longas & obliquas, exterior transversales: Quam congruenter ad hæc observationi nati Anatomice res colligit, paucis exponam:

Pro *exemplis* hæc rite instituenda, sumatur Arteria magna homini aut bovi eampræ potius, quæ bacillum (quæ eadem ferebatur) superinducta, aquæ ferventi aliquoties immergatur, ut tunicae & fibræ nonnihil contrahantur & tamen diutius fatis melius dignosci & ab invicem divelli possint: Tum separatione per cubile ham facta tunica quatuor distincte apparebit: Nam autem eadem tenues & nervæ, pro totius vasis integritate interveniunt, exterior multas propagines nervæ, hæc illæ varicæ per septas habet: In superficie vero interiore, vasorum omnis generis, ac præcipue sanguineorum, textura quasi retiformi & densissima per totum obducitur: Arteriae primo à vasis coronariis, & deinceps ex Aorta manco, ejusque ramis ubique ascendentes, in hæc tunica, cum vena cava ejusque ramis pariter emissis, ianctantur: Porro propagines nervæ occurrentes varicæ complicantur, adeoque ea omnibus intertextis quoddam quali reticulum, obique tubum arteriosum obducens, constituitur: è quo fusculi pericæ vasorum cojugis generis in reliquis arteriis magne tunicae substratae porriguntur: 1. Tunicae huiusmodi, altera glandulosa succedat, seu potius hæc superposita illi intime cohaeret: Membra hæc glandulis pericæ & albicanibus per totum confusa, pari modo habet ac ventriculi ac intestinum tunica interior glandulosa, cutis villosa substriata: à cujus inter seigo plexus vasorum retiformis ubique disponitur:

3. Tercio in loco habetur tunica Muscularis, sive Fibrosa, vid. à fibræ transversæ sive annularibus densissima accumulata contexta: Hæc fibræ carneæ & mortice, tubum arteriosum cingentes, haud scilicet tenuis & singulari, prout in tunica venosa struitur, venam aggerit quidam, alia super aliis strata, pellem valde ciliatam constituunt: Earum strata, sive ordines, in Arteria temicodæ facillime separari & ab invicem divelli possunt, quæ pariter omnino (ac tam istæ ventriculi & intestinum à nobis distinctæ) carneæ ac mortice videntur. 4. Arteriae tunica quarta ac interior, cavitatem ejus involvens & tunica substriatam obducens, tenuis & fere tantum membranacea est: Fibillæ ejus nervæ in longam processum, fibras annulares ad rectos angulos secant, & videtur quod hæc sunt fibræ istæ rectæ quarum memio à Galeno & aliis facta est: Quas autem prædicant obliquas, ramos imaginarias fuisse reor, quoniam eas nullibi in hoc videri potest: Contra vero errorem istum Medicis quibusdam familiare fuisse, nempe ut vasa vasa plerumque & paribus membranis alligarentur fibræ rectas, transversas & obliquas, ex hiso supposito quod unicuique istorum fasciæ attractrix, retentiæ & expulsiæ inflex, quodque tria hæc munia fibræ triduum istorum ordinum distinctim obiciat: Quæ quidem omnia gratis & perpetui alium, culpam penitus inquirenti facile liquebit: Interim Galenus ærenus assensio, ut arteriæ quatuor distinctas tunicas agnoscat, quinimo eas in hoc vase, quemadmodum in ventriculo habere: Excepto tamen quod in vascibus, vasorum plexus retiformis, una cum tunica glandulosa, subest tunica fibrosa sive musculari, in arteriis vero super eam collocatur.

in arteriis vero super eam collocatur.

Hæc de arteriæ conformatione in genere, ejusque partibus constitutivis, quod spectat ad eam munia & rationes, videntur quod Tunica muscularis, fibræ carneæ orbicularibus paritatem, primarij sit usus & operationis: hæc nempe cordis motui obsequens, in sanguine circumspellendo perpetuas systoles & diastoles vices obit; quippe dum hujus fibræ carneæ succellive, & mira celeritate, sanguinis posse vim itingentem, necesse erit cursum ejus à corde usque ad arteriarum extremitates rapidissime peragi, Quod Tunica relaxans, & vasa per eas distensa, videntur omnino anios iunctæ musculari commoditatem & usum institui: namque imprimis nervi eorumque propagines, super aorta truncum, ejusque ramos majores ubique distennant, & exterius appaentes, fibræ carneæ & morticebus substriatæ, more suo cum ipsarum copias, propter continuas systoles penia obeunda imponantur, tum in super contractionem lymphaticarum indolentia deficiunt: Deinde arteriæ minores, tunicae exteriori superficiem interio rem densissime obducens, & erga tunica musculari substriatam, sicut arteriæ aliæ erga musculi alios & partes solidas, duplici munere funguntur, nempe ut focum albidum, quo nutriantur & accretas illar, & partem elasticas spiritibus jugiter instaurantis, convellant & apponant: dein venæ arteriarum conjugas, quæ cum sanguinis non alio impenduntur, redactant: Quod æger hæc vasa sanguifera, ex ita tunica musculari cum confusa, & inter se complicata, plexum quasi retiformem constitunt, è quo propagines tantum minimis & pericæ distinnuntur, cum in musculari plerique alia, vasa istha cum fibræ carneæ intertextis, ea quæ proinde rubet factum, differtim hujus ratio videtur esse, nempe quod opus sit vasa sanguifera à fibræ Aorta, & vicerum morticebus aliquantulum seposita, ac ad distant quoddam locum, ne fortiter etiam has uberius alluent, in eisdem obstruant, adeoque phlegmoneum aut abscessum cito lethaliter pariat: quare in majorem cautellam, vasorum istorum plerumque retiformi tunica glandulosa temper cohaeret, cum nempe ob finem ut icolentis tum à nervis, tum ab arteriis superellus, & non per venas stram redactæ, glandulis istis numerosissimis stram excipiat, & donec sanguinis remandatus (ne in fibræ mortice trahant easque spasmodice afficiant) contineri possint: Quod autem plexus vasorum retiformis, rique tunica glandulosa cohaerens, in aorta supra tunica musculari, ac in vascibus subest eam, disponitur, ratio est ut vasa hæc minuta, quæ locos lenit & dispensat debent, à torrentis sanguinis in aortam effusione, quantum fieri potest, amoveantur: ut in ventriculo ac intestinis ob coctum munia rite obeunda sanguinis foco prioris opus est: Tunica Aorta interna, cavitatem ejus involvens, præterit in hos usus confitit videtur ut sanguinem canalem inter obducit, & reliquis hujus vasis partes terminet: verum inuipet hæc tenuis aliquid, forte & motus concedere oportebit: nam hæc fibræ nervæ prædictæ, non secus ac cordis sinus, à sanguine pertransiente afficiunt: proinde iuxta hujus sententiam, tunica muscularis in systole & diastole motus crebrioris aut tardioris, æquales aut inæquales urgeat: Porro hæc tunica prope cor spatio durum circiter unctum, & fibræ rectas sive longitudinales, majores & quasi carneas habet in tantum, ut suspicor hic loci, ob majorem sanguinis impellum, Arteriam pone sanguinis rivum, haud tantum quod amplexum istius & coarctari, sed pariter ac in corde, eaque quæque systole etiam quod longitudinem nonnihil contrahi & decurtari. *Id. Ibid. Pharm. Rat. p. m. 280.*

OBSERVATIO II.

Pulsus inequalitas ob Cordis sinistram ventriculum subnigricante carne infarctum.

Non vulgariter nos mirari coëgit Nob. viti Cor, in cuius sinistro ventriculo glandulose, sed nigricantis interim carnis libras duas reperimus, corde instar uteri ad ejus carnis molem extenso, & homine ante mortem *habitu utrunque Melancholico*, & ad morbum vigili, & Pulsu prædito miris sane modis inæquali & vario, quique arteriæ contractionem manifeste ostendebat: Ita enim multis mensibus ante mortem (cum tamen ante mortem veluti sanus obambulet) pulsus aut arteria potius contrahi visa fuit, ut trium aut quatuor pulsationum ictuumque intervallo contracta maneret, velutque expulsionem moliretur: Imo *postremis vix septimanis*, ex novem ictuum intervallo, rtes tantum aut quod dilatationes arteriæ, tactui subinde occurrerunt: Deinde animalis facultas, cum principis animæ functionibus, ad mortem usque satis constabat; quæ non tam ex cordis vicio proxime obvenit, atque ex sinistro crutis gangræna, quæ ab impedito arteriæ pulsu occasionem perinde duxit, ac si intermissi illi ex cordis vicio pulsus illius nativum calorem apte eventilassent: Potissimum cum ex sclopeti ictu, ante aliquot annos, ipsi viciata esset arteria quæ fibulam petit. *Vesalius lib. 1. cap. 5. de hum. corp. fabrica.*

S C H O L I A.

Habitu utrunque melancholicus] Melancholicorum pulsus ut plurimum parvissimus est, tenuissimus, rariissimusque sine ulla vix periculo ait *Saxonia lib. 3. de Puls. cap. 100.* Habeo, aut, patientem melancholia laborantem, cui adeo pulsus est languidus, parvus, rarus & tardus, ut inter unam & aliam distensionem, sex ad minus alie distensiones in quocunque pulsu, moderatæ etiam raritatis, cadere possint: Ex quo certo mihi persuasum illum tandem inæge motum amissurum, Et eo possimum quod illud idem alias commigisse sibi patiens referebat: nunc satis bona fuit valitudine, Non ergo similis pulsus semper est letalis.

Postremis vix septimanis &c.] Pulsuum tres differtentias, magni momenti, rariores & periculosas annotavit *Rumlerus* obviare. 46. Primam in juvene, qui quod in carcere dia detinebatur, in febrem incidit lentam, hæcicæ similem, in quam tandem etiam desinebat: huic pulsus tam levis erat, ut nonnulli lon-

gissimo temporis spatio interposito digitum feriret, facile enim interea duodecim numerari potuisset, quod signum summe imbecillitatis visum: In alio magis periculante, pulsus omnino nullum perceptum fuisse: In tertio ardente febre correpto, pulsus omnibus dimensionibus excedentem fuisse, quod cor omni conatu natæ imbecillitati succurrere frustra adlaboraret.

Deinde animalis sanctus] Validi sive Debiles Pulsus causas à spiritibus Animalibus deducit *Prax. Sylvius* Prax. lib. 1. cap. 36. qui si copiose ad musculorum cordis parenchyma deficiant, & ipsum valde contrahant, Pulsus robustus & potens evadat: Debiles contra sequi vult sæpius eorundem defectum universalem in toto corpore, aut partialem (sætem in corde: Universalis, ob sanguinis defectum, ab hæmorrhagia immodica, incidia &c. Partialis, si nervi ad cor tendentes fuerint vulnerati.

OBSERVATIO III.

Pulsus inequalitas à pituitosa concretionem in corde.

Memini intra paucos annos aperta fuisse cadavera duo, alterum Comitum; alterum Principis: In quorum cordibus reperta est concretio quædam humoris pituitosi, flavescens, instar medullæ, quæ in ossibus boum coctis invenitur: Erat hujus longitudo duorum digitorum transversorum, crassitudo minor minimo meo digito: In utroque, (illo quidem cum febre & Pleuritide, in hoc absque febre) apparuit Pulsus inæqualitatis genere maxime inæqualis. *Erasius parte 5. differt. de febre putrida.*

OBSERVATIO IV.

Asphyxia ab utroque cordis ventriculo corporibus adiposis obstructa.

Quidam ætatis anno 30. circiter ex renum ulcere laborans, integro die ante obitum sine pulsu jacebat: Dissecto cadavere, uterque cordis ventriculus duabus quasi turundis oblongis, adipis concreti obstructus est reperiens. *Pelichius Epistagmas. observ. 34.*

OBSERVATIO V.

Pulsus Inæqualis & similis Palpitanti, à sanguine in corde & toto retorto.

Mulleri hypochondriacæ pulsus erat inæqualis & palpitanti similis. In ipso corde jam speciem aneurismatis subesse autumabamus, spiritu & sanguine mirum in modum arterias distendente & dilatante.

In ea, ut in cadavere observatum, sanguis nigruerat, corque vix refrigerium accipiebat. *Gallenus consilio 78. lib. 3. Annot. 2.*

S C H O L I A.

Pulsus inæqualis & palpitans simul] Palpitans pulsus in ex palpitante vel cordis & arteriarum, vel bami tantum; idque dupliciter, vel ex fluxu sue vaporum patem elevari ac deprimi; aut ex causa capulicem irritare: Si fiat priore modo, aut fluxus elevat membranam pericardii vel cordis, sicque arteriarum pulsus nihil à naturali statu mutatur: aut elevat cordis ventriculos, arteriarumve tunicas, & hoc major, celerior atque inæqualis evadit, Major, quia fluxus ille, aut vapor, plus distendit cor ac typicam quam expediat: Celerior enim, quia facultati naturaliter distendenti accedit quoque fluxus impellens: Inæqualis denique, quia fluxus ille nature legem non servat, nec tunc tantum elevatioem facit cum facultas distendi, aut depressionem cum contrahit. Sed potius est contra vice plerumque elevat cum sit contrahit: aut deprimi, cum sit distendi; hinc maxima sequitur in pulsibus inæqualibus crebrius, intermissionis, interrupcionis aliæque consilium: Porro hæc omnia, & longe majus est huius ex facultatis irritamento, ob quod ut plurimum linat doctori & interrupti, & quandoque cordis motus ad o. v. h. mens rediit, ut etiam costas loco movile ac cunctis egisse tradit Ferri.

Saxonia l. 3. c. 89.

In ex sanguine aggravat &c.] Huc pertinet quod de palpitacione cordis habet *Fernandus* de part. morb. & lymph. cap. 12. Hæc causam, aut, omnem venies vel in sanguinis exuperantiam veniunt, vel in humorem copiosorem pericardio infusum; Ceterum in his, quos exempli gratia recentius palpitacionem peperit ætorrida bilis, quæ alias sponte vacuari consueverat, in arteriis effusa &c. In cæteris clausam animadvertimus bilem esse perassam, interdum in paricordis, sæpius in liene congestam: quomobrem in hoc symptoma plurimum propensum sunt qui hypochondriaca melancholia laborant, & quibus lien bilis atæ copia ingreditur &c. Fit autem pulsus palpitans, & in febribus communis phlegmaticis, cum venæ & arteriæ crudæ & frigida sanguine humoribus: observatur quoque aliquando in senibus, sed minori periculo.

In ipso corde spiritum amonitum] Notat Marchetti observat. 48. quodam 10. aut 11. annos palpitacionem p. n. in similitudo in hocce pulsus esse, quæ pro palpitacione habebatur, Ipse vero conjicit esse Anæsthesiam, vide *Hyllium* ut de palpitacione cordis.

OBSERVATIO VI.

Pulsus inæqualis excitata ab abscessu in vena arteriosa.

Observavi idem cuidam accidisse quod Antipatro Medico (vide historiam apud Galenum lib. 4. cap. 9. de Locis affectis, Et comment. Ioh. Bapt. Silvatici histor. 30. Zacutus, Princ. med. hist. lib. 2. histor. 12.) Huius enim mortuo inventus Abscessus in vena arteriosa. Schellægraphus Hallerus ad cap. 30. lib. 1. de morbis int.

S C H O L I A.

A'sfessio in vena arteriosa] Ut magis arteriæ calidi, ut notat insignis, obstructione interruptus inæqualitate omni generis pulsus proficiunt, cum ex his palpitacione, huiusmodi affectus in vena arteriosa item efficiunt, excepta palpitacione, notante Saxonia l. 3. de Pulsibus c. 14. quod probat exemplo caput d. calculeas septuagenarii qui per plures annos pulsus habuit inæqualis, illis omnino similes quos refert Galenus Antipatrum habuisse, absque palpitacione tamen, in ægra tam in finem valitudine, ut manus omnia obiret: Hæc vero admiracione dignum in illo non a inæqualitatem illam desine si febres prehendens, quæ recedente, illam statim recuperet: Causam vero non adducit, quam ex Clavio, *Præf. lib. de Feb. lib. mutari licet*, qui in pluribus inæqualis & intermissionem pulsus deprehendisse a. m. si subita animi passionem aut corporis agitationem n. m. subito interitus incalcescent, ita ut illi pulsus inæqualis, & intra vibratores fortan. 4. 7. 10. aut 20. intermissione afflicti hantur, & quævisque

febricitarent, pulsus irregulari modo in se haberet. Quamvis autem idem ab intermissione fieret immunes, pulsus erat omnino æqualis & ordinatus: Causam adhibet idio crasie eisdem cordis, quia nimium fermento est non bene constituto, sanguis effervescent non statim æquabiliter accendatur & totus exillat, sed pars quædam inflans primo exigit, dein maior, & post aliquot vices maxima in sinibus cordis pro momento temporis cellitans, ejusmodi pulsus producat. Inde inferit talem circa pulsus anomalliam, malignitatis non semper esse progremum nec semper eventum funestum licet augurari. Quamquam vero dilpar videtur Calculi in exemplum, calidæ affectu æquabiliter evadere pulsus, ad distantem tamen sanguinis in corde effervescentiam & constitutionem, cujus partes alie alia tenetore essent, ideoque inæqualiter in corde effervere, ac per arterias deferrentur, recurrendum, quæ per febrem ætalem ad æqualitatem deductæ, æquabilem pulsus tenorem producent.

OBSERVATIO VII.

Asphyxia quadrimestris à grumosis sanguinis in Aorta prope cor.

Thomas Cartier, temperamento sanguineo bilioso vergente ad atrabiliarium, laborabat tussicula & febricula, eum divi p. n. pene suffocante &c. Tandem febris facta contin. q. hominem ante 7. è vivo suffulit: Quatuor ante mortem mensibus erat plane asphyxia &c. Nulla alia deprehensa fuit causa præter 10. aut 12. grumos sanguinis crassos, nigros, & nereti, collecti & stabulantis in ipso ductu aortæ prope cor. Vide l. 4. tit. de Febris.

S C H O L I A.

Temperamentum sanguinis bilioso &c.] Venarum & arteriarum inceptio sæpe accit in ple. huius

cia corporibus, ita ut in omnibus locis quibus deprehendi solet pulsus, periret motus arteriarum: in

Kkk s quo

quo affectu commendat Hippocr. venæ sectionem ad curandam *Phlebotomia* venarum. *Euclides Bucher. Anat. l. 5. cap. ult.*

A. 179. 180. Quærit potest, Si cor rite salus, quamvis lento gradu, deficiente aut abolito motu arteriarum, necesse est obstructam esse aortam juxta cor, & interceptam esse irradiationem & influxum sanguinis arteriosi: Tumque sanguis venosus appellat ad cor, attractus in diastole et sigillum vitalitatis in dextram sinu accipiat, moxque repulsi in systole cavam ad venam ipsam vitales in ejus canalem longitudinalem impetuosè feruntur, atque per motus anastomoses venarum & arteriarum ipsa arteria communicant cum sanguine. Vidi in quibusdam sequentes motum arteriarum intercepti, vel lumene inæqualem

fieri per aliquot dies, postea subito impedimentum, quod erat juxta cor, eandem inæqualitatem deprehendi in costica arteria, vehementer admodum palpitate, quamvis æqualis & bene ordinatus appareret in reliquo corpore pulsi: Id, ut credo, emanabit à frustulo aliquo carneo vel adiposo, quod siccitatis ad portas cordis, ralem pulsum inordinatum procrebuit: repulsi ad costicam, quæ propagatio est aortæ, ralem irregularitatem producebat. *Idem ibidem.*

Gravitas sanguinis crassi Sanguinem in venis coalescere multis tradunt; imò *Placens* corallum alioquin rubellum coarctum instat, se aliquando è venis extraxisse testatur. Sed eo in casu syncopas potius parit, ob causam vehementiam: Quomodo autem si quis in venis concretas, vide apud *Salvum* de affect. particular. c. 4.

OBSERVATIO VIII.

Pulsus inæqualitas & parvitas ob hydropem thoracis; dextram pulmonis partem flaccidam, sinistram in saniem resolutam &c.

Serenis. Venetorum Dux N. post varios & obscuros affectus, dyspnœa affectus fuit, cum Pulsuum mira inæqualitate & parvitate &c. Cavitas pectoris h. v. circiter continebat aquosæ materię: Dextra pulmonis pars flaccida videbatur, crasso & mucoso humore oppleta, sinistra protius resoluta erat in saniem albicantem &c. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

S C H O L I A.

A Pod *Ballonium* Conf. 70. lib. 1. castor historis hanc propemodum similis quæ commentari videtur tenet, Petrus *Gurardus*, inquit, quoties in morbos incidit à Medicis pro desperato sepe relinquitur, adeo magnis, obiculis incognitisque morbis impetitur. Nam hinc vires elanguent, & cum virium infirmitate magna est cacochymia, ut quod affectibus remedium est cum virium pugnet custodia &c. Inappetens ciborum erat, nulla aut exigua febris, spura pestilens, paulo post in metaphœno tumores & in ribitis, scela tumens, Pulsus languidus, parvus, sæpe inæqualis, frequenter deficitio, paulo post convulsiones totius &c. De mutatione crebra Pulsi ita philosophabamur, Hoc contingi vel affectione propria cordis, Vel tisione ventriculi opprelli, Vel consummatione in prima venis oblietationis, quæ liberum spiritibus ingressum & egressum impedit: Vel Pulmonum inflammationem, vel quæ legitimam non suppetit alimentum cordi, potè elatis aut paucis aut

pravis spiritibus à materia solida contenta in ventre: Nam cum à vena arteriosa suppeditatur alimentum corruptum levisissimum, aut quis per arteriam venosam impediri non libere statuitur, nec mirum est si magna mutatio in Pulsu contingat: At major horum pars concurrere videtur: Quod autem inæqualitas periculis sit in multis polibus, & nonnumquam in et ceteris inextimabili, id eo modo contingere videtur quæ & in Anipatio, ob oblietationem levium arteriarum: Porci & propterea Pulmonum ipsorum inflatum provenire, aut mollietudinem & laxitatem eorundem, utpote qui in collam incumbunt, quod annotavit Hippocr. l. de loc. in Hom. Maxime vero videtur fieri ex præviæ anachymias, declaravit indicavit curatio, pro gradibus purgationis Pulsus restitueretur, Et Hipp. in lib. de morbis, observat in affectibus Pulmonum, præsertim si inflammation sit, insignem mutationem Pulsi & animi deflectionem &c.

OBSERVATIO IX.

Arteriarum omnium insignis Pulsatio, cum est totius corporis, ab aneurysmate arterie venosæ.

QUæ in partibus internis contingunt Aneurysmata, sunt incurabilia, qualia frequenter accidunt his qui litus & sudores ad curationem huius veneret multoties petulere, quod sanguis attenuatus & nimium inde incallescens, adeoque incandescens, nec jam arterie conceptaculis contineri potis, ipsam in eam distendat amplitudinem, ut manum in pugnum complicatam capere possit: Quod ego animadverti in cadavere veltiarii cuiusdam, qui ex Aneurysmate Arterię venosæ repente, dum pila palmaria luderet, rupto vase, corruit: Ille dum viveret micantium impetu arteriarum omnium Pulsum, ingentemque toto corpore calorem se percipere dicebat, cuius rei occasione sæpe animo linguebatur: Dom. *Sylvius* Interdixit illi vino, aquam coctam pro potu, & pro cibo lac pressum, caseosque recentes esse, atque cataplasmatibus formam imponi dolenti & tumentis loco voluit: Vespere præparata ex farina hordei & semine papav. utebatur, clystere vero ex refrigerantibus & emollientibus, aut castia sola per intervalla utebatur, quibus remediis multo melius sibi esse dicebat:

Dissecto cadavere magnam sanguinis copiam in thoracis capacitatem effusam inventi, arterie vero corpus in eam quam dixi amplitudinem dilatatum, inextimabilem ipsius tunicam ossicam

offeam: quo ego nomine ejus paulo post, cum magna admiratione, copiam in scholis Medico-
dicorum feci, dum cadaver publice diffecarem. *Paremi lib. 6. cap. 28.*

S C H O L I A.

[Nomen ipsum tumorem offam] Causa offæ ejusmodi arteriarum per aneurysmata constitutionis, est quod sanguis calidus & fervens primo tunicae arteriae facit dilatationem, inde supponem: Quod cum coarctaverit, mutatur cum ea corporibus vicinis materiam idoneam, qua solvam sui unitatem restitueret: hæc materia dum senim resiccat & induratur, in cartilagineam, vel etiam officam substantiam degenerat, eandem plane casuum materiam & efficiendum vi, qua in renibus & vesica calculi generantur: Sanguinis enim portio magis terribilis deccatur & densatur vi caloris contra naturam, in parte aneurysmate obiecta existentis, quo fit ut ad arteriam dilatata & rupta substantiam addita, in offam constitutionis corpus abeat: In quo Naturæ, Dei minister, elucet singularis providentia, ut quæ novo velut agere comparatio & opposito, futeoris tan-

guinis, spirituum vitalium copia turgentis, imperiū recidare velit. Nisi quis male ejus ducticuli causam referat ad conclusionem medicamentorum refrigerantium & adstringentium, quibus densandi & indurandi vis inest, appositionem, ut non omnino obicere licet colligere ex Galeni scriptis. *Idem ibidem.*

[Arteriarum tumorem pulsus] Cæterum de fistulis sigis supra commemoratis, eam nonnuquam in ingulis Aneurysmatibus nec pulsus ullum percipere licet, nec digitorum appellatione sanguinem in arteriam compellere: Vel quia sanguinis ejusmodi effusio major subest copia quam ut pristinae arterie conceptaculis coërceri possit: Vel quia in thrombos coit & concrevit, ex quo mox putrefacta, ventilationis à corde benedictio destituta; Vnde dolor ingens gangrena, & partis necrosis, animantis denique ipsius interitus. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO X.

Pulsus intercepto à duobus Polypis in corde.

Illuſtr. Colonellus (*de quo lib. 3. tit. de ventriculi dolore*) in sinistro cordis ventriculo duos habuit polypos, duos, carnosos & latos, ad quorum motum versus arteriam magnam sequebatur Pulsus interceptio.

S C H O L I A.

[Pulsus interruptio] Cum nulla arteriarum pulsatio in brachio deprehenditur, habet *Rulani* (angi cruralem arteriam in inguine, cum sit evidens, (etiam in mulieribus, modo honeste id fiat,)) & tactu manifesta, vehementer propter arterie magnitudinem, cujus pulsus facile deprehenditur ac remanet extremus, extincto in aliis partibus externis ubi arterie micare solent & explorantur: Sed si honestati consulendum, si vis ut explorari eandem alterutram in collo, cujus non minor evidentiæ & magnitudo, quæque oculis, præ turgenti in quibusdam se offert,

Coningit & ut depreſſiones arterie, ut virium aliud, tangenti manus decipiant, tumque vel altera manus percutienda, vel alia partes consulenda, ut signis aliis inter se comparatis certius fiat ut judicium: Exhibuerat olim Sala, ad expurgandum serum copiosum, clasterii gram 20. libe damno, Petrasiens vero Minadous, quem forte consilius manu poellæ tangeret, abiret & pullus, pro mortuo, vel brevi mortura proclamavit: At occurrens Sala eam puellæ manu percutienda fuisse ostendit quæ pulsa semper curavit.

OBSERVATIO XI.

Pulsus inequalis & intermittens ob cordis ventriculum dextrum ulceratum, auriculam dextram majorem.

Domina N. Dyspnææ obnoxia, pulsus admodum inæqualem & 3. vel 4. quavis pulsatione intermittentem habuit. Cordis ventriculus dexter parte interiori membrana denudatus & ulceratus apparuit: auricula dextra solito major &c. *Vide tit. de Dyspnæa.*

OBSERVATIO XII.

Pulsus Inequalis Intermittens ob corpora solida in sinibus cordis contenta.

Illuſtr. N. cordis palpitacioni obnoxius, cum Pulsu inæquali, inordinato, intermittente &c. Cor in utroque sinu substantiam continebat oblongam, mollem &c. *Vide lib. 3. tit. de ventriculi Tumore.*

OBSERVATIO XIII.

Pulsus intermittens, deficiens, à calculo in cordis cavitate dextra contento, cum humore putrido in capsula.

Puellæ cachecticæ &c. Pulsus fit intermittens, hinc *apoplexia*: Illi circa valvulas dextri ventriculi cordis calculus castaneæ magnitudine: In capsula humor putridus; Cor duplo majus &c. *Vide tit. de Syncope.*

OBSERVATIO XIV.

Pulsus intermittens à Calculo uni aortae ramo infixo.

J Arminius cordis palpirationi obnoxius erat: accedere animi deliquium, Pulsus intermittens &c. Cor amplum erat, sed sine pericardio: Calculus infidebat palpirer illi aortae ramo qui vergit ad glandulam sinistro reni impositam. *Vide tit. de cordis palpiratione.*

OBSERVATIO XV.

Pulsus parvus & intermittens ob Pericardium cordi undique adnatum.

Vxor N. melancholica erat, ad motum quemvis anhelat, cum Pulsu parvo & semper intermittente: Illius mortuae cor pericardio undique adnatum inventum est. *Vide tit. de Syncope.*

S C H O L I A.

Cor pericardio adnatum] Pars cordi maxime vicina est membratosa ejus capsula, Pericardium indidicta, quod ipsum cor, (ut cortex oecleum) undique amplectatur: Membrana est firma & robusta, ejusdem figurae & pene magnitudinis est cum ipso corde, cui lobulidum tam necessarium patitur, ut in aribus minoribus, serpentibus, ranis, & in omnibus praeterea vel minimis animalculis, quae haecenus dissecare licuit, nunquam desideretur: De usu ejus optima fiet conjectura ex liquore quem continet: Fix-

terquam enim quod cordis parenchyma, involucto isto munitione, nec corrumpitur ab emphyemate, nec pulmonibus adhaeretur, & ceteris adjacentium partium injuriis minus exponitur, praetera in vacuo inter cor & membranam ambit Serum quiddam, sed aqua tenuis semper reperitur, quae externa cordis superficie continuo humectatur, quae aliqui ex perenni agitatione & calore ioarecere & corrumpi, adeoque ad motum inepta reddi poterit. *Tab. LXXXI. Traët. de inde pag. 4.*

OBSERVATIO XVI.

Pulsus formicans ob Pericardium aqua refertum.

Sartor asthma diu laboraverat & pulsus semper erat Formicans: Pulmo dexter repetitus consumptus, sinister integerrimus, & Pericardium aqua plenum, unde Pulsus formicans extirerat. *Vide tit. de Dyspnoea.*

S C H O L I A.

Pericardium aqua plenum] Unde humor ille proveniat, & à quo potissimum fonte profusus lucetis non ita recte pronuntium est: plerique enim humores serosus ab aëre cordis in nubem clerosos, & densitate hujus membranae coarctatos, in aquam istam condensant, & proinde pro ratione temperamentis plus lo calidioribus, io frigidis autem minus abundare itarunt: Verum si hanc originem hujus aquae atque causam esse concedamus, utique non apparet quare majore copia plerumque hic loci non congeritur, quippe cum humores à continuo cordis aëre in narem suscipi, atque à membrana hac intus cohiberi & in aquam conveni debent, quid impedit quo minus io copiam justo majorem, quoriamque haec capsula continere non poterit, augetur? Praetera cum congesti incrementi fuerit, os simul & extrin alicubi habuerit, aut diutina stagnatione corrumpti, adeoque cordi infesta reddi, aut saltem nimia ejus inundatione cor ipsam obesi necesse sit: Quare ut aquae hujus fontem alibi quæramus, adveniens oportet naturam in variis corporis partibus, ubi operis aut functionum eadem aut par ratio est, iidem plerumque machinis atque instrumentis uti: & quemadmodum glandulas lacrymales ad humorem suggerendum quo oculi illinuntur atque madefiant, (absque quo luci & motui inhabiles, evaderent) praeter & juxta cordis basin diversitas glandulas constituit, è quibus humor intra capsulam exsillat, & in vacuo isto spatio huc illuc

agitur cordis superficiem undique alluit, quo promptior & facilior ejus motus redderetur: Porro humorem istum non mere sacramentitium, aut instar rosis stillantii aqueum, Sed Seri potius nutritii è sanguine promanantis partem esse, exinde constat quod ignis calosi vel paululum admovent, non aliter quam serum, sanguini post venae sectionem innatans, aut lymphæ è glandulis secreta in gelatinam albam incrasantur: Qualem consistentiam nec sudor, neque urina qualicunque coctione acquirit, sed vel omnino in auras exhalat, aut in sabulum induratur: Unicum tantum super hac re obiter est notandum, nempe aquam io pericardio contentam istam solummodo hujus experimento idoneam esse, quae in animali bene constituto, & violenta morte petimento reperitur, eas utpote sanguis sero nutritio diluitur: Nam in animalibus morbo defunctis, aut longa inappetentia & inedia confectis, quorum nempe sanguis succo chyloto prorsus destituitur, neque eadem ratio est & impar successus, Ceterum io sanioribus tam manifestata res est, ut aperto jugulari bovis pericardio, magnam plerumque concretæ gelatinæ copiam invenias, quae extincto tantum calore patris, aut sponte sua, aut à frigore in istam consistentiam condensatur, non aliter quam deosum cornu cervi, ubi

frigido aëre exponitur, in gelatinam subito concrevit. *Idem*

Idem.

OBSERVATIO XVII.

Pulsus Durus & Inæqualis ob Pericardium inflammatum.

Quidam acuta febre præhensus est cum thoracis incendio, cordis tremore, Pulsu duro & inæquali: Sectio à morte palam fecit adfuisse Pericardii inflammationem. *Vide tit. de pectoris dolore.*

OBSERVATIO XVIII.

Pulsus Durities & Parvitas ob tumorem Pericardio innatum.

Quidam animi deliquito &c. cum Pulsu duro, parvo, affligebatur: Eo dissecto apparuit in Pericardio duriusculus tumor, nucis avellanæ parvæ magnitudine. *Vide tit. de Phthisi.*

OBSERVATIO XIX.

Pulsus languidus & rarior ab infigni aqua turbida in Pericardio.

Anno 1657. in cadavere Angli cujusdam, in cachexiam pituitosam delapsi, Pericardium liquoris turbulenti, ad minimum duas libras in distento Pericardio spectatori-
bus continere ostendimus: Huic Pulsum languidum ac rariorem inveni. *De Diemerbræk Anat. lib. 2. cap. 5.*

S C H O L I A.

Languidum ac rariorem] Pulsus Languidus est cui minima contentio scilicetque invalidus, qui si prematur, omnes motus partes statim pereunt, quia gravitas à digitis arteria, amplius moveri non potest ob facultatis languorem, causa enim illi cæcæ adscri-

benda, non instrumentum: Sicut autem Pulsus parvus nativi caloris penuriam ingentemque refrigerium denuntiat, sic & Rarus, qui in illum statim transiit, sicut incrementum malo Tutiditas accedit.

OBSERVATIO XX.

Pulsus inordinatus, intermittens à Pulmonibus cruore suffusus &c.

Puella 10. annorum (*vide lib. 1. tit. de convulsion.*) Tussi crebra & humida infestata fuit, quæ tandem plane convulsiva evasit: Dum paroxysmi convulsivi urgerent, Pulsus erat plurimum Inordinatus, ac sæpe Intermitens: Mortuæ Pulmonum caro valde rubicunda & velut cruore suffusa, in quo quibusdam in locis livida & fere nigra: Ex eadem ubi-
vis scissa ichor tenuis & spumofus exsudabat, Inde conficit sanguinis ferventis impuritates, illico Pulmonibus impactas, eorum poros & meatus adeo interfecisse, ut sanguis soliorum & liberiori circuitu præcluso, ibidem stagnans & extravasatus, inflammationem quandam excitaret.

OBSERVATIO XXI.

Pulsus formicans ob vasa Pulmonis dextri plane purulenta, & Pericardium aqua plenum.

Sartor asthma te diu laboraverat, Pulsus illi semper erat Formicans: Pulmo dextra parte erat consumptus, vasa plane purulenta, & Pericardium plenum aqua, unde Pulsus formicans. *Vide Tit. de Phthisi.*

S C H O L I A.

Formicans] Pulsus undulosus, vermiculans, Formicans, inæquales sunt in unico ictu, atque sub varia digitis, atque in omnibus duplex inæqualitas, una quæ est in tempore inotus partium arteriarum; altera ratione quantitatis distentionis: quæ inæqualitatis species nunquam per se stare possunt, imo necessario semper secunda cum priore copulatur, Etenim undulosus, vermiculosusve Pulsus non dixerit, nisi plures sint arteriarum partes motæ: ac si plures moventur, sed inæquale & inæqualiter, contigit hinc unum absque alia esse non posse: Quoad Formicantem, ex Galeno constat: illum ex hac eadem duplicitate constare, aut enim à vermiculoso sola quiescente distare: Ergo, sicut vermiculosus ab unduloso inæqualitatis specie non differt, sed magnitudine tantum ac pervasitate, ita & Formicans, qui nihil aliud est quam

summe parvus, ex eadem inæqualitatis specie constabit, sed fere insensibilis: Sed notandum non omnem languidum, eamque parvum ac tardum pulsum esse lethalem: Sed neque omnem crebriorem, quamvis languor, parvitas ac tarditas illi sit connexa: cum enim crebritati accedat languor & parvitas, ex humorum ac ipsorum distentione, sed absque solidæ cordis substantiæ infigni latione, malus quidem hic pulsus, sed non perinde exitialis atque ille qui solidorum intemperiem sequitur, qualis est vere Formicans vocatus: Hinc Galenus 2. de Pulsibus ad Tyonium 11. acutas (syncopas) aut Formicantem comitari, quia Syncope acuta hæc ex cordis corporis essentialiter affecto, imo vero & maligna febre temeraria: Ac 3. de Puls. caus. ult. aut Faculentem quæ à febre catæthæ diffusivior, formicantes consequens.

Pulsus inæqualis à Pulmonibus sanguine nigerrimo, liquido, multaque sanie obfessus.

Nuper cum in tertia die primum Comitem Alvisium Gonzagam invissem, statim dixi adstantibus ut extrema illi pararent, alios advocarent Medicos, ante septimum diem obituro à morbi initio, laborare specie quadam *abscessus in Pulmone*: Tum mulier, recte inquam, in hoc ut reor, nam sanguinem ruffiando expuit, competerat enim me solum Pulsum explorasse: Dicam autem qua virid cognoverim, Erat ei Pulsus omni inæqualitatis genere perturbatus, plurimumque in singulis differentis variabat, ordo omnino nullus: Nullus dolor in Pectore præcesserat, nulla difficultas spirandi aderat; unde etiam si delirasset, non potuit abscessus esse in Pectore, ob doloris defectum: Nec in Pulmone, quod spirandi difficultate careret: At in Pulmone tamen morbus erat magnus, non enim sine illius affectu & incompositione tanta Pulsus diversitas conflare potuisset: Advocantur Medici, statuant ut sanguis mittatur, quod ut ère erat, ita ad accelerandum aliquanto plus mortem (quod & prædixi) faciebat: Perit igitur in medio quintæ diei, aliqui ad finem sextæ suffecturis vitibus: Hæc fuit prædictio ex prima visitatione, & solus Pulsus ratione tuto evulgata, de qua omnes qui interfuerant admirati sunt.

Dissecuimus etiam corpus, ut an recte de abscessu sensissem viderent, Invenit est novus morbus, Pulmones sanguine nigerrimo, liquido, tum exquisita sanie, ac multa toti redundabant, citra tamen propriam aliquam suppurationem. *Cardanus artu curat. parva propria pag. 294. & seq.*

SCHOLIA.

Serie quadam *abscessus in Pulmone*] Temeraria videtur prædictio, cum nulla adesse spirandi difficultas, nullus in pectore dolor, aut aliud indicium affectionum Pulmonum: Sed potius arguenda erat cordis, ejusque vasorum, Pulvisque facultati destitutorum, obstructio, aut similis quæpiam læsio, ad exemplum *Galenus* qui in Aniparæ obfessas laves arterias judicavit ex Pulsu summa inæqualitate.

Abscessus in Pulmone] Intermittebat Pulsus ab abscessu in Pulmonibus exemplum singularare, in singulari hæc, fidei integerrime Viri, Clavi. Dom. D. Roberto Vaudeneto, Iusticoi Julio Genæ, & Hurris publicis præfecto, excitari vidi anno 1676. Fluxionibus ille in Pulmones aliquando tenaxus, annos natus 49. 24. Aprilis caracho sub vesperam prehendiatur, qua de causa difficultas & molesta nox obigit: Mane nix & Claris. Dom. D. Cræmeram Advocat. levissimam deprehendimus febrem, sed ex assidua excretionibus & pyralismo, caput & ventriculum pluvia multa redundare contabatur: hinc protinus alvum adflictam enemate proficiscimur: Atque ad ulteriores ventriculi, phlegmatis copia abstrahi, depletionem, Bolum exhibuimus ex Electuar. cathol. Nic. gij. spec. Hieræ simpl. ℥j. crem. Tart. ℥j. à quo ostes pituitosa, serosa, plurima cum euphoria exclusi, sublequuta inde, oneris parte sublevisata natura, nocte tranquilliore: Die iij. ab invasione morbi existit febris, subent male, accedit rufus & pectoris circa sternum gravamen: quomobrem de sanguinis missione statim cogitatio incidit, maxime ob tamenus in iuxta venas, qui aperta vena cum impetu ad 3a. exillit portus: Pulsus ex intervallo, sed longioribus intercephebatur: Postidè, morbi die iv. summa accessit virium attritio, pectoris gravitas major, suspensio crebra, cum pulsus intermissione adeo frequenti, ut ex quatuor pulsationibus una deficeret: Ideoque cacoethiam, vel latentem in pulmonibus abscessum suspicari, ad generosum præsidium, quod circulationem debitam sanguini restitueret, remotionemque prumperet confugimus duximas; aquæ de exhibendo lapide Bizozæ, si modo genuinus occurreret, inter nos convenit: Sincerum ergo & proba-

tissimum nacti, ex Indis orientalibus à Domino Lagia, qui eas regiones ter peragravit, allatum, atque ex ipso animalii illo perente cucum, ad grana xij. ex aqua storum arancorum præbimus: Bihorio exacto commotus sudor, ut tantum circa pectus; successit autem excretio matris parim cunctæ parim purulenta, admodum tenacis & viscidæ, in thrombos coactæ, qui præ crassitie & visciditate viæ tracheam permeabant: huic vero excretioni, quamquam paritæ & divulæ, pulsus libertas omniomoda successit, adeo ut omnia in tuto viderentur: At die 5. accessit dolor lateris dextri punctioris, qui ab admozo cataplasmate ex mica panis, semini lini, fernug. summit. aneth. hyperici, flori. chamom. melior. sambuc. lacti incoctis, cum pauco croco, remissi, pergenter nihilominus matris abscessum committentis anacathasi: Circa sextæ diei finem & septimam ingruentem, anæstas ingens Virum Claris. amicorum iorimam premit: sequitur Pulsus non intermittens modus, sed & intercurrentes, expirans, aliquando myræ, paucis, pressus, ut adventantis crisis impetum sustinere non posse vires, naturamque morbo omnino impetum crederemus: A cardiaca tamen creberrime exhibitis. tyap. Kermetum, cortic. cin. rub. Idæi, margari. pulvere & aqua ephæ, & pulvis item columbinis per medium dilectis, pulveribusque cardiacis aspersis, frequenter admotis (qui post semihoræ moram sanidissimi removebatur) gillinisque vivis pedum plantis applicatis, dimissam naturæ & morbi impetum sustinuit & uberiusque per totam calido manente sudore; alvo simul cum morbo, quo biliosus, serosa, aliquando purulenta dejecta, salvus & sospes evasit; paritæ & amicorum voti, mentem præsertim reddidit: Ex his constat duplicem adhuc esse ædum, febrem scilicet, scilicet, eamque malignamque suam, & propriam, habuit crisis, per sudores & alvum: Præterea Abscessum in pulmonibus, bidui ignis, rufus ope exclusum: Ad tunciam pulmonum, eorumque absterionem, usus est deinceps hydiomelitis ex scabiosa, rufis, rufis, rad. succitæ, semini. myr. hi. prunella confectio: Quævis die canam mentis alidens tumplis: Sicque Dei grata citra recidivam, convalesce, destinata

destinata alia remedia responsa: Singulate vero quid præ se ferebant oritur, quæ sub morbi exitum cuncto pulvere asperse videbantur, contracto videlicet

in hosteis dum illa ventiliandis præcisset: Observatum enim eos quibus ventandi ritibus cum demandata est, asthmaticos pene omnes interire, ac microbios esse.

OBSERVATIO XXIII.

Pulsus crebrior ab humore acri Pericardio infixio; à quo cum cordis membrana fuit erosum.

Ad sui contractionem crebro vel continuo vellicatur cor, tum à quocunque acri una cum sanguine ad ipsam delato, sive illud sit acidum, sive salsum lixivum, sive ex utroque mixtum, quale salsum est muriaricum: Tum à quocunque halituofo vel flaturulento in cordis ventriculos penetrante, ipsiusque parietes aliquantum, non tamen nimium explicante; & ita quidem ut iterum queant contrahi: Tum ab re cotidi Externa, in Pericardio pura contenta, ipsiumque rodente aut pungente: Sic offendimus ante triennium in pericardio humore salsum & acrem, à quo tam Pericardii quam cordis membrana eras erosa excoriataque. *Frans. Sylvius Prætoris lib. 1. cap. 25. §. 26.*

OBSERVATIO XXIV.

Pulsus molles, languidi, inæquales ab augmento pino Pulmonum partis alterius &c.

Rever. Pater febre assidua prehenditur cum lateris dolore, pectoris gravitate, Pulsibus molliotibus, languidis & inæqualibus: Inventa est altera Pulmonum pars aucta in magnitudine, ut quadruplo major esset quam altera & durior, quæ secta multa aqua facta fuit expurgata; & cito inventa dura, densa & rubra &c. *Vide lib. 4. tit. de Febris.*

S C H O L I A.

Pulsus molliotibus] Sont molles Pulsus in Pericardio, lechargo alisque id genus humidis affectionibus: Dari in plurimis affectionibus, 1°. in omni quantitate melancholia, ratione siccitatis & rehibitionis, 2°. in omni marasmo & febre marasmodi, diuturna, consumptiva, ratione siccitatis, 3°. in Epilepsia, catocæ, convulsionem, doloribusque omnibus, præcipue nervosarum & tendinosarum partium: 4°. in omni tumore calido, frigido ac mixto, maxime iuniorum quæ venas ipsas & arterias constitunt: Hinc patet ex Dato Pulsu posse cognosci inflammationes, erysipelata, scirrhos, abscessus varios, obstructions ingentes, humorum copiam, crassiciem, lentorem, frigiditatem siccitatemque, nec modo in locis prædictis, quos esse doctos novæ unguisquæ, sed & in illis quæ ex se molles faciunt pulsus, ut est cerebrum ac pulmo, in quibus sive adsit lechargo, sive pericardio, &c. aliasve contumelias affectus, cum duro pulso connexas, sine duritie causam, non in ipsorum proprium affectionis locum, sed in affectum, qui duritiem faciat, referre debemus: *Saxonia lib. 3. de Puls. cap. 57.* At si in supradicto ægro plures fuere causæ quæ durum Pulsu parere valeant, inflammatio scilicet Pulmonis, carnis ejusdem durities, densitas, cum molles facere Pulsus? Dicendum fortissimum simul fuisse, scilicet inæqualem systematica duritiem ac molliem, ob similem arteriæ inæqualitatem, ut docet Galenus 2. de Prælag. ex Puls. cap. 6. Quomodo vero fuisse tales explicat idem Saxonia, cap. 67. Fit, ait, inæqualis Pulsus secundum duritiem ac molliem, in ægro, ob quinque præcipue causas, 1°. cum adhuc inflammatio est heus; quo tunc tempore fuit materia Pulsus est durus vel durior; quo vero tempore digeritur, est mollis, vel minus durus; fuit autem materia ad locum inflammatum circa accessum inleis & incrementa, itaque eodem tempore pulsus fit durus; digeritur autem in statu & de-

clinatione, idcirco aut minus durus fit, aut quandoque mollior, 2°. si hæc mutatio ex loci permutatione, sive cum transeat materia à membranis ad carnem, locave inania, aut extra corpus mittatur, pulsus ex duro molli redditur: Si vero contra, sit durus: mittitur autem materia à membranis extra membranas, in contentivis quibuscumque febribus periodicis, quas Galenus lib. de morb. temporibus cap. 7. inquit in declinatione duritiem deponere: eam autem deponunt digesta granis flavæ materiei à loco ubi duritiem inducerebat, ad alium vel totum vel extra corpus, ut nullam amplius duritiem efficiat: sic ergo permixta materia à cerebri membrana ad sublaoniam, vel à pulmonis membrana ad carnem, pulsus ex duritie induit molliem, ex molliæ autem duritiem relinquit: 3°. *Ex inæquali siccitate & humiditate, aut inæquali frigiditate ac calore:* Fluor enim quandoque ad affectum locum materiei biliozæ vel melancholicæ, ex quibus durus fit pulsus, qui paulo post mollior reddi potest, si illis recedentibus humidæ atque aquosæ fluxus: 4°. *Fit & aliquando iniquis arteria: um reiterationio circa accessum inleis, ex qua Pulsus oritur durus, qui tunc demum mollior fit quando arteriæ incaluerint:* Fiant denique inæquales Pulsus duritie ac molliæ in Phthisicis, qui non modo pulmonum ulcere laborant, sed & fluxione plurius, quandoque empyemate, & non raro lubiditate putrilagine; ob quas omnes causas putrida quædam febris accenditur, horis respectibus magis mollior, in capis initio movetur materia humida à capite ad pulmones, à pulmonibus & thorace ad arterias, quæ dum illas diluit, irritat & humectat, mollior fit pulsus: accedente vero febre ad statum, tæ uisage materia, durities succedit, relinquit arteriis ex tabida febre exsiccatis, Adde ab eoribus in leæ rebus non nari. Sic in pulso molli-

frigide potius, aut quid tale, duritiem statim efficiere valent.

OBSERVATIO XXV.

Pulsus durissimus, vermicularis, celerrimus, à suppuratione Pulmonum, Vomica, Aquosa substantia in pericardio, Corde flaccido &c.

Hubert Pouble, (vide historiam tit. de Phthisi) febre hectica marasmodi consumptus, Pulsum habuit durum, celerem, crebrum: Postmodum durissimum, vermicularem, celerrimum, creberrimum: In Pulmonibus exulceratio reperta est, cum duabus conclusis vomicis: Multa præterea aquosa substantia in pericardio & thoracis cavitate quoque fluctuabat: Cor flaccidioris substantiæ erat, In ventriculis tantum aliquot nigri sanguinis striæ continebantur.

S C H O L I A.

Pulsus habuit durum] Pulsus durities naturalis adscribenda tunicarum crassiciel: præter causam affligentem visco membranarum inflammationi: Causam & habet macerem, & spermaticarum partium ad summum usque deductum aequalitatem & tictura-

tem: alias vomica in pulmone, cordis flacciditas, & aquosæ mulæ humiditatis præsentia in pericardio, dactilem illam sanguine debuerunt, si pulsus mollem inducere non valuerunt.

OBSERVATIO XXVI.

Pulsus interceptus ob Pulmonem sinistram inflammatum, fere putrem.

Dom. Tarenti ad cachectiam vergentis Pulsus erat interceptus: Pulmonum sinisterrimus inflammatus apparuit & fere putridus: lib. 3. tit. de Cachectia.

OBSERVATIO XXVII.

Pulsus inæqualitas à vario Pulmonum vitio, & cordis insigni magnitudine.

Serenissimo N. Pulsus mira erat inæqualitas & parvitas: Cor erat prægrande, sine tamen ulla materia: Aderat hydrops thoracis: Pulmones utrique mucosæ & sanie obditi. Vide lib. 4. tit. de Febribus.

OBSERVATIO XXVIII.

Pulsus interceptus ob partem sinistram Pulmonum materia fetida tumentam.

Illustr. N. tussis, dyspnœa, febris &c. laboranti Pulsus in quarta pulsatione facti sunt intercepti: Fuit inventus tumor in parte sinistra Pulmonis, e quo materia fetida sectioneeducta. Vide ibidem.

OBSERVATIO XXIX.

Pulsus magni, molles, quinta pulsatione intercurrentes, à Pulmonum tumentium &c. vitio.

Illustr. N. in febrem assiduam est delapsus cum dyspnœa, genarum rubore, pectoris gravitate &c. Pulsus erant magni, molles, sed in quinta pulsatione intercurrentes &c. Pulmones fuerunt inventi tumentes & pravi coloris, sed non fuerunt secti &c. Vide lib. 3. de Febribus.

S C H O L I A.

Pulsus magni, molles, intercurrentes] Lethargicorum, peripneumoniarumque pulsus sunt magni, celeres, crebri ex calore: languidi, ex facultate gravata: molles undolique, ex partis & affectus mollitie cum suberfusione: Intermittentes ex arteriarum compressione, Intercurrentes à Dicrosi diti, ex utroque ca-

sa præcipue autem calore aucta, cum facultate languida in dicroto, non admodum languida in intercurrente: Sunt autem ex Cerebro potius intermittentes quam Intercurrentes. Ex Pulmonibus autem potius intercurrentes. Saxonia lib. 3. de Pulsibus cap. 27. De pulsin intercurrente vide eundem cap. 25.

OBSERVATIO XXX.

Pulsus in dextra manu fere abolitus, In sinistra magnitudine & parvitate dispar, à dissimili inflammationis statu in dextro & sinistro pulmone, cum hydropne thoracis.

Cætolus Phatmacopœus oblit ex peripneumonia & hydropne pulmonum: Hic durus non habuit Pulsus, sed in dextra manu fere abolitus, quod durior majorque in dextro pulmone: In sinistra, magnitudine ac parvitate dispares, quod minor ac mollior, & aliqua ex parte suppurata esset in sinistro pulmone Inflammatio. Saxonia l. 3. de Pulsibus. 96.

S C H O L I A.

Quomodo ex unica affectione, ut inflammatione, tam varii prodeunt pulsus, cum idem sit locus affectus, causa & affectiones, adeo ut sint quidam interstati, vibrati, convulsivi, simpliciter duri, æque disparēs magnitudine ac parvitate? Respondeo fieri simpliciter duos ex tunicarum arteriarum flicie, refrigeratione, tensione, impletione absque compressione, atque obstruktionē & absque usu aucto, vel absque vehementi facultatis: Vibratos vero ex his quidem causis, sed accedente usu aucto & robore facultatis: Convulsivos autem irritata sentiente expulserique non vis facultate; vel ex majori impletione quam in simpliciter duro, Scitinos vero, accedente tensioni compressionē moderata: Disparēs magnitudine, ex moderata compressionē aut obstruktionē absque tensionē: Intermitentes denique, aucta eo usque impletione, obstruktionē vel compressionē, ut tota vasis cavitās in ea parte sit angustata: Idcirco in in-

termitentibus, atque magnitudine disparibus ipsæmet arteriarum tunica, vel cavitates impleantur, comprimuntur, vel obstruantur: In aliis vero pulsibus jam dictis, vel siccantur ac refrigerantur, vel ad altiarum partium impletionem ac tensionem comprimuntur atque tenduntur. *Mem.*

Cam peripneumonia & Hydropse pulmonum] Si quispiam quaerat cur hydropse pulmonis laborantibus & cæco ex fibre ac demum colliquantur fuisse in omnibus vasis humores, fusoque sero, magnam illius partem ab ingenti pulmonum calore in thoracem esse tractam, partem vero per locum fuisse expurgatam: ratio enim hoc morbi tempore usque crude triplo plus redderet quam biberet? Eandem ob causam existimo Excessu Duce Pinellum habuisse in capite huiusce aquæ portionem multam, quod scilicet ab inflammationis calore eodem modo in caput attraheretur. *Idem.*

OBSERVATIO XXXI.

Pulsus inordinatus, intermittens, urgentibus paroxysmis convulsivis, cum inflammatione pulmonum.

Puella tussi humida conficta fuit, quæ convulsiva plane evasit, &c. Dum paroxysmi convulsivi urgerent, Pulsus erat plurimum inordinatus ac sæpe intermittens, vomitione etiam crebra afficiebatur &c. Ventriculus sanus erat, nihil præter liquorem nuper ingestum continens: &c. Pulmonum caro valde rubicunda & velut cruore suffusa, inflammationis notas exhibens &c. *Vide lib. 1. tit. de convulsione.*

S C H O L I A.

Vomitione crebra afflicta] Quoniam huius vomitus causam rejicitur: Pulsus in convulsionum participem factum ventriculorum, Adnotat tamen vomitum Pulmonicis familiarē esse, primis præsertim diebus, forte quod membrana communis est ætiophago & bronchis pulmonum, adde & nervorum communionem, unde facile ventriculi pulmonibus sympathia solet.

Inordinatus ac sæpe intermittens] Scorbucis anomalia illa Pulsus familiaris est, cujus causa cum quadare possit in ejusmodi pulsuum, aliis affectibus accidentem, eam ex Clar. Viri Tract. de Scorbuto cap. 3. §. 4. adducimus; Pulsus inæqualis aut, ac intermittens Scorbuto graviori sæpenumero accidit, cujus pars ratio ac respiracionis anomalæ, modo sanguinis in corde

accessioni indebitæ, modo nervosi generis inordinacioni merito adscribitur: Sanguis sanguineor factus, ac intusper faculentis scorbucis valde repletus, velut ellychnii oleum, sile ac fordibus limosis labundum, nonnulli inæqualiter ac interruptè accenditur: quare hinc pulsus inæqualis cum spirituum vitalium crebro deliquo clegat: Porro si quando nervi cardiaci etiam materia scorbucica obducuntur, ut spirituum animalium influxus, quo cordis motus perennaret, haud iusto dimenio & aequabili iu peragatur, propterea quidem accidit cordis motum aliquatenus imbecilliusque reciprocaciones varie perturbat: Pulsus inæqualis vel intermittens, & parvus ac debilis, à dyscrasia sanguinis: Sin facti sit magnus & fortis, à functionis animalis vicio procedere videatur.

OBSERVATIO XXXII.

Pulsus Interctisus, Intermittens ob hydropem pericardii & thoracis.

Joh. N. vidua difficultatem spirandi per 30. annos habuit: E capacitate thoracis aquæ librar 6. purcentis educuntur: Aruerant pulmones, Pulsus magnus, elatus, tardus, interctisus & intercalarem habens in pulsatione una atque altera intermissionem. *Vide tit. de Dyspnœa.*

S C H O L I A.

Pulsus magnus, elatus, tardus] Nec enim omnis magnus necessitas est vehementis; nec vehementis magnus: Sicut non omnis pulsus parvus est languidus; neque omnis languidus est parvus: leiburgicorum enim pulsus sunt magni simul & languidi: Pulsus utrem magnus, docente Franc. Sylvio requirit sanguinis rarefactionem amplam plenamque, concurrente arteriarum molliē: Sed ita aruerant Pulmones, cur pulsus potius datus non fuit? Verisimile est talem extitisse Pulsum antequam acritas induceta sit pulmonibus, quem in morbi decursu ab aqua in thorace con-

tenta, siccandi vi prædita, contraxerunt; vel quæ lympham, qua plurima pulmonum superficies donatur, in capacitatem thoracis depoluerunt, qua privati acritas illis accessit: Nili dicas in vasis plurimum quoque iterum inclusum, expansionis arteriarum ausam præbuisse.

Aqua libra sex pariter &c.] Cavitas pectoris Serenissimi de qua supra agitur materis libras quinque continebat, cujus Pulsus omnino huic dissimilis, inæqualis scilicet, & parvus; morbo nempe ad exitum & exitum properante, initio enim magni & fortes fore. **OBSERV.**

OBSERVATIO XXXIII.

Pulsus inaequalitas ob Hydropem Pectoris & Pulmonum.

Joh. Baptista Ramundinus, sexagenarius, maximam in Pulsu inaequalitatem patiebatur & difficultatem respirandi, inde repente obiit:

Dissecti Pulmo aqua plenus, inde thorax inventi sunt. *Cardanus parte 3. n. 63. de causis, signis & locis morborum.*

OBSERVATIO XXXIV.

Pulsus debilitas ob bilem minus acrem in vesica fellea contentam.

Dom. Franciscus Sylvius foeminam aperuit, cujus bilis flavescerebat, unde minus acris erat; hinc Pulsus debilem derivabat: *Alardus Herm. Cummensis in miscellan. cur. anni 1673.*

S C H O L I A.

Hinc constat Bilem utilem esse suum, qui sanguini vigorem afficit, nec excrementis esse accedendam: Tanquamque abest, ut ad Aristotelem & Plinii placita, quidam hominum absque bile inventi fuerint, ejusque absentia vitae productioni intersit, ut potius ex ejus defectu homo superstes vix esse queat, quin hydropem vel talem cachexiam incurrat: Id olim à *Formis* fuit observatum, qui in quibusdam non aliam motus causam comparasse ait, quam quod folliculus omni bile exhaustus fuerit: Praeter utilitatem, quam ad coctionem primam expellendum & abolendam affert, nullum dubium, ut *Maisius Fundam. Mediana cap. 16.* ipsam

quoque haematosis, eum in corde tum in hepate, bile ista alimentari javari: Bilis ista nimirum videtur quasi flos sanguinis, unde chylus mixtus cum sanguine in corde, maxime hujus beneficio fermentari, & demum in sanguinem mutari videtur: Revera si inutile excrementum Bilis esset, & solum, ut vult *Galenus*, intersit ad praeiuv incisionem & absorptionem, ac ut intestinorum capultrix ad deponenda excrementa follicularetur; natura eam non ad intestina tenuia, ubi chylus ultimam accipit manum, ac potius ad crassiora, quae scybalis crassiora continent, & simul pro excretionis praeparationis opus habebant, ablegaret.

OBSERVATIO XXXV.

Pulsus deficiens à corruptione omnium viscerum ortus.

Cuidam cum acuta febre Animi deliquium, Pulsus deficiens &c. Omnia viscera marcore confecta & abscessu putria inventa sunt. *Vide tit. de Febris.*

S C H O L I A.

Pulsus deficiens] *Galeno 2. de causis Puls. cap. 3.* est qui ad movendi digitos videtur casolatus, & tenenti applicatos paulatim prorsus desinit: Deficiens autem alias est *Deamatus*, *Movensque* *epyrus*, qui & *mundus* & *depressus* dicitur, est qui perpenam dimittitur, nec minimi desistit, ad quietem denique omnimodum venit, prorsusque debet: Qui si iterum redit, & de integro augeatur, *Deamatus* *reversus* dicitur, 1. de diff. Puls. cap. 11. Quod si in eo nulla servetur aequalitas, motusque ipso sequenter deficiat, *De-*

iens inaequalis appellatur. 2. De caus. puls. cap. 12. Nomen autem a figuris quae in acutum desinunt, & à eisdem multis transierunt Graeci: Hujusmodi autem Pulsuum inaequalitas Systematica dicitur: Pulsus omnis *μυστος* provenit ab imbecillitate facultatis Pulsaica: verum ea imbecillitas, in eo qui *μυστος* dicitur, maxima est, neque enim se recipit & recolligit, postea in eo, qui in qua desit praevitate, hanc servat: minor vero ubi magnitudinem recuperat.

OBSERVATIO XXXVI.

Pulsus intersectus, myurus, capillaris, in aërophia desinens, ob partes vitales in angustum coactas ab hepatis mole, Pulmonum vitio &c.

Serenis. N. arthritidi obnoxius, capitis dolore prehensus fuit, post destillatione in pectus, febricula &c. Omnia frustra tentata sunt, crescente anxietate & aucta pulsus imbecillitate, ita ut intersectus videretur, postea myurus, mox capillaris, tandem sine pulsu: Pulmo, cor, pleura, ac septum transversum vi retracta ac in angustum coacta hepatis mole & ventriculi, septum quasi superantia; Pulmones nigricantes, digitis compressi tabum reddentes, cor integrum sed inaequali figura praeditum &c. *Vide tit. de mitione difficili lib. 3.*

S C H O L I A.

Pulsus intersectus] Alias Intercidens, sive Intercidus, Inaequalis est in uno & eodem ista, secun-

dum unam & eandem arteriae partem; ubi arteria sua distensionem finit, media quadam intersecta brevissima

brevissima quiete: ac licet bis scire videatur, unus tamen duntaxat est Pulsus, quia ad unam eandemque arteriæ distensionem pertinet. Hic minus periculosus quam intermitteus statuatur, quod signum sit morbi cum morbidicis causis decedentis. Notandum vero ex Galeno 2. de Præfig. 5. quod intercurrentis aliquando bonæ sit crisi præmonstris, naturæ ad pugnam se accingentis conarum indicant: aliquando sit sympto-

maticus, præve alicujus affectionis index, qui plures habet inequalitates coarctatas, qualis fuit in Serenissimo, sequens enim pulsus myurus, capillaris, fastidicis indices facultatis: criticus autem, præter intercurrentiam, alias non habet insignes inequalitates: suas præterea obtinet distensiones magnas, validas, celeres, præsertim circa statum ac coctionis tempore.

OBSERVATIO XXXVII.

Pulsus vibrans ab Hepatis incendio, Sinistro pulmone purulento, &c.

IN III. Domina N. febre semitertiana affecta Pulsus erat Vibrans, qualis in ingentibus inflammationibus apparere solet. Hepar incendio incanduerat. In cysti aderant lapilli novem: Sinister Pulmo purulentus: Fœmina erat itæ præcipitis. *Vide Tit. de Febris.*

SCHOLIA.

Pulsus erat vibrans) Græcis dicitur *κλονήεις*: hic perpetuo durus est, & propter duritiem vehemens: fit autem cum valida est facultas instrumentum durum & urgent usus: quorum usus si abis, ex Galeno, Vibrans fieri non potest. Eosdem autem quos & Pulsus durus morbos denantias.

Qualis in ingentibus inflammationibus) Quatenus facultas valet, non potest cor primo & per se insigni morbo laborare. Provi vero usus est valde auctus, oportet affectionem esse calidam, magnam, aut cordi proximam, aut saltem per magna vasa illi facile communicabilem: denique quatenus instrumenta sunt dura, opus est corpus arteriæ esse valde impletum, aut saltem valde tensum, ut membranas, nervos tendentes affectos. Ex quo statim colligitur posse

Vibratum fieri ex tollamatis, vel à calida materia impletis arteriis hævibus, aut his quæ ex aorta ducant originem (dummodo tamen affectio facultatem non exolvat) vel ex eadem inflammatione, aut impletione septi, pleuræ, meningum, oris ventriculi, vesicæ, uteri, intestinorum, aliarumque id gerat membranarum, ut peritonæi, jecoris, lienis, renum, testium ac consimilium: Denique vero ex nervorum ac tendorum affectione, præcipue vero pedum ac brachiorum, qui cæteris sensibilibus ac duciore sunt. Ex his omnibus locis fieri Duros Pulsus, & accedente causa calorifica, ut inflammatione, erysipellate, impletioneve à materia calida vibratus nemini jam ignotum est. *Saxena lib. 3. de Pulsib. cap. 83.*

OBSERVATIO XXXVIII.

Pulsus inequalis, deficiens, ob cordis ventriculos & pulmones sanguine refertos, cum carunculis in sinistro cordis sinu.

DOm. N. de palpitatione cordis conquestus est, Pulsus illius contrectans, inaequalem illum juvenio, omni genere inequalitatis, ita ut statim mihi renovaverit memoriam Anripatrî: Varia sunt præscripta, sed æger in pejus perpetuo ruebat, summa discurrere respirandi laborans, & Pulsus nullus apparebat in carpo. Aperto cadavere, inventus fuit cordis ventriculus uterque sanguine concreto repletus ac distensus: tum etiam torus Pulmo sanguine multo refertus. In sinistro cordis ventriculo carunculae rotundæ. *Vide Tit. de Pulsu cordis.*

OBSERVATIO XXXIX.

Pulsus intermissus, tandem asphyxia ob calculum in sinu dextro cordis inclusum, &c.

HOnefti civis filia, cachectica, in febrem biliosam continuam incidit, succedit pervigilia. Pulsus intermissus, &c. In capsula cordis aderat humor purridus, cor duplo majus, bubulum referens, inveniuntur: circa valvulas dextri ventriculi calculus ex tartaro concretus. *Vide tit. de cordis palpitatione.*

OBSERVATIO XL.

Pulsus per triduum deficiens ab exhaustis sanguine cordis ventriculis.

VXor N. quæ gravida judicabatur, post varia symptomata vivere desit. Cor illi elegans & pusillum, adipe fere tectum, In ventriculis ne gurma sanguinis comparuit, ut mirum non sit tribus ante obitum diebus Pulsum cessasse. *Vide lib. 3. Tit. de ventris tumoribus.*

S C H O L I A.

Pulsum effugit) Circa Pulsus validi & debilis causas sic ratiocinatur *Praxos. Symp. Praxeos lib. I. cap. 34. §. 41. & seqq.* Arbitramur, nil, omne animi deliquium deduci debere proxime ac immediate ab ipse sanguine ad cor utrinque audente, neque illis omnibusque tam secundum tum p. n. ipsi coagulantur, & una cum ipso ad cor deferuntur, ipsiusque Effervescentiam naturalem ita turbant & immutant, ut non tantum sanguinis rarefactio imminatur, sed cor ipsum non satis expandatur constabaturque, Sanguisque insufficienter in Arterias effundatur, ideoque Pulsus Minor & Languidus, quin aliquando Nullus fiat.

Si enim ad pulsum laudabilem efficiendum requiratur, sicut omnino requiri arbitramur, tum 1. Sanguis undique & utrinque ad utrumque cordis ventriculum refluxus, tum 2. Bili ascendenti sanguini innectus; tum 3. Lympha undequaque cum descendente Sanguine affluens, tum 4. singularis ex concilio Bili, fusi Pancreatici & Saliva in tenui intestino conflatu sui Effervescentiam ortus, & mox per Lactea venas transiens Liqueor; tum fortan 5. Aer inspiratus in pulmones attritus, & aliqua sui parte Sanguini per ipsos circulantem admixtus, dum in subsequente mox Explicatione excluditur iterum reliqua; tum aliquando 6. Chylus, quamvis non semper is, sed post assumpta demum alimenta propellatur ad cor: Si haec omnia, inquam, requirantur ad laudabilem Pulsum efficiendum, utique singula tum adesse, tum rite disposita esse oportet: Quod si horum unum vel plura in totum aut ex parte desint, aut copia majore adfuit, aut aliena qualitate donata eo accedunt, vel alia insuper non requirita, ideoque necessaria nona conflant, contingit dubio p. oculis, praeter aliarum in corde fieri solitarum functionum labefactionem, aliqua Pulsus lesio.

Ut autem in praesenti maneamus negotio, Pulsus deficit plus minusve in Magnitudine ac robore 1. propter universalem Sanguinis defectum, post haemorrhagiam notabilem, aut inardiam diu protraham. Unde non tantum deficit sanguis, verum alii quoque in corpore humores, Bili, Succus Pancreaticus, Lympha & ceteri ad vitalem sanguinis rarefactionem, Pulsumque ideo magnum efficiendum necessarii.

Deficit idem in Magnitudine, hinc & Robore Pulsus 2. Propter Bili defectum, in xlii fluxu & vomitu enormi, ac praetertim cholera morbo, unde quantitate minore, tandemque fortan nulli si ad cor deferatur Bili, aut mitius si minor vel nulla exciteretur in ipso Effervescentia, Si minor vel nulla fiat sanguinis Rarefactio, Si minor vel nulla sequatur Ventriculorum cordis tum Contractio tum Contractio, Pulsusque sentiat vel Minor vel Nullus.

Deficit idem in Magnitudine, hinc & Robore Pulsus 3. propter Lympha defectum, & Sudore nimio, cum quo, praeter spiritus animales, Lympham quoque minuti evincere videntur Acidum non minus quam Spirituosa Volatilia, multum sodanica recreantia & resiliencia. Defectus autem Lymphae Subacide, tum sanguinis Consistentia mediocri, tum eisdem Effervescentia deficit, unde idem nec satis rarefiet in corde, nec hujus Explicatio Complicatioque fiet satis magna, unde Pulsus etiam observabitur necessario Naturali minor.

Deficit idem in Magnitudine, hinc & Robore Pulsus 4. propter Liquoris ex insigni utrumque exurgens defectum, in vomitu & alvi fluxu molesto ac imprimis continuo: Hoc etiam ex parte, aut in totum excluso, erit necesse Sanguis ejus beneficio. Censuimus autem alibi facere ipsum ad Coagulationem naturalem Sanguinis concludendam, Ea proinde si plus vel minus deficiat sanguis, nec hujus defectus reparatur continuo, minus apud erit ad rarefendum cordisque ventriculos explicandum sanguis, sequeturque Pulsus necessario Minor.

Deficit idem in Magnitudine, hinc & Robore Pulsus 5. propter Inspirandi Aeris defectum, in Oris, Narium Fauciumque, aut Alperae arteriae angustia qualicumque, ob quam minori copia accedens aer, desideratum sanguini refrigerium, vel qualemcumque tandem mutationem satis nequit conferre, quocirca segnius propellitur per Pulmones sanguis, nec sufficientem novo ex dextro cordis ventriculo succedenti locum faciens, cordis contractionem impedit, & haec est Pulsus minoris causa exitus.

Deficit idem in Magnitudine, hinc & Robore Pulsus 6. propter Chyli defectum, & in praeposteris Inedulis, sive voluntaria sive coacta, & in Alimentorum fermentatione, aut Secretione, aut Transfusione, aut Translocatione quovis modo impedita: Nisi enim quotidie, ac imprimis consueti tempore assumantur alimenta, ex quibus electus Chylus ad cor deferatur, non tantum non replebitur sanguis continuo deperditus, sed in se, sanguinemque reliquum, nimium perpetuo agent Humores in corde, ac intestino venali confluentes, ac nonnumquam praetabant sanguinem magis vel minus consistentem, hactenusque ad debitum sufficientemque sui Rarefactionem, cordisque ventriculorum Explicationem Complicationemque ineptam, unde necessario sequetur Minor & Debilis pulsus.

Non tantum ex enumeratis Humorum defectibus, verum aliquando excessu quoque, Minor & Languidus contingit Pulsus. Nam 1. Sanguinis redundantia, plethora dicta, impedit ne sparii & loci defectu copiosus in Arterias expelli possit Sanguis, nec proinde in dextro cordis ventriculo valde laxius rarefieri, cordisque parietes multum explicati tumque complacari queant.

Quin 2. Bili majori copia ad cor delata, in febribus ardentibus praetertim, non tantum sanguinem solito magis potentiusque rarefacit, cum Pulsu Majore ac Robustiore, sed postquam ista rarefactione nimis tandem vasa multum distendenda, & Plethoram ad vasa dictam dicendamque constituendo, ipsa ipsorum omnia replevit, ut in Aduerum conservet noxium, nun potest tam Leni defectu aequae sanguinem ac prius deducere, neque Pulsum Magnum Robustumque producere, qui prius sentium observatur Minor ac Debilis, ob deficientem sanguinis Rarefactionem, Cordisque ventriculorum Explicationem Complicationemque, donec Sanguinis effusione qualicunque, locus parent novus reliquo amplius rarefactio excipiendo, una cum Pulsu & Majore & Robustiore mox simul coequeant.

Pulsus Minorem, ideoque Languidum quoque producit, 3. Lympha Subacida, si copia majore accedat ad Cor; quoniam Consistentiam tribuit sanguini

galmi firmiorem ac solidiorem, quam ut debite factique possit idem rarefieri ad cordis ventriculos sufficienter dilatandos, quo læcedat notabilis eorumdem constitutio ad Pulsum magnam ac Robustum constituendam omnino necessaria.

Idem dicendum 4. de *Liquore* illo intestinorum tenuium *humorali*, si præteritum ejus manus sit coagulationem naturalem, ab acido subaucto pendente, Sanguini præstare. Hoc enim aucto augetur quoque sanguinis coagulario, minuetur contra ejusdem apicando ad rarefendam, ac minuetur proinde Pulsus, sique simul Debilior.

Cùm *Aëre* laudabilis copia magna in Pulmones allecta non possit non esse utilis, non poterit ab ipsa expectari, nec deduci Pulsus Minor, vel Languidior.

Potest tamen 5. à Chyle majore copia, quovis modo ad cor delato, Pulsus reddi et Minor et Debilior, quatenus sanguinea vasa nimium replet, ac plethoram tum efficit tum auget.

Si quantitate, aut deficiente aut excedente, Pulsam minorem Languidioremque producere poterunt & sanguis & alii memorati humores ad cor cum ipso delati, certe non minus idem præstabit illdem quodque qualiter peccant noxia. Sanguis namque t. vel *fluidus*, vel *solidus*, ineptus est laudabilis rarefactionis, qua deficiente ostensum jam est non fere Pulsam causæ qui Minorem Languidioremque.

Sic 2. *Aëre glutinoso* minusque *aræ* effectveleret minus, paritque igneus dele promer paucius, unde sanguis minus rarefiet, & tandem Pulsus fiet minor ac debilior.

3. *Lympha* vel *acidior* vel *ascrier*, non tantum sanguinem præstabit *Glutinosorem*, idèque ad rarefendum ineptiorem, sed insuper non parum obtundet bilem, paritque Igneus undecunque erumpentes, atque sic Pulsui & minori & languidiori dabit animum.

4. Idem sentiendum dicendumque de *Liquore* aucto *Trismetrali* vel *acidior* vel *ascrier*.

5. *diu Betala* & *Ascrier* faciet multum ad sanguinem valde coagulandum, ipsiusque rarefactionem impediendam.

Si 6. *Alimenta* assumantur *acidiora* vel *ascrier*, chylus quoque paribit similis, à quo noxia incommoda sunt expectanda, cum Pulsu minore ac Debiliore.

Pulsus minor ac Debilior, debetur quoque aliis Rebus præter naturæ leges ad cor dilatis, quodque aut *Humori* in corpore corrupti, aut *Halitu* *Fluissis* ex ipsis producti, aut tenues per os, nates cutive poros, vel quatenusque aliam viam in corpus penetrania una cum sanguine Cor accedant, & languentia aut nimis coagulans coagunt, aut quovis modo alio ad debitam sui rarefactionem ineptum reddunt.

OBSERVATIO XLII.

Pulsus Inæqualis ob contenta extranea in sinibus cordis, succedente Asphyxia.

Dom. N. Pulsus contræctans, illum inæqualem invenio omni genere inæqualitatis, tandem ad asphyxiam devenit. Inventus fuit cordis ventriculus uterque sanguine concreto repletus, in sinistro caruncula. Vide Tit. de *Palpit. cordis*.

S C H O L I A.

Omnis generis inæqualitatem inæqualitatis Pulsus causas tum in Corde, tum extra id diliquit Saxonia lib. 3. de Pulsibus cap. 14. Quævis, ait, Galenus 4. de Purg. ex Pul. 12. nos docuerit ali. & eundem omnium arteriarum pulsus mutari, contra vero quorundam tantum, ubi in arteriis quibundam determinata fuerit læsio, artem non valet consequentia, omnes arterie inæquales profertur Pulsus, ergo Cor in propria substantia est affectum. Patet enim affectio in Magnæ Arteriæ principio consistens, omnium arteriarum pulsus reddet inæquales, ut aperte colligitur ex Galeno 2. de Puls. cap. 4. & Autpant exemplo confirmatur 4. de loc. affect. ubi itaque cordis affectionem in propria substantia fectam, eo dignoicemus argumentum quod ab Hippoc. propositum est 2. aphor. 41. Qui sepe ac vehementer, & absque manifesta causa exaltantur, repente moriuntur: Ex nulla enim alia parte affecta potest quilibet inæpt, & vehementer, & circa manifestam causam animo linqui, præterquam ex viciato in propria substantia corde: Fit plerumque omni generis inæqualitas in Pulsu, propter lævæ arterie oblituitas vel compellitas, ut de Anipato proxime, nullo tamen existente animi deliquio, nisi prope moriem.

Fit quoque Pulsus insigniter inæqualis ex ore vomitibus affecta, accedente quin etiam frequenter in syncope, sed causa tui manifestella, vel boalioma, vel frigidum humorum copia, vel acrimonia atque tenuitas.

Fiunt plerumque non minus inæquales ex atere, cum animi distractu magni momenti: sed & hujus defectus atque inæqualitatis causæ enut compicunt, forte nec admodum frequenter. Solum Cor primario læsam omnem profert Pulsus inæqualitatem, cum frequenter ac valida syncope, interim nulla apparens in reliquis corporis partibus affectione: Ex quo statim concludendum Cor in propria substantia vim pati: Quia vero aut intemperie eade afficitur, aut à materia aliqua comprimatur, gervatur vel obstruitur, utrobique quidem adeit omnium Pulsuum inæqualitas, frequenter syncope, sed in intemperie cum materia, adeit Palpitatio, in intemperie citra materiam, nulla, juxta Galenum 3. de Purg. ex Pul. 4. Quæ cum sit duplex, ait, altera in facie ejus propriæ, altera in partibus solidis, illa ex facie profecta, una cum totum corpus sit palpitatio, hæc ex solidis partibus absque palpitatio. Utum vero hæc materia sit in ventriculorum cavitate, an solidæ impacta substantia, pertinet adquisitionem casuum synopes & palpitatiois: Nunc illud intellexisse sufficiat, Cor primario affectum omnes Pulsuum profert inæqualitates, cum syncope absque causa, addita quinetiam palpitatio si adit materia: absque palpitatio vero, cum desit materia, idcirco noxias istas causas in aliis propinquis cordis partibus repeti, facile ex hoc dignoscemus, vel quod careant syncope, vel si adit, nec erit frequens, nec valida

nec tandem absque manifesta causa, imo vero cum ea cunctis cognita & percepta. Hujus rei multa proferri possunt exempla, quorum primum ex *Antipatro* desumimus, qui omnem habuit in Pulsu inaequalitatem, absque frequentis syncope, ob laeves arterias laesas, a. est alterius, de quo Observat. ex *Hollerio*. 3. est *Dodoni*, qui ex omnes arteriarum affectu eodem vult fieri Pulsus, quos veneraliorum cordis affectio generat, sed absque syncope, cum palpitatione tamen, cujus fidem facit historia ab eodem conicripa. Vide Observat. Ex quo & aliis consimilibus casibus, patet, Magnae arteriae callos, tumores insignes, obstructionesve, Interruptos Inaequalisque omnis generis Pulsus proferre, cum cordis palpitacione: Eodem vero affectus in vena arteriosa omnia haec praestare, palpitacione excepta, Id quod mihi quoque propria constat experientia & exemplo *Calceolari*, cujus vide historiam inferius.

Sic ergo loci affecti in genere & affectiones sunt distinguenda.

Causae vero aequae morbi in specie, qui gravitatem, obstructionem vel compressionem faciunt, ita inter se discerni debent, Nam si fuerit sola materia absque tumore, Pulsus erit inaequalis, inordinatus: Si fuerit tumor aliquid, erit ordinatus stabilisque, propterea & *Galeno* *Hidum* vocatus. Rursum si tumor non adit, sed tantum materia, si quidem vaporosa fuerit, cito accedit & recedit omnis Pulsuum Inaequalitas, neque interrupta est sed tancum dispar: Si vero *ampullosa* fuerit, diutius permanet, Pulsusque interruptus, pro sui copia ac crassitie potest efficere, Imo vero ejusdem materiae copiam ex disparitatis in-

terruptionisque modo discernemus: Etenim qui interrupti, aequi sunt languidi in principio ac fine, valde onerati ostendunt facilitatem, qui in fine tantum, minus: qui in principio magis quam in fine, omnium minime: Materies vero acque tumorum species sic distinguimus; nam materia, aut tumor calidus, pulsus simul proferit aliquando celeriores, majores, aut saltem crebriores; frigidas vero oppositos: Idcirco cum calidis plerumque febris erit comitens, cum frigidis nequaquam. Et cum materia, ut diximus, Pulsus inconstans erit, cum tumore vero, firmus hodicus ac constans.

Sed ambigit quispian, an ex Inaequali pulsu, per omnes arterias, cum magnitudine, celeritate, ac crebriate stabili, ordinata, aequae cum syncope, possimus inferre Cor primario tumore calido, inflammatione scilicet aut erysipelate laborare, Ex *Galeno* enim 5. de loc. a. & 3. de praeg. ex Pulsibus 8. Cor non potest inflammatione vel erysipelate tantari quin prius animal intereat? Itaque non videtur valere consequentia nostra, Pulsus est in omnibus arteriis inaequalis, hodicus, cum celeritate, magnitudine, ordinatus, ergo calidum cordis tumorem significat. Respondet verum esse *Galeni* sententiam de maximis cordis tumoribus, quod totum illius substantiam occupant, non de illis qui unam duarum ejus partem tenent, Docuit quippe experientia, ex multiplici lectione cadaverum comparata, cor, dum vivente homine, abscessus alicuique sustinuisse: at vero si abscessus, ergo & inflammationes quae abscessus praecedunt, Exemplis pulsum obvia sunt: haec semper potius experientiae quam auctoritati adhaerendum;

APPENDIX.

Pulsus inaequales in integra valetudine fruentibus aliquando accidunt.

EX casibus Observat. superioribus allatis, apparet magnae arteriae callos, tumores insignes, obstructionesve, interruptos inaequalisque omnis generis Pulsus proferre, cum cordis palpitacione: Eodem vero affectus in vena arteriosa omnia haec praestare, palpitacione excepta. Id quoque mihi propria constat experientia, *Calceolari* cuiusdam *Paravini*, septuagenarii, qui multos jam annos pulsus habet inaequales, illis omnino similes quos refert *Galenus* Antipatrum habuisse, absque palpitacione tamen: Imo vero usque adeo integra fructum valetudine ut omnia obire munia possit. Hoc vero admiratione dignum hunc tunc primum inaequalitatem hanc amittere cum febribus detinetur: febre autem recedente eandem statim recuperare. *Saxonia l. e.* Experientiae huic mea accedat, Sub mea cura est ab octennio Nobil. Matrona, Dom. Favre, jam octogenaria, aethmati cum cordis palpitacione in juvenute obnoxia. Illi similiter Pulsus inaequalis est continuo, inaequalitate systematica, intermissus, intercurrent, imo saepe intermittens; alias pro aetate, si crurum infirmitatem excipias, robustissima; quanquam hydropse ascite, aethmati complicato, affecta fuerit ante tres annos, cura autem nostra liberata: Alteram huic adjungo, Matronam Clarissimam, & officio fimbriarum denticularum argentearum tota Europa celeberrimam, Dom. Andriou, alias *Perdreau*, mulierem sagacissimam, sexagesimum quartum annum praetergressam, sat firmae valetudinis, cui etiamnum Pulsus mire variegatus est, interruptus, intermittens, sed sine cordis Palpitacione.

OBSERVATIO XLII.

Pulsus intermittens à corde exulcerato, &c.

Puella annos 14. nata febre prehensa, pulsum fere semper habuit intermittentem, cum tussi sicca, dyspnoea, &c. Mortuae cor albicans visum est, & media sui parte exulcerata & exulcerata, &c. Vide Tit. de *Hemipysy*.

S C H O L I A.

Intermittens De pœhemate hoc distinguere oportet, cujus due sunt distinctæ fœndi rationes: nam licet quandoque Pulsus intermittat, quoniam cor pro eo tempore à motu cessat, atamen præterea tactu indice Pulsus nonnumquam in carpo incedere videtur, dum cor in pectore celeriter ac incessanter (ut fit in Tremore ejus) vibrare sentitur, cujus causam esse suspicor, quod urgente illa cordis passione sanguinis portio tantum per exigua quaque systole in Aortam projicitur: quare hæc inanitas & flacciditas, atque læticia promovenda carens, ne frustra sæpius agat, contractionem suam quandoque intermitit. Pariter hoc fieri videtur ac circa navem exonerandam, videlicet tempore merces difficiliter & impeditè admodum deponuntur, bajulatores expostantur itum & redituum vices quasdam prætereunt. Porro in febribus malignis aut funestis, si quando Pulsus creber & debilis sit, etiam se subinde intermitit. Cujus ratio est, non quod cor à motu interitum cessat (hoc enim tunc læpimè indefinenter laborat) sed quatenus sanguis non uberi satis peno quaque systole in aortam profertur, quare hæc opere satis agenda carens, nonnumquam citatur.

Verum insuper Pulsus quandoque intermitit, quia cordis ipsius contractio pro vice quadam suspenditur, sive pausæ ejus duplo longior exsistit, quod quidem manu pectori adnota quâpiam in seipso aut alio faciliè deprehendat, imò laborantes per gravamen pectoris & oppressionem plane in se peritiant, quoties cor à motu cessat: Porro hæc affectio non iam languidos, moribundos aut periculose laborantes, quum satis validos & quoad plurima recte habentes pulsus interit: quare non semper, juxta vulgi opinionem, pro morbo aut signo peripetioso admodum, aut valde fontico sumi debet: Hinc obdoli plerumque etiam vertigine, cephalalgia aut pœhematis ipsamodici molestati solent: Cæterum ille cordis defectus quoad typum varius est, nam intermissionum periodi modo sunt certæ & ad Pulsus vicem quandam, post 3-4-5, aliamve aut crebriorem aut rariorem, determinatæ: modo incerta sunt ac vagæ, ut cessatio per pulsus jam pauciores, mox plures contingat: Arteriarum vibrationes dum concitantur satis valide sive fortes existunt, & plerumque sunt æquales: quandoque tamen pulsatio prima post intermissionem maxima est,

quæ succedit paulo minor, ac ita sensum minuantur, donec intermissio repetat, dein postea pulsus magnus incipiens, quasi per scalam rursus ad deorsum descendit.

Novi quosdam Pulsu intermittente semper prædictas nullo non tempore arteriam tangens, ita habuisse deprehenderem, interim ut illi satis sani vili de nulla alia ægritudine quærentur: atamen quosdam alios adverti tantummodo cum adfuit, vel immineret, cephalalgia immanis, aut capitis affectio quæpiam gravior, etiam pulsum folio rariorem & intermitentem habuisse.

Ex his constare arbitror pœhematis modo descripti causam; sive rationem formalem, non à sanguinis missione aut crasi, sed tantum ab irregulari spirituum animalium & cerebelli in nervos cardiacos, indeque in tendines, cordis dispensatione pendere. Enimvero suspicari fas est propter nervos istos nonnihil obstruètos, spiritus animales hand pleno satis alveo, aut influxu ad musculi hujus tendines dependere: quare cum penus eorum nonnihil deficit, cordis motus pro unico pulsu inbide desit, donec spirituum copia mox denuo instauratur, actio ejus redintegrari possit. Ita videmus Molendinum à rivo per caiguo circumactum, lymphâ interdum sublidere & penè exhaustâ subsistere, & deinde mox cum alio gereret aquatum cumulos, cicuius sors repetere.

Quorum Pulsus ex se magnus & satis fortis intermittere solet, illi non tantum cephalalgia & affectibus Venigignosis, sed plerumque etiam incubo, & non raro Apoplexiæ obnoxii degunt, nam si comigerit nervos cardiacos, prius non satis aptos & expeditos, postea in totum obtuli, propterea necesse est Corde (quod primus Elater est) immobili fixo, corporis animæ machinam mox totam à motu, & consensu, quæret à vira cessare.

Quamvis affectio hæc præsentè incommodo aut periculo sape carnis, præproprietatem causationem non exigat, atamen præterventionis gratia, ut morbi graviores insequantur, remedia adhiberi debent, ut quantum fieri possit morbidæ quævis seminat in intra 12-24-36-48-60-72-96-120-144-168-192-216-240-264-288-312-336-360-384-408-432-456-480-504-528-552-576-600-624-648-672-696-720-744-768-792-816-840-864-888-912-936-960-984-1008-1032-1056-1080-1104-1128-1152-1176-1200-1224-1248-1272-1296-1320-1344-1368-1392-1416-1440-1464-1488-1512-1536-1560-1584-1608-1632-1656-1680-1704-1728-1752-1776-1800-1824-1848-1872-1896-1920-1944-1968-1992-2016-2040-2064-2088-2112-2136-2160-2184-2208-2232-2256-2280-2304-2328-2352-2376-2400-2424-2448-2472-2496-2520-2544-2568-2592-2616-2640-2664-2688-2712-2736-2760-2784-2808-2832-2856-2880-2904-2928-2952-2976-3000-3024-3048-3072-3096-3120-3144-3168-3192-3216-3240-3264-3288-3312-3336-3360-3384-3408-3432-3456-3480-3504-3528-3552-3576-3600-3624-3648-3672-3696-3720-3744-3768-3792-3816-3840-3864-3888-3912-3936-3960-3984-4008-4032-4056-4080-4104-4128-4152-4176-4200-4224-4248-4272-4296-4320-4344-4368-4392-4416-4440-4464-4488-4512-4536-4560-4584-4608-4632-4656-4680-4704-4728-4752-4776-4800-4824-4848-4872-4896-4920-4944-4968-4992-5016-5040-5064-5088-5112-5136-5160-5184-5208-5232-5256-5280-5304-5328-5352-5376-5400-5424-5448-5472-5496-5520-5544-5568-5592-5616-5640-5664-5688-5712-5736-5760-5784-5808-5832-5856-5880-5904-5928-5952-5976-6000-6024-6048-6072-6096-6120-6144-6168-6192-6216-6240-6264-6288-6312-6336-6360-6384-6408-6432-6456-6480-6504-6528-6552-6576-6600-6624-6648-6672-6696-6720-6744-6768-6792-6816-6840-6864-6888-6912-6936-6960-6984-7008-7032-7056-7080-7104-7128-7152-7176-7200-7224-7248-7272-7296-7320-7344-7368-7392-7416-7440-7464-7488-7512-7536-7560-7584-7608-7632-7656-7680-7704-7728-7752-7776-7800-7824-7848-7872-7896-7920-7944-7968-7992-8016-8040-8064-8088-8112-8136-8160-8184-8208-8232-8256-8280-8304-8328-8352-8376-8400-8424-8448-8472-8496-8520-8544-8568-8592-8616-8640-8664-8688-8712-8736-8760-8784-8808-8832-8856-8880-8904-8928-8952-8976-9000-9024-9048-9072-9096-9120-9144-9168-9192-9216-9240-9264-9288-9312-9336-9360-9384-9408-9432-9456-9480-9504-9528-9552-9576-9600-9624-9648-9672-9696-9720-9744-9768-9792-9816-9840-9864-9888-9912-9936-9960-9984-10000-10024-10048-10072-10096-10120-10144-10168-10192-10216-10240-10264-10288-10312-10336-10360-10384-10408-10432-10456-10480-10504-10528-10552-10576-10600-10624-10648-10672-10696-10720-10744-10768-10792-10816-10840-10864-10888-10912-10936-10960-10984-11008-11032-11056-11080-11104-11128-11152-11176-11200-11224-11248-11272-11296-11320-11344-11368-11392-11416-11440-11464-11488-11512-11536-11560-11584-11608-11632-11656-11680-11704-11728-11752-11776-11800-11824-11848-11872-11896-11920-11944-11968-11992-12016-12040-12064-12088-12112-12136-12160-12184-12208-12232-12256-12280-12304-12328-12352-12376-12400-12424-12448-12472-12496-12520-12544-12568-12592-12616-12640-12664-12688-12712-12736-12760-12784-12808-12832-12856-12880-12904-12928-12952-12976-13000-13024-13048-13072-13096-13120-13144-13168-13192-13216-13240-13264-13288-13312-13336-13360-13384-13408-13432-13456-13480-13504-13528-13552-13576-13600-13624-13648-13672-13696-13720-13744-13768-13792-13816-13840-13864-13888-13912-13936-13960-13984-14008-14032-14056-14080-14104-14128-14152-14176-14200-14224-14248-14272-14296-14320-14344-14368-14392-14416-14440-14464-14488-14512-14536-14560-14584-14608-14632-14656-14680-14704-14728-14752-14776-14800-14824-14848-14872-14896-14920-14944-14968-14992-15016-15040-15064-15088-15112-15136-15160-15184-15208-15232-15256-15280-15304-15328-15352-15376-15400-15424-15448-15472-15496-15520-15544-15568-15592-15616-15640-15664-15688-15712-15736-15760-15784-15808-15832-15856-15880-15904-15928-15952-15976-16000-16024-16048-16072-16096-16120-16144-16168-16192-16216-16240-16264-16288-16312-16336-16360-16384-16408-16432-16456-16480-16504-16528-16552-16576-16600-16624-16648-16672-16696-16720-16744-16768-16792-16816-16840-16864-16888-16912-16936-16960-16984-17008-17032-17056-17080-17104-17128-17152-17176-17200-17224-17248-17272-17296-17320-17344-17368-17392-17416-17440-17464-17488-17512-17536-17560-17584-17608-17632-17656-17680-17704-17728-17752-17776-17800-17824-17848-17872-17896-17920-17944-17968-17992-18016-18040-18064-18088-18112-18136-18160-18184-18208-18232-18256-18280-18304-18328-18352-18376-18400-18424-18448-18472-18496-18520-18544-18568-18592-18616-18640-18664-18688-18712-18736-18760-18784-18808-18832-18856-18880-18904-18928-18952-18976-19000-19024-19048-19072-19096-19120-19144-19168-19192-19216-19240-19264-19288-19312-19336-19360-19384-19408-19432-19456-19480-19504-19528-19552-19576-19600-19624-19648-19672-19696-19720-19744-19768-19792-19816-19840-19864-19888-19912-19936-19960-19984-20000-20024-20048-20072-20096-20120-20144-20168-20192-20216-20240-20264-20288-20312-20336-20360-20384-20408-20432-20456-20480-20504-20528-20552-20576-20600-20624-20648-20672-20696-20720-20744-20768-20792-20816-20840-20864-20888-20912-20936-20960-20984-21008-21032-21056-21080-21104-21128-21152-21176-21200-21224-21248-21272-21296-21320-21344-21368-21392-21416-21440-21464-21488-21512-21536-21560-21584-21608-21632-21656-21680-21704-21728-21752-21776-21800-21824-21848-21872-21896-21920-21944-21968-21992-22016-22040-22064-22088-22112-22136-22160-22184-22208-22232-22256-22280-22304-22328-22352-22376-22400-22424-22448-22472-22496-22520-22544-22568-22592-22616-22640-22664-22688-22712-22736-22760-22784-22808-22832-22856-22880-22904-22928-22952-22976-23000-23024-23048-23072-23096-23120-23144-23168-23192-23216-23240-23264-23288-23312-23336-23360-23384-23408-23432-23456-23480-23504-23528-23552-23576-23600-23624-23648-23672-23696-23720-23744-23768-23792-23816-23840-23864-23888-23912-23936-23960-23984-24008-24032-24056-24080-24104-24128-24152-24176-24200-24224-24248-24272-24296-24320-24344-24368-24392-24416-24440-24464-24488-24512-24536-24560-24584-24608-24632-24656-24680-24704-24728-24752-24776-24800-24824-24848-24872-24896-24920-24944-24968-24992-25016-25040-25064-25088-25112-25136-25160-25184-25208-25232-25256-25280-25304-25328-25352-25376-25400-25424-25448-25472-25496-25520-25544-25568-25592-25616-25640-25664-25688-25712-25736-25760-25784-25808-25832-25856-25880-25904-25928-25952-25976-26000-26024-26048-26072-26096-26120-26144-26168-26192-26216-26240-26264-26288-26312-26336-26360-26384-26408-26432-26456-26480-26504-26528-26552-26576-26600-26624-26648-26672-26696-26720-26744-26768-26792-26816-26840-26864-26888-26912-26936-26960-26984-27008-27032-27056-27080-27104-27128-27152-27176-27200-27224-27248-27272-27296-27320-27344-27368-27392-27416-27440-27464-27488-27512-27536-27560-27584-27608-27632-27656-27680-27704-27728-27752-27776-27800-27824-27848-27872-27896-27920-27944-27968-27992-28016-28040-28064-28088-28112-28136-28160-28184-28208-28232-28256-28280-28304-28328-28352-28376-28400-28424-28448-28472-28496-28520-28544-28568-28592-28616-28640-28664-28688-28712-28736-28760-28784-28808-28832-28856-28880-28904-28928-28952-28976-29000-29024-29048-29072-29096-29120-29144-29168-29192-29216-29240-29264-29288-29312-29336-29360-29384-29408-29432-29456-29480-29504-29528-29552-29576-29600-29624-29648-29672-29696-29720-29744-29768-29792-29816-29840-29864-29888-29912-29936-29960-29984-30000-30024-30048-30072-30096-30120-30144-30168-30192-30216-30240-30264-30288-30312-30336-30360-30384-30408-30432-30456-30480-30504-30528-30552-30576-30600-30624-30648-30672-30696-30720-30744-30768-30792-30816-30840-30864-30888-30912-30936-30960-30984-31008-31032-31056-31080-31104-31128-31152-31176-31200-31224-31248-31272-31296-31320-31344-31368-31392-31416-31440-31464-31488-31512-31536-31560-31584-31608-31632-31656-31680-31704-31728-31752-31776-31800-31824-31848-31872-31896-31920-31944-31968-31992-32016-32040-32064-32088-32112-32136-32160-32184-32208-32232-32256-32280-32304-32328-32352-32376-32400-32424-32448-32472-32496-32520-32544-32568-32592-32616-32640-32664-32688-32712-32736-32760-32784-32808-32832-32856-32880-32904-32928-32952-32976-33000-33024-33048-33072-33096-33120-33144-33168-33192-33216-33240-33264-33288-33312-33336-33360-33384-33408-33432-33456-33480-33504-33528-33552-33576-33600-33624-33648-33672-33696-33720-33744-33768-33792-33816-33840-33864-33888-33912-33936-33960-33984-34008-34032-34056-34080-34104-34128-34152-34176-34200-34224-34248-34272-34296-34320-34344-34368-34392-34416-34440-34464-34488-34512-34536-34560-34584-34608-34632-34656-34680-34704-34728-34752-34776-34800-34824-34848-34872-34896-34920-34944-34968-34992-35016-35040-35064-35088-35112-35136-35160-35184-35208-35232-35256-35280-35304-35328-35352-35376-35400-35424-35448-35472-35496-35520-35544-35568-35592-35616-35640-35664-35688-35712-35736-35760-35784-35808-35832-35856-35880-35904-35928-35952-35976-36000-36024-36048-36072-36096-36120-36144-36168-36192-36216-36240-36264-36288-36312-36336-36360-36384-36408-36432-36456-36480-36504-36528-36552-36576-36600-36624-36648-36672-36696-36720-36744-36768-36792-36816-36840-36864-36888-36912-36936-36960-36984-37008-37032-37056-37080-37104-37128-37152-37176-37200-37224-37248-37272-37296-37320-37344-37368-37392-37416-37440-37464-37488-37512-37536-37560-37584-37608-37632-37656-37680-37704-37728-37752-37776-37800-37824-37848-37872-37896-37920-37944-37968-37992-38016-38040-38064-38088-38112-38136-38160-38184-38208-38232-38256-38280-38304-38328-38352-38376-38400-38424-38448-38472-38496-38520-38544-38568-38592-38616-38640-38664-38688-38712-38736-38760-38784-38808-38832-38856-38880-38904-38928-38952-38976-39000-39024-39048-39072-39096-39120-39144-39168-39192-39216-39240-39264-39288-39312-39336-39360-39384-39408-39432-39456-39480-39504-39528-39552-39576-39600-39624-39648-39672-39696-39720-39744-39768-39792-39816-39840-39864-39888-39912-39936-39960-39984-40000-40024-40048-40072-40096-40120-40144-40168-40192-40216-40240-40264-40288-40312-40336-40360-40384-40408-40432-40456-40480-40504-40528-40552-40576-40600-40624-40648-40672-40696-40720-40744-40768-40792-40816-40840-40864-40888-40912-40936-40960-40984-41008-41032-41056-41080-41104-41128-41152-41176-41200-41224-41248-41272-41296-41320-41344-41368-41392-41416-41440-41464-41488-41512-41536-41560-41584-41608-41632-41656-41680-41704-41728-41752-41776-41800-41824-41848-41872-41896-41920-41944-41968-41992-42016-42040-42064-42088-42112-42136-42160-42184-42208-42232-42256-42280-42304-42328-42352-42376-42400-42424-42448-42472-42496-42520-42544-42568-42592-42616-42640-42664-42688-42712-42736-42760-42784-42808-42832-42856-42880-42904-42928-42952-42976-43000-43024-43048-43072-43096-43120-43144-43168-43192-43216-43240-43264-43288-43312-43336-43360-43384-43408-43432-43456-43480-43504-43528-43552-43576-43600-43624-43648-43672-43696-43720-43744-43768-43792-43816-43840-43864-43888-43912-43936-43960-43984-44008-44032-44056-44080-44104-44128-44152-44176-44200-44224-44248-44272-44296-44320-44344-44368-44392-44416-44440-44464-44488-44512-44536-44560-44584-44608-44632

mortem instantem minaretur, modo v. gerior recue-
rebat, ut sanorum similis videretur, quo sepius re-
perito, tertio demum die serio defuit & pulsus &
vix: Alios vidi chronico morbo enervatos, tribus
ante mortem diebus pulsus prorsus carentes: Febre
maligna quidam æstuans, toto ferme morbi cursu
pulsu destituta r. r. perituro recurrente, quem xiii.

demum die sustulit fari necessitas: nempe maligni-
tate ita sopiuntur sensus sanguisque, ut nullo ad æ-
terius Pulsu ferantur: In mortis vero confinio san-
guis, vel in corde vi caloris grauifecit ut illuc
non possit, vel deficiens, arteriis relictis, cordi
auticulisque movendis vix sufficiat. *Bartholinus
semper. 4. hyst. 42.*

OBSERVATIO XLIV.

Pulsus intermittens à calculo obfidente arteriam aortam juxta renes.

Iuvenis incidit in vehementem cordis palpitationem, &c. quibus accessere Pulsus inter-
mittens, &c. Prope renem sinistram dedit se nobis in conspectum inauditum calculi
genus, quod, à loco cui infedit, vocare lubet arteriale: infidebat quippe firmiter illi arte-
riæ aortæ ramo, qui vergit ad glandulam Eustachii, sinistro reni impostam, &c. *Vide Tit. de
Palpitatione cordis.*

S C H O L I A.

Inventum calculi genus, *Gr.*) Imo à calculis & ste-
nullis circa renes recentis, & conatu naturæ in iis
excernendis Pulsus intermissionem contigisse, qui-
bus exclusus ad pristinum tenorem redierit, notat
Bartholinus hystor. 17. centur. v. Unde infer hujusmo-
di intermissionem errori Medico esse non debere.
Hinc recte *Hallerus* de colico dolore in scholis, vi-

res ex pulsu non esse colligendas in magnis dolori-
bus, qui cum solet esse admodum parvus. *Screniff.*
Princeps Anhaltinus Ludovicus, referente Rolfin-
gio *Meth. med. spec. 1. 3. c. 11.* calculosus ex renibus,
hypochondiacus, asthma sicco laborans, Pulsum
à primis pueritæ incurabilis habebat intermittem-
tem quasi connotum.

OBSERVATIO XLV.

Asphyxia à cordis vasis majoribus sanguine concreto repletis.

Vidit Guido Patinus Facultatis Medicæ Parisiensis Decanus meritisissimus, &c. Virum
diutius asphyxia laborantem, in cujus cadavere dissecto cordis magna vasa sanguine
concreto erant repleta. *Th. Bartholinus Tract. de lacteâ Thoracicâ cap. 14.*

S C H O L I A.

Concretionis illius sanguinis causam refert in
humoris, quo dilui debet, defectum, atque
asphyxiæ obstructus thoracis lactis induci credit.
Variozum, *ingui*, affectuum generationem facilem
& expeditam nuper iuventutis lactis thoracis pro-
palans, &c. *§. iv.* Pulsuum mutationes cito sumpto,
qui dignosci à Medico prudenti, idcirco debent. Imo
pulsus interceptio in asphyxia obstructis his thora-
cicis inducitur, unde sanguis, coctus alioquin, hu-
more necessario dilui nequit. Hinc vidit G. Pati-

nus, &c. Sepius id quoque observari in subitò de-
mortuis cadaveribus passim à me dissectis. Panarol-
lus in febri ardentissima mortuo vidit cor torrefac-
tum pyri tolli instar, absque ulla pericardii aqua,
unde febricitantes & poru indigent & eundem ap-
petunt: Isdem lactis obstructus sine dubio animi
deliquio occubuit *Rob. de Meris* apud Sænetum, cujus
ventriculi cordis coagulato sanguine scatebant,
&c. *Vide infra Observ. 4.*

ANATOMIÆ PRACTICÆ
LIBRI SECVNDI
SECTIO X.

De Leipothymia, Syncope.

OBSERVATIO I.

Syncope à corde sanie obfiso.

Lucas Alantsea, civis & Bishopola Viennensis, cum subito ex syncope anno 1522. obijisset,
lapertum est ejus pectus, atque inventa est pishquam media pars cordis saniosa & pu-
tredine absumpta in hunc modum: Quæ certe putrefactio in exiguo tempore tam validum
membrum consumere adeo non potuit, sed necessarium est diuturnam perstitisse prin-
cipium

quam tam nobile membrum, fortissimis & durissimis villis constans, adeo evinceretur: Hic eo anno quo obiit, multa & crebra passus est animi deliquia: *Matthias Cernax cap. ultimo sua historia.*

S C H O L I A.

Cor ipsam & potedinem & apostemata petere posse aliquandiu, testimonio *24. m. m. m.* ostendit, *Qui in anatomia sua, cap. de corde, de fœcale Mercatorem quendam Venetiis, ex vulnere capitis mortuum, testatur, in cujus corde, cum obiter thoracis partes percuteretur, reperit præter omnium opinionem alios, seu apostema, in ipsa auricula & substantia cordis, magnitudine ovi gallinæ, quem tandem cerro compexit, habita diligenti investigatione apud demortui familiares, quod in vita nunquam de corde fuerit conquisitus: Sed non incon-*

einne fortassis aliquis inferre possit Venetum mercatorem immenon ab animi deliquiis fuisse, quoniam recentior lux, & non perinde magne putredo illum cor invaserat: Cætem verò Vicinierem ideo crebras syncopas perpeffum, & hinc extinctum, magna putredine cor urgente & ad exitum viam impelleret: Hæc à me dicta sunt, ut caudidus Lector agnoscat multa præter opinionem veterum contingere, multa novum aliquando moliri nobis incredibilia, nedum incognita, vera tamen. idem.

OBSERVATIO II.

Syncope ab ulceribus sinistram cordis auriculam exedentibus.

Puero trimo ferebatur ab humido capite tam frequens destillatio in subjectos pulmones, ut præter tussim ac febriculam, contraxerit inde summam spiritus difficultatem, profundum soporem, & tam frequens animi deliquium, ut tandem repente migraverit è vita.

Qua defunctus, obtulit Medicorum oculis pectus aqua refectum, & pulmones non tantum flaccidos, sed sinistram cordis auriculam variis ulceribus excexam: à quorum eructante fœtore defecit proculdubio frequens animus ipsi.

S C H O L I A.

Cordis deliquium etiam aliis ex simili causa vidimus contingere: sed præcipue quidam luxi, quem propterea pusillanimitas visuperaverat qui cum ipso veritabantur nebulones. Sed videmus hic evidenter non oportere ad insensibilem horum ulcerum dispo-

*tionem, referre repentinis illas mortes de quibus loquitur *Thyphoratus* inquitens, Qui exolvantur sæpe ac vehementer, sine evidenti causa, repente moriuntur: aph. 41. section. 2. *Nihilum Talium lib. ij. cap. xvj.**

OBSERVATIO III.

Leipothymia inducitur à grumo sanguinis in sinistro cordis ventriculo.

Nobilis mulier frequenter animo deficiebatur: Omnibus remediis magnam & malignam vim morbi opugnantibus consulebatur: Aperto cadavere, in sinistro cordis ventriculo repertus est exiguus quidam grumus sanguinis qui ibi concreverat, hinc repentinæ mortis occasio. *Ballonius Paradigmat. x.*

OBSERVATIO IV.

Syncope à nigro concretoque sanguine in dextro cordis ventriculo, ejusque auricula, Et nigro crassoque in sinistro.

Wilhelmi Roberti de Marca, Principis Bullionei famulus quidam, jejunos in subitaneum animi deliquium præcipitatus, eodemque oppressus mox interit, qui ante de nullo malo questus fuerat.

In cujus Anatome dexter cordis ventriculus, simul cum auricula ejusdem, nigro; crasso coagulatoque aut thrombofo sanguine, multoque statu distentus apparuit. Quin & in sinistro sinu non rorsus floridusque, aut ex rubro flavescens sanguis, qualis arteriarum esse solet, sed nigricans quoque crassusque copiosus scife obtulit: Qua sanguinis cacochymia & crassitie vitalis spiritus suffocatus fuisse videtur. *Heur. Smetius Miscellan. lib. x. p. 542.*

S C H O L I A.

Thrombofo sanguine etc.) De hac Syncope specie *Agli Riolani Encheir. Ann. lib. 3. cap. 8.* Sæpe meminit, *an*, & præ se fert speciem Apoplexiæ, sed sine sterore, nec relinquens post se paralylin: Si ærius fortiter recurret, tandem cor obruit & suffocat, non tantum ob interceptum sanguinis exitum, ex plenitudine vasorum, sed ex oppressione cordis ab ali-

qua crassa substantia sanguinis, intra ventriculos cordis impulsâ, quæ alphyziam affert in motu cordis & arteriarum: interdum aphoniam, tandem iperitiam: Hic affectus Germanis æque familiaris ac apoplexiæ, ex æthetico corporis habita, quem tamen non curant exolvere venæ sectione liberali: nec mirum si à tanta sanguinis copia incidant in apoplexiæ vel syn-

Pen: Inde aphor. 42. 2. & explicatio dependet: *Haemorrhia Rulana*: Cur vero ab hujusmodi sanguine concreto, aut corporibus crassius sanguine confusis, Syncopen potius quam apoplexiam, aut vice versa, eveniat, item cur ad haec non semper mors succedat, vide

(scholia ad Observ. 36. sect. 2. l. 1. ex *W. Hoffm.* p. 208. Mortis autem repentinae quae in dicto Roberto de Marca corrigi, causam refert *Ext. Bartholinus tract. de laetis Thowicis*, in harum obftructionem. *Vide ejus hyst. myt.*

OBSERVATIO V.

Animi deliquium à fetido humore in sinistro ventriculo cordis concluso.

Clvis Monspelienfis per triennium melancholia laboraverat hypochondriaca, eaque severissima; quæ tandem acuta febre superveniente hominem è vivis sustulit: Priusquam tamen vitaungeretur, per mensem integrum bis in die levi & fugaci animi deliquilo corripiebatur, cum modico urinae ardore & incredibili meindi desiderio: *Profusa* autem *præputra* tenui & fuxida urina statim ad se redibat.

Dissecto cadavere, totam fere thoracis cavitatem tenui, prærubro & fetidissimo humore oppletam invenimus, nec non cordis sinistram sinum eodem humore plenum: Causam tam frequentis leipothymix, & fugacis stranguix, ad virulentæ materix per sinistram sinum & arterias transfusionem transferendam esse existimavi: quia humoris in thorace contenti, & urinarum, quæ in leipothymia profundeabat, idem erat color, eadem substantia, nec dissimilis fætor. *Andreas Laurentius lib. v. quæst. liij. Anat.*

SCHOLIA.

Profusa urina præputra inde assertam vult *Laurentius* opinionem *Galenus* 4. de loc. cap. 6. qui Empyricum pus per urina vias expurgari statuit, fugientis pulmonis substantia pus, ferique inde in arteriam venosam, ab hac in sinistram cordis venericulum, permeare ab eo in aorta truncum & emulgentes: Objectionem autem, qui fieri possit ut purulenta hæc illuvies per sinistram cordis ventericulum, vitalis spiritus *ætherium*, & officinam, necnon per arterias, ejusdem spiritus conceptacula, salva & integra ægri rebus, expurgari queat, sic solvit, Aliud esse fieri quippiam *seruunt*, aliud *expurgant*, Puris hanc per sinistram sinum transfusionem, si sit critica, si vires consent, fieri sine ægri incommodo, quia retinet & conservat spiritus natura, nonque tantum excludit: At si vires sine debiles, mori in ipsa expurgatione ægri, & eo dissecto, totum sinistram cordis sinum purulentum apparere, quod rudioribus plerumque imponit, qui cordis abscellum fuisse clamitant: Quod & altero firmat exemplo, ex *Hæro* delumpto, mulieris cui intolerabili cruciatu urina purulenta profluebat, in qua mortuus post quartum mensem & dissecta, duo calculi in corde, cum multis abscellibus parvis inventi sunt, renibus integris & vis omnibus minime dictis: Expurgatam ergo aut purulentam illuviem per aortam: Sed notandum cum vena *æthæra* non raro emulgentibus intercedere communioem (de cui-

jus inventionis laude diffensunt Anatomici;) per rarium qui aliquando in ipsam emulgentem interitur, quinquam venisimilis est cum materiam per emulgentes arterias deferri, mediante corde.

Ad virulentæ materix A succo pæocreatico scidiore, per lacteas venas in sanguinem translati, majorem consistentiam accedere, unde minus rarefactis sanguinis pulsus fiat minor, existimat *Rud. Graff Tit. de succo Pancreatico* §. 134.

A quo visio valde excedente Syncopen quandoque produci censet: quod confirmat egregie, exemplo quod *Lac. Rivinus* refert *prax. lux lib. 8. cap. 2.* Puellæ, morte repentina sublata, quæ ab ineunte ætate huic symptomatici erat valde obnoxia, ita ut ex quovis animi pathemate, etiam leviori, in leipothymiam aut syncopen incideret: or & illius puellæ, de qua *Observ. 14.* cujus secto cadavere in arteria magna & vena cava totus sanguis coactus apparuit: De quo (inquit) si quis dubitaverit, meo & aliorum exemplo, liquorem multum acidum in viventis canis venam sensum infundat, observabit non tantum sanguinem inde ita coagulatum & concreverit, ut postea sine ipsius effusione institui possit ulterius sectio, sed ubi ad dextrum cordis ventericulum notabili quantitate pertingit acidus ille liquor, mox carum & subito interire canem.

OBSERVATIO VI.

Leipothymia à frustulo carnis nigrioris in sinistro cordis sinu.

Mulier Clara nomine & genere, Cordis dolore interdum vexabatur, quem Medici à malo ipsius cordis habitu fieri arbitrabantur: Sed cum pluribus jam annis connubio juncta non conciperet, & sterilitatis causam quæreret ac tollere conaretur multis præsidis, ita demum dolor ille cordis increbescere cepit, ut perpetuus fieret: Ex quo sæpius etiam mulier ipsa deficiens *recreari vix poterat*, donec eo jam magis magisque invalescente è medio sublata est.

Cæterum mortuæ corpore inciso, frustulum nigrioris carnis in sinistro cordis ventriculo, supra arteriam, quod mespili formam haberet, inventum est, quod mortis causam fuisse cognovimus. *Berivenium cap. xxxv. de abditis.*

S C H O L I A.

Reserati vires poterat) Car ab assumptis cardiaca tam cito vires resocillensur, causam querit Excell. Th. Bartholinus in lacteis thoracicis, Vires resocillensur, an, cum medicamentis, alimentis, cordialibus lacteis thoracicis recipiunt, vel ex ventriculo, per glandulas lacteas, vel ex oesophago, statimque ad cor deferunt: hinc citissime adeo cordialia, viui potius, acetum & alia hujus census vires resocillant, & subinde intra cibum sumptum sedatur fames, roboraque naturae accedit ob sanum lactem oesophago

conterminatum, & lacteam reliquarum breuem ad cor commensum: Adhuc portiones vuluerat, vel pectorales, mora brevissima & nullissima pervadunt ad cor & pulmones, quoniam per longas venarum ambages non ita suta recta perferantur: Deleteria quoque eadem celeritate cor petunt, ejus aegrotius destruant & spiritus inficiunt: Inefficacia autem cardiacorum in illa muliere, fuit causae morbosae conditio & resiliencia.

OBSERVATIO VII.

Syncope Cardiaca à Verme in sinu cordis dextero aborta.

§. I. **N**Os Vermem mirum in ventriculo cordis innasce vidimus: Cum enim valetudinarium quidam Syncope Cardiaca, Palpitationeque cordis per intervalla quateretur immaniter, savitia mali devictus subito occubuit: Dissecto cadavere, inventus est vermis cordis ventriculo dextero adhærescere, mortuus, nigerrimis magni forma, qui frustra toties tentata praesidia illuserat. *Zacutus prax. adm. admir. lib. ij. cap. cx.*

S C H O L I A.

Vermem ventriculo cordis) Vermes in corde generari multi asserunt *Majors. Hollerius, Cernax, Astruc, Pedemontanus* & alii: *Joh. Hübnerus*, lib. de Pelle, narrat: Principem quendam ex morbi travicia perillisse, cujus cadavere dissecto vermis albus, pericuto rostellis, eoque corneo praeditus, e cordi adhærescere deprehensus sit: Aurius est *Dallmann* l. 7. c. 9. frequenter lumbricos foris ad os ventriculi ascendentes cardiacos affectus & syncopas excitare, ut nonnulli statim, cum à lumbricis roduntur, intereant; unde mors repetitis adultos & infantes opprimit: Vermiculis in corde, & capsula ejus, obnoxia esse virgines ait *Hermannus* Prax. Chymias. cap. cx. Cognosci ex puncturis & doloribus cordis, tum ex lumbricis excretis vel non excretis: Signum diagnosticum esse convulsionem.

Notata praesidia illustrat) Corotationem instituit *Hermannus* l. c. non per cordialia, quae inutilis esse ait, sed per Mercurii vivi purgati & mortificati cum salivae jejunii, vel succo limonum temperati, exhibitionem ad ℥j. cum conserv. ros. ʒij. bezoar. gr. ij. Quod si quis sumere reformidet, infusionem ʒj.

vel ij. in aq. frigida, per noctem, facta colatura, praebet: vel aquam ex capis alliove distillatam ad ʒij. vel ij. lis quidem excretis, sed convulsivorum paroxysmis recurrentibus (quod pathognomonicum ventriculi cordialis) extracta specifice praescribit, allii, raphani sylvestris, naturalis aquae, ad ʒj. ex buidio vel juiculis, praemacerato raphano sylv. Extractorum penuria dentur succi omnium, & pati mensura mitigentur, doctis ad coctilecia duo vel ij. conservant: Efficaces & eorum tales, insitio atqueam convulsiones adfuit, aliquid posse lap. bezoar. dail. à gr. 4. ad ʒ. cum sale tanacet. aut dictamni *Cretici. Richardus Lowius* tract. de Corde, vermes quoque intra ejus, capsulam generari statuit, qui atrophia sua magnas cordis molestias quandoque pariant, cordis tremorem, anxietatem, pulsum incoherenterem, dolorem pungentem & syncopen: Talem symptomatum & animalium curam, cataplasmare & solis ciniae, tanacet. & abynthai vulgaris, aceto acerrimo incoctis, regioni cordis admotis & cum mitchidatio pauco mixtis, bis dissipatam vidisse asserit.

§. 2. Excitatur syncope nonnunquam à vermibus, non solum orificium ventriculi, sed & cor ipsum vellicantibus, ut vult *Mesadus*, qui mortem inde inferri docet: *Scholiographus Hollerius* cap. 29. lib. 1.

§. 3. Vermes cor erodentes intra pericardium gigni certum est, & scordio enecati: De hoc morbo tractavit *Salinus*: Nec absurdum intra cordis ventriculos vermes reperiri qui tamen cavam intra venam geniti eo pervenire. *Riolanus Enchir. Anat. & Path. l. 3. cap. 4.*

OBSERVATIO VIII.

Leipothymia exulcerationem cordis sequuta.

Filia Dom. N. annos xiv. nata, per multos dies laboraverat vomitu pituitoso, cum Cardialgia per intervalla affligente: Item patiebatur dolore in summa scapula sinistra & summitate brachii: Successit febris, à cujus invasione pulsus fere semper fuit intermitteus, nec poterat xgra in sinistrum latus decumbere, quin statim cardialgia & tussi corripere: Die 34. morbi subito correpta est sanguinis spatio, quem per tussim excrevit ad ʒvii. quo redeunte, subito extincta est. Dissecto cadavere, inventus, est pulmo colore albicante, ut & cor, quod media fere sui parte, quà diaphragma respicit, exesum atque exulceratum repertum est. *Vide historiam ject. 5. observ. 21.*

OBSERV.

OBSERVATIO IX.

Syncope ob defectum pericardii.

Discipulum in Romana Academia mortuum sæculi: huic misero juveni pericardium deerat; itaque subinde in syncopen incidebat, subinde mortuo similis conspiciebatur, quo genere morbi cyanimatus est. *Columbus Lib. xv. Anatom.*

OBSERVATIO X.

Animi deliquia à corde extenuato, cum variis partium vitalium & naturalium vitiis.

Cadaver dissecaimus in quo repertus pulmo consumptus, thoracis cavitas plena sanguine putrido & concreto, in pericardio plusquam mensura puris albi contrinebatur, tota cordis superficies absumpsa erat & putrida, extenuatumque admodum cor: hepar usque adeo magnum ut infra umbilicum descenderet, rotam anteriorem hypogastrii partem occupans: Symptomata quibus vexabatur erant tussis, febricula, dolor in thorace, & in anteriore ventris parte, dyspnœa, paucis diebus ante mortem Deliquia animi: *Ex Observat. Iohannis Banhini.*

OBSERVATIO XI.

Anatome juvenis crebris Leipothymias tentati, cujus Cor magnitudinis insignis deprehensum &c.

Nic. à Sonnevelt circa xij. ætatis annum, ex febre quadam acuta evadens aliquandiu valerudinarius vixit: circa xx. annum in crebras cordis anxietates incidit, postea in Leipothymias, tandem è vita decessit: Thorace aperto inventum fuit cor bovino non multo minus, quippe communem magnitudinem quater circiter excedebat: In villis septi intermedii tres calculi reperiebantur. *Vide tit. de l'algustatione cordis.*

OBSERVATIO XII.

Animi creberrima defectio ob putrem & fatidum humorem intra pericardium contentum.

Si sine manifesta causa exolvantur quidam, vel defectum animi patiantur, & frequenter & fortiter, statim moriuntur: quoniam & his vitale robur valde inbecillum est: Ideo facile quibuslibet de causis exolvuntur, & propterea decrepente moriuntur, Impedit enim cordis actionem moles quædam sparsa, id est, humidum vel siccum ipsi cordi incumbens, Cum autem quaereretur causa (ut testatur Galenus) in dissectione corporis, inventa est tunica quardam superjacens ipsi cordi, plena humiditate quadam fædi odoris: quæ quidam humiditas viciosa illa qualitate corrumpbat semper, & destruebat robur vitale, & hinc oriebat affectus exolutionis. *Philosthenus comment. ad aph. 41. lib. 2.*

OBSERVATIO XIII.

Syncope Pericardii inflammationem sequuta.

§. 1. **C**ausa ob quam Authores de inflammatione septi transversii, membranarum Interseptientium, pericardii, peculiarem non fecerunt commemorarionem, ea est, quoniam, Authore *Avicenna* 10. 3. tract. 4. cap. 1. hæc ipsæ symptomatibus insigniuntur quæ pleuritidem comitari solent, nam hæc partes non solum sunt cordi vicinæ, sed eadem tunica teguntur: Cum hoc tamen stat pericardii inflammationem acutissimum esse morbum ac lethalem, & severissimis obortis symptomatis sæpe ex tempore interficere: Quidam in flore ætatis acuta febre est prehensus, quam comitabatur siccus Ingens, anxietas, thoracis incendium, syncope, animi deliquium, cordis tremor &c. Triduo è vita sublatus est.

Sequitur post mortem palam fecit fuisse pericardii inflammationem lethalem, nam tota fere tunica livida & rugosa visa est, & in multis partibus asperitudines apparuerunt miliaceæ, nigrore quodam infectæ, quæ omnia ab adurenti & retorrido calore fuisse suborta res est manifesta. *Zacutus Praxis aduvis. lib. 1. observat. 138.*

§. 2. Agricola plaustris sæno onusti ruinam in se passus, de doloris sensu in pectore conquisitus est: aliquot elapsis diebus febte corripitur ardente, cum asthmare, delirio, vigiliis, siti maxima, genarum rubore & Leipothymia sibi mutuo succedentibus: xi. vitam finit: Aperto cadavere pericardium scærens pure sanioso repertum, (à prægressa inflammatione) cui velut immersum cor &c. *Vide de Pectoris dolore scil. 3. observ. 4.*

OBSERV.

Syncope Cardiaca à concreto in venis Sanguine.

S. I. Puella xiv. annum agens, cum per diem capitis gravitatem, vertigines & anxietatem passa esset, die sequenti subito extincta est: Cum dubitaretur quo morbo perierit, & an vitio cerebri, an huius synopes merito hoc factum fuerit, secta fuit post mortem, in qua immense cerebrum ab omni affectione p. n. invenimus: Sed in arteria magna, & in vena cava, ita totum sanguinem coalescere vidimus, ut apprehenso illius sanguinis concreti uno principio, totus sanguis coalescens ita integer ex vena & arteria educeretur, perinde ac gladius ex vagina extrahi solet: Quare iudicatum fuit subitam hanc mortem, à sola interceptione & occlusionis venarum, à sanguine coalescente facta, causam fuisse. *P. Salus Diversus de affect. particul. cap. iv.*

SCHOLIA.

A Venarum interceptione & occlusionis affectio letissima, & que subitam mortem sæpe inferre solita sit, emanat: Evenit enim ut sanguinis copia non ad partes, nec ad cerebrum, sed ad vasa interna, scilicet venam cavam & arteriam magnam aliquando affluam intrat, eadem applicando ibi sistitur, firmatque excrementis, & fere extinctis spiritibus coalescat; cujus ratione nativa caliditas, que suffocationis vim, nequeantibus spiritibus per vasa permeare, patitur, fere extinguitur: hincque syncope cardiaca ex ea accedente, nisi præstio remedia admittantur, subita mors subsequatur. De hac syncope cardiaca, genita ob eandem fetenativam caliditatem, ratione sanguinis venas opplentis, & ibidem coalescentis, meminit *Galenus* 4. de rat. v. in acut. Quam tamen viri illi qui singulorum morborum curationes tradere profuerunt, adeo neglectum, ut de ea ne verbum quidem fecerint, cum tamen & ratione periculi & ratione affectionis hoc agere debuissent: Ratione periculi quidem, quoniam imminente subita morte, cum ante agnoscatur & antevertere docere debeant: Ratione autem affectionis, quoniam tuncbatur ad, vertere insulsum hanc caliditatem & a nemine consideratur, scilicet in vena viventi hominis coalescere sanguinem, qui in mortis toler fluida conservari: Ego autem de hac syncope pertractans, & hac diu considerans scilicet de periculo & affectionem, quod periculum dico, Medicum futuram hanc syncope, & imminente subitam mortem, ex duobus præcipue cognoscere posse; quorum primum erit, quod illi patientes, ante caliditatem synopes, perierint nonnunquam præfoculationem quandam, non ad fauces, nec ad partes spirituales superiores, sed in partibus internis, ac si manu eorum ipsum subito contingatur, deficiuntque, ac mutato colore virido in pallidum, cadunt: Cum autem revocatur ab hoc defectu, subsequitur lassitudo magna: Alterum est, quod in his pulsus quandoque accedit intermittens, qui si supra unicam inaequalitatem pulsationem, magnum periculum minatur, significatque synopen hanc inflare: que intermedium, sicut de illa suffocatio, non aliunde generatur quam ex illa sanguinis coalescentis copia, obstruendis ac gravatis vasa illa & partes internas: Hæc duo signa vidi ego in nonnullis quibus, cum prædictum periculum impendens, sectio venæ aliisque remedia oppoterunt, ab imminente discrimine præservati sunt: nonnulli autem alii qui, cum eodem hoc significaverint, remedia venenunt, subito de medio subiaci sunt: Quoad affectionem, auctor & ego, ut *Stephanus* & *Galenus* testimonium, me observasse in nonnullis ita sanguinem in venis & arteriis coalescere,

ut inde & syncope & mors subsequens fuerit, præcipue autem in puella, de qua in historia allata: Alteram vidi juveniculum, cum per mentis fluctuationem expurgaretur, mediæque die æstivo tempore in balneum aque frigide ingressa, & ibi morata fuisset, eadem die post coenam hilariter sumptam, subitam oppetisse mortem, hinc iudicavi ob repressam mentis purgationem, sanguinem, cujus maxime abundabat, ad vasa interna recurrisse, ibique coalescentem, ac venas & arterias una interceptientem, subitam etiam hanc mortem intulisse: In hac dubitatum fuit de veneno, tamen, mea sententia, causa illa protractica fuit: sufficiens ad inferendam mortem; cum novum sanguinem in venis coalescere possit, ad mortemque causandam hoc solum aliquando sufficere. Novæ quidem à venenato pharmaco aliquando sanguinem coalescere in venis, indeque mortem subsequi, sed ab hac syncope differt veneni calus: quia si tale venenum celeriter hominem de mediocritate debet, ante mortem qui venenum assumptum in profundissimum somnum rapitur, qui ingravescente, nec excutitur, nec relinquitur, sed ad mortem, non tamen subitam, prosperat: Si autem ad tempus hoc venenum itam promere debet violentiam, coalescit quidem sanguis, sed non affatim, nec tantum ut omnia vasa intercipiat, imo potius ea, quadam acquiescentia actimonia, aperit, & hinc è natibus hinc emanant sæpe sanguinem adeo concretum, ut digitis solis enim apprehendere, & ad nobilem quantitatem simul unitam extrahunt; talem etiam sæpe ab infestissimis partibus excurrunt, huiusmodi tandem liquato hinc sanguine, à proprioque calore destituto, vitam cum morte commutant, examinamurque a solo sanguinis profluvio, quod ut plurimum è natibus prodire consuevit: Unde patet veneni calum non esse huius syncope consimilem, licet ab utroque mors imminere impendatque, patetque in venis coalescere posse sanguinem: Quod qua ratione fieri possit, cum venæ propriam sint sanguinis conceptaculum, p. o. petiamque sit eis ipsum si idem conservare, non ita facile est explicare: Quam tamen novit qua ratione sanguis ad extra vena concretus, potest eadem cavit ad sanguinem intra venas existentem adaptando, sem ipsum declarare: Sanguis & vena cæcis hac ratione coarctat, quoniam quævis quævis conceptaculo proprio deductus est, statim evanescunt & exhalant ipsi spiritus, & mixta & simul pars ich. uola separatur, quo facto relinquitur huiusmodi conceptaculo, & ita concretis, ut non tantum p. u. & tunc ita sanguinis pars, sed etiam cæteri admissi humores, qui ex sui natura non possunt concretis (hoc enim lo-

lius sanguinis est proprium) una cum sanguine ipso coalescant: Hinc videmus non solum utramque hilem cum sanguine à vena ejectionem concretescere, sed etiam pluviam in ipsam, quæ adeo in sanguinis superficie non unquam concretæ, ut vix gradio inclidi queat, nique hæc & limosa pars sanguinis ei admisceatur, licet concretæ sanguis quomodocunque è vena ejectionis, non tamen ita cito concretæ, nec ita dure coalescit, sicut et consilii quando copiose ei admixti sunt & humores melancholici & pituitosi: Sanguis igitur extra venas eductus, pluribus exanimatis, & eisdem evaporantibus, ac parte ichorosa separata, ob refrigerationem coalescit: Coalescent siquidem & quæ siccantur, & quæ refrigerantur: hic autem non propter siccationem, ut patet causas considerantes, sed propter refrigerationem concretæ, & eo velocius & intensius concretæ, quo ei magis admixti sunt humores frigidiore, crassiores & viscidiores, sicut pluvias & melancholicus humor, quorum ratione incomperiem consequuntur frigidiorem, ad concretendum faciliorem habilitatem & promptitudinem recipit: Hæc autem eadem causæ, cum non tantum in sanguine cava venas, sed etiam in venis existentibus contrahere possunt, clausum erit quæ sanguis aliquando in venis coalescere queat: Evenit enim quandoque ut in sanguine, vel non genita, vel e creta ichorosa parte, viscosi delinunt & abundare facci, qui subitanea crassiores, & frigidi temperie, sanguinem crassiorem & frigidiorem reddunt, qui sanguinem venas internas & majores nonnunquam occupant, adeo replet, ut spiritus intercepti & penetrare non permittens, eos in extinctionem ducat: quibus spiritibus extinctis, sanguis refrigeratur ac concretæ, & una cum ipsa viscosa, qui in ipso dissoluta, & qui cum ad concretendum habilitant & disponunt, lucri, nempe si hinc non parit essent, incoagulatum & naturaliter fufus liquidum redderetur sanguis, quoniam nec extinctionis spirituum causa potius adisset, nec tantæ refrigerationis occasio, ut sanguis possit coalescere: ut ubi hæc mapeant sistanturque, cum nimium caliditatem respuant exinguantque, facilius ac expeditè sanguis ob introductam refrigerationem concretescere poterit: Unde in affectis hoc pacto corporibus, in notatis Galeni, si sanguis detrahatur, is frigidus (quod vix ullus credere queat) crassiusque & vix effluens conspicitur, idque propter huiusmodi refrigerationem. *Salmuthidum.*

Sanguinem coalescere Hinc ob vasorum obstructionem ad cor fluere prohibetur: Locum hic habet inhibitus sanguinis Circulatorio, Cum sanguis in dextro ventriculo vel in alicuius dextenis, & quacunque de causa nec per pulmones, nec per septum cordis commotum liberum habet, refrigeratur arteriis, imo sanguis simul sinistro ventriculo non communicatur:

§. 2. In omnibus morbo cardiaco extinctis cor sanguine lento ac coagulato est plenissimum, quod probat *Adrianus*: in huiusmodi enim hominibus dissectis, non tantum cordis, ventriculi, verum etiam venæ cavæ & arteriæ magnæ trunci, sanguine viscido ac concreto plurimo repleti comprehensi fuerunt, ita ut incisus illis parvis facis oblonga ac unita istius coagulati sanguinis portio extrahi potuerit. *Adrianus Spigelius Epist. ad Gal. Sophierum.*

S C H O L I A.

HUc pertinet causa leipochymix illis supervenientibus, quibus vena secta, soluta demum ligatura, non dum sanguis effluit: unde suspicio adest eam fieri à spirituum effluvio: cohibitus enim, vi ligaturæ, & refrigeratus in manu, cum hæc soluta lumen remitti, cordi occurrentes leipochymiam invehit: sentiant

Concretionis autem sanguinis juxta tenorem Salvianiucci Pancretici, causam sic explicat *Raffinicus* consult. ij. lib. iv. Afflicti sunt, Cor uti similem temperatum, quatenus ejus temperis naturalis calida, ab adventantibus tactis acidis, viscosioribus, biliosis impetitur: Sanguis à cava vena adductus, admixtis heterogeniis hinc vaporibus quasi coagulatus moveri renuit: Spiritus vitales nobiles gelida hac glacie fixati & concretæ, per arterias ad partes non distrahuntur, hinc illæ lacrymæ, ut Dissimulare eidem afflicti cor, cum impacti hi, five halitus five vapores, vel si mavis flatus, viscositate in parietibus cor disacimonia sua acida cor vellicant, ut quasi in medio motu derepente consistere & jam jam succumbere videantur. Causa immediata syncopes est defectus vaporum, sanguinis confluentis impeditus: Medius proximior causa, secundum essentiam consideranda, sunt vapores, halitus, flatusque quantitate & copia multi, qualitate acres, acidi & viscosi, motuque insolentes, ea viscosa humorum intermixta insensibilium coactionem efficiunt: inde ad cor, adeoque ad omnes partes corporis elevati, illademque efficiunt: & refrigerationem sanguinis impediunt: quæprimùm hi regiam cordis aciem copiamque impugnant, refrigerationem thymicam coagulant & figunt, illisque in effusionem impediunt: ut tacitam quæ ex conflictu horum draconum efficiunt, qualicunque viscosam, quæ vel sola ad syncopen inducendam sufficit: Elevantur hi ex pituita, viscida, glutinosa, crassa, quæ succo pancreatice acidiori & acriori confusa, viscosè effervescit & ebullit: inde flatus & vapores generantur, viscidiores ratione pituitæ, acidiore & aciores succi Pancretici & biliratione: Congrediuntur hinc facci & confluent in unum duobus, hinc effervescencia & chylisio, hinc vaporum ad cor ascensus: Vix quibus deferuntur hi vapores & halitus, sunt venæ lacteæ. Afflicti sunt, primi & secundi ordinis: hauriunt hæc cum chylo vapores & vapores illa acida, acris, viscosa, & per venam subclaviam cordi insinuantur &c. *Vide Salmuth ad Observ. 26.*

Sanguis saugor ex vena & arteria educitur &c. *Andr. Spigelius Epist. ad Gal. Sophierum.* affert in omnibus morbo Cardiaco extinctis cor tali sanguine lento ac coagulato esse plenissimum: quod probat partim *Adrianus*: Partim etiam ex pulu parvo & vermiculante, qui in hinc ægis observatur: Sicut & denique diversis partium externarum & internarum effusione, nam in talibus ægis partes externas frigere, Internas & incalere & uti dicit: Hinc deducit causam incombuibilibus cordis *Caspari Germani & Hilderni Zuringii*, vel saltem quod daturus igni resistunt, quia scilicet sanguine quomodocumque viscido, mucoso ac melancholico obliu fuerint: quæ tamen adhibere majore flamma tandem consumi possident.

§. 3. Tribus præcipue modis cordis motum pervertit sanguis 1. in craffatione & coagulatione. 2. abundantia nimia 3. defectu. 1. motus cordis à sanguine alteratur, cum aut ab alieni mixtione, aut propriarum partium fecessione coagulatur & grunefcit, adeo ut viam sibi ipsi & transirum omnino præcludat, prout in peste & veneno aliquando accidit, unde gravissima illa symptomata, cordis anxietas, tremor, palpitatio, pulsus intermissio, & tandem syncope & mors repentina succedunt: Quæ omnia in majore molosso, post injectam libram semis lactis recentis modice calefacti, (experimenti gratia) in venam cruralem, detracta prius pari sanguinis copia, quo lacti recipiendo locus esset, non sine magna commiseratione semel vidi: Vix enim femihora elapsa est, quin maxima præcordiorum anxietate & oppensione cordis, & diaphragmatis summa contentione (pro expediendo sanguinis circuitu) afficiebatur, quin & mox crebra palpitatione, tremore & gravissimis suspiriis succedentibus, tandem inter miserandos plangtus & querelas *Syncope* extinctus est.

In dissecito mox observavi venam cavam, utroque cordis ventriculos, vasa pulmonum atque aortam, lacte cum sanguine penitus concreto impleta, & adeo inter se compactus cum lacte sanguis fuit, ut digitis non ita facile divelli aur separari porerat: Unde similem in peste coagulationem esse non est quod dubitem, cum iisdem proptus signis & symptomatibus se prodant. *Richardus Lower. Traictatus de corde cap. 2. p. 126.*

OBSERVATIO XV.

Syncope à carne excrescentia, inter magna arteria ramum & venæ arterialis radicem suborta.

Quidam in ætate consistente constitutus animi deliquio vexabatur assidue: adhibita plura auxilia quæ status eliderent, nam ita in eo abundabant, ut etiam à somno, superveniente orthopnea, cum strepitu quodam per os erumpent: Sed illa profuere nihil. Tandem ingravescens malo, & accessione oppressus, subito occubuit.

Aperto thorace inventi Pulmones statu distenti: Pericardio dissecito, inter magnæ arteriæ ramum, & venæ arterialis radicem, carne excrescentia dura & concreta, colore nigerrimo reperta, quæ binas fere uncias ponderabat. *Zacharius Præfixi hystor. lib. 2. cap. 8.*

OBSERVATIO XVI.

Syncope à corpore fibroso in aorta contento.

In forma diu asthmatica, & cum cordis palpitatione consistente, tandem Cardiacâ *Syncope* extincta, corpus pituitosum sive fibrosum, ulnæ longitudinem superans, ex aorta extraxi. *Weyferus Dissert. de Apoplexia.*

S C H O L I A.

De generatione ejusmodi corporum, Vide Scholia ad observ. 36. sect. 1. lib. 1. ex eodem Clariſſ. *Weyfer.*

OBSERVATIO XVII.

Syncope ab abscessu in diaphragmatis parte carnosa.

Olim puellæ Leipothymia subita interempræ cadaver dissecantes, in carnosa diaphragmatis parte abscessum magnum, cum cysti, sanie & vesiculis aquosis impletâ reperimus. *Vide lib. 1. tit. de Phrenitide.*

OBSERVATIO XVIII.

§. 1. *Syncope Mediastini inflammationem, Pulmonum & Pericardii sequens.*

NOb. cum febre acuta detineretur & convalliturus speraretur, ex insperato præcedentibus nonnullis *Synopsis* extinguitur. Exsecito inventus est in membranis intersepiens rumor satis notabilis magnitudinis, qui etiam in parte communicabatur pericardio. *Vide tit. de pectoris dolore.*

§. 2. Quidam orthopnoicorum more cubabar, alias supinus quiescens statim animi deliquo corripiebat: Inventæ sunt membranz intersepiens maxime inflammata. *Vide tit. de Dyspnæa.*

§. 3. Inflammationem mediastini vidimus, in qua xget quoties quiescere supinus cupiebat, statim Animi deliquo corripiebat: Eo mortuo membranz intersepiens dictæ maximopere inflammata deprehensæ: *Pamarolus observ. 10. Penter. 2.*

§. 4. Agricola plaustris fœno onusti ruinam in se passus, febre prehenditur &c. Leipothymia succedente Pericardium in defuncto scarebat pure copioso, cui velut immersum cor: Pulmo ejusdem labis particeps. &c. *Vide tit. de pectoris dolore.*

M m m

§. 5. Puellus

§. 5. Puellus 4. annos natus febre continua corripitur, cum dolore lateris & sterni, rufsi ac animi levi defectione. Una pars pulmonis velur stipula ardente deflagraverat. *Vide tit. de Febribus.*

§. 6. Mulier vomitu puri copiam cum defectione animi rejiciebat, vomica ingens in pulmone reperta est. *lib. 3. tit. de vomitu.*

OBSERVATIO XIX.

Leipothymia à Pancreatis abscessu orta.

Mercator apud Medicos conquerabatur, quod cum dormire conaretur in Leipothymiam incideret &c. In ejus cadavere Pancreas duntaxat repertum est abscessu putrefactum &c. *Vide historiam lib. 1. tit. de vigiliis.*

S C H O L I A.

Quoniam ad Synopsin & Leipothymia generationem concurrat Pancreas ostendit Cl. Sylvius de le Ros Pract. lib. 1. cap. 36. ubi de utriusque causis, symptomatibus committitur, accurate agit; unde quodam hac affert volumus: Animi deliqui & Synopses, affectum cognitu explicansque difficultorum productio, sicut vulgo per vitales spiritus traditur, quoniam mihi non satis facti, comhor illam ex causis manifestis, tanquam principis notionibus, gradum & paucis aliter deducere. Observatur ergo consequi 1. certos odores cum gratia, nunciatos. 2. rerum ingratarum cooptatum. 3. ab ingratissimis. 4. ab inedia protracta. 5. à quibusdam animi affectibus, 6. magnas sanguinis effusiones. 7. feminis & humorum per vomitum, sudorem &c. iniectionem cum id sit cum magnis doloribus, corporis agitatione vehementi, 9. confectum factam vacationem aque in hydropicis, aut puris in empyematibus. 10. letum vel morium venenarum. 11. quorundam febrium paroxysmos. 12. dolores quosdam vehementes. 13. nimium corporis motum & defatigationem. 14. ætium summum ab igne, sole, febre, balneo. 15. famem, sive urgeant. 16. in feminis quosdam nimium lactationem; item papillarum dolorum in suctione: Ea committitur autem ac similibus causis, ac his quæ supra proposuimus, diligenter collatis, abstraham omne Animi deliqui deduci debere, proutque ac immediate, ab ipso sanguine ad cor utriusque accedente, atque his omnibus quæ tum secundum, tum p. n. ipsi conjunguntur, & una cum ipso ad cor deferuntur, ipsique effervescentiam naturalem ita turbant & lementant, ut non tantum sanguinis rarefactio minuat, sed cor ipsum non ita expandatur contrahaturque, sanguisque insufficienter in arterias effundatur, ideoque Pulsus minus & languidior, quin aliquando nullus sentitur; Si enim ad Pulsum laudabilem efficiendum requiratur tum 1. Sanguis undique & utriusque ad cordis dextram ventriculum refluens, Tum 2. Biliis ascendens sanguini junctus, Tum 3. Lympha undequaque cum descendente sanguine afflans, Tum 4. Singularis excoctio Biliis, succique Pancreatici & Salivæ in tenui intestino conflans, post sui effervescentiam ortus, & mox per lacteas venas translatus liquor, Tum fortasse 5. Aer inspiratione in Pulmones attractus, & aliqua sui parte sanguini per ipsos circuli admittus, dum in subtegitur mox Expiratione excluditur iterum reliquæ, Tum aliquando 6. Chylus, quamvis non semper is, sed post assumptam denum alimentum propellatur ad cor; Si inquam hæc omnia requirantur ad laudabilem Pulsum efficiendum, atque singula tum adesse tum tunc disposita esse oportet: quod si hoc unum vel plura intorrem, aut ex parte deficiant, aut copia majore adsint, aut aliena qualitate donata eo accedant, vel alia insuper non requirant, ideoque necessario no-

xia simul confluent, contingit dubio procul, præter aliarum in corde fieri solitarum functionum labefactionem, aliqua Pulsus læsio: Pulsus ergo deficienti plus minusve (Nam per Pulsum & minorem & languidiorum Animi deliqui species omnes dignoscuntur, quorum Pulsum causam censeo tum semper Glutinositatem autamiam sanguinis, cæterisque ex ipso secretis Humocibus, Tum simul aliquando Acidiorum autamiam in succo Pancreatico, Lympha & foras ipsa quoque Saliva) in magnitudine ac Robore 1. propter universalem sanguinis defectum post Hæmorrhagiam notabilem, aut inediam diu protractam, unde non tantum deficiet sanguis, verum alii quoque in corpore humores, Biliis, succus Pancreaticus, Lympha & cæteri ad vitalem sanguinis rarefactionem, Pulsumque adeo magnam efficiendum necessarij: Deficiet item in magnitudine, hinc & Robore Pulsus 2. ob Biliis defectum in Alvi fluxu & vomitu enormi, ac præteritum cholera morbo, unde quantitate minore, tandemque foras nulla si ad cor deferatur Biliis, an nilum si minor vel nulla excietur in ipso effervescentia? si minor vel nulla fiat sanguinis rarefactio? si minor vel nulla sequatur ventriculorum cordis tum expansio, tum contractio, pulsusque sentiat vel minor vel nullus? Deficiet item in magnitudine, hinc & Robore Pulsus 3. ob Lymphæ defectum à Sadore nimio, cum quo præter ipsius animales Lympham quoque minui evincere videtur Acids, non minus quam ipsius volatilis, multum sudantes recreantia & resuscitantia: Defectu autem Lymphæ subiacet tum sanguinis consistentia mediocri, tum ejusdem effervescentia deficiente, unde item nec satis carcat in corde, nec hujus Explicatio Complicatioque fieri satis magna, unde Pulsus etiam obieratior necessario naturali minor: Deficiet item in magnitudine, hinc & Robore Pulsus 4. ob Liquoris ex Intellectuali Triumvicatu exurgens Defectum, in vomitu & alvi fluxu molesto, ac iniectione continuo: Hoc enim ex parte, aut in totum excludo, carbit necessario sanguis ejus beneficio: Censuimus autem alibi facere ipsum ad coagulationem naturalem sanguini consilandum: Ea proinde si plus minus detrahatur sanguis, nec hujus defectu reparetur continuo, minus apud eum ad rarefactionem, coarctationem explicandam sanguis, sequensque pulsus necessario minor: Deficiet item in magnitudine, hinc & Robore Pulsus 5. ob Insipiditatem & aciditatem, in oculis, nasum, faciem aut alperæ arteriæ angustia qualionique, ubi quam minori copia accedens aer, dederat sanguini refrigerium, vel quomocumque eodem mutationem suis neque confect: quoniam sanguis propulsus per Pulmones sanguis, nec sufficientem novu ex dextro cordis ventriculo succedenti locum faciens, cordis contractionem impedit, & hæc enim pulsus minoris causa existit: Deficiet item in magnitudine,

rudine, hinc & Robore pulvis 6. ob chyli defectum & in praepoltera inedia, & in alimentorum fermentatione aut Secretione aut Translocatione, aut Translatione, quovis modo impedita. Non tantum ea enumeratorum humorum defectu, verum aliquando Excessu quoque minus & languidiu continget Pulvis: Num primo Plethora impedit ne spaii & loci defectu copiosus in arterias expelli possit sanguis, nec proinde idem in dextro cordis ventriculo valde lassae rarsificationis, cordisque parietes multum explicari autumque complicari queant: Quia 2. Bilia majori copia ad cor delata, in fibrillis ardentibus praesentim, non tantum sanguinem solito magis potenterque rarefacit, cum Pulvis majore ac robustiore, sed postquam ista rarefactione nimia tandem vala multum distendendo, & Plethoram ad vala dictam constitutendo, ipsa ipsorum omnia replevit, uti autorem conservet noxam, non potest tamen loci defectu aequo ut prius Sanguinem deducere, atque pulvis magnum robur tumque producere, qui potius sensim observatur minor & debiliior ob deficientem sanguinis rarefactionem, cordisque ventriculorum explicationem, complicationemque, donec sanguinis effusione qualicumque locus pareretur novus, reliquo amplius rarefacto accipiendo, una cum pulvis & majore & robustiore mox simul concurrunt: Pulvis Minor em, ideoque languidiorum quoque producer, 3. Lymphis Subacida, si copia majore accedat ad cor, quoniam consistentiam tribuit sanguini firmiorem ac solidiorem, quam ut debite factusque pulvis idem rarefieri ad cordis ventriculos sufficiens dilatandos, quo faceret nobilibus, eorundem contractio ad pulvis magnum & robur tum constituendum omnino necessaria. Idem dicendum 4. de Liqueore illo Triumvirali, si praesentim ejus munus sit coagulationem naturalem, ab acido insuflato pendente, sanguinis praesentia: hoc enim auscu, augebitur quoque sanguinis coagulaio, minuetur contra ejusdem aptitudo ad rarefaciendum, ac minuetur proinde pulvis herque simul debiliior. Cum Aëris laudabilis copia magna in pulmones affecta non possit non esse utilis, non poterit ab ipsa expectari, nec deduci pulvis minor vel languidior: Potest tamen 5. a chylo, majore copia quovis modo ad cor delata, Pulvis reddi & minor & debiliior, quatenus sanguinea vasa nimium replet, ac plethoram tum efficit tum augeat. Si quarebatur aut deficientem, aut excedentem, pulvis minorem languidiorumque producere possunt & sanguis, & alii memorati humores ad cor cum ipso delati, certe non minus idem praestabunt idem quoties qualisve peccata noxia; Sanguis namque 7. vel fluidior, vel solidior, inaptus est laudabili rarefactioni, qua deficientem offensum jam est pulvis consequi minorem languidiorumque: Sic 2. Bilia glutinosa minusque acris effervescit minus, partesque igneas de se promer parcius, unde sanguis rarefieri minus, & tandem pulvis her minor ac debiliior: 3. Lympha vel Acidior vel Austerior, non tantum sanguinem praestabit glutinosiorem, ideoque ad rarefaciendum ineptiorem, sed insuper non parum abundet Bilem, partemque igneam undecunque erumpentem, atque sic Pulvis & minor & languidior dabit ansam. 4. Idem dicendum de liquore laudato Triumvirali vel acidior vel austerior. 5. Aër Borealis & asperior facit multum ad sanguinem valde coagulandum, ipsiusque rarefactionem impediendam. Si 6. Alimentum humanum acidior vel austerior, chylo quoque parabitur similis, à quo notata incommoda sunt expectanda, cum polli debiliore ac minore: Pulvis minor ac debiliior debetur quoque aliis causis praeter naturae le-

ges ad cor delatas, quoties aut humores in corpore corrupti, aut halitus flatusve ex ipsis producti; aut Venena per os, nara &c. in corpus penetrantia aut cum sanguine cor accedunt, & sanguinem aut nimis solvunt aut dissolvunt, aut nimis coagulant coaguntve, aut quovis modo alio ad debitam sui rarefactionem ineptum reddunt: Ut auctem haec nos premittat Animi deliquio atque Syncopei praefixi applicentur, & utriusque affectus naturam generationemque clarius deducamus, quoniam non tantum Pulvis in utroque observatur minor ac debiliior vel nullus, Sed animales quoque functiones, Sensus & motus non parum labefactantur, videndum aut, & qui ab una eademque causa tam diversi affectus possint produci, Consideranda vero & distinguenda sunt symptomata quae utrique affectui solent esse communia, ab illis quae Syncopei sunt peculiaris: Sedor enim tum fluidus tum glutinosus erumpit in Syncope, non item in Animi deliquio, in quo inequidem corporis universi sanguis temper observatur, quovis perpetuum fit Syncopei: Cetera vero symptomata in affectu utroque solent subinde notari, Vnde patet panem gradibus differre hos affectus, partim aliquid gravius Syncopei continuo comitari: Symptomata autem omnia superius enumerata, ut & causas externas, siue manifestas, si quis attenta mente trivinus fuerit, & cum illis quae modo de Pulvis tum minore tam debiliore contulerit, concluder facile affectum utrumque, ac praecipue Syncopei, occurrere impium ab Acido majore copia ad cor deducto & impetum in sanguine obtinente, non negat interim humorum variorum Glutinositate: Hoc utique evidentiis, libet ordinem symptomata notata causa memoriae capondere, ac omnia *Exsuperant Acido & Glutinosi* affectus: Signum instantis Animi Deliquii, plurimum est Cardialgia, vel Trillatio in orificio superiore ventriculi, Quid vero aptius est utrumque hunc affectum excutere quam *Auriam*? Illud enim si blandius fuerit, & ad superius ventriculi orificium Halitus forma accenderit, partem dictam trillabit duntaxat & vellicabit: Sin acris fuerit, mordebile eandem, atque dolorem pariet molleum, Cardialgia nomine notum. 2. Praecedat quandoque *Cordis impressio & asperitas*: Quovis aut cum plurimo humore, tum copioso tum glutinoso, debeat cordis compressio, & Halitus flatusve Oritatio, quoniam verohi affectus observantur non tam perpetuo & graves, quam ipsos ante mox lequaturum animi deliquium infestare, ac proinde causam insuper aliam, & quidem vel plurimum otiosam in actum deducentem, vel halitus flatusve ex eadem producentem agnoscere, facile patet, tum ad pirae vim excitandam & augendam, tum ad oritationem gignentes halitus efficiendos requirit acidum, quippe quod austeriusculum praesentim si fuerit, glutinosiorem praestet piussum, quae gravitatis & compressionis lenium citius & potentius producat, cum bile autem visiose ac victoriose asserescens, licet in fibrum intermitentium plerumque initia evenit, flatuslem halitibus, adeoque ipsi oritationi ansam praebet, Praecedat & 3. aliquando Animi deliquium Ventris distensio, Rugis vel Tortina, quae omnia cum omni habeant a flubibus vel blandiis vel acioribus, ex pluvio vel viscolis dum azaar, vel simul acida certo tempore, paulo ante animi deliquium deductis ac diductis, veritas distorum notitiam parit abunde: 4. Praecedunt nonnumquam animi Deliquium caliginis aut tenebrae ob oculos versantes, una cum vertigine auriusque tinnitus, Haec autem omnia quis ignorat

ortum suum debere halitibus, nunc blandis, nunc acerbis, atque semper pituitum viscidum, subinde eandem simul acidam pro materia habentibus, atque spirituum animalium motum mite concubantibus? Denique §. præcedunt aliquando Animi deliquium Pandiculationes, motusque convulsivi; Pandiculationum eadem quæ oscillationum causa est, Motus autem convulsivi ortum habent ab humore halituve acris, sed acido, nervorum initia alternatim rodente ac vellicante: Hæcenus Symptomata Animi deliquium præcedere solita, comitari vero solent Pulsus vel minor & languidior, vel nullus, sensui saltem manifestus, de quo ante: Trahantur autem in omni in consensum sensus interni & externi, quia aliquando omnino cessant ab operatione: quo ratio patet, considerandum in verigine omni animi deliquium, præsertim gravius præcedere Vertiginem, agitant & iidem in gyrum, confute saltem actis animalibus spiritibus, Cur dubitabimus quoties in corpore ab halitibus valde agitati, & ad cerebrum affluuntibus similiter agitantur, concubantur & in gyrum forsitan coguntur idem spiritus, non tantum turbant sed etiam offuscant, tandemque ita obnubilant sensus tam internos quam externos, ut ad tempus cessantur sensus omnes, motusque animalis ob concubantur spirituum animalium motum, Sed etiam ob impedimentum eorundem motum vel sublarum, quod fiet quando iidem producti atque à sanguine secerat delineant, ob coagulatum & immobilem factum ab acido quovis, & imprimis austriore, sanguinis massam: Causam hanc confirmemus per ea quæ observari solet ubi solvitur animi deliquium, Tunc cor paulatim denuo agitari atque palpitare incipit: fuit ergo talis Deliqui causa quæ cordis motum impedivit, quaque superata motus ipsi restituitur: Si proinde cordis motus verus fiat cum ventriculus ejus dexter expanditur ab impulsu sanguinis copia, cum ab ejusdem mox ab effervescentia iuscescentis amplitudine: Sinister vero imprimis à sanguinis fervidioris & adhuc quasi bullientis copia; utrique autem constat ex mire turbis ad instar concerta musculosa cordis substantia, cæterorum musculorum ritus, per animales spiritus fibræ ejus replentes contracta, utique humorum sanguinis consensuum Glutinosius vel Aciditatis, vel utriusque, tribuenda erit cum effe-

vescentia in corde ad sensum cessant, nam partium igneum erupio valde diminuta, Tum sanguinis universi rarefactio deficiens: Tum proinde cordis motus & Pulsus desideratur: qui actum redintegrant, ubi ex parte saltem correctæ derivare est extrinsecus glutinosi acidive vis & mora, & quidem à Bile, vel quovis aromatis matibus admoto, vel potius, ori infuso, vel foeniculis applicato & ad cor ulque, alimve mali focum fontemque penetrante. Tunc enim à bile, usurpatisque aromaticis, focellive dominium in glutinosum & acidum obtinentibus, non tantum sanguis denuo rarefit magis magisque, sed insuper halitus fluxive producantur, à quibus omnibus expanduntur iterum cordis ventriculi, excitantur spiritus animales torpidi, mox & complicantur iterum ventriculi, atque sic restituitur sanguinis motus, quin reddunt idem concitior & concubatus, h. e. fit cordis palpitatio. Symptomata Syncopi omni ac semper conjuncta de hic expendenda, & 1^a. *Frag* illud de in corpore de in sudore algidum, quod ab humore acido deducendum credo, postquam in continua & sollicita aliquot iustorum præxi, & omnium cæterarum causarum observatione, oihli repertis baculis in verum naturæ quod manifeste frigus parat in homine præter Acidum, & quicquid de Acido participat: Idem puro moxto Frigidi Sudoris, corporaque in Syncope causam exillimare acidum humorem halituve, sanguini aliunde admittum, ad cor delatum, & una cum sanguine quaquaversum propulsum, atque in corporis supsticie hærentem: 1. Glutinositas sudoris, quæ fit ratione humiditatis pituitosi à nostro acido soluti, & una cum ipso focus expulsi, atque sponte iterum extra corpus concretis ac coagulati. 2. Palpor accidit corpori universi, ratione ejusdem acid domini ubique nati, accedente imprimis glutinosa pituitosa, acida emula & focia: 4. Austrius cordis ac præcordiorum extremis, magisque inexplicabilis, patrim mali focum, abdominis partesque in tenuis intestinum de exonerantes, ac imprimis Pancreas; partem mali fomitem manifestat, humorem non tantum acidum, qui dolores lancinantes, rodentesque aut penetrantes pateret, sed insuper glutinosum, qui partibus omnibus firmiter adhærens ab illidem recedit lenius ac difficilius, ac proinde inger periclitatus, quo à bile oppressa in halitus fluxive viscosos lentosque dilatum, notatam arguit austeritatem. Animi ergo Deliquio & Syncopi, debet humoris glutinosi & pituitosi continua lentæque coactio ad emendatio, ut & ejusdem, ali simul redundaverit, aut in totum emendari nequeverit, per repetitas vires evacuationis, imprimis per alvum & urinas.

OBSERVATIO XX.

Syncope ab Iliacarum venarum concursu & dilatazione, in umbilico desinentium & Jecur officientium.

Mulieris venæ dux, post partum difficilem, varicosæ ab Iliacis venis externe ad umbilicum usque ascendebant, digiti pollicis crassitie, cum supina decumberet Syncope corripiebatur &c. Venæ illæ, dextra & sinistra, in unum coeuntes globum in umbilici regione terminabantur: Umbilicus ipse, aperta vena umbilicali, Jecur continuo impulsu sanguinis percutiebatur: Vide l. 4. tit. de Tumoribus.

OBSERVATIO XXI.

Syncope à Lumbrico excitata, orificio ventriculi affixo.

ANno 1665. Puella quinquennis, filia Dom. Le Fortii, Aromatopolæ Genevensis celeberrimi, frequenter Syncope corripiebatur: Vermes crebro, etiamnum per os excluderat, exoriente tandem vehementi syncope & diuturna, irritis remediis extincta est: Ex iudicio Medici familiaris, excitabatur syncope ubi lumbricus orificio ventriculi adhaerebat: definebat eo in fundum secedente: Aperto cadavere lumbricus in fundo ventriculi, prout prædixerat Medicus, repertus est.

S C H O L I A.

Gravissima symptomata à lumbricis excitari pro natura partis cui insident, notum est, sicut & quæm eximio sensu prædiximus sic officium ventriculi: Mortem sequutam à simili causa, vidi in pæ-

ro octo annos nato, syncope tamen non prævia, imo oec leipothymia, sed tantum insigni jecundatione. Vide *historiam lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

OBSERVATIO XXII.

Syncope à Tuberculo ventriculo innato & rupto.

NOs Illustris. Alphonsus Ferrariz Ducem in cura habuimus, in cujus ventriculo tuberculum disruptum est: Hic habuit cumulatim hæc omnia symptomata, *Exsolutionem*, vomitionem, *animi defectionem*, imo & mentis alienationem, & alia multa symptomata, & secunda die à disruptione mortem. *Brassævolus comm. ad aph. 8. sect. 7.*

S C H O L I A.

A Postematis ventriculi in abscessum transmutati & sanati vidi: exemplum apud *Peresum lib. 18. observ. 32.* Sanatus vero fuit apostema, quia vergens ad exteriora sui indicia præbuit: prædictum autem diagnosticæ nulla, sed tantum communia læsi ventriculi habuit.

Exsolutionem, animi defectionem] Hæc duo vocabula plerisque synonyma sunt; quamquam et distincta proponat *Brassævolus*: differentiam ostendit *Excell. Foræ consulu. 18. cent. 1.* Nos, aut, distinguentes *animi exsolutionem, deliquium* & *synapsem*, credimus potius à cerebro quam à corde horum ortum derivandum; Si-

quidem *Exolutio* fit cum sensus & motus sola perturbatione, *animi defectus*, cum sensus & motus integra ablatione: *Syncope* vero cum omnium actionum, imo & ipsius pulvis privatione: quam differentiam significavit *Hippoc. 7. aph. 8.* A tuberculo intus ruptione exolutio, vomitio, animi defectio: Necnon *Galen. 1. de curat. per sim.* hæc præscribens utque ad animi deliquium, monebat Medicos pulvis attenuos esse debere, in matuerunt, ut scilicet excluderetur syncope: Quare animi exolutio & animi defectus, sunt læsa facultate animalis, sicut syncope vitalis: Vide *L. 6.*

OBSERVATIO XXIII.

§. 1. Leipothymia à corruptione Hepatis & Pulmonum.

DOm. de Hodeville languit fere per 45. dies, nec manifestus erat morbus: Animo sæpe deficiebat, ut facultatis vitalis vitus videretur extingui, alimentis refurgebat, moris:

Aperto cadavere totum *Hepar pene putre*, Pulmões corrupti:

Quibus in ægris eadem symptomata conspiciuntur, caute medicamenta exhibere oportet, nam sæpe calamitose statim à sumpto medicamento intereunt: at *præmatura morte corripuntur. Ballenii Paradig. 174.*

§. 2. Dom. N. In febre, singultu, Syncope &c. prehensus est: Pulmões erant purulentii, corrupti, Intestina quasi syderata superna parte, Lien plane putris: Vix ulla pars integra. *Videtur de Febribus.*

S C H O L I A.

Qui sit ut plerique diu decumbant ægrotantes, quibus omnes partes intus fere putent & *Agrippæ* pariterur: alii quibus sanæ sunt partes, oborto morbo facile intereant? Declaravit Dom. de *Hodeville* & uxor Dom. *Merlai*, cui utrique partes & eorum parenchyma computuerunt. Idem uxori *Purum* Notarii contigerat, & nesciebant quomodo tam valendaria foret, cum speciosa fasis esset: Totum internum corpus putuerat, ac vere sepulchrum erat dealbatum, Quia in illis nutritio fit spiritalia, ut sic loquar, & per quandam *Agrippæ* & *ballenii*, ut sandius maneat quando spiritus recreantur; quamquam si

morbus validus esset, statim intereant, sed non tam ægrotant quam languent: ut eorum morbus non ægotatio sed languor appellatur, corruptis nimirum & resolutis partibus, & officium suum deferentibus, & diu resistentibus, pote morbo factum non accelerante, sed sensum mole corporis & partium compage dissoluta, Superstitibus spiritibus minime illustribus, qui euechymia alimentis superant & recreantur: declarat facilius eorum *ballenii*, nam si vel tantillum moverentur, animo linguntur & *ballenii*, vere autem syncopen non pariantur, alioquin statim intereant. *Ballenii Epid. p. 57.*

Præmatura morte corripuntur] Id usu comprehensum in

Mmm j ii 5

lis qui ex inflammationibus imi ac medii ventris (quosvis in phlegelom abeunt) tenentur, ut inopia morte abipiantur & placide expierent, ita enim ac putredo in majores arterias treple, protinus succedit syncope & mors, non secus ac lampadis lumen, oleo non lubrificato, extinguitur: nam pusidus & malignus vapor spirituum vitalem suffocat temperamen- tumque cordis destruit: Eodem modo intereunt mus- licres quibus secundum in utero precescit, & quibus externae partes gangrena obducuntur.

Totum Hepar puto putre De quomodocumque Iecoris corruptione, notandum quod affert Clar. Th. Kerckringius

§. 3. Cuidam cum acuta febre, singultus, Animi deliquium &c. omnia visceta marcote confecta & abscessu putria inventa sunt: *Vide lib. 4. tit. de Febris.*

OBSERVATIO XXIV.

Syncope ab effuso, ob vas ruptum, sanguine in abdomen &c.

§. 1. **M**atrona dolorem in ventre habuit cum sensu alicujus rei disruptae, paulo post sequitur syncope funesta: Abdomen sanguine plenum erat, ex vena rupta quatuor digitis infra majorem lobum Hepatis; *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 2. Uxor N. post epulas tripudio induluit; succedit animi deliquium, mors: Perito- nazi cavitates cruoris plena disrumpunt venam esse restabantur. *Vide ibidem.*

§. 3. Princeps post ventriculi dolores nigra dejecit & syncope oborta exspiravit: Ven- triculus sanguine concreto erat semiplenus, Er in cavo jecoris manifesta solutio continui, venaque porae disruptio reperta est. *Vide tit. de ventriculi dolore.*

§. 4. D. Contix gravidæ frequentes accidunt cardialgix, interdum etiam leipothymix: Dissecto mortuæ abdomine, in ipsius cavitare sex concreti sanguinis libræ repertiuntur. *Vide l. 3. tit. de Hypogastrii doloribus.*

§. 5. Ill. quædam Matrona à prandio animi deliquio correpta, horis quatuor post ex- spiravit, à rupta vena in ventre, quæ à nobis videri non potuit, sed sanguis totus in capaci- tate ventris inventus est. *Botallus lib. de curatione per f. m. cap. 11.*

§. 6. Quidam in hypochondrio dextro lato gladio vulneratur; sequuntur leipothymix frequentes &c. Vulnus in ventriculi fundo maximum erat, è cuius vasis penitus discissis ingens copia sanguinis effluxit, cujus pars in abdomen illapsa erat. *Vide l. 4. tit. de vulnerib.*

§. 7. Miliri gladius paulo infra cartilaginem xiphoidem intruditur, Syncope &c. obruit: Invenitur ventriculi orificium ad thoracem per vulnus delatum, Ac inferior abdominis capacitas, circa pubem, sanguine abundabat grumoso. *Vide l. 4. tit. de vulneribus.*

OBSERVATIO XXV.

Animi deliquium ab abscessu in ventre disrupto.

Puella febre tertianæ intermittenti haud dissimili laborans, levi animi deliquio cum rigore quodam prehensa fuit; diximus abscessum in ventre inferiore ruptum, ex quo brevi interiora esset, &c. Dissecto corpore, magna puris quantitas inventa est circa ure- rum, &c. *Vide lib. 4. tit. de Febris.*

S C H O L I A.

Levi animi deliquio &c. Disquisitione dignum, cur ab ergo puris excretionis animus facile deficiat? Cum enim Medici in missione sanguinis liberales esse soleant, mirum erit in educatione puris adeo parci sint, tamen quæ maries in pus abijt, sanguis actu erat, ac expiemia probat: sanguis pure, aut vi excreto, aut fuit: pone manant, majorem vim iam justuram contin- gere quam si sanguis pletibus efflavit: Sunt qui ad do- lorem qui in aperienda vomica insignitus recurreunt; Sed si dolor hanc leipothymiam afficit, ob difficil- itatem corporulorum illorum, in sectione venæ tecan- tur quoque & va de cunctis: Dum abicinditur ipha- celum citra arteriæ magnæ & nervi scinduntur, nulla fere animi deflectione: Alii dicunt quod natura in parte- rem abscessu occupatam multum sanguinis & spiritus in subsidium militat, quoniam evacuatio contingat

cum pus efflavit, At non est probabile inde tantam perturbationem & deflectionem evenire, multo enim major usque fuit evacuatio in phlebotomia, quam in effusione puris: Existimamus nos posseti exclu- sionem sui indicia, naturæ tamen opus esse, Imo quid elaboratius quam sanguis, quem quantum potest nihi- tur partibus solidis assimilare, natura autem est via ipsi partium solidorum, quibus suis inferitur, non sine que- rela id fit: Aequalitas, albor, larvæ declarant natu- ram eo processisse, ut si materies id pateretur totum exculum id ultima assimilatione in naturam puris abiret: Imo pus cum spiritibus eam esse analogiam credimus, ut licet minimis feminis excreto ob ma- teriei ipsius naturam, quod jam fere pars solida sit, & te- naturæ familiaris, & spirituum copiam corpus brevi probrenat, ita & pus erupio: *Vide Botall. conf. 83. l. 2.*

OBSERV.

OBSERVATIO XXVI.

Leipothymia, Syncope, à variis imi ventris partibus affectibus oborta, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum, Pancreatis, Vteri.

§. 1. **S** Artor materiam nigram per vomitum dlu rejecit, & frequentibus Leiptothymis
divexarus est: In ventriculo (qui hepatis adnatus) coninebatur ad mensuram
unam matēria nigra, pulsus instar crass. *lib. 1. tit. de vomitu.*

§. 2. Vir de ventriculi dolore, (*vide lib. 3.*) querebatur, cui supervenit leipothymia: Aperto ventriculo nihil virii invenio, sed saltem liquamen subcruentum.

§. 3. Quidam febre pestilenti extinctus, multis Deliquis præviis decem horarum spatio obiit. Inveni stomachum triplici eschara pertusum. *Vide tit. de Febris.*

§. 4. Piliſtor querebatur de dolore Hepatis non valido, interdum Leipothymia tentabatur; Hepatis parenchyma in pus degeneraverat, integra membrana. *Fide lib. 3. tit. de Hypochondr. dolore.*

§. 5. Vidi cui heparis parenchyma, illæsa sola superficie, in pus versum fuerat, sub *Lemnida* febre, & frequenti *Leipothermia* solum. *Hennini comment. in aphor. 43. sect. 6.*

§. 6. Ictus fuit scipione in regione lienis juvenis, cum insigni dolore, ac tam frequentis animi deliquo, ut postridie obierit: Lien, in gibba parte, in qua ictum exceperat, illatus: In cava erat evidenter fissus. *Vide lib. 3. tit. de Hypoch. dolore.*

§. 7. Matronæ ventriculi dolore laboranti accedit Febris, Anxietas, frequentes Leptothymiz: &c. Pancreas maximum erat & scirrhusum: Ren sinistrè colloquutus omnino. *Vide lib. 3. tit. de ventriculi dolore.*

§. 8. *Vidua N. nephritica* in febrem marasmodi incidit; frequentes aderant *Leipothymia*: Ren sinister lapide obsessus erat, Dexter admodum parvus. *Fidel. 3. tit. de Diabete.*

§. 9. Cuidam eor frequentior palpitabat, cui accessit frequens animi deliquium &c. Cor erat magnum sed sine pericardio, Illi aortæ ramo, qui vergit ad glandulam sinistro reni impositam, infidebat calculus &c. *Vide tit. de palpit. cordis.*

§. 10. Puella (de qua sit. de *Hysterici affectibus*) Leiptothymia per intervalla afficiebatur : Juxta uteri testes vesiculae retro humore plenz aderant : In thoracis cavo humor pravus ex Pulmone corrupto exudans.

§. 11. Mulier querebatur de inordinatis menstruis & de crebris animi deliquiis. In vul-
va delitescbat rumor, lividus, ater, cruore ac sanie perfusus. *Vide tit. de menstruis inordin.*

SCHOLIA.

In *Nervorum morbis*] A menstruationis vitio quo modo inducatur Syncope, iuxta tenorem Silvianæ doctrinæ sic explicat Ruffinus lib. 4. Afficitur, aut, cor, ut, similem temperat, quatenus temperies ejus naturalis calida ab advenientibus succis acidis, viscidiosis, biliosis impetitur: Sanguis est crassa vena adductus, admittit heterogeneis hinc vaporibus quasi coagulatur, moveri renuit: Spiculis vapores mobiles, gelida hac glacie fixat & coacti elapseri aeternas ad partes non diti ibuntur, hinc illæ lacrymæ: Ut dissimilare eisdem afficiat cor, cum impacti hinc five halitus, five vapores, vel, si mavis, huius visciditatis in parietibus cordis acrimonia sita acida cor vellicat, ut, quasi in medio motu derepente consistere & jamjam succumbere videatur: *Adus* quo cor in Syncope afficitur, duplex est, unus per effluviū, quo causa permanentem fuscipit dispositionem, à nulla alia quæ dependet parte, led per le primario affectu est: Alter cum nondum permanentis dispositio infixa & stabilis est, licet affectum penitus non excludat, fed ab alia & cum alia coexistit. Hæc integra cor non patitur synopen *identitatem*, per *evanescens*, *inter*, & *effugium*, verum *ex passivitate* & *inertiam*, deflexionem & interpositionem: Inter polares est affectus, per intervalla, novis nimirum liturgicis *concordantem*, hoc cum affectu *aggra* coexistat, idque per contentum positivum:

Subjectum secundarium, mediatum, duplex est, uterus & primæ viæ: *Uterus*: quia in expellenda ex-

crementis lingualis mole non rite officio suo defungitur: *Primo* vis, nam ventricularis ingreditur cibis quantitate, qualitate, modo & tempore affluendi peccantibus, chylum producat inopem, Inde angustis redditur impurius, luccus Pancreaticus augens, bilis acrior, phlegma viscosior & copiosior, congre diendi- bus postmodum his tribus pollutioribus, & consensuibus in unam hominibus in duodecim, quanta quæso effervescencia & ebullitio, quam deinde vapores ad cor viam affectantes? In quibus defensum hi vapores & halitus, sunt venæ lacteæ Aëliæ, pili- mi & secundæ ordinis, & Preputiæ: Hauriunt hæc cum chylo vapores & *mixta* illa acris, acida, viscosa, & per venam subclaviam cordi infundunt: Iste adeo chylus in totum corruptus hos vapores sepius impingit ad cor devertit, quousque demum lignissimus le deprehendendum dedit effusus: *Causæ immixtæ* illi defectus *supra*, lingualis consensus impeditus *infra* proximi causæ, secundum cili- ariam condensata, sunt vapores, halitus flauusque & quantitate & copia multi, qualitate acris, acidi & vitidi, moroque insolentes, ex vitiosa humorum in teoal intestino consensuum effervescencia, inde ad cor, adeoque ad omnes corporis partes elevari, ubi- demque effervescencia & rarefactionem lingualis impediens: Quamvis enim hi tergiæ cordis ar- cem copis inis impugnant, sanguinem ridentiam coagulant & figunt, illiusque rarefactionem impedi- unt: ut taceam quæ ex consensu horum diaconum

efficitur, viscosam qualitatem, quæ vel sola ad lymphæ inducendam sufficit: Elevantur hi ex pituita viscida, glutinosa, crassa, quæ iugeo pancreatico acidiosi & actiori coagulata, viscosè effervescit & ebullit: Inde flatus & vapores generantur, viscidiores ratione pituitæ, acidiores & actiores ratione focci pancreatici & bilis: Pituita potest esse alimentalis, seu sanguis pituitosus, quarta massa sanguinis pars, frigidior & humidior: Excrementicia idem præstare potest pituita, frigida, lentius, albus & remans humor, in ventriculo & intestinis collectus: Acida, æquæ, nonnunquam est, nonnunquam *ampullosa* salia, vel *amara*, inipida: Inde flatus varium locique secundum essentia modum, *Quantitas*, ratione molis, & ædificiis, tum Qualitate manifesta vel oculis: Quantitate & copia turbant & percipiunt sangui-

nem, Qualitate acii vellicat membranarum & nervosum in corde genus, acida coagulant, viscida sanguinis motum impediunt: Salus, lividulus, biliosus iugus, & acida pancreaticæ, si acedine & acore intensio præcaveant, seminaque gravia habuerint ascendenti, stragem hanc facile possunt edere, & reotiosi sanguini ipsimofu liem movere: *Mors* peccati hi humores & vapores, generationis, & localis: Non generantur in loco affecto, per *vena* *ampullosa*, congestionem, ob facultatem letam, sed extra locum affectum, à cacochymia pinguis, biliosa, acida, quæ conservatur à viscosibus male habentibus, foveant, & *ampullosa*, globo quodam confensionis per *ampullosa* & *ampullosa*, infuxionem & irruptionem, ad Cor per *cavam* defectum *ampullosa* & *ampullosa* factam, quæ in momento vitale figunt huiusmodi &c.

OBSERVATIO XXVII.

Syncope, Sanguinis nimiam effusionem per vena sectionem sequenti.

Vxor. Dom. N. annos circiter 25. nata, pusillæ staturæ, ingenii vividi, sed valetudinis parum firmæ, felici partu filiam enixa est anno 1669. At syncope subito prehensa paucis post diebus interit: Dum viveret, parum & sæpe comedeat, ab *ingesto enim cibo* paulo copiosiore, *miræ angebat*, ac pene in suffocationem adigebatur. Præceptis & improviso obrepens mors ad cadaveris apertionem impulit parentes.

In quo viscera omnia citra labem reperta sunt, sed Jecur & splen insignis magnitudinis, ut se mutuo in latera compellerent & cogerent; hinc angustia & compressio ventriculi: Uterus contractus erat, parvus & vacuus; quanquam Medicus in ejus cavo grumos sanguinis, eosque insignes, repertos in iurejurando pene affirmaret, à quibus clari terri vapores synopen lethalem inducerent: Sed vasa omnia, & totum corpus sanguine destituebantur, à crebris & citra necessitatem factis ejus emissionibus.

OBSERVATIO XXVIII.

Leipthymia crebra ob cor pericardio destitutum, cum hydropæ pectoris.

D. M. Guillermetus (*vide tit. de Respiratione laesa*) asthmaticus, crebris leipthymiis tentabatur: Aperto cadavere cor nudum apparuit, aquis innatans, pericardio omnino destitutum, cujus ne minima vestigia.



ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI SECVNDI

SECTIO XI.

De Morte Repentina.

OBSERVATIO I.

S. 1. Mors subita ob effusum sanguinem in dextrum cordis suum & pericardium, à ruptura vena cava.



N. M. 1670. 1. Augusti subito extinctus est Vir Clariss. D. Lud. Saladinus, Juriscons. Genevensis, annos natus 30. *Palpitationi cordis* diu obnoxius & *parexyms asthmaticis*: De capitis præterea *gravativo dolore* & *summo virium languore* diu conquestus, quæ de causa raro in publicum prodibat: Ante biennium conjugium sed sterile inii: Ingreunte æstivate libertori aëri committere se, suffocationis metu, cogebatur: Mense accumbentem, æstivate vel palpitatione cordis correptum, & ad fenestras properantem, mors occupat.

Paucis

Paucis post horis evisceratum cadaver, inquirendæ subitaneæ lethi & affectuum causæ gratia: atque sequentia Medicis & Chirurgis præsentibus adnotata. 1. quidem protinus se obtulit Pericardium sanguine concreto turgidum, tanta copia ut exemptus scutellam stanneam fere adimplerit 2. Magnus cavæ venæ truncus, in ventriculi cordis dextri confinio manifeste disruptus apparuit. 3. corpus quoddam partim membraneum, partim carneum, cavum, auriculis cordis annexum, parte superiori, corde paulo minus, ovali figura, sanguinem fibrosum, adustum continens, deprehensum est, ac maxima adjacentium vasorum & enormi dilatatio, quibuscum conjungebatur. 4. Pulmones erant permagni, intra se saniofam materiam & purulentam ferè, continentes: 5. Jecur naturalem molem multum excedebat, à naturali statu alias vix recedens: 6. Lien quoque magnitudinem ordinariam superabat, cum duritie: 7. Ventriculus parvus, membranz ejus tenuis, interior phlogoscos notas præ se ferebat: 8. Lientia Intestina & Mesenterium, prægressi æstus & incendii notas præ se ferebant. 9. Aperto capite insignis scæ inter utramque meningem congestio adfuit.

S C H O L I A.

Repentinam mortem adscripserunt Medici fociore cordis calori nativo à subita sanguinis, tum in pericardium, tum & maxime in cordis deatrum ventriculum effusione: Disruptionis autem insignis illius vasis causam existimant, necnon varicosæ trunci venæ cavæ constitutionis, exuberantem sanguinis copiam, cui denegatus esset liber commensus ab extraneo illo corpore, auriculis cordis, illisque annexis vasis aditu, inde eorum compressio, concurrente proculdubio corruptione & putredine partium

cavæ & interioris canæ illius cæterescenz, ad venam cavam usque propagatz; qua de causa paratior ad crepaturam & disruptionem exitit. Capitis notæ gravavi doloris causa, merito insigni illi scæ inter meninges cerebri eocervicariis assignata fuit. Vitalium vero & Animalium facultatum languorem, à prohibita tum sanguinis tum spirituum *vitalium* deducetur, producta à majorum vasorum per dictum corpus compressionem, ac in eo concepta putredine, nec non à viscerum phlogosi hincque ducta debilitate.

§. 2. Cuidam subita morte eocidentis, fodiendi labore fatigato, vena cava prope cot disrupta, sanguine inundavit viscera. *Thom. Bartholinus.*

§. 3. Meminit *Amatus Lusitanus* cujusdam qui ex frequenti uxoris super se in re venerea decubitu, quæ corpulentæ & valti corporis erat, in venæ cavæ rupturam incidit, & deperente omni sanguine extravasato mortuus est. *N. Donatus Hystor. mir. lib. 4. cap. 9.*

S C H O L I A.

Quam *Mors sit Vita privata, hujus Essentia inquirenda* Animæ corporeæ existentia omnino ab Actu seu vita ejus dependet: acque hoc respectu flammæ vulgaris, eique Solis similis videatur, quantum scilicet utriusq; substantia quamprimum à motu omni cessat, illico non est, nulloque modo eadem numero redintegrari potest: Ea autem Naturæ perfectionibus & Homini communis, cum toti corpori organico cædunt, & singulariter partes ejus tam humores vivificat, acuat & irradiat, ita in duobus illorum eminentius subsistere, atque sedes velut imperiales habere videtur: Sont autem immediata hæc animæ subjecta, *Liquor vitalis, live sanguis, in corde, arteriis & venis*, perpetuo gyro circulator: atque *Liquor animalis, live Nervus suus, intra cerebrum & appendices ejus* blande scaturiens: Animam ergo corpoream binis contineat partibus statuimus, una in sanguine radicata, quam *Flammam*: altera in *arteriis & nervis genere gliscis, quam Lucidam* appellamus: Quoad priorem, credimus 1°. *Sanguinem Animam esse*, 2°. *Animalium vitam in ipsius assensione*, aut in affectu huic maxime analogo consistere. 1°. Sanguinis animationem & placita Philosophorum & indubitata S. S. testimonia asserunt: Quod etiam ex observatione Clar. Harvei sensui constat, utpote cujus motus oculo discernendus, indicat primo ipsam vivere & ultimo mori: In ampliore hujus probationem talis vilgo notum est, animalia tantum quoties sanguis in debita copia & motu pestilur vivere: hujus autem, si aut nimia detrahatur quantitas, aut motus supprimatur, protinus interire. 2°. *Sanguis essentia animam, live vitam ab incendio ejus pendere, ac propriis ignis flammæque passionibus, soli sanguini viâ competere ostendimus*: Eam vero præcipua & ma-

ajme essentialia, ad flammam perennandam requisita sunt hæc tria, 1°. ut huic quamprimum accendatur, fibra & continua aëris accessio concedatur. 2°. Ut pabulo sulphureo constanti fuescit. 3°. Vi Recrementa ejus tam fuliginosa quam crassiora perpetim amandentur, 1°. igitur ut Flamma accendatur, maneatque accensa, libero & indistincto aëris accessu opus est, idque non solum ut effluvia vaporosa, flammæ suffocationem minuant, foras convellant & perpetim decedant: at tamen longe potius, ut pabulum nitrosum, propter cujusvis rei incendium necessario requiritur, ab aëre suppeditetur: Si quando enim nitrosum aëris particule, quibus universa hæc ejus regio abunde repletur, subjecti cujusvis sulphuris, inter accendendum erumpentibus, precludantur, & flamma & ignis cito disperseunt: quod exinde constat, quoniam hic aut ignis, vitro impolita, post aërem effluviis vel excludit, dissimile capitant: Eodem ritu callidiora animalia, si respiratione prohibentur, cito expirant: quare maxime vulgaris & promptissima eadem interficiendi ratio est, ipsitum præcludere, quo penitus obstrueto, *vita uti flamma perit*: Quod si obstricta *sensu* interire, quia fuliginosa retentæ massæ sanguineæ instat & intumescant; quæ proinde, mole aucta, & fere immobilitas facta, cordis finem opplet, ejusque motum inhibet: dico hoc improbabile esse, quoniam si arteriæ ubique in artubus, & circa collum ligaturis constringantur, ut sanguis, quoad circuitus sui ambitum coarctatus, circa præcordia plurimum contineatur, (plus centè quam à mera fuligine retenta evenire potest) propterea tamen neque statim mori, neque lethalia symptomata subsequantur: Hinc ut constet Respiratione prohibito interire,

interire; quia *sanguis in flamma vitula utroque acris pabuli defluunt*, potius ignem quod eadem de proptia fuligine detenta ubiatur: Horum similitudo adhuc clarior observatur à mineralium fossilibus, qui passim exasperantur in cryptis subterraneis, ubi vel nitrum deficit, vel à vapore quodam alieno obigiunt, si quando amplexu deliquam immittunt, vel plane urget, eodem tempore laterne flammam diminui, caculeam evadere, & denum exspirare.

Secundum flammam sustinende requisitum, est conflans pelali *sulphuret*, quod continuo depalcatur, *sufflumen*, quo subtrahitur, aut propter incongruam emissam depravato, flamma exinguitur: Uti certitur in lampade, quæ oleo deoegato, aut si aqua vice ejus suffundatur, exspirat; Eodem plane, quo flamma vitæ, calidum animalium sanguis (& è cunctis naturalibus, præter ignem, hic unicus) *pabulum sulphureum*, coctissimè & copiosum exigit, illudque brevi accensum, magna ex parte in effluvia vaporosa absumit, capite mortuo, terræ, salis, scædique sulphuris relicto, interitum è pabulo suo per accensionem attrito, particulas quasdam in alios usus necessarios disponit, *Sanguinis vitæ, sive flammæ*, alimenco continuo egeat nullus est quin quoridie in seipso experitur: Nam si aliquandiu illud denegatur, sanguinis vigor minuitur, quin & partes solidas ætiores, eorum tamen, aliosque corporis humores, quibus depalcatur, in finem suum rapi: Si nutrimentum ab assumptis quotidie suggestum tenore nimis & aquosum faciat, sanguinis se vor hostis flammæ jejunæ semini solet: Sin pabulum valde sulphureum, ac spiritum vinoso turgidum copiose ingeritur, cruor iterum inflammatur, ac non raro in febrem, quasi apertius incendium erumpit: interit ex isto sanguinis pabulo, uti videtur, per accensioem atrox, effluvia calida cum fuligine & vapore copiosissima decedunt, Et quod ipsum iodolem plane ignem recitat, non raro linguam & fauces torrefacit, & veluti caminum, ætredine inficiant: Porro sanguine confligant facies adustæ in-

flar capitis mortui, in vesicam scillis, lientem, & scilicet foras emunctis amandantur.

Tertio, ut flamma accensa aliquandiu permaneat, jugi exortilatione opus est, atque ut effluvia ejus fuliginosa contineant volent, quæ fecas in vicinis dentibus eggeta & detenta ignem suffocant, in quantum scilicet corporis acceoli putos obstruunt, materia sulphurea inflammatur & tropiorem impediunt: Pariter ac flamma etiam sanguinis vitæ *peritissimum* continuat exigit, in quem huc, præter majora Tracheæ "spicula, minora innumera, scilicet pori caris, ubique per totum corpus hiances, effluvia à sanguine arduante decidua copiose emittunt; quos si collapsi ac nimis occludi contingit, propterea sanguis quasi sumo & vapore obstitit inordinate effervescit: porro necesse habet circuli sum corripere, ut credamur vice Pulmones petramiscent, illas totam quæ licet, fuliginem suam dissipat. *Ubi Tract. de Animi Interit part. 1. cap. 2. Et Tract. de Animi Interit, ubi fufus h. m. flammæ*: De morte quatenus sequitur ad vitæ Liquidum nervi, vide ut. de Rhythmologia Syncope, Palpitatione, &c. &c. Vulgo autem mors adhibetur interitui caloris nativi, & causis autè ex quæ maxime efficaciter subitum inferre possunt, Quatuor autem de causis calor interit, inquit *Hærmus* *lib. 1. cap. 4.* Aut vehementia dissipante calorem, quemadmodum dicitur magis lumen obicure minus: Vel à suo contrario, quemadmodum aqua exinguit ignem; & denique copiosus assueti nutrimenti, suffocantis calorem, ut nimium oleum elychnii flammam: & quemadmodum seilibi *Apper*. ex hac causa, habitissima consuetudo corporis quæ in summum evalit, qualem in maledia cernit est, tumore periculosa, eo quod spiritus vitæ copia assueti nutrimenti, suffocentur: Vel calor exinguitur inopia alimentum, ut cum flamma angulo loco coniecta inaccessibile, ut in cucurbitula medicata, cum flamma adde defraudatur: sic in humilibus quæ fauces præcluduntur, & cutis spicula.

OBSERVATIO II.

Anatome Virginitatis anno 40. subito mortuæ cujus vasa circa cor sanguine exhausta reperta sunt, cum Pulmonibus vitatis.

Virgo Nobilis Genevensis, annum 40. prætergressa, cui crebræ à cerebro defluxiones in dentes & circumfusas partes moleste, ac dorsum exoriosa deformabat, 15. Februarii mensis, 1672. repente de scotomia conqueritur, aurium tinnitu, capitisque dolore, fructat paulo post aphoniam & asphyxiam, hinc morte quarta ab invasionis hora: Multa administrata præsidia, ac inter cætera cucurbitula sicca sincipiti adnota, quæ cruorem aliquem elicuit.

Apertum postmodum cadaver me præsentem, In quo sequentia adnotata, 1. abdomine reformato, viscera satis integra se exhibuerunt, ventriculus omnino inanis, et si cardiacæ multæ ingesta fuissent. 2. Uterus, quamquam pudicitæ notissimæ, fartæ & testæ esset, amplissimus, major quam in plurimis quæ sapius pepererunt. 3. Thorace inciso, Pulmones variegati apparuerunt, lividi, viscidæ pituita circumfusi, cum plurimo pure intra parenchyma. 4. Neque cor, neque vasa adlita vel gurtam sanguinis continebant: Effusus intra thoracis cavitatem animadvertetur, sed non ea copia quæ vasa dicta exhaurire potuerit. 5. Pericardium humore omnino erat delictum. 6. Spina dorsæ ad lævum omnino deflectebat, vix à latere proximo duorum digitorum distantia quæ medium dorsum occupare debet abesset, literam S effingens, superiore parte extra vergens, inferiore, circa medios pulmones, admodum depressa, ut ideo admodum premeretur, unde asthmatis diurni causa repetenda, & quod ad quemvis mortum anhelaret: Apertio capitis negata ob instantes exequias: Partem tamen sanguinis eo confluisse ut crederem, impulerunt & paucitas ejus in thorace reperta, & querela de capitis dolore ingruente syncope, & elicuit ab adnota cucurbitula cruor.

OBSERVATIO III.

Mors subita à vermibus cordis aut pericardii incolis.

§. 1. **I**N Palatio Magui Ducis Hetruriz, civis Florentinus circumforaneum fabulantem audiens, morte subitanea correptus est: quæ mors cum adstantibus & familiaribus ipsius maxime suspecta esset, dissecti cadaver curant. In quo dissecto nihil mortis causam quam vermem vivum in cordis capsula fuisse à Medicis repertum est. *Ex Petri Sphererii observationibus, Archiepiscopi Moguntini Medici.*

§. 2. Valetudinarius quidam Syncope cardiaca, palpitationeque cordis per intervalla quatiebatur, & tandem subito occubuit: Dissecto cadavere, inventus est vermis cordis ventriculo dextro adhærescere, mortuus, niger. *Zacutus Praxis med. admir. lib. 2. observ. 39.*

OBSERVATIO IV.

Mors subita ab atro sanguine in cordis cavitate, Sero in pericardio, & Abscessu prope sinistram auriculam.

HYacintus Burga, trium annorum, Nobil. D. de Burga, arcis Antuerpiensis præfati filius, repente obiit: Aperto cadavere ab Excell. D. Nonnio, præter atrum sanguinem in cordis cavitate, Et ferositatem in capsula cordis inventam, Repertus abscessus est iuxta ovi prope sinistram cordis auriculam. *Nic. Fontanus Respons. & cur. medic. p. 60.*

OBSERVATIO V.

Mors repentina à corporibus extraneis in sinibus cordis contentis.

§. 1. **I**Nfantulus, Thomæ Hall, Aromatarii Dorchestensis, trimæstris filiolus, sanus & bene habitus, cum nutrix cum eo luderet, in sinu ejus subito, oculi quasi nocturnam vitam exspiravit.

Dissecto à morte corpusculo, cordis dexter ventriculus sanguine congelato repletus fuit inventus: In reliquis partibus nihil culpa dignum, sed viscera sana & firma apparebant. *Frid. Lefsius observ. med. 15. lib. 1.*

S C H O L I A.

CAusam proximam tam subitæ mortis, impedire forsitan sanguinis circulationi adhibendam censeo: Hæc si prohibemus, vel in torculari Hierophylli, vel cordis ventriculis, *Sm. Pauli* auctoritate, idem in Microcosmo quod in Macrocosmo, interposita terra inter Solem & Lunam, accidit, & velut Eclipsis quædam existit, quam necessario mora, solutis oculis, insequitur. *idem.*

§. 2. Intra ventriculum dextrum, ad orificium venæ cavæ, in quibusdam repentina ac inopinata morte suffocatis, deprehendi frustula carneæ, pugni magnitudine, invicem conglobata, & nuper in Episcopo Mallicacensi id à me fuit observatum. *Riolani Anthropographia lib. 3. cap. 12.*

§. 3. Juvenis 24. annorum, diu præter solitum mæstus, habitus melancholici, coloris nigri, subitanea tandem morte occubuit, antea tamen molestissimam sitim perpeffus, & satis large ideo potans.

Secundo à me cadavere, omnia se recte habuere, præter cordis ventriculum utrumque, qui non sanguine, sed pituita potius vitrea, tenaci, subalbida repletus erat.

Rumlerus observ. 6.

§. 4. Præter adipem extrinsecus cordi adnatum, aliquando & intra eor, in ipsis sinibus & ventriculis frustula pinguis, sevo aut adipi similia, & quidem satis magna, nonnunquam reperiantur: Ita refert *Psyllius* in Ducis Ferrariensis, subitanea morte extincti, sinistra cordis cavitate: pinguedinis frustum, ad magnæ candelæ sebaceæ formam repertum fuisse. *Rolsinkius Dissert. de corde cap. 3.*

§. 5. Notandum est quod ego anno 1774. cum Rev. Præceptore meo J. B. Canano, & Exc. Patre meo, Ostiarium Sereniss. nostræ Barbaræ Austriacæ inspexi, Subitanea morte correptum, cui insignis pinguedo ad magnæ candelæ sebaceæ formam sinistram cordis cavitatem occupabat. *Hippolitus Boschi de Facilitate Anatomica lecti. 4. p. 438.*

OBSERVATIO VI.

Mors subita ob Polypos in sinibus cordis, Pulmones sanguine infarctos &c.

§. 1. **F**ilolus N. per 4. aut 5. dies tussis, febricula, &c. laboravit, & intra bidentium extinctus est: Pulmones mortui sanguine stagnante infarcti reperti sunt: Dum vero lethi

lethi adeo subjeti causas adhuc rimamur, corde dissecto, in sinibus Polypi ingentes animadverti. *Vide sit. de Dyspnea.*

S C H O L I A.

Polypus] Præter naturam multa in ventriculo reperiuntur, *Rachium* frustula adiposa, & *Wermius* ex utroque ventriculo carunculas quasdam interius albicantes, exterius rutilo colore emergentes, quod & nos alias invenimus, *Erasmus* concretione

tuitosam, flavescens instar medullæ: *Vesicula* glandulosa nigricansque carnis libras duas, *Boncompagni* frustulum carnis instar mesepili. *Thom.*

Bartholinus Anatom. reform.

lib. 2. cap. 7.

§. 2. D. Simon Pauli Hafniz vidit Polypum cordis, à sanguine tota substantia corrupto genito, in humano corde repentina morte extincto, cum veneni exhibitu suspitione. *Th. Bartholinus observ. 15. Alter. medic. ann. 1671. & 1672.*

§. 3. Subitanea morte coincidentem anno 1669. aperit Chirurgus, fatique præcipitis causam detexit pinguedinem nimiam Pulmones comprimentem: Item Polypum cordis ventriculi sinistri transitum sanguinis retardantem. *Th. Bartholinus in miscell. cur. anni 1670.*

OBSERVATIO VII.

Mors subita ob sinistram cordis auriculam materia crassa refertam.

Filius Dom. N. quinque annos natus spirandi difficultate diu laboravit: Supervenit leipothymia, pulsus parvus languidus &c. Defuncti Pulmonis pars sinistra diaphragmati hærebat firmiter: Sinistra cordis auricula solito amplior erat, repleta materia crassa & compacta, omnino alba, laridum coctum referente, quam subitanæ mortis causam fuisse censuimus, cordis ventriculum sinistram suffocando, & illius ventilationem impediendo. *Riverius cent. 1. observ. 83.*

OBSERVATIO VIII.

Mors repentina ob sanguinem intra cor & pericardium effusum, & abscessus in Aorta.

IRa repente mortuus, pericardium sanguine repletum dissectus ostendit, Cum ejus causa ulterius perquireretur, inventi sunt duo abscessus in trunco arteriæ aortæ prope cor, unde sanguis exierat.

S C H O L I A.

Pericardium &c.] Quod rupto vase proximo, aut dilato saltem ejusdem officio probabile videtur.

Abscessus] Crudi haud dubie, & sanguinei sive inflammatorii nondum suppurati. *Wesilius in militem. cent. 3. §. 15.*

OBSERVATIO IX.

Mors repentina à sanguine cor suffocante.

Precipiti & repentina morte occumbere horrendum simul ac miserabile est, sicut hoc anno 1651. vidimus, nam brevi temporis spatio unus post alium hoc modo sub flebili mortis iugo reclinavit: habuimus anno præterito, fere per totum annum & amplius, siccitates immensas & præsertim æstatis tempore, cum ardentissimo fervore copulatas: Autumnus vero elapso anni 1650. aquæ copiosæ statim post calorem & siccitatem humectantes agros, rigantes prata visæ sunt: Post aquas vero siccitas cum frigidity magna supervenit: hinc copia catarrhi, & frequentia ophthalmiæ, & angina spuria visæ sunt: Anatomica sectio mortuorum qui hoc modo perierunt, ostendit Medicis cor à sanguine suffocatum. *Dem. Panarolus observat. 7. Pentec. 3.*

S C H O L I A.

EX dictis facile credo posse cognosci hujus morbi causam, si dixerimus oriri ab humore aliquo crasso & vaporoso per venas redundante, suffocante calorem naturæ, aut venam aliquam disrumpente: Venæ etenim cum supra modum sint repletae periculum est ne disrumpantur, ut provenit aliquando à copia sanguinis, sicut inquit *Galen.* aphor. 3. 1. Cum enim vasa fuerint cibus ac potibus supra modum repleta, periculum est ne aut ipsa disrumpantur, aut

calor naturæ suffocetur: Non neglecta interim prohibitione insensibilis transpirationis per advenum frigoris, Et sic corpora excalefacta per immensas siccitates caloribus maximis associata, adveniente pluvia, humorem ad internas usque partes attrahunt, ob raritatem corporis & apertione pororum, sicut accidit in ferro, dum durissimum reddere volumus, quoniam à ferventissimo igne extractum in undas impegitur, qui humor postea cum non possit exire per poros,

poros, per insensibilem transpirationem, propter frigoris externi ambien- tis, quod poros claudit, alios quærit aditus, quos si non inveniat, per corpus excurrit cum periculo maximo ne robur virale cordis, ipsiusque calor suffocetur: Confirmat copia catarrhi, ophthalmicæ & anginæ, & anæmie mortuorum qui

hoc modo perierunt: Ideo optimum remedium esse si huius morbi indicium aliquod haberi posset, statim cucurbitulas applicare per totum corpus ad elevationem potiorum: sicut etiam sanguinem ex brachio utroque minuere, ne cor ab ipsius copia suffocetur. *Idem ibidem.*

OBSERVATIO X.

Mors repentina à disrupta vena in ventriculo cordis, cum Pulmonum vitio.

Rusticus carceribus detentus eum optime carnasset & dormitum ivisset, paucis habitis verbis cum socio, quicum decumbebat, perpetuo somno se tradidit: Socius perterritus carcerum custodes advocat, custos Judicem, qui cadaver aperiendum jubet.

Quo aperto, Omentum laceratum & putridum inventum: Jecoris portio circa costas suppurata, Pulmones putridi: Nec rufis adfuit nec respirandi difficultas: Corpus pariter lividum erat, præsertim ea parte in qua jacebat: Hujus tantum repentinæ mortis fuit causa, disruptio venæ in ventriculo cordis, *P. Poterius cap. 60. centuria ii.*

OBSERVATIO XI.

Mors repentina à sanguinis copia suffocante & obruente sinistrum cordis ventriculum.

IN Nosodochio aperui corpus cujusdam ancillæ, quæ in chorea Inter saltandum subitanea morte periit, causam mortis investiganti, Sinistrum cordis ventriculus magnam continere sanguinis copiam apparuit: Omnia etiam in corpore contenta sanguine suffusa nigricabant, vel saltem rufescebant: Pulmones quoque ita atque undique thoracis lateribus adhærescebant, ut vix separari potuerint, unde continua laborabat spirationis difficultate: Cerebrum alias erat bene constitutum, nisi quod omnes venæ sanguine turgent, præter naturæ modum.

SCHOLIA.

Vnde conjecti mortis causam fuisse quod ex salutatione & motu vehementiore, cor & sanguis supercalescens fuerit, quæ majorem requirebant respirationem, quæ cum deegreteretur ob adnatos

pulmones, necessario ipsum cor & calore & nimia sanguinis copia obrutum interivisse, idque subito & inopinato. *Salzmanus Observat.*

Anat. pag. 46.

OBSERVATIO XII.

Mors subitanea à retrocessione sanguinis ex arteria & vena axillari ad cor, ob corpus carneam cavitationem arterie obturans.

Cum ego in Nosocomio S. S. ad æscum gratia secandi corpora, accidit ut Parer quidam D. Antonij, desiderio impulsus anatomicæ sectionis ad ipsam intueudam me rogarer: libenti iraque animo aliquando dum secui, ut prope me sederet oravi: Opus complevi, atque ipse ex hujusmodi inspectione totus jucundus domum revertitur: Sequenti die quidam mihi retulit patrem istum è vivis decessisse, rogans ut reliquorum patrum gratia ipsum aperirem ad intueudam repentinæ mortis causam: Corpus secuinus, atque sub dextera axilla pius Aneurysma habuerat, quare Medicis consulentibus singulis annis, cum esset quadrato corpore, maxima ex brachio opposito sanguinis copia hauriebarur: accidit eo tempore, dum nunquam tam jucundus & proprior esset ad viæ functiones, illi repentina mors & in terram cecidit.

Secundo cadavere, venam azygos maxime turgentem inveni, ita ut rumpi videretur: Venæ item & arteriæ omnes, quæ musculos intercostales dexteros irrigant, summopere tensæ plenæque erant: ita ut dum sectio fieret circa claviculam & axillam, maxima sanguinis copia redundaret: Sed quod maxime admirandum fuit, arteriæ axillaris fuit inspectio: ipsa enim, non ut in cæteris aneurysmatibus rupta & corrupta erat, sed undequaque integra: Earamen differentia, quod circa arteriam & venam axillarem, atque intra cavitationem arteriæ, caro quadam alba, solida, dura & cartilaginosa maximæ portionis, tam firmiter adhærebat, ut secerni nullo modo posset, imo ferro mirifice resistebat: unde cum via sanguinis naturalis & vitalis ad irrigandum, brachium ex insigni interna & externa obstructione paulatim clausa esset, retrocedendo sanguis cor suffocando, Patrem illum inopinatus sustulit. *Dum. Panaxelus Pentecostæ y. Observat. xi.*

Nun

SCHOLIA.

SCHOLIA.

Cere quodam alba, fulida &c.) Similia corpora, pro variis quos obident locis, varias lesionum species inferunt, apoplexiam, orthopnoeam &c. syncopen cardiacam, si in corde primas radices agnoscat, vel in vicinis illis locis deliteant, sique id languidum sit, nec sanguinem amplius propellere valeat,

unde maiore tanto oneri succumbit: Observatum quidem quoddam ista corpora diu impune gestasse, atque pleraque vice munia obuisse, ubi scilicet mobilia sunt atque hinc inde disperguntur; in autem alicubi fixiter fixa, impedita sanguinis circumgyratione, subito mortem inferre possunt.

OBSERVATIO XIII.

Mors repentina à sanguine circa cor &c. concrecente.

§. 1. **T**imoris damna non pauci experti sunt: Metus mali sæpe major ipso malo, & formidine mortis quamplures moriuntur ante mortem: Fugientius timor vel eo nomine, ne torpidus metu sanguis iogruentia mala facilius admittat: Corruptiuntur multi pestilentia, quam forsitan constanti animo & sereno evaderent. Romæ mortuus est, me præsentente, vir Emioens, cui in thorace circa cor sanguis concretus mortis causa credebatur, natus ex timore in mari concepto, quum iniquitate ventorum agitatus Genua solveret in Sardiniam trajecturus. *Th. Bartholinus observ. lxxvj. cent. iv.*

§. 2. Sæpius observavi in subito mortuis cadaveribus, passim à me dissectis, cordis magna vasa sanguine concreto repleta: *Idem l. de lact. Thorac. cap. 14.*

§. 3. Puella cum per diem capitis gravitatem, vertiginem &c. passa esset, die sequenti subito extincta est &c. In arteria magna & vena totus sanguis illi coaluerat &c. *Vide sup. de Syncope.*

OBSERVATIO XIV.

In subita morte extincto, repertum Pericardium aqua & sanguine concreto repletum.

Miles subito post longum mororem mortuus, visceribus reliquis salvis habuit in pericardio, non aquam modo sed & copiosum sanguinem concretam. *N. Abrahamus Frambesarius in Exam. Doctor. fol. 29.*

SCHOLIA.

Hoc patet non omnes qui subito moriuntur, apoplexia mori, & frustra sæpe causam queri ab anatomicis in capite, cum in thorace sit: Eo in milite cor obrutum & oppressum fuit tum ab aque copia tum à sanguine, cuius intercorpus fuit curius, hinc ejus concretio; Mæstos & melancholicos sero abundare docuit, in morte ad cor sanguinem conflueret, ibique stagnare, ejus oppressio, ob quam vix explicatur, ostendit: Syncope autem cardiaca correpti vix ab apoplexia distinguantur: animales enim actiones io priores statim debilitantur, ac tandem penitus

deficiunt; hac enim ingruente oculis viridia olivæque obvertantur, aures insinuat, & quoadque omnia in gyrum rapi videntur, mox omnis sensus & motus perit, insensæ trunci jacent agi: Quæ ergo ratio distinctionis est? In apoplexia, quantum vis fortis, stertor est, quod id quod è cerebro accedit molculis thoracis, ad complementum respiratiois, solum est ablatum, durante adhuc ebullitione naturali in carder. In syncope cardiaca nullus est stertor, quia cor ipsum subito occupatur.

OBSERVATIO XV.

Mors subita ab aqueo humore in pericardio redundante.

Elapsis annis cum anatonem Nobil. cujusdam viri jussu Magistratus aggredere, eo quod repentina morte præventus fuerat, & suspicio erat ne causa lethi veneficium fuisset, tandem cum nulli visceri vestigium, siue nota ulla deleterii pharmaci appareret, invenimus pericardium logenti mole tumens, quo manibus leviter pressio, humor ipse aqueus ex ore ubertim manasse liquido coospeimus: Coospeci ex his ob cordis palpitacionem ipsum statim obisse: *Julius Ioselinus Tractatu de aqua in Pericardio, capite ij.*

SCHOLIA.

Aqua quæ in involucro observatur, & quæ in thoracis cavitate ortum ducit, nemum ex valis inibi contentis, verum etiam & potius aliquid totis modo ac madoris eo petterat creosmus, tum per anastomosis non etiam per diapedesis, si cum potum assumimus lambendo veluti per parietem aliquid insinuat. Hoc ex Hippocr. clara sententia liquet, libri de Cuest. initio. *Ad quomodo aqua aëratam trahit, tubulorum ac multum rufum exhibet præterea inquam quod*

contra respiracionem fertur: quod enim per rimam illatam, tanquam juxta parietem dilatans, aëre elationi non infuso, sed levem ac lubricam quandam viam humectatio ipsi præbet: Hinc itaque humorem ser. de pulmone una cum aëre abducit: Aërem quidem opitur, ubi in medullam usque penetrare oportet: rursus per eandem viam, quæ abducit, rejicit: verum humorem pariter in calum ac vaginam suam expulit, pariter rursus una cum aëre foras propellit: Hanc Seno lentemini confirmat Galeus 4. m. m. cap. 7. & 7. de ul. part.

z. 17. & alibi sepiſſime: Nec probatione authoritate egent quæ tenſus indicatur, quandoquidem in nobiliſſimis experiſui licebit æſtivo tempore, præcipue ſi quis in ſole ambulaverit, & ſi interdum vehementer crucietur, via loqui poteſt: ſumpto poſtea aquæ haſtu, loco vel ore ſtatuim voa redi: Ecquid amplius immoror, cum veſtiſſima ſit hæc ſententia? imo ipſius Platonis i hic in Timæo, Cum vero ex iſta palpitatio, in terribiliu rerum morte, ex ira exortatione, prævidetur ſuis tantum hoc tranſientis parvis dimiſſum æſtuſum ac propinquum quædam reddatur, ſubſtitutum illi pulmonum forma aggerente incrementum: quæ ſentis pri-

mam & exiguam, deinde cavernoſa ſorgia iſtat, ac formidulenta eſt, in ſpiritu potius excepto reſſuſcitum reſſuſcitaret æſtuſumque mitigaret: Hippocr. Platonem vetuſtioreſ nedum ratione, velum experimento probavit, oſtenditque notam, Signum autem horum rei hoc eſt, ſi quis cum aquam carule colore, aut rubrica temperatam ſuſcipiat valde bibendum dederit, maxime ſui, hoc enim picus non eſt curioſum neque manducare deſtitum: deinde dum æſtuſum bibet iſtus guttur reſſuſcit, hoc colore ruſſa tantum reperiet: Sed non eſt cuſuſus hæc Chirurgia aggreſſio: Nequaquam fides noſtra ſuſpecta eſſe debet de potu quod homini in guttur vergat, comprobata hiſtoria ſuperius allata.

OBSERVATIO XVI.

Mors ſubita ab adipis copia pericardium invaſiente.

Vixit ante aliquot annos Mercator Amſtelredami, vir ſumme obæſus; (nomen ſubriceo) cujus cadaver, quod repentina morte occubiſſet, culro anatomico ſubjectum eſt, Atque pericardium adipe adeo obſitum animadverſum eſt, ut cordi conſtrictio debitam expansionem denegatam fuiſſe conſiderit.

OBSERVATIO XVII.

Mors ſubita à nimia pinguedine

REver. Joh. Muſonius Polonus, vir ſtatura procera, corporeque ob nimiam pinguedinem vaſto atque ad motum inepto, annos 58. natus, per aliquot annos de dyſpnœa, maxime inter eundem ſæpiſſime conqueſtus eſt, qui antea frequenter hæmorrhagiam narium fere uſque ad animi deliquium pariebatur, & ex eryſipelate pedis utriuſque ulcere laborabat: hic è conſilio noſtro aliquoties purgantibus uſus eſt, ob metum hydropis, ſed abſque commodo, nam respiratio in dies difficilior, facultasque vitalis debilior reddebatur, ut ſe tandem lecto committere cogeretur: Lecti & quietis pertæſus, aura liberiore frui geſtiebat, perſuaſus ſibi inde valetudinis aliquod emolumentum: Cum ipſum nullis rationibus à propoſito abducere poſſem, ille denique 25. Aug. 1669. mane Cathedram Templi conſcendens, habitaque concione Polonica brevi, circa meridiem rheda cum ſilia ſe vehi jubet ad vicinum pagum, milliare Germanicum ab urbe diſtantem profecturus; ſed dum vix quartam milliarii partem perficeret, rheda deſcendens ſubito moritur.

Cadaver ſectiõni traditum eſt, ubi poſt Chirurgicam apertionem, in abdomine ſupra muſculoſam carnem fatis amplam & robuſtam adeps, coloris ad citrinum vergentis; octo digitorum tranſverſorum craſſitatem ſuperans conſpiciebatur: Præterea in cavitate abdominis ichorofis humoris aliquid, in inteſtinali vero ſtatu paulo major copia: Sed viſcera omnia medii ventris, cor inſigni pinguedine præditum cum pulmonibus: In infimo, ventriculus &c. optime conſtituta: hinc conſtat obefitatem nimiam mortem acceleraviſſe. *Simon Schelſum in miſcell. cur. anni 1671. obſerv. 87.*

OBSERVATIO XVIII.

Mors ſubita ab irruente affatu in Pulmones ſanguine, ibique concreſcente.

PERumque onerantur ſanguine pulmones in moribundis, & in ſubito extinctis, ex irruente in pulmones ſanguine, ibique reſitante ob motum circularem ceſſantem, cauſam mortis non ſemel ſectiõne detexi. *Th. Bartholinus Traſſ. de Pulmonibus p. 27.*

S C H O L I A.

Sanguine ibi reſitante) Subſtantia pulmonum noſtrorum compaſſioſior videtur quam ut cum aribus vel tanſis comparetur: ſanguine plena eſt nec tranſigaret: Si vero æquæ lance rem utramque expendamus, facili cogemur & hominum & majorum animalium pulmones ſpiritu aëreo plenos eſſe, & adeo iæcos levioresque ut aquæ ſuperneant, evidenti veſicularum tenetate conſtitutionis argumento: Huic pulmonum poroſitati & levitati imponitur quidam cauſam, cur

ſuffocati in aquis poſt tres dies iterum emergunt natanteque: Unde pulmones eximere ſolent: Plerumque ſubmerſa cadavera fundum linquant: Præterea pulmones ad unum omnes, qui parenchyma quoddam habere videntur, ſevera carne omnia deſtituuntur, quia ſanguine in ampliffimis vaſis abundans, nec ita accurate exprimitur, remanet in pulmonibus, quibus coctis parenchyma maneat, & cibi ſolidi vicem pauperioribus præbet, quemadmodum

Naa 2 & ſar.

& facinoris, quæ vacuum intestinum sanguine repleat, si cognoscere parenchyma frangere possunt. Ceterum si debita diligentia pulmones corporibus exempti aqua eluantur, comprimentur manibus, per solum aqua immissa laventur, diuque subigantur, ut omnis proflus sanguis exillet, aliam faciem videbimus: candicabant, & præter membranosum corpus inspererit nihil. Plerumque obstruunt sanguine in moribundis, excurrente in illos sanguine libique resistente ob motum circulares cessantem: Ita nisi

fallit omen, omne quoque parenchyma, seu sanguinis affuso in hepate & liene, evanescit tandem solis fibræ vasique & membranæ remanentibus, si sanguis qui illis inhaeret & parenchyma sumptis manibus vel bacillis exprimitur, vel aceto coctum dissolvatur. Lienis ita parenchyma disparuit, & *signum deatellitæ* lib. 1. part. 3. cap. 1. tot vala, tot fibræ nervosae mire complicatae, magnam carnis putridæ locum implent.
idem ibidem.

OBSERVATIO XIX.

Mors subita à putredine quinti pulmonum lobi.

IN Carolo Sabauditz Duce nono (præter alia monstrosa) quintum pulmonis lobum omnes vidimus; tergitimus incidimusque, quem una cum aliis penulis vitiarum putridumque deprehendimus, Ex quo judicatum est, cum aliis ipsam inopinatæ & subitæ mortis causam fuisse. *Franc. Putes Apologia Anat. pro Galeno contra Vesalium.*

OBSERVATIO XX.

Morte subita abreptæ mulieris anatome cujus mediastinum plenum erat sero sanguineo, Pulmonis substantia pure referta Testiculus sinister vitiatissimus &c.

VIdua D. N. asthmate, febre, dolore pectoris corripitur: Die xi. morbi cum optime se habere videretur subito extinguitur: Aperto cadavere invenum est mediastinum plenum sero sanguineo: quod forte rupta membrana versus partem superiorem pulmonis, cumque arque asperam arteriam comprimens, subito suffocaverat: Univerfa pulmonis substantia referta erat materia purulenta: Testiculus sinister erat colore nigricante, cujus substantia interior veluti gangræna affecta apparuit. *Vide tit. de dolore pectoris.*

OBSERVATIO XXI.

Anatome viri morte repentina sublato, in cujus thorace reperta massa, saccum referens, in medio pendens, sanguine nigricante plena.

GAllus quidam, quadragenarius circiter, nomine Paris, Sigillorum sculptor sine pari, dissolutam diu vitam vixerat, sanus hic sibi & aliis visus, festo natiuitatis Christi, cum amicis quibundam lætus, ad mulram noctem bibens & saltans, male se habere coepit, & cubiculum petens in lectum se coniecit: Famulus dormire eum ratus, in quiete eum reliquit, at mane mortuum teperit: Contigit hic casus in Vestrogotia, in arce Leckoe Illustr. Dn. magni Gabrielis de la Gardie; magni Regni Sveciæ Cancellarii, qui artonitus obitam inprovisam rem, iussit ut causam repentinæ illius mortis perquireretur.

Dissecto cadavere, infusi ventris viscera omnia sana reperta; Thorace reformato, apparebat massa quædam nigra, sacci ad instar in medio pendens, quæ Pericardium erat, continens membranam cordis, Parenchymatis penitus consumpti loco, sanguine nigricante repletam: Pulmo dextra parte totus consumptus: Sinister integer quidem, sed fuscis plenus maculis. *D. Petrus Spelth in miscellanti curiosis ann. 1674. 75. & 76. p. 35.*

OBSERVATIO XXII.

Mors subita ab hydropæ Thoracis, Pulmonum motum impediente.

Vir Nob. Sexagenarius, per quadriennium, initio levi, post gravi pectoris angustia detinetur, qui tandem frustra adhibitis multis subitò, quasi fulmine vel apoplexia tactus, morte inopinata corruit.

Ad inquitendam inreritus causam, corpus post mortem aperio, discissaque cartilagine costis adnexa, mox aqua ex viridi citrina, cum impetu, ad eam profilit: Ulterius in sectione pergens, discisso mediastino, totum os pectorale caput versus reflecto, & ecce, Pulmo multis maculis nigris, diversis coloribus, instar spetmatis tanarum, occurrit, quo dissecto, sanguis nigerrimus profluit. *Iohannes Bilgerus Medicus Campodunensis ad Gr. Horstium tom. 1. p. m. 142.*

SCHOLIA.

EX his facile colligere est quod pulmo aque ciens, sese dilatare, prout par erat, ac spiritus fovere non poterit.

OBSERVATIO XXIII.

Mors subita à Tabæ & consumptione Pulmonum.

PUella etiam annorum diuturna quartana laborans, subito extincta: Aperto corpore, visi sunt Pulmones adeo contrahiisse ut nullum illorum vestigium appareret, sed ransum membrana plena purulenta materia, cum tamen *nunquam vel de tussi* (mirabile dictu) conquesta fuisset, velpus expuisset. *Ludev. Nannius Med. Antuerpiensis ad Zacutum, in Praxi admir. lib. 1. observat. 109.*

SCHOLIA.

NUnguem vel de Tussi &c.) Id observatum a Nic. Massa incidit apostemata in pulmonibus existere, quæ nulla comitetur febris, nec tussis: refert enim in *microsc. anat.* fol. 57. se quendam secuisse, cui in substantia pulmonis, parte sinistra, ulcus magnum, concavum & putridum inserat, in cujus ca-

vinatæ fuit sanies multa & prava: cum tamen doloris omnis & tussis fuerit expers: Veritabile ulcus illud enatum è tuberculo taud. in in pussum o: Cui vero absit tussis & expulsiō pizientie materia purulenta vide ut. de Phibf.

OBSERVATIO XXIV.

Mors subita ob Pulmones sicciore & vitium cordis auricularum, unde impedita sanguinis circulatio.

ANno 1652. initio Februarii mensis, ob inconstantem aëris intemperiem multi in urbe inopinata morte subito extinguuntur: Inter hos autiga in curru expitavit, natus annos 30. Longo autem tempore conquestus fuerat de abdominis doloribus ad jugulum ascendentibus, ut inde se crederet suffocari, nec levamen ante sensit quam presse thoracem & abdomen manu comprimeret, vel opposito fulcro sublevaret: Inspertatæ mortis causam investigaturus cadaver apertui & sequentia notavi:

1. In abdomige omentum invenimus putridum cum ingenti fœtore: 2. Hepar ingentis molis, ut utrumque hyponchondrium fere impleverit, colore sano sed duriusculum, imprimis sub ensiformi cartilagine: 3. Lien exiguus infra ventriculum, fibris membranisque mirum in modum vicinis partibus connexus & implicatus, figura singularis, referebat enim renes bubulos vel sullos, quatuor vel quinque lobis distinctus: 4. Ren sinister cætera sanus, incumbens lienis impressum setvabat vestigium, Liene uterque maior: 5. In abdomine inter membranas pleraque hinc inde vesiculæ à statu excitatæ: 6. Cæcum intestinum in sinistro hyponchondrio colo adhætebat: 7. In Thorace pulmones sicciore ad livorem tendentes, Sinister mediastino adnatus, Prope gulam & dorsum inflammatus, sicut & ipsa gula, unde vivus post cibum sumptum de dolore ibidem loci ingenti non immerito conquerebatur: 8. Cor insuaturæ magnitudinis & quovis bubulo majus: 9. Dextra cordis auricula amplissima, sed digitos transversos lata, sanguine turgida: Sinistra vero contracta, vix nucem æquans minorem:

SCHOLIA.

Paret hinc facile mortis causa: Pulmones enim exsiccatis motum inidonei, per venosam arteriam sanguinem non admittit per circulationem hac iutum, unde stagnans in ventriculo dextro & auricula

dextra hominem suffocavit: Quo accesserunt fluxus ex abdomine, qui pressio diaphragmate & angustato corde spiritum interchulerunt. *Thomas Baribolus uniu. 1. observ. 219.*

OBSERVATIO XXV.

Mors repentina à retorrída bile in arterias effusa.

Retorridam bilem in duobus, qui à valida pilæ exercitatione repentina morte sublatis sunt, in arterias effusam illic deprehendimus, in topi nigri speciem concrevisse. *Fernelius Patholog. l. v. cap. 12.*

S C H O L I A.

Billi illi retortide palpitationis cordis causam assignat *Fernellius*, quæ melancholia hyponchondriaca laborantes, & quibus lien artæ bilis copia turgescit frangat, cum ex ea per arterias, quibus mal-

lis lien perfusus est, æter ætque vapor promptè cor vicium lubit: Eisdem substantia, si cor per arterias invadat, lethum subito invehere poterit, oedum palpitationem.

OBSERVATIO XXVI.

Anatome hominis subito extincti, cujus valvule semilunares, ad aortæ ostium sitæ, ossæ repertæ sunt.

Sultor Parisiensis in vico S. Jacobi habitans, sanguineus, corporis habitus obærioris, non admodum senex, sumptuo jentaculo, domo egressus vix xl. passus ab ea aberat, quando de repente concidens expiravit.

Domum deportatus aperitur, & in roto corpore nihil morbosum, nihil p. n. repertum, nisi quod tres valvule semilunares, ad aortæ ex sinistro cordis ventriculo egressum fixæ, ossæ fuerint: unam dono accepti, coloris albicantis, adeo duratur vix cultro aliquid abscindi potuerit. *Carolus Rayger in miscell. cur. anni 1672.*

S C H O L I A.

Antam repentinæ mortis causæ fuerint, dubio, cum nec circulationem sanguinis impedivisse, aut Apoplexiam istam fortissimum introduxisse credibile sit: Osio corde cervi annosi inveniri non adeo rarum, ut in homine in solitum. *Herron* tamen in ho-

mine fortissimo, portionem arteriæ magnæ juxta cor in os rotundum vidit conversum: *Exc. Bartholinus in corde Phylisici, cent. 1. Observat. 50.*
In corde Ulabani VIII. Pontif. cent. ij. *Observ. 45.*

OBSERVATIO XXVII.

Mors subita ob corruptionem omnium viscerum vitalium & naturalium.

Vlego valetudinaria, præcedente cardialgia, vertigine, subito occubuit: Peritonæum, mesenterium, Intestina omnia, Jecur, Lien, Testes &c. corrupta erant, Pulmones purulenti. *Videl. 3. iii. de ventrû dolore.*

OBSERVATIO XXVIII.

Mors repentina à Corde flaccido, suppurato &c. vitio omenti, pulmonum, jecoris &c.

Quidam juvenis annos 24. natus, arte sigulus, cum pertransiret viam, quæ dicitur de *Mascontenti*, ad ostium proximum pulliar, introgreditur, & de doloribus ventris vehementer conqueritur: vix accessit Pharmacopola, cum faceret, qui ipsi postulant Theriacam affectum, animam agit & derepente moritur: Hæsitant amici an veneno potus fuerit, ideo ad Judicem criminales recurrunt, qui de more præcepit à Medico & Chirurgo cadaver visitaretur: Cadaver omnino lividum reperit: Plebs hac de re hominem fuisse veneno peremptum purar, qua de causa ut cadaver à Chirurgo aperiat jubeo.

Eo aperto, inventum est omentum semicorruptum, Intestina mirum in modum distenta, Jecur male coloratum, Pulmones circa costas putridi, Cor insuper flaccidum & suppuratum: In hoc casu satis mirari non possum, quo pacto vir iste sanus à cunctis haberetur, nec de ullo affectu conquereretur; imo nuprias brevi erat celebraturus: Neque tussis neque respirandi difficultas adfuit. *Petrus Poterius centur. 3. observ. lix.*

OBSERVATIO XXIX.

Mors ex improvise adveniens, à rupta pulmonis vomica & pure ad Cor penetrante.

S. 1. **N**on pauci inopinato è vivis horæ quadrante erepti sunt, In quibus dissectis non alia mortis causa comparuit quam repentina vomicæ disruptio in pulmonibus, è qua pus in cordis arcem penetraverat, ipsius vim extinguens atque obruens: Cumque ex his duo Medici essent percelebres, atramen nec febris, nec inappetentia, nec aliud simile præcesserat: Id mihi quidem persæpe ejus loci memoriam evocavit, quo inquit Hippocrit. Quibus suppuratio in corpore abdita non innotescit, ea propter crassitudinem vel puri vel loci delitescit. Etenim laud raro efficit obvolvantis densitas, ut nihil terrum à pure in cor vitæ fontem inspiretur. Omnibus tamen sic affectis, multo tempore antequam vomica rumpere, cruenta excretio processit è pulmonibus eaque cum tussi, adfuitque spiritus gravis ac fetidus, pectoris gravitas, pectoris levis oppressio & spiritus difficultas, quibus Tabes raro comes. *Fernellius Patholog. lib. 5. cap. 10.*

§. 2. Ut plurimum pus reperitur in ventriculis cordis eorum qui subita morte intereunt.

Jacobus Challeuvius Tract. de Origine & motu sanguinis p. 83.

S C H O L I A.

Hoc argumento quidam utuntur ad impugnandam sanguinis circulationem. Si humor ab arteriis in venas, & ab his transit in cor, sanguis, juxta leges circulationis, cor ingressus dira proculdubio inveniet symptomata, lyacopen, imo mortem subitam, si quid alieni & corrupti ipsi immixtum sit. Pars enim adeo nobilis inquinamenta ejusmodi non sustinebit citra noxam insignem: Respondeo Valere hanc objectionem apud eos quibus ignota est corporis economia. At si quis probe perpendat inesse corpori vitæ principium, quod illius custodizæ assidue invigilat, Calorem scilicet naturalem, qui alterare conatur, & probe temperiei restituere humorem in corruptionem abire paratum, si hic cum putredinis attingit gradum, ut in pristinum statum denegatus sit, rediit, tunc tem-

poris calor naturalis, quantum licet, illum à corde accet & propellit, modo ad hæmorrhoidales ablegans venas, modo ad alvum, urinas, menses in mulieribus, modo extra vasa propellens tanquam noxiam, unde abscessus, tubercula, &c. Idem calor naturalis si languet, nec par sit ferenda ejusmodi illuviei, succedunt languores, leipothymiz, imo mors ipsa. Interdum idem humor, lenso per cor transitu, leipothymias invehit, tandem vero plurimis peractis circulationibus, emendationem suscipit, pristinum induens naturam. *Idem ibidem.*

Pus in Ventriculo Eo ablegatum, sanguinis mediantē circulatione, ab abscessibus variis in corporis partibus generis atque disruptis, quod nisi celeri transitu ablegetur, virulenta vitæ principium destruit.

OBSERVATIO XXX.

Mors repentina ab hydropne Thoracis & Pericardii, ac vitio cordis nigro sanguine distenti.

JOh. le Mons Flandri, placida sed repentina morte extincti, cadaver apertum anno 1634. utrumque dextrum Pulmonis lobum, sed præcipue inferiorem ostendit nobis consumptum, ut sola membrana externa infæcius residua esset, adeo crassa, ut triplo pericardii crassitie ordinariam æquaverit. Non tamen membranosa hæc tota erat tunica, sed interiore facie quæ pulmones ambiebat: consistentia instar sevi crassa apparebat, candidans, non absimilis cartilagineæ costarum substantiæ, nisi quod ob mollitiem digitis contrectata in pulpam resolveretur, arcte utroque latere pleuræ adnata, inferiore loco ad diaphragma hydatides aliquot ingentes limpida aqua repletas formaverat, quæ fontis instar thoracis dextram partem aquarum copia inundaverant, & Thoracis hydropnem acciverant, Pericardium quoque multa aqua distentum, ultra naturalem excreverat magnitudinem: Cor ipsum longe naturam molem excedebat, flaccidum, nigro sanguine plenum: In sinistro latere uterque pulmonis lobus videbatur sanus: parenchyma quidem consumptum non erat, color tamen luridus, viscidæque materia puriformis passim inspersa comparebat. *Thomas Bartholinus cent. ii. Observ. 66. Ottho Heurnius observat. xiv.*

OBSERVATIO XXXI.

Mors subita ab appenso amuleto ex Arsenico, à quo cor siccum, nigricans & ulceratum fuit.

Refertur Nob. quendam qui supra cor venenatum illud antidotum (*pentaculum ex arsenico*) appenderat, pestis præcavendæ gratia, pila palmaria ludentem, è vestigio exanimem corruisse.

Cujus aperto cadavere, siccum, nigricans, ulceratumque cor apparuit, *Gualbertus tractatu de Pest.*

S C H O L I A.

Amaleta, præsertim ex autipimento illo fictio, quod Arsenicum crystallinum vocatur, ad arcendum pestis contagium magnopere à multis commendatur: ajuntque Ad. VI. Ponsil. Max. à peste quæ Romæ anno 1322. sævii, beneficio iaculi, arsenico repleti, atque è collo suspensi, immunes evasisse: At hæc de Arsenici & ipsa quamplurimi in dubium vocant, Erasius, Hor. Augustinus, Columba, Joh. Mathæus, H. Saxonia, Plautius: Quod Adrianus VI. à peste immunis fuerit, credo, at illam arsenici gestationem causam fuisse nondum exinde colligo: Multa simul finit quæ à diversis pendent causis: Atque ad stabilendam experientiam, non sufficit unum alterumve experimentum, sed vitæ prudentum longa ob-

servatione opus est. Plurimi contra tempore contagii serpentis, ejusmodi amuleti gestatione, non modo non adjuvi sunt, sed citius aliis pestilentiæ sue fuerunt polluti, teste Vntzro: E contra plurimi tale præsidium suseque deique habentes, vel idem non abhibentes, adhibitis diversarum probatis alexicæcis, à contagione maligna incolumes servati sunt. Addit *Gualberti* commentator, ex Sculi cujusdam Medici relatione, Juvenem quendam, pila palmaria ludentem, de repente in sphaeristæio extinctum, cui ex collo iaculus arsenico plenus pendebat. Paravinus M. dicit, inquit, potro scripto prodixit luctu perituræ, qui hujusmodi iaculum gestabat, cum incaluisse, in ad nem febrem malignam incidisse: In quibusdam Aulicis

Non 4 observum

observatum, inquit, qui huiusmodi venenum cordis regioni applicuerant, toto pectore erupisse pustulas, ex vi arsenici caustica ac maligna: Visi sunt alii, m-

qui, animi deliquio passim concipi, ex gestato imbi deliterio illo amuleto, qui eo ablato protinus con-

OBSERVATIO XXXII.

Mors subita à Cordis corruptione & pericardii consumptione.

IN Equite Aurato deprehendi penitus absumptum Pericardium, ut ne vestigium ejus restaret, Corque ipsum ira corruptum, ut ejus substantia butyri instar mollis fuerit, digitiq; in apprehensione facile penetrarint. Ægrum tamen quadriduo ante mortem chartis ludentem vidi. *Rob. Flud. à Fluctibus lib. 4. Anat.*

OBSERVATIO XXXIII.

Mors subita ab alterato ventriculi fundo.

VXor N. diarrhoea affecta interit, cum nihil minus quam de morte cogitaret: Inventus ventriculus in fundo ulceratus. *Vide lib. 3. tit. de Diarrhoea.*

OBSERVATIO XXXIV.

Mors subita à subito bilis in ventriculum confluxu.

Prospere N. cum diu ictero laborasset, & subito ex bilis in ventriculum confluxu expirasset, Jecur habuit magnum, durum & viride cum grandi liene. *Vesalius.*

OBSERVATIO XXXV.

Mors subita in quodam cui ventriculus vinculo quasi strictus videbatur.

PResum, Medicus Romanus insignis, retulit se in Anatomica sectione Lienem quasi vinculo quodam ita cinctum vidisse, ut geminum Lienem repræsentaret: Vinculum vidimus nos in ileo levi intestino, de quo in vulvulorum observatione. *In stomacho auctori repertum fuisse in fratre Advocati Citadini, præcipiti fato è vivis sublato.*

S C H O L I A.

Vnde hi orbiculi oriantur, An à mala compositione in ipso ortu, an vero à morbo Medici contemplandum relinquo. Tamen in Liene ex primo octo evenisse existimarem, non sic in stomacho & inte-

stinis, ubi villi circulares ob ingentem caliditatem & siccitatem contracti cingulum efficiunt: Exemplum habemus in lyre nervi, qui prope ignem positi statim contrahuntur. *Dum Patensius Prætor. Observ. xi.*

OBSERVATIO XXXVI.

§. 1. *Mors repentina à bilis in ventriculum effusione.*

Prospere Marcellum, qui multis annis regio morbo laboraverat, insperat à subitâq; morte, ut Belloarmarus, interierat, dissecui, quo mortis causam inquirerem, quæ bilis in ventriculum injectio erat præcipua. Is enim sola bile occurrit turgidus, una cum jecoris scirrho, & illius contractione, seu in unum condensatione; cum Lien interim mollior & grandior naturali esset, sanguinique parando subservire videretur, Bilis tamen vesicula duorum pugnotum magnitudinem facile adæquante, & exiguis lapillis quodammodo plena, qui invicem connexis granis, seminibusvè milii, aut potius asperæ superficiei vulgaris officinarum rutæ erant quam simillimi: Ubicumque venas aperirem, nihil præter densissimam bilem inveni, Imo & in arteriis occurrens liquor, manus non minus quam bilis ipsa tingebat. *Vesalius Epistola de rad. China.*

§. 2. In Nicolæa Honorévisi est summa bilis effusio in intestina: Cystis fellea videbatur exhausta: Fernellus cap. de morbis Cystis felleæ, meminit quosdam interisse, in quibus nulla interitus causa alia comparuit, quam quod folliculus fellis exhaustus esset. *Ballonius Ephem. & Epid. lib. 2. pag. 201.*

OBSERVATIO XXXVII.

§. 1. *Mors subitanea à pure ex abscessu rupto, & pure in intestina confluenta.*

Ostendimus in puellæ dissecto cadavere, quæ cum optime habita omnibus videretur, in levem quandam febrem incidit, intermittenti Tertianæ haud dissimilem, sine dolore in

lore in febre: Ad eam circa mediam noctem vocati, quod levi animi deliquio laborasset, cum rigore quodam, quem paroxysmi initium esse putabant, prædiximus abscessum in ventre ruptum, ex quo brevi interitura esset; Id cum alteri Medico absurdum videretur, ac brevi illa obijisset, Dissecto corpore magna puris quantitas circa uterum inventa est, quæ ad superiores usque partes redundabat, cum intestinorum eolore subnigro. *Iacotini comm. ad aph. 9. lib. 3. sect. 2. C. Cocar. Hipp.*

§. 2. Ac nos quidem ter superiore anno observavimus, in febre tertiana cum rigore non ita ordinato, exortam suppurationem in imo ventre, cujus nullum signum memoratu dignum præcesserat: unde subito effuso pure supra intestina, aut intestinis ipsis ad sphacelismum perductis, improvise mors sequuta est, cum rigore, sudore frigido, animi deliquio, sudore, ventris & inflatione. *Idem comm. ad aphor. 76. lib. 5. sect. 2. Cocar. Hippocr.*

OBSERVATIO XXXVIII.

Mors repentina à vermicibus ventriculum perforantibus.

O B præteriti anni humilissimi intempericm, corrupto fœno, pecudes initio veris anni 1649. catervatim in Dania moriebantur: In dissectis bobus visæ in ventriculo vesiculæ plurimæ vermicibus scatentes, à quibus erosus credebatur ventriculus illis quæ sua sponte moriebantur. Author est Trallianus l. 7. c. 9. frequenter lumbricos sursum ad os ventriculi ascendentes, cardiacos afflicti, immodicas animi defectiones, syncopas excitare, ut nonnulli statim, cum à lumbricis roduntur, intereant. Hinc sæpe mors inopinans infantes adulescentesque opprimit, sine causa manifesta, ex ventriculo à vermicibus perforato, præsertim si ad stomachum pertingant. *Th. Bartholinus hist. 77. cent. 4.*

OBSERVATIO XXXIX.

Mors subita ob Fungorum esum, à quibus redditum Hepar turgidum & albidum.

D ie ix. Novembris 1651. Montispeffuli, non longe ab ædibus Dom. Vendemian hospitibus mel, mortui sunt Pater, filix dux, & vicina ob hesternum fungorum esum: His dissectis inventum Hepar turgidum & albidum. *I. Nicolæus Binningerus cent. 1. Observ. xxviii. 1.*

OBSERVATIO XL.

Anatome cujusdam subito extincti, cui gibba Jecoris pars ulcere affecta erat.

I llustriss. Renata Ferrariz Ducissa, iussit ut famulum quendam Gallum, repente mortuum, aperiri facerem, ut qua morte obierit decerni posset. In Jecoris gibbo ulcus inventum est, quod ad suppurationem devenerat. *Brassavolus comm. ad aph. 18. sect. 6.*

OBSERVATIO XLI.

Anatome mulieris repentina morte sublata, In cujus hepate lapis repertus.

E xeell. Comitissa Nadasti, cum esset in proclinctu partus, derepente extincta fuit: Aperto, ut fœtus baptisaretur, ventre, repertus fuit lapis magnitudinem ovi anserini referens, ponderis levissimi, intus candicans, ac si ex contritis diadematibus coagmentatus fuisset, Lapis autem hic adhærebat tunicis hepatis. *Pauli de Serbati Præf. Fiennenj in Mithæell. curiosis anni 1671. Observ. 106.*

OBSERVATIO XLII.

Mors subita à ruptura vesicæ fellæ.

A nno 1654. in mense Novembri, accidit Rostochii, ubi exorta inter conjuges lite, cum alter alterum baculo percussisset, in apoplexiam, vel potius in lethalem leipothymiam, illico conjux vapulans resoluta interiit: Quare convocatis Medicis cum Chirurgo, deliberatum fuit de causa tam repentinæ mortis, Alii ad principium nervorum obstructum à materia ab ira commotæ recurrebant, Alii alia afferebant.

Sed ubi in dissectione ad vesiculam fellis perventum fuerat, aliis illæsis partibus illam ruptam invenerunt. *Simile quid apud Benivennum cap. 110. Frideric. Hofmannus meth. med. cap. 20. lib. 1.*

OBSERV.

Mors subita à sanguine à Liene putri effuso.

J Formageus de hypochondriorum doloribus conquestus, & præsertim sinistri, in quo ingens pulsatio, derepente interijt. In Liene putri & magno sanguis concretus erat, qui è proprijs vasis effusus, tandem ruptis tunicis quibus concludabatur, inopinatam mortem intulit. *Vide tit. de Febribus lib. 4.*

OBSERVATIO XLIV.

Mors subita sequuta Vasorum rupturam & sanguinis intra corpus effusionem.

§. 1. **Q**uidam lumborum doloribus affectus, emaciatius, repente interijt: Dux lumborum vertebræ corrosæ repertæ, una cum aortæ & venæ cavæ rupturæ, unde magna ex utroque vase facta fuerat sanguinis eruptio. *Vide tit. de Lumborum dolore.*

§. 2. Chirurgus (de quo tit. de Lumborum dolore) calculosus creditus: Difficultate quadam respirandi prehenditur, hinc vix advertentibus adstantibus moritur. In sinistro pulmonum lobo copiosissimus sanguis concretus repertus est. Vena cava, qua spinam decurrit, corrofa.

§. 3. Uxor N. Doloribus parturientium corrupta fuit, subitòque exstinguitur: Ventris vacuum sanguine seroso repletum erat: venæ nonnullæ in parenchymate hepatis, & circa os sacrum, ruptæ fuerant à violento motu infantis. *Vide lib. 3. tit. de Partu difficili.*

§. 4. Quidam ex aneurysmate arteriæ verrosæ repente rupto vase corruit: dissecto cadavere magnam sanguinis copiam in thoracis capacitatem effusam inveni, arteriæ vero corpus in ampliudinem dilatatum, internamque ipsius tunicam ossicam. *Vide tit. de puls. p. n.*

OBSERVATIO XLV.

Mors subita ab Abscessu Hepatis, Sanguine circa id extravasato, & Foetu in utero mortuo.

Nobil. Matrona annorum 38. temperamenti calidi & humidi, habitus carnosus, coloris rosei & floridi, acris ingenii fixæque imaginationis, postquam xvi. partus feliciter in lucem edidisset, tandem xvii. vice concepit, quem conceptum cum ultra tempus consuetum gestasset, sibi præfagium fecit ultimam hanc uteri gestationem fore fatalem. Dictum factum, cum enim tempus pariendi ipsi fuisset præterlapsum, nullique apparerent partus indicia, æconomicis operam dabat, ita ut vix unica die, antequam naturæ debirum persolveret, lecto affixa hæreret, & obstetrici se submitteret, quo tempore subinde tormina & dolores in diversis abdominis & lumborum partibus percipiebat, qui tamen proportionatis adhibitis remedijs cessabant, ita ut desuper se melius habere mulierculis indicaret: Quid sit? sumpta cœna ex improvviso convulsione epileptica corripitur; accurrunt omnes, sed frustra, jam enim natura succumbente animam suo reddebat creatori: Circumstantes tetrore perculsi apertionem cadaveris urgebant, ut fortis, si adhuc vitalis, salvari posset: Vocatus Chirurgus proprecanti manu uterum discindit, sed nihil vitale in foetu, sed potius cum jam ante biduum fuisse extinctum, experientia edoctus confirmat: erat enim totus lividus, & gangrenæ indicia præ se ferebat: Secundinæ etiam putrefactæ, uteri cornubus firmissime annectæ, & nonnisi summa cum violentia poterant avelli.

His perspectis, Hepatis constitutionem explorare fuit desideratum: tractatur cultero anatomico hepatis, sed totum corruptum, & manu Chirurgi in centum particulas, instar lanæ, discerptibile; In cujus cava parte ingens se monstrabat abscessus, quo disrupto materia heterogenea copiosissime prorumpebat, cum sanguine grumoso diu extra venas fuso & refrigeratam, non exigua calidum innatarum extinguendi occasio. *Tobias Czaskelius in Miscellaneis curiosis anni 1672. Observ. 267.*

SCHOLIA.

IN hac història offerunt se nonnulla inquisitione digna, 1^a. quæ ratione Nob. Matrona cum tanca hepatis corruptæ colore faciei tam floridum, album & rubicundum habere ponerit, cum color bonas sit character? Illi Hepatis color vero melius vitæcum latens vitium ostendit? 2. Utrum hic casus non confirmet quod pulchiores & colore vividiores citius intereant? Incertum est natura pulchriorum celerius

aliis morientium Pulchiores citius intereant, ajebat Cardanus, quia plurimum habent calidi innati, quod sua activitate facilius depopulatur humidum radicale: licet enim color vividus optimus supponat humores, intellige de humoribus in superficie, non autem in centro existentibus: hinc Alexander Perizonius dixit, ideo homines magis coloratos citius interire, quia humor deterior in centro consistit. Recte Casus, Qui

nidiores

nitidiores sunt sua bona suspecta habere debent. s. indagandum est. Cum Hepar totaliter corruptum fuerit luventum, & præcipuum sanguificationis organum credatur, quoniam pars vices Hepatis egerit, & sufficientem pro nutritione sanguinem pro matre & fœtu

suppeditare poterit? Nonne & dicendum cum Hippocr. lib. 4. de morbis, Sanguinis fons est cor: Idem vult Aristoteles, & cum his sentit tota vicorum doctrinæ huius sæculi corona, ut per anatomiam omnibus notum esse potest: Idem ibidem.

OBSERVATIO XLVI.

Mors repentina à Pancreate sphacelato, Pinguedinis copia in partibus internis, &c.

Vt quidam temperamenti calidi & humidi 42. ann. sæpius reiterata colica, non tamen adeo intensa dixeratur, applicato clystere catminativo sedatur semper dolor, excreta materia viscosa, tremula, instar vitri fusi transparente: incipit vesperi circa Solis occasum conqueri de frigore interno, Sole alias tota die satis potenter urente, incidit in colicam ordinariam, paritur deliquia, adhibentur debita remedia, sed frustra; applicantur calentes latres, sed eos non sentit, applicantur clysteres, sed excreta similiter urante materia dolor non remittit: datur laxativum, sed facta bona operatione augentur symptomata, & spatio 18. vel 19. horarum moritur sine convulsione, sine minima violentia, aut in agone solito accidente, ita ut illum potius obdormivisse quam mortuum esse adstantes putaverint.

De hoc funesto tamque repentino casu amici solliciti, me ad cadaveris apertionem vocarunt; Prima statim abdominis sectione tantam pinguedinem inveni, ut similem in saginato porco nunquam quisquam viderit; profunditas huius pinguedinis se extendit ultra pedem, præ eadem pinguedine nullus musculus apparebat in abdome, sed tantum membranz videbantur: Omicntum erat mera pinguedo scitihosa, in formam globi contracta: pinguedo intestinorum maiorem occupabat locum quam ipsamet intestina cum excrementis infarta: erat denique stupenda pinguedinis machina, qua excepta, reperi Pancreas plane sphacelatum, in cujus defectum natura aliam similem massam suggestit rotundam in dextra parte, versus hepar, huic sphacelato adnatam, per cujus medium, instar rami Wirsungici, dispersæ erant venulæ, sed sine ordine: hoc sphacelatum Pancreas infectis similis contagio, non tantum adjacentes omnes partes, sed etiam diaphragma penetrans, finitrum Pulmonum lobum plane, sicut in Tabæ absumpsit, & copiosa, ingentis licet, sed flaccidissimi cordis, pinguedo maiorem thoracis locum occupavit. Hepar assimilabatur Sanguini grumoso in colore & substantia: in cujus vesicula fellis replebantur 4. lapilli majores cubici, una cum innumerabilibus pene aliis minimis, etiam quantum videre licuit, cubum referentibus. Huic vesiculæ fellis erat in fundo adnata alia tunica, quæ alium aliis omnibus maiorem talem cubicum lapidem continebat: hæc lapidum massa ponderabatur simul ʒiij. ʒvj. bilis cum his lapillis permixta, erat coloris intense viridis, & saporis acidi magis quam amari. Statura huius corporis erat magna & vasta, sed habebat ossa sicut subtilissima quædam puella, musculos plane exiles, magis membranofos quam carnosos: Ego curiositatis gratia, ob stupendam pinguedinem in variis partibus corpus modicum aperui, sic secundum sensum conjecturaliter judicare possum corpus illud ultra 8. vel 9. ad summum 10. libras carnis non habuisse, quin tota reliqua corporis machina mera pinguedo fuerit. I. Georgius Greifselius, in miscell. curiosis anni 1673. Observ. 45.

OBSERVATIO XLVII.

§. 1. Mulieris mors repentina, cui Testiculus dexter mirum in modum intumuerat.

Legduni anno 1578. quum subito mortua esset mulier quædam sola, & suspicio esset de vi aliqua illata, Ego, imperante magistratu, corpore interne & externe rite prius inspecto, nullam causam subitanæ mortis repetire potuimus, præter eam quam magistratui retulimus. Nempe Tumorem magnum Testiculi dextri, ob copiam pilorum & marenæ similis sevo, cum pure: Unde *matricis suffocationem* violentissimam & lethalem excitarum fuisse verisimile est. Ex Observat. Joh. Bauhini Medici Legdunensis.

§. 2. In virgine triginta annos nata, pallidis coloribus divexata, & quæ repentina & inopinata morte fuit sublara, inveni Testiculum sinistrum pugno maiorem, intus humore seroso & subflavo repletum, foris vero sanguine suffusum. Riolanus Anthropol. lib. 2. cap. 30.

OBSERV.

OBSERVATIO XLVIII.

Mors subita ab uteri gangræna & corruptione.

DOmnia N. sensum emarcuit, omne alimentum fastidians, ac subito est extincta. Uterus corruptus erat, & quasi gangræna affectus, plenus tabo & sanie. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

OBSERVATIO XLIX.

Anatome mulieris subito mortuæ, in qua nihil repertum præter Testicularum alterum corruptionem.

IN muliere subito mortua nullam causam invenire potui præter tumorem magnum Testiculi dextri, in quo pili, pus, &c. *Vide lib. 3. tit. de Hystericiæ affectibus.*

OBSERVATIO L.

In cadavere mulieris subito mortuæ, & perpetuo cum magnis ejulatibus querule, uterus convolutus inventus cum binis embryonibus, & lapide in cysti fellea.

ANno 1654. Uxor Bernardi Gießen, ex Hernia umbilicali mortua est, cujus vesica fellea quinque lapillos continebat, ponderis gij. Porro, cum Parens *uxor me* Offembachium ab Illust. Principissa Isenburgica anno 1656. 9. Jun. esset evocatus, ob subitam mortem alicujus administratricis famulæ, cum magno ejulatu continuo querentis de duabus mulieribus, ac si virgis ab illis sine intermissione caderetur, quum tamen nemo adstantium domesticorum aliquid videret, Is & ego tum temporis ex Ducatu Wirtembergico redux, cum duobus Chirurgis causam obitus exploraturi sectionem instituebamus, &c.

Aperto cadavere, sana omnia inveniebamus viscera, nisi quod uterus bis esset convolutus, binis embryonibus masculis, digiti longioris magnitudine, & elegantioris formæ imprægnatus: Præterea in vesica fellea calculum formæ ovalis, (*distillum integrum referentem*) pondere tunc temporis ʒʒ. fere, modo vero gij. ʒʒ. quem inter rariora mea condo, *In Miscell. cur. annor. iv. & v. p. 302.*

S C H O L I A.

Vterus convolutus) Hunc morbum vocat Hippocr. acerbissimos ad immum ventrem mortuæ: Huic re-
Complicationem uterorum quem *Balsamus* Epid. pertus est uterus omnino revolutus &
lib. 1. observavit in Ducissa Lotharingæ post dolores complicationem.

OBSERVATIO LI.

Mors subita ob vomitum in Cerebro excitatum.

NOb. duo vulnera in capite accipit: Cum utrumque pene consolidatum esset, & æger periculum evasisse videretur, præter expectatum extinctus est, exacta 4. septimana: Dura meninx sphacelo correpta erat: vomica in contigua cerebri parte latitabat. *Vide lib. 4. tit. de vulneribus.*

OBSERVATIO LII.

Mors subita ob influxum feri in quartum cerebri ventriculum, Nobilem dictum.

TAnta est ventriculi quarti dignitas ad Vitæ conservationem ut eo tacto confestim pereat animans, ex subita jactura spirituum: ideoque Galenus sectione spinalis medullæ in occipito animalia enecabat: eoque modo mactari pecudes in Græcia recitat. 7. de administr. Anat. Unde si contingat ferolum humorem in eum ventriculum subito & confestim irruere, de repente etiam sanus homo extinguitur, atque suffocatur, sine ulla convulsione: Ut in quibusdam observatum, qui reliquas corporis partes sanas habebant: ideoque raro in aliis cerebri affectibus lethalius, nisi repentino isto casu, moriuntur ægri, quartus hic ventriculus humore diffusus reperitur. Ut huic incommodo prospiceret natura, repagula interposuit humores intercipientia: Quare si quendam videbis subito & inopinato mortuum, illico tentabis exsiccationem cerebelli, & revulsionem humoris illapsi in quartum ventriculum, profunda unctione occipitis cum ardenti carbone, vice candentis ferri, quod semper non est ad manum, & ad cujus ignitionem opus est tempore, Præsidia cum festinatione ibi rapienda. *Riolanus Anthrop. lib. 4.*

OBSERV.

OBSERVATIO LIII.

Mors subita à fracto offe temporalis sub ipso musculo.

FRacto offe sub ipso musculo, omnino lethale est, ac proinde sectio musculi est supervacua: quod & ego sæpe vidi, & publice frequenter theatro demonstravi, in quibusdam solam rimam in offe subjecto musculo temporali, repentinæ mortis causam fuisse, cum falso apoplectici haberentur, sola præsentè confusione, quæ nonnisi gravis, cum offa subjecta frangit, & musculum ipsum, tum partes internas ipsius cerebri, unde certa mors. *Marchetti sylloge Observ. 15.*

S C H O L I A.

Repentina mortis) Læso cerebro quodam evadere, alios vitam diu protrahere; quodam repente interire certum est. Phurim ad cordis consensum recurrunt, Sed ex fe, sine hujus consensu, mortem inducere quid verum? Ratio pendet ex cerebri nuclei conditione, quo vel leviter læso, sive ab interiori in-

cidente, sive punctura exteriore, animas inopinato mortis genere prosternitur, Sic Sub Alpini Ianones sola acus in cervicem immisione boves necant, Quippe interior ille nobilioris cerebri recessus, quem medullam vocant, animalis viæ tenet arbitrium & potestatem.

OBSERVATIO LIV.

Mors repentina à sanguine in ventriculos cerebri illapso, ibique concreto, Plexu choroidæ quasi contuso, Pulmonibus lateribus annexis.

Illuſtr. & Reverendissimus Episcopus Vivariensis pectus seminaria, variis in locis pullulantia, excludere satagens, scripsit ad me & Dom. Arque D. M. citatissime equis advocavit, quo causas rimatetur mortis Marronæ cujusdam septuagesimo tertio ætatis anno subita extinctæ: Eo cum pervenissemus, inspecto cadavere, illico asseruimus *apoplexia tactam* inretitisse: quod aperto cranio amplius innouit, reperti enim in ventriculis cerebri tres grumi sanguinis, unusquisque amygdalum suo cortice involutum æquans. Reſerato vero rhorace, pulmones arctissimo nexu costis affixi apparuerunt, qui vix sine laceratione distrahi inde potuerunt, quæ asthmaſis diu ſarigantis causa fuerat. *Iosephus Covilliarum Observ. Iatrobirurgic. Gallicæ editarum xxxvii.*

OBSERVATIO LV.

Mors subita, cujus nulla causa intus in corpore reperta, à venenata aura cor subito opprimente nata.

VIdi juvenem subito mortuum, cui statim post obitum, extra, in regione cordis, sydera: rior, seu livor ingentis latitudinis apparuit: Intus, (urper *autopsia* videre licuit) nihil mali fuit repertum.

S C H O L I A.

Hoc quid aliud fuit quam venenata quædam aura per longum tempus deliſcens, quæ tunc demum vel ſylæum influxu, vel quâ viâ alteratione, quali è somno ſuſcitata, nullum sui veſtigium in parte in qua ſuiſi orta & ſervata relinquit, proprio, ſed occulto impetu, Cor, viæ fontem, cum quo venena inimicitia gerunt, eſt aggreſſa? Sed non ſolum cor, verum & cerebrum hujusmodi hoſtilibus incurſionibus eſt obnoxium: In memoriam revoca hiſtorias à *Galen*

narratas 3. loc. aff. c. 7. duorum adoleſcentum, quibus aura ad caput aſcendebat, ex iſtibus iniitium capiente. Venena enim quæ nobis inſuaſantur (Gil. 3. de loc. c. 7. & lib. 5. c. 5.) in locis in quibus fuerunt: genita, quaſi connaturalia illis, nihil nocent, poſtea ſi quavis occaſione agitentur, vel cor petunt & occidunt, vel cerebrum & epilepticos inſultus inducunt. *Rodericus à Caſtro. l. Quæ ex Quibus cap. 7.*

OBSERVATIO LVI.

Mors subita ab impedito sanguinis ingreſſu in cordis ſiniſtrum ventriculum.

Virginem aliquando Baſilæ, robuſtam prius & bene valentem, oborto repente aſcite, inopinato mortuam, diſſecimus, in cujus ſolummodo corde, intaminatis reliquis viſceribus omnibus, virtutum latuerat.

Cuius ſubitanæ mortis, & hydropis, alia cauſa non erat quam vinculum arteriæ venoſæ injeſtum: quippe mitrales valvulæ in oſſeam ſubſtantiam penitus occalluerant, oſtium, quominus in ſiniſtrum ventriculum penetrare ſanguis poſſet, præcludentem. *Ioh. Conradus Peyer in methodo hiſtor. Anatomico Med. cap. 6. p. 64. & 101.*

Mors subita interdum contingit ob Renes pinguedine onustos.

Observabis diligenter adipem Renibus circumfusum, qui non solum instar fomenti, sed etiam emunctorii & spongiz modo comparatus est, ad excipiendas sordes Renum, Inde morbosæ Græci *œneiperæ* vocant, quoties Renes indequaque pinguedine obruuntur: Hoc malo magis afficiuntur animalia, quæ sevo pinguescunt, maxime autem ovis, ut etiam intereat. In causa est pabuli ubertas, qualis in Leontino agro Siciliæ: Hinc *Aristot.* 3. de part. animal. cap. 9. ait, Cum cæteris animalibus Renes habere pingues proficiat, & plerumque totos obesos habeant, Ovis hoc lethale est: Quamobrem hominibus etiam qui vitio Renum laborant, quanquam pinguescere juvat, tamen si pingues admodum efficiantur, dolores profecto accidunt lethales. Itaque humore flarique intercluso *celeriter praesideratione intereunt.* Namque per venam & aortam statim vitium ad cordis sedem transvehitur: meatus enim ex illis venis ad Renes continui pertendunt. *Riolanus Anthr. lib. 2. c. 26.*



ANATOMIÆ PRACTICÆ

LIBRI SECVNDI.

SECTIO XII

De GIBBOSITATE.

OBSERVATIO I.

Gibbositas ob sinistram Pulmonem & Pericardium firma cicatrice costis adnata.



VIDAM purulenta tussiens, circa diaphragma sinistram vehementissime doluit, tandem æticide obiit: Aperto cadavere, parenchyma sinistri pulmonis fere totum consumptum; bronchia vero relicta cum paucis parenchymate, & ipso pericardio firmissima cicatrice, seu callo, costis adnata coaluere, ita ut propter diuturnum dolorem, hoc latere compresse depressoque, gibbosus altero latere factus fuerit mihi. *Sal. Resiclini in miscell. cur. anni 1673. Observ. 191.*

SCHOLIA.

Gibbosis, H. Meniali definitore morbus est tum in situ tum in figura, non solum rectitudinem corporis depravans, verum & flexionem, ad posteriora saltem, non parum impediens: Præter hæc est imperfecta Sitis emorio, sub qua juncturæ, manifestis luxatisque vinculis diducuntur & hiant, rariu modo serrata rectitudine. *Galenus* primus hanc invenit *æmæ* appellatam, quæ laxatio & abductio quædam est, ipso latiore relicto vertibulorum, cui vitio pueri puerum ob nervorum mollitudinem suos obnoxii.

Fir Gibbet ab abscessu, nedum communiter, sed & proprie dicto: Natura autem quæ hominis celestis lux originis indagatoris sublimes vultus, cum respondens in rectum, sed Scalis corpore patitur, architectata est spinam, id est, ventriculatis offibus & cardinis modo instructis, in longum altam compagem, quæ sic corpus sustentat ut capere (*capere*) navem: Hujus autem ipsius omnes naves, arque telluris, qui tum cervicis, tum dorso lumbisque discedit sunt, extrinsecus ligamentorum apothecia firma, & cranio derivata, & à prima cervicia obli. ad inferas ulque producta, convellit atque contrahit: cui succum quandam pinguem lentumque vertebra, motum conservando commodum

perpetuo subdidit: Cui naturali linimento postea temporis commissa inerte vitiosa picea, quæ consertim è superioribus demissa irrunt, ædum quidem doctus nervorum, qui per osses illas coagmentationes exiliant, sed etiam ipsarum vincula, quæ modo dixi, distendit ita, ut sæpe tua de sede revelet, ac tuos uno quidem situ, nunc alio concoquat: Quam eversionem modos tres fecere, tum primus *Hippoc.* in lib. de artic. partic. 1. 2. 7. 11. 68. tum *Galenus* ibid. ac lib. 4. de loc. c. 3.

Una scias perversio est extorsum, cum vertebrae recedentes ali æqualitate laterum in medium ipsorum abscedentes, & se coarctantes in unum quasi tum binant eorum: Hæc *æmæ* & *æmæ*, homines vero his affecti & cæci à *æmæ* Græce dicuntur, Affectionem vero Gibbet, corpus vero Luxum & Gibberosum dicere censuere Latini: Alter modus est intorsum, qui sic cum à naturali rectitudine in hunc suum raptam ipsodilia, simam & velut inflexam doctipartem relinquunt. *Leschi* hæc à primoribus magistris, Divaricatio vero & Reproditas à nostris est nominata: Testis est ad Spinae latera constitutus, tum dextrum tum sinistram, quem *Gæcia* *æmæ*, Obliquitatis vero nomine Latini exullit: Est autem sic dicta quod scolio, i. e. libræque tectilem sepeantem refert, ipsarum similitudine.

Adve. vi

Adverti Gibber extrorsum frequentissime fieri, non infrequenter etiam ad latera, verum ad anteriora per multum insolens esse, auctor *Hieron. Fallopius*. Eam scilicet ob eandem quod antea inter binas vertebrae interjecta cartilago multa, non potest tunc fieri quin impulsus omnis spinæ retrahatur, id quod aliis suis inflexionibus non accidit. Illud enim animadverto necessarium, quod cavo partis minus respondeat oportet convexum alterius adverti, eamque si thorax sit thorax posticus, cavus erit antiquus, & contra, si dorsi sit cavitas, pectoris ruber erit. Sic quoque cum cavitas in altero latere facta fuerit, continuo in adverso respondebit ruber, quamquam non ita localiter hoc ut in prioribus, nisi magna laetis facta fuerit divaricatio.

Causa advena, &c. Singulae distractiones illae dorsi, communes quidem saepe, sed privas etiam agnoscunt causas: communes quidem exeternae sunt, id est, quodcumque grave durumque corpus qualitas, alidit, percutit: plurimum autem harum causarum vertebrae ad interiora compelluntur, qualis est casus de sinistrata in vestem spinæ, à Galeno narratus 6. de loc. aff. 4. Haec quidem manifestas, sed & ceterae sunt causae, de quibus mor. audis, si simul appropies referent modos quibus hi, qui jam peribant in ista sede nodi depravantur. Hi Galeni esse 3. de loc. causae sunt & spasmus communes, quae sunt ficietas & plenitudo, Siccatas & signalis primus meminit de caus. Pul. c. 11. cui addidit & fignus inmodicum, à quo ceu gela convulsiva intentio est, Sed & inaequalitas interpetes, eodem auctore, distorquere potest et censendi, Siccatas in ardente febri potissimum visitur, casus febri vi aefacta viacula vertebrae, has in anteriores pertrahunt, ut & cervicis interdum, affirmant Hippocr. 4. aphor. 34. si à febre duntaxat collum pertrahatur, & alium devorata vix ipsi possit, sine vitiis tamen labale. Mens est Hippocr. colli vertebrae in febri distractionem commisit, sic contractione & alidit abluantur liber ligamento, & quae has sequuntur ossa verticilla.

Ex adverso plenitudo est distorsio maxima saepius etiam distorcionis parit: itaque inflammationes & scierhi, abscessus & quocumque erudum tuberculorum generatio: breviter omnes praeter naturam interiores vicinas partes ad se retrahere valent, res haec de vertebrae Medicis difficillima investigata, quae verba sunt Galeni lib. de caus. Pul. & lib. de loc. aff.

Causae autem interae externaeque ut separatim locae vertebrae possunt, sic & itaqueque possunt liberet ad iovicem coefferent, nempe via procraistica fortisecus impulsu facto vertebrae adurget in anteriora, torior vero, quae plenitudo est, distendendo, ficietas contrahendo eo verum etiam adducit.

Vertebrae quidem ossa per se, neque perventur à Tuberculis neque trahuntur, sed primam vim fit in his corporibus quibus vertebrae alligantur. Igitur ubi ad vertebrae Tuberculum oritur, ac tunc in uno-tem affurgit atque augetur, ab interiori live priori parte (utroque enim vocabulo licet uti) necesse est ut tuberculum sequantur ligamenta, atque rursus vertebrae, itaque si in una parte duntaxat tuberculum oritur, ubi haec in interiora trahitur, in priora partem spinæ convertitur: Sed si in duabus, ubi aliqua sit interjecta sit involuta, gibba evadit, utroque enim tuberculo adijuncta vertebrae trahent, quae in medio sunt à posteriori parte gibbae sunt, quod evidenter intueri licet omnibus eventis quae curvari modice possunt, cuiusmodi fuor videtur rami, quos si quis deare-are digitis ab una parte, sinistræ ab altera prehensens ad se traxerit, medium in contrariam partem attrahet

gibbæque conspicies, atque nisi alia de causa spinæ ad latera convertitur, quam ob crudum tuberculum quod ab eisdem latere sit: haec autem etiam viria in spinam incidunt cum vertebra loco moventur.

Praeter internas jam expolitas causas, est de virium imbecillitas, omnes unius vitiis vincula lacertique, dorsi minime valeores: casus sistit, factum ut nuda spinæ curvevit, quae fontalis causa est una quae senes omnes gibbosi existant. Sic autem imbecillitas, ut succi prevaleant tum copia tum viribus, cum eo locorum impingunt unde mox de hauras adveniat: Est & ex causis externis consuetudo corporis quocumque verum inflectendi atque inflexum continendi, quoniam admodum enim virgulis & viridibus sine pondere pressis, assidueque commotis, ita & dorsi nostri corporis accide, sub insiduis vitiis diverfa ac opificis.

Causa advena, &c. Quidam censent exoriri posse Gibbosin à Tuberculo, quod sustinente aegre pulmone, sic agitato multa pectoris, respiratio, depravatio & inde vertebrae emotio incitetur: quoniam Gibberis exoritur huius verbi explicat *Merruialis*, nam quod concinnatur spinæ motu thoracis intolentiore, ac magnum inde laborem experitur, id profecto non facit ut Gibbas patiatur, praesertim quando confirmatum est agitationem illam thoracis ad incommo- modo respiratio undeletur aequalis, non magis ual quam alteri parti suae vim ac noxam inferre debet: Demum cui posita necessaria causa, id est, posito pulmone tuberculo, atque agitato depravatio thoracis, non consequatur gibber? At eundem sequuntur Gibbosin à tuberculo semper verum contendit, si res solum intelligatur ad venientiam Galeni, quae comm. 3. de artic. procreasocem Gibbi necessitatem retulit ad una vertebrae tubercula, non autem ad tuberculum pulmonis, quod falso credit *Merruialis*. Sed respondeo velim, qui phisici & althmatici non Gibbi omnes: itaque nullis & althma Hippocr. sunt symptomata & affectus consequi ex disrupto jam abiectione circa spinam. H. *Saxonia* Panthei lib. 1. cap. 4. causam Gibbi repletionem facit ligamentorum spinæ vertebrae annexorum, Errat vero, quod sibi nobis-que susceperit distensionem induci tuberculo Pulmonis inter, maxime si crudum ac parte postica consistens, atque non nisi diuturnum & parte posita positum coecepterit. Nam quae vel pulmone, vel huius tuberculo corporibus vacuitate locorum, & aëris interjecti distilis vis sit, ut vertebrae spinæ convellat? at neque resiliens à tuberculo pus tam ut penetrabile, aut tam erga solutissima ligamenta prevaleat ut hac vincere queat: Praeterea quod fluere naturali suo nutu comparata pualentia substantia, orquequam media spinæ testitudine consistere; sed ad infima repetere debet: quapropter aut his private partibus gibbosin, aut etiam aliud quodcumque malum potius quam gibbum excutiat, quod si tamen *Saxonia* detor, ut ex adverso pulmone parte spinæ consistat & non distillat-finit: Tum & deterius incommo- dum argumentationis subit: Hecules, quod perpetuo circa dorsum etiam spinæ luxatio, atque adeo non erit unde vertebrae, curvitas, aut lumborum, aut ossis tacti perversio, *Saxonia* *Parmanensis* censuit Gibber primam igitur eumque indititiam, mox sub althma ac tuberculo magna pulmonis, necessitate quadam avetiente difficultatis, atque laboris inspirando se respiciendo flexu dorsi completum, quod multo liberius agitur potmo, huiusque succedit respiratio dorsi jam consuetudo.

quam recto septo transverso atque externis molculis, qua de causa cogitur homo, sic insignite natura, testitudinem rhoracis, quoquo pacto licet, atque etiam amplianse curvitate dilatare, qua infusus affoetodine in dies fista, sic demum absolvitur Gibbosus. Ingeniosa quidem excogitatio, ut nihil ad sensum Hippocrit. qui causas plane necessarias, non contingentes Gibbi posuit. Fietur autem per hanc opinionem, ut gibbosus & comoda semper respiratio frueretur, & in quacunq; dyspnoea perpetuum esset in dorsum incurvatio levamen, & illud quidem patatu facile. *Quarum opinio eorum est qui à tussis vehementia vertebra loco pelli censent, Res ab Hippocrit.*

nuquam astita, ut asthma eo tussis fiat causa gibbi, verum ut gibber sit cum asthma & tussis conpactum. Ut appareat jam ex his omnibus summe vera opinio Galeni, qui causam Gibbium haud tuberculum quidem pulmonis, sed sylvae contiguum alterum indicavit. *M. Aur. Serenus de Cataplasma p. 127. Gr.*

Quonquam autem *Saxonia* semetiam rejicit, ex alio tamen exemplo manifestum sit quomodo à Pulmonis tuberculo Gibber exoriri possit si scilicet id posticam Pulmonem partem occupet; maruerit id, disrumpatur hians ulcus, collis pura, interventus, adhucet; Quam partium cohaesionem itpe ea de causa fieri in pacibus internis animadvertit *Platen.*

OBSERVATIO II.

Gibbositas causa in capite reperta, ob vitiosam ossis Ethmoidis conformationem.

Adolescens à pueritia Gibbo & asthma vexatus, tandem ex *phibisi obit*, circa annum ætatis xvi. Hujus cranium aperui, & inveni processum sive interstitium, aut seprum illud quod eminet in medio ossis ethmoidis, seu cribrosi (qui processus effasilem papyri excedere vix solet) in latitudinem & altitudinem ita auctum, ut fere totum os cribrosum obtegeret, adeo ut foramina hujus ossis, per qua *pituita ex cerebro ad nares solebat effluere*, plane oppleta viderentur, & quamvis petrecto cranio, vix eorum ullum pateret. Denique ossicula superioris maxillæ, quæ in magno oculi cantho conspiciuntur, adeo excreverant, ut septum nasi hinc inde propemodum attingerent: Hanc præcipuam fuisse Gibbositatis causam verisimile est: nam cum *pituita per nares minime posset expurgari*, versus spinalem medullam tendebat, sicque *vertebra, earumque cartilaginee, assidue irrorata pituita viscida & relaxata*, tandem excreverunt in Gibbum maximum. Nec solum pars illa Dorsii ex hac deflexione & irroratione *pituitæ relaxata* fuit, verum etiam omnia ossa à collo usque ad pedes, præcipue vertebrae, os sacrum, os pubis, ossa pedis, denique omnes epiphyfes sive appendices, præter consuetudinem molles ac tenellæ erant, ita ut fere instar ceræ tractari possent. Illud præterea in hoc cadavere notandum viscebar, quod 6. 7. 8. 9. & 10. vertebra metaphreni, quæ Gibbum efficiebant, *exelæ erant carie*, præcipue autem 7. 8. & 9. quarum nihil præter exteriores semicirculos, & eorum processus conspicebantur. Interiores autem partes harum vertebrarum, in quatuor aut quinque fractas partes, non sine admiratione, in ipsa pulmonis substantia invenimus; Pulmo enim in parte, quæ dorsum respiciebat, ulcere magno & calloso laborabat, per quod ea fragmenta, ex continuo pulmonis motu attracta fuisse, dubium non est: Tanta enim est pulmonis ad se attrahendi facultas, ut nonnunquam turundæ ex vulneribus pectoris penetrantibus ad se traxerit. *Fabritius Hildanus cent. 1. Observ. xlv.* Diximus in Gibbo illo 7. 8. & 9. vertebra metaphreni ita exelæ fuisse, ut nihil præter exterioris semicirculos & eorum processus repertum sit: ubi admiratione non caret quomodo spinalis medulla conservata fuerit. Erat enim plane denudata, & nonnisi membrana sua cooperta: inter tam tamen insigni illa putredine ossium cariosorum, & ulceris pulmonis sordidi circumdata, neque tamen sequutum ullum symptoma ex his quæ spinali medullæ læsæ accidunt. *Idem cent. v. Observ. lxxvi.*

S C H O L I A.

Adolescenti à pueritia gibbo & asthma vexatus obit anno ætatis xvi. Huc quadrat Aphor. 46. sect. 6. *Qui gibbosi ex asthma & tussi sunt, autu pubertatem moriantur*: cupis interpretatio varie toris inserpentes, quod multi gibbi à pueritia provectam ætatem attingant; nec omnes dyspnoea aut tussis ptemat; Ingeniosam commocutus est explicationem *M. Aur. Serenus lib. de Abicessibus*, Hippocritæ morbi & experientie confirmam, commutationem facta vocis *ἐξιοσσε*, aut elisione vocalis onius, ut legendus sit sic aphor. *οἱ αἰον ἐξιοσσε ἀσθμα, ἢ ὀξυς πνευμα*, &c. Vocem autem *ἐξιοσσε* Græcis, atque ac Latine, ooo Extra solum significare, sed etiam, *Præter*, exemplis adductis comendit, Aphorismi ergo sensum hunc esse, Quipater asthilationem & tussim gibbi quoque fuer, eos ante pubertatem mori. Jam igitur eo constituto, *scilicet* *Præter* *asthma*, Hujus orationis sensum quidem mihi videtur

necessario quodam nexu comprehendendus has tres res simul omnes, gibberis, asthma, tussis asthionæ, aut ante pubertatem, aoum x v. necessitas moriendi sit, quippe postquam unum aliquod istorum non explevit morbum, quod expectatum aliquo abunde videbatur, reliquum nova epigenesi facta, pessimum & exitiale malum oporebit. Difficultas autem spirandi simplex, haud necessaria absolute causa videtur ut vitæ vim ioferte queat; multo quoque minus tussis compellisse quemquam ad interitum visa est: Ac neque sola Gibbositas nam habet vim ut fatum acceriat, necessum est enim, ut pulmones, aut scilicet organa laborent sic, ut ex horum affluibus malis sufficula paria plurimum molester: Quæ omnia cum nos sunt, videmus quotidie multos qui gibberis belle ferunt incommoda, propterea quod nullam aut tussis aut spirandi difficultatem exstantur.

expetierunt. Quintano vili sunt inter confratres homines gibbi, qui in arte caendi consummati vocem quam maxime deprimunt aut intendunt: Verum enimvero gibbere pectoris angustiam faciente, post angustiam vero difficultatem respirations, ac multo maxime post dissipatos abscissus nullum ac ailiham consequens, sic plenissima & necessaria causa est ut mors homini lente subrepat, vaneicente scilicet calido cordis, qui dissipare in ea pressum, velut picis in arido solo, non potest, quando nimum alimentum pelum aeris deit viventi. Hæc universalis nostra lex est, deinde requiritur specialis, ut hi homines imbecilli, graciles ac prope iqualidissimi, quo calore ac siccitate constante fer ut major sit vius respirandi, qui maximus in angustia pectoris maxime videt quantum ex difficultate spirandi præ se ferat noxam: Sed vergeticos modesteque canuoli, etli gibber experti, nil detrimunt, ac neque spiritus difficultatem perpetuatur: Sic Hippoc. lib. 1. de artic. air, *Multi quidem gibbi sunt, ac non finem quem bene valentem jam usque ad senectutem ad mali sustinent, præsertim quibus corpus carnis plenum ac pingue efficitur est: potius autem ex eo ad sexagesimum autem pervenerunt, plerique enim citius moriuntur.* Requiritur de tertio causa vis præpotens, hæc autem est deflagatio crudi gravissque fuentis, multa copia de capite coarctatum ad inficiora iuentis, cujus pars ad ipsum delata, & circa vincula venetorum cuncta, gibbum, ea qua dixi ratione contrahit, pars ad pulmonis & anhelitus vias brevius detrahit, & spiritus anxietudinem, & iustitiam exciet, siue quidem hic relicto phryma submolli subrodoque, quod sudorilientum suum velut madorem in alperam arteriam infunder, siue spiritalibus tandem irrigatis viis, & vullo phryma relicto: Ex quibus omnibus noxis, quæ primum se prodit, est pulmonis: quæ causa fuit scilicet, ut ex ipsa viciet, languorem præ se ferente, suscitatos spinæ confensus opinari fuciant nonnulli: Accedit ad hæc gibbi causa & alia, quæ veluti principium est omnium, improba videt, capitis conformatio, experta naturalis utriusque projectura, maxime vero posterioris, cum Theriaca prope forma, nam capitis formæ faciet: præcipue vero naribus hiolcis atque anhelis, & oris ampliore rictu, cum ratione, aliquando & iudicio dente, collo vero nullo, vel intra thoracem relictæ. Hæc capitis universi conformatio plurimum incommoda est, vel quod ad ipsam pertinet, quæ cursum exhibet, ac non coarctet, humoribus superfluis, vel quæque includens primam iotemperiem & imbecillitatem facultatis formatricis, causa est mali possissima qua necessitas ac verenda fluxiones pectoris œconomiam infestent.

Sæpe etiam cum formatricis vicio, quod intra medicis clausula coarctat, coniungitur extra uterum imbecillitas nervorum, quæ maxime cedit & oppositum se reddit inflexus, Sic & mala partium conformatio & gibbi perversio apparet, quo multas afferre narrationes possem, sed superat omnes ea quam mox audies, &c. Vide Observat.

Ad hæc in Gibbosi illos potissimum requirimus, ut circa vias spiritus incubuunt, ampleque, non te mi schemate sit ille panis qui Gibber exaltat: Enimvero non spectans ad ductus spirales exille phryma, haud sane valentem ad interruptendum vitæ cursum vix habere poterit. Itaque superiores spinæ partes tenet, atque ad inferiora potius quam interiora vergat gibbus, tacitam homini tabem illaturus.

Sic vertebra afflicta irrorata, &c. Benignius theatri Tabidorum Exeretur, xxi. E fluxione acriori spinæ accumbente, docti vertebrae luxas, ossaque alia ex acerbabilis densitas & exorta vidisse te an: Imo si fluxio qualitate nature peroris aliena sit delibata, ut in hoc venerea, ossa, præsertim tibiæ, ad veritatem similitudinem aliquantulum inflexa protruberant, fristibilia, spongiosa minisque tertia undique evadere,

Ex hac deflexione Tres statuunt viæ quibus ceteri humor in spinalem medullam maneat perhiberis prima est quam excogitavit *Fernetus*, qua humores, loter pericranium ac eadem cupitis collectos in subiectas partes, ac in medullam quoque spinalem fluere arbitror. Secundam viam recentiores idem monstrant, quam ii grande illud *Ovipus foramen* pandere arbitrantur. D. Semetius exemplum superius ex Hildano petit, *Ossa nati*, inquit *ille, erat depravata, hanc præputum fuisse Gibbositate confirmam, quæ itaque pinata per nates inuene possit expurgari versus spinalem medullam tendebat, sique vertebra, ac rami quoque cartilagineos afflicti irrorata pinata vrida, ac relaxata, tendens excreverant in gibbum maximum.* Quæ quæstio est argumentatio? Est magis infirma quam hæc ipsa ossa? Nam subiungit Hild. *Non solum part illa dorsi, ex hac deflexione & irroratione pinata relaxata sunt, veram etiam omnia ossa de collo usque ad pedes, præcipue vertebra, os sacrum, os pubis, ossa pedis, denique omnes epiphyses seu appendices præter consuetudinem molles ac tendia erant, ne ut fere milar vera trahere possent.* At ita, Pinuam cerebri occipitri foramine, & mox spinæ tramite decurrentem, ossi pedis novissima, tam mollia, tam cetera, os ita loquar, effecisse? Illa spinæ fistula non offoce ad ossa pedis, non ad epiphyseis, non ad ossa pubis extenditur: quam ioria sunt omnia, tam devia quoque à vero: In molis ossa fuerunt male formata, ac quoque simul ossa nati, per quæ pinuam cerebri ferunt habere exitum, Ergo illorum oppellatio fuit fons & origo mali. O languida via ratiocinandi. Phrymis de causis ossa, & præsertim tam multa, simul visitari poterunt. At inveni, loquor, præsum, siue manifestum, quod emittit in medio ossa rictu, seu cribro, (quæ præcæssu papyri crassitudo exordere vix solet) in latitudinem ac altitudinem ita rictum, ut fere totum os cribrosum obtegeret, adeo ut foramina huius ossi, per quæ pinata ex cerebro ad nates solent effluere, plena officia viderentur, & quævis periculis cranio, vix erram alium patenti. Nec exanthosi, nec sani hominis cranio costro ossis cribriformis foramina prius paula fient, quam nevali omni studio adhibito fuerint protracti, qui de cerebri membranis tracti, per ea ad natiom ratiocin excurrunt: Falsus igitur est Hildanus, non lapsum inflexa illa foramina: Hæc in cruro cranio & succido exantia naturaliter cetera & inobterabilia: Difficilioris Professor, moxistis nervis odoratois, ut vocant, & mammillaribus processibus, foramina ossis illius cribriformis, nec aliorum oculis subleptere potest, nec suis consequi. Nuper nos quoque processum ossis, *Pomeridicti*, deprehendimus oppido quam incurvum: Homo autem in vita sua læpe coryza pressus fuerat, Nec fuit hic miser, cujus cranium postea est contumplatus *Fabennus*, uicis semper fide naribus. Pannum evenit, ut quæ observare Medici, ad scita veterum sequimur, studiosissime accommodent, Hæc via salum gliscit & tam alitas agit radices: Meitro prædicanda erit prudentia *Francis Gibbosi*.

hic felicissime cœquatur naturam & ingenium illius morbi quo ossa misceant vitiantur. Vocat Rachidem (Vide inferius) Fabricius Hild. & D. Sennertus si in pueros ad hunc modum egros incidissent, caput mali continuo iudicantur fuissent esse caput. Eo namque tam grandi, ossibus tam mollibus, tam vehementer vitalis epiphyseus, huius morbi fontem esse nihil aliud quam talem capitis cœteribz, qui ex superiori observat. proditur. Longe secus laudato Giffonio videtur.

Tertia via quidem in monumentis Hippocr. sepius occurrit, est vero admodum fallax & falsa. Qui insuit sanguis, non est cerebri privatus, sed communis sanguis, venæ quoque non sunt cerebri, sed rami venæ cavæ, ut & illæ quæ in spinalem medullam Dorsæ aut Lumborum feruntur. Ipsi Hippocr. interpretet talem humorem tradunt ex spinali medula per nervos multo longius diffundi; verum spinalem medullam membranis obducentibus, humor in eam tam facile non insuit, quamvis id aliquando fieri non inficiamur, sit semper est corporis sanguis, aut humor massa sanguinea. Eo caliditate recepto, erit inflammatio partium ad spinalem medullam tendentium: eodem frigidiore & lenso, oriuntur tumores. Gibbum inde reddi posse spinam Dorsæ non abnuo, aut ex fere ratione quam lib. de Rachitide cap. 13. ostendit Giffonius. Minime vero ille humor cerebri est, nec talis vel per venas aut arterias cerebri, ut videtur Hippocr. vel per superficem vertebrarum, vel per foramen occipitii, ut placet affectus Hippocr. ad intima spinalem medullam & mollior. Hæc via sunt nullæ: Nullus itaque cerebri cœteribz sit in spinalem medullam, fluxio autem in eam, mora massa sanguinea, concitari potest, arteriis maxime æstuantibus, quæ sunt membranarum spinalem medullæ, ut Cervicæ arteriæ, arteriæ lumbales, Lumbares & Sacræ arteriæ. Considera lib. de cœteribz spinalibus pag. 473.

Per quæ spina ex cerebro ad naves, &c.) Illud hic prætereundum non est, quod auctores tradunt per hæc ossa cribiformia foramina, illum saltem cœteri humorem qui supra cerebri meningibus & supra corpus callosum colligitur, à multo major vis humorum, ut vulgus credit, per ossa cuneiformia foramina pugit decurrit: quæ via tum parva, atque si humoribus ad os cribiforme profuentibus iter est interclusum, illi exitum etiam per ossa cuneiformia foramina tandem aliquando habere posse videtur:

Quæ cum ita sint, tanta vis ossium ab oculis ossis cribiformis foraminibus orti haud potuisse videtur, quinimo æger vitam tantam trahere non potuisset, cum cerebrum ita qua, (ut illorum fert opinio) indiget maxime, privatum fuisset. Item lib. de ossis cribiformis p. 399.

Ex phthisi obit) Ulceri magno & calloso in Pulmonibus adscribenda. Quamquam & in contrarietatem & competitionem subditi Ductus chylif. possit referri, cum Excellens Bartholinus Tractatu de Hepat. exanth. desperata causa p. 704. Excell. ait. Submihi opinatur in Gibbere à causa interna producta, haud torquenti aut premi lacteum Thoracicum, sed sequacem ad extensionem spæi eradere. Ab externa & violenta causa illud probabile iudicat, si præcedant anorexia & vomitus chylif. At ille Hippocr. adversatur, quod lib. de Articulis de Gibbere ex morbis loquuntur, ait, Quibus adhuc pueri, ante perfectum corporis augmentum, spina in gibbum attollitur, is corpus ad spinam augeri non solent: credidit scilicet. vasa sanguinea comprimere, quibus corpus & paulo nutritur. Galenus in comm. l. 3. receptaculorum distortionem tum incurat, morionis difficultatem & laborem. Igitur si cœtera receptacula spinæ vicina, si vasa vularia comprimuntur & distorquentur, quæ prærogativa Lactæas thoracicas spinæ accumbentes hæc distulcitate eximet? In externa causa quod vim quoque pariantur lactei ductus, patet. Premuntur enim nervi ex spina eo loci exenates, unde non raro paralysia fin legimus sequarum, quamvis nervi ad extensionem æque sint loquaces, hinc etiam torus corporis impotentia & Ruptor ex Hippocr. Ex quo insulper notandum lib. de An. Spinae contortiones velius interiora periculosas esse, quando in anguli, non in circuli flexum commoventur, in qua commotione, siquidem, ex eodem Cœ, vasa & ita cœta supprimunt, pedes & crura per se igitur, quæ ipse lacteis superent: evadente commune periculum? Reliquas Gibbositates, quamvis in tanto non consistit periculo, noxæ tamen obnoxias laudat Cœ dectat. In acutis igitur si ad circulum emineat spina, levius damnum patitur lacteus succulus; si ad angulum gravius, unde tales observari nunc increduli nosabiles esse. Ad lactea quoque spina torta torquet lacteum, qui licet in lechosis non potius excludat chylum, eodem tamen nonnihil oborto itinere retardat.

OBSERVATIO III.

Gibbositas ob spinæ dorsæ irrigationem à cerebro humida.

I. Oh. Pfeiffer (Vide Tit. de phthisi) à morbis complicatis extinguita est: Spina dorsæ, à continua defluxione humorum ex capite, adeo erat emollicata, adeoque vertebrae relaxatae, ut figuram hic adiunctam referrent. Prima incurvatio sinistram partem pectoris occupabat, altera è regione hepatis &c. hinc omnes partes adeo in globum contraherantur, ut ostentis vix puerum trium annorum adæquaret.

OBSERVATIO IV.

Gibbositas Pectoris & Dorsæ à magnitudine Hepatis extraordinaria, Rachitis Anglica dicta, Tabes Pectoris.

Pectoris Tabem appellamus, non quæ intra Pectus sedem habeat, quo facto Phthisis Pulmonia eo nomine comprehenderetur, sed in qua ipsa Pectoris crates videretur, id quod fit in morbo quem describendum suscipimus, Est autem hic Puerilis duntaxat seu infantilis, & vulgarissimus in Anglia, uti & in Hibernia ab aliquot annis, ubi antea solebat rarissimus esse ac vix cognitus. Invadit autem non grandiusculos tantum infantes, sed & valde teneros ac recens natos, Sicuti contra rarissime trinis majores adoritur, & ut plurimum

intra

Intra bimatam se continet: Multæ corporis partes in hoc morbo afficiuntur, pectus, caput, artus, alix; sed præ omnibus ac ante omnia pectus; cujus pars anterior, quæ lata esse debebat ac plana, angustior fit, & utrinque acclivis in medio, seu sterni regione, altius affurgit, tandem prorsus carinatur: Costæ inferiores, ad latus foveæ ventriculi, introrsum retrahuntur, ac quandam utrinque velut scrobem faciunt, totoque sui ductu, quibusdam velut nodis asperantur ac inæquales fiunt: vitiata pectoris figura respirationem facit impeditiorem ac crebriorem, quam etiam tussicula plerumque sicca, comitatur: Caput grandescit ultra debitum modum, ac proportionem inferiores corporis partes, coxæ, femora, crura; extenuantur & debilescent; unde infantes incessui inepti redduntur; non modo illi qui nunquam adhuc eo usi fuerant, sed & qui firmiter admodum fragilitateque incedere ac discurrere cœperant, diu antequam hoc morbo prehenderentur: Dorsî spina in multis curvatur, atque arcus instar in exteriora flectitur: Ossâ articulorum in brachiis & cruribus, non omnium, sed carporum ac talorum augentur; ac tantopere protrudent ac si duplicata esset fere eorum moles; unde etiam *Doubling of the joints*, i. e. juncturarum duplicationem id vitium nominant Angli; qui morbum ipsum, hoc symptomate stiparum *Tent* indignant: quum aliâ quin eum generaliori vocabulo, omninemque ejus speciem includente *The Rickets* appellant: Præter hæc omnia dextrum hypochondrium intumescit totum, tumore æquali, magno ac renitente, sicut digitos sub costas nothas adigere non possis: Et sanè omnis mali vel origo vel fomes laet hoc in loco: Tumor iste cum pectoris aliqua angustia, statim initio morbi apparent; sicut interdum quidem ambo ista simul, eodemque tempore se prodant, alias vero vel hoc vel illud altero nonnihil antè sit: Nodi in costis, ac scrobes istæ in lminis oris pectoris postea accedunt: quando etiam pectus fit magis magisque angustum: Capitis incrementum istis postèrius est, nisi quod pectus toto morbi decursu arctius redditur, donec ad summam angustiam devenitum sit, siue ut carinæ instar acutum fiat, ac promineat, quod fere non fit nisi paucis ante mortem diebus: Est enim lethalis hic morbus, si vel negligatur penitus, vel fero aut prave curetur, plurimosque quotidie absumit, neque ullus est annus quo non aliquor millia infantium pereant: Articulorum granditudo fere nonnisi ulrimo loco supervenire solet: quamquam multi sunt qui eam nunquam parluntur, ac moriuntur prius quam ad eam deveniantur: sicuti rursus ex iis, quibus illa accidit, petmulti evadunt; etiam si incuriosius habeantur; quippe haud ita periculosa est illa Tabis Pectoris species quæ hoc symptoma trahit, quam quæ eo caret.

Origo hujus labis à Jecore est, per sepe non vitiato utamvè noxam passò, sed supra modum adaucto, ita ut plerumque duplo, imò ferme triplo maius sit quam par erat, totamque anteriorem epigastrii partem occupet, & ipsum quoque sinistrum hypochondrium attingat, interdum quoque impleat: Jecur sic adauctum, cum in ipso ventre non inveniat spatii satis ubi se commodè explicet, à thorace mutuatur quod ipsi deest, ac versus superiora assurgens, diaphragma longe impellit, adeo ut interdum pectoris cavo vix dimidam partem spatii ipsi debite relinquit: Pulmones sic in arctum redacti, contrahunt sese ac in sese colligunt, unde fit ut pectoris quoque crates, ipsorum causa facta, iis se accommodet ac angustior evadat: Quandoque ab ipso pectore & pulmonibus ulla pars malum, hæctica quadam siccitate, cum nonnullo etiam caloris excessu, obsessis, quæ sensim marcescentes illæ partes, ac sese contrahentes, quum vix ullum nutrimentum tunc capiant, sanguinem quæ in statu naturali valde copiosum ad se trahere ac absorbere solent, Jecori refundunt; quod eo circumfluens, plus iusto increscit, atque in omnem partem sese adauget: cuiusmodi nimium Jecoris incrementum principalis hujus morbi causa est, ita in hoc quoque non parum ad eundem fovendum confert, atque in progressu eadem omnia mala importat, quæ modo memoravimus: atque sic morbum, quamquam non ab ipso cœptum, fovet tamen & magnopere adauget: Neque in hac Pectoris Tabis specie ulla magnopere periculum est, donec ista à Jecore noxa supervenerit: quæ & supervenit semper si diutius trahatur malum, neque statim initio curetur, aut ab alia causa præmortuus infans fuerit. *Ego sane, quum plurima corpora, atriâ hujus morbi specie extinctis secernerim; anopsia deprehenderem ita se habere, neque nunquam mihi adhuc infans isto morbo defunctis, corpus aperire contigit, in quo non præterea de ejusmodi Hepar reppererim.*

Mali hujus originem infantes sæpe in utero matris contrahunt, idque vel mox in ipso conceptu vel gestationis tempore: Prius evenire solet ubi vel pater, vel uterque parens calida & sicca utriusque visceris, Jecotis & Pulmonum, vel alterutrus intemperio laborat, Alterum à sola matre proficiscitur, quando ea in vultu multum peccat, interea dum uterum gerit, atque vinum, cerevisiam fortem, aquam vitz crebrius ac largius ingurgitat: Eodemque vel matris, vel adfectitix nutritis vitio, hæc labes accenditur etiam infanti, qui alloquin

ei abortu obnoxius nequaquam fuerit, si liberaliori cuiuscumque Sicetæ potui crebrius ac largius indulgeant, istoque pacto lac suum inficiant, ac naturalem ejus bonitatem corrumpant: Quandoque coetæ huic malo causæ subsunt, infantisq; ejus iacta secum ex matris utero deferunt, vesp postmodum illi contrahunt, absque eo ut ullus ejusmodi defectus vel in parentibus vel nutrice compareat: Sane ut in aliis permultis humani corporis affectibus, ita in hoc quoque alitra plurimum possint, certorumque siderum ictus illi vel procreando vel fovendo magnopere inserviunt: Morbus iste ægrius tollitur si à jecore cœpit, quam si à pectore: magisque etiam si à primo ortu ipsius ei obnoxius fuerit: Quando in pectore ipso originem habet, curatio ejus satis facilis est; quam siccitæ, etiam hæctica, quæ in corporibus adultis fere immedicabilis, in copore infantili cum minori difficultate emenderet: Curatur autem balneis unguentisque emollientibus atque chalaisticis, aliisque ad humectanda pectoris ossa pulmonisque accommodatis: inter quæ pellis ovi aut agno recens detracta, & adhuc calens admota, atque aliquot horis relicta, mirifice multis profuit: Quod si jam in progressu est morbus, atque jecur super augeri cœpit, aut si ab ipso jecore processit malum, isti quoque medicatio adhibenda est, omnibusque modis conandum ut incrementum ejus obstitatur, atque intra naturalem modum coerceatur: quam in rem, non inimenta modo & unguenta, aliæque topica, sed interna quoque in usum trahenda: sic tamen ut non salubritatis tantum ratio habeatur, sed & teneræ isti ætati effectus ac sapot medicamentorum attemperetur: Pari quoque prudentia cavendum ne dum refrigerare ac contrahere jecur nitimur, obstructions aliæque mala in eo generemus, nimio adstringentium, aut intempestivo emplasticorum usu, atque sic geminam pro simplicem labem accersamus, morbumque penitus incurabilem reddamus: Super autem omnia sciendum pro internis externisque medicamentis, ea hic deligenda, quæ & lecori privatim amica sint, & præter communis cum aliis multis Refrigerandi & Adstringendi facultates, peculiarem aptitudinem huic operi necessariam, sortita sint: Purgatio hic nullum locum habet, ne sanguinis quidem missio, nisi morbo longius processu, ac capite jam nimium aucto: quando sanguisugæ venis post aures, atque in fronte & temporibus utiliter admoventur, multumque ad universam curationem conducunt: ideoque si res ita ferat secundo ac tertio usurpandæ sunt: Vicus ratio longe alia in hoc morbo instituenda est quam imprudentioribus, ac naturam ejus non satis perspectam habentibus, videri posset: Non enim Atrophiz, qua infantes contabescunt, per se attendendum est, neque conandum ei occurrere plenioræ cibari ac validius nutriendi, quod esset oleum addere camino, sed contra omnis opera in id adhibenda est, ut exuperans sanguinis copia compescatur, ac nimius ejus fervor, nimisque tenuitas & acrimonia coerceantur: quod quibus potissimum rebus effici debeat neminem doctum Medicum latere debet: Quod si ita teneri sunt infantes, ut nihil dum præter lac nutritioni assument, matri vel nutrici ea danda sunt quæ prædictis scopis inserviant, ac lac eorum debito modo attemperare valeant: In his vero infantibus qui grandiusculi jam, nondum tamen ab lacte, & ubera sugunt, & alios præterea cibos ac potus assument, uti oque modo agendum est, & tum ipsorum, tum nutrimentum victus ita ut diximus ordinandus. Hæc curationis via sollicite admodum observata, & diu admodum continuata (nihil enim hic parvo temporis spatio effici potest, præsertim ubi altius hæsit malum) feliciter curatur iste morbus.

Morbum istum non in Anglia duntaxat & Hibernia, sed & in aliis quoque regionibus grassari verisimile est, & de Gallia quidem mihi certissime constat: diversos enim Parisiis infantes vidi eo laborantes. *Arnoldus Boetius de affectibus omnis cap. xij.*

SCHOLIA.

Orgo hujus labi à Jecore) Glisson cap. 45. Anatom. Hepatis, sedem hujus morbi statuit in medulla spinali extra cranium, nervisque inde oriundis, deducitque ortum à nutritionis inæqualitate, quæ proveniat à quorundam nervorum per alia ad partes nutriendas ineptitudine: Ubi scilicet nervi isti in fingendo officio debiles atque languidi sunt, præ his qui è spinali medulla intra cranium natales suos deducunt: Inde evenire, ait, ut caput, facies, atque imi veneris

viscera grandescant, ut pote nervos intra cranium enatos tortica: Brachia autem, & pedes præcipue, macrescant, reddamurque flaccida & enervata, quia nervi à languidiore spinali medulla parie foris exitus extra cranium prodeuntes irritentur: Præterea quoniam interdum nervorum quorundam ramulus aliquis per cæcis magis debilitetur, fiat ut altera pars atrox alicujus, altera plus crescat, adeoque totum membrum illud tandem incurvetur.

Constitutio corporum, interna & externa, ex Rachitide desumptorum.

Testatur plures nostrum variis corporum hoc morbo occumbentium dissectionibus interfuisse, eaque quæ longa experientia, frequentique dissectione observavimus, quæ propriis

ptilis oculis vidimus, manibus tractavimus hoc loco narratos: Inrerea tamen duo hic præmonenda sunt, 1°. Defunctos quos dissectimus gravissime ante obitum hoc morbo affectos fuisse, si quidem ipsi magnitudinis morbi maxima ex parte succubuisse supponuntur: Ne igitur expectet in aliis corporibus adhuc vivis, siue recens affectis, siue saltem ad *incipiens* nondum procectis, eam morbi magnitudinem ad symptomatum quæ hic depingitur: 2°. Morbos fere omnes tractu temporis alios diverſi generis ſibi adſciſcere, ideoque morbos Chronicos plerumque ante obitum eſſe complicatos: Ne ergo putet in defunctis corporibus quicquid præternaturale reperitur, ad hunc affectum neceſſario pertinere, ſorte etiam magis id alium morbum huic ante mortem ſupervenientem, quam hunc ipſum reſpiciat, Progrediamur jam ad ipſas obſervationes: Obſervata hæc noſtra Anatomica diſtinguantur in ea quæ extrinſecus, nondum aperto corpore occurrunt, Et ea quæ nonniſi diſſectio prius corpore ſe offerunt.

1. *Quæ ſtatim denudato defuncto exterius occurrunt.*

1. Irregularis ſeu irrationalis partium proportio: caput nempe juſto majus, facièsque habitior reſpectu reliquarum partium: atque hoc quidem in omnibus hoc morbo extinctis, quos hætenus vidimus apparuit, unico tantum excepto, qui ſimul cum hoc affectu ſuppuratos habuit Pulmones, phthiſique conſectus eſt: Hic vero habuit etiam per totum ferme morbi decurſum caput majusculum facièmque pleniorẽ, atque per xiv. circiter dies ante obitum ſubito collapſæ ſunt partes carnoſæ circa caput, facièsque Hippocratica reddita eſt, non ſine omnium ob ſubitam mutationem admiratione.

2. Membra externa, muſculique totius corporis graciles & emaciati, quaſi atrophia veitæ abſumpti cernuntur: Atque hoc, quantum quidem ſcimus, perpetuo obſervatur in iis qui ab hoc affectu intereunt.

3. Cutis univerſa, tum vera, tum membrana carnoſa & adipoſa, flaccida & quaſi pendula, laxaſque inſtar chirothecæ apparet, ita ut multo plus carniſum quàm continere poſſe putes.

4. Circa articulos, præſertim in carpiſ & talis, protuberantiæ quædam exiſtant, quæ ſi aperiantur, non in partibus carnoſis aut membranofis, ſed in ipſis oſſium extremis, præcipue in eorum epiphyſibus, radicari deprehenduntur: Quod ſi forte hæc oſſium prominen-tias ſima tadas, facile percipies eas eſſe ejuſdem ſimilariſ ſubſtantiæ cum cæteris oſſium partibus.

5. Articuli, artus, habitusque omnium externarum partium, minus firmi ac rigidi, minus inflexiles ſunt quam alias ſolent obſervari in defunctis, & ſpeciæ collum poſt mortem vix riget à frigore, aut ſaltem multo minus quàm in aliis cadaveribus.

6. Pectus exterius macrum & valde anguſtum, præſertim ſub alis, & à lateribus quaſi compreſſum cernitur, ſternum vero nonniſi acuminatum, inſtar carinæ navis, aut pectoris gallinæ.

7. Coſtarum extrema, quibus cum cartilaginibus ſterni comittuntur, nodosa ſunt, ut de articulis carpi & tali diximus.

8. Abdomen exterius quidem, reſpectu nempe partium continentium, macrum eſt: interius vero reſpectu contentarum nonniſi prominens, tumidiuſculum ſentitur.

2. *Aperto abdomine hæc notavimus.*

1. Hepar in omnibus à nobis diſſectis juſto majus, alias autem non male coloratum, neque valde induratum allôve aliquo vitio notabili contaminatum: Excipienda hic volumus nonnulla corpora, in quibus ante obitum alii morbi cum hoc implicati fuerunt, quemadmodum in hydropico & extreme tabido meminimus.

2. Lienem ut plurimum (quantum nempe hætenus nobis viſiſſe licuit) non contemnendum, ſive magnitudinem, ſive colorem & ſubſtantiæm ejus ſpectes, quamvis ob complicationem cum aliis morbis aliter accidere poſſe non negemus.

3. Aquam ſeroſam in cavitatem abdominis illapſam aliquoties vidimus, ſed neque frequenter, neque eam valde copioſam.

4. Ventriculum & inteſtina nonniſi ultra morem ſanorum ſtazibus repleta, quæ ex parte cauſa eſſe poteſt tenſionis hypocondriorum ſupra memoratæ.

5. Meſenterium aliquando inculpatum, aliquando glandulis juſto majoribus, ſi non ſtrumis affectum: Cæterum de Pancreate niſi certi hic pronuntiamus, ſuſpicamur tantummodo poſſe hic nonnunquam obſtructiones, ſi non ſcirrhum, accidere.

6. Renes, vtreces, vesicam, nisi alius adfuerit morbus, satis sanos: Notamus in genere de visceribus omnibus in hoc ventre contentis, quod licet partes ea continentes multum extenuatæ & emaciatae occurrant, ipsa tamen æque magna ac plena, si non majora & pleniora, ut de Hepate dictum, quam in sanis deprehenduntur.

3. Detraçto sterno in Thorace hæc sese ostentantur.

1. Adnascencia quædam Pulmonum cum pleura, quæ in omnibus quos hætenus dissectimus plus minusve adfuit: arbitramur tamen contingere posse hunc affectum sine hujusmodi coalescentia, licet ea in progressu morbi plerumque ante obitum superveniat.

2. Pulmonum infarctus non minus frequentes, præsertim in ipsis partibus adnascenticibus: Tumbres item eorum duri à sanguine crassiori, viscidiori & nonnihil nigricante nati, modo in una, modo pluribus pulmonum lobis, non tamen hæc semper conspiciuntur, frequentius quoque abscessus & empyemata.

3. Aliquis nostrum testatur se semel vidisse glandulas strumosas, tam numerosas ut viderentur æquare, si non superare magnitudinem ipsorum pulmonum: fixæ autem fuerunt utriusque inter pulmones & mediastinum, & à thymo usque ad diaphragma protensæ.

4. In cavitate thoracis vidimus aliquas serosas collectas, & frequentius quidem quam in cavitate abdominis, non tamen in omnibus.

5. Vidit & aliquis nostrum affectum hunc complicatum cum magno empyemate simulque phthisi: Amoro sterno, Pulmones sinistralateris tori occupati sunt abscessu, atque undique pleuræ adnati: compresso leviter tumore, pus copiosum, sublavum, crassum & feridum per trachæam arteriam in ipsum os effluxit: Eorum membrana exterior, qua firmiter pleuræ adnati sunt, crassior apparuit solito, & quæ mediante lobi istius lateris ita coalescerunt, ut vix in lobos distinguere potuisses: eadem etiam membrana tum pulmones, tum ipsum abscessum involvit, qua aperta, in conspectum venit magnitudo abscessus, qui adstantium æstimatione continuè ad minimum libras duas puris: rancum abscessum in rantillo corpore merito quis miretur: sed is totum ferme sinistrum latus occupavit: parenchyma pulmonum istius lateris corruptum erat, semiputridum & pure quasi intertextum.

6. Thymus in puerili ætate semper magnus solet deprehendi, & forte adhuc major in illis qui ex hoc morbo intereunt.

4. Cranio orbiculatim Serra circumscisso, ejusque operculo ablato, hæc observavimus.

1. Ductam matrem firmitus, atque in pluribus locis quàm solet in adultis, cranio adhæsisse: forte idem observari potest in aliis pueris hoc morbo non affectis, licet, ut opinamur, non tantopere: si quidem certum est in recens natis multas esse & arctas connexiones pericranii cum dura matre, quæ postea abrumpuntur, vixque notari possunt.

2. Inter ductam & piam matrem, atque in ipsis ventriculis cerebri, serosas aquas in nonnullis à nobis dissectis reperimus, unde patet affectum hunc cum hydrocephalo complicari posse.

3. Cerebrum in aliis à nobis dissectis satis firmum & inculpabile, neque illuvie serosa inundatum deprehendimus.

4. Et ultimo observavimus jam aliquoties in corporibus novissime à nobis apertis, carotides justa proportionem ampliores fuisse, similiter quoque venas jugulares: arterias verò venasque ad exteriores partes delatas multo exiliores debito extitisse. An verò hoc perpetuum sit in hoc affectu, nondum ut oculati testes hoc asserere possumus. *FRANC. GILSON lib. de Rachitide cap. ij.*

SCHOLIA.

Rachitis) Anglis dicitur *The Rickets*, in quod nomen aliquis nostrum casu quodam incidit, quod sibi, & cæteris omneque assilit: absque enim tortione vocis à voce *juxine*, *juxine*, deduci prompte potest:

Fuit autem *viciu juxine*, morbus spinalis; item *viciu ræ juxiq*, morbus spinæ Dorsæ, quæ inter partes primo hoc morbo affectas princeps. Aitiologiam hujus affectus, vide dicto libro.

OBSERVATIO V.

Gibbositæ ob vertebrae dorsi in cavo inflexas.

Matrona, (cui Hepar in magnam molem excrevit, & Afcirica oblit, *Vide lib. 3. tit. de Ventru tum.*) Vertebrae habuit Dorsii in cavo flexas, seu ira incurvas ut Græcorum, s. aut Latinorum minus reserrent.

SCHOLIA.

S C H O L I A.

DE flexura seu incurvatione vertebrarum spinæ dorsalis inter nos erat questio: Corpus non fuit deformatum; ut in gibbosis solet, licet breves nec inflexio vertebrarum in vestra animadvertatur: cum erectionem non læderet, maxime juvencale & virgini: Non nego Luxationis fuisse speciem quandam, non quidem unius aut alterius vertebræ, sed plurium flexura quædam simul, ad laus dextrum quærendum, & aliarum ad sinistram, ita tamen ut forerit vinctæ acconnæ in medio dorso ad lumbos usque manerent; Et talis curvitas non sit conspicua, nec ita deformis ut illa quæ in thoracis vertebis ad extra Gibbum causit: Naturalem non fuisse hanc incurvationem est à causa externa, cum mater anixæ in gibbi curatione habita sit, & hujus deformitatem ipsa ante delinquit. *Hælysternus Cafa x. cent. x.*

Veritatem Dorso in cavo flexa) Varia accidentia subiunguntur prout aut cervicis, aut dorso, aut lumborum vertebres afficiuntur, quæ ex *Hippoc.* recenset *Hellerius*: Primæ quidem cervicis perverſio mentum deprimit

ad pectus, summum loquendi ac deglutendi difficultatem excitat, ac extremum sacrum accersit: At vero in gibberibus reliquarum colli secundularum, cervix contorqueatur, respiranti pariter & loquenti spiritibus tenuis angustisq; clis exhibiturum, dormienti vero stertorem facit: Sed in gibbere Dorso ac thoracis, spiritus difficultat & cum sono fertur, costarum incrementa in laum sunt nulla, thorax anterior in quandam veluti conum acuminatus, sternum in acutum coactum: Sed in Jordosi extremus Dyspnœæ modus, paralyſis, torpor, stupor coxis, præter lubitum volutaris mictus ac defecatus: Post hæc in Goliſi, solutio nervorum frequentior ad partem laxatam, ad laus vero adversum distensio: Postremo quibus ad Lumbos repanda est, his accedunt renum & vesicæ vitia, abcessus ad illa aque inguina, coarctatis gæciliis, tarda & parca pubertas ac barba emissio, intercurdioresque sunt magis quam quibus obigit gibbei partibus diaphragmate superioribus tenus. *Idem.*

OBSERVATIO VI.

Gibbositas à vertebis intus vel extra, aut ad latera inclinantibus ortum ducit.

Semel vidi utrumque os Ilium cum ossæ sacro, Et bis horum alterum tantum cum prædicto ossæ symphyli unitum, accidentaria *ossæ* humorum piruitosorum *superiorum* ibi congestorum, & eorundem concretione, atque in ossam substantiam aut callum, si velis ossæum, conversionem: Saxillime vertebræ *parvæ*, nunc plures nunc pauciores simul conjunctæ, aut, ut verius dicam, unitæ, & tanquam in unum os redactæ visæ sunt: figuram nunc rectam nunc curvam, intro vel extra, vel ad alterutrum laus inclinatam habentes, unde *Asphæne*, *Asphæne*, *Asphæne*, cæteraque vitia spinæ sunt: Quæ Lutetie frequentissima sunt, & ubique in Gallia apud nobiliores familias, maxime puellas infestant, quas matres student demissis humeris esse vincto pectore, ut graciles fiant &c. *Severinus Pinna lib. 2. de Nat. Virginit. cap. 9.*

OBSERVATIO VII.

Anatome Gibbosi, cujus Pulmo integer repertus est; unde constat ejus affectus dyspnœam non semper esse comitem.

Mala partium conformatio & Gibbi perverſio apparet, quo multas quidem afferre narrationes possem, sed superat omnes ea quam audies: nimirum Antonio Santoro puero Neapolitano, quidem pusioni, sed 14. jam annos æmense, visos à me Gibberis omnes mire complexos, ad cervicis inquam & lumbos, & coccygis repanditurum, ad dorsum & pectus cyrtosus; à supremo dorso ad lumbos usque scoliosis; præter quas omnes gibboses estne alia quæ supersit: Quod autem summe dignum notari visum est, nulla puero respirandi difficultas, aut tum fuit, aut antehac; & de qua quidem re certos nos idem fecit, propterea quod Pulmo huic purior visus est. Non de his autem, sed de aliis secundum pulmonem affectis dixit *Cardanus*, quod Gibbosi crebriter spirant.

S C H O L I A.

Conſidera. Illud cum Lordosi permixta necessarium advertebat. *Florentinus* serm. 7. summ. 2. tit. 3. c. 40. ne nulla sit contra pectoris projectura, seu cyrtosis: Sic enim præter magnam pectoris angustiam, parva pectoris est intercedo, ac modica commoditas, per quam pulmo, quoad sit facis, extendi se permovendo possit: Sed contra hanc *Nicola* hypothesia est *Cardanus*, qui simul cum colitis contorqueat dorſi spinam, atque hanc vicissim cum colitis notavit, propterea quod colix vertebræ æque ac ster-

no mediæ, colligatæ sunt cum utriusque: quos it, ut quam emotionem incurrit possit, thorax, eandem & anticus (subæ) oportet, & contra: Quæ quidem *Cardani* ratio ut plerumque vera sit, non perpetua, namque consistat partis alterius integritas potest, si verba altera, quam nos rem Neapoli non semel vidimus, & admoniti per nos amici multi. *Armenius* l. 4. pag. 141.

Nulla respirandi difficultas (Causas quæ in scho- liis ad observat. 1.

APPENDIX. I.

Gibbositas insignis, muscularum thoracicum vitio excitata, feliciter topicis curata.

PRO certe statutz vir xl. annorum sic incurvabatur ut silicernium potius nonagenarium quam iditatis homo videretur. Adit ille varios, qui se vel dislocata membra restituerent, vel male conformata ad debitam figuram revocare profitebantur, sed irritum omnium conatu: Is quoque me adiit: Visa est non tam ex ossium quam muscularum, malis humoribus obfessorum vitio orta esse hæc mala corporis conformatio: Præparandis igitur & purgandis humoribus dum operam do, eaque fomenta adhibeo quæ illi morbo censebam idonea, cœpit ille non præter spem, sed opinione tamen mea citius se erigere, & intra sex septimanarum spatium ita sanari, ut corpus illud procerum, rectum sanumque circumfereretur. Observatio hæc admonitio sit ne Anatomia incautos decipiat, dum existimant omnem deformationem externam solum ab aliquo interne distorto osse originem sumere. *Theod. Kerkringii Observat. Anat. 15.*


APPENDIX. II.

Spinæ incurvatio & tortuositas febrem sequuta, resolutivis & roborantibus curata.

A Febre spinæ inflexionem & tortuositatem, à cervicis fine ad extremos lumbos, at non diu superstitem, vidi uno eodémque tempore in puero & puella: Anno 1668. per ætatem, vagata est febris tertiana Genevæ, qua prehensus fuit filius Nob. & Clar. Dom. Alex. de Hartsy Juriscons. annos natus novem; Hanc excepit spinæ inflexio & contorsio, per abscessum in vertebrarum ligamenta & musculos factum: Sollicitus & anxius admodum parens, qui mortuum filium superstiti & defuncti præferebar, præcipuos Chirurgos in consilium adhibuit: hi machinis, thoracibus cupreis & artificio multo rectitudinem & restitutionem moliebantur: Ego resolutivis solis & roborantibus rem transigendam esse assereram; discussio humore musculos & ligamenta imbuerent, eo per metallasini & abscessum ablegato, nec fortiter impacto, suam spinæ rectitudinem brevi restitutum iri: Fidem fecit eventus, cum enim curæ meæ tunc temporis commissa esset puella septem annorum, filia D. Favon Pharmacopœi olim peritici. post febrem quoque solutam Gibbosa facta, totus ex roborantibus & nevroticis parati ope; ac litus ex oleis lumbric. vulpini, castorei. & de castoreo, cum adipe hum. paucorum dierum spatio integre sanata fuisset, Eo exemplo commotus vir Clar. curam ut solus aggredere voluit, puellumque charissimum (Juvenem nunc procerum, præstanti corpore & animo) eadem methodo felicissime restitui: Hinc firmari potest opinio Schneideri Clar. de Gibberi causis, Scholiis ad Observat. 2. allata: Quæ de Tuberculis spinæ adnascentibus, vulgarissimâ Gibbositatis causâ, asseruntur, suspecta mihi sunt, nec enim ullum ex Anarome prostat exemplum: Aliquos insigniter gibbosos dissectos vidi, in quibus solam spinæ inflexionem deprehendere licuit, phymata vero nulla aut tubercula.

Finis Libri secundi.

NOI 1461 104





V. LOFFREDO



